





THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
PRO SCIENTIA
POPULIQUE
SALUTE
1891
LIBRARY


GENEVA BOTANICAL GARDEN
Septemb 1897
R W Gibson Inv

SYNOPSIS
VERBENACEARUM,
MYOPORINEARUM, SELAGINEARUM, STILBINEARUM, GLOBULARIEARUM ET PLANTAGINEARUM

OMNIUM

AD ANNUM MDCCCXLIV. COGNITARUM.

AUCTORE

GUILIELMO GERARDO WALPERS,

PHILOSOPHIAE DOCTORE, BOTANICEN IN UNIVERSITATE LITERARIA FRIDERICA GUILIELMA BEROLINENSI PRIVATIM DOCENTE, ACADEMIAE CAESAREAE LEOPOLDINAE CAROLINAE NATURAE CURIOSORUM, SOCIETATIS REGIAE BAVARICAE BOTANICAE RATISBONENSIS, SOCIETATIS SILESIACAE CULTURAE PATRIAE STUDIOSAE SODALI.

ADDITUS EST INDEX ORDINUM, SUBORDINUM, GENERUM, SECTIONUM, SPECIERUM ET SYNONYMORUM OMNIUM IN REPERTORII BOTANICES SYSTEMATICAE FASCICULIS I—XXVI OBVIORUM.

LIPSIAE.

SUMTIBUS FRIDERICI HOFMEISTER.

1844 & 1848.

REPERTORIUM

BOTANICES SYSTEMATICAE.

AUCTORE

GUILIELMO GERARDO WALPERS.

TOMUS IV.

ADDITUS EST INDEX ORDINUM, SUBORDINUM, GENERUM, SECTIONUM, SPECIERUM ET SYNONYMORUM OMNIUM IN FASCICULIS I—XXVI OBVIORUM.

LIPSIAE.

SUMTIBUS FRIDERICI HOFMEISTER.

1844 & 1848.

In praefatione ad tomum quintum nuntiaveram, Gustavum Reichenbach elaborandae Orchidearum synopsi operam dare eamque mihi esse traditurum, ut recipiatur in Repertorii tomum quartum complendum. Sed proh dolor! Orchidearum monographus paullo post ex inopinato in morbum incidit longinquum et gravissimum, terminusque ille, quo Orchidographia illa mihi iterum iterumque sanctissime promissa absolveretur, adeo remotus est, ut diutius exspectari vix queat.

Multi interea botanici iteratis me aggressi sunt precibus postularuntque, ut Repertorii fasciculorum viginti sex hucusque editorum indicem darem ordines, genera, species et synonyma omnia amplectentem, quo facilius citiusque reperiri possint plantae in Repertorium receptae vel etiam omissae. Quibus precibus eo minus repugnare potui, quum Repertorii non ulterius continuandi consilium jam cepissem.

Propterea indicem elaborari curavi locupletissimum, quem nunc tandem absolutum botanicis trado. Circiter septuaginta millia generum et specierum vel synonymorum exhibet, eumque tam assidua cum diligentia et cura elaboratum esse, mihi persuasum habeo, ut nullam fortasse speciem in Repertorio commemoratam statim non reperias. Specierum homonymarum nomina in indice accuratissime seorsim enumerantur; quominus synonymia ceteroquin molesta et taediosa

augeatur, ipsis illarum auctoribus horum nominum mutandorum a me relicta est cura. Nonnullas species a me bis esse in Repertorium receptas ex indice compertus sum, alterum illarum locum uncinis inclusum in indice reperies. Pauca, quae hucusque mihi emendanda videbantur, ad calcem totius indicis commemorantur.

Quum autem Repertorii tomus quintus et sextus jam editi essent neque nunc quoque sperare possem, Reichenbachium susceptam illam Orchidographiam jam proximo anno esse ad finem perducturum, admonente bibliopola indicem hunc tomo quarto adhuc incompleto inserere mecum statui. Memorabile hoc certeque inusitatum ὕστερον πρώτερον ab illis comprobari non poterit, qui ad causas non respexerunt, quibus ad hoc consilium perductus sim.

In tergo fasciculi vigesimi octavi fusius exposui, cur Repertorium amplius continuare nollem, simulque nuntiavi me in posterum editurum:

ANNALES BOTANICES SYSTEMATICAE

in quibus enumerabuntur plantarum phanerogamicarum nova genera et species omnia in botanicorum scriptis et in societatum doctarum diariis per ultimum annum descripta vel novis synonymis amplificata vel iconibus denuo illustrata. Quorum annalium tomus primus per aestatem instantem apparebit et annos 1846. et 1847. continebit.

Hunc librum ipso meo Repertorio multo utiliorem fore suspicor propterea que omnes illos botanicos, quos mihi fautores compertus sum, humanissime oro, ut me qualicumque modo pro viribus suis sublevent.

Scribebam Berolini Idibus Februariis
MDCCCXLVIII.

Dr. G. Walpers.

REPERTORIUM
BOTANICES SYSTEMATICAE.

TOMUS IV.

Relata refero.
Tacit.

Ordo CLVI. VERBENACEAE *Juss.*

(Juss. Annales du muséum d'histoire naturelle VII. 63. — Endl. Gener. plant. pag. 632. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 297. II. 189.)

Tribus I. *LIPPIEAE* Endl. Gener. plant. pag. 633.

Fructus exsuccus, raro subbaccatus*), nunc drupaceus 2-4-locularis, 2-4-partibilis, nunc achaenia 2-4 discreta.

A. Fructus maturus in achaenia 2—4 secedens.

I. (3692.) **CARYOPTERIS** *Bnge.*

(Bnge. Decad. plant. Monghol. 1. ex Ann. sc. natur. [2. Sér.] VI. 64. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 290. II. 198.)

1. C. MONGHOLICA Bnge. l. c. — Suffrutex leviter fragrans: foliis subintegerrimis incanis; paniculis axillaribus oppositis vel alternis et terminalibus; floribus amoene cyaneis; antheris nigricantibus, polline coeruleo. ♄ — Crescit in rupibus apricis montium Mongholiae fere totius, exceptis regionibus maxime borealibus et maxime australibus.

II. (3720.) **MASTACANTHUS** *Endl.*

(Endl. Gener. plant. p. 638. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 290. II. 198. — *Barbula* Loureiro, Flor. Cochinch. 444.)

1. M. (BARBULA Loureiro l. c. 445.) SINENSIS Endl. mss. — „Frutex lignosus pedalis: ramis ascendentibus paucis. Folia ovato-oblonga obtusa serrata, basi integerrima lineata tomentosa opposita, petiolis brevibus. Flores verticillati axillares, verticillis fastigiatis. Corolla alba". — Planta gratum spargit odorem. — Crescit locis incultis ad Cantonem Chinensium.

B. Fructus drupaceus 2—4-locularis vel demum 2—4-partibilis.

III. (3693.) **PERONEMA** *W. Jack.*

(W. Jack, Malay. misc. II. no. 7. pag. 46. ex Hook. Comp. bot. Magaz. I. 152. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 298. II. 198.)

1. P. CANESCENS W. Jack l. l. c. c. † — Planta arborea subramosa. Folia opposita pinnata, fere bipedalia, foliola 7-9-juga alternantia vel subopposita lanceolata, utrinque attenuata acuta subrecurva integra, supra glabra, infra canescentia, subtus reticulato-venosa 8-9-pollicaria. Petioli alati tomentelli, alis a foliolorum insertione decurrentibus. Stipulae nullae Rami panicula opposito-corymbosa terminati, ramuli ultimi dichotomi cum flore in dichotomia, omnes tomentoso-pilosuli. Bracteae parvae acutae. Flores minuti albidi. Calycis 5-partiti segmenta acuminata erecta. Corolla calyce non multo longior, limbo explanato irregulariter quinquelobo, segmentis 2 superioribus divergentibus, infima reliquis multo longiore. Stamina 2 reflexa inter segmenta corollae superiora, filamentis subulatis, basi incrassatis, antheris longis, adsunt staminum 2 sterilium rudimenta. Stylus staminibus longior, stigma simplex refractum. Fructus calyce inclusus villosus siccus quadripartibilis, nuculis monospermis. ♄ — Crescit in insula Sumatra.

---

*) *Cf. MONOCHILUM.*

IV. (3685. ex p.) **STACHYTARPHETA** *Vahl.*

(Vahl, Enumer. plant. I. 206. — *Verbenae* sect. a. et c. Endl. Gener. plant. p. 633. no. 3685. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 290. II. 198.)

Sectio I. EUSTACHYTARPHETA Wlprs.

Flores rhachidi magis minusve carnosae immersi vel adpressissime imbricati.

1. ST. (VERBENA Mill. Dict. IV. 595.) ANGUSTIFOLIA Vahl, Enumerat. I. 205. — Caule herbaceo erecto glabro ramoso; foliis lanceolatis, utrinque longe attenuatis remote obtuseque dentatis glabris; spicis longissimis carnosis; bracteis lanceolatis acutis membranaceo-marginatis. ⊙ — Caulis erectus quadrangularis glaber. Folia 3–4-pollicaria 6–9 lin. lata obsolete et irregulariter dentata, basi in petiolum longe attenuata, petioli oppositi pilorum serie connexi. Spicae breviter pedunculatae 4–6 poll. longae, etiam breviores. Bracteae lanceolatae dense imbricatae, margine scarioso auctae. — *Verbena Indica* Jcq. Observat. 4. t. 86. — Crescit in America meridionali. (v. s. c.)
2. ST. ELATIOR Schrad. Hort. bot. Gôtting. plant. rarior. I. ex Roem. et Schult. Mantiss. ad Syst. veg. I. 152. et Dissert. de Blumenbachia 19. t. 2. fig. 1. — Fnzl. in Jcq. fil. Ecloge pl. rar. II. 10. no. 56. — Rchb. Plant. hort. bot. I. tab. 59. — Caule herbaceo subsimplici; foliis lineari-lanceolatis, utrinque attenuatis remote serratis scabris, costa media margineque ciliatis; spicis longissimis; bracteis lanceolatis subulato-acuminatis calycem superantibus. ⊙ — Caulis 4–5-pedalis erectus. Folia 4-pollicaria et longiora. Spica demum ultra pedalis. Calyx oblongus, utrinque margine acute compressus, ore tridentato. Corolla violacea majuscula, tubo incurvo, laciniis limbi rotundatis. — *St. palustris* Jcq. fil. Eclog. plant. II. t. 159. — Crescit in Brasilia et in Guiana Britannica. (v. s. sp. et cult.)
3. ST. (VERBENA Linn. Spec. plant. 27.) INDICA Vahl, Enumerat. I. 206. — Caule tetragono sulcato herbaceo glabro; foliis lanceolato-oblongis obtusiusculis, basi attenuatis remote dentatis glabris; bracteis lineari-lanceolatis margine membranaceis, in aristam fere attenuatis, calyce parum longioribus. ⊙ — Folia 2–3-pollicaria lineari-oblonga et lineari-lanceolata remote subpinnatifido-dentata, dentibus obtusis. Spica longissima ultra pedalis, rhachide profunde exsculpta, flores densi vix exserti. — Crescit in Zeylania et in Guinea. (v. s. sp.)
4. ST. (VERBENA Linn. Syst. veget. 66. — Jcq. Observ. IV. t. 85. — St. Hil. Plant. usuelles du Brésil t. 39. — Vellozo, Flor. Flumin. I. t. 37?) JAMAICENSIS Vahl, Enumer. I. 206. — Caule herbaceo; foliis ovato-ellipticis serratis tenuissime ciliatis, supra scabriusculis, subtus glabris; bracteis lanceolatis acuminato-subulatis calyce brevioribus. ⊙? — Rami pilis brevibus sparse obsiti. Folia petiolata, petioli 1½-pollicares ciliato-hirti, lamina ad 2 poll. longa, pollicem lata latiorque, basi decurrens, argute serrata. Spica longissima cylindracea. Bracteae margine membranaceae. Corolla coerulea. — *Verbena folio rotundo serrato, flore coeruleo* Sloane, Hist. Jamaic. 171. t. 107. fig. 1. — *Valerianoïdes* Boerh. Hort. Lugd. II. 270. — *St. gibberosa* Rchb. Hort. botanic. II. t. 138??

   β. pilosiuscula: foliis rigidioribus utrinque scabriusculis, apice angustatis, dentibus serrulatis, bracteis subulato-aristatis calyce paullo longioribus. — *Stachytarpheta pilosiuscula* H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 279. † — (Ad urbem Angosturam.) — Crescit in America meridionali (in Brasilia, insulis Caribaeis). (v. s. s. et c.) — Variat caeterum foliis maximis ovato-rotundatis 4–5-pollicaribus.

5. ST. (VERBENA Vahl, Eclog. pl. Am. II. 2. t. II.) ARISTATA Vahl, Enum. I. 206. — Caule fruticoso; ramis subcinerascentibus; foliis oblongis in petiolum attenuatis basique integerrimis, caeterum aequaliter serratis, supra glabriusculis, subtus, praesertim ad nervos incano-pilosulis; spica terminali valde elongata; bracteis inferioribus patulis, superioribus adpressis calyce longioribus ciliolatis. ♄ — Rami purpureo-subcinerascentes. Folia sesquipollicaria, utrinque attenuata. Spica interdum fere pedalis. Bracteae unguiculares. Calyx florifer patentiusculus. — Crescit in America meridionali.

6. ST. (VERBENA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 23. † t. 34. fig. b.) DICHOTOMA Vahl, Enumer. I. 207. — Suffruticosa glabra vel hirto-pilosula: foliis ovatis, basi in petiolum angustatis, crenato-serratis, subtus hispidulis; spicis longissimis; bracteis lanceolato-subulatis calycem subaequantibus. ♃ — Caulis ad nodos compressus, hinc inde hispidulo-pilosulus. Folia late ovalia, 3-4-pollicaria, 1½-1¾ poll. lata vel etiam angustiora, basi longe cuneata in petiolum attenuata, utrinque glaberrima tenuiter membranacea vel hinc inde hispidula. Spica pedalis. Rhachis, bracteae et calyces glabri. Calycis prismatici pentagoni denticuli laterales longiores. — Planta Ruiziana certe non eadem ac Humboldtiana (cf. H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 279.) et plurimorum auctorum. Differt enim illa a nostra foliis apice angustatis, crenulatis, supra scabris, subtus canis 1½-2-pollicaribus. — Dubitaturi inspiciant iconem supra laudatam. — Crescit in Peruvia et Surinamo, etiam in littore Mexicano oceani Pacifici? (v. s. s. et c.)

7. ST. (ZAPANIA Poir. Encycl. méth. Suppl. V. 520.) URTICIFOLIA Sims, Bot. Magaz. t. 1814. — Caule herbaceo foliisque rugosis scabriusculis, caulinis late ovatis obtusis inaequaliter serratis, ramealibus ovatis acute serratis; spicis junioribus recurvis; bracteis ovatis calyce brevioribus. ♃ — Differt a *St. Jamaicensi* caulibus altioribus fere glabris, foliis minus crassis, subtus vix ad nervum scabris, magis acuminatis acutius (etiam basi) serratis, bracteis basi solum membranaceis. Corolla violacea. Calycis dens interior exteriore brevior, dentes exteriores latiores. [Folia 1½-3-pollicaria, 1-1½ poll. lata. — Valde affinis *St. dichotomae,* a qua non satis mihi videtur diversa.] — *Cymburus urticifolius* Salisb. Paradis. Londin. t. 53. (excl. synon.) — Crescit......? (v. s. c.)

8. ST. HIRTA H. B Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 280. † — Caule suffruticoso; foliis ovato-oblongis, apice angustatis crenato-serratis, supra scabriusculis, subtus cano-hirtis; bracteis linearibus subulato-subaristatis, calyce brevioribus. ♃ — Caulis subtetragonus crebre pilosulus. Folia acuta, basi in petiolum angustata, supra parce pilosula scabra. Petioli brevissimi. Spicae terminales subpedales. Bracteae lineari-subulatae strigoso-hirtae. Calyx tubulosus quadridentatus, dentibus acute mucronatis. Corolla pallide violacea. Stylus capillaceus glaber. — Affinis *St. dichotomae,* differt foliis crenato-serratis, spicis longioribus bracteisque angustioribus. — Crescit in collibus aridis regni Novo-Granatensis prope Olleros et Sondorillo.

9. ST. (VERBENA Rich. Act. soc. hist. natur. Paris. I. 105.) CAJANENSIS Vahl, Enumer. I. 105. — Caule suffruticoso; foliis ovatis crenato-serratis obtusissimis glabris; bracteis linearibus subulato-aristatis calycem subaequantibus. ♃ — Rami teretes, juniores hirti. Folia 2-pollicaria, 15 lin. lata, membranacea acuminata, basi in petiolum attenuata, crenis serrulatis, supra glabra, subtus ad nervos hirta. Petioli glabri aut hirtelli. Spica longa gracilis. Bracteae hirtae cum acumine calycem superantes. Calyx hirtus; corolla coerulea. — Variat etiam haec foliis acuminatis majoribus et minoribus obtusissimis 1½-3-pollicaribus. — In Cayenne, in Nova Andalusia crescit. (v. s. sp.)

10. ST. HIRSUTISSIMA Link, Enumer. plant. hort. Berol. I. 19. — Caule herbaceo foliisque ovalibus acute crenatis hirsutissimis; spica longissima; bracteis calyce minoribus appressis. ♃ — Caulis 1-2-pedalis erectus. Folia cum petiolo 4½-pollicaria, 2 poll. lata, in petiolum attenuata, acutiuscula, pilis rigidulis hirsutissima. Spica terminalis 1-2-pedalis. Bracteae lanceolato-lineares, 3 lin. longae. Calycis laciniae 4-lineares, 4 lin. longae. Corolla coerulea, tubo calycem 3 lineas superante, limbo 3 lin. longo, laciniis obtusis. — *St. rotundifolia* Lnk. in Hb. Reg. Berolin. — Crescit in Brasilia. (v. s. cult.)

11. ST. MARGINATA Vahl, Enumerat. I. 207. — Glabra: caule fruticoso; ramis teretibus; foliis subrotundis obtusissimis dentato-serratis, serraturis mucronatis, nervosis aveniis, dentibus margine cartilagineis; spica terminali elongata; bracteis lineari-lanceolatis attenuatis longitudine calycis, subtilissime striatis. ♄ — Folia pollicaria. Spicae semipedales, crassitie pennae columbinae. — Crescit in India orientali.

12. ST. STRIGOSA Vahl, Enumer. I. 207. — Tota strigoso-pilosa, suffruticosa: caulibus subquadrangularibus; foliis ovato-oblongis subrhombeisque, in petiolum angustatis, obtusis, crenato-serratis, serraturis mucronulatis marginatis, nervosis aveniis; spicis terminalibus elongatis; bracteis lanceolato-acuminatis, margine nervoque medio piloso-ciliatis striatellis, calycem aequantibus. ♃ — Planta tota pilis albidis strigosis sparse obsita est. Folia 1–1½-pollicaria, 6–9 lin. lata, basi longe cuneata integerrima in petiolum angustata, ovato-oblonga vel subrhombea. Spicae subsessiles hirsutissimae 6–9-pollicares, crassitie fili emporetici. — Folia supra parcius pilosa. — Crescit in insula St. Thomae. (v. s. sp.)

13. ST. UMBROSA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 280. † — Caule erecto obsolete tetragono pilosulo suffruticoso; foliis oblongo-ovatis in petiolum angustatis, utrinque acutis, grosse et argute serratis glabris; spicis subterminalibus; bracteis margine membranaceis scabrellis lanceolato-subulatis, calyce glabro brevioribus. ♃ — Folia membranacea bipollicaria. Petioli semipollicares et ultra, margine membranaceo alati. Spicae 4–5-pollicares crassitie pennae columbinae. Corolla coerulea. — Crescit in Peruvia prope Cumana.

14. ST. MICROPHYLLA Wlprs. mss. — Caule fruticoso? simplici? vel ramoso?; ramis densissime albo-lanatis: foliis oppositis minimis ovato-lanceolatis crenatis, (gemmis axillaribus foliiferis indeque) pseudofasciculatis, sub lana fere absconditis; spica terminali simplicissima pubescente, ramo fulciente crassiore; floribus in rhachide immersis; bracteis linearibus apice subulatis acutis calycem aequantibus; calyce compresso, apice bidentato; corollae intus pilosulae tubo calyce duplo longiore. ♃? ♄? — Video ramum pedalem simplicissimum, crassitie pennae columbinae teretem, densissime albo-lanatum. Internodia 3–5 lin. longa. Folia 2–3 lin. longa, sesquilineam lata crenata hirsutissima, sub lana fere abscondita. Spica semipedalis, ramo fulciente duplo crassior tetragona sessilis, adpresse pubescenti-lanata, floribus tota longitudine calycis rachidi immersis, apice bracteis florum nondum evolutorum comosa. Bracteae oblongo-lineares subulato-acuminatae, dorso pubescentes, 4 lin. longae, calyces aequantes, quam areolae rhachidis breviores angustioresque. Calyx compressus puberulus, apice bifidus, demum infra aridus pellucido-membranaceus, costa utrinque dorsali persistente viridi. Corolla glabra coccinea, tubo subcurvato, calycem duplo excedente, limbo subaequaliter quinquelobo, laciniis erectis ovatis integris. Fructus a calyce inclusus in fundo areolae absconditus bipartibilis, nuculis semicylindricis fuscescentibus glaberrimis. — Crescit in Brasilia ad Bahiam. (v. s. sp.)

15. ST. CANESCENS H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 281. † — Caule suffruticoso obsolete tetragono densissime villoso; foliis brevissime petiolatis, basi cuneatis reticulato-venosis serratis villoso-canescentibus; spicis subterminalibus (demum alaribus); bracteis lanceolatis subulato-aristatis villoso-hirtis, calyce multo longioribus. ♃ — Folia basi cuneata, praesertim subtus dense cano-villosa 1½–2-pollicaria. Spicae demum alares 8-pollicares, crassitie pennae anserinae. Corolla violacea. — Crescit in Peruvia ad Santa, in littore oceani Pacifici.

16. ST. HIRSUTA Jcq. fil. Eclog. plantar. II. (1844. edit.) 10. no. 57. t. 160. — Caule erecto tetragono patentim hirsuto; foliis oblongis obtusis grosse serratis, basi attenuatis integerrimis, utrinque hirsutis; spica stricta terminali elongata tereti undique imbricata puberula, rhachide non exsculpta; bracteis ovato-lanceolatis cuspidato-acuminatis, calyce longioribus; calycis rhachidi adpressi dentibus aequalibus subulatis; corollae tubo incurvo e calyce exserto; staminibus anantheris quam fertilia corollae tubo inclusa longioribus; fructu brunneo apiculato, e calyce demum subexserto. ♃ (Fnzl.) — Caulis erectus, 3 circiter lineas crassus. Folia 3–3½-pollicaria, 15–18 lin. lata sessilia, basi longe attenuata, e medio serrato-crenata. Spica sessilis quadripollicaris terminalis. Flores magni coerulei, laciniae limbi orbiculari-rotundatae subemarginatae, fauce alba pilosula. Calyx et bractea piloso-hispidus. — Affinis est *St. canescenti* nisi forte eadem. — Crescit in Brasilia.

17. ST. (VERBENA Linn. Syst. veget. 66.) ORUBICA Vahl, Enumer. I. 208. — Caule suffruticoso; ramis teretiusculis vix puberulis; foliis rhombeo-ovatis acutis serratis, utrinque pubescenti-scabriusculis; bracteis subrotundo-ovatis cuspidato-subulatis ciliatis calyce majoribus. ♃ — Frutex fere 6-pedalis ramosissimus. Folia bipollicaria et ultra grosse et acute serrata, basi cuneata, rigidula. Spicae subterminales 8–12-pollicares, crassitie pennae cygneae. Bracteae glabrae cum calyce ciliatae. Corolla violacea. — *Verbena Orubica Teucrii folio* Pluk. Alm. 383. t. 228. fig. 4. et t. 227. fig. 7. — *Sherardia Urticae folio subtus incano, floribus violaceis* Ehret. Pict. t. 5. fig. 1. — Crescit in insula Oruba et in regno Novo-Granatensi.

18. ST. (ZAPANIA Zuccagn. in Roem. Collect. 117. — VERBENA Jcq. Collect. II 334., Icon. II. t. 207. — CYMBURUS Salisb. Parad. Londin. I. 49.) MUTABILIS Vahl, Enumerat. I. 209. — Vent. Jard. de Malm. t. 36. — Andrews, Bot. Repos. t. 435. — Bot. Magaz. t. 976. — Tota incano-pubescens fruticosa: ramis tetragonis strictis; foliis petiolatis ovatis, ovali-oblongis vel etiam subcordato-ovatis acuminatis vel obtusiusculis, crenato-serratis, supra scabris, subtus pubescentibus; spica terminali elongata; bracteis e basi lanceolata subulatis calycem subaequantibus asperis. ♄ — Rami obsolete quadrangulares vel teretiusculi. Folia inferiora nonnumquam ternata, superiora opposita, petiolata, petiolo semipollicari alato. Folia (cum petiolo) 2½–4-pollicaria, 1½–2 poll. lata, basi nonnumquam subcordata, obtusa vel acuminulata, e forma subrotunda (folia juniora *Tiliarum* aemulantur) ad ovali-oblongam transeuntia, grosse crenato-serrata, serraturis saepius mucronulatis. Spica terminalis elongata 6–9-pollicaris, undique strigoso-pubescens, crassitie pennae cygneae. Bracteae e basi lanceolata subulato-setaceae rigidae, ante anthesin ultra dimidium recurvato-patentes, demum accumbentes. Corolla majuscula coccinea, deinde rosea. — *St. Zuccagni* Roem. et Schult. Syst. veget. I. 205. — *V. rosea* Hortor. — Crescit in America meridionali. (v. s. sp. et cult.)

19. ST. CRASSIFOLIA Schrad. Goett. Gelehrt. Anz. 1821. no. 72. p. 709. — Caule fruticoso; foliis oblongo-ovatis obtusis serrato-crenatis, supra glabris, subtus reticulato-venosis pubescentibus; spicis strictis; bracteis calyce duplo fere brevioribus. ♃ — Praecedenti maxime affinis, sed differt praeter characteres datos forma et substantia crassiore foliorum, spica multo breviore, floribus violaceis. Frutex mediocris, rami glabri. Folia in petiolum attenuata, quam in congeneribus crassiora. Spicae spithamaeae et ultra, bracteis ovato-lanceolatis acuminatis. Calyx uti bracteae glaber quadridentatus. Corolla violacea. — Schrad. l. c. — Crescit in Brasilia.

20. ST. TRISPICATA Nees et Mart. Nov. act. acad. caes. Leop. Carol. nat. curios. XI. 69. † — Caule fruticoso; ramis compressis; foliis oblongis utrinque attenuatis crenato-serratis glabris, subtus venoso-reticulatis scabris; spicis ternis; bracteis calyce brevioribus. ♃ — Frutex 6-pedalis, cortice pallido glabro, rami inferiores teretes, ramulis triangularibus. Folia 1–2-pollicaria in petiolum longe attenuata, utrinque integerrima, medio ambitu crenulato-serrata, ad venas margineque scabra. Spicae ternae terminales 1–2-pollicares brevissime pedunculatae cylindricae densae. Bracteae lanceolato-subulatae carinatae, medio pectinato-ciliatae, calyce breviores. Calyx prismaticus ad medium quadrifidus, laciniis lanceolatis obtusis. Corolla calyce duplo longior coerulea. — Proxima *St. crassifoliae*, sed differt foliorum forma spicisque ternis. — Crescit in Brasilia.

21. ST. QUADRANGULA Nees et Mart. Nov. act. acad. caes. Leop. Carol. nat. curios. XI. 69. † — Caule fruticoso acute quadrangulari; foliis ovatis acutis crenato-serratis, subtus scabris; spicis laxis; bracteis subulatis calyce brevioribus. ♄ — Differt a *St. prismatica* caule quadrangulo, angulis acute prominulis scabris a folio decurrentibus, foliis brevioribus ovatis acutis, basi abrupte in petiolum brevissimum attenuatis (nec longe petiolatis), minute obtuseque serratis, supra rugulosis glabris, subtus venoso-reticulatis, ad venas scabris, calycibus bracteisque duplo longioribus, floribus saturate coeruleis. — Crescit in Brasilia.

22. ST. HISPIDA Nees et Mart. l. c. † — Tota hispidissima: caule fruticoso; foliis ovatis basi cuneiformibus, apicem versus obtuse serratis; bracteis lanceolatis longitudine calycis. ♃ — Frutex 3–4-pedalis irregulariter dichotomus, dense setoso-hispidus. Folia 1½-pollicaria, e basi longe cuneata integerrima ovata acuta, utrinque dentibus 6–8 obtuse cuspidatis setosa, venis simplicibus. Spica semispithamaea satis crassa densa sessilis. Bracteae lanceolatae valde setosae. Corolla pulchre coerulea magna, ad faucem villosa. — Differt a *St. dichotoma* hirsutie parciori, foliis acutius serratis et spicis laxioribus. — Crescit in Brasilia.

23. ST. (VERBENA Linn. Spec. plant. 27. — Jcq. Icon. pl. rar. II. t. 208.) PRISMATICA Vahl, Enumer. I. 209. — Caule herbaceo glabro; foliis basi tenui in petiolum decurrentibus ovatis acutis serratis glabris scabrellis; spicis axillaribus terminalibusque tenuibus breviter pedunculatis; bracteis subulatis calyce brevioribus. ♃ — Folia opposita, petiolo 9–12 lin. longo, lamina bipollicari, 1–1½ poll. lata, argute serrata. Spicae ultra semipedales, terminales longe, axillares breviter pedunculatae. Calycis profunde quadripartiti dentes subulati Corolla coerulea. — *Verbena spicata Jamaicana Teucrii pratensis folio, disperma* Pluk. Alm. 382. t. 321. fig. 1. — Calyce demum lateraliter rumpente et fructu e calyce exserto prope accedit ad *Chascanum*. — Crescit in America meridionali. (v. s. sp.)

24. ST. SCABERRIMA Chamisso, Linnaea VII. 244. † — Subglabra, leptostachya, macrantha: caulibus ex inflorescentiis dichotomis, tetragono-alatis, foliis ovatis subacuminatis acutis, basi subinaequali acuminatis, lamina in petiolum decurrente. lateribus crenato-serratis, crenis mucronatis, acuminibus integerrimis, supra tenuissime scaberrimis, utrinque in nervo subtusque in venis rariter pilosis, bracteis membranaceo-paleaceis (aridis) lanceolatis acuminatis subcuspidatis calyce fructuque in rhachide immersis brevioribus. ♄ — Caules exacte tetragoni, angulis ala angusta instructis, scabris, pilorum serie simplici petioli connectuntur. Internodia 2–3-pollicaria. Folia cum petiolo 5-pollicaria, 20–24 lin. lata. Spicae pedales terminales et alares subsessiles, ramo, in quo sunt terminales, non crassiores. Bracteae lanceolatae vel ovato-lanceolatae acutissimae aridae scariosae subenerves semipollicares vel longiores. Calyx 9 lin. longus. Corolla subbipollicaris, extus glabra vel tenuiter puberula, fauce villosa, coccinea? Fructus lineari-cylindraceus acute rostratus 8 lin. longus. — *St. asperrima* Cham. mss. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

25. ST. GESNERIOIDES Cham. l. c. 245. † — Caule herbaceo erecto simplici tetragono, inferne suberoso-alato, pilis erecto-patulis dense obsito; foliis ellipticis obtusis crenatis, integerrima basi productis (acuminatis cuneatisve) sessilibus, subtus tomentosis, supra calvescentibus ; spica terminali stricta elongata tereti undique imbricata; bracteis lineari-lanceolatis acuminatis cuspidatis pilosis ciliatis, inferioribus calyce brevioribus, superioribus eodem longioribus; calycibus erectis adpressis (nec rhachidi immersis). ♄ — Internodia subbipollicaria, alae caulis inferioris suberosae. Folia venosa erecto-patula firmia, maxima cum acumine baseos 5¼ poll. longa, 2 poll. 4 lin. lata, superiora minora. Spica subsessilis, basi relaxata densissime imbricata, apice cuspidibus bractearum comosa. Calycis 5-dentati dens posticus brevior, pilosus, antice ad medium bifidus. Corollae tubus 9 lin. longus, limbo 4 lin. diametro. Fructus calyce inclusus, eodem dimidio brevior, 3½ lin. longus. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

26. ST. VERONICAEFOLIA Cham. l. c. 246. † — Fruticosa, erecta, ramosissima: ramis teretibus canescenti-sublanuginoso-pubescentibus; foliis ellipticis obtusis acutiusculisque, in petiolum attenuatis, grosse, haud profunde crenato-serratis, supra calvescentibus scabris, subtus pilis antrorsis canescenti-hirtis; spicis terminalibus alaribusque gracilibus laxifloris, rhachide angulata obiter foveolata, haud incrassata; floribus erectis et erecto-patulis non immersis; bracteis e dilatata basi anguste triangularibus acutis cuspidatis hirtis ciliatis, inferioribus calyce brevioribus, superioribus eodem longioribus. ♄ — Quodammodo foliis affinis est *St. strigosae*, spicis gracilibus floribusque exsertis toto coelo differt, a *St. Jamaicensi* recedit spicis gracilibus, pube tomentoque. Rami annotini lignosi teretes

glabri. Internodia $1\frac{1}{2}$–2–pollicaria. Folia complicata, lamina pollicari, semipollicem et ultra lata, parte petiolari 4 circiter lin. longa. Spicae sessiles maximae semipedales, lanuginoso–pubescentes. Bracteae margine pellucido–membranaceae, basi gibbae et dilatatae. Calyx compresso–tubulosus leviter recurvus 5–dentatus, dente postico breviori (2 lin. longo). Corolla calyce vix longior, ad faucem puberula. Fructus calyce inclusus compressus oblongo–ellipsoideus obtusus breviter rostratus. — Crescit in Brasilia.

† Species dubia.

27. ST.? (VERBENA Jcq. Hort. Schoenbr. I. 3. † t. 5.) SQUAMOSA Vahl, Enumer. I. 209. — Caule fruticoso tereti simplici vel ramoso villoso; foliis elliptico–lanceolatis serrulatis *alternis* utrinque attenuatis scabriusculis hirtis; pedunculis axillaribus longissimis, adpresse squamosis, simplicibus vel apice breviter ramosis. ♃ — Folia longiora semipedalia. Pedunculi 15–pollicares, toti hirsuti, squamis adpressis lanceolatis ciliatis tecti. Spicae solitariae vel ternae pollicares. Flores minuti. Calyx *pentaphyllus*, foliolis lanceolatis hirtellis. Corollae tubus albus, limbus coeruleus, labium superius oblongum semibifidum erectum, inferius tripartitum, laciniis linearibus oblongis emarginatis, intermedia obcordata. Filamenta tubo longiora. — Certe non hujus generis. — Crescit........?

28. ST. GIBBEROSA Rchb. Hort. bot. II. 15. † t. 138. — Hirtella: foliis ovatis in petiolum attenuatis serratis, bracteis calyce brevioribus basi globoso–tumescentibus. ♃? — Forte eadem ac *St. Jamaicensis??* — Habitat......?

Sectio II. MELASANTHUS Pohl, Plantar. Brasil. icon. et descript. I. 75.

Flores rhachidi non insidentes.

29. ST. POHLIANA Chamisso, Linnaea VII. 248. † — Erecta, ramosissima: caule inferne lignoso teretiusculo; ramis herbaceis oppositis obtusangulis, ad nodos compressis hirtis hirsutisve, summitatibus cum inflorescentiis subcanescentibus; foliis ellipticis acuminatis, basi in petiolum attenuatis et decurrentibus, antrorsum serratis, ex toto vel saltem supra in nervo, subtus in nervo et venis pilosis; spicis terminalibus alaribusque pyramidatis rectis laxifloris folia superantibus; floribus patulis; bracteis lanceolatis acutis. ♄ — Internodia $1\frac{1}{2}$–2–3–pollicaria. Rami e nodo quovis oppositi, iterum ramuliferi, spica alari terminati. Folia utplurimum longiora $3\frac{1}{2}$–pollicaria, 14 lin. lata patula, reticulato–venosa, venis subtus vix prominulis. Spica subsemipedalis, apicem versus angustata, rhachide calycibusque hirsutis. Calyx 5–nervius, breviter acuteque quinquedentatus, semipollicaris. Corollae sursum ampliatae tubus 9 lin. longus, intus basin versus villosus. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

30. ST. GLABRA Cham. l. c. 250. † — Fruticosa, dichotoma: ramis tetragonis, angulis nervosis, nodis compressis; foliis ellipticis, utrinque acuminatis, antice grosse aculeque serratis, petiolis linea marginali tenui deorsum arcuata connatis; spicis ellipsoideo–cylindraceis obtusis; floribus patulis patentibusque; bracteis lanceolatis acutis calyce brevioribus. ♄ — Internodia $\frac{1}{2}$–1–pollicaria. Margo interpetiolaris rarissime setula una alterave instructus. Folia tripollicaria, parte petiolari 9 lin. longa, 14 lin. lata. Spicae subsessiles vix foliis longiores. Rhachis angulata scrobiculata. Bracteae deciduae. Calyx semipollice paullo brevior nervoso–angulatus 5–dentatus, dente postico tenuiori. Corolla calyce duplo longior 9 lin. longa tubaeformis, sursum ampliata, intus fere ima basi villosa. Filamenta sterilia apice clavata. — Habitat in Brasilia.

31. ST. DISCOLOR Cham. l. c. 251. † — Erecta fruticosa glabra: caule tereti; ramulis tetragono–compressis; foliis coriaceis discoloribus, subtus glanduloso–punctatis, sessilibus subcordatis ovatis acutis leviter crenato–serratis; spicis densifloris ovoideis nutantibus terminalibus alaribusque; floribus patulis; bracteis calyce brevioribus e latiori basi in acumen angustum acutum productis. ♄ — Affinis *St. glaucae.* Internodia circiter bipollicaria. Folia adulta bipollicaria, pollice latiora, supra opaca, subtus ochroleuca. Spica obtusa circiter pollicaris. Calyx

subsemipollicaris tubulosus, antice planus 4–dentatus, prope dentem quintum minimum fissus. Corollae (7 lin. longae) tubus sursum ampliatus, ima basi intus villosa. Stamina sterilia apice non clavata. — Crescit in Brasilia.

32. ST. (MELASANTHUS Pohl, Plant. Brasil. icon. et descr. I. 78. † t. 62.) RHOMBOIDALIS Wlprs. mss. — Caule suffruticoso simplicissimo folioso pubescente lutescenti–viridi; foliis deciduis sessilibus erecto–patentibus subrhomboideo–rotundatis, apice serratis, dente majore terminatis glabris; spica solitaria terminali elongata; bracteis lanceolato–acuminatis glabris; corollis tubulosis nigrescentibus, intus velutinis. ♃ — Caulis bipedalis pennam corvinam crassus. Folia basi cuneata integerrima, utrinque glabra, venoso–nervosa, supra brunneo–viridia, infra lutescenti–viridia, unciam et quadrantem longa, unciam lata. Spica elongata apice subnutans, rhachide pubescente. Flores sessiles caduci. Calyx aridus glaber luteo–virens, corolla triente brevior obsolete quinquedentatus. Corolla subinaequalis decidua pure (??) nigra cylindrica glabra, laciniae limbi 5 rotundatae repandae. — Crescit locis aridis in montibus altis ad St. Antonio dos montes Claros ante Megaponte in Brasiliae prov. Goyaz.

33. ST. TRIPHYLLA Wlprs. mss. — Caule suffruticoso subramoso albido–pubescente; foliis ternatim verticillatis sessilibus obovato–ellipticis acuminatis apicem versus crenatis, dente supremo majori terminatis glabris, nervo ad basin pilosulis; spica terminali subsessili stricta densa; bracteis lanceolato–acuminatis glabris; corollis rubescenti–nigris. ♃ — Caulis bipedalis pennam anserinam crassus. Folia decidua, basi cuneata integerrima, sesquiuncialia, unciam lata, infra lutescenti–viridia. Spica elongata densa subsessilis. Rhachis pubescens. Flores sessiles. Bracteae lanceolato–acuminatae integrae glabrae nervosae. Calyx glaber lutescenti–viridis subaridus glaber. Corolla infundibuliformis calyce longior, intus velutina. — *Melasanthus triphyllus* Pohl, Plant. Brasil. icon. et descript. I. 79. t. 63. — In montosis siccis aridis ad St. Antonio dos montes Claros in Brasiliae provincia Goyaz.

34. ST. VILLOSA Chamisso, Linnaea VII. 247. — Caule fruticuloso tereti subramoso glabro; ramis foliosis albido–villosis; foliis deciduis decussatis sessilibus subrotundis crenatis ciliatis, basi cuneiformi angustatis villosissimis; spicis terminalibus densis cylindricis; bracteis ovato–acutis deciduis ciliatis pilosis; calyce tubuloso truncato acute quinquedenticulato; corolla cylindracea, sursum ampliata, intus basi villosa. ♄ — Fruticulus parum ultra spithamaeus. Folia crassa venoso–nervosa, supra sordide brunnescenti–viridia, subtus albescenti–viridia, 9 lin. longa, fere totidem lata. Bracteae rubescenti–luteae. Calyx rubescenti–luteus aridus pilosulus. Corolla infundibuliformis atropurpurea. Stamina sterilia subulata. — *Melasanthus villosus* Pohl, Plant. Brasil. icon. et descript. I. 76. † t. 60. — Crescit in pascuis graminosis ad Cavalcante, in Brasiliae provincia Goyaz. (v. s. sp.)

35. ST. CHAMISSONIS Wlprs. mss. — Caule suffruticoso, cano brunneo–tomentoso, apice ramoso; ramis foliosis; foliis crassis sessilibus subrhomboideis crenatis ciliatis, apice rotundatis, basi cuneiformi attenuatis pilosiusculis; spicis terminalibus demum valde elongatis laxiusculis; bracteis lanceolatis ciliatis pilosis; corollis atro–coccineis. ♃ — Caulis bipedalis et altior, penna anserina crassior, apice virescenti–canus. Folia ramea alterna, caulina magis opposita, basi cuneata integerrima, sesquiuncialia, unciam lata, reticulato–venosa pilosiuscula, subtus brunnescenti–lutea pilosa. Spicae terminales pedales vel ultra, rhachi villosa. Pedicelli brevissimi. Bracteae caducae lanceolatae pilosae. Calyx virescenti–canus pilosiusculus aridus, truncato–5–denticulatus. Corolla atrococcinea calyce parum longior, limbo irregulariter 5–lobo, lobis rotundatis crenulatis. Stamina sterilia subulata. — *Melasanthus longespicatus* Pohl, Plantar. Brasil. icon. et descript. I. 77. † t. 61. — Crescit in montosis aridis glareosis ad Serra de Cristaës in Brasiliae provincia Goyaz.

36. ST. INTEGRIFOLIA Wlprs. mss. — Caule suffruticoso subramoso pruinoso folioso; ramis fasciculatis fastigiatis; foliis sessilibus deciduis crassis ovalibus acutis glabris integerrimis pruinosis; spicis terminalibus densis sessilibus; bracteis oblongo–acuminatis flavescentibus; corollis atris, tubo rubescenti–nigro. ♃ —

Caulis teres glaber tripedalis substriatus, ad 4 lin. crassus. Rami brevissimi, apice spicigeri. Folia crassa herbacea opposita, supra brunneo-viridia, subtus luteo-viridia pruinosa uninervia, 4 uncias longa, 2 lata. Spica cylindrica densa nutans brevis. Rhachis glabra. Calyx luteo-viridis subaridus, breviter acuteque 5-dentatus, dentibus ciliatis. Corollae calyce longioris limbus intus velutinus, tubus intus glaber. — *Melasanthus integrifolius* Pohl l. c. 80. † t. 64. — Crescit in campis graminosis ad Pillar in Brasiliae provincia Goyaz.

37. ST. GLAUCA Wlprs. mss. — Caule suffruticoso tereti, apice ramoso cano-luteo pruinoso; foliis oppositis sessilibus crassis ellipticis glabris, apice dentatis glaucis pruinosis; spicis terminalibus brevibus sessilibus; bracteis latis acuminatis; corollis atris, tubo rubescenti-nigro. ♃ — Caulis glaber tripedalis, penna anserina crassior. Folia decidua erecto-patentia herbacea late obovali-elliptica obtusissima, basi integerrima subattenuata, supra medium remote dentata, $2\frac{1}{2}$ uncias longa, $1\frac{1}{2}$ lata. Spicae breves nutantes. Rhachis glabra. Bracteae deciduae. Calyx corolla dimidio brevior subaridus nigro-virescens glaber, obsolete quinque-denticulatus. Corollae limbus extus velutinus, tubus intus a fauce usque ad filamentorum originem hirsutus. — *Melasanthus glaucus* Pohl l. c. 81. t. 65. — Crescit in altis montosislocis graminosis in Serra S. Felis prope Rio Custodio in Brasilia.

38. ST. PSEUDOCHASCANUM Wlprs. mss. — Caule fruticoso tereti ramoso glabro; ramulis quadrangularibus; foliis oppositis coriaceis, utrinque glaberrimis petiolatis, e basi cuneata subrotundo-ovalibus crenato-serratis obtusis; spicis ternis terminalibus elongatis laxis, rhachi glabra, calycibus truncato-quinquedenticulatis demum antice fere basin usque fissis, fructus bipartiti duas tertias includente. ♄ — Ramuli quadrangulares, in faciebus profunde sulcati glaberrimi. Folia 2–$2\frac{1}{2}$-pollicaria, 1–$1\frac{1}{4}$ poll. lata, parte petiolari semipollicari, vix supra brevissime scabrella, infra pallidiora rufescenti-viridia, coriacea. Spicae ternae, intermedia brevius pedunculata, 6–7-pollicares laxae. Flores a me non visi. Bracteae brevissime subulatae caducae vel subpersistentes. Calyx ad 5 lin. fere usque longus glaberrimus, truncato-quinquedenticulatus, denticulo interiori saepe evanescente, demum longitudinaliter antice fissus. Fructus bipartitus subsemipollicaris, nuculis styli basi persistente superatis glaberrimis semicylindricis. — Habitu et patria omnino ad *Stachytarphetas* pertinet, et a genere *Chascano* differt etiam calyce plano-patente, nec apice convoluto. De floribus incertus malui hanc ad genus indigenum quam alienum referre. — In Brasilia prope Bahiam. (v. s. sp.)

39. ST. BIFURCA Bth. Plant. Hartw. 21. no. 178. — Caule herbaceo erecto dichotomo minute puberulo; foliis petiolatis ovatis crenatis, basi cuneatis; floribus in rhachide non impressis; dentibus calycinis subulatis; bracteis lanceolato-setaceis, calyce brevioribus. ⊙? — Vidi specimen defloratum, toto habitu valde accedens ad *Bouchéam*. Planta videtur annua simplex, apice trispicata, folia infima minora obtusa, superiora longe acuminata, omnia grosse acuteque serrata, subtus glauca, puberula, maxima cum petiolo tripollicaria, pollicem vel sesquipollicem lata. Spica canescens subsessilis laxa. Calycis dentes longe subulati. In Mexico (v. s. sp).

6. BOUCHÉA *Chamisso.*

(Chamisso, Linnaea VII. 252. — Meisner, Gener. pl. vascul. I. 290. II. 198. — *Verbenae* sect. b. Endl. Gener. plant. no. 3685.)

1. B. (VERBENA St. Hil. Pl. us. du Brés. t. 40. †) PSEUDOGERVÃO Chamisso l. c. 253! — Fruticosa: ramulis hirtellis; foliis glabris in petiolo nervisque raro pilosulis; pedicellis tribracteatis. ♄ — Habitu *Stachytarphetis* non dissimilis. Caules tetragoni glabri, ramuli subtetragoni striatelli parce pilosuli. Internodia valde inaequalia pollicaria et tripollicaria. Folia petiolata ovata, utrinque acuminata, inferiora rotundiora, grosse acuteque serrata, basi integra in petiolum attenuata, cum petiolo (4–9 lin. longo) $1\frac{1}{2}$–3-pollicaria, 9–15 lin. lata, supra glabriuscula, infra in nervis venisque cum petiolo parce remoteque pilosula. Flores brevissime pedicellati, laxissime remoteque racemosi, erecti, bracteis tribus setaceis petiolum aequantibus ad ejus basin; calyx cylindrico-tubulosus puberulus

semipollicaris, acute brevissimeque quinquedenticulatus, dentibus subsetaceis, duobus longe lateque coalitis. Corollae tubus calyce triente longior, intus ad faucem pilosulus, limbo subaequaliter quinquelobus, laciniis rotundatis. Stamina brevissima per paria superposita, antheris superiorum exsertis. — Crescit in Brasilia tropica. (v. s. sp.)

2. B. EHRENBERGII Chamisso l. c. — Herbacea: ramis pilis retrorsis brevissimis pubescentibus; foliis utrinque striguloso-pubescentibus; pedicellis unibracteatis. ♃ — Differt a praecedente calycibus, corollis, fructu tertia circiter parte brevioribus minoribusque, dentibus calycinis longius aristatis, spica magis densiflora, petiolis pro ratione laminae folio paullo longioribus. — Crescit in insula Sti. Dominici. (v. s. sp.)

3. B.? (VERBENA Rottl. mss. in Wall. Cat. no. 6318.) HYDEROBADENSIS Wlprs. mss. — Foliis ovato-ellipticis, basi in petiolum cuneatis, vix acuminatis, grosse serrato-dentatis, utrinque glabris, subtus reticulato-venosis; bracteis lanceolatis, margine membranaceis scabrellis, calyce dimidio brevioribus; calycis longe tubulosi dentibus subulatis inaequalibus. ♃ — Habitus omnino *Bouchéae*, sed flores explicati et fructus desunt, vix tamen *Verbenae* species, et ob stamina 4 perfecta potius ad hoc genus quam ad *Stachytarphetam* referatur. Folia cum petiolo semipollicari tripollicaria, pollicem lata vel minora. Calycis tubus fere semipollicaris glaberrimus, dentibus brevibus subulatis inaequalibus. Spica terminalis solitaria pluripollicaris pedunculata. — *Verbena Mysoorensis* Wght. Hb. — Crescit in India orientali ad Myssooree. (v. s. sp.)

VI. (3685/1.) SHUTTLEWORTHIA *Meisn.*

(Meisn. Gener. plant. vascular. I. 290. II. 198. et 360. — *Uwarowia* Bnge. Bullet. scientif. de l'ac. de St. Ptrsbrg. 1840. p. 278.)

1. SH. RUIZIANA Wlprs. mss. — Fruticosa incana procumbens: caulibus ramosissimis; foliis basin usque 2–3–fidis (unde verticillata videntur), laciniis lanceolatis integris vel cuneatis trifidis; spicis sessilibus involucratis capituliformibus paucifloris; corollae hypocraterifomis tubo calycem duplo superante, limbi laciniis emarginatis, duabus angustioribus integris. ♄ — Planta tota hispidula canescens. Caules pedales. Folia, an vere verticillata? an basin usque 2–3–fida?, laciniae semipollicares lanceolatae integrae vel apice 2–3–fidae cuneatae, margine revolutae. Bracteae lineari-oblongae calyce breviores. Calyx prismatico-pentagonus acute 5-dentatus. Corollae purpurascentis tubus hypocraterimorphus. — *Verbena clavata* Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 21. † t. 33. fig. 6. — Crescit in Peruvia prope Aricam.

2. SH. (VERBENA Sweet, Brit. flow. gard. [2. Ser.] III. t. 221. — Lindl. Bot. Regist. t. 1748.) SULPHUREA Meisn. l. c. II. 198. — Herbacea procumbens ramosa subsericea: foliis multipartitis, laciniis linearibus obtusis, margine revolutis; floribus in capitulum terminale globosum subumbellatum collectis sessilibus; bracteis lanceolatis calyce brevioribus; corollae calyce subduplo longioris tubo cylindrico extus glabro, intus barbato, laciniis bifidis. ♃ — Herba procumbens ramosa argenteo-canescens. Folia ½–1-pollicaria trifida vel irregulariter multifido-pinnatisecta, laciniis angustissimis obtusis. Capitula longe pedunculata terminalia solitaria, subumbellaeformia. Corolla pallide sulphurea, intus barbata, tetrandra (nec *diandra* ut habet Sweet), tubus fere pollicaris. Calyx et bracteae setuloso-hispidae. — Crescit in regno Chilensi. (v. s. c.)

3. SH. (VERBENA Spr. Syst. veget. II. 750. no. 42. — Pöpp. Coll. pl. Chil. I. no. 157!) DISSECTA Wlprs. mss. — Caule erecto herbaceo, infra medium brevissime ramuloso pubescenti-hispido; foliis basin usque 2–3–fidis, laciniis linearibus pinnatifidis vel trifidis linearibus obtusiusculis; spicis longissime pedunculatis terminalibus subcapitatis; bracteis calyce duplo brevioribus subtriangularibus; corollis calyce duplo longioribus glabris, laciniis subemarginatis. ♃ — Herba *Jasionem montanam* habitu referens, subsimplex, ramulis ascedentibus folia vix

superantibus. Folia 9–12 lin. longa pinnatifida vel trisecta, segmentis linearibus. Pedunculus in specimine suppetente 7-pollicaris, hinc inde bractea brevi effoeta instructus piloso-hispidus. Spica subglobosa capitata. Bracteae calyce duplo breviores canescenti-hispidae. Calyx tubulosus breviter 5-dentatus hispido-pilosulus, corolla duplo brevior. Corollae flavescentis? tubus supra calycem ampliatus glaber, limbi laciniae ellipticae subemarginatae. — Affinis magis characteribus quam habitu praecedenti. — Crescit in Chili in arenosis maritimis prope Concon. (v. s. s.)

4. SH. (VERBENA Spr. Syst. veget. II. 750. no. 42!) TENERA Wlprs. mss. — Caule ascendente ramoso; ramis erectis hirsuto-pubescentibus; foliis tripartito-pinnatifidis, laciniis pinnatifido-incisis integerrimisque linearibus obtusiusculis; spica terminali, ante anthesin capitata, post anthesin valde elongata laxa; bracteis ovatis acuminatis, calyce ultra triplo brevioribus; calycibus breviter subulato-5-dentatis, dentibus corollae glabrae tubo tertia parte brevioribus; laciniis corollinis obcordatis profunde emarginatis. ♃ — Herba gracilis tenera vix pedalis, striguloso-pilosula. Folia vix ultra 9 lin. longa congesta, laciniis linearibus obtusis. Spica fructifera demum ad 3 poll. longa. Corolla semipollicaris rosea? Fructum videre mihi non contigit. — *Sh.* (*Verbena* Sweet, Brit. flow. gard. III. t. 295.) *pulchella* Meisn. Gener. plant. vascul. II. 198. — Crescit in Chili et in Brasilia. (v. s. sp. et cult.)

5. SH. (VERBENA Spr. l. c. no. 43.) SELLOI Wlprs. mss. — Caule repente radicante hispido; foliis tripartito-pinnatifidis, laciniis linearibus ciliatis mucronatis; floribus subcapitatis longe pedunculatis; bracteis calycem aequantibus, e basi lata lanceolatis; corollis glabris, calyce duplo brevioribus, limbi laciniis integris. ♃ — Corolla coerulea? parvula. — Species e fragmento pessimo non describenda valde dubia, sed certe hujus generis, forte ad praecedentem removenda. — Crescit in Montevideo.

† *Species non descriptae.*

6. *SH. (VERBENA Bert. Herb. no. 1392. et 1809.) DICERAS Meisn. l. c. —
7. *SH. BERTERII Meisn. l. c. — *Verbena*....... Bertero Herb. no. 744. et 1389.

VIII. (3685.) VERBENA *Linn.*

(Linn. Gen. plant. no. 23. excl. spec. — Endl. Gen. plant. no. 3685. excl. sect. a. b. c. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 299. II. 199.)

Sectio I. ALOYSIOIDES Wlprs.

Calyx albo-pilosissimus. Corolla quadrifida. Flores verticillato-spicati.

1. V. SALVIAEFOLIA Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 42. — Fruticosa: ramis junioribus tomentosis; foliis ovato-lanceolatis sessilibus subserratis, supra scabris rugosis, subtus pubescentibus reticulatis; pedunculis lateralibus elongatis; floribus verticillato-spicatis; calyce hispidissimo; corollae limbo quadrifido. ♄ — Caulis erectus lignosus, demum glaber nitidus. Rami juniores dense tomentosi. Folia demum erosa opposita 1½-uncialia subcoriacea rugosa, supra atro-viridia, subtus pallidiora, punctis micantibus fragrantibus adspersa. Flores in spicam densam verticillatam dispositi, calyces albo-lanati. — Valde affinis sequenti, sed certe differt. — Crescit in Chili ad Coquimbo.

2. V. GRATISSIMA Hook. et Gill. Bot. Miscell. I. 160. — Foliis oblongo-ovatis breviter petiolatis coriaceis integerrimis subtridentatisque; floribus verticillato-spicatis; spicis lateralibus; calycibus albido-pilosissimis. ♄ — Frutex 8–10-pedalis, rami stricti graciles. Folia opposita vix uncialia coriacea, juniora scabrella, adulta glabra, subtus pallidiora, punctis glanduliferis numerosissimis fragrantibus adspersa, petioli brevissimi. Corolla parva semper quadrifida. — Simillima est *Aloysiae lycioidi*, sed nuculae huic tribuuntur quaternae, caeterum differt ab illa foliis fere duplo minoribus hinc inde tridentatis. Abhorret etiam floribus verticillato-spicatis a *Verbenis* reliquis et calycibus albo-lanatis ad *Aloysiam* prope accedit. — In utramque hujus sectionis speciem erit inquirendum. — Crescit in montosis apud Mendozam, ubi ab incolis „Cedron“ appellatur. (v. s. sp. pess.)

Sectio II. **VERBENACA** Wlprs.

Calyx glaber vel hispidus. Corolla quinquefida. Flores alterni spicati.

§. 1. *Spinosae.*

A. SERIPHIOIDEAE Wlprs. — Spinae a foliis distinctae.

3. V. **SERIPHIOIDES** Gill. et Hook. in Hook. Bot. Misc. I. 164. — Fruticosa: ramulis brevissimis; foliis densissimis connatis ovato-triquetris crassis carinatis, superne canaliculatis obtusis glabris, spinis oppositis connatis late subulatis subfoliaceis ciliatis, demum elongatis rigidissimis integris trifidisve; floribus subsolitariis. ♄ — Tri-quadripedalis ramosa, rami breves numerosi. Folia vix duas lineas longa glabra. Flores in apicibus ramulorum. Bractea ovata. Calyx tubulosus angulatus. Corolla calyce dimidio longior albescenti-lilacina. — Habitus omnino generis *Seriphii.* — Crescit in provincia meridionali Mendozae.

4. V. **CAESPITOSA** Gill. et Hook. l. c. 165. — Fruticosa: ramis densissime caespitosis brevibus, ramulis brevissimis; foliis connatis oblongis obtusis, supra canaliculatis adpresse pilosis; spinis oppositis connatis subulatis rigidis integris; capitulis bifloris. ♄ — Habitu praecedenti haud dissimilis, sed multo compactior foliisque adpresse pubescentibus differt. Radix crassa lignosa. Flores gemini intra bracteas duas connatas ciliatas concavas. Stylus basi incrassatus articulatus in ovarii apice. — Crescit in „Paramillo de Uspallata".

5. V. **ASPARAGOIDES** Gill. et Hook. l. c. — Foliis fasciculatis lineari-oblongis obtusis pubescentibus, majoribus revolutis; spinis tripartitis; capitulis paucifloris; bracteis lanceolatis dentibusque calycinis spinosis; floribus pubescentibus. ♄ — Folia lineam vel sesquilineam longa. Spinae juniores margine angustissime foliaceae. — Crescit in summo fere jugo Uspallatae apud Cerro del Portezuelo.

B. ERINACEAE Wlprs. — Folia et bracteae spinescentia.

6. V. **MINIMA** Meyen, Reise um die Erde I. 451. — Wlprs. Nov. act. acad. Leop. Carol. XIX. Suppl. I. 379. — Fruticulosa ramosa: foliis densissime imbricatis carnosis linearibus acutis pungentibus integerrimis subrecurvis carinatis, basi vaginantibus glabris; floribus solitariis axillaribus sessilibus; corollae purpureae fauce hirsuta. ♃ — Crescit in Peruvia, Laguna de Titicaca. (v. s. sp.)

7. V. **POLYCNEMOIDES** Lagasca, Gener. et spec. plant. 18. — Suffruticosa ramosissima: foliis subulatis basi connatis subpungentibus; floribus axillaribus geminis sessilibus. ♃ — Habitus omnino *Polycnemi arvensis.* — In Bonaria.

8. V. **TRIDACTYLIDES** Lagasca, Nov. gener. et spec. 19. — Spicis capitatis terminalibus solitariis; foliis minutis connatis bifidis linearibus. ♄ — Fruticulus 1-2-palmaris, *V. thymifoliae* quoad habitum simillimus. — Crescit in insulis Maluinis.

9. V. **TRIDENS** Lagasca l. c. — Fruticosa: foliis trifidis, laciniis subulatis acerosis, spicis cylindricis (terminalibus?); bracteis brevibus tridentatis. ♄ — Frutex 3-4-pedalis. — Crescit in America meridionali.

10. V. **TRIFIDA** H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 273. † t. 134. — Caule erecto stricto ramoso (??); ramis tetragonis pubescenti-hispidis; foliis sessilibus trifidis cuneatis, laciniis lanceolatis acuminatis rigidis integerrimis, utrinque hispidis; spicis compluribus abbreviatis in capitulum terminale globosum conglomeratis. ♄? ♃? — Ramus (illustratus) pedalis, folia 14 lin. longa, 2-3 lin. lata trinervia, margine revoluta. Bracteae lanceolato-subulatae calyce paullo breviores. Calycis hispidi dentes subulati. Corollae laciniae subpatentes rotundatae emarginatae. — Crescit in montibus Mexicanis inter pagum Totonilco el Grande et pontem Dantoe vel Stae. Virginis.

11. V. **JUNIPERINA** Lagasca, Gener. et spec. plant. 19. — Fruticosa ramosissima pubescens: foliis oppositis profunde tripartitis, laciniis acerosis pungentibus, adultioribus rigidissimis persistentibus; capitulis florum terminalibus; bracteis calyce longioribus subulatis. ♄ — Habitus fere *Ulicis Europaeae* v. *nanae.* Planta 4-5-pedalis valde ramosa. Flores albi vel pallide purpurei. Corolla glabra, tubo

semiunciali superne inflato, calyce dimidio longiore. — *Verbena juniperina* Gill. et Hook. Bot. Miscell. I. 163. certe eadem est planta. — Crescit in convallibus Andium prope Mendozam.

12. V. ERINACEA Gill. et Hook. in Hook. Bot. Miscell. I. 164. † t. 48. — Fruticosa humilis caespitosa: foliis densis oppositis connatis acerosis strictis ciliatis pungentibus, demum elongatis spinescentibus; capitulis paucifloris inter folia immersis. ♄ — Radix crassa lignosa. Tota planta spinosissima. Capitula sessilia immersa 2-3-flora versus apicem ramorum. Bracteae ovato-lanceolatae mucronatae, calyce elongato tubuloso striato hirtello quadruplo breviores, calycis dentes pungentes. Corolla calyce subdimidio longior. — Crescit in summo jugo montium Uspallatensium ad Mendozam.

§. 2. *Inermes.*

* *Folia fasciculata.*

A. SELAGINOIDEAE Wlprs. — Foliis alternis simplicibus fasciculatis.

13. V. SELAGINOIDES Kunth mss. — Caule fruticuloso erecto ramoso; ramis teretibus striatis striguloso-hispidis; foliis alternis fasciculatis linearibus obtusis uninerviis, margine revolutis, utrinque striguloso-hispidissimis, supremis singularibus sensim in bracteas transeuntibus; spicis densissimis subcapitatis multifloris; bracteis foliaceis lanceolatis, calyce longioribus; corollae calycem duplo excedentis tubo tenuissime puberulo, limbi quinquefidi laciniis obovalibus, infima productiori. ♄ — Fruticulus habitu *Selaginum*, bipedalis vel altior; rami virgati subsimplices. Folia densa alterna, gemmis axillaribus evolutis fasciculata (internodia brevissima) anguste linearia, semipollicaria, axillaria breviora, glauco-viridia, praesertim subtus striguloso-pilosa. Folia suprema solitaria alterna breviora, 3 lin. longa. Spica brevis densa subcapitata multiflora. Flores pulcherrime azurei. Calyx pilosulo-hispidus quinquedentatus, dentibus linearibus foliaceis corollae tubo duplo brevioribus. Corollae tubus 4 lin. longus subcurvatus, sursum ampliatus, faux nuda, stamina 4 didynama tubo supra medium adnata brevissima inclusa. Stylus staminibus brevior. Fructus desideratur. — Bracteae inferiores longitudine tubi corollini, superiores breviores. — *V. alternifolia* Hortor. — Crescit.......? [in Chili?] — (v. s. et v. c.)

14. V. ASPERA Gill. et Hook. Bot. Misc. I. 163. † — Fruticosa: foliis alternis plerumque fasciculatis oblongo-lanceolatis acutis subpiloso-asperis; spicis elongatis sessilibus pubescentibus; floribus imbricatis; corollis calyce duplo longioribus quinquefidis. ♄ — Caules et rami adulti lignosi pallide fusci. Rami patentes, juniores pilosi vel pubescentes. Spicae ad 4-5 uncias longae, breviores densius imbricatae. Bracteae subulatae longitudine fere calycis. Flores albi glabri. Nuculae 4 primum arcte coalitae. — Crescit locis incultis inter Mendozam et jugum Andium, etiam in convalle Uspallatensi.

B. THYMOIDEAE Wlprs. — Folia fasciculatae opposita trifida vel pinnatifida.

15. V. THYMOIDES Chamisso, Linnaea VII. 257. † — Fruticulosa, ex toto subcanescenti-strigosa (nec scabra): caulibus erectis ramosis; foliis oppositis discretis tripartitis, laciniis lateralibus bifidis integris dentatisque, omnibus linearibus, margine revolutis pseudo-acerosis; capitulis terminalibus, saepius paucifloris, floriferis capitatis, fructiferis relaxatis oblongis; bracteolis ex ovato lanceolatis acutis integerrimis vix dimidium calycem aequantibus. ♃ — Suffrutex *Thymi vulgaris* facie vel caulibus elongatis foliisque flaccidioribus habitu galioide. Caules decumbentes et erecti, simplices et ramosissimi tetragoni, internodia ½—2 poll. longa. Folia pleraque semipollice breviora, saepe accedentibus axillaribus pseudo-fasciculata. Spicae subsessiles 6-10-20-florae terminales. Calyx 2½ lin. longus. Corolla glabra coerulea, ad faucem eximie barbata. Fructus calyce inclusus pallidus lineam longus. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

16. V. CALCICOLA Wlprs. Nov. act. acad. Caes. Leopold. Carol. nat. curios. XIX. Suppl. I. 378. † — Herbacea prostrata ramosissima strigoso-hispi totaque pul-

vere calcareo adspersa nivea: foliis oppositis fasciculatis linearibus, vel hinc inde tripartitis, margine revolutis acutis strigoso–asperis; capitulis terminalibus solitariis sessilibus; bracteis subulato-linearibus calycem superantibus, corollae puberulae tubum aequantibus superantibusve. ♃ — Herba prostrata sublignosa ramosissima, nivea strigoso–aspera, rami nodosi, internodia 3–12 lin. longa, ramulis novellis subtetragonis. Folia fasciculata, (gemmis axillaribus evolutis) linearia, bi–tripartita vel saepius simplicia, margine revoluta subulata acuta, 3—7 lin. longa, strigoso–aspera nivea. Capitulum terminale multiflorum subcapitatum, inter ultimos foliorum fasciculos sessile. Corollae e sicco roseae puberulae tubus calyce dimidio longior, limbi laciniae rotundato–ovales. Calycis quinquedentati strigosi dentes demum basin usque secedentes. Nuculae glabrae dorso rugosae. — Crescit in Peruvia in Pampa grande de Arequipa (v. s. sp.)

17. V. LIPOZYGIOIDES Wlprs. mss. — Prostrata tomentoso–pilosa (glanduloso–viscida): foliis angustissime linearibus obtusis pinnatifido–multipartitis, laciniis infra uninerviis, margine subrevolutis; capitulis densis terminalibus; bracteis lineari–subulatis calycem aequantibus piloso–glandulosis ciliatis; calycibus tubulosis acute quinquedentatis strigosis; corollae glabrae, ad faucem pilosulae tubo calyce dimidio longiore, laciniis obovatis emarginatis. ♃ — Caules e basi lignosa prodeuntes prostrati subtetragoni, nodosi. Folia semipollicaria vel paullo longiora, angustissime multifida pinnatifida, laciniis obtusis, foliis ramuli axillaris abortientis accedentibus, unde folia fasciculata apparent, undique glanduloso–pilosa canescentia. Spica terminalis a foliis ultimis brevissimo spatio sejuncta vix pollicaris subcapitata. Flores carnei? tubo 4½ lin. longo, quantum e calyce emergit, inflato.

β. *minima:* foliis simplicioribus trifidis, lacinula media apice plerumque profunde tridentata. — Habitu multo graciliore recedit foliisque brevioribus vix ultra 3 lin. longis capitulis paucifloris subumbellatis, sed ceterum hanc non diversam esse existimo. — Bertero, Hb. plant. Chilens. 1390. — Crescit in Chili. (v. s. sp.)

** *Folia opposita non fasciculata.*

A. JUNCEAE Wlprs.

Caules ramique aphylli, subaphylli vel foliis decurrentibus alati.

18. V. SCOPARIA Gill. et Hook. in Hook. Bot. Miscell. I. 161. t. 47. — Fruticosa glaberrima: ramis oppositis junceis teretiusculis sulcatis; foliis valde remotis subsessilibus saepe deciduis, ovali–ellipticis vel oblongis obtusis vel acuminulatis integerrimis; spicis terminalibus laxiusculis; calycibus truncato–quinquedenticulatis; corollae tubo multo longiori, sursum infundibuliformi, laciniis limbi parvis oblongis subaequalibus. ♄ — Frutex habitu *Spartii juncei*, glaberrimus glaucescens?, internodia saepe quadripollicaria, folia saepius minuta, vel decidua, maxima pollicaria, 3 lin. lata, pleraque, eaque superiora 3 lin. longa obovata, subcoriacea integerrima glabra. Ramuli abeunt in spicam sesqui–bipollicarem laxam. Flores sessiles odorati. Calyx puberulus, demum glaber? Corollae tubus calyce ultra triplo longior, 4 lin. longus, fauce pilosa. Fructus non visus. — *Citharexylum? alpinum* Poepp. Colect. pl. Chil. II. no. 85. (9.) — Aliud specimen quod vidi, ad *V. junceam* referendum erat. Crescit in Andibus Chilensibus a Rio Colorado usque ad la Guardia de los Hornillos, in vallibus ad Villovizergio, Uspallata, ad Mendozam et alibi. (v. s. sp.)

19. V. JUNCEA Gill. et Hook. in Hook. Bot. Miscell. I. 162. † — Suffruticosa: ramis elongatis teretibus glabriusculis; foliis remotis parvis oblongo–lanceolatis integerrimis vel serratis, petiolo brevi inferne latissimo decurrente; spicis oblongis laxis; stylo exserto. ♃ vel ♄. — Tripedalis, basi fruticosa, superne herbacea ramosa, ramis elongatis attenuatis teretibus glabris vel sub lente tenuissime pubescentibus junceis. Folia remota semiuncialia ovato–lanceolata subcoriacea glabra,

integerrima vel grosse serrata, breviter petiolata, petiolo inferne dilatato decurrente. Spicae biunciales subcylindraceae, basi bifoliae, flores laxiusculi. Bracteae minutae. Calyx cylindraceus glaber aut pubescens etiam subglanduloso-pilosus sessilis. Corolla calyce triplo longior curvata, limbo parvo quinquelobo. Stylus sublonge exsertus.

α. Foliis integerrimis; spicis pubescentibus.

β. Foliis grosse serratis; spicis glabriusculis. — Crescit in Chili prope la Guardia in valle fluminis Aconcagua ad Rio del Diamante. (v. sp. s.)

20. V. EPHEDROIDES Chamisso, Linnaea VII. 260. † — Fruticosa ramosissima subaphylla: ramis tetragonis glabris laevibusque; foliis squamaeformibus recurvis; spicis laxiuscule densifloris sphaeroideis cylindricisque terminalibus; panicula amplissima laxa. ♄ — Rami lignosi (sesquipedales) ramulosissimi, juniores tetraquetri subalati. Internodia sesquipollicaria, raro 3-pollicaria. Folia squamaeformia triangularia acutiuscula subsemiamplectentia exiguo margine instructa, apice recurva. Spicae pilis albis adpressis pubescentes, vix 2 lin. crassae. fructiferae ¾ poll. longae, floribus erecto-patulis. Flores infimi duo saepe remoti extimum ramuli nodum occupant. Bracteolae minutae membranaceae foliaceae. Calyx tubulosus striguloso-pubescens acute quinquedentatus brevis. Corolla extus pubescens, intus villosula, ad faucem barbata, limbo quinquefido. Fructus calyce inclusus quadripartibilis pallide lutescenti-griseus. — Affinis *V. scopariae* Gill. et Hook. et *junceae* Gill. et Hook. sed ab utraque certe diversa jam foliis triangularibus. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

21. V. GLAUCA Gill. et Hook. Bot. Misc. I. 163. — Suffruticosa: ramis elongatis teretibus filiformibus glaucis; foliis distantibus minutissimis linearibus; capitulis ovatis subpubescentibus; floribus dense imbricatis: bracteis exterioribus calyce duplo majoribus cordatis rigidis pungentibus. ♃ — Species distinctissima ob caules filiformes glaucescentes folia remota minuta vix tres lineas longa, ob capitulum florum extus bracteis longis rigidis magnis instructum. Bracteae interiores minores. — Crescit in Chili prope flumen del Diamante ad Poso de los Ancos.

22. V. APHYLLA Gill. et Hook. mss. in Hook. Bot. Miscell. I. 161. t. 46. — Ramis flexuosis teretibus striatis glabris aphyllis; spica pubescente. ♄ — Caules ramosissimi 3-4-pedales striati, rami flexuosi teretes oppositi acutiusculi, omnino aphylli. Stipulae ad basin ramorum minutae fuscae, demum deciduae. Spicae unciales vel biunciales ramos breves terminantes multiflorae. Flores fragrantes, odorem melleum spirantes. Bracteae minutissimae orbiculari-rotundatae squamaeformes. Calyx cylindraceus pubescens angulatus, corolla duplo brevior. Corollae limbus quinquelobus. — Crescit in Andibus Chilensium prope Villa Vicenzia et inter „Los Chacayes y los Arbolitos" prope Mendozam.

23. V. SPATHULATA Gill. et Hook. Bot. Miscell. I. 162. † — Suffruticosa: ramis elongatis attenuatis flexuosis glabris; foliis remotiusculis lineari-spathulatis integerrimis pubescenti-scabris; spicis capitatis oblongis pubescentibus. ♄ — Bipedalis, inferne fruticosa, superne subherbacea, rami elongati flexuosi subulati, siccitate nigrescentes glabri, superne attenuati. Folia rara remota, superiora praecipue, uncialia vel sesquiuncialia sessilia siccitate margine revoluta, pubescenti-aspera, suprema linearia minora. Capitula uncialia. Flores numerosi imbricati. Bracteae lanceolato-subulatae, calyce dimidio breviores. Calycis cylindracei dentes elongati. Corollae tubus pubescens, calyce dimidio longior, limbus quinquelobus. — Crescit in valle „las Lenas Amarillas" in Andibus Mendozae.

24. V. ALATA Chamisso; Linnaea VII. 258. † — Sweet, Brit. flow. gard. (2. Ser.) I. t. 41. — Ramis junceis quadrialatis subaphyllis, angulis nervosis scabris, faciebus tenuiter nervosis laevibus glabris; foliis sessilibus ovatis vel triangulari-oblongis acutis integerrimis dentatisque trinerviis striguloso-scabris; spicis densifloris subcylindricis brevibus cymoso-subfastigiato-paniculatis, apicalibus sessilibus. ♃ — Herba 2-3-pedalis, internodia inferiora approximata, superiora valde elongata 4-6-pollicaria. Caulis et rami late tetragono-alati, ad nodos contracti glabri, ramuli inflorescentiae strigilloso-scabrelli. Folia squamaeformia

subnulla, (in hortis) pollicaria vel bipollicaria, pollice latiora, grosse duplicato-serrata et subintegerrima, sub-5-nervia, supra glabra, infra praecipue in nervis venisque piloso-scabrella. Pedunculi corymboso-trichotomi, spicas ovali-sphaeroideas vel subcylindricas breves breviter pedicellatas gerentes. Bracteae ovato-acuminatae strigoso-hispidulae, calyce breviores. Calyx tubulosus acute quinquedentatus, glaber, (dentes sicci apice violascentes). Corolla incarnata? puberula calyce longior, laciniis limbi 5 inaequalibus ellipticis. Fructus a calyce inclusus quadripartibilis. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp. et c.)

25. V. SAGITTALIS Cham. l. c. 259. † — Ramis junceis quadrialatis subaphyllis, angulis nervosis scabris, faciebus tenuiter nervosis, inter nervos serialim areolato-impressis, areolis orbicularibus oblongisque puberulis; foliis sessilibus ovatis vel triangulari-oblongis acutis integerrimis dentatisque trinerviis strigoso-scabris; spicis densifloris cylindricis aggregatis subternis, lateralibus minoribus sessilibus. ♁ — Praecedenti proxima, differt tamen faciebus ramorum jam oculo nudo impresso-punctatis et inflorescentia. Dignoscitur insuper spicis multo crassioribus, densius imbricatis fere 5 lineas crassis, terminali pollicari, calycibus majoribus 4½ lin. longis, fructu majori sesquilineam fere longo tenuius nervoso, non sulcato ferrugineo, singulis carpellis dorso cum nervis marginalibus tenuiter quadrinerviis, marginem versus tenuiter strigulosis, faciebus concoloribus strigulosis, angulo faciali subenervi. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

B. FOLIOSAE. — Folia distinctissima.

1. Micranthae Wlprs. — Flores (pro ratione spicae) parvi in spicam cylindricam vel filiformem digesti, numquam fastigiati.

a. Holophyllae. Folia integra, crenata, serrata vel inciso-dentata.

26. V. ANGUSTIFOLIA Michx. Flor. Bor. Americ. II. 14. — Erecta vel ascendens, pubescenti-hispida: foliis lineari-lanceolatis, basi longe attenuatis obtusiusculis, infra lineato-venosis, e medio apicem versus dentato-serrata; spicis filiformibus solitariis terminalibus axillaribusque elongatis. ♃ — Herba sesqui- vel bipedalis erecta ramosissima pilosulo-scabra. Folia maxima tripollicaria vel longiora, vix semipollicem lata, culta latiora brevioraque, dentibus hinc inde evanescentibus, supra glabriuscula vel setulis brevissimis aspersa, infra praecipue in nervis setulosa. Spicae maximae semipedales filiformes, laxiusculae. Bracteae lanceolato-subulatae calycem aequantes, calyx inaequaliter aculeque 5-dentatus, corollae violaceae (?) glabrae tubus parum exsertus. Fructus calycem explens vix lineam longus, carpellis fuscis glabris rugosis. — *V. rugosa* Mühlenbrg. in Willd. Enumer. pl. hort. Berolin. 633. — *V. integrifolia* Michx. mss. — Occurrunt specimina simplicissima 8-10-pollicaria foliis angustissime linearibus integerrimis, spica terminali simplicissima strictissima. Sed ea vix pro varietate habeo. — Crescit in America boreali locis humidis et in arvis.

27. V. CAROLINIANA Willd. Spec. plant. I. 119. — Pubescenti-scabra: caule erecto subsimplici subtetragono; foliis obovalibus obtusis (raro acutis), basi longe attenuatis crenato-dentatis; spicis terminalibus longissimis filiformibus remotifloris; bracteis lanceolato-subulatis calyce triente brevioribus. ♃ — Herba bipedalis vel etiam altior subsimplex glauco-viridis, pubescenti-scaberrima. Folia 2½—3½ poll. longa, pollicem lata plerumque obtusa, basi longe attenuata integerrima, infra reticulato-venosa. Calyx inter dentes membranaceus. Corolla pallide violacea, tubus 3 lin. longus breviter exsertus puberulus, limbi laciniae tres minores suborbiculatae, duabus majoribus altius coalitis. Fructus calycem explens, styloque basi persistente subexserta pyriformis, nuculis arcte coalitis glabris, dorso ruguloso-sulcatis. — *Verbena Carolinensis Melissae folio aspero* Dillen. Hort. Elth. 407. t. 301. fig. 388. — *Verbena Caroliniana folio integro serrato scabro* Raj. Suppl. Appdx. 249. — *Verbena carnea* Medicus. — Crescit in Columbia et in Carolina australi. (v. s. s.)

28. V. CHAMISSONIS Wlprs. mss. — Herbacea, pilis conicis, basi callosis scabra aspera, demum albo-punctata: caule simplicissimo stricto tetragono, angulis

scabris, faciebus duabus planis striatis, alternis canaliculatis; foliis erectis strictis subconnatis oblongis acutis lineatis, margine reflexis, in supera pagina sublusque in venis scabris integerrimis aut antice grosse serratis, sursum internodiis elongatis decrescentibus, inferioribus antice dilatatis, superioribus a basi attenuatis; cyma trispicata, raro paniculata, panicula subfastigiata; spicis densifloris, fructiferis breviter cylindricis, basi relaxatis. ♃ — Caules e radice multicipite 1½–3-pedales. Folia radicalia breviora, caulina bipollicaria vel longiora. Spicae laterales pedunculatae, intermedia sessili, fructiferae subpollicares, crassitie trium linearum. Bracteae acute triangulares dimidia longitudine calycis. Corollae tubus calyce duplo longior, extus canescenti-pilosus, intus villosus. Fructus calyce inclusus dilute ferrugineus. — *V. gracilis* Cham. in Linnaea VII. 261. † (1832) nec Dsf. (1829.) — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

29. V. OVATA Cham. l. c. 263.† — Caule herbaceo stricto tetragono, angulis scabro, faciebus duabus striatis planis, duabus canaliculatis, media parte folioso, nodis supremis remotissimis subaphyllis; foliis sessilibus semiamplexicaulibus discretis, basi rotundato-cordatis, lobulis inferius quam costa cauli adnatis, ovatis acutis duplicato-serratis quinquenerviis venosis reticulatis, supra pilis callosis scabris et asperis, subtus pilis tenuibus brevibus densissime hispidis et scabris; spicis subcapitato-cymoso-paniculatis subsessilibus cylindreis, imbricatis; bracteis lanceolatis acutis carinatis ciliatis, calyce duplo longioribus, superioribus coloratis. ♃ — Caulis 4-pedalis, internodio uno altrove 6–10-pollicari, folia ima cito decidua, maxima 3¼-pollicaria, 2 poll. 2 lin. lata, auriculae lobi integerrimae, folia suprema breviter triangularia integerrima. Spicae thyrsoideae, 1½-pollicares, 4 lin. crassae, bracteae supremae purpurascentes. Calyx ciliolatus 5-dentatus. Corollae tubus calyce plus duplo longior, 3½ lin. longus, extus puberulus, limbus quinquefidus. Fructus vix calyce inclusus ferrugineus, nuculis dorso 6-sulcatis, facie albo-granulatis. — Crescit in Brasilia meridionali.

30. V. CARACASANA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 223. † — Caule erecto ramoso; ramis quadrangularibus glabris; foliis oblongis acutis grosse crenato-serratis strigoso-scabris subsessilibus; spicis terminalibus paniculatis filiformibus pedunculatis. ♃ — Folia inferiora (a me non visa) 4–5-pollicaria, sesquipollicem et paullo latiora. Vidi summitatem plantae corymboso-ramosissimae, ramulis junceis filiformibus acute quadrangularibus glaberrimis vel vix hinc inde scabrellis. Folia parva subsessilia lanceolata, lineari-lanceolata vel suprema subulato-filiformia, pollicaria, suprema 2 lin. longa. Spicae pedunculatae filiformes laxiusculae, floribus infimis remotis minutis. Corollae pallide violaceae tubus vix calyce longior, limbus planus rotundato-quinquefidus. Calyx fructifer apice contractus. Nuculae glabrae fuscescentes parvae. — Crescit in sylvaticis prope Caracas et in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

31. V. BONARIENSIS Linn. Hort. Ups. 8., Spec. plant. 28. — Kniphf. Orig. centur. II. no. 98. — Hook. Bot. Misc. I. 166. — Elata aspera: caule acute tetragono; foliis lanceolatis acutis sessilibus subconnatis venosis grosse serratis; pedunculis terminalibus trichotomis spicas numerosas subfasciculatas gerentibus; corolla calycem ovatum vix dimidio excedente; bracteis subulatis calycem aequantibus. ♃ — Herba pluripedalis undique tactu asperrima virgata, apicem versus corymboso-ramosa, caulis acute quadrangularis, ad nodos saepe coarctatus. Folia basi connata vel subconnata sessilia lanceolata, supra basim parum angustiora, 3–5-pollicaria acuta, grosse serrata, dentibus minoribus saepe interjectis, pollicem vel semipollicem lata, suprema lanceolato-linearia subintegerrima acutissima, pollicaria, 1½ lin. lata. Pedunculi corymbosi trichotomi, apice iterum iterumque brevissime trichotomi, spicas plurimas ideo subfasciculatas pollicares cylindricas densissimas gerentes. Corolla (ex sicco) obscure azurea. Calyx fructifer supra fructum contractus hinc basin usque, plerumque ad dentem breviorem utrinque longitudinaliter fissus. — *Verbena Bonariensis altissima Lavandulae Canariensis folio et spica* Dill. Hort. Elthain. 406. t. 300. fig. 387. —

Verbena quadrangularis Vellozo, Flora Fluminensis I. t. 39? — *V. trichotoma* Mnch. — *V. corymbosa* Hort. Berol. (nec Rz. et Pav.) — *V. Capensis* Thnbrg. Flor. Capens. 447?? (sed certe Eckl. et Zeyh. Hb. fl. Capens.) — Sieb. Hb. flor. Maurit. no. 86! — *β. littoralis* Hook. l. c. — Spicis paucioribus minus densis, brevioribus, floribus spicae infimis saepe distantibus. — *V. littoralis* H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 276. † t. 137. — *γ. longibracteata:* tota villosior, bracteis longioribus apice recurvis. — Crescit in America omni callidiore (var. *β.* in salsis maritimis oceani pacifici ad Truxillo, Lima etc.) in insula Mauritius et in Promontorio bonae spei. (v. s. sp. et cult.)

32. V. VALERIANOIDES H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 277. † — Glabra: caule erecto ramoso tetragono striato; foliis oppositis sessilibus linearibus, integerrimis acutiusculis, margine revolutis; pedunculis terminalibus tristachyis ternis abbreviatis. ♃? — Folia supra parce pilosa. Pedunculi 2–3–pollicares tristachyi, spicae 4–8 lin. longae, intermedia sessilis, pedunculi partiales semipollicares. Flores densissimi. Bracteae calyce triplo breviores acutae ciliato-scabrellae. Calyx acute 5–dentatus hispidulus. Corollae tubus calycem subaequans, limbo inaequaliter quinquefido, faux pilosa. Fructus oblongo–tetragonus quadripartibilis ¾ lin. longus, nuculis monospermis. — Habitu ad *Valerianas* nonnullas accedit. — Crescit locis frigidis ad Santa Fé de Bogota et Chipo.

33. V. MONTEVIDENSIS Spr. Syst. vegetab. II. 747. — Caule erecto ramoso glabro; foliis lanceolatis acutis subintegerrimis laevibus; spicis subternis terminalibus abbreviatis. ♃? — Crescit in Montevideo.

34. V. GLABRATA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pl. II. 276. † — Glabra: caule procumbente ramoso; ramis tetragonis; foliis lanceolato-oblongis argute inciso-serratis reticulato-venosis glabris vel pilis raris adspersis; spicis terminalibus ternis cylindraceo-filiformibus longe pedunculatis, intermedia sessili; bracteis lanceolatis hispidulis calyce paullo brevioribus. ♃ — Folia basi cuneata, 2–2½–pollicaria, 9–10 lin. lata. Spicae 1½–pollicares, intermedia fere 3-pollicaris. Calyx hispidulus. Corolla pallide rosea, tubo calycem parum excedente, limbo 5–fido. Fructus calyce inclusus glaber quadripartibilis. — Crescit in Andibus Novo–Granatensium prope Almaguer et Pasto.

35. V. VERONICAEFOLIA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pl. II. 275. † — Caule procumbente ramoso; ramis teretiusculis hispidis; foliis subsessilibus lanceolato-oblongis crenato–serratis acutis vel obtusis, utrinque strigoso–pilosis reticulato-venosis; spicis ternis terminalibus filiformibus (intermedia longiori); floribus subdistantibus; bracteis ovatis calycem aequantibus; corollae (pallide violaceae) tubo calycem vix excedente. ♃ — Folia subpollicaria, 3–4 lin. lata. Spica intermedia quadripollicaris. Calyx hispidus. — Crescit prope Moran Mexicanorum.

36. V. DIFFUSA Lam. Encycl. méthod. VIII. 550. — Prsh. Flor. Am. sept. II. 417. — Foliis ovato–lanceolatis serratis subpubescentibus; spicis longissimis laxis paniculatis valde diffusis. ♃ — Flores minimi purpurascentes. — Inter varietates *V. urticaefoliae* removenda videtur. — Crescit in America boreali.

37. V. RECTA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 277. † — Caule erecto striato tetragono ramoso hispidulo; foliis breviter petiolatis lanceolato–oblongis acutis, basi cuneatis, crenato-serratis reticulato-venosis, utrinque adpresse pilosulis; spicis virgato–paniculatis; floribus minutis; bracteis acuminatis calyce paullo brevioribus. ♃ — Caulis rubicundus 1–2–pedalis. Folia 2–pollicaria, 8–9 lin. lata. Spicae crebrae 1–2–pollicares. Calyx hispidulus. Corolla pallide violacea, ad faucem pilosa. Nuculae laeves fuscescentes calyce tectae. — Crescit in temperatis inter Pachucia et Cerro ventoso Novae Hispaniae.

38. V. HASTATA Linn. Hort. Upsal. 8. — Prsh. Flor. Americ. septentr. II. 418. — Erecta elata pubescenti–scabra: foliis inferioribus ovatis longe acuminatis hastatis, superioribus lanceolatis, grosse et inaequaliter subinciso–serratis; spicis numerosissimis filiformibus in paniculam terminalem et axillarem corymbosam congestis; floribus minimis densis; bracteis calyces subaequantibus. ♃ — Folia

infima petiolo pollicari instructa, 3–4 poll. longa, 1½–1¾ poll. lata, basi hastato-producta longe acuminata, grosse et inaequaliter subinciso-serrata, dentibus iterum serratis vel minoribus interjectis, superiora breviter petiolata lanceolata, omnino illis *V. paniculatae* similia. Caeterum omnino convenit cum *V. paniculata* Lam. cujus forte et haec et *V. urticaefolia* sunt varietates; sed illarum vidi specimina et spontanea et culta foliis numquam hastatis instructa. — *Verbena Americana altissima spica multiplici, Urticae foliis angustis, floribus coeruleis* Herm. Paradis. t. 242.

β. Foliis inciso-pinnatifidis grosse serratis. Lam. Illustr. I. 57. — Crescit in America boreali (v. s. s. et c.)

39. V. POLYSTACHYA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 274. † — Caule erecto ramosissimo; ramis tetragonis piloso-hispidis; foliis lanceolato-oblongis grosse serratis adpresse pilosis; spicis virgatis filiformibus paniculatis. ♃ — Folia subsessilia acuta, basi angustata, utrinque aspero-pilosa subbipollicaria, 7–8 lin. lata. Spicae subternae fere quadripollicares. Flores sessiles parvi violacei. Bracteae e basi ovata subulatae calyce triplo breviores scabrellae. Corollae tubus calycem aequans. — Vix differre videtur a *V. urticaefolia*. — Crescit in Mexico ad montem ignivomum Torullo.

40. V. BISERRATA H. B. Kth. l. c. 275. † — Caule erecto subsimplici quadrangulari, foliisque piloso-hispidis suboblongis serratis, dentibus alternis minoribus; spicis filiformibus paniculatis. ♃ — Species secundum characteres levissimos exstructa forte ad *V. urticifoliam* repellenda. Folia sesquipollicaria, 8 lin. lata. Petioli hispiduli. Spicae terminales ternae, filiformes, paniculatae, intermedia reliquis longior subtripollicaris. — Crescit prope urbem Mexico.

41. V. PANICULATA Lam. Encyclop. VIII. 548. — Edw. Bot. Regist. t. 1102. — Caule erecto scabrello, superne ramuloso; foliis omnibus petiolatis lanceolatis acuminatis, supra glabris, infra setuloso-scabrellis, basi attenuatis, grosse serrulato-dentatis; spicis filiformibus corymboso-paniculatis strictis; bracteis e basi lanceolata subulatis calyce dimidio fere brevioribus; corollae glabrae laciniis 3 inferioribus vix emarginatis. ♃ — Caulis 4–6-pedalis, atropurpureus, subquadrangularis, setuloso-scaber. Folia inferiora majora cum petiolo semipollicari 2½-pollicaria, 9 lin. lata, superiora breviora et angustiora, infra scabrella, supra glabra. Spicae terminales 3–4-pollicares corymbum strictum aphyllum efficientes, bracteolis 2 subulato-setaceis ad ramificationum basin. Spicae filiformes, basi laxiflorae. Calyx glabriusculus acute quinquedentatus, bractea e basi subamplectente subulata, tertia parte longior. Corollae purpureae glabrae tubus calyce parum longior. Fructus fuscus glaberrimus calyce inclusus. Stylus subpersistens. — In montibus Americae borealis (in Carolina et Virginia). (v. s. s. et c.)

42. V. URTICIFOLIA Linn. Hort. Upsal. 9., Spec. plant. 29. — Sabb. Hort. Roman. III. t. 55. — Knipb. Orig. centur. XI. — Caule erecto pubescente; foliis petiolatis ovatis acuminatis, supra setuloso-pilosulis, infra in nervis piloso-hispidis; spicis filiformibus axillaribus terminalibusque paniculatis; floribus minimis imbricatis; bracteis ovatis acutis calyce subbrevioribus; corollis e calyce exsertis quinquefidis glabris. ♃ — Planta pluripedalis, praecedenti proxima, at diversa foliis ovatis pollicem latis crenulato-serratis; spicis multo tenuioribus, floribus albis minoribus, bracteis calycem florentem subaequantibus, fructifero brevioribus. Hanc cum *paniculata* et *hastata* in unam contrahendam esse speciem, suadet *Hooker*. — *Verbena recta Canadensis Urticae folio* Moris. Oxon. Histor. III. 418. sect. II. t. 25. fig. 3. — [Rob. Ic. 26. — Riv. Monop. irr. 57.] — Crescit in America boreali. (v. s. s. et c.)

43. V. SCABRA Vahl, Eclog. pl. Americ. II. 2. — Caule erecto herbaceo tetragono villoso; foliis petiolatis, superioribus alternis, ovatis serratis scaberrimis, subtus in nervis villosis; spicis terminalibus solitariis ternisque elongatis filiformibus; floribus copiosis alternis aggregatis, bractea setacea ad basin calycis suffultis. ♃ — Folia sesquipollicaria, secus nervos lineata, pilis e punctis elevatis oriundis

scaberrima, petiolus semiunguicularis. Calyx fructifer angulatus grano Sinapis major. Nuculae lineari-triquetrae, dorso leviter rugosae. — Crescit in America meridionali. — Affinis dicitur *V. urticifoliae.*

44. V. HISPIDA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 22. † t. 34. fig. a! — Caule erecto tetragono piloso-hispido; foliis sessilibus semiamplexicaulibus e basi longe attenuata oblongis acuminatis integris trifidisque, utrinque piloso-hispidis, laciniato-serrato-dentatis; spicis subternis terminalibus pedunculatis densissimis cylindricis; bracteis calyces aeqnantibus vel superantibus lanceolatis acutis. ♃ — Planta culta a spontanea longe diversa, certe tamen eadem. Caulis pedalis vel pluripedalis acutissime tetragonus, strigoso-hispidus, anguli fusco-lineati prominuli. Folia opposita semiamplexicaulia, basi longe attenuata integerrima, tunc trifida vel integra ovali-elliptica vel suboblonga acuminata grosse et inaequaliter laciniato-serrata bipollicaria (in cultis tripollicaria) semipollicem (in cultis pollicem) lata, inferiora magis approximata (internodia 1, 1½, 2 poll. longa, in cultis internodia 2, 3, 5, 7 poll. distantia); spicae plerumque ternae, longiuscule pedunculatae cylindraceae densissimae, vix pollicem longae, 4 lin. crassae, pedunculi basi foliis duobus lanceolato-linearibus serratis longiusculis fulti. Bracteae calyces superantes, (in cultis eis duplo longioribus) lanceolatae acutae. Calyx parvus quinquedentatus, fructifer clausus florem includens, fructu ferrugineo glaberrimo sulcato, facie nucularum interiori albo-punctulata. Corolla calyce parum exserta violacea. — Ab hac non differe videtur *Verbena glandulosa* Moris, Annali di Storia naturale IV. 59.*) — *V. cuneifolia* Hort. Berolin. — Crescit in Peruvia (v. s. sp. et cult.) (Poepp. Herb. fl. Peruv. I. 158!)

45. V. LASIOSTACHYS Lnk. Enumer. plant. hort. bot. Berolin. II. 122. — Caule herbaceo diffuso hirsutissimo tetragono; foliis petiolatis ovalibus obtusissimis (membranaceis) basi longe attenuatis, grosse et inaequaliter sublaciniato-serratis utrinque subvilloso-pilosis; spicis lanatis terminalibus ternis elongatis remotifloris; bracteis calyce brevioribus acutis lanatis; corollae glabrae tubo calyce (tertia parte) longiore, limbo minimo quinquepartito. ♃ — Herba undique, sed inprimis in inflorescentia piloso-hirta sublanata. Folia maxima 3-pollicaria, 1½ poll. lata, pleraque tamen minora, ovata obtusa, hinc inde subtrifida, basi longe (½–1 poll.) in petiolum attenuata. Internodia 1–2-pollicaria. Spicae terminales tres, intermedia jam a basi florifera longissima (5-pollicari), lateralibus brevioribus tertia parte brevius pedunculatis, omnibus remotifloris, lanato-pilosis. Calyx 2 lin. longus quinquefidus (nec quadrifidus) longe piloso-hispidus, supra fructum minutissimum constrictus. Bracteae calyce breviores (nec eum aequantes) lineari-subulatae (nec oblongae) piloso-hirtae. Corolla coerulea. Nuculae brevissimae fuscae glabrae, facie interna albo-punctulatae. — Nisi ipsius clarissimi auctoris vidissem specimina vix crederem, me eandem habere plantam ac ille. — Affinis est *V. hispidae* Rz. et Pav. totoque habitu magis quam certis recedit characteribus. — Crescit (verosimiliter in America calidiori). (v. s. c.)

46. V. HIRTA Spr. Syst. vegetab. II. 749. — Chamisso, Linnaea VII. 255. † — Caule herbaceo erecto, angulis obsoletis teretiusculo, villoso-lanato; foliis subsessilibus, basi cuneatis ovatis obovatis rotundatisque grosse serratis, sublobato-paucidentatis subtrilobis planis, supra subvelutinis, subtus nervoso-venosis in rete vasculoso saltem hirsutis, cum ramis axillaribus caule brevioribus verticillatis ternis, rarius oppositis; spicis densifloris cymosis; cymis subcapitatis terminalibus racemosisque verticillatis ternis longe pedunculatis; bracteis lanceolatis acutis ciliatis, calycem subaequantibus. ♃ — Planta ulnaris et elatior. Folia 1–1½-pollicaria, internodiis 2–4-pollicaribus. Spicae floriferae globosae, fructiferae elon-

*) *Hirsuta, pilis apice glandulosis: caule ramoso decumbente; foliis lanceolato-oblongis, inaequaliter serrato-dentatis, basi attenuatis, integris, semiamplexicaulibus; spicis terminalibus densifloris, solitariis, cylindri o-oblongis; corolla, bracteisque calyce duplo longioribus.* ♃ — *In Chili.*

gatae semipollicares. Calyx 2 lin. longus. Corolla extus pilosula, intus ad faucem barbata, ad staminum insertionem villosula, tubo clavato, limbo quinquefido. Fructus ferrugineus reticulatus rugosus. — In Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

47. V. STRIGOSA Chamisso, Linnaea VII. 256. † — Fructiculosa ramosissima erecta, ex toto tenuiter strigosa vix scabrella: ramis tetragonis; foliis pergamentaceis erecto-patulis internodia subaequantibus superantibusve ellipticis obtusis crenato-paucidentatis subintegerrimisque triplinerviis, venis paucis seu nullis, petiolis subconnatis; spicis paucifloris laxiusculis terminalibus solitariis cymosis racemosisque; bracteis latis concavis brevibus enerviis ciliatis, calyce subquater brevioribus. ♄ — Planta cubitalis, caulis basi simplex teretiusculus, sursum ramosissimus dense foliosus. Folia circiter 9 lin. longa, semipollicem lata, superiora minora. Spicae subsexflorae. Bracteae concavae fundum calycis fovent, vix infimam tubi partem tegentes. Calyx laxus 5-dentatus dentibus dilatatis brevibus obtusis, inter dentes hyalino-membranaceus. Corolla extus pilosula, ad faucem barbata, tubo ovato 2 lin. longo tubum calycis excedente, limbo 5-fido. Fructus......? — Formae ambiguae inter hanc et *V. hirtam* Spr. (cf. no. 46.) occurrere dicuntur. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

48. V. STRICTA Venten. Hort. Cels. 53. t. 53. — Bot. Magaz. t. 1976. — Stricta, canescenti-hirsutissima: caule simplici, apice corymboso-ramoso teretiusculo; foliis subsessilibus obovalibus acutis, grosse acuteque serratis, infra reticulato-venosis hirsutissimis; spicis terminalibus axillaribusque strictissimis elongatis laxiusculis; bracteis lineari-setaceis calyces aequantibus; corollae calyce dimidio longioris limbi laciniis 4 superioribus integris, infima emarginata. ♃ — Herba rigida pluripedalis, undique, sed praecipue partes juniores, inflorescentia foliorumque pagina infera canescenti-tomentoso-pilosa. Caulis purparescens pilosus teretiusculus subsimplex strictissimus, folia subsessilia-plantae cultae basi foliolis utrinque brevissimis aucta bipollicaria, pollicem lata, supra impresse venosa, infra reticulato-venosa. Spicae saepe subargenteo-canescentes strictissimae semipedales cylindricae, flores infimi subremoti laxi, superiores dense imbricati. Calyx sericeus tubulosus quinquedentatus. Corolla coerulea, tubo extus puberulo, fauce pilosula. Fructus calycem explens, carpidia quatuor sponte secedentia fusca glaberrima longitudinaliter sulcata, facie interna subconcolori pallidiori. — *V. rigens* Michx. Flor. Bor. Amer. II. 14. — *V. alopecuroides* Hort. Berolin. — Crescit in America boreali (Illinois, St. Louis, Missouri) (v. s. s. et c.)

β. Schizophyllae. — Folia incisa, palmatipartita, pinnatifida vel multifida.

49. V. LUCAEANA Walpers mss. — Strigoso-hirsuta erecta stricta; foliis sessilibus, inferioribus fere basin usque trifidis, laciniis lateralibus in superioribus sensim minoribus, late lanceolatis profunde pinnatifido-dentatis, nervis subtus prominentibus reticulato-venosis, utrinque, praesertim subtus in venis strigoso-canescentibus; spicis terminalibus strictis longissimis (accedentibus axillaribus) paniculatis laxiusculis; bracteis calycem aequantibus. ♃ — Ex habitu valde affinis *V. strictae* Vent., sed jam differt caule acute tetragono foliisque pinnatifido-dentatis. De foliis inferioribus trifidis silet ill. *Hooker*, occurunt etiam specimina quorum folia ima jam a basi profunde pinnatifido-incisa reperiuntur. Folia infima 2½, superiora 1-pollicaria, 5-6 lin. lata exacte sessilia, nec amplexicaulia, juniora subcanescentia, laciniis 2 baseos saepe lanceolatis integerrimis (in superioribus). Rami corymbosi omnes in spicam abeunt saepe pedalem strictam laxam, floribus infimis saepe valde remotis. Bracteae lanceolatae calycem aequantes strigoso-pilosae. Calyx cylindricus 2½ lin. longus acute quinquedentatus strigoso-pilosus. Corollae (coeruleae??) tubus pubescenti-pilosus calyce dimidio longior, limbi inaequaliter quinquefidi laciniae 4 superiores ellipticae obtusae, quinta inferiori longiori emarginata. Faux pilosa. Fructus calyce subinclusus glaberrimus, nuculis arcte cohaerentibus brunneis longitudinaliter sulcatis. — *V. strigosa* Hook. Compan. Bot. Magaz. I. 176. (nec Chamisso.) — Crescit in Americae borealis civitate New Orleans, Tainturies. (v. s. sp. et c.)

50. V. CANESCENS H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 274. † t. 126. — Caulibus herbaceis diffusis procumbentibus canescenti–hirtis; foliis oblongo–lanceolatis serrato–incisis subpinnatifidis, basi attenuatis, laciniis acutis, margine revolutis, utrinque canescenti–hispidis; spicis alaribus terminalibusque filiformibus laxiusculis; bracteis calyce parum longioribus ovato–acuminatis. ♃ — Rami 6–8-pollicares tetragoni. Folia pollicaria et longiora reticulato–venosa, supra rugosa. Spicae 1–2–pollicares. Flores vix 2 lin. longi; calyx piloso–hispidus, corolla coerulea minima proptereaque haud satis explorata. Nuculae flavescentes rugosae. — Crescit in montibus Mexicanis prope Guanaxuato, Marfil et fodinam Bélgrado.

51. V. RADICANS Gill. et Hook. in Hook. Bot. Miscell. I. 170. — Suffruticosa: caule procumbente inferne radicante; foliis trifidis, segmentis plerumque iterum trifidis, laciniis oblongo–linearibus subcarnosis glaberrimis; spicis brevibus subcapitatis, corolla calyce pubescente duplo longiore. ♃ — Habitu prope accedit ad *V. microphyllam* H. B. Kth., sed folia majora magis divisa glaberrima, exsiccata flavicantia, spicae terminales nec axillares. Planta tota valde procumbens radiculasque plurimas e parte inferiore lignosa emittit. Flores fragrantes. — Crescit in convallibus Andium prope Mendozam.

52. V. MICROPHYLLA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 272. † t. 133. — Caule suffruticoso repente; foliis tripartitis strigoso–hispidis, laciniis obovato–oblongis bilobis, intermedia triloba; spicis alaribus solitariis subcapitatis. ♃ — Rami tetragoni pubescenti–hirti. Folia breviter petiolata 3 lin. longa, basi cuneata, laciniis obtusis. Spicae alares capituliformes pedunculatae solitariae, pedunculi 2 lin. longi. Flores semipollicares. Calyx pentagonus in nervis hispidus acute quinquedentatus. Corolla calyce duplo longior apice dilatata glabra, limbo subaequaliter 5–fido, laciniis leviter emarginatis. Fructus......? — *V. clavatae* Rz. et Pav. affinis dicitur. — Crescit in frigidis regni Quitensis prope urbem Rhiobamba.

53. V. (ZAPANIA Poir. Encycl. VIII. 843.) BRACTEOSA Michx. Flor. Bor. Am. II. 14. — Hook. Bot. Magaz. t. 2910. — Undique pubescenti–hirta ramosissima prostrata vel ascendens multicaulis: foliis lanceolatis subtrifidis inciso–pinnatifidis, basi longe cuneata attenuatis; spicis terminalibus solitariis elongatis, remotifloris; bracteis lanceolatis utrinque acutis flore quinquies sexiesve longioribus patentissimis. ♃ — Caules procumbentes ramosissimi cum foliis bracteis calycibusque piloso–hispidissimi. Folia 1½–2–pollicaria, ½–1 poll. lata, basi longe attenuata integerrima, profunde trifida, laciniis lateralibus brevioribus angustioribus serratis, saepe deficientibus, grosse irregulaiterque pinnatifido–serrata sublaciniata. Spicae terminales solitariae laxiflorae elongatae 1–6–pollicares hirsutissimae. Bracteae infimae foliaceae reliquae anguste lanceolatae utrinque acutatae, 6–12 lin. longae. Calyx brevissimus 1–1½ lin. longus sericeus, fructifer nuculas 4 facile secedentes includens fuscas rugoso–sulcatas, facie interiori albido–punctulatas. Corolla pallide purpurea a me non visa. — *V. bracteata* Cavanilles. — *V. repens* Spr. mss. — Crescit locis aridis in America boreali (Illinois, St. Louis, Missouri). (v. s. sp. et c.)

54. V. GRACILIS Dsfont. Cat. hort. Paris. (edit. 3.) 393. — Procumbens pubescens scaberrima canescens: foliis inciso–pinnatifidis, basi cuneatis, laciniis oblongis vel lanceolatis acuminatis; spicis terminalibus elongatis laxis; floribus parvis, inferioribus remotioribus; bracteis inferioribus foliiformibus, superioribus sensim lanceolatis, linearibus subulatisque flore semper multo longioribus. ⊙ — Valde affinis est *V. bracteosae* Michx., sed strigoso–hispida est, nec villosa, folia sunt duplo minora et angustiora, bracteae sursum decrescunt, supremae subulatae et spicae sunt minus densae. — Herba prostrata ramosissima, ramis in spicam simplicem saepe quinquepollicarem abeuntibus. Folia maxima 9–12 lin. longa, laciniis sesquilineam latis, utrinque strigosis scabris subcanescentibus. Folia suprema alterna subremota, in axilla florem singulum gerunt, mox bracteaeformia lanceolata vel suprema subulato–linearia, flore minimo semper ultra duplo

longiora. Calyx hispidissimus. — *V. parviflora* Ruiz in Herb. Reg. Berolin.! — *V. remota* Bth.! Plant. Hartweg. 21. no. 174. — Crescit in Mexico. (v. s. sp. et cult.)

55. V. INFLATA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 273. † t. 135. — Canescens: caulibus procumbentibus opposite ramosis; foliis sessilibus strigoso-hispidis, fere basin usque tripartitis, laciniis 3–4-partitis, lacinulis linearibus obtusis; spicis ramos terminantibus elongatis laxifloris; calycibus post anthesin (parum) auctis fructum includentibus. ♃ — Caules procumbentes — non dichotomi, ut dixit ill. **Kunth**, sed opposite ramosi — canescenti-hirti. Folia rigida strigoso-hispida pollicaria, laciniae laterales 3–4-fidae, intermedia saepe 5-fida. Spicae floriferae abbreviatae, fructiferae subtripollicares lineari-cylindraceae canescenti-hirtae. Flores 2 lin. longi. Bracteae lanceolato-subulatae calyce breviores. Corollae pallide violaceae tubus calycem aequans, limbi laciniis 5 rotundatis, fauce barbata. Calyx fructum includens vix auctus est appellandus. — *V. heterophylla* Willd. Herb. ex Spr. Syst. vegetab. II. 749. — Nomen specificum vix probandum. — In regno Quitensi juxta Mulalo, Riobamba et Tambillo crescit.

56. V. OFFICINALIS Linn. Spec. plant. 29. — Strm. Flor. Deutschl. Hft. 3. (c. ic. aen.) — Caule erecto glaberrimo paniculato-ramoso; foliis basi longe cuneatis sessilibus vel petiolatis trifidis vel oblongo-lanceolatis vel lanceolatis, grosse inciso-serratis, serraturis acutis vel saepius obtusis rotundatis, inaequalibus minutissime scabrellis; spicis terminalibus axillaribusque paniculatis elongatis remotifloris; calyce subtruncato-quinquedenticulato; corollae glabrae tubo vix exserto, limbi quinquefidi laciniis rotundatis integris tubum aequantibus. ⊙ — Species valde polymorpha, sed vix in varietates dissecanda. Occurrunt specimina paucipollicaria et humanae fere altitudinis, folia petiolata lanceolata acute pinnatifido-serrata, subtrifida, et in petiolum latum cuneata, supra medium trifida, obtuse serrata, etiam obovali-elliptica, basi cuneata non lobata, profunde rotundato-crenato-incisa, folia ad spicarum ortum saepius lanceolata acute serrata, vidi semipollicaria et tripollicaria. Spicae longissimae saepe pedales, interdum plurimae aggregatae. Corolla minima purpurea quinquefida (nec quadrifida ut vult cl. **Hooker**). — *Verbena communis flore coeruleo* Bauh. Pinx. 269. — *Verbena recta* Dod. Pemptad. stirp. 150. — *V. sororia* D. Don, Prodr. fl. Nepal. 104. — Sweet, Brit. flow. gard. III. t. 202. — *V. officinalis* Lour. Flor. Cochinch. I. 33. — Crescit in toto orbe terrarum in ruderatis viarumque marginibus. (v. s. sp.)

57. V. SUPINA Clus. Histor. stirp. II. 46. — Sibthrp. et Sm. Flor. Graec. VI. t. 554. — Linn. Spec. plant. 29. — Herbacea procumbens multicaulis vel erecta, undique canescenti-pubescens: foliis in petiolum attenuatis, multipartito-bipinnatisectis, lacinulis ultimis obtusiusculis (vel etiam laciniis minus profundis subtrifidis); spicis in ramorum dichotomia terminalibusque paniculatis elongatis, floriferis densis, fructiferis relaxatis; floribus sessilibus minutis; fructibus distincte sed brevissime pedicellatis; bracteis subpersistentibus demum recurvatis. ⊙ — Herba tota exceptis corollis fructibusque pilis brevibus dense canescenti-lanata hispida. Foliorum forma variabilis pro laciniis magis minusve profundis, a 3 lin. longis ad sesquipollicaria, basi longe cuneata integerrima in petiolum attenuata, lacinulae subtus nervo prominulo percursae, brevissimae lineam longae. Spicae fructiferae ad 5 poll. longae laxissimae, fructus brevissime sed distincte pedicellati, calyce persistente supra eum non producto arctissime inclusi, dentes calycini fere nulli. Corolla minima coerulea glabra, tubo supra calycem ampliato infundibuliformi, limbi quinquefidi laciniae integerrimae ovatae. Stamina 4 brevissima didynama in fundo tubi, ubi dilatatur. Nuculae sero secedentes glaberrimae dorso sulcato-striatae pallide fuscae, stylo subpersistente superatae. — *Verbena tenuifolia* Bauh. Pinx. 269. — Hanc speciem proprii generis crediderim esse typum. — Crescit in Hispaniae, Algeriae, Aegypti, Syriae et Caucasiae ruderatis. (v. s. s. et cult.)

58. V. SPURIA Linn. Hort. Upsal. 8. et Spec. plant. 29. — Caulibus numerosis ascendentibus ramosis glabris; foliis tripartito-laciniatis obtusiusculis scabris; spicis

solitariis filiformibus bispidulis; floribus remotis; bracteis calyces superantibus. ♃ — Flores minimi coerulei. — *Veronica humilior foliis incisis* Clayt. Virgin. 8. — Crescit in America boreali (Illinois, Virginia, Kentucky). — Hujus plantae, a **Nuttallio** iterum cum *V. officinali* conjunctae vidi specimina pessima nullo modo describenda, et ab illa non separanda.

II. Macranthae Wlprs.

Flores magni speciosissimi spicati, sub anthesi fastigiati, spica fructifera saepe elongata.

a. Melindres: Folia crenata, dentata vel subincisa.

59. V. STELLARIOIDES Chamisso, Linnaea VII. 264. † — Caule herbaceo subsimplici erecto gracili tetragono glabro, angulis obsolete strigosis; foliis erectis lineari-lanceolatis attenuatis acutis, costa subtus obsolete strigosa, venis raris tenuissimis, margine reflexis strigillosis ciliato-scabris; pedunculo terminali piloso; spica solitaria, florente macrantha fastigiata, fructifera elongata laxa; bracteis lanceolatis subulato-acuminatis villoso-ciliatis, calycem superantibus. ♃ — Herba habitu *Stellariae holosteae* at paullo firmior foliisque paullo crassioribus. Caules subtripedales utplurimum simplicissimi spicaque solitaria terminati. Internodia 1–2- vel rarius 4-pollicaria, folia inferiora minora, saepe squamaeformia, superiora bipollicaria et longiora 2–2½ lin. lata vel breviora latioraque. Spica brevis cylindrica breviterque pedunculata, bracteae lanceolatae aristatae strigulosae, calyce tertia parte longiores. Calyx inaequaliter acuteque 5-dentatus strigoso-hispidus. Corollae extus sublanuginoso-canescentis tubus semipollicaris, limbo amplo quinquefido. Fructus oblongus eleganter areolato-rugosus griseus, carpella dorso octo-nervia, faciebus albidis nudiusculis.

α. decurrens: foliis decurrentibus linearibus integerrimis glabris.

β. sessilis: foliis sessilibus lanceolatis obsolete serrulatis, parte superiori strigulosis. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

60. V. PHLOGIFLORA Chamisso l. c. 266. † — Ex toto strigosa: strigis caulis ramorumque retrorsis, reliquis antrorsis; caule erecto herbaceo tetragono fistuloso brachiatim ramosissimo; foliis petiolatis internodio brevioribus, basi cuneata in petiolum decurrentibus, oblongis, a basi attenuatis obtusis acutisque serratis vel duplicato-serratis; inflorescentiis terminalibus cymosis, ad summum bis bifidis; spicis subcapitatis semiglobosis cymoso-ternis, collateralibus longe pedunculatis, primaria brevius longiusve pedunculata, cyma sessili trispicata, rarius ex apicali alaris facta. ♃ — Planta habitu *Bidentium*, inflorescentiam *Phlogis paniculatae* referens. Folia in aliis 3-pollicaria, pollicem fere lata, petiolo semipollicari, in aliis sesquipollicaria, latitudine semipollicari, petiolo 9 lin. longo, nunc crebre, nunc grosse serrata. Internodia 3–4–6-pollicaria. Flores sessiles subumbellati, spica ideo brevissima. Bracteae ovato-lanceolatae calyce breviores. Calyx tubulosus 5-plicatus et dentatus 6 lin. longus, corollae (violascentis?) tubus 9 lin. longus rectus, limbi late et inaequaliter quinquefidi laciniae emarginatae. — Fructus griseus rugoso-reticulatus 2 lin. longus. — *V. cunea* Arrabida, Flor. Flumin. I. t. 41??

α glabra: fere laevis, strigis tenuibus brevibus, oculo nudo vix conspicuis; spicis capitatis, unico florum pari inferiori remotiusculo; bracteolis nunc minimis, nunc tertiae circiter calycis longitudinis.

β. canescenti-hirtello-scabra: pilis validioribus longioribusque; spicis demum ovatis, rhachide elongata; bracteolis tertiae et dimidiae calycis longitudinis. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

61. V. CORYMBOSA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 22. † t. 33. fig. a. — Caule erecto subsimplici, apice patentim corymboso-ramoso, piloso-hispido; foliis breviter petiolatis cordato-triangularibus subtrilobis, profunde inciso-serratis, utrinque adpresse pilosissimis reticulato-venosis; spicis brevibus in corymbum terminalem dispositis; bracteis calyce cylindrico breviter 5-denticulato duplo

brevioribus. ♃ — Herba 1–2–pedalis habitu fere referens *Thalictrorum* summitatem. Caulis tetragonus subsimplex, apice breviter ramosus corymbosus. Internodia 2–3–3½–pollicaria. Folia subsessilia 1–1½–pollicaria, 6–9 lin. lata, subcordato–ovata, inferiora subtriloba, superiora, basi non cordata, grosse inciso–serrata. Spicae breves pedunculatae corymbosae. Calyx et bracteae undique piloso–setosae. Corollae violaceae tubus calyce duplo longior, extus pubescens, limbi laciniis 5 obovatis, apice emarginatis. — *V. lobata* Arrabida, Flor. Flumin. I. t. 43? — Crescit in Peruvia et in Brasilia. (v. s. sp.)

62. V. INTERMEDIA Gill. et Hook. in Hook. Bot. Misc. I. 166. — Aspera: caule acute tetragono; foliis lanceolatis acutis sessilibus subconnatis venosis grosse serratis; spicis breviusculis; corolla calycem cylindraceum plus quam duplo superante. ♃ — Habitu accedit ad sequentem. Ubique tactu est asperrima. Folia rigida laete atque pallide virentia. Spicae paucae ternatae, nunc proliferae, unciam et ultra longae. Flores laxiusculi coerulescenti–purpurei. Calyx fructum maturum includens longitudinaliter fissus (ut in *V. Bonariensi*). — Crescit in Bonaria non raro.

63. V. VENOSA Gill. et Hook. l. c. 167. — Hook. Bot. Magaz. t. 3127. — Sweet, Brit. flow. gard. (2. Ser.) III. t. 207. — Asperrima: caule acute tetragono; foliis sessilibus elliptico–lanceolatis vel lanceolatis, basi subcordatis, subtus eximie venosis grosse et acutissime serratis; spicis subternis brevibus; corollis calyce cylindraceo triplo bracteisque duplo longioribus. ♃ — Caulis fere pedalis simplex vel apice ramulosus. Folia basi magis approximata, superiora ad quatuor pollices distantia, basi non connata, infima saepe minora 1¾ poll. longa obovato–subcuneata, supra medium tantummodo dentata, superiora 3–4–pollicaria, a semipollice ad pollicem usque lata, dentes acuti profundi patentes, folia ad pedunculorum trifurcationem subhastato–lanceolata longe acuminata. Spicae ternae subfastigiatae, intermedia brevius pedunculata, densae demum cylindricae sesquipollicares vel pollicares. Bracteae lanceolatae apice setosae calyce dimidio longiores. Calyces corolla triplo breviores, setosi acute quinquedentati. Corollae coeruleo–violaceae tubus subpilosus, versus medium inflatus, limbi ampli quinquefidi laciniis ovalibus parum emarginatis. Fructus calyce inclusus, nuculae glaberrimae fulvae longitudinaliter sulcatae, facie interna pallidae. — *Buchnera Montevidensis* Spr. mss. — *Verbena scaberrima* Cham.! Linnaea VII. 267. † — Crescit in Bonaria inter Pampas. (v. s. s. et c.) — [Ab hac differre dicitur *V. rugosa* Sweet, Brit. flow. gard. (2. Ser.) IV. t. 318. — *V. Doniana* Steud. Nomencl. botanic. (edit. 2.) II. 750. — Perennis erecto-pilosa: foliis cordato-oblongis acutis serratis rugosis; spicis densis abbreviatis; corolla pilosa calycem duplo excedente, laciniis limbi cuneatis emarginatis. ♃ — Hanc a *V. venosa* non differre censeo nisi foliis inferioribus brevissime subpetiolatis floribusque coeruleis nec violaceis. — In Bonaria crescit.]

64. V. MARRUBIOIDES Chamisso, Linnaea VII. 269. † — Caulibus caespitosis ascendentibus teretiusculis patentim hirtis; foliis subsessilibus cuneato-obovatis obtusis, antice grosse crenato-dentatis rugoso-venosis adpresse subtomentosis canescentibus; spicis grandifloris terminalibus solitariis laxifloris, floriferis fastigiatis, fructiferis elongatis; floribus patulis; bracteis angustis acutis calycem dimidium subaequantibus. ♃ — Caules saepius simplices. Folia internodiorum fere longitudine, maxima 1½–pollicaria, 10 lin. lata. Spica sub anthesi subpollicaris, fructifera 3–pollicaris. Calyx sursum purpurascens 4½ lin. longus. Corolla coerulea extus pubescens, tubo sursum infundibuliformi 7½ lin. longo, limbo amplo quinquefido, diametro semipollicari. Fructus 2 lin. longus. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

65. V. SCORDIOIDES Chamisso l. c. † — Rhizomate lignescente; caulibus caespitosis ascendentibus teretiusculis patentim hirtis, foliis cuneata basi in petiolum attenuatis ovatis oblongo-triangularibusque grosse obtuse subsinuato-dentatis

lineatis patentim hirto-subtomentosis canescentibus; spicis grandifloris terminalibus solitariis, floriferis jam elongatis; floribus erectis strictis; bracteis angustis acutis dimidium calycem subaequantibus. ♁? — Differt a praecedente foliorum figura et hirsutie, pilis longioribus erectis spicisque magis elongatis, floribus longius tubulosis magisque erectis. Folia maxima 2-pollicaria, 8 lin. lata. Spica saepe quadripollicaris. Bractearum longitudo variabilis. Corollae tubus 15 lin. longus, laciniis limbi leviter emarginatis. — A *V. teucrioidi* Gill. et Hook. non satis differre videtur. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

66. V. CHAMAEDRYFOLIA Juss. Ann. du Mus. d'hist. natur. VII. 73. — Hook. Bot. Miscell. I. 167. — Sweet, Brit. flow. gard. (2. Ser.) I. t. 9. — Hook. Bot. Magaz. t. 3333. — Maund et Henslow, The Botanist III. t. 129. — [Chamisso, Linnaea VII. 270.] — Caule procumbente piloso; foliis oblongo-lanceolatis grosse serratis calycibusque hispidis; spicis terminalibus solitariis, laciniis corollae omnibus emarginatis. ♃ — Caules prostrati saepe pluripedales simplices vel basi opposite ramosi, piloso-hispidi. Folia infima petiolata (petiolo semipollicari), basi cuneato-attenuata, oblongo-lanceolata, bipollicaria, ¾ poll. lata, ramealia — etiam minora suborbiculata — obtusa, grosse et inaequaliter crenato-serrata, utrinque, sed subtus densius piloso-setosa, suprema sessilia lanceolata acuta subintegerrima. Spicae terminales solitariae saepe pedunculo quadripollicari suffultae laxae breves subcapitatae florentes fastigiatae. Flores sessiles speciosissimi fulgentes punicei. Bracteae subulato-lanceolatae calyce ultra duplo breviores pilosae. Calyx cylindricus 3-4 lin. longus piloso-setosus, breviter acuteque quinquedentatus, quinquecostatus. Corollae tubus calyce saepe dimidio longior, incurvus, limbus inaequaliter 5-lobus, laciniis obovatis, apice profunde emarginatis. Fructus calyce inclusus in quatuor nuculas cylindraceas glaberrimas rugulosas fuscas partibilis. — Species hortorum decus sane insigne, varietatibus plurimis hybridis aucta. — *Lychnidea Veronicae folio, flore coccineo* Feuill. Hist. Peruv. III. t. 25. fig. 3. — *Erinus Peruvianus* Linn.! Spec. plant. 879. — *Verbena veronicaefolia* Sm. in Rees's Cyclop. — *V. Melindres* Gillies in Lindl. Bot. Regist. t. 1184. — *V. Montevidensis* Spr. in Hb. Reg. Berolin. (vix Syst. veget. II. 747.) — *V. melissoides* Sweet. — Crescit in Peruvia et in Brasilia meridionali (Paraguay etc.) (v. s. sp. et c.)

67. V. MELINDROIDES Chamisso! Linnaea VII. 270. — Hirsuta: caule decumbente tetragono radicante, apicibus ramisque erectis ex inflorescentiis dichotomis; foliis ovatis, basi obtuse cuneatis attenuatisque in petiolum brevem, antice rotundatis, apice acutiusculis, interdum acuminulato-mucronatis, margine aequaliter crenatis vel subduplicato-serrato-crenatis, supra subvelutinis, subtus maxime in nervis et venis hirsutis; spicis solitariis longe pedunculatis, floriferis terminalibus fastigiatis grandifloris, fructiferis terminalibus alaribusque elongatis relaxatis; bracteis lanceolatis acutis, calyce ter brevioribus. ♃ — Species proxima *V. chamaedryfoliae,* a qua differt foliorum forma et uberiore hirsutie, nullius fere momenti notis at constanter differt. Maxima in hoc specierum distinguendarum fides quod illa exsiccata pallidum lacte viridem servat colorem, haec contra obscuriori griseo-subnigrescente colore lugere videtur. — Cham. — Crescit in Brasilia calidiori, in provincia Stae. Catharinae. (v. s. sp.)

68. V. TWEEDIANA Niven mss. in Hook. Bot. Magaz. t. 3541. — Paxton, Magaz. of bot. IV. 5. (c. ic. aen.) — Pubescenti-hirsuta erecta herbacea suffruticosa ramosa: foliis ovato-lanceolatis acuminatis membranaceis, grosse et inaequaliter serratis, basi cuneatis integerrimis, in petiolum gracilem attenuatis; spica grandiflora (subcapitata corymbosa); calycibus cylindraceis quinquecostatis, quam corolla duis tertiis brevioribus; corollae limbo subaequaliter quinquelobo, laciniis obovato-cuneatis emarginatis. ♃ — Herba speciosissima pubescenti-hirsuta erecta, opposite ramosa 1-1½-pedalis. Folia 1-2½-pollicaria, ½-¾ poll. lata, basi cuneata petiolulata, acuminata, grosse et subregulariter serrata, infra, praesertim ad nervos piloso-aspera. Spica terminalis pedunculata (pedunculo saepe semipedali) solitaria brevis subcapitata. Corollae tubus 9 lin. longus, calyce

duplo longior subcurvatus, laciniis limbi obcordatis emarginatis puniceis, 3 lin. latis, 4–5 lin. longis, faux corollae flava. — Valde affinis *V. chamaedryfoliae*, sed differt foliis acute nec obtuse crebriusque serratis majoribus. — Videtur tamen species inquirenda. — Crescit in Bonaria et in provinciis Cordova et St. Louis. (v. s. sp.)

69. V. TEUCRIOIDES Gill. et Hook. in Hook. Bot. Miscell. I. 167. — Hook. Bot. Magaz. t. 3694. — Undique asperrime piloso–hispida (procumbens?): ramis quadrangularibus; foliis sessilibus elliptico–ovatis obtusissimis, basi subcuneato–attenuatis irregulariter et profunde subpinnatifido–dentatis, margine revolutis, utrinque asperrime piloso–hispidis; spicis subcapitatis breviter pedunculatis solitariis, floriferis terminalibus; bracteis calyce triplo brevioribus lanceolatis acutis; corollae tubo calycem duplo superante, limbi subinaequaliter quinquefidi laciniis obcordatis emarginatis. ♃ — Video ramum, cujus folia sunt sessilia nec tamen amplectentia, 1½–pollicaria, 6–9 lin. lata crassiuscula, infra venosa (iis *V. canescentis* baud dissimilia), utrinque, sed praecipue subtus in venis asperrime setoso–pilosa, dentes obtusissimi rotundati satis profunde excisi, folia suprema angustiora acuta. Spica densa brevis, sesquipollicaris multiflora. Bracteae e basi ovata acuminatae foliaceae 3 lin. longae, basi longe albo–ciliatae. Calyx cylindraceus quinquangularis, 6–8 lin. longus, breviter et acute 5–dentatus viridis, inter dentes basin usque pellucide membranaceus, pilosissimus. Corollae tubus calyce duplo circiter longior incurvus, faux barbata, limbi ampli quinquefidi laciniae obcordatae emarginatae, infima suborbiculari. Corolla flava. Fructum non vidi. — Crescit in summo jugo Uspallatensi et ad Cerro de Portezuelo. — *V. scordioides* Chamisso ab hac non satis differre videtur. (v. s. c.)

β. Aubletia: Folia inciso–lobata, pinnatifida vel bipinnatifida.

70. V. RIBIFOLIA Wlprs. mss. — Fruticosa ascendens (opposite) ramosissima: ramulis junioribus quadrangularibus pubescentibus; foliis subsessilibus cuneato–trilobis, dentato–serratis, margine revolutis, utrinque, sed praesertim subtus in venis piloso–hispidis scabrellis; spicis breviter pedunculatis terminalibus subcapitatis solitariis; bracteis calyce brevioribus lineari–subulatis; calycis corolla tertia parte brevioris hispido–pilosi dentibus subulatis inaequalibus; corollae extus puberulae limbo 5–fido, laciniis ovalibus integris, fauce glabra. ♄ — Frutex humilis — ut videtur — prostratus, ramulis erectis. Ramuli hornotini quadrangulares simplices. Folia illa *Ribium* nonnullarum aemulantia, basi longe attenuata cuneata subsessilia, 6–8 lin. longa, 3–4 lin. lata, tridentata vel subtriloba, lobis grosse et obtuse paucidentatis, utrinque piloso–setulosa, supra impresse, subtus prominulo–nervosa. Pedunculi ½–1–pollicares solitarii terminales. Spica brevis densa subcapitata fastigiata subumbellata. Calyx 3 lin. longus tubulosus pilosus, inaequaliter 5–dentatus. Corolla (purpurea?) 4½ lin. longa, extus puberula. Fructum non vidi. — Species habitu peculiari distinctissima. — *V. humifusae* Cham. quodammodo affinis. — Crescit in Chili ad Conceptionem. (v. s. sp.)

71. V. HUMIFUSA Chamisso, Linnaea VII. 271. † — Rhizomate lignoso; caulibus filiformibus prostratis subradicantibus hirsutis hirtellisve, apicibus ramisque ascendentibus; foliis cuneatis in petiolum brevem angustatis, antice rotundatis vel acutis crenato– vel dentato–incisis subtrilobis, lobis lateralibus bi– rarius 3–dentatis, intermedio 3–5–dentato, triplinerviis, nervis omnibus 3–furcatis vel medio paribus venarum duabus instructo, supra, margine et subtus in nervis pilis longioribus antrorsis basi callosis substrigosis ciliatis hispidisque; spicis terminalibus solitariis ternisque longe pedunculatis, florentibus grandifloris fastigiatis, fructiferis elongatis relaxatis; bracteis brevibus. ♄ — Collum lignosum multiceps. Caules flagelliformes prostrati hinc inde radicantes, parce pilosi. Internodia 1–2–pollicaria. Folia maxima pollicaria, latitudine plerumque semipollicari, basi cuneata. Pedunculus in ramulo terminalis 1–2–3–pollicaris, cyma trispicata, spica intermedia brevius pedicellata. Spica sub–12–flora, floribus violaceis. Bracteae angustae acutae calyce breviores. Calyx tubulosus 4 lin.

longus aristato-5-dentatus. Corollae extus glabrae tubus semipollicaris, faux barbata, limbi ample quinquefidi laciniae emarginatae. Fructus 2 lin. longus stramineus reticulato-venosus a calyce inclusus. — Haud dissimilis est *V. microphyllae* H. B. Kth., differt tamen foliorum forma et magnitudine spicisque longius pedunculatis ternis. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

72. V. **FLAVA** Gill. et Hook. Bot. Miscell. I. 170. — Foliis lineari-lanceolatis integris pinnatifidisque glabris; floribus laxe spicatis; calyce elongato pubescente, dentibus valde inaequalibus; bracteis minutis. ♃ — Caules basi procumbentes. Foliorum laciniae paucae lineares trifidae integraeque in iisdem et distinctis ramis. Flores laxi intense flavi. — Descriptionem accuratiorem exoptamus. — In convallibus Andium Mendozam versus et in collibus prope Rio del Diamante.

73. V. **CRITHMIFOLIA** Gill. et Hook. in Hook. Bot. Miscell. I. 169. — Scabra herbacea erecta: foliis bipinnatifidis, segmentis linearibus obtusis crassis canaliculatis, margine revolutis; spica oblonga densa; nuculis *(??capsula??)* acute triquetris *(triquetra??)* ♃? — Tota planta scabra vix hispida. Folia crassa, quasi carnosa profunde divisa in lacinias lineares. Bracteae etiam lineares. Calyx ovato-oblongus, dentibus obtusiusculis. Corolla calyce duplo longior, limbo mediocri roseo. — *β. minor:* foliis angustioribus. — Crescit in Andibus ad Mendozam (*β.*) in prov. St. Louis.

74. V. **ELEGANS** H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 273. † — Caule repente; foliis inciso-pinnatifidis hispidis, laciniis lineari-oblongis obtusiusculis integerrimis; spicis alaribus solitariis pedunculatis; bracteis calyce paullo brevioribus; corollae tubo calycem duplo superante, laciniis limbi emarginatis. ♃. — Rami hirti, juniores hispidi. Folia basi cuneata fere pollicaria. Pedunculi spicaeque pollicares. Flores 8 lin. longi rubri. Bracteae lanceolatae hispidae. Calycis dentes valde inaequales. Corollae tubus puberulus, faux barbata. — Proxima *V. erinoidi* et *V. Aubletiae*, prioris varietatibus hanc adnumerarem si vidissem specimen siccum. — *V. Moranensis* Willd. Herb. — Crescit inter Moran et Regla Mexicanorum.

75. V. **CILIATA** Bth. Plant. Hartweg. no. 176. — Procumbens villosa canescens: foliis subbipinnatifidis, laciniis oblongis obtusiusculis; spicis densis, primum fastigiatis; bracteis linearibus calyce brevioribus; corollae tubo pubescente, calyce piloso dimidio longiore; carpellis reticulato-rugosis. ♃ — Ex affinitate *V. erinoidis* et *V. Aubletiae.* — Herba procumbens, infra araneosa; supra albido-pilosula. Folia basi cuneata, tripartita, laciniis bipinnatifidis, intermedia majori, lacinulis oblongis obtusiusculis integris vel subdentatis, 1–2 lin. latis, toto folio sesquipollicari. Spica brevis capitato-fastigiata, flores maximi, ex sicco albi? Calycis dentes longe acuminati, tubo corollino dimidio breviores albo-pilosi, bracteae lineari-acuminatae calycem aequantes. — Crescit in Mexico. (v. s. sp.)

76. V. **ERINOIDES** Lam. Illustr. gener. I. 57. — [Willd. Herb. 11137.] — Hook. Bot. Misc. I. 168. — Caule ascendente ramoso hirto; foliis tripartito-laciniatis hirsutis; laciniis lineari-lanceolatis subdentatis iterumve laciniatis; spicis solitariis terminalibus; bracteis calycem aequantibus patulis. ♃ — Herba quoad foliorum longitudinem et formam valde variabilis. Caules prostrati, raro radicantes pedales piloso-hirti. Folia profunde trifido-incisa, laciniis linearibus bis trifidis. Spica subcapitata, fructifera demum elongata. Bracteae calycesque piloso-hispidi subcanescentes. Corollae purpureo-carneae tubus calyce duplo longior, laciniis magnis emarginatis. Nuculae duae saepe abortivae, calyce inclusae rugoso-reticulatae. — *Lychnidea Verbenae tenuifoliae folio vulgo Sanda-Laguen* Feuill. Hist. Peruv. Chil. III. t. 25. — *Erinus laciniatus* Linn. Spec. plant. 879. — *Verbena multifida* Rz. et Pav. Flor. Peruv. Chil. I. 21. t. 33. fig. c. — *V. odorata* Meyen, Reise I. 481.

α. Foliis ovato-lanceolatis inciso-serratis vix trifidis.

β. Foliis profunde trifidis subtripartitisve, laciniis incisis, ultimis ovatis lanceolatisve (Rz. et Pav.) — [Poepp. Coll. pl. Chil. no. 159!]

γ. Foliis tripartitis, laciniis inciso-pinnatifidis, ultimis lineari-oblongis acutis. — *V. multifida β. contracta* Bot. Regist. t. 1766. — *V. Sabini* Hort. — Sweet, Brit. flow. gard. (2 Ser.) IV. t. 347.

δ. Foliis bipinnatifidis, segmentis paucis linearibus elongatis vel etiam foliorum segmentis anguste linearibus.

ε. Foliis bipinnatifidis, segmentis linearibus brevibus; bracteis plerumque calyce longioribus. — An specie diversa? — Crescit in Chili, Peruvia, in Mexico (foliorum laciniis acuminatis) et in Brasilia meridionali.

77. V. POGOSTOMA Klotzsch mss. — Herbacea erecta subcanescenti-pubescens: foliis profunde trifidis, laciniis pinnatifido-incisis dentatisque, subtus uninerviis, margine revolutis, utrinque canescenti-piloso-hispidis; spica terminali densa cylindracea, primum fastigiata; bracteis lanceolatis acuminatis, margine membranaceis ciliato-pilosis, calyce paullo brevioribus; calyce quinquecostato, inter nervos membranaceo, nervis in dentes 5 inaequales subulatos excurrentibus; corollae glabrae calyce vix longioris laciniis suborbiculatis integerrimis. ♃ — Herba 1–1½-pedalis stricta ramosissima, folia sesquipollicaria, laciniae lineam vel paullo amplius latiores, acutae vel obtusae, gemmae axillares folia minora proferunt. Spica breviter pedunculata 3–4-pollicaris cylindracea, 3 lin. crassa, apice ob bracteas densissime imbricatas comosa. Calyx tres lineas longus hispidulo-pilosus, laciniae lineares acuminatae piloso-hispidae, una reliquis breviore. Corolla intense coerulea glaberrima, fauce pilosula lutea, limbi 3 lin. diametro tenentis laciniae rotundatae obtusae. Stamina brevissima inclusa. Calyx supra fructum constrictus; nuculae fuscae parvae glaberrimae, dorso rugoso-reticulatae, duabus saepe abortivis sterilibus minimis. — Colitur in horto botanico Berolinensi e seminibus Bonariensibus. (v. s. c.)

78. V. CUNEIFOLIA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 22. † t. 32. fig. a. — Caule erecto hispido tetragono, infra ramoso; foliis ambitu late ovatis sessilibus profunde trifidis, laciniis lanceolatis inciso-pinnatifidis grosse dentatis, utrinque piloso-hispidis; spicis terminalibus ternis quaternisque breviter pedicellatis oblongis; bracteis lanceolatis acutis calycem hispidum subaequantibus; corollae calyce longioris laciniis 5 emarginatis. ♃ — Herba habitum *V. corymbosae* referens. Folia exacte sessilia nec tamen amplexicaulia, basi cuneata, bipollicaria, 20 lin. lata, laciniae pollicares, 6–9 lin. latae, internodia saepe ultra bipollicaria. Spicae brevissime pedunculatae, pollicares vel paullo longiores, infra laxiusculae. Corolla semipollicaris coerulea. Calyx supra fructum maturum constrictus. — Crescit in Peruviae provincia Huanuci ad Mayubamba locis arenosis (v. s.)

79. V. AUBLETIA Linn Supplem. 86. — Jacq. Hort. Vindobon. II. 82. † t. 170. — Curtis, Bot. Magaz. t. 308. — Ker, Bot. Regist. t. 294. et t. 1925. — [Willd. Spec. plant. I. 119.] — Caule herbaceo procumbente, ad nodos radicante hirsuto; foliis petiolatis, basi longe cuneatis ovato-oblongis, subtrilobis inciso-pinnatifidis, acuminatis, laciniis grosse dentatis, junioribus nervisque subtus scabris puberulis; spicis terminalibus (demum valde elongatis) densiusculis; bracteis lineari-acuminatis calycem aequantibus; calycibus tubulosis breviter 5-dentatis corollae tubo triente breviore; corollae maximae limbo irregulariter quinquefido, laciniis obovatis profunde emarginatis. ♂ — Planta pulcherrima hortorumque nostrorum decus, varietatum multarum hybridarum typus. Folia cum petiolo (saepe foliaceo-dilatato) 2–3-pollicaria, semipollicem vel pollicem lata. Corollae tubus 9 lin. longus leviter incurvatus glaberrimus, saepe calycem duplo excedit. Corolla e carneo violascenti-purpurea, ad faucem pilosa. Stamina superiora saepe subnulla. Limbus saepe semipollicem diametro habet. Calyx nuculas reticulato-rugosas glabras includens, demum (in planta spontanea) latere interno longitudinaliter ruptus. — *Lychnidea Verbenae tenuifoliae folio* Feuill. Hist. Peruv. III. 35. t. 25?? (vulgo ad *V. erinoidem* relata). — *Erinus laciniatus* Linn. Spec. plant. II. 878? — *Glandularia Carolinensis* Gmel. Syst. II. 920. — *Anonymos Carolinensis* Walt. Flor. Carol. 164. — *Billardiera explanata* Mnch. — *Buchnera Canadensis*

Linn. Mantiss. 88. — *Verbena Oblaetia* Retz, Act. Holm. 1773. p. 144. t. 5. — *V. Obletia* Med. Act. Palatin. III. 194. t. 7. — *V. longiflora* Lam. Illustr. I. 57. — *Obletia* Rozier, Journ. I. 367. t. 2. — *V. Drummondi* Hortor. — *V. Lamberti* Ker, Bot. Regist. t. 1102. — Sweet, Brit. flow. gard. (2 Ser.) IV. t. 363. — Spr. Syst. veg. II. 750. no. 39. — *V. prostrata* R. Brown in Ait. Hort. Kew. IV. 41? — *V. grandiflora* Michx. — Polymorphae hujus speciei varietates constituere nolui in planta viva spontanea indagandas. — Crescit in America boreali (in Carolina et Georgia).

80. V. INCISA Hook. Bot. Magaz. t. 3628. — Pubescenti-hirsuta erecta suffruticosa ramosa: foliis petiolatis cordato-oblongis pinnatifido-lobatis grosse inciso-dentatis, superioribus sublanceolatis sessilibus inciso-pinnatifidis; corymbis terminalibus planiusculis; floribus subsessilibus: calycibus cylindraceis quinquedentatis quinquecostatis, tubo corollae tertia parte brevioribus, limbi oblique quinquelobi segmentis cuneatis bifidis. ♃ — Folia inferiora caulina subcordato-3-5-loba, lobo medio multo longiore, omnibus grosse inciso-pinnatifidis, basi cuneata integerrima, bipollicaria, cum parte petiolari 9 lin. longa, 1½ poll. lata, ramealia lanceolata, basi saepe auriculaeformi-producta, subsessilia grosse pinnatifido-serrata, sesquipollicaria, 3-4 lineas lata. Spicae terminales subcapitatae solitariae (pedunculo 2-pollicari). Bracteae brevissimae, lanceolato-acuminatae, calyce multoties breviores. Calyx prismatico-cylindricus semipollicaris subtruncatus, obsolete quinquedenticulatus pubescenti-glandulosus. Corollae tubus calyce tertia parte longior pallens, limbus e roseo purpurascens maximus quinquelobus, laciniis obovatis profunde emarginatis. — Affinis *V. Tweedianae*, sed certe diversa. — Crescit ad St. Fée, in isthmo Panamensi et in Porto Alegro Bay. (v. s. c.)

† *Species dubiae et non satis notae.*

81. V. SIMPLEX Lehm. Linnaea III. Literb. 10. — Caule herbaceo erecto stricto hispido; foliis lanceolatis, superne inaequaliter serratis venosis scabris; spicis solitariis terminalibus laxis; floribus distantibus. ♃? ⊙? — Crescit......?

82. V. SCOPARIA Tausch, Flora XIX. 390. (nec Hook.) — Caule herbaceo ramosissimo hirto adscendente; foliis ovatis lanceolatisve inciso-serratis, inferioribus hastato-auriculatis; spicis terminalibus valde aggregatis longissimis hirsutis. ♃? ⊙? — Crescit......?

83. V. XUTHA Lehm. Linnaea X. Literb. 115. — Caule erecto hispido; foliis canescenti-pilosis, inferioribus oblongis inciso-serratis, superioribus tripartitis subpinnatifidis serratisque; spicis lateralibus terminalibusque simplicibus strictis; floribus remotis; bracteis subulatis adpressis calyce brevioribus. ♃ — Crescit in America tropica.

84. V. LIGUSTRINA Lagasca, Nov. gener. et spec. 18. — Fruticosa: foliis ovatis oblongisque scabris, margine revolutis integerrimis; spicis cylindraceis terminalibus. ♄ — Crescit in Portu Desiderato.

85. V. THYMIFOLIA Lagasca l. c. — Suffruticosa humilis ramosissima: foliis ovatis ciliato-scabris, margine revolutis; spicis capitatis terminalibus solitariis. ♃ — Habitus *Herniariae fruticosae*. — Crescit in Portu Desiderato.

86. V. RIGIDA Spr. Syst. veget. cur. post. 230. — Caule herbaceo simplici; foliis subsessilibus oblongo-lanceolatis grosse dentatis rigidis asperis; cymis terminalibus compositis; laciniis calycinis setaceis elongatis. ♃ — Crescit in Brasilia.

87. V. MEGAPOTAMICA Spr. l. c. — Caule herbaceo erecto pubescente; foliis petiolatis oblongo-lanceolatis serratis, basi cuneatis glabriusculis; capitulis terminalibus; bracteis minutis ciliatis; calyce elongato glabro. ♃ — Crescit in Brasiliae provincia Rio Grande.

88. V. MENTHAEFOLIA Bth. Plant. Hartweg. no. 175. — Caule erecto elato ramoso pilosiusculo; foliis obovato-cuneatis subincisis, laciniis acutiusculis grosse dentatis; spicis elongatis gracilibus paniculatis; bracteis parvis; corollis calyce triplo longioribus; fructibus remotis. ♃ — Species valde insufficienter descripta, forte ex affinitate *V. hastatae*. — Crescit in Mexico.

89. V. TUBEROSA Grah. in Edinbrgh. philos. journ. 1840.[*]) Octb. — Radice tuberifera; caule suffruticoso erecto; foliis petiolatis ovato-ellipticis, utrinque obtusis inciso-serratis; spicis terminalibus solitariis; floribus verticillatis. ♃ — Radix perennis repens, tubera magnitudine Coryli nucis plurima proferens. Caulis subglutinosus herbaceus erectus. Folia petiolata concava rugulosa ovato-elliptica, infra pallidiora reticulato-venosa pilosa, petiolus dimidium fere folium adaequans, superiorum brevior. Spicae terminales elongatae. Flores pedicellati, bractea ovali undulata fulcrati. Calyx apice coloratus inaequaliter 5-dentatus. Corolla carnea odorata, extus puberula, limbo obliquo inaequali, laciniis obovato-linearibus, tubo curvato. Stamina 4 didynama. Reliqua haud satis nota. — *Verbena lobelioides* Graham mss. — Crescit in Bonaria. — Affinis dicitur sequenti.

90. V. PLATENSIS Spr. Syst. vegetab. II. 748. no. 14. — Caule fruticoso ramoso; foliis oblongo-lanceolatis venoso-lineatis inciso-serratis, utrinque hispidis; spica solitaria terminali laxa; bracteis calyce elongato brevioribus. ♄ — Crescit in Brasilia ad Rio de la Plata. — [Species haec inter plantas a Sellowio relictas, qui eam misit, non reperta pro cive dubio habenda est.]

†† *Species nonnisi nomine cognitae.*

V. AMERICANA Mill.
V. ARRANIANA Hort.
V. ASPERA Knze.
V. BARBATA Grah.
V. BIPINNATIFIDA Nutt.
V. CUNEIFOLIA Rafin.
V. ELEGANS Hort.
V. FRUTICOSA Houst.
V. GLANDULOSA Morren.
V. INTERMEDIA Penny.
V. RUGOSA Mill.

††† *Species e genere excludendae.*

V. ALPIGENA Wlprs. = ALOYSIA LYCIOIDES.
V. ANGUSTIFOLIA Mill. = STACHYTARPHETA ARISTATA.
V. CAPENSIS Thnbrg. = LIPPIA CAPENSIS.
V. CAPITATA Blume. = LIPPIA NODIFLORA.
V. CLAVATA Rz. et Pav. = SHUTTLEWORTHIA RUIZIANA.
V. CAJENENSIS Rich. STACHYTARPHETA CAJENENSIS.
V. CORDATA Hort. Berol. = LIPPIA CHAMAEDRYFOLIA.
V. CUNEATA Willd. = LIPPIA CANESCENS.
V. CURASSAVICA Linn. = TAMONEA CURASSAVICA.
V. DENTATA Visiani. = ALOYSIA CHAMAEDRYFOLIA.
V. DICERAS Bert. = SHUTTLEWORTHIA DICERAS.
V. DISSECTA Willd. = SHUTTLEWORTHIA DISSECTA.
V. ELLIPTICA Willd. = LIPPIA CANESCENS.
V. FORSKALII Vahl. = PRIVA FORSKALII.
V. GLOBIFLORA Herit. = LIPPIA ASPERIFOLIA.
V. GLOBIFLORA Nocc. = LIPPIA REPTANS.
V. GLOBULIFERA Auct. = LIPPIA ASPERIFOLIA.
V. HYDEROBADENSIS Rottl. = BOUCHÉA HYDEROBADENSIS.
V. JAMAICENSIS Linn. = STACHYTARPHETA JAMAICENSIS.
V. INDICA Jcq. = STACHYTARPHETA ANGUSTIFOLIA.
V. INDICA Linn. = STACHYTARPHETA INDICA.
V. LANCIFOLIA Mnch. = STACHYTARPHETA INDICA.

[*]) *Num forte Privae species ob flores pedicellatos?*

V. LAPPULACEA Linn. = PRIVA LAPPULACEA.
V. MEXICANA Pers. = PRIVA MEXICANA.
V. MUTABILIS Jcq. = STACHYTARPHETA MUTABILIS.
V. MYSSORENSIS Wght. = BOUCHÉA HYDEROBADENSIS.
V. NODIFLORA Linn. = LIPPIA NODIFLORA.
V. NODIFLORA Petagn. = LIPPIA REPENS.
V. ORCHIOIDES Hort. = PRIVA ORCHIOIDES.
V. ORUBICA Linn. = STACHYTARPHETA ORUBICA.
V. PRISMATICA Linn. = STACHYTARPHETA PRISMATICA.
V. PSEUDO-GERVÃO St. Hil. = BOUCHÉA PSEUDO-GERVÃO.
V. PULCHELLA Sweet. = SHUTTLEWORTHIA TENERA.
V. REPENS Savi. = LIPPIA REPENS.
V. SARMENTOSA Willd. = LIPPIA CANESCENS.
V. SCABRA Mühlnbrg. = LIPPIA QUERETARENSIS.
V. SELLOI Spr. = SHUTTLEWORTHIA SELLOI.
V. SQUAMOSA Jcq. = STACHYTARPHETA SQUAMOSA.
V. STOECHADIFOLIA L. = LIPPIA STOECHADIFOLIA.
V. SUFFRUTICOSA Aubl. = LIPPIA STOECHADIFOLIA.
V. SULPHUREA Sweet. = SHUTTLEWORTHIA SULPHUREA.
V. TENERA Spr. = SHUTTLEWORTHIA TENERA.
V. TRIPHYLLA Herit. = ALOYSIA CITRIODORA.

VIII. (3690.) **PRIVA** *Adans.*

(Adans. Familles des pl. II. 505. — Juss. Ann. de mus. d'hist. nat. VII. 75. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 200. II. 198.)

1. PR. ECHINATA Juss. Ann. de mus. d'hist. nat. VII. 69. — Caule erecto subsimplici piloso-hispidulo; foliis petiolatis cordatis acuminatis crenatis; racemis laxis elongatis terminalibus axillaribusque; calycibus fructiferis ovato-globosis inflatis, uncinato-hispidis. ♃ — Herba tenera pedalis et altior subramosa. Caulis tetragonus sparse setulosus subglaber. Folia petiolata, petiolis 6–9 lin. longis, ovato-cordata acuminata, bipollicaria, pollicem lata vel latiora, tenuissime membranacea, utrinque adpresse setuloso-scabra, obtuse crenata, apice saepe integerrima. Racemi ex axillis foliorum superiorum et terminales laxi semipedales vel longiores. Flores breviter pedicellati, parum infra pedicellum bractea lineari-subulata eum aequante suffulti, bracteis pedicellisque post fructum cum calyce delapsum persistentibus, piloso-hispidulis. Calyx cyathiformi-globosus, undique setulis uncinatis obsitus, brevissime obtuseque quinquedentatus. Corolla purpurea, calyce duplo longior (explicata a me non visa). Fructus ovatus quadricornis bipartibilis. — *Busseria* Löffl. It. 194. no. 69. — *Blairia* Houst. Ann. Herb. 277. — *Scorodonia floribus spicatis purpurascentibus pentapetaloideis* Sloane, Hist. Jamaic. I. 174. t. 110. fig. 1. — *Verbena* (*Priva* Pers. Enchir. II. 139.) *lappulacea* Linn. Spec. plant. 28. — Jcq. Observ. I. 37. t. 24. — *Zapania lappulacea* Lam. Encycl. méth. — Crescit locis ruderatis in America meridionali (in insulis Cuba, St. Thomae, Martinica, in Mexico et ad Guayaquil Quitensium) (v. s. s.)

2. PR. CRENATA Schrader, Linnaea VIII. Literatb. 24. — Foliis petiolatis ovatis breviter acuminatis crenatis; racemis elongatis; pedicellis fructiferis bractea brevioribus; calycibus uncinulato-hispidulis; fructibus didymis. ♃ — Affinis sed diversa dicitur a *Pr. hispida* foliis basi non cordatis florumque colore (non indicato). — Species re vera dubia habenda. — Crescit in Mexico.

3. PR. ASPERA H. B. Ktb. Nov. gen. et spec. plant. II. 278. † — Caule erecto ramoso quadrangulari pubescenti-hirto; foliis oppositis petiolatis, basi acutis, ovatis acuminatis crenatis scaberrimis, infra pubescenti-hirtis; racemis elongatis terminalibus axillaribusque laxis; bracteis subulatis pedicello duplo longioribus; calycibus fructiferis subglobosis pubescenti-hispidis. ♃ — Caulis 4–6-pedalis. Folia reticulato-nervosa rigida, subquadripollicaria, 25–26 lin. lata, petioli 8 lin.

longi hirtelli. Racemi solitarii aut terni subsexpollicares. Pedicelli vix dimidiam lineam longi. Calyx hispidulus. Corolla coerulea extus pubescens, tubus calyce vix longior, limbus bilabiatim quinquefidus, faux pilosa. Fructus quadrilocularis bipartibilis calyce globoso tectus. — Valde affinis *Pr. echinatae*, differt tamen calycibus quadruplo minoribus. — Crescit locis siccis in Nova Hispania inter Ario et Aguasarca. (v. s. sp.)

4. PR. HISPIDA Juss. l. c. — H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 278. — Foliis ovatis scabris subsessilibus; calycibus fructiferis didymo-globosis densissime echinato-hispidis; fructibus semper(?) bilocularibus. ♃ — A diagnosi data paullo alienas video plantas. Herba ut videtur pluripedalis, caule tetragono opposite ramoso, pilosulo-hispido, ad nodos subcompresso. Internodia 4-pollicaria, ramealia breviora. Folia superiora subsessilia, inferiora petiolata, petiolis semipollicaribus vel 2 lin. longis, folia 1½-2-pollicaria, 9-18 lin. lata, ovato-acuminata grosse crenato-serrata, utrinque setulis adpressis scabra. Racemi laxissimi terminales axillaresque elongati pedales usque. Flores pedicellati, pedicellis bracteis subulatis calycibusque tubulosis acute quinquedentatis pilosulo-asperis. Corolla extus puberula calyce duplo longior purpurascens. (Evolutam fructusque maturos videre mihi non contigit, tamen nullus dubito, quin rectam viderim *Pr. hispidam.*) — *Verbena Mexicana Trachelii folio, fructu Aparines* Dill. Hort. Eltham. 407. t. 302. fig. 389. — *Verbena* (*Priva* Pers. Enchirid. II. 139. — *Zapania* Lam. Illustr. gener. I. 59. — *Blairia* Gärtn. De fructib. et semin. I. 265. t. 56.) *Mexicana* Linn. ex Willd. Spec. plant. I. 116. — Crescit in Mexico. (v. s. s. et c.)

5. PR. LEPTOSTACHYA Pers. Enchir. II. 139. — Caule brevissime lignoso; ramis quadrangularibus pubescenti-scabris; foliis petiolatis cordato-ovatis obtusis crenato-serratis, strigilloso-pilosulis; racemis terminalibus axillaribusque piloso-hispidis elongatis; floribus remotis; bracteis ovalibus pedicello sublongioribus; calyce hamuloso-setoso, fructifero aucto orbiculato. ♃ — Rami e rhizomate lignoso plures erecti subsimplices. Folia longiuscule petiolata (petiolis ½-1½-pollicaribus), petiolis basi connatis, 1-2-2¼ poll. longa subaequilata, obtuse grosseque crenata, setulis rectis vel hamulosis utrinque strigulosa. Racemi terminales elongati laxi et ex axillis foliorum superiorum. Calyx tubulosus subgibbus 5-angularis et 5-dentatus, fructifer auctus. Corollae albae hypocraterimorphae tubus subcurvatus calyce longior, sursum contortus, limbi 5-partiti segmenta aequalia obovata. Stamina 4 didynama, medio corollae tubo inserta, filamenta villosa, antheris per paria approximatis ovalibus bilocularibus. Ovarium quadriloculare, ovulis solitariis basifixis. Stylus filiformis apice clavatus, stigma laterale. Fructus nucamentaceus obcordatus compressus bipartibilis, dorso crebre aculeolatus quadrilocularis tetraspermus. — *Tortula aspera* Roxb. in Willd. Spec. plant. I. 359. † — *Streptium asperum* Roxb. Plant. of the coast of Corom. II. 25. t. 146. — Wght. in Hook. Journ. of bot. I. 230. † t. 130. — *Priva* (*Verbena* Vahl, Symb. bot. III. 6?) *Forskålii* E. Mey. Comment. de plant. Afric. austr. I. 275? — Crescit in India orientali locis umbrosis (Trichinopoly, Trevalore ad Tanjore). (v. s. sp.)

6. PR. (VERBENA Vahl, Symbol. bot. III. 6.) FORSKALII E. Mey. Comment. de plant. Afric. austr. I. 275. — Caule erecto herbaceo tetragono glabro subramoso; foliis breviter petiolatis ovatis acutis obtuse serratis, utrinque adpresse strigillosis; racemis terminalibus valde elongatis laxis; bracteis subulatis pedicello longioribus; calycibus pubescentibus obsolete quinquedenticulatis; corollae calyce duplo longioris glabrae tubo curvato, limbo bilabiatim quinquelobo; calycibus fructiferis globosis inflatis; fructibus glabris profunde areolato-insculptis, demum bipartitis, partitionibus bilocularibus. ♃ — Video specimen pessimum, quod describere non audeo. — *Phryma* Forsk. Cat. pl. Aeg. Arab. 115. — *Priva dentata* Juss. Annales du mus. d'hist. nat. VII. 70. — *Zapania Arabica* Poir. Encycl. méth. — Crescit in Arabia et in Promontorio bonae spei.

7. PR. LAEVIS Juss. l. c. — Caule herbaceo; foliis ovato-oblongis dentatis, basi attenuatis glabris; floribus longe racemosis; calycibus ventricosis glabris, dentibus subulatis. ⊙ — Caulis 1½-pedalis tetragonus glaber. Folia ovata obtusiuscula, basi longe cuneata, superiora serrato-dentata, inferiora crenata, 1½-pollicaria, pollicem lata glabra. Flores in racemo terminali subsessiles, subverticillati. Bractea brevis lanceolata. Calycis dentes subulati, fructifer ventricosus. Corolla luteo-rubra, linea 3-4 lin. ampla. — *Castelia cuneato-ovata* Cavanilles, Icon. VI. 61. t. 583. et Anales de ciencias nat. III. 134. t. 30. — Crescit in Chili et in Bonaria.

8. PR.? (VERBENA Hortor.) ORCHIOIDES Wlprs. mss. — Radice longe repente stolonifera; caule erecto ramoso herbaceo glabro; ramis quadrangularibus; foliis petiolatis, e basi cuneata ovato-ellipticis, utrinque glaberrimis glaucis obtusissimis vel subacutis dentato-serratis; racemis terminalibus laxis; bracteis suborbiculari-ovatis acutis calyce multo brevioribus; calycibus curvatis acute et subaequaliter quinquedentatis; corollae tubo curvato calycem aequante (extus minutissime puberulo), limbo amplo bilabiato quinquelobo, laciniis subrotundis, fauce pilosula; antheris staminum anticorum subexsertis. ♃ — Planta pulcherrima, in hortis diu culta, sed nunquam descripta et nunquam seminifera, propterea quoad genus subdubia. Foliorum forma omnino convenit cum *Pr. laevi* Juss., sed differt praecipue bracteis orbiculato-ovatis nec lanceolatis. Tota planta glaucescens, calycis dentes saepe purpurascentes, corolla ampla lutescenti-rubicunda. — Num forte *Verbena tuberosa* Graham (Cf. p. 33. no. 89.) cum hac specie consocianda erit? — In Peruvia crescit. [v. v. c. et s. c.]

IX. (3690/1.) PHRYMA *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 1165. pag. 526. — Prsh. Flor. Am. sept. II. 415.)

1. PHR. LEPTOSTACHYA Linn. Spec. plant. 838. — Lam. Illustr. gen. t. 516. — Prsh. l. c. — Willd. Spec. plant. III. 180. † — Genus toto coelo a *Priva* alienum, quacum solo habitu ducti et Endlicher et Meisner pessime conjunxerunt. — Herba perennis simplex vel parce opposite ramosa, pedalis vel bipedalis. Caulis obsolete tetragonus laevis vel superne adpresse puberulus, saepe ad nodos subgeniculatus. Internodia inferiora bipollicaria longioraque, superiora pollicaria et breviora. Folia inferiora longiuscule, superiora sensim brevius petiolata, suprema semper sessilia opposita, ovato-acuminata, basi saepe subcordata, saepe subcuneato-angustata irregulariter grosseque serrato-crenata membranacea, utrinque adpresse striguloso-hispida, caeterum glaberrima laete viridia, maxima cum petiolo saepe quadripollicaria, 2 pollices lata. Folia paris supremi sessilia semiamplexicaulia, nec tamen coalita cordata acuminata, si racemi laterales reperiuntur, in racemo terminali semper minima saepe lanceolata integerrima, nec tamen unquam desunt. Racemi laterales, axillares et terminales solitarii elongati laxi, quadripollicares et longiores. Rhachis, pedicelli, bracteae et calycis tubus puberuli. Flores brevissime pedicellati patentes. Bracteae sub pedicello lineari-acuminatae, tubum calycis fere adaequantes, bracteola ad basin calycis utrinque brevissima subulata. Calyx tubulosus quinquecostatus bilabiatus, labii superioris dentes 3 longissimi setosi glaberrimi, apice subrecurvati, inferioris dentes 2 brevissimi obtusissimi triangulares pubescentes herbacei. Corolla tubulosa bilabiata ex albo purpurascens, tubus calyce vix longior, limbus distincte bilabiatus, labium superius cum tubo continuum longitudine dentium calycis trium superiorum, apice emarginatum, margine subreflexum, labium inferius patens maximum rotundato-trilobum, lobo medio maximo purpurascente. Faux nuda. Stamina 4 didynama (superiora breviora) tubo adnata glabra, antheris subrotundis bilocularibus, in fauce corollae per paria approximatis. „Germen oblongum, stylus filiformis longitudine staminum, stigma obtusum. Calyx fructifer reflexus rhachidi adpressus immutatus glaberrimus connivens, demum longitudinaliter rumpens.

Fructus teretiusculus subcompressus, bilocularis, loculo altero sterili, altero monospermo." — Neque ovarium neque fructum perfectum vidi. — *Leptostachya* Mitch. gen. no. 9. — *Amaranthi Siculi Bocconis spica, floribus parvis purpurascentibus propendentibus, herba Floridana* Pluken. Almath. 59. t. 380. fig. 5. — *Verbenaca Mariana Rosae Chinensis folio, seminibus deorsum tendentibus* Petiv. Mus. 694. — *Phryma Carolinensis* Walter. — Crescit in America boreali locis umbrosis a Canada ad Carolinam. (v. s. sp.)

† *Species e genere excludenda.*

PHR. DEHISCENS Linn. fil. = CHASCANUM CUNEIFOLIUM.

X. (3686.) MONOCHILUS *Fisch. et Mey.*

(Fisch. et Mey. Indx. sem. hort. Petropolit. 1835. I. 34. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 290. II. 198.)

1. M. GLOXINIFOLIUS Fisch. et Mey. l. c. — [Ann. sc. natur. (2. Sér.) V. 124. — Linnaea X. Literaturb. 98.] — Herba humilis, radice repente carnosa; caule abbreviato humili simplici(?); foliis suboppositis longiuscule petiolatis late ovalibus, irregulariter subdenticulato-serratis, supra glabris, infra in nervis puberulis; racemis axillaribus terminalibusque; bracteis brevissimis subulatis; bracteolis in medio pedicello geminis subulatis; calyce campanulato acute quinquedentato pubescente; corolla calycem triplo excedente. ♃ — Caulis bipollicaris simplex rubens, brevissime puberulus. Folia subalterna, petioli pollicares et longiores, foliorum lamina basi in petiolum cuneata late ovata obtusa, 2–3½-pollicaris, 1–2 pollices lata, folia illis *Gloxiniarum* simillima, juniora adpresse pubescentia, adulta glabrescentia membranacea. Racemus bipollicaris laxus, rhachi, bracteis calycibusque adpresse fuscescenti-tomentosis. Flores breviter pedicellati. Calyx campanulatus acute quinquedentatus, dente sexto accessorio lineari-subulato interdum accedente. Corolla albida extus puberula. — Crescit in Brasilia, in sylvis primaevis Macahé. (v. s. c.)

XI. (3719.) QUOYA *Gaudich.*

(Gaudich. ad Freycinet, Voyage bot. 453. t. 66. — Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 290. II. 198.)

1. QU. CUNEATA Gaudich. l. c. — Prsl. Repert. bot. system. I. 143. — Suffrutex tomentosus pilis stellatis vel ramosis vestitus, ramulis teretibus. Folia opposita sessilia obovato-cuneata crenata rugulosa. Umbellae axillares pedunculatae simplices pauciflorae bracteatae. Flores pedicellati coerulescentes. ♃ — Crescit in Novae Hollandiae ora occidentali ad „Baie des chiens marins."

XII. (3689.) DIPYRENA *Hooker.*

(Hook. Bot. Misc. I. pag. 355. [index.] — Meisn. Gener. pl. vasc. I. 290. II. 199.)

1. D. (WILSONIA Hook. Bot. Misc. I. 173. † t. 49.) GLABERRIMA Hook. l. c. — Frutex erectus rigidus subvirgatus, ubique glaberrimus. Ramuli subspinescentes. Folia praecipue in ramis junioribus fasciculata alterna parva oblongo-spathulata crassiuscula subcarnosa obtusa uninervia sessilia. Flores terminales in spicam laxiusculam congesti bracteati odorati. Bracteae inferiores foliiformes, supremae lineares calyce longiores. Calyx brevissime pedicellatus oblongo-cylindraceus 5-dentatus parvus, dente uno (exteriore) longiore. Corolla calyce quadruplo longior. Tubus cylindraceus, superne incrassatus. Germen ovatum, basi glandula carnosa cinctum. Stylus filiformis, tubo corollae longior. Stigma dilatatum obliquum seu laterale. Drupa ovalis siccitate nigra, basi calyce hinc fisse circumdata, utrinque longitudinaliter sulcata, demum in duas nuces plano-convexas biloculares dispermas facile soluta. — Genuina *Verbenae* esse dicitur species. — Crescit in convallibus Andium prope Mendozam. (v. s. sp.)

XIII. (3687.) CHASCANUM *E. Mey.*

(E. Mey. Comment. plant. Afric. austr. I. 275. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 290. II. 199.)

Sectio I. APTERYGIUM Wlprs.

Carpidia cylindrica v. semicylindrica.

a. Foliis dentatis.

1. CH. CERNUUM E. Mey. Comment. plant. Afric. austr. I. 276. — Foliis cuneatis subtruncatis, apice grosse 3–5–dentatis; spicis terminalibus elongatis. ♃ *Buechnera cernua* Linn. Mantiss. plant. 251. — Thnbrg. Flor. Capens. 466? Crescit in Promontorio bonae spei (inter Breederivier et Gamtoosrivier.)

2. CH. CUNEIFOLIUM E. Mey. l. c. — Maund et Henslow, The Botanist IV. t. 196. — Foliis flabellato–cuneatis, apice rotundatis 7–9–dentatis; spicis subterminalibus elongatis. ♃ — Caules herbacei, praesertim juniores tetragoni glabri. Folia breviter petiolata carnosula, sicca nigricantia, orbiculato–, ovato–, vel obovato–cuneata, apice rotundata, profunde 5–7–9–dentata enervia, maxima non ultra semipollicem longa et lata, suprema vix 3 lineas longa et sesquilineam lata. Spicae in ramis ramulisque terminales laxiusculae. Flores distantes rhachidi adpressae, interstitio longiores, bractea brevissima lanceolata acuta fulcrati, breviter pedicellati. Calyx cum pedicello 3 lineas longus tubulosus quinquedentatus, dentibus brevissimis subulatis, post anthesin subcontortis, fauce pubescente, membrana diaphana inter singulos dentes basin calycis usque procurrente. Calyx fructifer antice longitudinaliter fissus, apice subconstrictus paleaceus. Drupa exsucca bilocularis calycis fere longitudine rugulosa glaberrima, styli basi apiculata, loculis monospermis. Corolla tubulosa calyce multo longior, limbi subbilabiatim quinquelobi laciniis subaequalibus basi constrictis obovatis. Styli filiformis corollam aequantis stigma capitellatum. — *Buchnera cuneifolia* Thnbrg. l. c. — *B. cernua* Houytt. Syst. VIII. 129. t. 58. fig. 2. — *Phryma dehiscens* Linn. Supplem. 277. — In Promontorio bonae spei. (v. s. sp.)

3. CH. GARIPENSE E. Mey. l. c. 277. — Foliis ovatis grosse dentato–serratis; spicis terminalibus longissimis. ♃ — Caules strictiusculi teretes (ramulis supremis teretiusculis), medulla copiosa farcti glaberrimi. Folia petiolo semipollicari (superiora breviori) suffulta pollicaria (superiora minora), semipollicem lata, elliptico–ovata grosse et inaequaliter serrato–dentata, illis Chenopodiorum nonnullorum haud dissimilia, e basi distincte trinervia carnosula glabra, exsiccata nigrescentia. Spicae terminales 5–6–pollicares. Flores brevissime pedicellati laxiusculi, basi bractea lineari–setacea suffulti, rhachidi adpressi. Calyx anguste linearis tubulosus glaberrimus laete viridis, siccus paleaceus, apice subulato–5–dentatus, striis inter dentes basin usque 5 membranaceis pellucidis. Calyx cito antice longitudinaliter fissus; corolla tubulosa cernua calyce dimidio longior, ex sicco purpurascens. Drupam maturam non vidi. — Crescit in collibus asperis ad fluvium Garip prope Verleptpram in Promontorio bonae spei. (v. s. sp.)

4. CH. PUMILUM E. Mey. l. c. — Subacaule tomentosum: foliis ovatis inaequaliter inciso–serratis; spicis brevissimis axillaribus. ♃ — Crescit in Promontorio bonae spei, in collibus asperis siccis inter Blaauwekrans et Wilgerboschfontein.

5. CH. MARRUBIIFOLIUM Fnzl. mss. in Kotschy, Plant. Nubic. no. 32! — Caule teretiusculo opposite ramoso cano–pubescente; foliis oppositis petiolatis ovatis obtusissimis grosse serrato–dentatis, utrinque pubescenti–setulosis, infra reticulato–venosis; spicis terminalibus longissimis multifloris; calycibus canescenti–virentibus asprellis. ♃ — Summitates tantummodo video, sed ejus caules et rami teretiusculi, praesertim juniores cano–villosuli pubescentes. Folia petiolata, petiolis semipollicaribus, basi cuneata, ovalia obtusissima, pollicem longa, semipollicem lata, grosse, inaequaliter et obtuse serrato–dentata, utrinque setuloso–pubescentia, praesertim ad nervos, infra reticulato–venosa. Spicae terminales pedales et longiores. Flores numerosissimi, rhachidi adpressi, exacte sessiles,

bractea lineari–subulata calyce subduplo breviori viridi scabrella setulosa suffulti. Calyx filiformis tubulosus viridis asprello–pubescens breviter et acute quinquedentatus, striis inter dentes 5 pellucide membranaceis, demum antice basin usque fissus. Corolla lutea (?) tubulosa calyce duplo longior, limbo subbilabiatim 5–lobo. Stamina 4 didynama brevissima inclusa, summo tubo inserta. Stylus longissimus filiformis inclusus persistens, stigma in styli apice lateraliter capitellatum. Drupa nigra sicca nitida rugulosa, mox in carpidia duo monosperma cylindrica secedens. — Crescit ad pagum Cordofanum Abu–Gerad in solo pingui. (v. s. sp.)

β. Foliis inciso–pinnatifidis.

6. CH. PINNATIFIDUM E. Mey. Comment. de plant. Afric. I. 277. — Caulibus adscendentibus; foliis pinnatifidis, laciniis rhachique linearibus; spicis brevibus axillaribus. ♃ — Fruticulus humilis vix spithamaeus opposite ramulosus, caule ramisque erectis teretibus scabrellis. Folia pollicaria vel ultra, semipollicem lata anguste linearia pinnatifida 2–3–juga, laciniis linearibus lineam latis integerrimis obtusis carnosulis. „Spicae brevissimae axillares“, ego video flores paucos sessiles in spiculam terminalem laxissimam digestos. Bracteae lineares acutae calyce triplo breviores. Calyx tubulosus breviter quinquedentatus, demum apice subcontortus, antice longitudinaliter fissus. Stamina 4 didynama brevissima tubo corollae purpurascentis calyce duplo longioris prope faucem inserta inclusa. Styli filiformis persistentis stigma laterale capitellatum. Drupa exsucca glaberrima ruguloso–insculpta, stylo persistente terminata, basi antice oblique subtruncata (ubi squama mericarpii abortivi), bipartibilis sed non sponte secedens, bilocularis, loculis monospermis. — *Buchnera pinnatifida* Thnbrg. Flor. Capens. 466. — Crescit in Promontorio bonae spei in planitie aspera sicca inter Leeuwenfontein et Slengerfontein et alibi. (v. s. sp.)

Sectio II. PTERYGOCARPUM Wlprs.

Carpidia apice in alam expansa.

7. CH. LAETUM Fnzl. mss. in Kotschy, Plant. Nubic. no. 230! et 1012! — Totum glaucescens brevissime asprellum, erectum ramosum: caulibus ramisque teretiusculis; foliis petiolatis ovatis, ovato–ellipticis, subrhombeis vel ovato–cuneatis, grosse et inaequaliter serrato–dentatis obtusis vel subacuminatis, infra scabrellis; spicis terminalibus longissimis; calycibus asprellis, demum stramineis; carpidiis ala elliptica auctis. ♃ — Caules demum lignescentes erecti opposite ramosi minutissime asprelli. Folia magnitudine valde variantia, ½–2–2½–pollicaria semipollicem vel pollicem lata, petiolo saepius pollicari, ovata, ovato–subrotunda, subrhombea vel ovato–cuneata glauca, infra nervoso–reticulata, grosse et inaequaliter serrato–dentata asprella glauca, acuminata vel obtusa. Spicae terminales longissimae pedales multiflorae. Flores subsessiles, rhachidi valde adpressi, bractea lineari–subulata calyce triplo breviori suffulti. Calyx tubulosus 4 lineas longus cylindricus asprellus, brevissime et acute quinquedentatus, virescens, striis 5 inter dentes pellucido–membranaceis basin usque procurrentibus, demum paleaceus stramineus longitudinaliter fissus. Calycis dentes saepe evanidi. Corolla et genitalia a me non visa. Carpidia gemina matura sponte secedentia semicylindrica, fusco–brunnea glaberrima striato–rugulosa, apice in alam ellipticam obtusam subconcavam, utrinque subdecurrentem expansa, facie interiori pulverulento–verruculosa, basi excavata receptaculo conico innata, unilocularia monospermia. Semen cylindricum. — Crescit in finibus Cordofanis versus Tekele inter frutices ad montem Kohn et in collibus prope Adegama. — Ex habitu simillimum est *Ch. marrubiifolio*, cujus varietatem primo intuitu forte habebis. (v. s. sp.)

XIV. (3688.) CASSELIA *Nees et Martius.*

(Nees et Mart. Nov. act. acad. Caes. Leop. Carol. XI. I. 73. t. 6. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 290. II. 199.)

1. C. VERONICAEFOLIA Chamisso, Linnaea VII. 364. † — Foliis lanceolatis antice profunde acute serratis; pedunculis bifloris, pedicellis quam pedunculus et calyx

longioribus, folio multo brevioribus; dentibus calycinis cuspidatis. ♄ — Caules e radice lignosa plures spithamaei simplicissimi vel ramosi. Internodia pollicaria vel sesquipollicaria viscidulo-puberula. Folia subopposita, inferiora breviora latiora et obtusa, medii caulis lanceolata acuta, in petiolum brevissime attenuata, serraturae utrinsecus 5-9 acuminatae acutae glabra, margine setoso-scabrida, 2-pollicaria vel longiora, petiolo 1½-lineari, 10 lin. lata, superiora minora acutiora scabra. Flores sub anthesi erecti, fructus nutantes. Pedunculus 1½-2, pedicelli 3-5 lin. longi. Bracteolae setaceae minutae. Corolla glabra calyce ter longior. Drupa turbinato-obcordata calyce vestita. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

2. C. CHAMAEDRYFOLIA Chamisso l. c. 365. † — Foliis ex ovato-ellipticis profunde serratis, serraturis ellipticis, cuneata basi integerrimis; racemis paucifloris erectis, folio duplo pluriesve longioribus; floribus breviter pedicellatis; dentibus calycinis ellipticis subcuspidato-acuminatis. ♃? — Caules simplices vel ramosi semipedales, internodiis ½-1½-pollicaribus. Folia infima squamaeformia, inferiora minora rotundiora, superiora patula subsessilia, supra nitida, infra opaca reticulato-venosa, antrorsum serrata, serraturis mucronulatis, maxima sesquipollicaria, 8 lin. lata. Racemi axillares oppositi subtripollicares saepe triflori, floribus sub fructus grossificatione saepe remotis. Pedicellus calyce brevior sesquilinearis. Calyx tubulosus 3 lin. longus. Corolla tubulosa calyce ter longior. Drupa matura desideratur. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

3. C. SERRATA Nees et Mart. Nov. act. acad. Caes. Leop. Carol. XI. I. 75. † t. 6. fig. A. — Caule fruticuloso ramoso; foliis oblongo-ellipticis, basi in petiolum attenuatis grosse serratis; racemis axillaribus oppositis paucifloris folio brevioribus; calycis dentibus subtriangularibus. ♄ — Fruticulus pedalis patule ramosus. Caulis teretiusculus, cortice glabro albido indutus, rami geniculati tetragoni, praesertim apice pubescenti-strigosi. Internodia brevia, 3-9 lin. longa. Folia basi in petiolum brevissimum attenuata 1-1½-2-pollicaria, 6-9 lin. lata grosse serrata, apice basique integra, supra glabra, subtus margineque scabra. Racemi 3-5-flori, pedicelli vix linea longiores bractea subulata suffulti. Corolla alba, fauce purpurascente. Drupa magnitudine Pisi turbinata calyce tecta reticulata pendula. — Crescit in Brasilia.

4. C. INTEGRIFOLIA Nees et Mart. l. c. 76. † t. 6. fig. B. — Caule subsimplici; foliis oblongo-lanceolatis integerrimis, basi in petiolum attenuatis; racemis axillaribus folio brevioribus. ♄ — A praecedente, cui habitu simillima est, differt caule saepe octangulari simplicissimo, rarius ramoso, basi plerumque aphyllo, foliis, praesertim summis longioribus (4-6 poll. longis, 12-15 lin. latis) integerrimis laeviusculis, petiolis longioribus, bracteis linearibus persistentibus, corollis paullo majoribus, laciniis latioribus. Pedunculi inferiores abortientes florum rudimentis dentati ad modum cirrhi brevissimi e foliorum axillis egrediuntur. — Crescit in Brasiliae sylvis densis.

† E genere expellendae.

C. DAVURICA Dumort. = LITHOSPERMUM DAVURICUM.
C. DENTICULATA Dumort. = LITHOSPERMUM DENTICULATUM.
C. BRACTEATA Dumort. = LITHOSPERMUM PALLASII.
C. GRACILIS Dumort. = PULMONARIA GRACILIS.
C. LANCEOLATA Dumort. = LITHOSPERMUM MARGINATUM.
C. MARITIMA Dumort. = STEENHAMMERA MARITIMA.
C. PANICULATA Dumort. = PULMONARIA PANICULATA.
C. PARVIFLORA Dumort. = STEENHAMMERA MARITIMA.
C. SIBIRICA Dumort. = PULMONARIA SIBIRICA.
C. SIMPLICISSIMA Dumort. = PULMONARIA SIMPLICISSIMA.
C. VILLOSULA Dumort. = PULMONARIA VILLOSULA.
C. VIRGINICA Dumort. = PULMONARIA VIRGINICA.

XV. (3684. excl. sect. a.) **ALOYSIA** *Ortega.*
(Ortega, Decad. plant. ex Pers. Enchirid. I. 129.)

1. A. (LIPPIA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pl. II. 260. — ZAPANIA Lam. Illustr. gener. I. 59.) CITRIODORA Ortega ex Pers. Enchirid. I. 139. — Caule fruticoso erecto ramoso; foliis ternis subsessilibus lanceolatis, utrinque acutis integerrimis vel hinc inde denticulo uno alterove instructis, supra scabrellis, infra glaberrimis; floribus in paniculam terminalem pyramidatam dispositis. ♄ — Frutex elegans aromaticus pluripedalis, glaberrimus. Rami virgati subsimplices glabri, teretiusculi. Internodia ½–1–pollicaria, folia inferiora saepe breviora obtusiora, media maxima, suprema acutiora angustioraque, latitudine et longitudine valde variantia, 1–3–pollicaria, 5–9 lin. lata vel angustiora, petioli brevissimi vix sesquilineares. Racemuli pauciflori verticillati in paniculam terminalem pyramidatam dispositi, panicula 2–3–pollicaris. Bracteae orbiculari–acuminatae calyce triplo breviores puberulae, calyx tubulosus puberulus, demum hinc fissus. Corollae calyce longioris limbus bilabiatim 5–lobus, laciniis 3 inferioribus parum majoribus. Staminum longiorum antherae semper semiexsertae. — *Verbena triphylla* Hérit. Stirp. I. 21. t. 11. — Crescit in Bonaria et in Chili. (v. s. c. et sp.)
2. A. (LIPPIA H. B. Kth. l. c.) SCORODONIOIDES Chamisso, Linnaea VII. 234. — Caule suffruticoso erecto; foliis oppositis ovatis obtusis, basi acutis crenatis, supra scabris, subtus tomentoso–hirtis; spicis axillaribus solitariis; floribus subverticillatis. ♃ — Ramosissima, rami oppositi quadrangulares canescenti–hirtelli. Folia petiolata reticulato–venosa, supra viridia subrugosa et scabra, subtus tomentoso–hirta et incana, 12–22 lin. longa, 9–14 lin. lata, petioli 4–6 lin. longi, hirti subcanaliculati. Spicae pedunculatae 3–pollicares vel longiores, pedunculo 9–12 lin. longo cum rhachi pubescenti–hirto. Flores pedicellati suaveolentes. Bracteae lineares hirtellae calycem vix aequantes. Calyx subaequaliter 4–dentatus, dentibus subulatis. Corolla albido–rosea extus hirtella, fauce pilosa. — Crescit locis aridis ad Mira Quitensium.
3. A. (LIPPIA Steudel, Nomencl. bot. [edit. 2.] II. 54.) CHAMAEDRYFOLIA Chamisso l. c.*) — Foliis oppositis brevissime petiolatis ovatis suborbiculatisve grosse profundeque serratis, suprascabris, subtus adpresse canescenti–tomentosis; spicis axillaribus solitariis oppositis sparsisque in apice ramorum. ♄ — Frutex elegans 4–5–pedalis opposite vel sparse ramosus. Ramuli tetragoni pallide cinnamomei breviter et subretrorsum hirtelli, internodiis semipollicaribus vel etiam sesquipollicaribus. Folia subsessilia rigida obtusiuscula reticulato–venosa, serraturis utrinsecus 4–5, supra scabra albo–punctulata, infra tenuissime pubescenti–tomentella, ovata pollicaria, 9 lin. lata vel suborbiculata semipollicaria, petiolo 1½–½ lin. longo. Spicae laxae 3–5–pollicares. Flores dilute coerulei pseudo–oppositi vel verticillati terni senique, bracteolae lanceolatae acutae hirtae, calyce breviores. Corolla infundibuliformi–tubulosa oblique 4–fida, laciniis rotundatis, supera emarginata. Drupa obcordata bisulca calyce tecta. — Crescit in Brasilia meridionali (v. s. c. et sp.)
4. A. (LIPPIA Steud. l. c.) POLYGALAEFOLIA Cham. l. c. 236. † — Foliis ovatis breviter acuminatis acutis integerrimis, supra scabris, subtus glabris, nervo piloso, sessilibus ternis laxe imbricatis; spicis pseudoterminalibus axillaribusque solitariis rectis cano–villosis. ♄ — Rami obsolete hexagoni, annotini aphylli cicatrisati, hornotini pilosi striati. Folia obscure sexfaria pseudoverticillata terna laxe imbricata, inferiora majora 7 lin. longa, 4 lin. lata, basi saepe auriculato–subcordata, supra albo–punctulata acutissima, margine reflexa. Spicae sparsae cum pedunculo pollicari saepe quadripollicares. Rhachis et ramuli pilosi. Flores

---

*) *Eadem esse videtur: VERBENA DENTATA Visiani, l'Orto bot. di Padova* 150. — *Fruticosa erecta pubescens scaberrima: foliis ovato–ellipticis grosse serratis rugulosis nervosis coriaceis rigidis; spicis axillaribus oppositis filiformibus rectis cano–lanuginosis; corolla aequaliter subrotundo–quadriloba, fauce villosa, tetrandra.* ♄ — *Crescit......?*

verticillati terni pluresque, vel saepe alterni, majusculi. Bracteae lanceolatae acutae calycem aequantes, nonnunquam steriles. Corolla coerulea? tubuloso-infundibuliformis, limbo oblique quadripartito, laciniis rotundatis, superiore obcordata. — Crescit in Brasilia.

5. A. (LIPPIA Steudel l. c.) LYCIOIDES Chamisso l. c. 237. † — Ramis brachiatis lentis, ramulis subspinescentibus; foliis oppositis oblongo-ellipticis lanceolatisve in petiolum attenuatis integerrimis obsolete serratisve, supra scabris, subtus lutescenti-canescentibus opacis; spicis nutantibus paniculatis terminalibus axillaribusque solitariis geminatisve; panicula foliosa. ♄ — Internodia adulta subpollicaria vel raro sesquipollicaria, novelli puberuli tetragoni, adulti teretes pallidi. Folia apice saepius obtusa margineque integerrima, 20 lin. longa, 8 lin. lata, vel in speciminibus macrioribus semipollicaria, 2 lin. lata, supra minutissime calloso-pilosula, infra glabra. Spicae re vera terminales axillaresque pedunculatae et subsessiles, 2–4-pollicares. Rhachis canescenti-pubescens. Flores pseudoverticillati ramosi. Bracteae ovatae acutae deciduae calyce breviores. Corolla infundibuliformi-tubulosa, limbo obliquo 4-fido, laciniis ellipticis, altera emarginata. — *Verbena alpigena* Wlprs. Nov. act. acad. caesar. Leopold. Carol. nat. cur. XIX. Suppl. I. p. 378. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

6. A. (LIPPIA Steudel l. c.) URTICOIDES Chamisso l. c. 238. † — Foliis oppositis membranaceis breviter petiolatis ex ovato lanceolatis subduplicato-serratis, supra scabris, subtus subtomentoso-pubescentibus; spicis axillaribus tergeminis solitariisque laxis nutantibus ad basin ramulorum. ♄ — Ramuli tetragoni hirtello-pubescentes, adulti teretes calvescentes, internodia sesquipollicaria. Folia basi cuneata integerrimaque grossiuscule subduplicato-serrata, supra antrorsum piloso-aspera, subtus subtomentoso-canescentia, reticulato-venosa, 2–3-pollicaria, 9–16 lin. lata. Spicae graciles nutantes pendulaeque 4–6-pollicares, axillares trigeminae. Rhachis pubescens, nunc a basi florigera, nunc infra denudata. Flores oppositi et pseudo-verticillati. Bracteae filiformes vix calycem aequantes. Corolla et caetera congenerum. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

7. A. (VERBENA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 20. t. 32. fig. b. — ZAPANIA Poir. Encycl. méth. — PRIVA Spr. Syst. veget. II. 753.) VIRGATA Chamisso l. c. 234. — Caule erecto fruticoso ramosissimo; ramis virgatis obsolete tetragonis; foliis petiolatis ovatis acutis crenatis, supra retrorsum scabris, infra pubescentibus rugosis; spicis ternis axillaribus terminalibusque ternatis; floribus verticillatis bracteatis; calyce villoso semibifido, laciniis bidentatis; corollae hypocraterimorphae limbo bilabiatim quinquefido; fructibus dispermis ♄ — Planta fragrans biorgyalis. Folia brevissime petiolata 2-2½-pollicaria, 12–15 lin. lata acuminata crenata. Spicae numerosissimae folio duplo triplove longiores. Flores 3–6-ni verticillati, bracteis minutis lanceolatis suffulti. Calycis dentes subulati. Corolla alba, labio superiore obcordato, inferioris trilobi laciniis obcordatis. Stamina didynama, antheris fertilibus. Semina duo calyce immutato inclusa convexa, intus plana, ovato-oblonga. — Crescit in Peruviae nemoribus Pozuzo.

8. A. (LIPPIA Martius, Flora [B. Z.] Beibl. II. 59.) ATTENUATA Wlprs. — Caule tetragono suffruticoso, strigilloso; foliis late lanceolatis vel oblongis in petiolos cuneato-attenuatis, antice serratis, postice integerrimis, supra hirsuto-asperis, subtus villoso-tomentosis subincanis; spicis cylindricis in pedunculis alaribus, vel terminalibus dichotomo-paniculatis; bracteis obovato-rhombeis acutis, dorso hirsuto-incanis. ♃ — Crescit prope Cubajam Brasiliae.

XVI. (3684. excl. sect. b.) LIPPIA *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 781. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 290. II. 199.)

Sectio I. ZAPANIA Juss. Ann. du Mus. d'hist. nat. VII. 75.

Calyx compressus, demum bifidus, laciniis carinatis non alatis.

§. 1. *Subacaules herbaceae.*

1. L. VALERIANOIDES Wlprs. Nov. act. acad. Caes. Leop. Carol. nat. cur. XIX. Suppl. I. 377. — Glaberrima acaulis: foliis radicalibus cuneato-obovatis obtusis,

basi attenuatis; scapo simplicissimo pumilo in medio diphyllo, foliis sessilibus similibus; floribus capitatis bracteatis; bracteis ovatis obtusis, corolla paullo longioribus. ♃? — Plantula pollicaris vel sesquipollicaris. Folia semipollicaria 3 lin. lata crassiuscula integerrima. Scapus supra medium diphyllus. Capitulum terminale suborbiculare, magnitudine Cerasi minoris. Bracteae ovatae integerrimae. Corolla rosea? — Habitu non dissimilis est *Valerianis* quibusdam. — Crescit in Peruvia, in planitie circa Tissalomam.

2. L. LANATA Wlprs. mss. — Densissime albo-lanata subacaulis: foliis rosulatis oppositis cuneatis, basi attenuatis, apice obsolete tridentatis obtusis; pedunculis axillaribus foliorum longitudine solitariis monocephalis; spicis subpyramidato-globosis; bracteis densissime lanatis obcordatis, inferioribus involucrantibus flore longioribus, superioribus brevioribus, omnibus acuminulatis. ♃ — Herba subacaulis, e rhizomate lignescente multicipite caespitosa undique lana alba densissime obsita, habitu *Plantagineo*. Folia crassiuscula 1–1½-pollicaria, 5–6 lin. lata, internodiis brevissimis 1–1½ lin. longis. Pedunculi tetragoni filiformes albolanati, vix folio longiores. Capitula 3–4 lin. longa, pyramidato-globosa. Corolla carnea? quam bracteae inferiores brevior tubuloso-hypocraterimorpha glaberrima, fauce villosula, limbo 4-fido, lacinia una longiori subemarginata. Drupa calyce membranaceo villosulo cincta obcordato-globosa subcompressa, styli basi persistente apiculata fusca lanuginosa bilocularis, loculis monospermis. — Crescit in summis Andibus Mexicanis. (v. s. sp.)

§. 2. *Fruticosae vel suffruticosae caulescentes.*

A. Capitulis axillaribus solitariis.

3. L. AMERICANA Linn. Spec. plant. 833. — Bnks. Reliq. Houst. t. 12. — Fruticosa ramosa: ramis ad genicula compressis; foliis lanceolato-ovatis supra medium serratis scabris petiolatis; pedunculis axillaribus brevissimis monocephalis; capitulis multifloris tetragonis ovatis (magnitudine *Pisi*). ♄ — *Dalea Lippiastrum* Grtnr. De fructib. I. 235. t. 51. fig. 2.*) — Crescit in Vera Cruce.

4. L. PURPUREA Jacq. Eclog. plant. I. 126. t. 85. — Caule suffruticoso tetragono; ramulis novellis dense albo-pilosis; foliis late ovatis acuminatis, basi in petiolum angustatis, membranaceis, supra sparse pilosis, infra, praecipue ad nervos venasque hirtis, remote acuteque serratis; pedunculis in axillis foliorum superiorum, folio longioribus; capitulis hemisphaericis; bracteis exterioribus ovatis acuminatis late involucrantibus, corolla longioribus; corollae tubulosae extus puberulae limbo obliquo, lacinia infima valde protracta ovata, lateralibus et superiori brevissimis subreflexis. ♄ — Caulis quadripedalis obtuse tetragonus, supra albohirsutus. Folia quadripollicaria, 2 poll. lata et minora, bullato-convexa acuminata, petiolus semipollicaris. Pedunculi 4–6-pollicares. Bracteae cordato-ovatae acuminatae integerrimae, extimae maximae. Calyx hyalinus truncatus obsolete denticulatus. Corolla purpurascens puberula, fauce villosa, labium superius obcordatum breve, labio inferiore trilobo porrecto, lacinia media maxima crenulata oblonga, lateralibus rotundatis reflexis. Capitulum fructiferum elongatum, drupa ovata calyce tecta bilocularis, loculis monospermis. — Habitu valde accedit ad *Lantanas*, sed certe *Lippia* est. — *Lantana achyranthifolia* Dsfont. Catal. hort. Paris. (edit. 3.) 392. — Crescit in America boreali. (v. s. cult.)

5. L. HEMISPHAERICA Jcq. Americ. 176. t. 179. fig. 100. — Fruticosa ramosa: foliis oblongis acuminatis integerrimis; capitulis conico-hemisphaericis pedunculatis axillaribus solitariis. ♄ — Frutex 10-pedalis aromaticus, rami teretes, ramuli quadrangulares. Folia ex ovali-lanceolata, utrinque acuminata, supra glabriuscula, subtus glabra. Pedunculi petiolo breviores. Bracteae rhomboideo-cordatae acuminatae. Corolla alba. — In sylvaticis ad Carthagenam in America australi.

6. L. (VERBENA Thnbrg. Flor. Capens. 447.) CAPENSIS Spr. Syst. vegetab. II. 751. no. 4. — Fruticosa ramosa: foliis petiolatis ovato-oblongis crenatis, supra scabris,

*) *Hoc synonymum secundum cl.* Choisy *ad* Microdontem ovatum *pertinet, cf. Mém de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II.* 2. *p.* 98.

subtus tomentosis; capitulis axillaribus breviter pedunculatis oblongis hirsutis. ♄ — Caulis quadripedalis. Rami leviter villosi. Folia petiolata, utrinque attenuata parum acuta, supra viridia scabriuscula, subtus tomentosa, nervis magis villosis, patentia pollicaria. Axillae foliis minoribus onustae. Pedunculi solitarii filiformes hirsuti, folio paullo breviores. — Crescit in Promontorio bonae spei.

7. L. ANGUSTIFOLIA Cham. Linnaea VII. 377. † — Fruticosa strigosa scabra: ramis obsolete angulatis bisulcatis striatis teretiusculis, sursum attenuatis, internodiis elongatis; foliis decrescentibus sessilibus erectis lanceolatis acutis integerrimis et paucidentatis; pedunculis in apice ramorum axillaribus solitariis oppositis folia superantibus; capitulis globosis; bracteis corollas subaequantibus undique imbricatis; calycibus inconspicuis. ♄ — Fruticulus habitu *Cynanchi*, rami subradicales tripedales simplicissimi. Folia lineari-lanceolata quadripollicaria angusta, internodia superiora ad 7 poll. elongata, foliis decrescentibus. Rami in caulium parte superiori. Folia rarius 2½ poll. longiora, rarius semipollice latiora, vetustate nonnumquam albo-punctata. Paria spicarum 3–5 evoluta, infimis fructiferis, summis nondum evolutis confluentibus. Pedunculi subpollicares foliis brevioribus suffulti erecti filiformes, rhachide subclavata. Capitulum quam praecedentis paullo minus, bracteolae latius ovatae ellipticaeve acuminulato-mucronatae. Calyx vix ullus tenuiter membranaceus pubescens. Corolla extus pubescens, intus ad faucem villosula, limbo inaequaliter 4-fido. Drupa subglobosa nigra seu brunnea. — Crescit in Brasilia.

8. L. INTERMEDIA Cham. l. c. 378. † — Fruticosa: ramis teretiusculis e toto foliosis, inferne hirtis, pilis rigidis longis patentibus albis, sursum strigosis simulque glanduloso-pubescentibus; foliis subsessilibus ex ovato ellipticis oblongisque acutis integerrimis et obsolete serrulatis scabris, inferioribus majoribus ramisque hirtis, sursum decrescentibus, superioribus parvis integerrimis a basi attenuatis strigosis simulque glanduloso-pubescentibus; pedunculis in apice ramorum axillaribus solitariis oppositis folia superantibus; capitulis ovoideis; bracteis corollas superantibus; calycibus hirsutis. ♄ — A *L. hieracifolia* ramis inflorescentiam usque foliosis foliisque minoribus internodia subaequalia subaequantibus, a *L. angustifolia* hirsutie figuraque foliorum differt. Folia penninervia, demum supra et margine albo-punctata et aspera, infima breviora et obtusa, 2½ poll. longa, 10 lin. lata. Inflorescentia eximie strigosa et glanduloso-pubescens. Pedunculi sesquipollicares. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

9. L. MACROPHYLLA Cham. l. c. 213. † — Ramis obtuse tetragonis calvescentibus; foliis oppositis ovatis ellipticisve, integerrima acuminata basi in petiolum brevem decurrentibus, obsolete crenatis vel serratis, utrinque mollibus, supra pubescentibus, subtus subtomentosis; pedunculis subtomentosis folio dimidio brevioribus; capitulis ovoideis subtomentosis subvelutinis; bracteis ovato-acuminatis acutis imbricatis flore paullo brevioribus. ♄ — Folia 7–8-pollicaria, 3–3½ poll. lata, petiolo 3–4 lin. longo, acumine laminae in petiolum attenuatae 1–1½-pollicari, pergamentacea sunt et firmia reticulato-venosa, infra ad nervos venasque prominulas hirtella. Capitula subterminalia duo gemmam apicalem constituunt. Pedunculi 2–2½-pollicares, capitula elongata fructifera 1–1½-pollicaria. Corollae tubus rectus subventricosus 4 lin. longus. Bacca ante maturitatem globosa diametro 1–1½ lin. — *Sarcolippia* Chamisso. — In Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

10. L. CITRATA Willd. Herb. 11611. ex Chamisso, Linnaea VII. 214. — Ramis obsolete tetragonis hirtellis scabris; foliis ovatis acutis serratis, basi in petiolum brevem attenuatis triplinerviis, supra hirtellis pilosulisve rigidulis, subtus adpresse subtomentosis mollibus; pedunculis solitariis petiolo vix longioribus; capitulis subglobosis ovoideisque villosulis; bracteis ovatis acuminatis acutis ciliatis, undique dense imbricatis, longitudine tubi corollini. ♄ — Differt a *L. asperifolia* foliis supra minime strigoso-scaberrimis at juniori aetate sicut subtus mollibus, vetustate tandem scabridis. Folia 2–3–4-pollicaria, latitudine plus bipollicari, petiolo semipollicari. — *L. asperifolia* Poepp. Plant. Cub. — *Lantana odorata*

Weigelt mss. — *Lantana cuneatifolia* Kltzsch.?? ubi?? — Crescit in insula Cuba, in Surinam et in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

11. L. TRIPLINERVIS Gardn. in Hook. Lond. journ. of bot. 1845. p. 133. — Fruticosa erecta ramosa: ramis piloso-pubescentibus; foliis confertis oppositis brevissime petiolatis ellipticis obtusis, basi subcrenatis triplinerviis, supra medium crenato-serratis, utrinque adpresse pilosiusculis, subtus punctatis; pedunculis axillaribus solitariis folia subaequantibus; capitulis hemisphaericis laxis paucifloris; bracteis ovatis obtusis pilosis, tubo corollae brevioribus. ♄ — Frutex bipedalis, rami fastigiati. Folia subpollicaria, 6 lin. lata. Flores rosei. Calyx subbilabiatim 5-dentatus. — Crescit in Brasiliae montibus dos Orgaos.

12. L. ASPERRIMA Cham. l. c. 215. † — Caule tetragono viscido hirtello; foliis subsessilibus oblongis, utrinque acutis grosse serratis subtriplinerviis penninerviisque in supera pagina subtusque in nervo et venis scaberrimis; pedunculis folio paullo brevioribus; capitulis globosis; bracteis involucrantibus ovato-acuminatis acutis longitudine florum. ♄ — Caulis e rhizomate lignoso ulnaris, basi lignescens, sursum herbaceus simplex vel ramosus, rami 1½-2½ poll. longi alterni vel oppositi, viscido-hirtelli obtuse tetragoni. Folia 3-pollicaria, 9 lin. lata, petiolo 1½ lin. longo, utrinque piloso-scaberrima, (pilis basi non callosis). Pedunculi axillares tenues internodia aequantes folio breviores bipollicares viscido-hirtelli, nulli desunt nodo a radice apicem usque, summorum capitula globosa 5 lin. diametro. Bracteae dorso margineque pilosae, inferiores involucrantes flore paullo longiores, interiores decrescentes lanceolatae. Calyx minutus demum bifidus in squamulas solutus. Corolla clavato-tubulosa, limbo parvulo, extus pubescens, fauce villosula. Fructus desideratur. — In Brasilia tropica. (v. s. sp.)

13. L. TURNERIFOLIA Cham. l. c. 217. † — Caule erecto simplici teretiusculo hirsuto et canescente; foliis elliptico-lanceolatis oblongis obovatisque acutis serratis integerrima cuneata basi in petiolum brevem attenuatis penninerviis sublineatis, supera facie pilis brevibus antrorsis, demum basi callosis scabra et aspera, infera in nervo et venis pilis longioribus patentioribus pariter callosis hirsuta et aspera; pedunculis filiformibus erectis hirsutis; capitulis globosis; bracteis hirsutis involucrantibus sub anthesi ovato-lanceolatis acutis longitudine florum, sub fructificatione dilatatis concavis, dorso gibbis imbricatis fructum foventibus. ♄ — Rhizoma lignosum repens. Caules annotini palmares vel spithamaei rigidi pilosi, basi calvescentes calloso-asperi, internodia inferiora longiora. Folia illis *Turnerae ulmifoliae* similia, maxima 2¼ poll. longa, 8 lin. lata, petiolo 3 lin. longo. Pedunculi saepe folio breviores, saepe folio ipsoque caule longiores. Capitula bracteis involucrata, interioribus brevioribus angustioribusque, fructifera subfragiformia imbricata. Calyx minimus demum bifidus. Corolla clavato-tubulosa, limbo inaequaliter quadrifido, tubo 1½-2 lin. longo, extus pubescente, sursum in fauce villosulo. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

14. L. PUMILA Cham. l. c. 218. † — Viscido-pubens et pilis mollioribus antrorsis patulisque villosulo-hirtella: caulibus hornotinis teretiusculis erectis simplicibus; foliis oppositis (rarissime ternis) sessilibus ovatis ellipticisque antrorsum rariter serratis nervoso-venosis; pedunculis filiformibus erectis folio duplo longioribus; capitulis globosis; bracteis involucrantibus lanceolatis longitudine florum. ♃ — Caules spithamaei inferne calvescentes. Nodi infimi aphylli steriles, internodiis sesquipollicaribus, supremis brevissimis. Folia maxima 9 lin. longa, 5 lin. lata, antica parte serraturis utrinsecus 2-4 incisa vel subintegerrima, subtus in nervis longiuscule pilosa. Pedunculi 1-1½-pollicares longioresque non incrassati, raro foliis instructi in ramos abeunt. Capitula diametro circiter 5 linearum. Bracteae lanceolatae trinerves, exteriores involucrantes breviores. Corollae tubus clavatus, fauce villosula inflata, limbo majusculo obliquo, laciniis valde inaequalibus. Fructus desideratur. — Crescit in Brasilia.

15. L. CORYMBOSA Cham. l. c. 219. † — Fruticosa erecta ramosa dense foliosa hirsuta: foliis verticillatis ternis sessilibus ovatis acutis crenatis rugosis, marginibus revolutis; capitulis ovoideis breviter pedunculatis folia superantibus apices

corymboso-ramosas ornantibus; bracteis lanceolatis acutiusculis laxo imbricatis corollas subaequantibus. ♄ — Fruticulus pedalis, rami calvescentes, epidermide longitudinaliter rumpente tecti, sursum brunnei, pilis pallescentibus hirsutissimi, valde foliosi, internodiis subtrilinearibus, corymboso-ramosi. Folia supra hirsuta, subtus mollia, 8 lin. longa, 5 lin. lata, suprema subcanescentia. Pedunculi solitarii vel supremi verticillato-terni 3 lin. longi longioresque. Axis capituli subsemipollicaris. Bracteae 3–4 lin. longae trinerviae. Calyx tubulosus incano-hirsutus. Corolla extus hirsuta, intus ad faucem villosula, tubo curvulo 2 lin. longo, limbi quadrifidi lacinia dorsali subbifida. — Crescit in Brasilia.

16. L. HERMANNIOIDES Cham. l. c. † — Fruticulosa erecta ramosissima, pilis glandulosis brevibus subhirsuta: ramis teretiusculis brunneis rimosis; foliis subsessilibus cuneato-obovatis subrotundisque subretusis, antrorsum paucidentatis paucicrenatisve rugosis, marginibus reflexis, venis utrinsecus subternis; capitulis spiculiformibus paucifloris, breviter pedunculatis folia subaequantibus; bracteis ellipticis, utrinque acutis corollas subaequantibus. ♄ — Haec maxime affinis est sequenti speciei. Internodia raro semipollice longiora, folia cum petiolo 8 lin. longa, 5½ lin. lata, utrinsecus tridentata, margine revoluta, unde crenata diceres, infra molliter pilosa. Capitulum lanceolato-spiculiforme folio modo longius, modo brevius, defloratum nutans, pedunculus ad summum bilinearis. Bracteae membranaceae nervoso-reticulatae, exteriores majores 4 lin. longae. Calyx lineam longus bidentatus ciliatus. Corollae tubus 3 lin. longus pubescens, fauce villosula Drupae loculum alterum saepe abortivum. — Crescit in Brasilia.

17. L. MICROCEPHALA Cham. l. c. 220. † — Fruticosa erecta ramosissima: ramis teretiusculis scabrido-hirtellis brunneis rimosis; foliis subsessilibus ellipticis obovatisque, basi cuneato-acutis, antrorsum paucidentatis, margine reflexo, nudiusculis, supra scabridis, subtus in costa et venis utrinsecus subternis scabrido-hirtellis; capitulis paucifloris breviter pedunculatis folia subaequantibus; bracteis oblongis obtusiusculis substrigoso-hirtellis et ciliolatis corollas subaequantibus. ♄ — Habitus prorsus praecedentis. Folia basi minus cuneata, magis elliptica et acuminata, dentibus acutioribus utrinsecus 1–3, cum petiolo 7½ lin. longa, 4½ lin. lata. Capitula 3–4-flora, bracteis collateralibus patentibus. Bracteae 3–4 lin. longae. Calyx membranaceus hirtellus irregulariter 2–4-fidus. Corolla clavata 2½ lin. longa, limbo bilineari, extus pubescens, ad faucem villosula. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

18. L. LUPULINA Cham. l. c. 222. † — Fruticosa, pilis glandulosis subtomentoso-pubescens: foliis distantibus breviter petiolatis ovatis, nunc late ovatis cordatis, nunc anguste ovatis, basi acutis obtuse serratis; pedunculis axillaribus pseudoterminalibusque folia subaequantibus erectis; capitulis floridis ovoideis; bracteis petaloideis. ♄ — Affinis praecedenti. Pedalis vel sesquipedalis. Caules simplices vel ramosi, internodiis 1½–4-pollicaribus. Valde variat foliorum figura et amplitudine, longitudine pedunculorum, pube et villositate. Folia in aliis speciminibus cordata, 2 poll. 9 lin. longa, 2 poll. 4 lin. lata, petiolo 4-lineari, in aliis ovata tenuius et acutius serrata sesquipollicaria, 9 lin. lata, petiolo sesquilineari, nec desunt formae intermediae. Pedunculi 1–2-pollicares. Capitulum junius globosum ceraso minus, mox bracteis erectis ovatum pollice longius. Bracteae tenuiter membranaceae reticulato-venosae molliter pilosae, ovatae acuminulatae, 8 lin. longae, 5 lin. latae. Calyx densissime albo-pilosus. Corolla extus villoso-pubescens 3–4 lin. longa. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

19. L. FLORIDA Cham. l. c. 221. † — Fruticosa, pilis glandulosis subtomentoso-pubescens: ramis erectis obsolete angulosis crebre nodosis; foliis subimbricatis oppositis verticillatisque ternis sessilibus cuneato-obovatis obtusis acutiusculisque crenulatis subrugoso-reticulato-venosis; pedunculis axillaribus pseudoterminalibus folia longe superantibus; capitulis floridis semiglobosis nutantibus; bracteis petaloidibus maximis. ♄ — Rami sesquipedales erecti, pedunculis annotinis superstitibus obsiti, internodia rarius ½- rarissimo 1-pollicaria. Folia utrinque

mollia penninervia, inferiora subpollicaria 5 lin. lata, superiora minora. Pedunculi pauci 1½–2–pollicares in summis nodis. Bracteae tenuiter membranaceae trinerviae reticulato–venosae, utrinque glanduloso–pilosae, extimae minores firmiores densius pilosae obtusissimae, interiores late ovatae acutae, nec tamen acuminatae, maximae pollicem excedunt longitudine, 9 lin. latae. Calyx parvus villosus. Corolla extus glanduloso–pubescens, intus ad faucem villosula, tubo 3 lin. longo curvato, limbo parvo. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

20. L. ASPERIFOLIA Rich. Cat. hort. med. Paris. 67. — H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 265. — Caule suffruticoso; foliis ovato–lanceolatis obtusis vel acutiusculis subsessilibus, supra adpresse strigoso–scaberrimis, subtus adpresse pilosis; pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus; capitulis cylindraceo-oblongis; bracteis suborbiculato–ovatis acutis corolla vix brevioribus. ♃ — Caulis erectus ramosus, rami virgati asperi strigillosi. Folia in petiolum attenuata subsessilia sesquipollicaria, semipollicem lata, supra subrugosa scaberrima, infra eximie reticulato–venosa adpresse piloso–hispida, tenuissime crenulata. Pedunculi axillares pollicares striguloso–canescentes, capitulum fere semipollicare. Bracteae orbiculares acutae subcanescenti–pubescentes, margine eximie ciliatae dense imbricatae corolla vix breviores. Calyx brevissimus sericeo–canescens bifidus. Corollae extus fauceque pubescentis albidae tubus bractearum longitudine, labii inferioris lacinia media productiori maxima. Drupa sicca laevis fusca orbiculari–subcompressa calyce inclusa stylique basi umbilicata. — Planta culta horti Göttingensis differt foliis ternatis paullo longioribus, pedunculis axillaribus solitariis, binis ternisve 9 lin. longis monocephalis, capitulis brevioribus. Reliquae omnes notae congruunt. — *Zapania lantanoides* Lam. Illustr. gener. I. 58. — *Zapania odorata* Pers. Enchir. II. 140. — *Zapania odoratissima* Scop. — *Verbena globulifera* Hérit. Stirp. I. 23. t. 12. — *Verbena globiflora* Willd. Spec. plant. I. 116. — *Nepeta maxima flore albo, spica habiliori* Sloane, Jamaic. I. 173. t. 108. fig. 1. — Crescit prope Cumana et Bordones, in insula Cuba ad margines Lagunarum. (v. s. sp. et c.)

21. L. (VERBENA Linn. ex Willd. Spec. plant. I. 116. — ZAPANIA Juss. ex Pers. Enchirid. II. 140.) STOECHADIFOLIA H. B. Kth. l. c. 265. — Caule fruticoso; foliis lanceolato–linearibus serrato–plicatis, utrinque strigosis; pedunculis axillaribus solitariis folio longioribus; capitulis globoso–ovatis; bracteis late ovatis acuminatis. ♄ — *Sherardia nodiflora Stoechadis serratifolii folio* Vaill. Sex. 49. — *Verbena suffruticosa reclinata foliis angustis serrato–dentatis, pedunculis longis solitariis, floribus conglobatis* P. Br. Jamaic. 116. t. 3. fig. 2. — *Lavandula foliis crenatis latioribus Americana frutescens* Pluken. Icon. t. 162. fig. 2. — *Zapania reclinata* Lam. Illustr. I. 58. — *Verbena suffruticosa* Aublet, Plant. de la Guian. I. 16? — In humidis insulae Jamaicae, Cubae et in Gallia meridionali.

22. L. QUERETARENSIS H. B. Kth. l. c. 264. † — Caule herbaceo procumbente; ramis tetragonis adpresse strigosis; foliis petiolatis oblongis acutis serratis adpresse pilosis; pedunculis axillaribus monocephalis folio ultra duplo longioribus; capitulis oblongo–cylindraceis; bracteis obovato–cuneatis acuminatis coloratis. ♃ — Caulis 4–6–pollicaris. Folia basi in petiolum angustata rigidula subpollicaria, petioli 2–3 lin. longi. Pedunculi bipollicares. Bracteae strigoso–pilosae, apice violaceae, flore breviores. Calycis laciniae apice bifidae, dorso pilosae. Corollae glabrae albae tubus calyce vix longior. Fructus ovatus compressiusculus laevis fuscus. — *Verbena scabra* Mhlnbrg. in Willd. Herb.?? — Crescit in humidis Novae Hispaniae prope Queretaro.

23. L. BETULAEFOLIA H. B. Kth. l. c. † — Caule herbaceo procumbente diffuso radicante strigoso; foliis petiolatis deltoideo–ovatis acutis argute serratis piloso–strigosis; pedunculis axillaribus monocephalis folio duplo brevioribus; capitulis oblongo–cylindraceis; bracteis acuminato–subulatis florem superantibus. ♃ — Rami tetragoni. Folia basi in petiolum angustata parallele impresso–venosa pollicaria, 10 lin. lata. Petioli 3 lin. longi. Capitula 5 lin. longa, pedunculi 4–5 lin.

longi. Flores minuti densissimi. Bracteae subaristatae, apicem versus pilosae. Fructus minutissimus calyce tectus subrostratus glaber. — Species elegans Betulam parvam referens. — Crescit in sylvis Orinocensibus prope Atures et in ripa Apurensi juxta San Fernando.

24. L. FERRUGINEA H. B. Kth. l. c. 265. † — Fruticosa: ramis ramulisque angulatis scabrellis, floriferis abbreviatis; foliis ovato-oblongis crenatis, supra scabris, subtus pulverulento-ferrugineis; pedunculis axillaribus solitariis monocephalis folio brevioribus; capitulis subsexfloris; bracteis subrotundo-ovatis acutiusculis. ♄ — Planta aromatica. Folia obtusa, basi cuneata reticulato-venosa rigida, 6–9 lin. longa, 3–5 lin. lata, petioli 1–2 lin. longi canaliculati ferruginei. Pedunculus 1½ lin. longus fuscescens. Flores sessiles bracteati 2½ lin. longi. Bracteae arcte imbricatae subrotundo-ovatae acutiusculae tenuiter ferrugineo-pulveraceae, calyce duplo breviores. Calyx tubulosus 4-dentatus, incisuris alternis brevioribus. Corolla alba?, extus puberula, superne paullo ampliata, fauce glabra. Drupa minuta subrotundo-compressa styli basi umbilicata laevis fusca. — Crescit prope Guancabamba Peruvianorum.

25. L. LINEARIS H. B. Kth. l. c. 262. † — Suffruticosa erecta: ramis tetragonis glabris glaucescentibus; foliis linearibus integerrimis adpresse strigosis glaucescentibus sessilibus acutis; pedunculis axillaribus folio brevioribus monocephalis; bracteis ovato-oblongis acutis. ♃ — Planta subsemipedalis. Folia basi connata et angustata integerrima crassiuscula subpollicaria, 1½–2 lin. lata. Capitula ovata magnitudine Pisi minoris. Pedunculi 5 lin. longi adpresse strigosi. Flores minuti densi, bracteae extus pilosae iis breviores. Calycis laciniae dorso pilosae acutae. Corollae albae tubus calycis longitudine. Drupa obovata compressiuscula glabra in fundo calycis, magnitudine grani Papaveris. — Crescit in arenosis Novae Andalusiae prope Cumana.

26. L. CANESCENS H. B. Kth. l. c. 263. † — Caule suffruticoso humifuso ramosissimo; ramis junioribus strigoso-canescentibus; foliis petiolatis obovato-cuneatis, apicem versus argute serratis strigoso-sericeis canescentibus; pedunculis axillaribus folio longioribus monocephalis; capitulis oblongo-cylindraceis; bracteis obovatis acuminatis. ♃ — Rami tetragoni. Folia crassiuscula subavenia, adjecto petiolo 7–9 lin. longa, 3 lin. lata. Capitula 3–4 lin. longa. Pedunculi 6–8 lin. longi strigoso-sericei. Flores minuti albi. Bracteae extus strigoso-sericeae flore breviores. Drupa ovato-globosa glabra laevis calyce tecta. — *Verbena elliptica* Willd. Hb. 11117. et Wlprs. Nov. act. acad. Leop. XIX. Suppl. I. p. 377. — *Lippia (Verbena* Willd. Hb. 11122.) *sarmentosa* Spr. Syst. veget. II. 752. no. 14. — *Verbena lanata* Willd. Hb. 11120. — Crescit in India orientali?, in Peruvia ad urbem Limam, in Brasilia meridionali et alibi in America calida.

27. L. UNCINULIGERA Nees ab Esenb. mss. ex Wlprs. in Nov. act. acad. Caesar. Leop. Carol. XIX. Suppl. I. 377. — Caule suffruticuloso repente; foliis lanceolatis, basi attenuatis, apicem versus argute serrulatis subaveniis, utrinque capitulisque strigilloso-canescentibus; capitulis pedunculatis axillaribus solitariis folio longioribus ovatis; bracteis late ovatis cuspidatis. ♃ — A *L. canescente,* cujus forte est varietas, differt foliis angustioribus et capitulis minime oblongo-cylindraceis. Plantula pollicaris vel bipollicaris. Pedunculi in ramulis infra terminales singuli. Calycis carinae pilis uncinatis, subinde fere circinnatis ciliatae, unde nomen. — Crescit in Chili (Melipilla). (v. s. sp.)

28. L. (ZAPANIA Prsh. Flor. Amer. septentr. II. 417.) LANCEOLATA Michx. Flor. Bor. Americ. II. 15. — Caule herbaceo repente; foliis lineari-lanceolatis argute serratis; pedunculis axillaribus solitariis monocephalis elongatis; spicis capitato-conicis. ♃ — Herba laevis. Flores albi. — Crescit ad ripas rivulorum in Georgia et Carolina.

29. L. REPTANS H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pl. II. 263. † — Caule prostrato radicante glabro teretiusculo; ramis tetragonis sericeo-strigosis; foliis petiolatis obovato-cuneatis grosse et argute serratis strigoso-canescentibus; pedunculis

axillaribus solitariis monocephalis folium subaequantibus; capitulis cylindraceo-oblongis; bracteis obovato-cuneatis acuminatis. ♃ — Folia basin versus integerrima, parallelo venosa, cum petiolo 13–15 lin. longa, semipollicem lata. Petioli 3 lin. longi strigosi. Capitula 5 lin. longa, pedunculi tetragoni strigosi 9–12 lin. longi. Calycis laciniae dorso villosae. Corolla alba glabra, ad faucem flava. Drupa obovato-compressiuscula laevis magnitudine grani Sinapis. — Eadem esse dicitur ac *L. canescens.* — *Zapania suberosa* Spr. — Crescit locis siccis provinciae Cumanensis.

30. L. (VERBENA Linn. Spec. plant. 28. — BLAIRIA Grtnr. De fructib. et semin. plant. I. 266. t. 56. — ZAPANIA Lam Illustr. gen. I. t. 17. fig. 3.) NODIFLORA Rich. in Michx. Fl. Bor. Amer. II. 15. — Caulibus prostratis diffusis radicantibus (saepe) ramosissimis; foliis obovato-cuneatis obtusis, antice serratis, utrinque glabris vel adpresse pilosulis; capitulis axillaribus solitariis pedunculatis globosis, fructiferis cylindricis; pedunculis folio duplo, triplo quadruplove longioribus; bracteis cordatis flore brevioribus; drupis pallidis orbiculari-subcompressis calyce bidentato inclusis. ♃ — Herba polymorpha late divulgata, saepe tota glaberrima saepeque canescenti-pilosula. Caules e rhizomate saepe crassissimo lignoso prostrati ramosissimi nodosi, e nodis radicantes. Foliorum forma et magnitudo valde variabilis, reperiuntur enim cuneato-obovata, lanceolato-linearia, lanceolato-elliptica vel etiam ovato-lanceolata, antice paucidentata vel excepta basi cuneata remote serrata, a longitudine trium linearum ad tres pollices usque elongata, a latitudine semilineae ad novem linearum, crassiuscula enervia vel membranacea, praesertim subtus in nervis adpresse pilosula, pedunculi semipollicares vel tripollicares, capitula florifera subglobosa, 3 circiter lineas longa, fructifera cylindracea semipollicaria. Corolla parva alba, extus vix puberula, bracteae facie externa pilosulae suborbiculari-cordatae. — Burm. Fl. Indic. t. 6. fig. 1. — *Verbena nodiflora capite oblongo* Barrel. Icon. 855. — *Lippia* (*Zapania* Bertol. — *Verbena* Savi.) *repens* Spr. Syst. veget. II. 752. no. 13. — *Verbena capitata* M. Blanco, Flora de Filipinas 19? *) — Species habitu quidem diversissimo gaudens vix in varietates certe distinguendas secanda, sed formas hasce propono:

α. vulgaris: Caulibus procumbentibus radicantibus, foliis cuneato-obovatis obtusissimis, antice paucidentatis.

β. arenaria: Caule prostrato crassissimo radicante, foliis lineari-lanceolatis linearibusque integerrimis vel antice pauci-serratis canescentibus asperrimis.

γ. debilis: Caulibus ascendentibus subsimplicibus, internodiis bipollicaribus, foliis linearibus basi longe attenuatis, apice dilatatis pauci-dentatis; pedunculis paucis internodia semisuperantibus. — Folia ½–1-pollicaria, 2 lin. lata, pedunculi etiam longitudine duorum internodiorum.

δ. umbrosa: Caulibus erectis vel ascendentibus, internodiis 2–2½-pollicaribus, foliis late lanceolatis subacuminatis, excepta basi cuneata grosse serratis, utrinque aspero-strigulosis, ad 3 poll. elongatis, 9 lin. latis, pedunculis folio parum longioribus strictissimis. — Crescit in Italia inferiore, in Sicilia, in Africa boreali, in Aegypto, in Hispania australi, in Promontorio bonae spei, in Nova Hollandia, in Americae borealis civitatibus australioribus, a Mexico Brasiliam usque. (v. s. s. et v. c.)

31. L. DULCIS Trevir. Nov. act. acad. Caes. Leop. Carol. nat. cur. XIII. I. 187. † — Caulibus procumbentibus diffusis vix puberulis; foliis breviter petiolatis membranaceis ovatis acuminatis serrato-crenatis, supra setulis brevissimis (ex alba

---

* *Caule repente radicante stolonifero, obsolete tetragono breviter piloso; foliis oppositis decurrentibus amplexicaulibus obovatis, apice serratis parce pilosis; capitulis floriferis axillaribus longe pedunculatis conicis; flosculis squama suffultis; calyce compresso bifido; corolla infundibuliformi minima, limbo breviter quadrifido, lacinia una emarginata; staminibus tubo adnatis 4 didynamis brevissimis; stylo brevissimo; nuculis geminis calyce membranaceo inclusis. ♃ — Crescit in insulis Philippinis.*

callosa verrucula oriundis) adpressis scabris, infra tenuissime pubescenti-hirtellis; pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus monocephalis; capitulis sub anthesi globoso-conicis, fructiferis cylindraceis; bracteis orbicularibus acuminulatis membranaceis pilosis ciliatisque densissime imbricatis. ⊙ — Rami procumbentes pedales tenuissime sparseque pubescentes teretiusculi. Internodia 1–3-pollicaria, folia (adjecto petiolo 3–4 lin. longo) 1–2-pollicaria, 8–12 lin. lata, basi abrupte subcordata in petiolum attenuata membranacea. Pedunculi 1–1½-pollicares filiformes puberuli, capitulum subconico-globosum 3–4 lin. longum multiflorum, dense imbricatum, fructiferum 7–8 lin. longum cylindraceum. Bracteae cuneato-orbiculares obtusissimae abrupte acuminulatae, flore subbreviores, membranaceae pilosulae ciliatae. Corollae albidae limbus quadrifidus, lacinia una emarginata. Drupa minima calyce bidentato inclusa pallida orbiculari-compressa. — Herba sicca odorem gravem *Melissarum* spargit. — [*V. globiflora* Hérit. Stirp. nov. 23. t. 12? huc relata prorsus alia est species.] — *Lippia asperifolia* Rchb. mss. — Crescit in insula Cuba?? (v. s. cult.)

32. L. FILIFORMIS Schrader, Index semin. hort. Götting. 1834. — Caule herbaceo repente; foliis oblongo-obovatis, basi cuneatis, apicem versus serrulatis strigoso-pubescentibus; pedunculis axillaribus solitariis monocephalis, capitulis folia longe superantibus ovato-conoideis; bracteis cuneatis. ♃ — Herba bipedalis ad genicula longe radicans. — Crescit in Chili.

B. Capitulis axillaribus verticillatis.

33. L. (VERBENA Burm. Indic. 12. t. 6. fig. 2. — Willd. Spec. pl. I. 117. — ZAPANIA Poir.) JAVANICA Spr. l. c. no. 18. — Caule erecto fruticoso; foliis oblongis subcrenulatis; pedunculis axillaribus pluribus verticillatis monocephalis folia superantibus, inferioribus solitariis oppositis; capitulis cylindraceis; bracteis acutis. ♃ — Affinis *L. nodiflorae*, sed differt foliis lanceolato-oblongis subcrenulatis acuminatis, pedunculisque (ex icone et descriptione) apice caulis corymboso-ternis. — Crescit in insula Java.

34. L. BERTERII Spr. Syst. vegetab. II. 752. no. 21. — Caule erecto fruticoso; foliis ovatis crenatis, subtus villosis; capitulis pedunculatis axillaribus numerosis verticillatis folio brevioribus, cylindraceis; bracteis acutis patulis incano-tomentosis ♄ — Crescit ad flumen Magdalenae.

35. L. CHAMISSONIS D. Dietr. Synops. plant. plermq. III. 598. no. 28. — Caule herbaceo erecto subramoso acute tetragono; foliis ovatis acutis, basi subcordatis serratis, supra calloso-pilosis, subtus tomentosis; pedunculis axillaribus solitariis geminisque hirsutis monocephalis; capitulis subglobosis, demum ovoideis hirsutis; bracteis ovatis acutis hirsutis ciliatis, corollae duas tertias attingentibus; calyce bidentato; corolla tubulosa, limbo inaequaliter quadrilobo; drupa sphaeroideo-lentiformi laevi brunnea, cum sutura sulco levissimo indicata. ♃ — Internodia sesqui-quadripollicaria. Folia basi cordata intra sinum insigniter in petiolum decurrentia subtriplinervia, supra pilis prostratis, basi callosis scabra, cum petiolo pollicari 3½-pollicaria, 2 poll. lata. Pedunculi semipollice vel pollice vix longiores, quam folia prius evoluti. Capituli fructiferi axis 8 lin. longa, diameter illius 4½ lin. Corolla extus hirtello-pubescens, intus ad faucem villosula, tubo 3 fere lin. longo, lacinia dorsali transverse elliptica. Drupae diameter linea major. — *Ridelia lippioides* Chamisso, Linnaea VII. 240. † t. 7. fig. c. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

36. L. SIDOIDES Cham. Linnaea VII. 224. † — Fruticosa: ramis obsolete tetragonis patulis glabrescentibus, summitatibus inflorescentiisque juniori statu subsericeo-canescentibus; foliis breviter petiolatis ovatis obtusis acutisque, cuneata basi integerrimis obtuse serratis penninerviis triplinerviisque, venis utrinsecus subquinis obliquis, supra impressis, subtus prominulis, supera pagina pilis brevibus antrorsis, vetustate basi callosis, demum scabra, infera pagina in rete vasculoso molliter pilosa; pedunculis axillaribus aggregatis laxis petiolo longioribus; capitulis tetraquetro-ovoideis; bracteis imbricatis ovatis acutis complicatis longitu-

dine tubi corollae. ♄ — Flores lutei? Pedunculi plerique senarii, racemum contractum formantes, basiquam maxime canescunt. Bracteae inprimis nervo carinali marginibusque villoso-pilosae. Folia pollicaria, semipollicem lata, petiolo 2 lin. longo, scabrida, vel bipollicaria, 9 lin. lata, petiolo 4 lin. longo scaberrima, juniora angustiora oblonga. Observatur etiam ramus luxurians, internodiis 4-pollicaribus, foliis ternato-verticillatis 3-pollicaribus sesquipollicem latis, petiolo 5 lin. longo. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

37. L. ELEGANS Cham. l. c. 225. † — Fruticosa: ramis obsolete tetragonis sursum cum inflorescentiis subtomentoso-pubescentibus; foliis ovato-oblongis, basi acutis, apice obtusis crenulatis rugosis, venis utrinsecus circiter 8, infima e petiolo oriente, discoloribus, supra calvescentibus, subtus tomentosis; pedunculis aggregatis laxis petiolo longioribus; capitulis tetraquetro-ovoideis; bracteis imbricatis late ovatis acuminulatis complicatis, longitudine circiter tubi corollini. ♄ — Habitu et inflorescentia praecedenti affinis. Folia internodiorum circiter longitudine, 1½-pollicaria, semipollicem lata, petiolo 3 lin. longo. Pedunculi in aliis speciminibus 3 lin. longi, axi capituli semipollicari, in aliis fere duplo longiores, capitulo dimidio breviore. Bracteae nervo carinali crasso paullulum excurrente acuminulato-mucronatae ciliatae. Calyx tubulosus pubescens, lineam longus. Corolla extus pubescens, intus infra faucem pilosula, tubo obovato 2 lin. longo, limbi lacinia dorsali biloba. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

38. L. MICROPHYLLA Cham. l. c. 226. † — Fruticosa ramosissima: ramis teretiusculis, epidermide grosse fibroso-secedente, ramulis canescenti-pubescentibus, summitatibus inflorescentiisque tenerioribus villosis; foliis petiolatis ovato-suborbicularibus obtusis in petiolum productis crenatis rugosis, venis utrinsecus quinis, supra pilis antrorsis scabris, subtus incano-tomentosis; pedunculis aggregatis laxis; capitulis tetraquetro-subglobosis ovoideisque folia subaequantibus; bracteis lanceolatis concavis inflexo-acuminatis patulis, corollas aequantibus. ♄ — Internodia 3–6 lin. longa, ramorum floriferorum 1½-pollicaria vel longiora. Folia maxima 9 lin. longa, 7 lin. lata, petiolo trilineari, speciminum macriorum scaberrima, 5 lin. longa, 4½ lata, petiolo sesquilineari. Pedunculi 2–3 lin., capitula 3–4 lin. longa. Calyx semilineam longus pubescens et ciliatus bifidus. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

39. L. SALVIAEFOLIA Cham. l. c. 227. † — Fruticosa: ramis teretiusculis, ramulis inflorescentiisque pubescentibus; foliis petiolatis anguste ovatis obtusis, basi rotundatis (rariusque subcordatis) crenulatis, venis utrinsecus 7–9, supra hirtello-pubescentibus, subtus tenuiter canescenti-tomentosis; anthuri pedunculis aggregatis laxis folia superantibus; capitulis tetraquetro-subglobosis parvis; bracteis ovatis acutis complicatis subrecurvis patentibus villoso-ciliatis, tubo corollino brevioribus. ♄ — Internodia 1–3-pollicaria. Folia ramealia bipollicaria, pollicem lata, minora majoraque, petiolo ad summum 4-lineari, superiora sensim minora. Rami in anthuros abeunt virgatos, ramuli infimorum pseudo-verticillorum vices agunt folii- et capituligeri, foliis rameis reliquis aequalibus suffulti. Pedunculi 4–5 lin. longi patuli et reflexi. Capitula minuta, axi 3 lin. longo, vix capitula majora. Corolla subclavata puberula. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

40. L. STACHYOIDES Cham. l. c. † — Caulibus erectis, basi lignescentibus teretiusculis, pilis retrorsis hirsutis simplicissimis in anthurum elongatum desinentibus; foliis verticillatis ternis oppositisve, breviter petiolatis subsessilibusque subellipticis crenulatis, venis arcuatis utrinsecus 7–8, pilis antrorsis densis rigidis, supra velutinis, subtus canescenti-tomentosis; capitulis breviter laxeque pedunculatis pluribus tetraquetro-subglobosis longiusve prismaticis, pilis rigidis densis canescentibus; bracteis imbricatis ovatis acuminatis complicatis inflexis tubum corollinum subaequantibus. ♃ — Planta 2–4-pedalis. Internodia inferiora 3–5-pollicaria. Folia ex ovata in obovatam ludentia formam, maxima subtripollicaria, sesquipollice latiora, petiolo subnullo vel 3-lineari, costa media saepe in mucronem sesquilinearem excurrit. Pedunculi 3 lin. longi longioresque, capitula

maxime evoluta 8 lin. longa, diametro fere 3-lineari. Calyx albido-pilosus ciliatus. Corolla 2 lin. longa tenuissime puberula. — Crescit in Brasilia.

41. L. SERICEA Cham. l. c. 228. † — Sericeo-incana: caulibus junceo-strictis simplicissimis vel sub anthuro ramuliferis; foliis verticillatis ternis quaternisque subsessilibus erecto-patulis ellipticis, utrinque acutis obsolete serratis crenatisve subintegerrimis, venis obliquis, utrinsecus subsenis; capitulis breviter laxeque pedunculatis tetraquetro-ovoideis vel longius prismaticis; bracteis imbricatis ovatis acuminatis complicatis rectis tubum corollinum subaequantibus. ♃ — Caules 1½-3-pedales graciles, internodia foliiferi caulis ½-1-pollicaria, anthuri 1-1½-pollicaria, folia inferiora internodia adaequantia, 4½ lin. lata, petiolo ad summum sesquilineari, sursum breviora, supra virentia vel canescentia, infra longiuscule villosa. Capitula plurima subsemipollicaria, diametro trilineari, pedunculis aggregatis 3 lin. longis. Bracteae uninerviae sericeae ciliatae, intus nudiusculae. Calyx sericeo-ciliatus bifidus, lineam longus. Corolla lutea? extus dense pubescens, intus ad faucem pilosula, 3 lin. longa, limbo sesquilineari. Drupae loculum ceterum saepe abortivum evanescens. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

42. L. ROTUNDIFOLIA Cham. l. c. 230. † — Caule erecto scabrido, superne ramoso; inflorescentiis thyrsoideis terminalibus; foliis pseudo-verticillatis ternis (quaternisque) breviter petiolatis subrotundis denticulatis subacuminatis, integerrima basi acutis subcoriaceis crassinerviis 3-5-nerviis venosis et reticulato-venosis, venis utrinsecus subquinis, supra scabris, subtus tenuissime tomentosis; pedunculis axillaribus solitariis geminisque erectis; capitulis ovoideis molliter velutinis folia multo superantibus; bracteis undique imbricatis lanceolatis acutis tubum corollae subaequantibus. ♃ — Planta 1½-3-pedalis, rami stricti medullosi obtuse tetragoni striati rigido-scabri. Internodia 1½-3-pollicaria, verticillari ordine foliorum saepe perturbato. Folia erecto-patula, inferiora maxima cum cuneata basi bipollicaria, diametro sesquipollicari, petiolo sesquilineari, sursum paullo decrescentia. Ramuli floriferi subfastigiati, pedunculi pubescentes longissimi, vix unquam pollicares. Capitula ovoidea sericeo-velutina, vix tamen canescentia densiflora, axi ½-1-pollicari. Flores violacei. Calyx basin usque? bifidus, phylla carinata lineam longa hirsuta. Corollae hirsutae tubus curvulus 4 lin. longus, limbo quadrifido, intus subnudo, 2 lin. diametro tenente. Drupa obcordata fusca nuda, styli basi apiculata. — Crescit in Brasilia.

43. L. LASIOCALYCINA Cham. l. c. 231. † — Fruticosa erecta: ramis hexagonis glabris, ramulis inflorescentiisque hirtellis; foliis verticillatis ternis subsessilibus ellipticis, utrinque acutis grosse acuteque serratis paucidentatisve membranaceis tenuinerviis hirtellis ciliatis, venis utrinsecus subsenis; ramulis abbreviatis, floriferis (racemis) comosis axillaribus; spicis pedunculatis laxis verticillatis ternis, foliolis integerrimis suffultis; bracteis lanceolatis acutis concavis longitudine tubi corollini, fructiferis patentibus; fructu calyce villoso subadhaerente vestito. ♄ — Internodia adulta 2-3-pollicaria, folia suppetentia 1 poll. 9 lin. longa, 10 lin. lata, juniora minora magisque lanceolata. Pedunculi e paucis lineis fere ad sesquipollicares elongati, sic et spica longitudine ludit, occurrunt enim capitula pauciflora et spicae elongatae laxiflorae; flores alterni, spica decimo flore deflorato etiam nunc florifera pollicaris. Bracteae lanceolato-acuminatae membranaceae tenuiter trinerviae hirtello-ciliolatae. Calyx tubulosus longe pilosus. Corolla tenerrima, extus rariter hirtella, intus glabra, tubo curvulo 5 lin. longo, limbo subaequaliter quadrifido, 2½ lin. diametro metiente. — In Brasilia meridionali.

44. L. MYRIOCEPHALA Schlchtd. et Cham. Linnaea V. 98. — Foliis elliptico-lanceolatis breviter petiolatis, obsolete serratis, supra scabrido-hirtellis glabrescentibus, subtus (in rete vasculoso) puberulo-hirtellis penninerviis, nervo venisque supra leviter impressis reticulato-venosis, rete subtus prominente; capitulis globosis axillaribus subquinis fasciculatis; pedunculis filiformibus folio dimidio brevioribus; bracteis ovatis acuminatis acutis patulis puberulis. ♃ — Rami tetragoni pubescentes. Folia inferiora maxima, cum petiolo sexpollicaria, latitu-

dine bipollicari. Capitula magnitudine grani *Piperis*. — Crescit in sylvis Jalapensibus Mexicanorum.

45. L. ORIGANOIDES H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 267. † — Caule fruticoso; ramis teretibus hirto-pubescentibus; foliis petiolatis ovato-oblongis obtusis crenatis, supra rugosis piloso-hirtis, subtus molliter hirto-tomentosis canescentibus; capitulis axillaribus verticillatis quaternis quinisve ovato-tetragonis pedunculatis, folio multo brevioribus; bracteis ovatis acutis. ♄ — Rami striati subcanescentes. Folia basi rotundata reticulato-venosa membranacea rigidula, supra rugosa, 9–14 lin. longa, 3–7 lin. lata. Petioli 4 lin. longi subcanaliculati hirto-pubescentes. Pedunculi 2–2½ lin. longi pubescentes, capitula 2–3 lin. longa petiolum paullo superantia. Flores quadriseriati. Bracteae extus pubescentes ciliatae 3–5-nerviae flore breviores. Calyx ovatus compressus bifidus pilosulus. Corolla hypocraterimorpha alba?, extus pilosula, limbo subquinquefido inaequali. Drupa oblique obovata fusca laevis minuta calyce tecta, loculo altero saepe abortiente. — *Gardoquia origanoides* Rchb. in Sieb. Hb. flor. Maurit. — Crescit in montosis siccis circa Punta Aroya Cumanensium.

46. L. GRAVEOLENS H. B. Kth. l. c. 266. † — Caule fruticoso; ramis teretibus piloso-canescentibus; foliis petiolatis ovato-oblongis acutis obsolete cordatis crenatis pubescentibus, subtus canescentibus mollibus; capitulis axillaribus pedunculatis quaternis verticillatis subglobosis, petiolum paullo superantibus; bracteis ovatis acutis. ♄ — Rami oppositi striati. Folia basi rotundata reticulato-venosa, nervo medio subtus prominente, supra viridia, 2–2½-pollicaria, 14–15 lin. lata, petioli 7–8 lin. longi teretiusculi subcanaliculati piloso-pubescentes. Pedunculi 4 lin. longi pubescentes. Bracteae imbricatae extus pubescentes. Calyx compressus 4-dentatus, demum bifidus? pilosus. Corolla hypocraterimorpha, calyce 3–4-plo longior, limbi lacinia superiore rotundata emarginata, labio inferiore trifido, laciniis rotundatis undulatis, intermedia majore. Drupa......? — Crescit in Novae Hispaniae littore Campechiensi.

47. L. SCHIMPERI Hochstetter in Steudel, Nomencl. bot. (edit. 2.) II. 54. (Hb. un. itin. it. Abyss. no. 257.) — Suffruticosa scabro-hispida: caulibus erectis simplicissimis; foliis omnibus verticillato-ternis subsessilibus e basi ovata ellipticis subacuminatis obtusis crenato-dentatis, supra calloso-scabris, subtus piloso-hirsutis; pedunculis in axillis foliorum superiorum verticillatis binis ternisve monocephalis, quam folia quinquies brevioribus, verticillo terminali folia aequante; capitulis globosis multifloris; bracteis dense imbricatis subrotundis cum acumine dorso hirsutis; corollae (roseae) hypocraterimorphae tubo bracteam aequante puberulo, limbo lato bilabiato, lacinia superiori majori apice emarginata, laciniis tribus inferioribus brevioribus ellipticis obtusis. ♃ — Tota planta (sed praecipue flores) odorem gravem *Lantanarum* respirat. Caules simplices? pluripedales? teretiusculi striato-sulcati piloso-hispidi scabri. Internodia 2–2½-pollicaria, suprema sensim brevissima aggregata. Petioli brevissimi, lineam longi, sed distinctissimi. Folia media maxima 2–2½-pollicaria, pollicem lata, supra setulis prostratis basi callosis scabra, infra praesertim in nervis venisque piloso-hirtella. Pedunculi vix ultra semipollicem longi filiformes scabrelli, verticilli terminalis breviores, capitula subglobosa diametro circiter quatuor linearum. Bracteae extimae majores capitulum subinvolucrantes. Calyx minimus membranaceus bifidus, pilosissimus. Corolla laete rosea, limbo supra bracteas explanato, diametro circiter trium linearum. Drupa desideratur. — *Lantana Abyssinica* Alb. Dietr. et Otto, Allgem. Gartenzeitung IX. 379. no. 27! — *Lantana polycephala* R. Br. mss.?? — Crescit in Abyssinia. (v. s. cult.)

48. L.? GEMINATA H. B. Kth. l. c. 266. † — Caule fruticoso; ramis subtetragonis pubescentibus; foliis petiolatis ovato-oblongis acutis serratis, supra adpresse pilosiusculis, subtus canescenti-pubescentibus; capitulis axillaribus pedunculatis geminatis verticillatis oblongis; bracteis ovatis acuminulato-subulatis. ♄ — Folia basi acuta in petiolum angustata reticulato-venosa, sesquipollicaria, 7–8 lin. lata, petioli 2–3 lin. longi canaliculati pubescentes. Capitula subglobosa, fructifera

cylindraceo-oblonga breviter pedunculata. Bracteae canescenti-pilosae floro breviores. Calyx brevissimus 5-dentatus pilosus. Corolla albida?, extus pubescens, limbo subbilabiatim quinquefido. Fructus ignotus. — An forte *Lantanae* species? — Affinis dicitur *L. ferrugineae*. — *Verbena lantanoides* Willd. Herb. — *Lantana geminata* Spr. Syst. vegetab. II. 763. — Crescit in inundatis fluminis Apure juxta Santa Barbara.

C. Capitulis paniculatis.

a. Paniculae axillares.

49. L. FLORIBUNDA H. B. Kth. l. c. 267. † — Caule fruticoso?; ramis tetragonis verruculosis glabris; foliis petiolatis lanceolato-oblongis subacuminatis serrato-crenatis glabris, subtus pilosulis; paniculis axillaribus ramosis folium superantibus; capitulis subglobosis; bracteis ovato-cuneatis acutis. ♄ — Folia basi in petiolum subsemipollicarem canaliculatum pilosulum attenuata reticulato-venosa membranacea, subtus pallidiora, 5-6-pollicaria, 18-21 lin. lata. Paniculae axillares subsessiles 6-7-pollicares ramosae bracteatae, ramis pilosulis oppositis geminatis ternatisque, bracteis oppositis oblongis acutis concavis, extus pubescentibus fuscescentibus deciduis. Capitula subglobosa longe pedunculata magnitudine *Pisi*, bracteae apicem versus extus pubescentes, flore breviores. Drupa glabra fuscescens. — Crescit in regno Novo-Granatensi.

50. L. HIRSUTA Mutis mss. in Linn. fil. Suppl. 288. — Willd. Spec. plant. III. 356. — H. B. Kth. l. c. 268. † — Caule fruticoso?; ramis tetragonis canescenti-hirsutis; foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis crenatis, supra rugosis pilosis, subtus molliter hirto-tomentosis canescentibus; paniculis axillaribus simplicibus folium subaequantibus; capitulis subhemisphaericis; bracteis ovato-cuneatis obtusis. ♄? — Folia basi acuta reticulato-venosa membranacea rigida sub-5-pollicaria, 12-14 lin. lata, petioli 3-4 lin. lati canaliculati pilosi. Paniculae adjecto pedunculo subquadripollicares, rami subgeminatim oppositi, pedunculo subbipollicari, bracteis coriaceis extus adpresse pilosis, interne fuscescentibus. Flores arcte imbricati, calyx bipartitus, margine ciliato-pilosus. Corollae glabriusculae lacinia superior emarginata, laciniis tribus reliquis rotundatis. — Crescit in Nova Granata.

β. Panicula terminalis.

51. L. VERNONIOIDES Cham. Linnaea VII. 232. † — Caule tetragono cum petiolis hirsuto; foliis ovatis ellipticisque acutis, in petiolum brevem breviter attenuatis serratis, supra pilis brevibus callosis scaberrimis et albo-punctulatis, subtus primum subtomentosis, dein in rete vasculoso hirtis rigidisque, venis oblique arcuatis utrinsecus 7-10, infimis e petiolo ortis; panicula terminali; ramis oppositis cymosis; capitulis squarrosis strobiliformibus globosis et ovoideis, alaribus sessilibus; bracteis squamiformibus arcte imbricatis antice dilatato-rotundatis mucronulatis velutinis, denudata basi (ungue) breviter cuneatis, longitudine tubi corollini. ♃ — Herbacea? simplex vel semel bifurca bipedalis, internodia pollicaria tripollicariaque, folia maxima quadripollicaria, latitudine bipollicari, petiolo bilineari, saepe tertia parte minora, apicem versus decrescentia. Panicula laxa pyramidata vel fastigiata, cymae bis terve bifidae vel internodiis duobus confluentibus quadrifidae, pedunculi apice saepe cymuliferi, capitulorum maximorum axis semipollicaris, diametro 4½ lin. Bracteae 1½ lin. latae et totidem longae. Calyx villosus bifidus. Corolla extus villoso-pubescens valde inaequalis, lacinia postica elongata ligulata. Drupa obcordata. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

52. L. UMBELLATA Cavan. Icon. et descript. plant. II. 75. † t. 194. — Caule fruticoso; ramis tetragonis hirto-tomentosis; foliis basi in petiolum angustatis ovato-oblongis acutis serratis, supra pilosis, subtus piloso-tomentosis mollissimis; paniculis terminalibus simplicibus; capitulis subverticillatis; bracteis ovatis acutis flore duplo longioribus. ♄ — Folia omnino *Callicarpae* reticulato-venosa mollissima incana subquinquepollicaria, 2½-3 poll. lata, petioli semipollicares canaliculati incano-tomentosi. Panicula 2-3-pollicaris subsimplex, rami verticillati

tetragoni hirto-tomentosi. Capitula hemisphaerica magnitudine fructus *Pruni spinosae* pedunculata. Bracteae reticulato-venosae, extus sericeo-pubescentes flore duplo longiores imbricatae. Calyx compressus bidentatus densissime albo-pilosus. Corolla infundibuliformis glabra lutea quadrifida, laciniis subaequalibus rotundatis. Drupa exsucca ovata calyce tecta laevis glabra fuscescens. — *L. callicarpaefolia* H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 268. — Crescit prope urbem Mexici. (v. s. sp.)

53. L. HIERACIFOLIA Cham. Linnaea VII. 375. † — Radice lignescenti-tuberosa; caulibus e lignosa basi subramosis ascendentibus, binc erectis strictis herbaceis, inferne foliosis patentimque hirtis, sursum subaphyllis strigosisque; foliis subsessilibus erectis ex ovato seu elliptico oblongis acutiusculis integerrimis dentatis serratisque, pilis patentibus rigidis longis albis, basi callosis hirtis, supra et in margine praesertim scabris asperis albo-punctatis, inflorescentia terminali stricta racemosa seu paniculata; capitulis breviter pedunculatis subglobosis; bracteis corollas subaequantibus undique imbricatis; calycibus villosis. ♄ — Frutex 2–5-pedalis, folia triplinervia et venosa, internodiis nunc longiora nunc breviora, infima breviora latioraque, intermedia maxima, ad 5 poll. usque elongata, sesquipollice latiora vel speciminum parvifoliorum subbipollicaria. Caulis pars supera scapiformis omnino nuda nunc folio uno alterove instructa. Inflorescentia in speciminibus macilentis 3–5-spicata contracta, in vegetioribus elongata, internodiis inferioribus elongatis, superioribus decrescentibus. Bracteae anguste lanceolatae acutae vix unquam semipollicares pedunculos suffulciunt, rami inflorescentiae elongati stricti racemiferi, intermedio saepe breviore. Capitulum sub anthesi globosum undique bracteis imbricatum ovato-lanceolatis. Calyx villosissimus facile in folia 2 secedens. Corolla extus et intus pubescens, limbo parvo quadrifido. Drupa ovoideo-globosa subcompressa parvula nitide brunnea vel nigra bilocularis disperma. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

54. L. GRANDIFOLIA Hochstetter in Schimper, Hb. Abyss. Sect. 2. no. 734! — Suffruticosa: caule stricto ramosissimo; foliis oppositis verticillatisque ternis quaternisque subsessilibus elliptico- vel ovato-lanceolatis acuminatis, supra calloso-asperrimis, infra ramisque puberulis, irregulariter obsoleteque serrulatis; pedunculis axillaribus verticillatis quaternis brevissimis monocephalis capitulisque in apice ramorum subaphylla conglomerato-subsessilibus subsphaeroideis; bracteis arcte imbricatis lanceolato-ovatis acuminatis; calycibus tenuissime membranaceis bidentatis, dense niveo-pilosis. ♃ — Caulis strictus bipedalis vel forte altior pallide fuscus sulcatus puberulus, rami stricti similes. Internodia 1½–2½-pollicaria. Folia infima maxima, sursum decrescentia, suprema minima lanceolata 2–3 lin. longa, maxima 3–3½-pollicaria, pollicem lata, supra laete virentia, verruculis conicis setula prostrata terminatis scaberrima impresse rugulosa, infra fusce reticulato-venosa puberula, ramealia pleraque anguste lanceolata 1½–2-pollicaria, 3–6 lin. lata acuminata acute serrulata. Inflorescentia strigoso-aspera, pedunculi brevissimi (saepe 3–6 lin. longi) sub capitulo incrassati verticillato-quaterni pluresve monocephali, capitula sphaeroideo-ovata hirsuta. In ramorum apice folia fulcrantia brevissima, capitula subglomerato-verticillata (statu morboso? confluentia), e foliorum axilla saepe prodit pedunculus strictus, folio duplo longior, apice capitula verticillato-glomerata gerens, inflorescentia igitur valde irregularem paniculam terminalem efficit. Bracteae e basi contracta lanceolato-ovatae acuminatae, dorso pilosae, corolla parum breviores. Calyx tenuissime membranaceus bidentatus drupam globosam glaberrimam fuscam sponte in elementa carpica secedentem arcte includens, longe niveo-pilosus (nec villosus). — Crescit in Abyssinia ad latera montium versus vallem profundam Ferrfera. (v. s. sp.)

55. L. ADOENSIS Hochstetter l. c. no. 1079! — Suffruticosa: caule stricto tereti striato aspero-pubescente ramoso; foliis oppositis vel inferioribus etiam verticillato-ternis subsessilibus e basi ovata lanceolatis acuminatis internodia superantibus, supra setuloso-asperis rugosis, infra praesertim in nervis venisque pu-

bescentibus, crenulato-serrulatis; capitulis pedunculatis axillaribus verticillatis ternis quaternisve cum verticillo terminali; capitulis subsphaeroideis densifloris; bracteis extus hirsutis suborbicularibus acuminatis arcte imbricatis; calyce bidentato tenuissime membranaceo piloso. ♃ — Valde affinis praecedenti, cujus forte varietas?, differt tamen hisce notis: Internodia superiora ½-1-2-pollicaria, folia maxima tripollicaria, pollicem lata, superiora sensim breviora et angustiora, capitula semper pedunculata, pedunculis pollicaribus vel in verticillis supremis semipollicaribus, apice non incrassatis, strigoso-subcanescentibus. Bracteae late rhombeo-orbiculatae acuminatae vix flore breviores hirsutae, folia verticillorum supremorum lanceolato-linearia crenulata vix pedunculo longiora. Drupa globosa fusca glaberrima, calyce fusco-piloso tenuissime membranaceo arcte inclusa. – Crescit in Abyssinia in vallibus ad montes calidiores. (v. s. sp.)

Sectio II. DIPTEROCALYX Chamisso, Linnaea VII. 241.

Calyx compressus bidentatus, carina alatus.

56. L. HIRTA Meisner, Gener. plant. vascul. II. 199. — Caulibus erectis subsimplicibus teretiusculis, aspere hirsutis; foliis verticillatis ternis subsessilibus ovatis vel ellipticis, basi subcordatis, apice acutis, antice serratis rugosis, subtus in nervo venisque hirtis, supra calloso-scabris, floralibus squamaeformibus integerrimis; capitulis axillaribus pedunculatis ternis quinisve, verticillis supremis confluentibus; capitulis demum cylindraceis imbricatis; bracteis late rotundato-ovatis obtusis vix calyce majoribus. ♄? — Caules basi lignescentes 2–3-pedales pilis subspinescentibus hirsuti. Internodia in medio caule 1½–2-pollicaria, sursum ad 4 poll. elongata. Habitus quodammodo *Hyperici montani*. Folia erecto-patentia nunc venosa, nunc triplinervia grosse rugosa, margine reflexa, supra scaberrima, 2-pollicaria, pollicem lata, superiora minora. Tota inflorescentia hirta et scabra. Pedunculi subsemipollicares. Capitula sexfariam imbricata sub anthesi globosa, demum cylindracea semipollicaria. Calyx 1½ lin. longus tubulosus alis auctus subdisciformis, ciliis stellatus. Corolla extus puberula, intus villosa, limbo 4-fido, lacinia ventrali bifida. Drupa lanceolato-ellipsoidea pallida laevis. — *Dipterocalyx hirtus* Chamisso, Linnaea VII. 241. † t. 7. fig. D. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

57. L. (DIPTEROCALYX Chamisso, Linnaea VII. 242. †) GLABRESCENS Meisner l. c. — Caulibus erectis subsimplicibus teretiusculis aspere hirsutis; foliis verticillatis ternis planis, subtus glabris subsessilibus ovatis vel ellipticis, basi subcordatis, apice acutis, floralibus squamaeformibus integerrimis; capitulis axillaribus ternis quinisve pedunculatis subglobosis; bracteis acuminulatis acutis. ♄? — A praecedente differt potissimum glabritie majori omnium partium foliisque planis non rugosis. Caulis paullisper scaber, statura paullo elatior, internodiis subaequalibus tripollicaribus. Folia terna quaternaque verticillata, ordine turbato alterna. Capitula minora breviora, bracteae glabrae scabrae, scabrido-ciliolatae. Drupa globosa diametro fere trium linearum. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

† *Species dubia.*

58. L. CYMOSA Swartz, Flor. Ind. occid. II. 1066. — Fruticosa ramosa: ramis pubescentibus spinosis, spinis oppositis; foliis oppositis infra fasciculatis ternis ovatis acutis seu obtusis subintegris pubescentibus, subtus glabris, stipulis oppositis subulatis; cymis parvis terminalibus tripartito-trifidis, pedicellis trifloris. ♄ — Rami divergentes cinerei. Folia semiuncialia integra vel margine inaequalia nervoso-venosa. Stipulae rigidulae marcescentes. Spinae e gemmis foliorum, folio ipso breviores erectae. Ramuli floriferi oppositi aequales distiche secundi patentes hirto-pubescentes. Flores parvi albi. Calyx quasi superus persistens 4-dentatus, dentibus 2 oppositis minoribus, demum utrinque longitudinaliter fissus. Corollae tubus longitudine calycis, limbi 4-fidi laciniae oblongae aequales, superiore erectiuscula. Drupa(?) obcordata compressa carinata nigra bilocularis.

Spiraeae congener spinosa folio subrotundo acuminato Sloan. Hist. Jamaic. II. 30. t. 174. fig. 3. et 4. — Crescit in insula Jamaica australi.

†† *Species indescripta.*

L. (ZAPANIA Torr.?) CUNEIFOLIA Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) II. 54.

††† *Species e genere expellendae.*

L. ECHINUS Spr. = RHAPHIODON ECHINUS Schauer (cf. Repert. III. 524.)
L. MONTEVIDENSIS Spr. = LANTANA SELLOWIANA.
L. OVATA Linn. fil. = MICRODON OVATUS.
L. PURPUREA Dum. Cours. = LANTANA TRIFOLIA.

XVII. (3683/1.) CRYPTOCALYX *Bth.*

(Bth. Ann. of natur. hist. II. 446. — Meisn. Gener. plant. vascul. II. 336. — Endl. Gener. plant. supplem. I. 1401.)

1. CR. NEPETAEFOLIA Bth. l. c. † — Herba annua ramosa, basi procumbens saepe radicans, apice ascendens. Rami crassiusculi obscure tetragoni glabri vel pilis adpressis paucis obsiti. Folia opposita petiolata ovato-rhombea grosse dentata, basi cuneato-truncata et integerrima 1–1½-pollicaria, utrinque viridia et glabra vel pilis adpressis paucis subpubescentia. Spicae ovoideo-oblongae axillares pedunculatae solitariae vel glomeratae, petiolo breviores. Flores numerosissimi minuti sessiles, seriebus circiter 12 densissime imbricati. Rhachis post flores delapsos cicatrisata. Bracteae cuneatae acuminatae membranaceae complicato-carinatae, margine ciliatae, flores parum excedentes. Calyx corollae tubo dimidio brevior sub lente minutissime pubescens. Corolla alba glabra vix ultra semilineam longa. Pyrenae maturitate omnino liberae graniformes semilineam longae. ⊙ — Crescit in Guiana Britannica. (v. s. sp.)

XVIII. (3683). BUCHIA *H. B. Kth.*

(H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 269. t. 132. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 290. II. 199.)

1. B. PLANTAGINEA H. B. Kth. l. c. 270. † t. 132. — Herba suberecta ramosa, caule rubro piloso, ramis teretibus. Folia opposita approximata petiolata oblonga subacuminata, inferne valde angustata integerrima quinquenervia, supra lanuginosa pilosa viridia, subtus lanuginoso-lanata incana membranacea, adjecto petiolo tripollicaria, 9–10 lin. lata. Pedunculi complures in apice ramorum congesti elongati 2½ poll. longi compressiusculi sericeo-pilosi. Spicae 3–6 in pedunculorum apice conglomeratae sessiles oblongo-cylindraceae obtusae 6–9 lin. longae. Flores arctissime imbricati ebracteati (?) 1½ lin. longi. Rhachis angulata densissime pilosa. Calyx infundibuliformis bipartitus pilosus, laciniis ovatis acuminatis concavis crassiusculis aequalibus. Corolla infundibuliformis alba, extus pilosa, tubo cylindraceo calycem aequante, basi pilis rigidis complanatis cincto, limbo 4-partito, laciniis oblongo-lanceolatis acutis aequalibus erectiusculis, fauce pilosa. Stamina 4 inclusa. Fructus depresso-globosus drupaceus trilocularis? tricoccus? tricuspidatus, calyce persistente inclusus. ♃ — Crescit locis humidis prope Javita Orinocensium.

XIX. (3691.) CHLOANTHES *R. Br.*

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. [edit. N. ab E.] 369. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 290. II. 199.)

1. CHL. STOECHADIS R. Br. l. c. — F. Bauer, Illustr. plant. flor. Nov. Holl. t. 4. — Foliis subtus calycibusque extus niveo-tomentosis; pedunculis medio bracteatis. ♄ — Fruticulus spithamaeus ramosus, rami subsimplices virgati, tota sua longitudine foliis tecti. Folia sessilia decurrentia semipollicaria, vix lineam lata, obtusissima, linearia crenata ideoque quasi vermiculata rigida subrecurva, supra undique brevissime setuloso-asperrima, margine revoluta, subtus in nervo medio niveo-tomentosa. Flores axillares solitarii brevissime pedicellati. Pedicelli

brevissimi medio bibracteati; bracteis dimidio calyce brevioribus linearibus foliaceis piloso-hispidis, margine subrevolutis. Calyx late campanulatus profunde quinquefidus, laciniis subaequalibus e basi lanceolata linearibus obtusis, margine revolutis albo-lanatis (ut calycis tubus), corolla duplo brevioribus. Corolla ochroleuca extus pubescenti-lanata. Drupa calyce inclusa (calyce supra eam subconstricto) subrotunda magnitudine pisi ferrugineo-fusca, lanato-pubescens chartacea crassa, dipyrena, pyrenis trilocularibus, loculis lateralibus monospermis, intermedio sterili. — Sieb. Coll. plant. Nov. Holl. no. 186. — Crescit in Nova Hollandia, in littoribus intra tropicum. (v. s. sp.)

2. CHL. LAVANDULAEFOLIA Sieber, Coll. plant. Nov. Holl. no. 185I. — Spr. Syst. vegetab. II. 756. no. 3. — Caule fruticuloso simplicissimo lanato; foliis linearibus obtusis crenatis, supra rugosis hispido-scaberrimis, infra albo-lanatis; floribus axillaribus solitariis sessilibus, bractea lineari bracteolisque utrinque ad basin calycis brevissimis subulatis suffultis. ♄ — Fruticulus spithamaeus simplicissimus — (an semper?) — valde affinis *Chl. stoechadifolia*, differt foliis pollicaribus, caeterum omnino conformibus, calycibus corollisque duplo fere longioribus. — Cum praecedente verosimiliter consocianda. — Crescit in Nova Hollandia. (v. s. sp.)

3. CHL. PARVIFLORA Wlprs. mss. — Caule fruticoso ramoso dense albo-lanato; foliis oppositis basi connatis, e latiore basi linearibus obtusiusculis, margine crenato-revolutis, supra setoso-strigosis, subtus dense albo-lanatis, nervo medio demum glaberrimo; floribus versus ramorum apices axillaribus solitariis breviter pedunculatis; bracteis lineari-subulatis calycem subaequantibus; calycis fere basin usque quinquefidi laciniis linearibus acuminatis, dorso margineque densissime albo-lanatis; corolla late hypocraterimorpha, extus araneosa, intus villosula; staminibus 4 didynamis brevissimis, annulo densissime albo-lanato sub staminum inferiorum insertione (corollae tubum claudente); stylo staminibus breviori, apice breviter bifido. ♄ — Frutex pedalis ramosus, densissime albo-lanatus. Internodia brevissima, superiora confluentia, foliis imbricatis. Folia pollicaria, basi 2½ lin. lata amplexicaulia connata, 1–1½ lin. lata, adulta demum glabrescentia. Flores folio breviores. Calyx 3 lin. longus basin usque quinquefidus. Corolla calyce duplo longior tubo brevi lanae albae annulo clausa, fauce late ampliata, limbi laciniis superioribus duabus ovalibus obtusiusculis, tribus inferioribus longius coalitis. Stamina inclusa brevissima. Stylus subcompressus apicem versus subalatus, stigmatis subhastati apice acute bifido. Drupa......? — A reliquis hujus generis speciebus differt staminibus inclusis et calyce basin usque quinquefido. — Crescit in Nova Hollandia. (v. s. sp.)

4. CHL. GLANDULOSA R. Br. l. c. — Foliis subtus glandulosis calycibusque extus pube rariori conspersis; pedunculis basi bracteatis. ♄ — Folia 2–2½ poll. longa, basi 3 lin. lata, sensim attenuata, margine parum revoluta, reticulato-venosa, supra rugosissima, utrinque glanduloso-pilosa scaberrima. — Crescit in Nova Hollandia cum praecedente. (v. s. sp.)

Tribus II. *LANTANEAE* Endl. Gener. plant. pag. 635.

Fructus drupaceus exsuccus vel baccatus indehiscens nec partibilis.

A. Antherae rimis duabus longitudinalibus dehiscentes.

§. 1. Stigma simplex.

XXI. (3694.) SPIELMANNIA *Medicus.*

(Medicus, Act. acad. Theodor. Palatin. III. 196. t. 10. — Willd. Spec. plant. III. 321. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 199.)

1. SP. (LANTANA Thnbrg. Flor. Capens. 458.) AFRICANA Willd. l. c. — Bot. Magaz. t. 1899. — Foliis sessilibus ovato-oblongis acuminulatis acutis acute irregulariterque serrulatis, supra asperis, subtus hirtellis. ♄ — Frutex pluripedalis ramosus,

caulis ramique patentes quadrangulares, hirsuto-pilosi densissime foliosi, internodiis brevissimis. Folia magnitudine valde variabilia, ramorum sterilium saepius majora 15 lin. longa, 10 lin. lata ovata vel ovato-oblonga, suprema vel ramulorum floriferorum ovato-lanceolata, acuminata acuta, 5 lin. longa, 3 lin. lata vel etiam minora, omnia supra rugoso-scabra, infra praesertim in nervis venisque hirtella, exacte sessilia (nec tamen decurrentia), majora saepius nitida, margine acute et irregulariter serrulato-denticulata, denticulis patentibus, juniora folia *Chorozematis* aemulantur. Flores in axillis foliorum ramealium sessiles solitarii. Calyx persistens, fere basin usque in lacinias quinque aequales lineares acutas margine serrulato-denticulatas divisus. Corolla tubulosa, tubo lacinias calycinas aequante, 3 lin. longo vix puberulo, limbi laciniae 5 obovatae obtusae aequales, fauce villis albis densissimis clausa. Stamina 4 tubo infra faucem adnata brevissima didynama. Drupa globosa rugulosa fusca glaberrima, styli basi persistente umbilicata, putamine lignescente biloculari vel dissepimento evanescente unilocularis, loculis monospermis. — *Lantana crispa* Thnbrg. Flor. Capens. 459? — *Lantana Capensis* Thnbrg. l. c. — In Promontorio bonae spei. (v. s. sp. et cult.)

2. SP. REVOLUTA E. Mey.! Comment. plant. Afric. austr. extratr. I. 274. — Foliis sessilibus lanceolatis imbricatis, margine dentatis revolutis hirsutissimis. ♄ — Frutex rigidus hirsutissimus ramosus, ramis alternis oppositisque erectis. Folia basi latiori sessilia densa erecta imbricata 4–5 lin. longa, propter margines dentatos revolutos pseudo-integerrima acutissima, undique hirsutissima. Flores in apice ramulorum axillares sessiles solitarii vix foliorum magnitudine. Calyx subaequaliter in lacinias 5 lineares divisus. Corollae tubus calyce duplo longior rectus cylindricus crassiusculus, intus ad faucem hirsutus, limbus subregulariter 5-fidus, lobis obtusissimis. Stamina 4 didynama inclusa. Drupa monopyrena disperma, semina erecta exalbuminosa. Embryo erectus, radicula infera, cotyledonibus ovatis dorso convexis. — *Lantana crispa* Thnbrg. Flor. Capens. 459? — *Spielmannia desertorum* Eckl. et Zeyh.! Hb. fl. Capens. — Crescit in Promontorio bonae spei in montosis rupestribus prope Ellebooqsfontein et prope Kuil. (v. s. sp.)

XXII. (3695.) LANTANA *Linn.*

(Linn. Gener. pl. no. 765. — Meisn. Gener. pl. vascul. I. 291. II. 199.)

§. 1. *Aculeatae.*

1. L. ANTIDOTALIS Thonn. et Schum. Kongl. Dansk. Vidensk. Selsk. Afhandl. IV. 50. — Fruticosa ramosa aculeolata: ramis quadrangularibus scaberrime pilosis; foliis petiolatis ovatis acuminatis, vix basi attenuatis obtuse serratis, supra scabrellis, subtus tomentosis; pedunculis folio dimidio brevioribus; bracteis lineari-cuneiformibus acutis tubum corollinum aequantibus. ♄ — Frutex quadripedalis et ultra. Petiolus brevis, folia tripollicaria. Pedunculus puberulus. Calyx minimus quadridentatus. Corolla lutea puberula. Drupa subrotunda glaberrima nigra magnitudine grani *Piperis*, putamine biloculari. — Dijudicent alii, num a *L. aculeata* recte differat nec ne. — Crescit in Guinea.

2. L. ACULEATA Linn. Spec. plant. 974. — Bot. Magaz. t. 86. — Arrabida, Flor. Flumin. VI. t. 85. — Ramis quadrangularibus sulcatis aculeatissimis hirto-puberulis; foliis breviter petiolatis subcordato-ovatis acuminatis, supra rugosis asperrimis adpresse setulosis, subtus molliter canescenti-tomentellis, crenato-serrulatis; pedunculis axillaribus folio longioribus, apice incrassatis, puberulis; capitulis subgloboso-hemisphaericis; bracteis lineari-cuneiformibus acuminatis corolla brevioribus. ♄ — Internodia 1½–2–3-pollicaria. Folia cum petiolo 4 lin. longo sesqui- vel bipollicaria longioraque, utplurimum pollice non latiora, pedunculi 2–2½-pollicares. Corolla e citrino crocea. Drupa succosa, putamine biloculari. — *Viburnum Americanum odoratum etc.* Pluk. Almath. 385. t. 233. fig. 5. — *L. albo-purpurea* Desfont. Cat. hort. Paris. (edit. 2.) p. 392. — Crescit in America calidiore (in Brasilia et alibi.) (v. s. sp.)

3. L. NIVEA Venten. Jard. de Malm. 8. t. 8. — Willd. Enumer. pl. hort. Berol. 651. — Ramis adpresse pilosulis aculeolatis; foliis lanceolato-ellipticis, utrinque acu-

tatis scabris glabriusculis crenulatis; pedunculis axillaribus folio brevioribus; spicis hemisphaericis; bracteis lanceolatis acutis tubo corollino multo brevioribus. ♄ — Petioli pollicares, folia 2–3-pollicaria, 1–1¼ poll. lata, utrinque acuminata. Pedunculi asprelli. Capitula magna umbelliformia. Corolla pallide alba, fauce flavicante. — Crescit in America calida.

4. L. MISTA Linn. Syst. vegetab. 473. — Willd. Enumer. pl. hort. Berol. 650. — Ramis quadrangularibus aculeatis; foliis petiolatis oblongis acutis, basi subattenuatis crenatis, supra scabris, infra hirtellis; pedunculis folio sublongioribus capitulis hemisphaericis; bracteis lanceolatis flores subsuperantibus. ♄ — Corollae color e croceo in purpureum mutatur. — Descriptio in Allgem. Gartenzeitng. IX. 364. data cum planta ipsorum auctorum vix ulla nota quadrat. — *Viburnum Americanum urticae foliis* Commel. Hort. Amstelod. I. 51. t. 78. — *Camara Lamii albi folio, flore misto* Dill. Hort. Eltham. 64. t. 56. fig. 64. — Crescit in America calida.

5. L. HORRIDA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 261. † — Aculeata fruticosa: foliis oppositis petiolatis subrotundo-ovatis acutis serrato-crenatis, supra strigoso-pilosis, subtus piloso-hispidis; capitulis hemisphaericis; pedunculis folio subduplo longioribus; bracteis lanceolatis corolla duplo brevioribus. ♄ — Frutex graveolens quadripedalis ramosissimus; rami tetragoni glabri sparsim aculeati, aculei in ramulis suberecti, in ramis apice recurvati sesquilineam longi, ramuli juniores hispiduli denseque aculeati. Folia basi breviter in petiolum pilosum 3 lin. longum attenuata pollicaria, 9 lin. lata, subtus pallidiora. Pedunculi 2–2½-pollicares pilosi. Flores subsemipollicares. Bracteae lanceolatae acutiusculae subtrinerviae hispidae. Calyx brevissimus subbidentatus ciliatus. Corolla aurantiaca puberula. — *L. aculeatae* L. affinis. — Crescit in monte Chapultepeque prope urbem Mexici.

6. L. SCABRIDA Ait. Hort. Kewens. (edit. 1.) II. 352. — Loddig. Bot. Cabin. t. 1171. — Ramis quadrangularibus pilosulis, ad angulos retrorsum aculeatis; foliis breviter petiolatis cordato-ovatis acuminatis vel ovatis obtusis, supra scaberrimis, subtus pubescentibus reticulato-venosis crenato-serratis; pedunculis axillaribus folia aequantibus vel saepius superantibus, sursum incrassatis retrorsum aculeolatis hispidis; capitulis umbellaeformibus; bracteis lanceolatis acutis hispidis, tubo corollino duplo brevioribus. ♄ — Internodia caulina bipollicaria, ramealia multo breviora. Petioli 3–4 lin. longi, folia 2½-pollicaria, sesquipollicem lata vel pollicaria, 9 lin. lata, pedunculi 1–2½ poll. longi. Corolla crocea, magna, extus puberula. — *L. crocea* Jcq. Hort. Schoenbr. IV. t. 473. — Paxton, Magaz. of Botany X. 53. † (c. icon.) — Alb. Dietr. in Otto et Dietr. Allgem. Grtnztng. IX. 362. † — Crescit in Jamaica et in Brasilia. (v. s. sp. et c.)

7. L. CRENULATA Otto et Dietr. Allgem. Grtnztng. IX. 363. — Ramis quadrangularibus subinermibus; foliis petiolatis ovatis, utrinque acutis crenulatis, supra scabris, subtus hirtellis; pedunculis folia aequantibus; capitulis subglobosis; bracteis spathulatis corollae tubum aequantibus. ♄ — Petioli semipollicares, folia 2–3-pollicaria, 1½–2 poll. lata, supra scabra. Bracteae spathulatae acuminulatae. Corolla lutea, demum aurantiaca. — Absque dubio prioris varietas foliis minute crenulatis. — *L. coccinea* Loddig. Catal.? — Crescit......?

8. L. VARIEGATA Otto et Dietr. l. c. X. 314. † — Ramis erectis quadrangularibus setoso-pilosis, ad angulos retrorsum aculeatis; foliis petiolatis ovatis acutis crenatis, supra scabris, subtus villosulis; pedunculis axillaribus folio subbrevioribus; capitulis hemisphaericis; bracteis oblongo-spathulatis ciliatis tubo corollino brevioribus. ♄ — Frutex pluripedalis, aculei brevissimi validi recurvati. Folia bipollicaria, sesquipollicem lata, basi in petiolum angustum attenuata longe pilosum, pedunculi pilosi, capitula multiflora. Corolla e roseo lilacina, ad faucem flavescens, tubo recto albido pubescente. — Crescit......?

9. L. AMETHYSTINA Otto et Dietr l. c. IX. 370. et X. 315. — Ramis quadrangularibus setoso-pilosis, ad angulos retrorsum aculeolatis; foliis petiolatis oblongo-

ellipticis acuminatis serratis, basi cuneatis integerrimis, utrinque scabris, subtus subhirtis; pedunculis axillaribus folio brevioribus; capitulis hemisphaericis; bracteis linearibus tubo corollino multo brevioribus. ♄ — Petioli 3–4 lin. longi, folia bipollicaria, pollicem lata, acute serrata, utrinque scabra, infra in nervis breviter pilosa. Pedunculi sub anthesi pollicares, post anthesin bipollicares. Corolla lilacina, demum coerulescens. — *L. nivea* var. *mutabilis* Hook. Bot. Magaz. t. 3110. — Crescit......?

10. L. MELISSAEFOLIA Ait. Hort. Kewens. (edit. 2.) II. 352. — Caule tetragono aculeato; foliis petiolatis oppositis ovato-oblongis villosis mollibus; spicis hemisphaericis; bracteis tubo corollino dimidio brevioribus. ♄ — *Camara Melissae folio flore flavo* Dill. Hort. Eltham. 66. t. 57. fig. 66. — *Lantana flava* Medic. Act. Palatin. III. Phys. 225. — Crescit in India occidentali.

11. L. MULTIFLORA Otto et Dietr. Allgem. Grtnztng. IX. 370. — Ramis quadrangularibus adpresse pilosis aculeatis; foliis oppositis petiolatis oblongo-ellipticis vel lanceolatis, utrinque acutatis, crenatis scabris glabrescentibus, subtus pallidioribus; pedunculis folio longioribus; capitulis subumbellaribus; bracteis linearibus corollae tubo brevioribus. ♄ — Rami ad nodos crebre aculeolati, aculei recurvati. Petioli semipollicares, folia bipollicaria, pollice latiora vel multo angustiora; basi abrupte attenuata. Pedunculi sub anthesi longitudine foliorum, demum longiores. Corolla lilacina. — Crescit in India occidentali? (v. s. cult. specim. pessim.)

12. L. CAMARA Linn. Spec. plant. 874. — Ramis quadrangularibus breviter pilosis inermibus vel brevissime aculeolatis, foliis petiolatis ovatis, basi attenuatis crenatis, supra scabris, subtus hirtellis; pedunculis axillaribus folio brevioribus; capitulis subumbellaribus; bracteis linearibus tubo corollino multo brevioribus. ♄ Petioli pollicares, folia 2–3-pollicaria, 1½–2 poll. lata basi rotundata, subcordata, grosse crenata, supra calloso-scabra, infra subcanescentia. Corolla flava, demum aurantiaca. Drupa succosa, ossiculo triloculari dispermo. — (Grtnr. De fructib et seminib. pl. I. 267. t. 56. fig. 4.) — *Camara alia flore variegato non spinosa* Plum. Gener. 32. ic. 71. fig. 1. — Pluken. Almath. 385. t. 114. fig. 4. — *Viburnum Americanum Urticae foliis, Lamii odore, floribus miniatis* Commel. Hort. I. 151. t. 78. — Crescit in America calidiore. (v. v. c.)

13. L. PURPUREA Hornem. Hort. Hafn. ??? — Spr. Syst. veget. II. 761. no. 2. — Ramis quadrangularibus puberulis aculeatis; foliis petiolatis subcordatis acuminulatis, supra scaberrimis, subtus praecipue in nervis venisque molliter piloso-hirsutis grosse serrato-crenatis; pedunculis axillaribus folia subaequantibus paullove superantibus; bracteis (ovato-oblongis?) linearibus obtusis hirsutis, tubo corollino multo brevioribus. ♄ — Video specimen unicum pessimum. Folia adjecto petiolo 4-lineari fere bipollicaria, pollicem lata. Pedunculi bipollicares apice incrassati. Corolla purpurea. — Hanc ad *L. Camaram* referendam esse crederem. — Crescit in America australi.

§. 2. *Inermes.*

* *Foliis verticillatis.*

14. L. TRIFOLIA Linn. Spec. plant. 873. — Ramis rigidis sexangularibus dense pilosis; foliis ternis quaternisque verticillatis subsessilibus elliptico-oblongis ovatisve, utrinque attenuatis, supra rugosis asperis hirsuto-pilosulis, infra canescenti-tomentosis, crenato-serrulatis; pedunculis axillaribus folio brevioribus hirsutis; capitulis spicatis multifloris; bracteis ex ovata basi longe acuminatis tubo corollino brevioribus. ♄ — Rami strictissimi crassi hexagono-polyedri sulcati hirsuto-pubescentes saepeque canescentes. Internodia plantae spontaneae 1–2-pollicaria, cultae semipollicaria. Folia tripollicaria, 1–1¼ poll. lata, basi integerrima longe attenuata subsessilia, subtus molliter canescenti-tomentosa. Pedunculi axillares, plantae cultae 9 lin. longae vel semipollicares, spontaneae bipollicares. Spica pollicaris jam florifera elongata. Bracteae longe acuminatae

pilosae hirsutae. Corolla pulcberrime lilacina ad faucem lutescens, extus puberula, quam bractea longior. Drupa irregularis succosa?, putamine lignescente biloculari. — *L. pilosa* Poeppig. Hb. fl. Peruv. nec H. B. Kth. — *Myrobatindum spicatum etc.* Vaill. Act. Paris. 1722. p. 277. — *Camara trifolia purpurascente flore* Plum. Gener. 32. icon. 70. — *Periclynemum rectum humilius* Sloane, Histor. Jamaic. II. 82. t. 195. fig. 3. (mala!) — Crescit in Peruvia subandina alibique in America calidiore. (v. s. sp. et cult.)

15. L. ODORATA Linn. Syst. veget. 474. — Hoytt. IV. 73. — Ramis quadrangularibus; foliis oppositis ternisque verticillatis lanceolato-ovalibus rugosis subsessilibus, capitulis axillaribus pedunculatis squarrosis; bracteis lanceolatis, corollis albis. ♄ — Species non satis nota, aromatica. — *Lantana aromatica foliis ternis etc.* Roy. — *Viburnum Salviae folio floribus albis* Herm. Prodr. 384. — Crescit in India occidentali.

16. L. SALICIFOLIA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 259. † — Ramis subteretibus albido-pubescentibus; foliis ternis lanceolatis, utrinque angustatis leviter crenatis rugosis reticulato-venosis, supra scabris, subtus incano-pubescentibus; pedunculis axillaribus solitariis folio brevioribus; capitulis subglobosis; bracteis lanceolatis flore duplo brevioribus. ♄ — Folia rigida 2½ poll. longa, 8–9 lin. lata, petioli duas lineas longi incano-pubescentes. Pedunculi floriferi 8 lin., fructiferi 16 lin. longi teretiusculi pubescentes. Flores 5 lin. longi. Bracteae lanceolatae tubo corollae duplo breviores, exteriores multo majores involucrantes. Reliqua ignota. — Crescit in umbrosis Novae Andalusiae.

17. L. CELTIDIFOLIA H. B. Kth. l. c. † — Ramis tetragonis strigoso-scabris; foliis ternis ovato-oblongis acuminatis crenato-serratis, supra scabris, subtus pubescenti-hirtis glanduloso-punctatis; pedunculis axillaribus cum capitulo oblongo-cylindraceo folium subaequantibus; bracteis ovatis acuminato-cuspidatis flore duplo brevioribus. ♄ — Frutex suborgyalis. Folia basi in petiolum 3–4 lin. longum strigoso-scabrum attenuata membranacea reticulato-venosa subqninquepollicaria, 20–22 lin. lata. Pedunculi axillares solitarii, rarius gemini, 2-pollicares tetragoni strigoso-scabri, capitula semipollicaria oblongo-cylindracea. Flores 2½ lin. longi. Calyx brevissimus subbidentatus. Corolla extus puberula, purpurea, fauce aurantiaca. Drupa globosa magnitudine grani *Piperis nigri* bilocularis. — Crescit in ripa fluminis Magdalenae prope Teneriffe, Mompox et Nares.

18. L. PILOSA H. B. Kth. l. c. 260. † — Ramis subhexagonis piloso-hispidis; foliis ternis breviter petiolatis ovato-oblongis acutis crenato-serratis rugosis, supra pilosis, subtus molliter canescenti-hirtis; pedunculis axillaribus solitariis angulatis hispidis cum capitulo oblongo-cylindraceo folium subaequantibus; bracteis ovatis acuminato-cuspidatis, flore duplo brevioribus. ♄ — Folia reticulato-venosa rigida tripollicaria, vix sesquipollicem lata, petioli vix 2 lin. longi piloso-hispidi. Pedunculi bipollicares, capitula 6–8 lin. longa. Reliquis notis praecedenti simillima. — Crescit in insula Cuba inter Havanam et portum Batabano.

** *Foliis oppositis.*

19. L. ANNUA Linn. Spec. plant. 874. — Bot. Magaz. t. 1022. — Willd. Spec. plant. III. 316. — Caule erecto simplici tetragono pilosissimo hispido; foliis petiolatis, subcordatis oblongis acuminatis, supra strigulosis asperis, infra in nervis longius pilosis subcanescentibus serrato-crenatis; pedunculis axillaribus folio multo brevioribus; capitulis subglobosis; bracteis ex ovata basi longe acuminatis, corollae tubo brevioribus. ⊙ — Herba pedalis, habitu *Lamiorum* nonnullorum. Internodia inferiora tripollicaria, suprema tandem semipollicaria. Caules pilosissimi hirsuti acute quadrangulares basi lignescentes. Petioli alati semipollicares, folia ipsa 2–2½-pollicaria, 1–1½ poll. lata, opposita vel rarissime terna verticillata. Pedunculi ad summum pollicares, hirsutissimi. Bracteae 4 lin. longae ovato-lanceolatae acuminatae. Corolla alba vel carnea, fauce lutea. Drupa......? — *L. trifolia* Medicus, Act. Palatin. III. 222? — *Periclynemum rectum humilius etc.*

Sloane, Jamaic. II. 82. t. 195?? — (ad *L. trifoliam* relata est.) — Crescit in America calidiore. (v. s. cult.)

20. L. RECTA Ait. Hort. Kewens. (edit. 1.) II. 351. — Jcq. Hort. Schoenbr. III. 59. t. 360. — Ramis teretiusculis cinerascentibus pubescentibus; foliis petiolatis subcordato-ovatis obtusis vel subrotundo-ovatis, grosse crenato-serratis, supra rugosis striguloso-asperis, infra reticulato-venosis incano-pubescentibus; pedunculis folio longioribus; capitulis hemisphaericis; bracteis orbicularibus acutiusculis ciliatis, dorso piloso-hispidis tubo corollino brevioribus. ♄ — Internodia caulina pollicaria et longiora, ramealia saepius duplo triplove breviora. Petioli 3 lineas longi, folia pollicaria, 7–8 lin. lata, superiora florifera multo minora. Pedunculi 9 lin. longi, capitulum subhemisphaericum, inter minora. — Folia semper opposita, nunquam terna, saepius triangularia acutiuscula, saepius subtus canescentia, pedunculi foliis nunc longiores, nunc breviores. — Proxima sane est *L. involucratae,* quam e terra Americana continentali allatam esse nescimus. — *L. parvifolia* Salisb. Prodr. chapel Allerton. 107. ex Willd. Spec. pl. III. 319. — *L. latifolia* Tausch, Flora (B. Z.) XIX. 391?*) — [*L. recta* Otto et Dietr. Allgem. Gartenztng. 371. no. 13. hujus loci non esse videtur.] — Crescit in Brasilia tropica. (v. s. sp.)

21. L. ALBA Miller ex Lnk. Enumer. pl. hort. Berol. II. 126. no. 1421. — Ramis obsolete tetragonis setoso-scabris; foliis breviter petiolatis subrotundo-ovatis acuminatis grosse serrato-crenatis, supra asprellis, subtus molliter pubescentibus; pedunculis axillaribus hirsutis folio saepius longioribus; capitulis floriferis hemisphaericis; bracteis exterioribus involucrantibus maximis suborbicularibus acuminulatis flores superantibus, interioribus sensim angustioribus. ♄ — Rami virgati simplices, internodia 1½–2-pollicaria, petioli 3 lin. longi, folia 2–2¼ poll. longa, 1–1½ poll. lata, acuminata grosse crenato-serrata. Pedunculi pollicares vel etiam tripollicares hirsuti. Bracteae extimae saepe foliiformes basique in petiolum cuneatae, saepius tamen membranaceae extus puberulae orbiculari-ovatae, semipollicem fere longae, interiores ovatae ciliatae, drupam succosam irregularem involventes. Drupa monopyrena, pyreno osseo biloculari. — *L. leucantha* Hortor. — *L. dubia* Wall. Cat. 1823? — Royle, Illustr. of Him. pl. t. 73. fig. 3. eadem esse videtur. — Crescit in America calidiore.

22. L. DUBIA Wall. Catal. no. 1823. ex Royle, Illustr. of Himal. pl. 300. t. 73. fig. 3. — Fruticosa inermis: foliis oppositis cordato-ovatis acuminatis serratis scabris, subtus sericeo-pilosis; ramis quadrangularibus hispidis; pedunculis axillaribus folia aequantibus; capitulis rotundatis, demum elongatis spicaeformibus; bracteis foliaceis cordatis squarrosis. ♄ — Crescit in India orientali Himalayensi.

23. L. INVOLUCRATA Linn. Amoenit. acad. IV. 319. — Ramis subtetragonis asprello-puberulis; foliis oppositis ternisque petiolatis oblongo-ovatis, utrinque acuminulatis vel obovato-subrotundis obtusissimis, rugulosis crenulatis, supra scabrellis, infra reticulato-venosis pubescentibus; pedunculis axillaribus folio brevioribus vel subaequalibus; capitulis hemisphaericis; bracteis exterioribus lanceolatis foliaceis involucrantibus, interioribus ovatis acuminulatis tubo corollae longioribus. ♄ — Frutex parvus subcanescens. Internodia brevissima. Petioli 2–5 lin. longi, folia pollicaria vel sesquipollicaria, 5–10 lin. lata, basi attenuata integerrima caetero margine crenulata, subacuminata obtusa. Pedunculi 6–21 lin. longi hispiduli. Capitula hemisphaerica, bracteae extimae involucrantes saepe lanceolatae foliaceae 3–4 lin. longae, interiores obovatae obtusissimae ciliatae. Corolla parva extus puberula lilacina, fauce lutea. — *L. lanuginosa* Mill. Dict. — *Viburnum Americanum odoratum folio parvo orbiculato floribus et baccis folio interceptis* Pluk. Almath. 386. t. 114. fig. 5.

*) *L. LATIFOLIA Tausch, Flora XIX.* 391. — *Inermis: foliis oppositis late ovatis acutis, subtus subcanescentibus; capitulis axillaribus pedunculatis folio brevioribus capitatis involucratis involucris ovatis acutis, quam flores (albi) brevioribus.* ♄ — *Crescit......?*

β. incana: foliis oblongo-obovatis subrotundisque obtusissimis utrinque incano-pubescentibus mollibus subrugosis. — *L. incana* Otto et Dietr. Allgem. Gartenzeitng. IX. 371. — Crescit in America calida.

24. L. SALVIAEFOLIA Jcq. Hort. Schoenbr. III. 18. t. 285. — Caule erecto fruticoso opposite ramosissimo; ramis teretibus pubescenti-scabris; foliis breviter petiolatis ovatis acuminatis vel ovato-ellipticis obtusiusculis, supra scaberrimis, infra pubescenti-hirtis subincanis, reticulato-venosis crenato-serrulatis; pedunculis axillaribus folio brevioribus; capitulis globosis; bracteis extimis late cordatis acuminatis pilosis nervosis tubo corollino brevioribus. ♄ — Rami saepius virgati simplices vel breviter ramulosi, internodia 2-pollicaria, sesquipollicaria vel breviora. Petioli 2–3 lin. longi, folia pollicaria vel sesquipollicaria in petiolum attenuata, 6–9 lin. lata, acuminata vel obtusa, rugosa, supra scaberrima, infra subcanescentia piloso-hispida, praesertim in nervis venisque valde prominentibus. Pedunculi semipollicares vel breviores sub capitulo incrassati pubescenti-scabri. Corolla pallide rosea subalbida, fauce lutescente. Drupam maturam videre non contigit. — *L. rugosa* Thnbrg. Flor. Capens. 459. — *L. fucata* Ker, Bot. Regist. t. 798. — Crescit in Promontorio bonae spei et in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

25. L. LAVANDULACEA Willd. Spec. plant. III. 319. — Jcq. Hort. Schoenbr. III. 59. t. 361. — Foliis lanceolatis acutiusculis crenulatis, basi attenuatis integerrimis, supra scabris, subtus hirtis; capitulis cylindraceis densis; pedunculis folio brevioribus; bracteis subrotundis acutis, corollae tubo brevioribus. ♄ — Folia densa, internodia brevia 6–9 lin. longa, petioli vix 2 lin. longi, folia 1–2-pollicaria, 6–10 lin. lata, utrinque attenuata crenato-serrulata, supra scaberrima, subtus piloso-hispida pallidiora. Capitula florum parva 2–3 lin. longa cylindracea. Bracteae subrotundae acutae tubo corollino breviores. Corolla parva alba. — Forte ad *Lippiam* removenda. — Crescit in America calidiori. (v. s. c.)

26. L. PSEUDO-THEA St. Hil. Pl. us. des Brasil. t. 40! † — Viscoso-hirta fruticosa: ramis teretibus; foliis sessilibus obovatis oblongisve cuneatis obtusiusculis crenatis reticulato-nervosis; pedunculis axillaribus solitariis folium subaequantibus; capitulis subglobosis parvifloris. ♄ — Fruticulus quinquepedalis viscosus. Folia dense aggregata, internodiis vix 3 lin. longis, exacte sessilia, basi attenuata, 1–1½-pollicaria, semipollicem lata obtusa crenulato-serrata reticulato-venosa. Pedunculi in axillis foliorum superiorum iisque subbreviores. Capitula 3 lin. diametro habent; bracteae cordatae piloso-ciliatae subtrinerves. Calyx brevissimus pilosus bifidus. Corolla bractea parum longior, tubulosa puberula, oblique quadriloba. — Herba aromatica aqua infusa pro *Thea* ab incolis adhibetur. — Crescit in Brasiliae provincia Minarum Generalium ad Serra de Cadonga etc.

27. L. CHAMAEDRYFOLIA Chamisso, Linnaea VII. 127. † — Fruticulosa erecta: caulibus teretiusculis pedunculisque oppositis elongatis fastigiatim caules superantibus puberulis; foliis subsessilibus ovatis suborbiculatisve grosse profunde acuteque serratis, supra scabris, margine pilis antrorsis brevibus rigidis albis ciliatis, nervo venisque subtus pilis iisdem rarescentibus munitis; capitulis semiglobosis. ♄ — Caules e rhizomate lignoso plures 4–6-pollicares saepe ramosissimi, internodiis semipollicaribus pollicaribusque. Folia subopposita, petiolo brevissimo vix lineam longo, ad summum semipollicaria, 4–6 lin. circiter lata. Pedunculi ex axillis foliorum mediorum, summitatem sterilem superantes 2–3-pollicares. Bracteae involucrantes integerrimae saepius anguste ovatae acuminatae, corollis paullo vel dimidio breviores. Corollae tubus 4 lin. longus puberulus, faux infundibuliformis, limbus sat amplus margine crenulato-undulato. — Crescit in Brasilia tropica. (v. s. sp.)

28. L. SELLOWIANA Lnk. et Otto, Abbldngn. von seltenen Gewächs. 107. t. 56. — Maund et Henslow, The Botanist III. t. 115. — Hook. Bot. Magaz. t. 2981. — Chamisso, Linnaea VII. 126. — Fruticulosa erecta: caulibus teretiusculis puberulis; foliis breviter petiolatis ovatis obtusiusculis grosse serratis, supra scabrellis, infra ad nervos pilosulis; pedunculis axillaribus terminalibusque folio multoties longioribus; capitulis subglobosis; bracteis late cordatis obtusiusculis piloso-hirtellis,

tubo corollino puberulo multo brevioribus; limbi corollini laciniis subrotundis. ♄ — Planta culta spontaneae simillima, sed densius foliosa et flores majores. Caules e rhizomate lignoso plures pedales altioresque, internodia inferiora bipollicaria, superiora pollicaria. Folia adjecto petiolo 3 lin. longo pollicaria, semipollicem lata, acuta vel frequentius obtusiuscula. serraturis saepius rotundis, rarius acutis. Pedunculi 2–3–4-pollicares puberuli, capitula 9 lin. longa, semipollicem crassa. — *L. decumbens* Sellow mss. — *L. reticulata* Pers. Enchirid. II. 141. ex Prsl. Repert. bot. system. I. 189? *) — *Lippia Montevidensis* Spr. Syst. veget. Cur. post. 231.

α. rugosa Chamisso l. c. — Ex toto uberiore pube crebrioribusque pilis munita: foliis rugosis acutius interdum serratis acutioribusque; bracteis involucrantibus late ovatis acuminatis acutis, drupa succosa, putamine lignescente ellipsoideo rugoso integro biloculari dispermo septicide bipartibili, segmentis dorso crassis, facie tenuibus planis, axi sesquilineam metiente. (v. s. sp.)

β. planifolia Chamisso l. c. — Parcius pubescens pilosa: foliis planis obtusis interdum serratis obtusioribusque; bracteis involucrantibus latioribus suborbiculatis acuminulatis acutis, drupa minori, putamine molliore. — Crescit in Brasilia, S. Joze do Uruguay, Chapicuy, Rio Pardo etc. (v. v. c. et s. sp.)

γ. longifolia Hook. Bot. Magaz. t. 3941. — Foliis lanceolatis subtripollicaribus, semipollice latioribus remote serratis, pedunculis folio multo longioribus, bracteis ovato-lanceolatis. — Crescit in Montevideo.

29. L. TEUCRIIFOLIA Otto et Dietr. Allgem. Gartnzeitng. IX. 371. † — Ramis obsolete tetragonis puberulis; foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis serratis, basi acutatis integerrimis quintuplinerviis, supra scabriusculis, subtus subhirtis; pedunculis folio brevioribus axillaribus solitariis; capitulis hemisphaericis; bracteis ovatis tubum corollae aequantibus. ♄ — Frutex ramosissimus, petioli vix ultra 3 lin. longi, folia ultra bipollicaria, vix pollicem lata, in petiolum angustata, vix rugulosa, subtus praecipue ad nervos pilosula. Pedunculi folio triplo breviores pilosi. Capitula densiflora. Bracteae ciliatae, dorso vix pilosae, tubum corollae aequantes. Corolla alba, fauce flavescente. — Mexico.

30. L. LAMIIFOLIA Otto et Dietr. l. c. 372. † — Ramis adpresse pilosulis obsolete tetragonis; foliis petiolatis oblongo-ovatis vel oblongo-lanceolatis acuminatis serratis, basi acutatis integerrimis, multiplinerviis rugosis, supra mollibus, subtus albidis pubescentibus; pedunculis axillaribus folio brevioribus; capitulis hemisphaericis; bracteis lanceolatis tubo corollae subbrevioribus. ♄ — Valde affinis *L. teucriifoliae* sed differre dicitur. Petioli 3–4 lin. longi. Folia bipollicaria, pollice latiora vel angustiora, basi in petiolum abrupte attenuata multiplinervia rugosa. Pedunculi folio triplo breviores pilosi. Bracteae late lanceolatae, exteriores tubum corollae purissime albae aequantes. — *L. hirta* Grah. New Edinbrgh. philos. journ. II. 186? **) — Crescit in Mexico.

31. L. GEROLDIANA Otto et Dietr. l. c. † — Ramis quadrangularibus adpresse pilosis scabris; foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis crenatis, basi cuneatis integerrimis multiplinerviis, utrinque scabris rugosis hirtis; pedunculis axillaribus folium superantibus; capitulis hemisphaericis; bracteis late ovatis tubum corollae subaequantibus. ♄ — Petioli 2–3 lin. longi, folia 1½–2 poll. longa, 9–12 lin. lata, crebre crenata, basi cuneata in petiolum attenuata integerrima, utrinque rugosa piloso-scabra. Pedunculi primum folio vix longiores, demum elongati.

---

*) *L. RETICULATA Pers. l. c. — Caule fruticoso inermi; foliis oppositis ellipticis acutis in petiolum brevem attenuatis serratis, hispidulis, superne nitidis; pedunculis folium subaequantibus; capitulis involucrato-foliosis; bracteis subcordatis. ♄ — Crescit in insula Sti. Dominici.*

**) *L. HIRTA Grah. New Edinbg. phil. Journ. II.* 186. † — *Inermis: foliis ovato-lanceolatis acuminatis, rugosis, supra hirtis, subtus nitidis, serrato-crenatis, basi cuneatis integerrimis; pedunculis axillaribus folio brevioribus; bracteis ovatis, acuminatis. ♄ — Crescit in Mexico.*

Bracteae exteriores flore sublongiores, interiores tubum corollinum aequantes. Corolla alba, ad faucem sublilacina. — Crescit in Mexico.

32. L. RADULA Swrtz. Prodr. fl. Ind. occid. 92., Fl. Ind. occid. II. 1057. † — Ramis tetragonis sulcatis asperrimis setoso-pilosis; foliis oppositis petiolatis rhombeo-ovatis acuminatis grosse acuteque serratis bullato-rugosis, supra setoso-asperis, subtus hirsutissimis reticulato-venosis; pedunculis axillaribus solitariis tetragonis asperis; capitulis oblongis subsquarrosis; bracteis ovatis acuminatis hirsutis. ♄ — Petioli fere pollicem longi, folia ipsa bipollicaria, pollice latiora, basi cuneata in petiolum attenuata. Pedunculi tripollicares vel longiores, capitula pollicem circiter longa. Corolla lilacina, rubescens vel coerulescens. Bracteae exteriores fere corollae longitudine, interiores breviores. — Crescit in insulis Sti. Vicentii et Sti. Dominici.

33. L. LILACINA Dsf. Cat. hort. Paris. (ed. 3.) 392. — Otto et Dietr. Allgem. Gartnztng. IX. 373. † — Ramis quadrangularibus adpresse pilosulis; foliis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi rotundatis rugosis crenatis, supra scabro-hirtis, subtus albido-(?)subtomentosis; pedunculis axillaribus folium superantibus hirtis; capitulis hemisphaericis subumbellaribus; bracteis exterioribus lanceolatis involucrantibus, interioribus angustioribus, omnibus tubo corollino puberulo brevioribus. ♄ — Valde affinis est *L. salviaefoliae*, sed differre videtur bracteis ovato-lanceolatis pedunculisque folio longioribus. — Petioli 3–4 lin. longi, folia 1–1½-pollicaria, 6–9 lin. lata, ex ovata basi lanceolata acuminata, saepe jam a medio in petiolum attenuata, supra laete viridia rugoso-scabra, infra pallidiora subcanescentia tomentosa. Pedunculi 1½–2-pollicares strigulosi. Capitula multiflora subumbellaeformia. Corolla magna pulcherrime lilacina, tubo 4–5 lin. longo. Drupa calyce tecta succosa? bilocularis, putamine lignescente. — Crescit in Brasilia. (v. s. c.)

34. L. HISPIDA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 260. † — Ramis tetragonis hispidis; foliis petiolatis ovatis, utrinque acutis serrato-crenatis rugosis, supra hispido-scabris, subtus piloso-hispidis; capitulis hemisphaericis folium subaequantibus; bracteis oblongo-lanceolatis flore duplo brevioribus. ♄ — Folia basi in petiolum 3 lin. longum hispidum attenuata, bipollicaria, pollicem lata, subtus pallidiora. Pedunculi hispidi sesquipollicares. Flores 3 lin. longi. Calyx brevissimus glabriusculus subintegerrimus. — Reliqua haud satis nota. — *L. Radulae* affinis. — Crescit in devexis montium prope Xalapam in Mexico.

35. L. RUGULOSA H. B. Kth. l. c. 261. † — Ramulis tetragonis pilosulo-hispidis; foliis petiolatis ovatis acuminatis, supra bullatis scabris; subtus canescentibus tomentoso-hispidis; pedunculis axillaribus tetragonis piloso-hispidis folio duplo longioribus; capitulis hemisphaericis; bracteis oblongis acuminatis flore duplo brevioribus. ♄ — Frutex quadripedalis, folia basi in petiolum angustata crenata reticulato-venosa, in petiolum 3 lin. longum piloso-hispidum attenuata 2½-pollicaria, vix sesquipollicem lata. Pedunculi tetragoni piloso-hispidi subtripollicares. Flores 6–7 lin. longi. Bracteae trinerviae, extus piloso-hispidae, inferiores multo majores. Calyx brevissimus subintegerrimus pilosus. Corolla extus puberula lilacina, tubo arcuato, medio inflato. Drupa globosa basi tubo corollae tecta rubra, magnitudine *Pisi* minoris bilocularis, loculis monospermis. — Crescit in alta planitie Quitensi juxta Hambato in radicibus montis ignivomi Cotopaxi.

36. L. STRICTA Swrtz. Prodr. 92. et Flor. Ind. occid. II. 1055. — Ramis teretibus, ramulis tetragonis cinerascentibus; foliis petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis rugosis, supra asperis breviterque pilosis, subtus albido-villosis reticulato-venosis, crenatis; pedunculis axillaribus folia aequantibus vel subsuperantibus teretiusculis; capitulis subrotundo-ovatis squarrosis; bracteis ovato-lanceolatis pubescentibus, flore parum brevioribus. ♄ — Caules 2–3-pedales. Petioli semipollicares subasperi, folia vix bipollicaria rigidula. Corollae pallide purpureae, illis *L. annuae* duplo minores. Drupa subrotunda sanguinea. — *Periclymenum rectum Salviae folio etc.* Sloane, Jamaic. II. 81. t. 195. fig. 4. — *L. angustifolia* Mil-

ler. — *L. suaveolens* Poir. ex Spr. Syst. vegetab. II. 762. no. 8. — *L. involucrata* Forsk. — Crescit in fruticetis insulae Jamaicae. — Species nonnisi verbis datis nota recognoscenda, forte cum *L. lilacina* et *salviaefolia* consocianda?

37. L. GLUTINOSA Poeppig in Otto et Dietr. Allgem. Gartnztng. X. 315. — Subglutinoso-villosa fruticosa: ramis quadrangularibus hirsuto-pilosis; foliis longiuscule petiolatis ovatis acuminatis, basi subcordatis crenatis scabriusculis; pedunculis folio brevioribus; capitulis subumbellaribus; bracteis lanceolatis tubum corollae subaequantibus. ♄ — Frutex 2-3-depalis, undique hirsuto-pilosus et viscido-glandulosus. Folia quinquepollicaria, 3 poll. lata acuminata, basi cordata, in petiolum attenuata. Petioli bipollicares canaliculati. Pedunculi quadrangulares bipollicares. Bracteae tubo corollino ultra duplo breviores. Tubus corollinus semipollicaris, basi albus, supra roseus, dense pilosus, limbus primum luteus, tunc lilacinus demumque aurantiacus. Drupa succosa viscida magnitudine *Pisi* minoris. — Crescit in Peruvia.

38. L. MORITZIANA Otto et Dietr. l. c. IX. 369. † — Ramis quadrangularibus adpresse piloso-scabrellis; foliis petiolatis oblongo-ovatis acuminatis, basi attenuatis crenatis, supra setuloso-scaberrimis, subtus praesertim in nervis venisque pubescenti-hirsutis; pedunculis folio brevioribus axillaribus solitariis, capitulis subumbellaribus; bracteis lanceolato-linearibus, extus piloso-asperis acuminatis, tubo corollino brevioribus. ♄ — Frutex pluripedalis ramosus; petioli canaliculati semipollicares, folia quadripollicaria, 2 poll. lata, longe acuminata, basi latiora, in petiolum abrupte attenuata rugulosa. Pedunculi folio parum breviores, breviter pilosuli. Capitula hemisphaerica, floribus subumbellatim patentibus. Corollae luteae, demum aurantiacae puberulae. — Bracteae ab ipsis auctoribus appellantur „subulatae brevissimae", in specimine suppetente sunt lineari-lanceolatae acuminatae, tres lineas longae, lineam latae. — Crescit in Carracas. (v. s. c.)

39. L. SCABIOSAEFOLIA H. B. Ktb. Nov. gener. et spec. pl. II. 261. † — Fruticosa procumbens: ramis teretiusculis glabris; foliis petiolatis ovatis acutis serratis, supra hispido-scabris subbullatis, subtus molliter incano-pilosis; pedunculis canescenti-pilosis folio duplo longioribus; capitulis hemispbaericis; bracteis lanceolatis florem subaequantibus. ♄ — Frutex graveolens, ramuli sericeo-pubescentes. Folia basi in petiolum 2 lin. longum attenuata reticulato-venosa subpollicaria. Pedunculi 1½-2-pollicares. Capitula *Scabiosae*, flores 3 lin. longi Bracteae exteriores interioribus duplo triplove majores involucrum referentes Calyx brevissimus bifidus pilosus. Corolla flava glabriuscula, tubo medio curvato inflato. Drupa globosa, exsiccata polyedra umbonata bilocularis, grani Cannabini magnitudine. — Crescit in scopulosis Andium Peruvianorum prope pagum Guancabamba.

40. L. CANESCENS H. B. Kth. l. c. 259. † — Ramis tetragonis strigosis; foliis oppositis petiolatis ovato-oblongis acuminatis, basi in petiolum angustatis crenato-serratis reticulato-venosis, supra scabris, subtus canescenti-hirtis; pedunculis axillaribus folio brevioribus; capitulis hemisphaericis; bracteis ovato-oblongis acutis, flore triplo brevioribus. ♄ — Suffrutex aromaticus. Folia quadripollicaria, sesquipollicem lata, petioli subsemipollicares strigosi. Pedunculi pollicares aut sesquipollicares teretes strigosi. Flores sessiles 2½ lin. longi. Bracteae subtrinerviae. Calyx subbidentatus. Corolla alba, tubo extus puberulo, supra medium inflato, limbo patente irregulari. — *L. mistae* affinis. — Crescit in umbrosis Novae Andalusiae juxta Bordones, Cumana et Queteppe.

41. L. (CHARACHERA Forsk. Descr. pl. Aeg. 116.) VIBURNOIDES Vahl, Symb. bot. I. 45. — Willd. Spec. plant. III. 316. — Ramis acute quadrangularibus pilosis; foliis petiolatis ovatis acutis, basi attenuatis serratis, supra rugosis scaberrimis, subtus molliter villosis; pedunculis axillaribus solitariis folium superantibus; capitulis subglobosis; bracteis lineari-lanceolatis capitulo brevioribus. ♄ — Petioli semipollicares, folia ipsa pollicaria, 8-9 lin. lata, grosse crenato-serrata, supra asperrima rugosa pilosula, subtus molliter pubescentia. Pedunculi pilosi. Corolla pubescens. — Crescit in Arabiae felicis monte Barah.

42. L. BRASILIENSIS Lnk. Enumer. pl. hort. Berolin. II. 126. no. 1420. — Fruticosa ramosissima: ramulis adpressissime piloso-scabris quadrangularibus; foliis breviter petiolatis elliptico-ovatis, utrinque longe attenuatis remote serrato-subcrenatis, membranaceis, supra adpresse hispido-scabrellis, infra praesertim ad venas piloso-hispidis; pedunculis axillaribus brevissimis; capitulis oblongis; bracteis lineari-lanceolatis acuminatis ciliatis, corollae tubum subaequantibus. ♄ — Internodia brevissima 6–9 lin. longa, folia magnitudine valde differentia, sesquipollicaria, semipollicem lata et quadripollicaria, sesquipollicem lata, basi in petiolum brevissimum canaliculatum attenuata, remote crenato-serrata, membranacea. Pedunculi axillares 3–4 lin. longi. Bracteae subpaleaceae lanceolato-lineares semipollicares subscariosae, dorso piloso-hispidae. Calyx brevissimus albo-tomentosus. Corollae tubus extus puberulus, 9 circiter lin. longus, albus, fauce lutescente. Drupa......? — *L. spicata* Arrabida, Flor. Flumin. VI. t. 58? — Crescit in Brasilia. (v. s. cult.)

43. L. CINEREA Lam. ex Otto et Dietr, Allgem. Gartnztng. IX. 378. — Ramis quadrangularibus adpresse pilosis scabris; foliis petiolatis ellipticis acutis, basi attenuatis serratis subcinerascentibus, supra scabris, subtus molliter subtomentosis; pedunculis......? ♄ — Petioli semipollicares, folia ultra bipollicaria, pollice latiora acute serrata. — Praecedenti proxima esse dicitur. — Crescit......?

44. L. TILIAEFOLIA Cham. Linnaea VII. 122.† t. 7. fig. A. — Inermis aculeolataque: ramis tetragonis hirtis; foliis ovatis acuminatis acutis, cuneata truncata vel rotundata basi in petiolum brevem productis obtuse serratis, supra pilis antrorsis rigidis hirtis, subtus pilis mollibus rete vasculosum praecipue munientibus subvelutinis; pedunculis axillaribus hirtis folium subaequantibus (eodem brevioribus nec non longioribus); capitulis globosis; bracteis oblongis angustis hirtis, flore brevioribus. ♄ — Rami obtusanguli, internodia 2–3-pollicaria, supra hirto-pilosa, pilis glanduliferis viscidis saepe immixtis. Aculei dum adsunt sparsi ½–1 lin. longi recurvati. Folia ad summum tripollicaria, petiolo semipollicari, forma *Tiliarum* nostrarum folia omnino referentia, latitudine valde variantia, leviter reticulato-venosa, supra demum pilis callosis scabrida, subtus molliter subvelutino-tomentosa. Pedunculi 1½–4-pollicares, folio breviores longioresve, capitula hemisphaerica sub fructificatione globosa. Bracteae flore breviores lanceolatae vel ligulatae, acuminatae vel obtusae hirtae. Corollae tubus 4–4½ lin. longus extus pubescens, limbus bilinearis. Drupa succosa monopyrena e sectione *Camarae*. — Crescit in Brasilia meridionali prope Bahiam. (v. s. sp.)

† *Species omnino dubiae.*

45. L. LIPPIOIDES Spr. Syst. veget. II. 763. no. 24. — Inermis: foliis parvis oblongis, utrinque attenuatis subdentatis venosis, subtus ramisque pilosis; capitulis hemisphaericis; bracteis spathulatis tubum corollae aequantibus. ♄ — Crescit in Brasilia.

46. L. LIPPIOIDES Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 305. — Fruticosa: ramis angulatis (quadrangularibus?) scabris inermibus; foliis breviter petiolatis ellipticis rigidis serratis strigoso-scabris reticulatim venosis rugosis; pedunculis axillaribus solitariis petiolum aequantibus; capitulo subgloboso pedunculi longitudine; bracteis cordatis adpressis pilosis acutissimis. ♄ — Tota planta pilis albidis canescens. Folia pollicaria, supra rugosa, venis nervisque infra prominulis. — Num forte *Lippiae citratae* forma?? — Crescit in Mexico ad Talisco et Acapulco.

47. L. INCONSPICUA Tausch, Flora (B. Z.) XIX. 391. — Inermis: foliis oppositis late ovatis subcordatis acuminatis serratis scabris; capitulis axillaribus pedunculatis folium subaequantibus; capitulis involucratis; bracteis (exterioribus) ovatis acutis capitulum aequantibus. ♄ — Crescit......?

48. L. INDICA Rxb. Flor. Indic. (edit. 1832.) III. 89. — Fruticosa stricta: ramis quadrangularibus pilosis; foliis oppositis cordatis serratis rugosis; pedunculis solitariis axillaribus folio brevioribus; capitulis ovatis; bracteis ovato-lanceolatis;

drupa biloculari. ♄ — Rami obscure purpurascentes pauci. Folia breviter petiolata, infra pilosa, 3–4–pollicaria, 2–3 poll. lata. Pedunculi purpurascentes angulati pilosi. Bracteae e cordata basi lanceolatae acutae pilosae. Flores pallide rubentes inodori. Calyx parvus ciliatus obsolete divisus. Drupa globosa glaberrima purpurea, magnitudine *Pisi* minoris, putamine turbinato biloculari. — Species non satis nota. — Crescit in India orientali ad Mussoore.

49. L. PARVIFOLIA Dsfont. Catal. hort. Paris. (edit. 3.) 392. — „Fruticosa erecta: foliis ovato–ellipticis obtusis crenatis pubescentibus cinereis; pedunculis axillaribus folio longioribus; floribus capitatis. ♄ — Frutex erectus pubescens. Folia petiolata perennantia cinerea parva elliptica et obovata. Capitula florum subrotunda. Bracteae ovatae obtusae pubescentes.“ — Crescit......?

50. L. MOLLISSIMA Dsfont. l. c. 393. — „Foliis ovatis serratis, subtus molli lanugine pubescentibus; pedunculis axillaribus solitariis oppositis brevibus; capitulis globosis. ♄ — Frutex 3–5–pedalis inermis. Rami tetragoni, juniores pubescentes. Folia dentato-serrata, uncias 2–3 longa, 1–2 uncias lata acuta vel obtusa. Pedunculi solitarii brevissimi. Bracteae ovatae acuminatae villosae. Corolla rosea parva.“ — Crescit......?

51. L. SUAVEOLENS Dsfont. l. c. — „Fruticosa: ramis tetragonis hinc inde spinulosis, junioribus pubescentibus; foliis petiolatis ovatis obtusiusculis crenatis, subtus pallidioribus lanugine molli pubescentibus; pedunculis axillaribus; floribus capitatis flavis. ♄ — Folia 1–2 uncias longa, 8-9 lin. lata.“ — Crescit......?

†† *Species vix nota a genere verosimiliter removenda.*

52. L. RACEMOSA Loureiro, Flora Cochinchin. II. 457. (edit. Willd.) — „Arbor magna inermis. Rami patentes. Folia opposita subrotunda acuminata integerrima plana glabra dura obscure viridia, subtus albicantia, petioli longi, basi glandulosi. Flos albus magnus. Racemi compositi vasti nudi terminales. Calyx subtruncatus, denticulis 4—5 minimis. Corolla campanulata quinquefida snbaequalis. Drupa carnosa turbinata compressa, apice retusa, nuce biloculari. Stamina didynama. Stigma......? — Crescit in sylvis Cochinchinae, ubi ejus lignum caeditur ad aedificanda aedificia.

††† *Species prorsus incognitae.*

L. ALBOPURPUREA Dsf.
L. INERMIS Mill.
L. LOOKHARDTII G. Don.
L. MOLLIS Grah.
L. SCABRA Wall.
L. URTICAEFOLIA Mill.
L. WIGHTIANA Wall.

†††† *Species e genere excludendae.*

L. ABYSSINICA Otto et Dietr. = LIPPIA SCHIMPERI.
L. ACHYRANTHIFOLIA Dsf. = LIPPIA PURPUREA.
L. AFRICANA L. = SPIELMANNIA AFRICANA.
L. BULLATA Mill. = CORDIA CURASSAVICA.
L. CAPENSIS Thnbrg. = SPIELMANNIA AFRICANA.
L. CORYMBOSA L. = CORDIA LINEATA.
L. CRISPA Thnbrg. = SPIELMANNIA AFRICANA.
L. CUNEATIFOLIA Kltzsch. = LIPPIA CITRATA??
L. GEMINATA Spr. = LIPPIA GEMINATA.
L. LIPPIOIDES Hook. et Arn. = LIPPIA CITRATA??
L. ODORATA L. = LIPPIA CITRATA.
L. POLYCEPHALA R. Br. = LIPPIA SCHIMPERI.
L. SALVIFOLIA L. = BUDDLEJA SALVIFOLIA.

XXIII. (3710.) **PETRAEA** *Jcq.*

(Jcq. Plant. Americ. 14 t. 182. fig. 6. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 199.)

1. P. RUGOSA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 282. † — Ramis hirto-scabris; foliis brevissime petiolatis ellipticis, apice rotundata mucronatis, basi subcordatis integerrimis coriaceis reticulato-venosis, supra rugoso-scabris nitidis, subtus hirtis; racemis axillaribus terminalibusque solitariis erectis laxis. ♄ — Rami subangulati. Folia 26-27 lin. longa, sesquipollicem lata, petioli incrassati sesquilineam longi hirti. Racemi subquadripollicares; flores breviter pedicellati (pedicellis lineam longis hirtis) alterni oppositique. Bracteae lineares acuminatae hirtae, flore duplo breviores. Calycis hispiduli laciniae 5 obovato-oblongae obtusae reticulato-venosae patentes, dentes interjecti totidem brevissimi ciliati inaequales. Corolla violacea calyce brevior subaequaliter 5-fida. Stamina 4 subaequalia inclusa. — Crescit in territorio Caracasano.
2. P. ARBOREA H. B. Kth. l. c. † — Arborea: ramis laevibus, foliis brevissime petiolatis obovato-oblongis brevissime acuminatis, basi subcordatis, margine undulatis integerrimis coriaceis reticulato-venosis, supra nitidis scabris, subtus hirtellis; racemis axillaribus solitariis pendulis laxis. ♄ — Arbor 20-pedalis, ramis suboppositis teretibus. Folia 3-3½ poll. longa, 15-16 lin. lata, acumen obtusum. Racemi subtripollicares. Pedicelli 3-4 lineas longi cum rhachide pubescentes. Bracteae......? Calycis laciniae lineari-oblongae obtusae reticulato-venosae glabrae violaceae, dentes interjecti ovati obtusi ciliato-hispidi, tubo corollae adpressi. Corolla calyce dimidio brevior rubro-violacea extus puberula, limbi laciniae ovatae obtusae subaequales, superior albo-maculata. — Crescit in convalli temperata Araguensi prope villam Guacara et Hacienda del Cura, etiam prope urbem Curae.
3. P. BRACTEATA Steudel, Flora (B. Z.) XXVI. II. 764. — Fruticosa erecta?: foliis ovatis coriaceis, supra nitidis, subtus pallidioribus, utrinque reticulatis scaberrimis (6-7-pollicaribus) obtusis, junioribus acuminatis, petiolo dense villoso-setoso; racemis elongatis laxis; bracteis lanceolatis subscariosis ciliatis reflexis. ♄ — Crescit in territorio Surinamensi.
4. P. VOLUBILIS Jcq. Americ. 180. t. 114. — Lam. Illustr. gen. t. 539. — Curtis, Bot. Mag. t. 826. — Grtnr. De fructib. et seminib. II. 471. t. 177. — Knwls. et Wstctt. The floral Cabinet III. 69. t. 108. — Fruticosa volubilis: foliis breviter petiolatis ovatis vel late ovatis, basi obtusis et subcordatis, apice acutis nec acuminatis, integerrimis glabris, subtus minutissime scabrellis, supra vix asprellis, reticulato-venosis; racemis terminalibus vel rarius axillaribus. ♄ ⌒ — Ramuli tetragoni glabri, cortice cinereo tecti. Petioli brevissimi sesquilineares setulosi. Folia 3-4½-pollicaria, 2 poll. lata vel latiora, saepe minora sesquipollicaria, pollicem lata rotundato-ovata acuminulata, interdum apice obtusissimo emarginata, coriacea, supra nitida asprella, subtus prominule nervoso-reticulata scabrella, nervis venisque hinc inde hirtis. Racemi laxi saepe pedales oppositiflori. Pedicelli pollicares, floriferi breviores. Bractea ad pedicelli basin lineari-lanceolata acuta 6-9 lin. longa decidua. Calycis tubus et nervi tomentelli, laciniae ellipticae, obtusae, demum pollicares, 4 lin. latae membranaceae reticulato-venosae coeruleae, dentes interjecti ciliati obtusi brevissimi, corollae tubo appressi. Corollae extus puberulae laciniae ellipticae, intus pilosa. Stamina didynama brevissima inclusa.

   β. Mexicana Schiede, Linnaea VI. 373. — Racemis axillaribus sub anthesi foliis vix longioribus; foliis magis ellipticis, utrinque acutioribus, apice evidentius acuminatis. — (Berlandier, Pl. exs. 136. — *P. Mexicana* Willd. Herb. 11490.) (v. s. sp.)

   γ. Guianensis Schlchtd. Linnaea VII. 367. — Foliis ellipticis utrinque acuminatis. — *P. Stapelsiae* Paxton, Magaz. of bot. IV. 99. (c. ic.)? — Crescit in insulis Antillis, in Brasilia et Mexico, etiam in Guiana. (v. s. sp. et c.)
5. P. RACEMOSA Nees ab E. et Mart. Flora (B. Z.) 1821. I. 300. et Nov. act. acad. Leop. Carol. XI. I. 72. † — Volubilis: ramis glabris, ad nodos strigosis; foliis

oblongis ellipticisque in petiolum attenuatis, inferioribus obtusis mucronatis, superioribus acute cuspidatis, omnibus integerrimis membranaceis, utrinque glabris, subtus reticulato-nervosis ad nervos brevissime setulosis; racemis axillaribus oppositis vel ternis, quaternis pluribusve verticillatis. ♄ ⌒ — Rami squarrosi nodosi, novelli subangulati strigosi. Folia 2-3-pollicaria. Pedunculi dimidio pede saepe longiores subangulati breviter setulosi. Bracteae minutissimae squamaeformes. Pedicelli 4-5 lin. longi subsetosi. Calycis laciniae oblongae obtusae venoso-reticulatae cum tubo coeruleae, dentes interjecti triangulares obtusi brevissimi ciliati. Corolla extus pubescens, limbi laciniae orbiculatae faucem versus velutinae. — Crescit in Brasilia ad ripas fluvii „Rio grande del Belmonte".

6. P. MACROSTACHYA Bth. Journ. of nat. hist. II. 448. (et in Hook. Journ. of bot. II. 53.) — Arborea: foliis ovali-ellipticis breviter acuminatis scaberrimis; racemo elongato terminali; pedicellis fructiferis tubo calycis brevioribus; calycis laciniis lineari-oblongis subspathulatis acuminatis aristulatis. ♄ — Folia semipedalia. Racemus sesqui- vel bipedalis pendulus. Calyces florigeri subsessiles longiores et tenuiores quam in plerisque aliis hujus generis speciebus. — Crescit in Guiana Britannica. (v. s. sp.)

7. P. SUBSERRATA Chamisso, Linnaea VII. 369. † — Fruticosa volubilis: foliis breviter petiolatis lanceolatis, utrinque acutis vel oblongo-ellipticis ellipticisque, utrinque rotundatis integerrimis vel saepius dentatis; racemis axillaribus oppositis erecto-patentibus. ♄ ⌒ — Maxime affinis *P. racemosae*, sed racemi numquam verticillato-quaterni. Folia juniora lanceolata, nervo medio excurrente valide mucronata cuspidata, adulta utrinque rotundiora, mucrone breviori subevanido apice saepe emarginato, saepe obovata, basi numquam cordata, maxima $4^1/_2$ pollices longa, $1^3/_4$ poll. lata, petiolo 1-3 lin. longo. Racemi semipedales pedalesve pseudo-oppositiflori bracteolati et puberuli. Pedicelli semipollicares pollicaresve. Calyx sesquipollicaris coeruleus splendidus. Calycis dentes interjecti tubo corollae adpressi pubescentes. Corolla saturatius colorata subhypocraterimorpha, intus villosa, extus glabra. — *P. volubilis* Arrabida, Flor. Flumin. VI. t. 59. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

8. P. DENTICULATA Schrader, Goetting. gel. Anzeiger 1821. no. 72. pag. 712. — Fruticosa: foliis subsessilibus leviter cordatis subserrato-denticulatis rugosis scabris; racemis (axillaribus?) erectis; calycis laciniis obovatis. ♄ — In Brasilia.

† *Species e genere expellendae.*

P. DENTATA Spr. = PATAGONULA AMERICANA β. GLABRA Cham. et Schl.
P. OBLONGA Spr. = BANISTERIA......?

XXIV. (3705.) PETITIA *Jcq.*

(Jcq. Plant. Americ. t. 482. fig. 6. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 199.)

1. P. QUINDUENSIS H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 248. † — Foliis ovato-lanceolatis acuminatis, subtus glabris. ♄ — Arbor biorgyalis: ramis inferioribus pendulis, junioribus subteretibus laevibus puberulis viridibus. Folia decussato-opposita obovato-lanceolata acuminata breviter petiolata integerrima membranacea reticulato-venosa glabra tripollicaria et majora, nervus medius superne puberulus. Paniculae corymbosae axillares oppositae longe pedunculatae bracteolatae. Pedunculus pollicaris aut sesquipollicaris puberulus patens. Flores pedicellati. Calyx turbinato-campanulatus quadridentatus puberulus. Corolla infundibuliformis albida, tubus calyce sextuplo longior cylindraceus, faux sensim ampliata, limbi quadripartiti laciniae ovato-oblongae. Stamina quatuor exserta. Antherae ovatae biloculares erectae. Ovarium ovatum. Stylus staminibus brevior, stigma acutum. Drupa......? — Crescit in scopulosis Andium Quinduensium juxta „El Moral".

2. P. DOMINGENSIS Jcq. l. c. (pict. t. 259. fig. 5.) — Foliis ovato-oblongis acuminatis, subtus incano-tomentosis. ♄ — Rami teretes glabri, juniores subtetragoni cum petiolis, foliorum pagina inferiori et inflorescentiae ramis adpresse pulve-

rulento-tomentelli fulvi. Petioli 9–12 lin. longi. Folia 3–5½ poll. longa, 12–32 lin. lata, forma valde diversa, elliptica, ovato-elliptica, elliptico-lanceolata, late ovata vel ovato-oblonga, saepius longe acuminata, integerrima, supra glabra, infra adpresse pulverulento-tomentella fulva reticulato-venosa, nervis venisque valde prominulis demum glabrescentibus purpureis. Paniculae axillares pedunculatae corymbosae contractae, folio multo breviores, fulvo-tomentellae, trichotomae. Flores breviter pedicellati, bracteola lineari-subulata ad pedicelli basin. Calyx campanulatus obsolete quadridentatus, demum parum auctus cupuliformis drupam nigram globoso-pyriformem glabram succosam basi suffulciens, extus tomentellus. Corolla minima infundibuliformis breviter quadrifida. — *P. tenuifolia* Willd. Herb. — *Callicarpa reticulata* Poepp. Herb. fl. Cubens. (nec Swrtz.) — Crescit in insulis Sti. Dominici et Cuba. (v. s. sp.)

XXV. (3694/1.) MALLOPHORA *Endl.*

(Endl. Annal. des Wien. Mus. II. 206. et Gener. plant. Suppl. I. pag. 1401. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 199.)

1. M. GLOBIFLORA Endl. l. c. et Decad. plant. I. 64. no. 72. † — Capitulis solitariis. ♃ — Rami teretes alterni et oppositi fastigiati, tomento stellari adpresso vestiti. Internodia 3 lin. longa, folia opposita saepe subfasciculata elliptica obtusa 2½ lin. longa, lineam lata subsessilia, supra pallide viridia, tomento parco cinereo conspersa, margine revoluta, subtus densissime cinereo-tomentosa. Pedunculi terminales solitarii semipollicares pallide ferruginei monocephali; pedicelli 1½ lin. longi seni-quindeni subcorymbosi, lana densissima vestiti, singuli bractea lineari albo-lanata stipati, extimorum 4–5 bracteis oblongo-lanceolatis obtusis sesquilinearibus ferrugineo-tomentosis involucrum constituentibus. Calycis laciniae lineares obtusae lineam longae, extus candide lanatae. Corollae tubus rectus aequalis, intus sparsim puberulus calyce paullo longior, limbus aequaliter quadrifidus, laciniis obtusis erectiusculis. Drupa parva globosa tomentosa, styli basi apiculata, calyce connivente abscondita fragillima 4-locularis, loculis monospermis. — In Novae Hollandiae austro-occidentalis interioribus.
2. M. CORYMBOSA Endl. Ann. Wien. Mus. II. 206. et Decad. plant. I. 65. no. 73. — Capitulis terminalibus corymbosis. ♄ — Differt a praecedente ramis ramulisque densissime lanato-tomentosis, foliis oppositis 4 lin. longis, lineam latis, utrinque densissime lanatis, marginibus revolutis rugosissimis glabratis, pedunculi terminalis lana longa fuscescente patente, capitulis corymbosis paucifloris, involucri bracteis calycibusque lana laxiore vestitis, floribus paullo majoribus. — Crescit in Novae Hollandiae austro-occidentalis interioribus.

XXVI. (3706.) CITHAREXYLON *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 760. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 201.)

§. 1. *Spinosa.*

1. C. FLEXUOSUM D. Don, New Edinbrgh. philos. journ. XI. 273. — Spinosum: foliis elliptico-oblongis mucronulatis integerrimis, subtus tomentosis; racemis paucifloris; calycibus quinquedentatis. ♄ — Frutex biorgyalis ramosissimus spinosus. Folia pollicaria vel sesquipollicaria, supra rugosa. Flores parvi ochroleuci odore suavissimo. Drupa atropurpurea. — *Rauwolfia flexuosa* Rz. et Pav. Fl. Peruv. et Chil. II. 26. t. 152. fig. a. — Crescit in Peruviae fruticetis ad Huanuci urbem et in provincia Huamalies et Tarmac.
2. C. RETUSUM D. Don l. c. — Spinosum: foliis obovato-oblongis retusis integerrimis, subtus tomentosis; racemis paucifloris; calycibus quinquedentatis. ♄ — Frutex biorgyalis spinosus. Folia sesqui- vel tripollicaria rugosissima. Spinae validiores. Racemi interdum multiflori, flores lutescentes magni. Drupa nigra. — *Rauwolfia macrophylla* Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. II. 26. t. 152. fig. b. — Crescit in Peruviae collibus arenosis versus Atiquipa tractus.
3. C. BARBINERVE Cham. Linnaea VII. 116. † — Pentandrum spinosum: ramis tetragonis; foliis obovatis (rarius elliptico-lanceolatis) obtusis retusis acutisque,

attenuata basi in petiolum decurrentibus, supra glabris nitidis, subtus in nervo et venis pilosis, axillis venarum barbatis; spicis simplicissimis terminalibus laxis; tubo corollae longitudine calycis irregulariter dentato. ♄ — Rami obtusanguli vel acute quadrangulares, epidermide pallide griseo-nitidula, internodia 1- vel rarius 1½-pollicaria. Spinae axillares validae conicae, nunc pollicares, nunc sesquilineares, raro omnino deficientes. Folia integerrima vel vix unquam obsolete dentata, floralia et apicalia saepe lanceolata acuta, 2–3-pollicaria, 12–15 lin. lata, parte in petiolum angustata 4–6-lineari, glandulis petiolaribus nullis, subtus conspicue resinoso-punctulata, nervo venisque primariis piloso-subvillosis. Spicae 3–4-pollicares simplices laxae pauciflorae, bracteolae squamaeformes. Calyx urceolato-campanulatus irregulariter 5-dentatus, dentibus rotundatis. Corolla hypocraterimorpha extus glabra, ad faucem villosa, regulariter 5-fida pentandra. — Crescit in Brasilia tropica et in provincia Cisplatina.

4. C. SPINOSUM H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 256. † — Spinosum: ramis tetragonis; foliis oblongis obtusis aut acuminatis integerrimis submembranaceis glabris; spicis axillaribus paucifloris. ♄ — Frutex orgyalis ramosissimus, spinae axillares oppositae, aut terminales, rectae quadrangulares. Folia petiolata reticulato-venosa, supra nitida, 9–10 lin. longa, 4 lin. lata. Petioli sesquilineam longi glabri. Spicae solitariae 6–8-florae. Flores pedicellati bracteati suaveolentes. Calyx pentagonus puberulus 5-dentatus. Corollae albae tubus calyce brevior, limbo aequaliter quinquefido, laciniis subrotundis fauceque pilosis. Stamina 4 vix inclusa. Drupa......? — *Duranta buxifolia* Willd. Herb. 11667. — Crescit in Andibus Peruvianis in convalli Caxamarcensi etc. (v. s. sp.)

5. C. CYANOCARPUM Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 58. † t. 11. — Ramis teretibus pubescentibus; spinis axillaribus; foliis sessilibus vel subsessilibus ovatis cordatisve mucronulatis coriaceis glabris nitidis integerrimis, subtus impresse punctatis; pedunculis axillaribus trifloris. ♄ — Frutex ramosus plerumque spinosus, spinis nunc validis nunc parvis, 1–2-pollicaribus. Rami teretes, juniores subangulati pubescentes. Folia coriacea pollicaria, 6–9 lin. lata vel saepius minora, sessilia vel brevissime petiolata, acuta, plerumque mucronulata, glabra laevia, costa solummodo puberula, subtus pallidiora reticulato-venosa impresse punctulata. Pedunculi brevissimi axillares triflori. Calyx glaber quinquedentatus. Corolla 1–1½ uncias longa infundibuliformis, laciniis limbi ovatis obtusis, intus puberulis. Stamina 4 didynama inclusa. Antherae ovatae obtusae. Stylus tubi corollini longitudine, stigma bilobum. Drupa sicca calyce tecta magnitudine *Pisi*, in nuces 2 partibilis. Nuces hemisphaericae dispermae — *Poeppigia cyanocarpa* Bertero, Bullet. des sc. nat. 1830. p. 109. — *Volkameria verticillata* Rz. et Pav. Herb.! — *Citharexylum verticillatum* Kltzsch. Herb. Reg. Berolin. — Ab incolis appellatur: „Arrayan macho". — Crescit in sylvaticis umbrosis ad Quillota Chilensium, in insula Jouan Fernandez et in Peruvia. (v. s. sp.)

§. 2. *Inermia.*

† Calyce multidentato.

6. C. DENTATUM D. Don, New Ednbrgh. phil. journ. XI. 237. — Foliis obovato-oblongis dentatis glabris; racemis multifloris; calycibus angulatis multidentatis. ♄ — Frutex inermis erectus ramosissimus. Folia dentata vel rarius subintegerrima valde coriacea rigida, utrinque glabra nitida pollicaria paulloque longiora. Racemus multiflorus. Calycis anguli prominentes, limbo acute 6–7-dentato. — *Rauwolfia dentata* Tafalla mss. — Crescit in Peruvia ad Maccos.

† † Calyce quinquedentato.

* *Dentibus inaequalibus.*

7. C. INCANUM Sessé et Moçinno mss. ex D. Don, New Ednbrgh. phil. journ. XI. 238. — Foliis ovatis serratis, subtus ramulisque pubescentibus; spicis erectis; calycibus inaequaliter quinquedentatis. ♄ — Folia ovata acutiuscula serrata vel rarius subintegerrima, subtus copiose cinereo-pubescentia, basi attenuata. Petioli

semiunciales. Spicae erectae sesqui-tripollicares. Calycis dentes recurvati inaequales, antico et postico majoribus. — Crescit in Mexico.

8. C. SCABRUM Moçinno et Sessé mss. ex D. Don l. c. — Foliis ellipticis mucronulatis, subtus cinereo-tomentosis scabris; spicis erectis secundis; calycibus inaequaliter quinquedentatis. ♄ — Folia bi- triuncialia, supra scabra, subtus dense cinereo-pubescentia, basi acuta. Petioli semiunciales. Spicae erectae semipedales. Dentes calycini recurvati, antico productiori. — Crescit in Mexico.

9. C. SUBSERRATUM Swrtz. Prodr. 91. et Fl. Ind. occid. II. 1043. † — Ramis tetragonis glabris; foliis petiolatis ovatis vel ellipticis seu obovatis, apicem versus remote subserratis, rarius integerrimis, supra lucidis, utrinque glabris; racemis terminalibus folio longioribus; floribus breviter pedicellatis; calycibus bilabiatim quinquefidis. ♄ — Frutex biorgyalis glaber. Folia membranacea rigida. Petioli subsemipollicares tetragoni glabri. Racemi folio longiores simplices vel compositi, racemulis oppositis filiformibus nutantibus. Flores approximati sparsi. Calycis pubescentis laciniae 2 breviores. Corollae tubus calyce parum longior cylindricus, intus villosus, limbi subaequalis laciniae 2 superiores suberectae, tribus inferioribus patentibus oblongis, fauce albo-villosa. Stamina subinclusa. Drupa baccata subrotunda, basi parum attenuata, calyce suffulta, matura rubra, dipyrena, pyrenis bilocularibus. — Crescit in Hispaniolae insulae campis sterilibus.

** *Dentibus aequalibus.*

10. C. ILICIFOLIUM H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 256. — Inerme: ramulis quadrangularibus; foliis elliptico-oblongis integerrimis aut dentato-spinosis coriaceis glaberrimis nitidis; spicis terminalibus erectis?; calycibus fructiferis quinquefidis. ♄ — Arbor 2-3-orgyalis, rami oppositi et terni, juniores puberuli. Folia brevissime petiolata, basi attenuata, apice obtusa coriacea, subtus prominulo-reticulato-venosa nitida, 14-16 lin. longa, 8-9 lin. lata. Spicae subpollicares. Flores pedicellati sparsi suaveolentes 2½ lin. longi. Bracteae, pedicelli et rhachis pubescentes. Calyx 5-dentatus pubescens. Corollae albae tubus calyce paullo longior, laciniae limbi rotundatae aequales. Drupa globosa magnitudine *Pisi* nigra, calyce persistente suffulta. — Habitus *Durantae*. — *Duranta ilicifolia* Willd. Herb. 11669. — Crescit in regno Chilensi, prope Quito, Chillo, Riobamba etc.

11. C. PENTANDRUM Venten. Hort. Cels. t. 47. — Ramis quadrangularibus sulcatis pubescenti-hirtis; foliis breviter petiolatis ovali-ellipticis vix acuminatis integerrimis repandis vel saepius grosse paucidentatis, supra vix in nervo medio puberulis, infra reticulato-venosis pubescenti-hirtellis; racemis terminalibus solitariis erectis. ♄ — Ramuli quadrangulares sulcati cinerascentes hirtello-puberuli. Internodia 1½-2½-pollicaria, superiora breviora. Petioli 3-4 lin. longi hirtelli. Folia basi ovata vix attenuata semper integerrima, 1½-2½-pollicaria, 9-15 lin. lata, suprema minora semipollicem lata elliptico-lanceolata. Racemus terminalis 2½-3-pollicaris. Rhachis, pedicelli brevissimi et bracteae subulatae pedicellos subaequantes hirtello-pubescentes. Calyx campanulatus obsolete quinquedentatus. Corolla hypocraterimorpha calyce duplo longior 3-4 lin. longa, limbo quinquefido, ad faucem intus villosa, stamina 5 brevissima inclusa. Drupa calyce suffulta cupuliformi quinquedentato, dentibus dilatato-ellipticis obtusis, obovata, axi 4½ lin. longa, diametro 3½ lin., foeta ossiculis duobus dorso convexis, facie fere planis, bilocularibus dispermis. In speciminibus spontaneis flores subsessiles reperiuntur. — Crescit in insulis Portorico et Domingo. (v. s. sp. et cult.)

12. C. PULVERULENTUM Pers. Enchirid. II. 142. — Ramis tetragonis; foliis ovatis serratis cauleque pulverulento-canescentibus. ♄ — Spica erecta, calyx obtusus. — *C. quadrangulare* Hort. Madrit. — Crescit in America meridionali.

13. C. MOLLE Jcq. ex Spr. Syst. veget. II. 761. no. 9. — Ramis tetragonis; foliis ovatis acutis serratis, utrinque villosis; racemis erectis terminalibus. ♄ — Crescit...?

14. C. LUCIDUM D. Don, New Edinbrgh. philos. Journ. XI. 238. (nec Cham.) — Foliis elliptico-oblongis obtusis, basi acutis, utrinque glabris; spicis elongatis

nutantibus. ♄ — Folia 3–4-pollicaria, supra lucida, subtus reticulato-venosissima apice mucronulo perbrevi instructa. Petioli unciales. Spicae palmares. — *C. cinereum* Moç. et Sess. mss. (nec L.) — Crescit in Mexico.

15. C. SESSEI D. Don l. c. — Foliis ovatis acuminatis, subtus pubescentibus; spicis elongatis nutantibus; ramis tetragonis. ♄ — Folia sesqui- vel tripollicaria membranacea pubescentia, supra demum nudiuscula, pinnatim nervosa, basi obtusiuscula. Spicae palmares. — A *C. pulverulento* et *quadrangulo* omnino diversum. — *C. quadrangulare* Moç. et Sess. — Crescit in Mexico.

16. C. AFFINE D. Don l. c. — Foliis ovato-lanceolatis acutis membranaceis glabris; spicis elongatis nutantibus. ♄ — Folia 2–4-pollicaria utrinque acuta membranacea glabra, pinnatim nervosa. Spicae quinquepollicares nutantes. — In Mexico.

17. C. MOCINNI D. Don l. c. — Foliis obovato-lanceolatis acuminatis, subtus tomentosis, basi rotundatis; spicis elongatis pendulis. ♄ — Folia ampla ovato-lanceolata acuminata integerrima coriacea, supra glabra nitida, subtus ramulisque dense fulvescenti-tomentosa, dodrantalia. Spicae tomentosae pendulae pedales et ultra. Calyx pentagonus, denticulis prominentibus. — Crescit in Mexico.

18. C. SCARIOSUM Moç. et Sess. mss. ex D. Don l. c. — Foliis ellipticis mucronatis coriaceis glabris; spicis erectis paniculatis. ♄ — Folia 2–3-pollicaria, venis prominulis, petioli breves. Spicae erectae 3–5-unciales. — Crescit in Mexico.

19. C. ELLIPTICUM Moç. et Sess. mss. ex D. Don l. c. — Foliis subsessilibus obovatis oblongisque retusis mucronulatisque costatis scabris; spicis erectis multifloris; ramis tetragonis. ♄ — Folia pollicaria subsessilia Spicae erectae triunciales. — Crescit in Mexico.

20. C. RETICULATUM H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 257. † — Inerme: ramis quadrangularibus; foliis oblongis acutis, basi angustatis integerrimis, coriaceis glaberrimis nitidis; spicis terminalibus erectis. ♄ — Rami rugosi albi glabri, juniores quadrangulares. Folia petiolata obovato-elliptica vel lanceolato-oblonga, obtusa vel acuta, basi angustata integerrima vel rarius dentato-spinosa reticulato-venosa coriacea glaberrima, supra nitida, subtus in nervo puberula, bipollicaria longioraque, 8–10 lin. lata. Spicae terminales erectae 1½–3-pollicares. Bracteae lineares cum rhachi pedicellisque puberulae. Calyx 5-dentatus glaber. Corolla alba calyce longior; laciniis limbi 5 rotundatis aequalibus. Stamina 5 summo tubo imposita brevissima. Drupa globosa calyce persistente semitecta. — *Ehretia articulata* Willd. in Roem. et Schult. Syst. veget. IV. 805. et Willd. Herb. 4532. — Crescit in Andibus Peruvianis et in Mexico. (v. s. sp.)

21. C. CORIACEUM Dsf. Catal. pl. hort. Paris. (edit. 3.) 392. — Arborea: foliis late ellipticis glabris integerrimis, subtus venoso-reticulatis; racemis spicaeformibus terminalibus recurvis. ♄ — Rami juniores tetragoni. Folia perennantia coriacea opposita 4–6-uncialia, 2–3 uncias lata brevissime mucronata. Spicae terminales solitariae aut plures nutantes. Flores odorati, secundi brevissime pedicellati. Calyx obtuse quinquedentatus. Corolla tubulosa alba, limbo subirregulariter quinquefido. Stamina quaterna summo tubo inserta nec exserta brevissima. — Affine *C. villoso*, at differt foliis subtus glabris. — Num a *C. cinereo* Linn. satis distinctum? — Crescit......?

22. C. CINEREUM Linn. Spec. plant. 872. — Ramis teretibus; foliis oblongis acuminatis integerrimis, utrinque attenuatis glabris; racemis spicatis elongatis aggregatis erectiusculis. ♄ — Petioli pollicares, folia 4–6-pollicaria, 2 poll. lata, utrinque longiuscule attenuata acuta. — *C. teres* Jcq. Hist. stirp. Amer. 185. t. 118. — *Citharexylum fruticosum cortice cinereo etc.* P. Br. Jamaic. 264. — *Citharexylon arbor laurifolia* Pluk. Alm. 108. t. 162. fig. 1. — *Jasminum arborescens racemosum etc.* Plum. Icon. 157. fig. 1. — Crescit in America meridionali.

23. C. CHAMISSONIS Wlprs. mss. — Glaberrimum: foliis lanceolatis ellipticisque, basi cuneatis, breviter petiolatis, apice breviter acuminatis mucronatis coriaceis, supra lucidis, subtus pallidioribus opacis; racemis simplicibus compositisque

terminalibus et axillaribus erectis. ♄ — Folia majora semipedalia, 2½ poll. lata, petiolo 3–6 lin. longo. Flores albi odoratissimi. — *C. lucidum* Chamisso, Linnaea V. 97. (nec D. Don.) — Crescit in Mexico in sylvis ad Jalapam. (v. s. sp.)

24. C. VILLOSUM Jcq. Icon. pl. rar. I. t. 118. et in Willd. Herb. 11477. — Ramis tetragonis, vix junioribus puberulis; foliis lanceolatis, utrinque acuminatis vel obovato-ellipticis integerrimis vel remote subdentatis, supra glaberrimis, subtus vix puberulis, coriaceis; spicis racemosis terminalibus subnutantibus; calycibus truncatis vel obsolete quinquedentatis, dentibus rotundatis. ♄ — Planta in Herbario Willdenowiano no. 11477. fol. 1. asservata forte ad *C. pentandrum* pertinet. Folia saepe anguste lanceolata, vel oblonga obtusa, rarissime apicem versus dente uno alterove notata, semper coriacea reticulato-venosa, rete subtus prominente molliter breviterque piloso, supra minutissime scabrida, maxima 4-pollicaria, sesquipollicem lata, petiolo 6–9 lin. longo. Drupa baccata nigra laevis nitida ovalis, calyce persistente quinquedentato suffulta. — Crescit in insulis Sti. Dominici et Thomae.

25. C. TOMENTOSUM H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 258. † — Ramis teretibus; foliis ovato-oblongis acutis integerrimis, supra molliter hirtis, subtus incano-tomentosis; spicis axillaribus terminalibusque nutantibus? ♄ — Arbor tri-quadriorygalis, ligno albo, cortice cinereo, ramis alternis teretibus glabris, junioribus incano-tomentosis. Folia petiolata, utrinque acuta, supra pilis stellatis molliter hirta, subtus incano-tomentosa, subsexpollicaria, 2½ poll. lata, petioli 8–9 lin. longi incano-tomentosi. Spicae axillares solitariae et terminales ternae 7–8-pollicares nutantes?, rhachi incano-tomentosa. Flores densi subsessiles suaveolentes. Calyx campanulatus 5-dentatus incano-tomentosus. Corollae albae infundibuliformis tubus calyce brevior, laciniis limbi subrotundis interne fauceque pilosis. Stamina 4 (vel 5??) summo tubo inserta inclusa brevissima. Drupa globosa, calyce semitecta magnitudine *Pisi* dipyrena. — Crescit in convalli fluminis Caucae inter pagum Tuluam et urbem Pugam Popayanensium.

26. C. POEPPIGII Wlprs. mss. — Foliis late ovatis acutiusculis, supra glabris, infra adpresse molliter ferrugineo-tomentellis reticulato-venosis; spicis terminalibus paniculatis erectis laxis; calycis dentibus ovatis obtusis; corolla infundibuliformi, laciniis limbi ellipticis obtusis. ♄ — Maxime affinis *C. Rugendasii* Cham., sed differt tomento ferrugineo nec virescenti, pulverulento adpressissimo, nec stellato. - Petioli pollicares glabri, folia 4–6½ poll. longa, 2½–4 poll. lata, utrinque subattenuata acuta vel basi exacte ovata non acuminata. Paniculae terminalis laxae ramuli adpresse ferrugineo-tomentelli. Calyces membranacei vix tomentelli. — Crescit ad fluvium Amazonum prope Egam. — (Poepp. Herb. fl. Amaz. 2910.) (v. s. sp.)

27. C. SOLANACEUM Cham. l. c. 118. † — Pentandrum, inerme: ramis teretibus; foliis elliptico-lanceolatis, utrinque acutis, antice attenuatis acuminatisque et rariter obsolete dentato-serratis aut integerrimis, subtus rariter molliter tomentosis, supra pilosulis, petiolis glanduliferis; spica terminali erecta; calyce regulariter quinquedentato, dentibus acutis parvis distantibus; corolla calyce duplo longiori glabra, fauce villosa. ♄ — Rami annotini grisei glabri, hornotini tomentosi. Internodia ½–2-pollicaria, pleraque pollicaria. Folia antice acuminata, rarius serrata, semipedalia vel majora, 2 poll. lata, petiolo 9–12 lin. longo, glandula utrinsecus ad insertionem petioli plana satis magna, rarius deficiens. Spica semipedalis vel spithamaea simplicissima vel basi ramosa pauciflora. Bracteolae squamaeformes acutae pedicello vix longiores. Calyx urceolato-campanulatus regulariter quinquedentatus, utrinque tomentosus. Corolla subsemipollicaris quinquefida pentandra.

β. Foliis paullo majoribus latioribusque; spicis brevioribus magisque densifloris; calycibus nunc longioribus, nunc brevioribus. — In Brasilia meridionali.

28. C. RUGENDASII Cham. l. c. 120. † — Pentandrum, inerme: foliis ovatis breviter angusteque acuminatis, supra nitentibus glabris, subtus cum petiolis ramis tetrago-

nis et rhachidibus tomento stellato canescentibus; spicis terminalibus paniculatis erectis laxis; calyce quinquedentato, dentibus parvis acutis; corollae tubo obconico calycem superante, limbo parvo pubescente, fauce barbata. ♄ — Rami obtuse tetragoni, internodia plerumque bipollicaria. Folia basi rotundata breviter et abrupte in petiolum desinentia, ibidemque foveolarum mellifluarum rudimenta, interdum subpanduriformia, breviter acuminata, infra prominule reticulato-venosa, 4–6–8-pollicaria, 2–3½ poll. lata. Spicae tres simplices aut semel iterumve trifidae. Bracteolae ovatae acuminatae acutae. Calycis 5-dentati dentes late triangulares acuti. Corollae obconicae laciniae 2 minores, 3 majores. Stamina 4 inclusa vix didynama, rudimentum quinti sterilis breve. — Crescit ad Jalapam Mexicanorum. (v. s. sp.)

29. C. MYRIANTHUM Cham. l. c. VII. 117. † — Pentandrum, inerme, subscabridum: ramis angulatis, angulis acutis et obsoletis; foliis pseudo-oppositis et verticillatis ternis elliptico-lanceolatis, utrinque acutis, petiolis glanduliferis; racemis paniculatis; floribus nutantibus; calycibus subirregulariter dentatis; corollis glabris longe tubulosis. ♄ — Rami 4–6-goni, internodia 2–3-pollicaria. Folia supra scabrida vel laevia, infra in nervis venisque hirtello-scabrida, (ad petioli insertionem foveola melliflua utrinsecus lateralis), 5–6-pollicaria, 1¾–2¼ poll. lata, petiolo circiter semipollicari. Ramuli verticillato-terni saepeque alterni in paniculam abeunt pedalem et majorem erectam, rhachis scabrida subhirtella. Flores brevissime pedicellati subsecundi. Calyx urceolato-obconicus obtuse et irregulariter quinquedentatus. Corolla quinquefida pentandra, extus glabra. Drupa subsemipollicaris calyce suffulta. — *C. scabrum* Willd. Herb. 11475. — Crescit in Brasilia tropica, ad Bahiam. (v. s. sp.)

††† Calyce truncato.

30. C. QUITENSE Spr. Syst. veget. II. 763. no. 4. — Inerme: ramis quadrangularibus; foliis obovatis acutis aut obtusis integerrimis, supra glabris, subtus molliter pubescentibus; spicis terminalibus nutantibus. ♄ — Arbuscula 1–2-orgyalis, ramuli quadrangulares striati verrucosi glabri. Folia petiolata acuta aut submucronata, basi cuneata reticulato-venosa membranacea, subtus subcanescentia subtripollicaria, 1½–2 poll. lata, petiolis 3–4 lin. longis puberulis. Spicae terminales solitariae subsexpollicares breviter pedunculatae, pedunculo semipollicari glabro. Flores subsessiles approximati magnitudine *Myosotidis scorpioidis.* Bracteae minutissimae pubescentes. Calyx urceolato-campanulatus laxus obsolete inaequaliter 5-dentatus puberulus. Corolla hypocraterimorpha albido-flavescens, tubo calycem duplo excedente, fauce villosa, laciniis rotundatis brevibus patentissimis. Stamina inclusa. — *C. molle* H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 257. † — Crescit locis humidis prope Guayaquil Quitensium.

31. C. LYCIOIDES D. Don, New Edinbrgh. phil. journ. XI. 237. — Foliis lineari-lanceolatis obtusis integerrimis glabris; racemis paucifloris; calycibus integris. ♄ — Frutex inermis virgatus. Ramuli cortice cinereo-albicante tecti. Folia margine integerrimo parum revoluta vix uncialia, drupa nigra. — In Mexico crescit.

32. C. QUADRANGULARE Jcq. Americ. 186. et Hort. Vindob. t. 22. (vix Willd. Herb. 11480.) — Willd. Spec. plant. III. 309. — Sieb. Herb. fl. Martinic. no. 159! — Ramis glaberrimis pallidis acute quadrangularibus; foliis petiolatis elliptico-lanceolatis, ovato-ellipticis vel obovatis membranaceis, utrinque glaberrimis integerrimis vel subrepandis; racemis terminalibus paniculatis apice subnutantibus glaberrimis; calycibus truncatis vix quinquemucronulatis. ♄ — Rami ad nodos valde dilatati, quadrangulares pallidi nitidi. Petioli 6–9 lin. longi, folia 3½–5½ poll. longa, 1½–2½ poll. lata, utrinque acuminata vel obtusa. Racemi paniculati laxi glaberrimi. Bracteolae subulatae acutae pedicellum aequantes. Corollae explicatae non visae. — *C. caudatum* Swrtz. Prodr. fl. Ind. occid. 234. — Crescit in insula Martinica. (v. s. sp.)

33. C. CAUDATUM Linn. Spec. plant. 872. — Ramis teretibus; foliis ellipticis emarginatis obtusis integerrimis; racemis erectis; calycibus subdentatis truncatis. ♄

— *Berberis fructu arbor maxima racemosa etc.* Sloane, Hist. Jamaic. 99. t. 206. fig. 3. 4. — *Citharexylum fruticosum foliis subellipticis etc.* P. Br. Jamaic. 265. t. 28. fig. 2. — *C. erectum* Jcq. Ic. pl. rar. III. t. 501. — Crescit in Jamaica.

34. C. BERTERII Spr. Syst. veget. II. 763. no. 2. — Ramis teretiusculis; foliis oblongo-lanceolatis, utrinque attenuatis mucronatis glaberrimis; racemis erectis elongatis; calycibus truncatis. ♄ — Crescit in Jamaica.

† *E genere expellenda.*

C. ALPINUM Poepp. = VERBENA SCOPARIA.
C. MELANOCARDIUM Swrtz. = PREMNA RETICULATA.
C. PANICULATUM Poir. = PREMNA INTEGRIFOLIA.
C. PERFORATUM Forst. = MYOPORUM LAETUM.
C. TENUIFOLIUM Forst. = MYOPORUM TENUIFOLIUM.

†† *Species indescriptae.*

C. DENTATUM Loddig.
C. MACROPHYLLUM Poir. } ex Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) I. 375.
C SERICEUM Loddig.

XXVII. (3709.) DURANTA *Linn.*

(Linn. Gener. pl. no. 186. — Meisn. Gener. pl. vascul. I. 200. II. 199.)

1. D. OBTUSIFOLIA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 254. † — Inermis: ramis teretibus; foliis oppositis ovatis obtusis integerrimis coriaceis glaberrimis; spicis paniculatis; floribus pendulis; calycibus fructiferis globosis, apice clausis. ♄ — Rami glabri nitidi. Folia basi in petiolum attenuata reticulato-venosa glaberrima nitida, 20–21 lin. lata. Petioli canaliculati glabri 4 lin. longi. Spicae crebrae ad apicem ramorum axillares terminalesque paniculatae 3–4-pollicares erectae. Flores distantes pedicellati bracteati penduli. Bracteae lineares pubescentes pedicellum subaequantes caducae. Pedicelli vix lineam longi glabriusculi. Calyx campanulato-tubulosus puberulus 5-dentatus. Corolla violacea extus puberula, tubo superne ampliato calycem duplo superante, limbo irregulariter 5-fido, laciniis rotundatis. Stylus indivisus glaber inclusus. Drupa globoso-ovata magnitudine *Pisi*, calyce persistente clauso tecta tetrapyrena, ossiculis bilocularibus, loculis monospermis. — In locis temperatis provinciae Bracamorensis juxta urbem Jaen.

2. D. MUTISII Linn. Supplem. 291. — Willd. Spec. pl. III. 380. — Inermis: ramis subhexagonis; foliis ternis oblongo-ellipticis acutis integerrimis glaberrimis coriaceis; spicis axillaribus secundis; floribus subpendulis; calycibus fructiferis ovatis apice clausis. ♄ — Rami teretes, lineis elevatis sexangulares. — *D. phytolaccaefolia* Juss. Hb. — *D. parietariaefolia* Juss. Herb. — Species valde dubia. — Crescit in planitie frigida regni Novo-Granatensis.

3. D. XALAPENSIS H. B. Kth. Nov. gener. et spec. II. 254. † — Spinosa: ramis quadrangularibus; foliis oppositis obovatis obtusis leviter serrato-crenatis subcoriaceis glaberrimis; spicis paniculatis; floribus subpendulis. ♄ — Rami laeves glabri albidi, ramulis pubescentibus. Spinae axillares rectae semipollicares. Folia petiolata, basi cuneata integerrima aut leviter serrato-crenata coriacea reticulato-venosa, nervo medio venisque primariis subtus prominentibus, glaberrima, subtus pallidiora, juniora utrinque pilis adpressis conspersa subsesquipollicaria, 10 lin. lata, petioli 3–4 lin. longi canaliculati. Spicae in ramorum apice axillares terminalesque paniculatae tripollicares. Flores pedicellati bracteati subpenduli, pedicelli lineam longi sericei. Bracteae lineares lineam longae sericeae. — Crescit in montibus Mexicanorum prope Xalapam et La Panderilla.

4. D. TRIACANTHA Juss. Ann. du mus. d'hist. nat. VII. 77. — Spinosa: spinis ternis; ramis subhexagonis; foliis ternis ellipticis obtusis integerrimis coriaceis glaberrimis; spicis terminalibus depauperatis; calycibus fructiferis globosis, apice clausis. ♄ — *D. buxifolia* Poir. — Crescit in regno Quitensi in collibus aridis prope urbem Ibarra.

5. D. **PLUMIERI** Jcq. Americ. 186. t. 176. et Ic. pl. rar. III. t. 502. — Bot. Regist. t. 244. — Inermis v. subspinosa: ramis quadrangularibus; foliis oppositis rhombeo-ovatis, utrinque attenuatis, obovatis obtusissimis, ovato-lanceolatis lanceolatisque, e medio apicem usque grosse acuteque serrato-dentatis, subdentatis integerrimisque coriaceis, utrinque glabris; racemis spicaeformibus axillaribus terminalibusque paniculatis laxis; floribus pendulis; calycibus fructiferis subglobosis apice clausis. ♄ — Frutex valde variabilis, mox valide spinosus, nunc omnino inermis vel subspinosus. Folia in petiolum brevem contracta ovato-rhombea vel lanceolata 3–4-pollicaria, 10–15 lin. lata, nunc ovata vel obovata pollicaria, semipollicem lata, supra supra glaberrima, infra sparse pilosula et glabra. Racemi axillares terminalesque, paniculam terminalem amplam efficientes, quam folia pluries longiores multiflori. Flores breviter pedicellati, pedicello ad basin bractea filiformi suffulta, sub calyce bracteolis geminis subsetaceis instructo. Calyx tubuloso-campanulatus truncatus quinquemucronatus. Corollae tubus calyce dimidio longior, laciniis limbi subrotundis. Genitalia inclusa. Drupa baccata monopyrena calyce aucto, apice contracto contortoque inclusa, pyreno pisiformi osseo subrotundo octoloculari octospermo. — *Duranta spinosa* Linn. Spec. plant. (edit. 1.) 637. — *Castorea repens spinosa* Plum. Gener. pl. 30. — *Duranta inermis* Linn. l. c. — *Castorea racemosa flore coeruleo fructu croceo* Plum. Gener. pl. Am. 30. ic. 79. — Crescit in America meridionali. (v. s. sp.)

6. D. **ELLISIA** Linn. Spec. plant. 888. — Jcq. Americ. 187. t. 176. fig. 77. et Hort. Vindobon. III. t. 99. — Bot. Magaz. t. 1759. — Ramis inermibus vel subspinescentibus subtetragonis; foliis ovatis acutis, basi longe cuneatis integerrimis, caeterum serrato-dentatis, utrinque glabris; racemis spicaeformibus terminalibus; bracteis parvis lanceolatis foliaceis, calyce dimidio brevioribus, bracteolis subsetaceis; calycibus acute quinquedentatis. ♄ — Laciniae calycinae in eodem arbore erectae contortaeque visae sunt. Rami inermes vel subspinescentes. Folia bipollicaria, 9 lin. lata. Bracteae parvae foliaceae virides lanceolatae integerrimae, qua sola nota hanc a praecedente specie differre video. — *Ellisia acuta* Linn. Amoenit. acad. V. 400. — *Ellisia frutescens quandoque spinosa, foliis ovatis utrinque acutis ad apicem serratis, spicis alaribus* P. Br. Jamaic. 262. t. 29. fig. 1. — *Jasmini folio integro flore coeruleo racemoso* Sloan. Hist. II. 97. — Species recognoscenda forteque cum praecedente consocianda. — Crescit in insula Jamaica. (v. s. c.)

7. D. **MICROPHYLLA** Dsf. Cat. hort. Paris. (edit. 3.) 392. — Fruticosa spinosa: foliis oppositis obovatis dentatis; floribus in racemum terminalem secundum dispositis. ♄ — Rami juniores tetragoni. Spicae axillares simplices ad summum pollicares. Folia 8 lin. longa glabra a medio apicem versus dentata, basi integerrima. Calyx truncatus quinque mucronato-dentatus. Corollae coeruleae limbus patens, tubus calyce longior. Stamina 4 inclusa. Stigma incrassatum. — Inter varietates *D. Plumieri* rejicienda videtur. — Crescit......?

8. D. **MACROCARPA** H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 255. † — Subinermis: ramis angulatis; foliis ternis, superioribus oppositis elliptico-oblongis obtusiusculis, apicem versus leviter serratis glaberrimis; spicis terminalibus; calycibus fructiferis 4–5-fidis patulis. ♄ — Rami subterni glabri albidi. Folia petiolata, basi attenuata, apicem versus obsolete serrata, reticulato-venosa, venis subtus valde prominentibus coriacea glaberrima subnitida, sesquipollicaria, 9 lin. lata. Petioli 1–1½ lin. longi glabri. Spicae terminales subsolitariae. Flores secundi brevissime pedicellati bracteati, bracteae lineares pubescentes, pedicello duplo longiores. Calyx tubuloso-campanulatus 5-dentatus, extus pubescens. Drupa globosa magnitudine fructus *Pruni spinosae*, calyce persistente tecta. — *D. dentata* Rich. — Crescit in Nova Hispania.

9. D. **VESTITA** Chamisso, Linnaea VII. 115. † — Ramosissima subspinosa: ramis teretibus, ramulis subtomentosis; foliis obovatis in petiolum attenuatis rotundatis

aut obtuse apiculatis emarginatis, margine revoluto integerrimis (vel rarius antice obsolete crenatis), subtus dense piloso-subtomentosis; racemis terminalibus infra saltem oppositifloris. ♄ — Internodia ad summum sesquipollicaria, ramis ex eadem axilla saepe geminatis, ramulis subspinescentibus. Folia supra glabra et laevia, nervo arcuatisque venis utrinsecus subternis, supra impressis, subtus prominulis, cum parte petiolari tertiam laminae partem aequante bipollicaria, latitudine 10–11 linearum. Racemi pauciflori? Drupa omnino *D. Plumieri.* — In Brasilia meridionali crescit.

10. D. FISCHERI Mart. Beibl. zur Flora XXI. II. 60. — Inermis: foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi attenuatis integerrimis aut antice leviter repando-crenatis, glabris, nitidis; racemis axillaribus; calycibus albidis plicato-pentagonis; corollae lobis undulatis, duobus superioribus paullo latioribus; drupa obovato-globosa vertice acuta. Corolla pallide lilacina. Stamina cinerea. — In Brasiliae provincia Sebastianopolitana habitat.

† *Species indescriptae.*

D. ARGENTEA Lodd.
D. PARIETARIAEFOLIA Juss.
D. PHYTOLACCAEFOLIA Juss.

†† *E genere expellendae.*

D. ILICIFOLIA Willd. = CITHAREXYLON ILICIFOLIUM.
D. BUXIFOLIA Willd. = CITHAREXYLUM SPINOSUM.

§. 2. Stigmate bifido.

XXVIII. (3697.) HOSTA *Jcq.*

(Jcq. Hort. Schoenbr. I. 60. t. 114. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 200. II. 199.)

1. H. COERULEA Jcq. Hort. Schoenbr. I. 60. t. 114. — Bot. Regist. t. 1204. — Fruticosa ramosa: ramulis tetragono-subalatis molliter adpresseque tomentosis; foliis breviter petiolatis late ovato-subrotundis, utrinque acuminatis integerrimis vel vix subrepandis, supra praesertim in nervis fulvo-tomentellis, infra mollissime et adpresse niveo-tomentosis; paniculis terminalibus thyrsoideis; calycibus cupuliformibus obsolete quadridenticulatis tomentosis; corolla extus tomentella. ♄ — Ramuli ultimi quadrangulares, angulis subalatis, fulvo-tomentelli, internodia 1–1½-pollicaria; folia basi in petiolum semipollicarem supra canaliculatum decurrentia, subrotundo-ovata acuminata, 3–4-pollicaria, 1½–3 poll. lata vel majora, supra adpresse pilosula vel tomentella, infra molliter niveo-tomentosa. Panicula thyrsoidea semipedalis terminalis opposite ramosa, folia ad ramorum basin inferiorum lanceolata, superiorum minima subulato-squamaeformia, cum rhachide leproso-tomentosa. Rami breves (pollicares) iterato-dichotomi cum flore pedicellato in dichotomiis. Calyx brevis cupuliformis quadridentatus albo-tomentosus, corollae extus tomentellae, intus coeruleae tubo quadruplo brevior. Fructum maturum non vidi. — *Cornutia pyramidata* Ait. Hort. Kewens. II. 353. — *Cornutia punctata* Willd. Spec. plant. III. 322. — *Hostana coerulea* Pers. Enchirid. II. 143. — Crescit in America calidiore. (v. s. sp.)

2. H. GRANDIFOLIA Cham. et Schlchtd. Linnaea V. 97. — Ramis obsolete tetragonis; foliis late ovatis sinuato-dentatis integerrimisque in petiolum decurrentibus, supra hirto-pilosis, subtus tomentosis; corollis pubescentibus. ♄ — Folia sex- septempollicaria, quatuor circiter pollices lata, petiolo circiter pollicari. Flores coerulei. — *H. grandiflora* Alb. Dietr. Spec. plant. I. 252. — Crescit in sylvis Mexicanis prope Jalapam.

3. H. ODORATA Poeppig et Endl. Nov. gener. et spec. plant. Chilens. III. 63. † t. 269. — Foliis rhombeo-ellipticis integerrimis, utrinque acuminatis in petiolum decurrentibus, supra punctatis, subtus lepidotis canescentibus; panicula terminali; calyce corollaque tomentosis; drupa obovata pubescente. ♄ — Caules numerosi 14–16-pedales, superne angulati, spongioso-medullosi ramosi, subherbacei,

rami oppositi tetragoni fusci, decidue tomentosi. Petiolus semiteres, supra canaliculatus, basi parumper dilatatus, cum costa continuus, lamina folii late elliptica, saepius rhombea leviter repanda, apice obtuse acuminata, in petiolum decurrens membranacea, in costa pube brevi rigida reflexa obtecta seu punctulis albidis adspersa, subtus flavido-canescens minute lepidota, folia adulta pedalia, dimidium pedem lata, petiolo tripollicari. Paniculae ramulos terminant erectae pedales bipedalesque pyramidatae foliosae, rhachi acute tetragona saepe angustissime quadrimarginata, ad articulos subcompressa, dense fusco-tomentosa. Pedunculi dichotome cymosi, bracteolae parvae ovatae, semiamplexicaules; flores numerosissimi cito decidui, extus fusce tomentosi. Corollae tubus intus violaceus, limbus resupinatus, labio superiore trilobo, laciniis ellipticis, inferiore integro latiore emarginato. Drupa vix Pisi magnitudine tetragona succulenta, vertice obsolete quadriverrucosa, monopyrena atrocoerulea, putamen quadriloculare. — Flores ac folia odore forti, sed suavissimo fere *Salviae officinalis* impraegnata sunt. — *Cornutia odorata* Poepp. Herb. — Crescit in fruticetis provinciae Maynas ad Yurimaguas. (v. s. sp.)

4. H. LONGIFOLIA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 247. † — Fruticosa: ramis obsolete tetragonis tomentoso-pubescentibus; foliis petiolatis ovato-oblongis angustato-acuminatis integerrimis, supra pubescenti-hirtis, subtus incano-tomentosis; paniculae terminalis ramis oppositis dichotomis tomentoso-pubescentibus; calycibus obsolete dentatis pubescentibus. ♄ — Folia basi in petiolum decurrentia reticulato-venosa coriacea 4-5-pollicaria, 1½-2 poll. lata, petioli 8 lin. longi canaliculati. Paniculae quadripollicares. Flores pedicellati. Corolla glabra coerulea?, tubus cylindraceus, inaequaliter quadrifidus. Stamina vix exserta, duo breviora castrata. — *Cornutia longifolia* Spr. Syst. veget. I. 39. — In Mexico crescit.

5. H. LATIFOLIA H. B. Kth. l. c. 248. † — Fruticosa: ramis tenuissime canescenti-tomentosis quadrangularibus; foliis petiolatis subrotundo-ovatis, breviter acuminatis et acutis integerrimis pubescentibus, subtus canescentibus; paniculae terminalis ramis oppositis dichotomis pubescentibus; calycibus obsolete quinquedentatis canescenti-pubescentibus. ♄ — Folia basi in petiolum decurrentia reticulato-venosa membranacea, sublepidota, tripollicaria et longiora, duos pollices lata. Petioli 3-4 lin. longi canescenti-pubescentes. Paniculae semipedalis rami pubescentes. Flores subsemipollicares. Corolla pubescens tubulosa, limbo inaequaliter quadrifido. Stamina breviter exserta. Drupa desideratur. — *Cornutia pyramidata* Spr. Syst. veget. I. 39? — Crescit in regno Mexicano.

† *E genere expellenda.*

H. PYRAMIDATA Alb. Dietr. = CORNUTIA PYRAMIDATA.

XXIX. PYROSTOMA *F. W. Meyer.*

(F. W. Meyer, Primit. fl. Esseq. 220. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 201. II. 199.)

1. P. TERNATA F. W. Meyer l. c. — Arbor? Rami patentes teretes glabri, ramuli praeteriti anni subcompressi sulcati fusco-ferruginei, annui quadranguli compressi sulcati croceo-ferruginei, villo lutescente vestiti. Gemmae ovatae obtusae villo sericeo croceo velatae. Folia opposita petiolata ternata, foliola membranacea sessilia oblonga breviter acuminata, basi attenuata, lateralia latere interiori paullo latiora, maxima pollices 6 longa, 2½ poll. lata integerrima costato-venosa tenuissime reticulata glaberrima. Petioli pollicares vel sesquipollicares semiteretes, superne canaliculati, ubi folia inserta compressi, una cum pedunculis pubescentes. Pedunculi ex axillis ramulorum annuorum oppositi solitarii, petiolos subaequantes, compressi sulcati, apice in pedicellos 3 unifloros divisi, quorum intermedius lateralibus duplo brevior, ebracteatus, laterales basi externe bractea singula et infra florem bracteis duabus subulatis ornati. Flores speciosi pollicares. Calyx magnus tubulosus, inferne pubescens, laciniis patentibus oblongo-lanceolatis reticulato-venosis glabris nitidis. Corolla interne pulcherrime coccinea, extus luteo-tomentosa, sericeo-nitens, tubus calyce tertia

parte longior subcurvatus, labiorum laciniae margine undulatae. Stamina strato filorum articulatorum supra tubi basin inserta filiformia compressa, nervo procurrente notata pilisque adspersa. Antherae ellipticae, superne planae bisulcatae, subtus convexae. Ovarium subrotundum planiusculum, margine tumido tomentosum. Stylus filiformis stilosulus. Stigmata subulata patenti-divergentia. ♄ — Crescit in sylvis Surinamensibus.

XXX. (3699.) WALLROTHIA *Rth.*

(Rth. Nov. plant. spec. 317. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 201. II. 199.)

1. W. ARTICULATA Rth. l. c. † — Foliis subternis, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, subtus subtomentosis; ramis articulatis subalatis; thyrso terminali; bacca tetrasperma. ♄ vel ♄? — Rami cinerei subtomentosi, internodia alternatim compressa indeque subalata, folia opposita petiolata, foliola tactu mollissima, supra puberula nitida sordide virentia, subtus praesertim in nervis venisque tomentella, petioli semidigitum longi, partiales brevissimi tomentosi. Thyrsus terminalis semidigitalis et digitalis cinereo-tomentosus opposite ramosus, rami dichotomi. Bracteae ad basin ramorum trifoliatae, superiores simplices ovali-subfoliatae lanceolatae. Calyx cinereo-tomentosus, corolla resupinata extus cinereo-tomentosa. Bacca glabra nitida. — Crescit in India orientali.
2. W. (VITEX Linn. fil. Supplem. 293. — Willd. Spec. plant. III. 392.) LEUCOXYLON Rth. l. c. 319. † — Foliis pinnatis digitatis, foliolis oblongis integerrimis, utrinque glabris; panicula axillari dichotoma; bacca monosperma. ♄ — Foliola obtusa, basi attenuata, subtus pallidiora, ad costam dorsalem venasque primarias pilosula. Petioli digitales pilosuli, partiales semiunciales vel unciales. Paniculae axillares dichotomae ebracteatae. Pedunculus petiolo parum longior, rami repetito-dichotomi, ad dichotomias loco bractearum pilorum annulo cincti, flores in dichotomia solitarii, superiores secundi, dimidio minores quam speciei praecedentis. Calyx subpubescens aequaliter 5-dentatus, dentibus triangularibus, corolla extus pilis ferrugineis subtomentosa. Bacca saltem junior pubescens monosperma. — Crescit in India orientali.

XXXI. (3700.) VITEX *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 709. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 201. II. 199.)

§. 1. *Foliis simplicibus.*

1. V. OVATA Thnbrg. Flor. Japonic. 257. — Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 206. t. 47. — Willd. Spec. plant. III. 390. — Foliis breviter petiolatis obovatis integerrimis; pedunculis axillaribus solitariis unifloris brevissimis, tandem in paniculam subtrichotomam terminalem brevissime pedunculatam digestis. ♄ — „Caulis repens.“ Folia decussata brevissime petiolata, bipollicaria (in specimine suppetente pollicaria vel saepe minora) obovata, rotundata, basi longe cuneata integerrima, supra glabra viridia, infra argentea puberula („mollia albo-tomentosa“ ex Willd.) Pedunculi subnulli cum calyce obsolete 5-dentato argenteo-tomentelli. Corolla exserta, labiis patentissimis, lacinia labii inferioris intermedia concava. Stamina exserta puberula. Stylus staminibus longior inaequaliter bipartitus. „Bacca globosa didyma quadrivalvis quadrilocularis. Semina minuta.“ — In icone citata flores in cymulas trifloras breviter pedicellatas digesti, cymulis ipsis in axillis foliorum superiorum solitariis vel in racemo terminali brevi positis. — *V. rotundifolia* Linn. fil. — *V. repens* Blanco, Flora de Filipinas 513. — Crescit in Japonia, in China et in Nova Hollandia in littoribus intra tropicum. (v. s. c.)
2. V. MOLUCCANA Blume, Bijdragen 813. — Foliis simplicibus subrotundo-ovatis aut ovalibus acutiusculis subintegerrimis coriaceis, infra puberulis basique glandulosis; panicula terminali divaricata. ♄ — *Tittius* Rmph. Herb. Amboin. III. t. 20. — Crescit in Moluccanis insulis.
3. V.? MACROPHYLLA R. Br. Prodr. flor. Nov. Holland. I. 368. (edit. N. ab E.) — Foliis simplicibus integerrimis ovato-oblongis glabris costatis, basi biglandulosis; caule arboreo. ♄ — Crescit in Nova Hollandia, in littoribus intra tropicum.

4. V. CHRYSOCLADA Bojer, Ann. sc. natur. (2. Sér.) IV. 268. † — Ramis superne octogonis stellato-pubescentibus aureis; foliis oppositis simplicibus ovatis acuminatis, interdum rhombeis, apicem versus serratis pubescentibus; paniculis subcorymbosis terminalibus ramosis floribusque albidis; fructu globoso nigro.♄ — Frutex 4-6-pedalis, rami interdum alterni, stellato-pubescentes aurei, inferiores teretes glabri. Folia breviter petiolata, utrinque acuminata quadripollicaria, superiora breviora, interdum rhombea, undique stellato-pilosa aurea, versus apicem serrata. Flores paniculato-corymbosi albi. Bracteae filiformes pedicello fere longiores. Calyx hemisphaericus obsolete et obtuse 5-dentatus. Corollae tubus intus purpureus, limbus albus. Stamina fauci inserta exserta, antheris globosis. Stylus staminibus brevior bifidus. Drupa nigra glabra calyce semiinclusa. — Crescit locis depressis inter frutices in insula Mombase ad oram orientalem Africae.

§. 2. *Foliis ternatis.*

5. V. TRIFOLIA Linn. Supplem. 293. — Willd. Spec. plant. III. 392. — Foliis ternatis quinatisque, foliolis ovatis acutis integerrimis, subtus canescentibus; paniculae rhachi recta, pedicellis dichotomis. ♄ — Foliola ovata acuta integerrima, subtus tomentosa, foliola duo petiolo proxima minora. — *Caranosi* Rheede, Hort. Malab. II. 13. t. 10. — *Logondium vulgare* Rmph. Hb. Amboin. IV. 48. t. 18. — *Vitex trifolia minor Indica* Pluken. Alm. 390. t. 206. fig. 5. — *Vitex integerrima* Mill. Dict. no. 3. — (Sieb. Flor. Maurit. exs. no. 283.) — [*Vitex trifolia, floribus per ramos sparsis* Burm. Thes. Zeylan. 229. t. 109. vulgo huc relata ob folia sparsa e genere et ordine removeatur.] — *Viticem ovatam* Thnbrg. hujus esse varietatem simplicifoliam A. v. Chamisso contendit, numquam autem hanc simplicifoliam vel illam trifoliatam videre contigit. — In India orientali, Luçonia. (v. s. sp.)

6. V. PUBESCENS Vahl, Symbol. bot. III. 85. — Foliis ternatis pubescentibus, foliolis ovatis acutis; panicula trichotoma; bracteis canescentibus calyces aequantibus. ♄ — Differt a praecedente foliis subtus non canescentibus, pedicellis non dichotomis, sed floribus longitudinaliter sessilibus alternis, habitu paniculae squarrosae, bracteis patenti-subreflexis majoribus quam in reliquis hujus generis speciebus. — *Pistacia Vitex* Linn. Fl. Zeyl. — Crescit in India orientali.

7. V. UNDULATA Wall. Catal. 1756! — Foliis ternatis (??), foliolis breviter petiolatis ovato-ellipticis abrupte longeque acuminatis integerrimis subundulatisque, utrinque glaberrimis, coriaceis; panicula terminali pyramidata ramosissima multiflora tomentella; calycibus obsolete quinquedenticulatis tomentosis. ♄ — Petioli tripollicares, petioluli semipollicares, foliola 2½-4-pollicaria, 1-1½ poll. lata, elliptica vel ovata, omnia abrupte acuminata. — Forte huic sunt foliola quinata, sed in specimine meo mancissimo sunt ternata. — Crescit in Manilla. (v. s. sp.)

8. V. ALATA Heyne mss. in Rth. Nov. plant. spec. 316. † — Foliis ternatis, foliolis ovatis acuminatis integerrimis, subtus cinereo-tomentosis, lateralibus extrorsum latioribus; ramis articulatis subalatis; paniculae ramis brachiatis elongatis subspicatis; pedunculis dichotomis; floribus aggregatis. ♄? ♅? — Rami cinerei subtomentosi articulati, articulis alternatim compressis subulatis, lateribus oppositis angustioribus profunde canaliculatis. Foliola brevissime petiolulata, supra glabra, foliolum intermedium longius acuminatum, lateralia basi subinaequalia. Petioli digitales cinerei, partiales vix semilineam longi. Panicula terminalis ultra semipedalis. Pedicelli dichotomi vix ultra lineam longi. Flores exigui. — *V. Morava* Hamilt. mss. — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

9. V. ALTISSIMA Linn. Supplem. 294. — Wall. Catal. 1755. — Foliis longe petiolatis ternatis, foliolis subsessilibus ovatis vel lanceolatis, utrinque (sed apice longius) acuminatis integerrimis coriaceis glaberrimis, infra ad nervos petiolisque tomentellis; panicula terminali pyramidata ramosissima; floribus interrupte subcymoso-verticillatis. ♄ — Petioli pollicares vel bipollicares, foliola 5-pollicaria, 12-15 lin. lata vel minora. Inflorescentiae rami cum calycibus rufescenti-tomentosi. Calyx parvus quinquedentatus, corolla duplo brevior rufescenti-tomentosus. Corolla extus tomentella.

β. macrophylla: Foliolis late ovatis obtusis vel ex ovato lanceolatis acuminatis. — Foliola 3–4½-pollicaria, 1½–2 poll. lata. — *V. pubescens* Heyne Hb. (nec Vahl). — *V. alata* Rxb. (ex p.) — Crescit in Manilla et in Zeylania. (v. s. sp.)

10. V. LIMONIFOLIA Wall. Catal. 1754. — Foliis longiuscule petiolatis ternatis, petiolis latissime alatis, apice latioribus, foliolis sessilibus ovatis, utrinque acuminatis, lateralibus minoribus inaequilateralibus, coriaceis integerrimis, supra nitidis, vix puberulis, infra adpressissime fulvescenti-tomentellis, reticulato-venosis; panicula (terminali?) ramosissima(?); floribus interrupte spicato-cymosis verticillatis; bracteis oblongo-linearibus calycibusque subtruncatis tomentosis. ♄ — Petioli 2½ poll. longi, apice 9 lin. lati. Foliolum intermedium 4–5-pollicare 2 poll. latum, lateralibus saepe multo minoribus. — Crescit in India orientali, Prome. (v. s. sp.)

11. V. ARBOREA Roxb. Hort. Benghal. 46. — Hook. Bot. Miscell. I. 285. † — Arborea: foliis ternatis ovato-lanceolatis integerrimis subtomentosis; paniculis terminalibus; bracteis calyce longioribus. ♄ — Ramuli subquadrangulares. Folia opposita petiolata ternata, interdum quinata, foliola ovato-lanceolata acuminata integerrima rigida brevissime tomentella, 5–6-pollicaria, 2–2½ poll. lata. Petioli longi basi incrassati pulverulenti. Paniculae terminalis flores subsessiles. Bracteae oppositae ovato-lanceolatae acutae tomentosae calyce longiores. Calyx tomentosus persistens. Corolla coerulescens vel albida, ore contracto subclausa, laciniis labii superioris divaricatis, inferioris lateralibus reflexis, media majori subrotunda concava, basi tomentosa, reliquis obscurius coerulea. Stamina exserta. Bacca nigra quadrilocularem tetraspermum nucem sistens. — Lignum durissimum ab incolis adhibetur ad aedificandas tomos, et corticis infusum iisdem est remedium contra ophthalmiam. — Malayis auditur *Lubbun*. — Crescit in insula Sumatra. (v. s. sp.)

12. V. DIVARICATA Swrtz. Prodr. fl. Ind. occid. 93., Flor. Ind. occid. II. 1078. † — Foliis ternatis, foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, utrinque glabris, intermedio maximo; paniculis dichotomis divaricatis. ♄ — Rami ramulique tetragoni laeves cinerascentes. Folia ad apicem ramulorum crebriora. Petioli longi teretes glabri, basi compressi. Foliola brevius petiolulata, subtus pallidiora, lateralia pollicaria, intermedium 3–4-pollicare. Flores paniculati vel pedunculi in axillis foliorum superiorum solitarii ter quaterve dichotomi. Corolla albida. Calyx urceolatus subbilabiatim 5-dentatus. Corolla extus pubescens, tubo calyce triplo longiore, limbi bilabiati lacinia intermedia labii inferioris reliquis multo majore subrotunda bifida. Stamina didynama exserta, corollae laciniis breviora. Fructus drupaceus mollis ovalis semiuncialis. — Crescit in insulis Stae. Luciae, Sti. Crucis et in Martinica.

13. V. BALBISII Spr. Syst. veget. II. 756. no. 5. — Foliis ternatis, foliolis obovato-ellipticis obtusis, utrinque glaberrimis subcoriaceis, subtus discoloribus; racemis axillaribus subcompositis. ♄ — Crescit in insula Hispaniola.

14. V. TIMORIENSIS Wlprs. mss. — Ramulis quadrangularibus glabris; foliis petiolatis ternatis, foliolis ellipticis ovato-lanceolatis acuminatis, basi rotundis coriaceis glabris; paniculis terminalibus axillaribusque multifloris; floribus parvis tenuissime cinereo-puberulis; staminibus styloque exsertis. ♄ — Ramuli quadrangulares lenticellis albis conspersi laeves, glabri, folia opposita, petiolo communi 2 poll. glabro tereti, foliolis 1½–2½ poll. longis, 1½ latis, intermedio submajori, basi saepe inaequilateralibus vel rotundatis, coriaceis, subtus 7–9-nerviis, nervis prominulis, utrinque glabris, petiolulatis, petiolulo 2–4 lin. longo glabro. Inflorescentia paniculata, paniculis terminalibus axillaribusque 5-pollicaribus, ramis suberectis, tetragonis glabris solitariis vel superpositis geminatis, multifloris. Flores parvi pedicellati, pedicellis subpuberulis bibracteolatis, bracteolis lanceolatis acutis erectis minimis. Calyx cyathiformis 5-dentatus, dentibus parvis, interdum subnullis, extrorsum puberulus, introrsum glaber subquinquecostatus. Corolla 2 lin. circiter longa, campanulata, ore inaequali 5-lobo, lobis subrotundis ovatis, superioribus erectis, lateralibus patentibus, inferiori reflexo aliis duplo

majore, tubo basi angustato, introrsum ima basi 3–nervato, nervulis in quovis corollae lobo pinnatim expansis. Stamina exserta, sterilia filamentis inferne complanatis hirsutis ad basin tubi insertis. — *V. littoralis* Dcne. in Nouv. Ann. du Mus. d'hist. natur. III. 401. (nec All. Cunn.) — In insula Timor et in Manilla crescit.

15. V. PARVIFLORA Juss. Annales du Mus. d'hist. nat. VII. 76. — Fruticosa: foliis longe petiolatis ternatis, foliolis breviter petiolulatis ovato-lanceolatis integris subpubescentibus; paniculis axillaribus oppositis; floribus parvis; drupa ovata, nucem tetraspermam gerente. ♄ — Crescit in insulis Philippinis.

16. V. RUFESCENS Juss. l. c. 77. — Fruticosa, undique rufo-tomentosa: foliis petiolatis ternatis, foliolis sessilibus ovato-lanceolatis; pedunculis supraaxillaribus oppositis petiolo brevioribus, apice paucifloris; floribus tomentosis; calyce quinquefido; corolla calyce duplo longiore extus tomentosa, bilabiatim quinqueloba; staminibus parum exsertis. ♄ — Propter calycem quinquefidum haec species male descripta e genere excludenda et ad *Casarettoam* translocanda videtur. A *C. molli*, cui proxima jam differt pedunculis petiolo brevioribus paucifloris foliolisque sessilibus nec petiolulatis. — In Brasilia.

17. V. MOLLIS H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 245. † — Foliis ternatis, foliolis oblongis obtusis integerrimis, supra glabris nitidis, subtus molliter canescenti-pubescentibus sessilibus, intermedio petiolulato; corymbis axillaribus dichotomis. ♄? — Ramuli canescenti-tomentosi. Foliola basi paullo angustata subcoriacea reticulato-venosa, intermedio 5-pollicari, 2 pollices lato. Foliola juniora subtus argenteo-sericea, petioli 2½-pollicares pubescentes. Pedunculi axillares sesquipollicares ramique canescenti-tomentosi. Bracteae lineares, flores pedicellati. Calyx tomentoso-sericeus. Corolla et fructus haud satis noti. — Crescit locis temperatis prope Chilpancingo Mexicanorum.

18. V. VESTITA Wall. Catal. 1750. — Fruticosa: ramis teretibus ad nodos incrassatis; foliis oppositis longissime petiolatis trifoliatis, foliolis late ovatis subrhombeis, utrinque acuminatis membranaceis, infra breviter piloso-pubescentibus, ad nervos ferrugineo-tomentosis, petiolulatis, intermedio maximo longissime petiolulato, lateralibus basi saepe inaequilateris; cymis axillaribus pedunculatis (ter) trichotomis fasciculatis petiolo multo brevioribus. ♄ — Frutex esse videtur. Rami crassitie pennae anserinae rufescentes, breviter pubescentes, demum glabri. Petioli 3–3¼-pollicares rufescenti-tomentosi, superne subcanaliculati. Folioli intermedii petiolulus bipollicaris, lateralium 4–6 lin. longus. Folii intermedii lamina ultra 5-pollicaris, 3 pollices lata, late ovata, utrinque abrupte acuminata, lateralium 3–4-pollicaris, 1½–2 poll. lata, acuminata vel obtusiuscula, basi saepe inaequali, omnium membranacea, supra glaberrima, excepto solo nervo medio rufescenti-tomentoso, infra sparse pilosula, penninervia, nervis venisque rufescenti-tomentosis. In axillis foliorum inferiorum proveniunt folia hisce similia, sed cum petiolo non ultra 2½ poll. longa. Cymae ternae quaternaeve fasciculatae, pedunculi circiter pollicares cum pedicellis ter trichotomis rufescenti-tomentosi. Calyces brevissimi patellaeformes pentagoni obsolete 5-dentati, demum glaberrimi persistentes. Caetera omnia mihi prorsus incognita. — Crescit in Martabania. (v. s. sp.)

§. 3. *Foliis quinatis ternatisque.*

19. V. GIGANTEA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 245. † — Foliis ternatis aut quinatis, foliolis oblongis acutis integerrimis, supra glabris, subtus pubescentibus, intermedio maximo; pedunculis axillaribus tri- aut sexfloris. ♄ — Arbor procerrima, ligno durissimo, rami juniores subcompressi tomentoso-hirti. Folia quinata, saepius ternata, petioli bipollicares longioresque pubescentes, foliolum intermedium maximum 4½-pollicare, 2 pollices latum, extima minora sesqui- aut bipollicaria, omnia brevissime petiolulata. Pedunculi axillares pollicares 3–6-flori. Flores pedicellati „violacei, labio corollae inferiore basin versus macula alba notato. Filamenta basi pilosa." Calycis quinquedentati dentes obtusiusculi,

tres inferiores approximati. — A *V. triflora* Vahl, cui affinis quidem, certe differt. — Crescit locis calidis prope Guayaquil.

20. V. BIGNONIOIDES H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 246. † — Foliis quinatis, foliolis oblongis acuminato-cuspidatis integerrimis complicato-reflexis glabris subaequalibus; corymbis axillaribus capituliformibus. ♄ — Rami laeves glabri, ramuli hirtelli. Foliola basi angustata reticulato-venosa complicato-reflexa glabra subaequalia bipollicaria et longiora petiolulata, extima sessilia. Petioli sesquipollicares et longiores hirtelli. Pedunculi axillares 2–3-pollicares hirtelli, flores pedicellati subcapitati. Calyx pilosus obsolete 5-dentatus. Corollae coeruleae lacinia labii inferioris intermedia undulata. Filamenta glabra. — Crescit in convalli Araguensi et prope Villam da Cura in Caracas.

21. V. ORINOCENSIS H. B. Kth. l. c. 247. † — Foliis quinatis, foliolis obovato-oblongis acuminatis, basi angustatis integerrimis glaberrimis, intermedio majore, extimis minimis; corymbis axillaribus dichotomis. ♄ — Arbor quadri- aut quinqueorgyalis, ramis teretibus glabris, ramulis puberulis. Petioli bipollicares partialesque 2–3 lin. longi pubescentes, foliolum intermedium 3-pollicare et longius, 18–12 lin. latum, infima pollicaria subsessilia, omnia coriacea reticulato-venosa. Corymbi axillares petiolum subaequantes. Pedunculi pedicellique pubescentes. Corolla coerulea. Fructus ignotus. — Crescit locis frondosis juxta confluentem Metam et Orinocum amnem.

22. V. CYMOSA Bertero mss. in Spr. Syst. vegetab. II. 757. no. 23. — Foliis quinatis subpedatis, foliolis oblongis acutis integerrimis, subtus ramisque tomentosis; pedunculis axillaribus cymosis. ♄ — Rami glabri, juniores cum petiolis et inflorescentiae ramis virescenti-tomentosi. Petioli tripollicares vel longiores. Petioluli brevissimi, foliola valde inaequalia, intermedio saepe quinquepollicari, 1¾ poll. lato, extimis 15 lin. longis, pollice vix latioribus, omnibus elliptico-oblongis ovatisque abrupte acuminatis integerrimis, supra vix puberulis nitidis, infra mollissime virescenti-tomentosis. Pedunculi axillares folio breviores? cymoso-pauciflori, calyx subcupuliformis, dentibus ovalibus obtusis, demum subevanescentibus. Corolla calyce triplo longior, extus tomentella. Stamina subexserta. — Crescit ad flumen Magdalenae. (v. s. sp.)

23. V. FLAVENS H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 246. † — Foliis quinatis, foliolis lanceolato-oblongis acuminatis integerrimis, supra adpresse pubescentibus, subtus molliter flavescenti-pubescentibus subaequalibus; corymbis axillaribus dichotomis. ♄ — Ramuli flavescenti-tomentosi. Foliola breviter petiolulata basi acuta, reticulato-venosa, supra adpresse pubescentia viridia, bipollicaria, exteriora paullo minora. Petioli 2½ poll. longi tomentosi. Corymbi axillares petiolis duplo breviores, tomentosi. Fructus magnitudine pisi majoris, basi calyce persistente dilatato cinctus. Flores......? — Affinis *V. rufescenti* Juss. et *V. ferrugineae* (??) Vahl. — Crescit in Peruvia.

24. V. ACUMINATA R. Br. Prodr. flor. Nov. Holland. I. (edit. N. ab E.) 368. — Foliis ternatis quinatisque, foliolis ovato-oblongis acuminatis glabris integerrimis; paniculae rhachi stricta, ramis dichotomis; calyce subedentulo; stamininibus inclusis. ♄ — Crescit in littoribus Novae Hollandiae inter tropicum.

25. V.? GLABRATA R. Br. l. c. — Foliis ternatis quinatisque, foliolis ovatis integerrimis glabris; pedunculis dichotomis axillaribus terminalibusque; calyce edentulo. ♄ — Crescit in littoribus Novae Hollandiae inter tropicum.

26. V. BOMBACIFOLIA Wall. Catal. 1749. — Ramis glabris, novellis subtetragonis puberulis; foliis ternatis quinatisque, foliolis longiuscule petiolatis ovatis, utrinque acutis integerrimis membranaceis, utrinque glabris, vix subtus apicem versus puberulis; paniculis terminalibus axillaribusque dichotomis (cum flore breviter pedicellato in dichotomia), ramis vix puberulis; calyce obsolete dentato puberulo; corollae lacinia infima basi contracta obovata, fauce villosissima. ♄? — Petioli 2–3-pollicares. Foliola extima minima brevissime pedicellata bipollicaria, pollicem lata, intermedium, adjecto petiolulo pollicari, quinquepollicare, 2½ poll. latum,

omnia obtusa vel acuta nec tamen acuminata, glabra, nervo medio infra subpuberulo. Panicula valde divaricata laxa dichotoma, corolla extus tomentella, intus villosa. — *V. Leucoxylon* Rxb. Hort. Bengh. nec L. — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

27. V. LITTORALIS A. Cunn. Ann. of natur. history I. 461. — Hook. Icon. plantar. t. 419. 420. — Caule arboreo; foliis ternatis quinatisque petiolatis, foliolis ovato-ellipticis obtusis cum acumine glabris, quinatorum foliolis duobus extimis minimis subsessilibus; paniculis brevibus racemosis axillaribus terminalibusque, ramis dichotomis; calyce campanulato subdentato; staminibus exsertis; corollae extus tomentosae labio superiore ovali integro. ♄ — Arbor excelsa, truncus 12-20 pedes usque circuitu tenens, ad primos ramos 15-30 pedes altus. Ramuli ultimi tetragoni. Petioli 1–2½–pollicares, foliola petiolulata, quinatorum extima subsessilia, oblongo-elliptica, utrinque acuminata obtusa glaberrima (exceptis nervis?), integerrima, maxima quadripollicaria, 1½ poll. lata, minima elliptico-lanceolata pollicaria vel sesquipollicaria, semipollicem lata. Paniculae folio breviores (ex icone) pauciflorae. Calyx cupuliformis obsolete denticulatus. Corollae bilabiatae labium superius porrectum integrum ovale obtusum, inferioris ample trilobi lacinia media maxima subtricrenata. Stamina exserta basi villosa. — *Ephialis pentaphylla* Bnks. et Soland. mss. — Crescit in Nova Zeelandia locis lapidosis maritimis.

28. V. OBOVATA E. Mey.! Comment. de plant. Afric. austr. I. 273. — [Tomentosa]: foliis quinatis, foliolis obovatis, brevissime apiculatis; cymis axillaribus folio brevioribus; calycibus decemcostatis corollisque extus tomentosis. ♄ — Rami hornotini, petioli, pedunculi, pedicelli, calyces et corolla extus brevissime pubescenti-tomentelli. Petioli plerumque pollicares, foliola subpetiolulata, intermedio maximo, lateralibus per paria minoribus, obovata, elliptico-obovata, subrotundo-obovata, basi cuneata, brevissime acuminulata, coriacea glabra, juniora subtus in nervo medio margineque pubescenti-tomentella, maxima 1–1½–pollicaria, 10 lin. vel pollicem lata, minima vix semipollicaria, 3 lin. lata. Cymae axillares folio parum breviores (pedunculo pollicari suffultae, dichotomae, floribus in dichotomia sessilibus. Calycis campanulati 10-costati dentes rotundati. Corolla hypocraterimorpha, limbo subbilabiato, tubo intus ad staminum insertionem villoso. Stamina inclusa villoso-pilosa. Stylus breviter exsertus brevissime bifidus. — Crescit in Promontorio bonae spei inter Komga et Key. (v. s. sp.)

29. V. INCISA Lam. Encycl. méth. II. 605. — Mill. Icon. t. 275. fig. 1. 2. — Willd. Spec. plant. III. 392. — Foliis quinatis (infimis supremisque nonnumquam ternatis) petiolatis, foliolis lanceolatis acuminatis profunde inciso-pinnatifidis, subtus argenteis puberulis, demum utrinque glabrescentibus subconcoloribus; paniculae terminalis pyramidatae trichotomae cymulis oppositis abbreviatis subverticillatis. ♄ — Caules et rami teretes glabri. Folia petiolata, petioli ½–1½–pollicares, foliola lanceolata vel ovato-lanceolata inaequaliter, saepe rhachin usque pinnatifida, laciniis deltoideis acutis saepe iterum hinc inde dentatis, basi longe cuneata sessilia vel subsessilia, juniora infra argenteo-puberula, seniora pallidiora quidem sed (excepto nervo medio infra) utrinque glaberrima, 1–2½–pollicaria, 3-6 lin. longa. Ad paniculae ramificationes inferiores occurrunt folia ternata, foliolis angustissime linearibus integris vel dentatis, ramealibus multo minoribus. Paniculae terminales vel in axillis foliorum supremorum, pedunculi, pedicelli et calyces nitide argenteo-pubescentes. Florum cymulae 3-5-7-florae oppositae subverticillatae. Calyx campanulatus breviter 5-dentatus. Corolla calyce duplo longior bilabiata, lacinia media infima productiori concava. Stamina exserta pilosula. Fructus......? — *V. laciniata* Hort. Götting.! — Crescit in China ad Cantonem. (v. s. c.) — Nonnulli hanc pro varietate habent *V. agni casti*.

30. V. UMBROSA Swrtz. Prodr. fl. Ind. occid. 93., Flor. Ind. occid. II. 1076. † — „Foliis quinatis integerrimis, utrinque glabris; racemis compositis axillaribus.“ ♄ — Arbor magna. Ramuli cinerascentes tetragoni. Petioli tereliusculi 2–3–pollicares.

Foliola petiolulata quinata elliptica acuta nervosa venosa, utrinque glaberrima subrigida, petioluli semiunciales. Racemi folio longiores, cymulis oppositis trichotomis. Calyx pilosulus persistens leviter bilabiatus, dentibus minoribus approximatis. Corollae extus villosulae campanulatae faux hirsuta, laciniis obtusissimis, infima majore. Stamina exserta pilosula, antheris basi bilobis. Stylus staminum longitudine, stigma subulato-bifidum. Drupa flava Cerasi magnitudine ovato-oblonga, nux subrotundo-ovata obtuse tetragona bilocularis, apice quadrilocularis videtur, nucleis stuposis hemisphaericis. — *Nephrandra* Coth. Dispos. 8. — *Nephrandra dubia* Grtnr. — Crescit in Jamaicae insulae montosis et in terra Essequebonensi.

31. V. MONTEVIDENSIS Chamisso, Linnaea VII. 373. † — Glabrescens: corollis extus gemmisque incano-tomentosis; calycibus, pedunculis, ramulis, petiolis, nervo venisque foliorum subtus pubescentibus, venarum axillis subbarbatis, foliolis quinatis vel rarius ternatis inaequalibus, medio maximo longius pedicellato, extimis subsessilibus minimis subsimilibus, foliorum ad ramorum basin oriundis minoribus minusque evolutis cuneato-obovatis, apice rotundatis subemarginatis aut subacuminulatis, superiorum (saepius late) ellipticis, utrinque acuminatis acutis, supremis maximis angustioribusque; cymis laxifloris paucifloris axillaribus folio brevioribus; bracteis ellipticis obtusis quam flores brevioribus, pedunculo petiolum subaequante. ♄ — Arbor 15–20-pedalis. Foliolum maximum circiter 3-pollicare, 1½ poll. latum, petiolulo quadrilineari, extima minora, pollice utplurimum minora, petiolus communis utplurimum 1½–2-pollicaris. Foliola membranacea, utrinque glaberrima. Flores sessiles breviterve pedicellati 3–7-ni in cymula. Calyx cupuliformis obsolete obtuseque 5-dentatus. Corolla 9 circiter lin. longa, ad medium oblique bilabiata, extus tomentoso-pubescens, intus pilosula. Stamina exserta puberula, basi barbellata. Stylus glaber staminibus longior, stigma inaequaliter bifidum.

β. multinervis: Uberius, intermixtis hinc inde pilis longioribus, pubescens: venis foliorum eximie reticulatis, corollis semipollicaribus. — Crescit in Brasilia Cisplatina. (v. s. sp.)

32. V. CAPITATA Vahl, Eclog. plantar. Americ. II. 50. t. 18. — Willd. Spec. plant. III. 393. — Foliis quinato-digitatis, foliolis lanceolatis glabris integerrimis; floribus capitato-subumbellatis. ♄ — Arbor mediocris, rami tetragoni cinerei laeves. Folia opposita, foliola semper quinata, terna 4-pollicaria, pollicem lata, lanceolata, utrinque acuta glaberrima, extima sessilia, venosa. Petiolus 2–3-pollicaris, pedunculi longitudine petioli, flores circiter duodecim subsessiles capitatos gerentes. Bracteae minutissimae. Calyx et corolla sericei, calyx cupuliformis, fructifer quintuplo auctus, drupa subtriplo minor. Corolla unguicularis. Drupa piso duplo major ovato-oblonga. — Crescit in insula Trinitatis.

33. V. CUNEATA Schum. et Thonn. Kongl. Dansk. vidensk. Selsk. Afhandl. IV. 63. † — Arborea excelsa: foliis quinato-digitatis, foliolis petiolulatis obovato-cuneatis integerrimis vix acuminatis coriaceis glabris; paniculis dichotomis cymosis axillaribus, pedunculo fere petiolum aequante; floribus incarnatis subsessilibus. ♄ — Ramuli tetragoni glabri fusci. Foliola supra nitida obscuriora, rhachide costisque albidis, 3–7-pollicaria, lateralibus minoribus. Petiolus longitudine foliolorum majorum, petioluli vix pollicares. Pedicelli brevissimi, bracteae subulatae deciduae. Calyx campanulatus brevis 5-dentatus pubescens. Tubus corollae intus barbatus, labium superius subrotundum breviter bifidum subfornicatum, extus puberulum, laciniae laterales ovatae aequales, infima basi coarctata reliquis longior subrotunda violacea, ad faucem flavescens. Stamina didynama exserta, longiora hinc inde pilosula. Antherae didymae atro-purpureae. Drupa magnitudine *Pruni* ovata nitida, calyci cupuliformi insidens, pulpa eduli subatra, nuce subossea quadriloculari. — Ab incolis appellatur Fjong. — Crescit in Guinea (Almindelig).

34. V. HETEROPHYLLA Roxbgh. Hort. Benghal. 46. — Wall. Catal. 1745! et Plant. Asiat. rarior. III. 15. † t. 226. — Foliis (alternis?) quinatis, foliolis ovato-oblongis

valde acuminatis integerrimis brevibus; panicula terminali brachiata; floribus pubescentibus cymosis. ♄ — Arbor excelsa umbrosa. Ramuli foliaque glaberrimi grisei. Petioli $2\frac{1}{2}$-pollicares, foliola petiolulata, intermedium maximum 5-7-pollicare, 3 circiter pollices latum, lateralia sensim minora, omnia nitida, subtus nervoso-reticulata, petioluli pollicares. Panicula ampla terminalis multiflora. Pedicelli brevissimi puberuli, flores majusculi ochroleuci. Calyx lineam longus. Corollae faux purpureo-punctata, lacinia labii inferioris intermedia purpurea. Stamina glabra. — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

35. V. SELLOWIANA Chamisso, Linnaea VII. 108. † — Foliis longe petiolatis quinquefoliolatis, foliolis breviter petiolulatis lanceolatis, utrinque acutis acuminatis mucronatis inaequalibus, medio maximo, supra glabris, nervo venisque subtus cum petiolulis, petiolo, ramulo, gemma inflorescentiaque rufescenti-subhirsuto-pilosis; cymis axillaribus ter quaterve bifidis confertifloris, pedunculo petiolum aequante. ♄ — Rami secedente epidermide glabri, hornotini tetragono-compressi hirtelli, dense foliosi. Petioli 3-pollicares longioresque, foliola plana, maximum 5-pollicare, 15 lin. latum, petiolulus 4 lin. longus, extima $2\frac{1}{2}$-pollicaria, 9 lin. lata, costato- et tenuiter reticulato-venosa. Cyma sub anthesi diametro circiter pollicari, flores subsessiles, bracteae setaceae calycem aequantes vel longiores. Calyx breviter et acute quinquedentatus, corolla circiter semipollicaris, intus ab insertione staminum ad faucem villosa. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

36. V. LOUREIRII Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 206. t. 48. — Ramis foliisque ternato-quinatis, utrinque glabris, foliolis oblongo- vel obovato-lanceolatis obtuse acuminatis, basi cuneatis, venosis nitidis integerrimis; paniculis terminalibus vel ex axillis superioribus pubescentibus erectis decompositis strictiusculis. ♄ — Differt a proxima *V. Negundo* jam primo intuitu foliolis omnibus petiolulatis. — *Cornutia quinata* Lour. Flor. Cochinch. II. 470. — Crescit ad Cantonem Chinensium.

37. V. NEGUNDO Linn. Spec. plant. 890. — Willd. Spec. plant. III. 393. — Foliis ternatis quinatisque, foliolis lanceolatis integerrimis vel serrato-repandis acuminatis, tribus majoribus (semper) petiolulatis, duobus minoribus sessilibus, infra canescentibus, in nervis puberulis; floribus in paniculam amplam racemulosam digestis. ♄ — Petioli saepe sesquipollicares, foliolo intermedio tripollicari, pollicem lato, petiolulo (vel basi cuneato-attenuata) semipollicari, foliola lateralia duo minora, extima duo sessilia minima ovata, obovata vel elliptica obtusissima vel acuminata, semipollicaria, ad sesquipollicem usque longa. Panicula terminalis trichotoma, ad ramificationes foliis simplicibus lanceolato-linearibus instructa multiflora, rhachis cum calycibus albo-tomentosa. Flores in cymulis oppositis verticillastra referentibus subsessiles. Calycis breviter campanulati dentes demum obsoleti, drupam subglobosam nigram quadrisulcam amplectentes. — *V. bicolor* Willd. Enumer. plant. hort. Berolin. 606. (Hb. Willd. 11709.) — *V. arborea* Fischer in Dsfont. Catal. hort. Paris. (edit. 3.) 391. — *V. paniculata* Lam. Encycl. II. 606. — *Vitex trifolia Indica minor serrata* Pluk. Almath. 390. — *Negundo arbor mas* Bauh. Hist. I. 189. — *Lagondium litoreum* Rmph. Herb. Amboin. IV. 50. t. 19. — *Bunnosi* Rheede, Hort. Malab. II. 15. t. 11. — *Vitex sylvestris trifolia Indica cordata* Burm. Thes. Zeylan. 229. R. — (Sieb. Hb. flor. Maurit. no. 84.) — Crescit in India orientali, in Manilla et in insula Sti. Mauritii.

38. V. SPICATA Loureiro, Flor. Cochinchin. II. 475. † — Caule fruticoso ramoso; foliis quinatis rariusve ternatis, foliolis lanceolatis crenatis integerrimisque tomentosis rugosis longiuscule petiolulatis; floribus in spicas longas saepe congestas terminales dispositis; corollae tubo globoso, limbi patentis quinquefidi laciniis obtusis, infima majori; bacca subrotunda fusca tetrasperma. ♄ — Species quoad genus forte dubia. Frutex 8-pedalis. Folia opposita laete virentia graveolentia. Spicae longae lineares. Calyx minimus acute 5-fidus persistens. Stamina 4 didynama, corollae tubo prope basin inserta, corollae lacinia inferiore

breviora, superioribus longiora. Stigma reflexum bifidum. — Crescit in China et in Cochinchina locis cultis incultisque.

§. 4. *Foliis quinatis vel septenatis.*

39. V. AGNUS CASTUS Linn. Spec. plant. 890. — Schkuhr, Hndbch. t. 177. — Sbthrp. et Sm. Flor. Graec. VII. t. 541. — Willd. Spec. plant. III. 391. — Foliis longe petiolatis digitatis, foliolis 5–7– vel etiam 9–nis lanceolato–linearibus integerrimis vel vix levissime subrepandis acuminatis, hinc inde obsolete denticulatis, infra canescenti–puberulis, duobus extimis saepe minimis, semper sessilibus; cymis subsessilibus glomeratis oppositis in spicas interruptas terminales et axillares, paniculam amplam terminalem efficientes digestas, dispositis. ♄ — Rami lignosi teretes, versus apicem pulveraceo–pubescentes. Folia longiuscule petiolata, petioli 1–2–pollicares vel etiam longiores. Foliola interdum terna, frequentius 5–7–na, nonnumquam 9–na vel plura, petiolulata, extima sessilia, 1½–4–pollicaria, semipollicem lata vel angustiora lanceolato–linearia, longe acuminata, nervo subtus prominente, infra canescenti–puberula argentea, nervo medio supra tomentello. Cymae multiflorae subsessiles, foliis parvis ternatis vel simplicibus bracteatae, spicam interruptam strictam formantes. Spicae axillares et terminales pedunculatae, inferiores folio breviores. Rhachis, calyces et corollae extus argenteo–tomentelli. Calyx campanulatus breviter obtuseque quinquedentatus, fructum maturum demum ultra dimidium includens. Corollae tubus amplus calyce ultra duplo longior, limbus oblique bilabiatus, laciniis 2 superioribus brevibus obtusis, intermedia labii inferioris maxima ovali. Stamina exserta, labio inferiore vix longiora glabra vel villosa, antherarum loculis discretis, apice tantummodo cohaerentibus. Drupa globosa umbilicata vix calyce major brunnea glabra tetrasperma quadrilocularis. — *Vitex* Camer. Epit. 165. — Ludw. Ectyp. plant. t. 28. — Blackw. Herb. t. 139. — *V. verticillata* Lam. Fl. Franc.

β. latifolia: Foliis plerumque quinatis, foliolis lanceolatis latioribus, integerrimis vel hinc inde dentatis. — Varietas vix distinguenda. — *V. latifolia* Mill. Dict. no. 2. — *Vitex latiore folio* Bauh. Pinx. 475. — Kniph. Centur. II. 99. — Crescit in Istria prope Fiume ai Piopi, Sudae, in Corsica prope Ajaccio, in Sardinia, in Hispania australi, in regione Alpujarras, in Macedonia, prope Smyrnam, in Sicilia et in regno Neapolitano. (v. s. sp. et c.)

40. V. FERRUGINEA Schum. et Thonn. Kongl. Dansk. vidensk. Selsk. Afhandl. IV. 62. † — Foliis digitatis, foliolis quinis septenisve glabris oblongis acuminatis, basi attenuatis brevissime petiolulatis, junioribus conduplicatis ferrugineo–tomentosis; corymbis axillaribus dichotomis oppositis. ♄? ♃? — Ramuli anni praecedentis ferrugineo – tomentosi, tenelli vix pubescentes. Foliola petiolulata obtusa, basi acuta, supra nitida, petiolorum longitudine. Pedunculi axillares vix pollicares ferrugineo–tomentosi, bracteae lanceolatae, supra (intus) nitidae, extus ferrugineo – tomentosae. Calyx quinquefidus extus ferrugineo – tomentosus. Corollae tubus longitudine calycis, labio superiore parvo breviter bifido, laciniis lateralibus reflexis, intermedia concava ad faucem barbata. Stamina subaequalia breviter exserta. Stigma acute bifidum. — *Vitex ferruginea* Vahl, quam Kunthius nosse videtur indagare non possum ideoque inter species dubias removeatur. — Crescit in Guinea (Ved Aquapim).

41. V. HEPTAPHYLLA Juss. Ann. du Mus. d'hist. natur. VII. 77. — Arbuscula: foliis digitatis septenatis (petiolo communi sesquipollicari), foliolis petiolulatis (petiolulis semipollicaribus) ovato–lanceolatis coriaceis integris glabris (interdum paucioribus); pedunculis axillaribus petiolos duplo superantibus trichotome paniculatis multifloris; floribus parvis; corollis subvillosis tubulosis quinquelobis, calyce quinquedentato duplo longioribus. ♃ — Fructus desideratur. — Species ab auctoribus semper omissa. — Crescit in insula Dominica, ubi dicitur: *Bois de Savane.*

† *Species valde dubia.*

42. V. GENICULATA M. Blanco, Flora de Filipinas 514. — Foliis quinatis ternatisque, foliolis lanceolatis, margine et nervo medio villosissimis *(petiolo comun con un nudo acia el medio, desde donde se doblo un poco en otro sentido)*, breviter petiolulatis; panicula verticillata; calyce parvo campanulato 3-4-dentato; corolla campanulata bilabiata, tubo incurvato sursum ampliato, labio superiore emarginato, inferiore trilobo, lacinia medio majori, fauce lanata; staminibus 4 didynamis infra villosis, antheris semilunaribus; stylo stamina aequante, stigmate bifido; drupa parva globosa. ♄ — Arbor quinquaginta pedum altitudine. — Crescit in insulis Philippinis.

†† *Species nomine tantum cognitae.*

V. AXILLARIS Wall.
V. BABULA Wall.
V. CANESCENS Wall.
V. FINLAYSONIANA Rxb.
V. FERRUGINEA Vahl (ex Kth.)
V. PALLIDA Wall.
V. PEDUNCULARIS Wall.
V. SALIGNA Wall.
V. SCABRA Wall.
V. SEXDENTATA Wall.
V. UNDULATA Wall.

††† *Species e genere excludendae.*

V. ARTICULATA Steud. = WALLROTHIA ARTICULATA.
V. LAEVIGATA Madr. Herb. = PSYCHOTRIA VITICINA.
V. LEUCOXYLON Linn. fil. = WALLROTHIA LEUCOXYLON.
V. PINNATA L. = AGLAJA ODORATA.
V. TRIFLORA Vahl. = CASARETTOA DIVERSIFOLIA.
V. POLYGAMA Chamisso. = CASARETTOA MOLLISSIMA.

XXXII. CASARETTOA *Wlprs.*

Flores polygami vel hermaphroditi. Calyx bibracteolatus hypocraterimorphus profunde quinquefidus, quinquenervis, laciniis foliaceis lanceolatis obtusis. Corolla tubulosa hypogyna, tubus calyce dimidio longior, tota extus magis minusve tomentosa, limbus bilabiatus, laciniis duabus superioribus brevioribus ascendentibus, lateralibus duabus majoribus latioribus porrectis, intermedia infima maxima rotundato-concava, basi contracta, crenulata. Stamina 4 tubo supra basin inserta didynama exserta, florum foemineorum stamina subpetaloidea circa germen inserta. Filamenta ad insertionem barbata, filiformia, antheris reniformi-sagittatis bilocularibus. Ovarium tomentosum globosum quadriloculare. Stylus staminibus longior, stigma brevissime bifidum. Drupa succosa calyce inclusa monopyrena, pyreno 4-loculari tetraspermo. — Arbores vel frutices Americae tropicae, foliis oppositis quinatis et ternatis, cymis pedunculatis axillaribus trichotomis.

1. C. MOLLISSIMA Wlprs. — Tota mollissime ferrugineo-fulvo-tomentosa: foliis petiolatis quinatis, supremis ternatis, foliolis petiolulatis ovato-ellipticis vel elliptico-lanceolatis, basi acuminatis, infra fulvescenti-leoninis; pedunculis axillaribus petiolo pluries longioribus, cymam contractam pluries trichotomam multifloram fastigiatam gerentibus; floribus polygamis et hermaphroditis. ♄ — Rami teretes, ad foliorum insertionem valde compressi, antiquiores nigrescentes glabri, hornotini cum petiolis, pedunculis, foliolis, pedicellis, bracteis, calycibus corollisque extus mollissime tomentosi, e ferrugineo fulvescenti-leonini. Petioli sesquipollicares, foliola brevissime petiolulata subaequalia vel intermedio parum

majori, 3–4–pollicaria, 1–1½ poll. lata, integerrima, vix acuminata, supra obscuriora, infra praesertim ad nervos fulvescentia, penninervia, nervis prope marginem anastomosantibus. Pedunculi axillares (terminales a me non visi sunt), 2–2½–pollicares, apice cymam contractam irregulariter et brevissime iterum iterumque dichotomam gerentes, bracteae ad ramulorum basin lanceolato–lineares foliaceae, flores in dichotomiis singuli pluresve aggregati sessiles. Calyx ad basin bibracteolatus, bracteolae calycem aequantes vel vix superantes lineares obtusae. Calyx hypocraterimorphus densissime tomentoso–pilosus 6–9 lin. longus, laciniis lanceolatis obtusis uninerviis subbilabiatis. Corolla tubulosa recta, extus densissime tomentosa calyce duplo longior, limbi bilabiati laciniae duae superiores brevissimae ovatae vix acutae, laterales latiores paulloque longiores, infima basi subcontracta maxima, apice breviter bifida. Floris hermaphroditi stamina e fauce corollae breviter exserta, floris foeminei filamenta quatuor castrata subpetaloidea, infra germen inserta illudque involventia. Drupa calyce inclusa nigra globosa succosa pubescens demum glabra, monopyrena, pyreno quadriloculari tetraspermo. — *Vitex polygama* Chamisso, Linnaea VII. 371. — Claussen, Hb. fl. Brasil. no. 396. — Crescit in Brasiliae provincia Minas Geraës. (v. s. sp.)

2. C. DIVERSIFOLIA Wlprs. — Ramis glaberrimis; foliis petiolatis ternatis, foliolis ovatis, obovatis vel ovato–ellipticis acuminulatis membranaceis glaberrimis, infra ad nervos setulosis subintegerrimis, medio semper petiolulato; pedunculis axillaribus petiolum aequantibus, apice cymulam bibracteatam trifloram vel iterata ramificatione septemfloram gerente; calycibus membranaceis glabriusculis reticulato–venosis vel ad nervos setuloso–hispidulis. ♄ — Rami ad nodos subcompressi glabri. Folia omnia ternata petiolata opposita, petioli plerumque sesquipollicares ferrugineo–setuloso–tomentosi, ad foliorum insertionem ferrugineo-barbati. Foliola terna, medio breviter petiolulato semper maximo, lateralibus subsessilibus vel sessilibus minoribus, ovata, obovata, obovato–cuneata, ovato-elliptica vel ovato–lanceolata, basi fere semper longe cuneata, apice obtusa vel magis minusve abrupte acuminata, acumine cum apiculo, 2–5–pollicaria ¾–2½ poll. lata, membranacea subintegerrima vel obsolete subrepanda, supra glaberrima, infra ad nervos setulosa, penninervia, nervis marginem versus eleganter anastomosantibus. Cymae axillares vel parum supraaxillares pedunculatae, pedunculo petiolum subaequante, apice bracteas geminas foliaceas lineares, apice latiores obtusas (¾ poll. longas) gerente, trifloro, flore medio sessili, lateralibus bibracteolatis pedicellatis, vel pedicellis iterum trifloris et cyma tunc magis minusve regulariter septemflora vel etiam rarius pedicellis uniseriatim racemosis. Calyx membranaceus 6–9 lin. longus distincte bilabiatus, hypocraterimorphus, 5–nervis, reticulato–venosus, laciniis 3 lin. longis lanceolatis obtusis, duabus parum profundius excisis parumque longioribus inferioribus. Corolla calyce duplo longior tubulosa, tubo extus adpresse rufescenti–tomentoso incurvato, laciniis limbi bilabiati duabus superioribus porrectis lanceolato–ovatis obtusis, lateralibus parum latioribus longioribusque, infima duplo longiori carinata integerrima protracta. Stamina prope basin tubo inserta, ad insertionem tomentosa, filiformia inter lacinias labii superioris longe exserta didynama subdecurva. Ovarium globosum minimum tomentosum quadriloculare, stylus filiformis exsertus staminibus longior setulosus, stigma brevissime bifidum. Si recte vidi, ovarii loculi tres abortu steriles. — Corolla extus densissime rufescenti–tomentosa, intus glabra purpurascens. Filamenta et stylus purpurea. Calyx post anthesin auctus, supra ovarium subconstrictus, laciniis longioribus distinctiusque bilabiatis. — *Vitex triflora* Vahl, Eclog. plant. II. 49. — Crescit in Cayenne, ad fluvium Amazonum circa Egam et Maynas. (v. s. s.)

XXXIII. (3701.) **PREMNA** *Linn.*

(Linn. Gener. pl. no. 1316. — Meisn. Gener. pl. vascul. I. 291. II. 199.)

§. 1. *Integrifoliae.*

* *Glabrae.*

1. PR. ATTENUATA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 368. (edit. N. ab E.) — Foliis oblongo-obovatis obtusis integerrimis glabris, basi acutis. ♄ — In Nova Hollandia.
2. PR. MEDIA R. Br. l. c. — Foliis late ovatis acutis integerrimis subtus costatis ramulisque glaberrimis. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.
3. PR. TIMORIANA Dcne. Nouv. Ann. du Mus. III. 402. — Ramis ramulisque teretibus glabris; foliis ovatis, basi rotundatis acuminatis vel obtusis integerrimis, rarius superne grosse dentatis, glabris, petiolis supra puberulis; cymis terminalibus dichotomis quam folia brevioribus; pedunculis puberulis; calycibus cyathiformibus subquinquedentatis. ♄ — Crescit in insula Timor.
4. PR. INTEGRIFOLIA Linn. Mantiss. 253. — Foliis ellipticis brevissime acuminatis integerrimis, utrinque glabris; panicula corymbosa terminali. ♄ — Drupa parva quadrilocularis, putamine fragili. — [Sub nomine *Pr. integrifoliae* verosimile diversae latitant species. Linnaeus in Mantissa 253. folia dicit ovata vel cordato-ovata, Willdenowius autem in Spec. plant. III. 314. elliptica brevissime acuminata, utrinque glabra pronunciat. In allegata figura Rumphii Herb. Amboin. III. 209. t. 134. folia ovata et utrinque obtusa delineata sunt, in descriptione scabra et crassa dicuntur. In specimine Tranquebariensi sunt folia elliptica breviter acuminata subcoriacea, supra glaberrima nitida, subtus pallidiora, cum petiolis, ramis, corymbi ramulis calycibusque piloso-scabra. — Rotb, Nov. spec. pl. 286. adnot.] — *Folium hirci* Rmph. Herb. Amboin. III. 209. t. 134. — *Cornutia corymbosa* Burm. Flor. Indic. 133. t. 41. fig. 1. — Crescit in India orientali.
5. PR. OBTUSIFOLIA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 368. (edit. N. ab E.) — Foliis ovalibus obovatisve obtusissimis integerrimis glaberrimis, basi cordatis; panicula terminali cymoso-dichotoma. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.
6. PR. PARVIFOLIA Rtb. Nov. spec. plant. 288. † — Spinis axillaribus oppositis; foliis ovato-subrotundis integerrimis tridentatisve glabris; racemo terminali. ♄ — Species quoad flores male descripta certe non hujus generis. — „Caulis ad ramificationes subcompressus, caeterum teres cinereus, rami oppositi, folia petiolata obtusa, 3–4 vel ad summum 8 lin. longa totidemque fere lata, petioli folio dimidio breviores. Spinae in axillis foliorum oppositae simplices subulatae semiunciales et unciales, nudae vel in medio foliorum pari instructae. Racemus terminalis strictus, flores oppositi pedunculati magni, pedunculi sesquilineam longi pubescentes. Calyx campanulatus truncatus obsolete crenatus subbilobus pubescens. Corolla fere sesquiunciam longa tubulosa, fauce maxima dilatata, limbi quadrifidi laciniis ovatis integerrimis, quarta infima maxima. Antherae nigrae bifidae." — Forte cum *Gmelina parvifolia* Rxb. (cf. pag. 97. no. 3.) consocianda erit. — Crescit in India orientali.
7. PR. LONGIFOLIA Rxb. Flor. Indic. III. 79. — Arborea: foliis oppositis petiolatis ovato-oblongis oblongisve integris acuminatis, utrinque glabris, petiolis canaliculatis subvillosis; corymbis terminalibus patentibus; floribus numerosis parvis; calyce bilabiato; corollae tubo brevi, limbo bilabiatim quadripartito, lacinia infima emarginata; drupa globulosa nigra. ♄ — Petioli 2–3-pollicares, folia 4–10-pollicaria. Margo interpetiolaris villosus. Corymbi ramificationes primariae brachiatae, reliquae dichotomae. Flores albi. Drupa magnitudine granis *Piperis nigri*. — Flores odorati. — Crescit in sylvis Bengalensibus.
8. PR. SPINOSA Rxb. l. c. 77. — Arborea spinosa (spinis in trunco ramisque adultis oppositis): foliis oppositis rarius ternatis vel quaternatis verticillatis petiolatis ovalibus integris obtusis, utrinque glabris; corymbis terminalibus pedunculatis; bracteis parvis; calyce trifido; corolla ad faucem villosa; drupa globosa pisiformi nigra, putamine quadriloculari. ♄ — Petioli breves subcanaliculati. Folia

2–3-pollicaria. Flores parvi numerosissimi virescenti–lutei pilosissimi graveolentes. Corollae forma non satis nota *(Corol, tube thrice as long as the calyx, throat woolly, upper divisions of the border twice as long as the upper divisions of the border of the corol).* — *Gumira littorea* Rmph. Herb. Amboin. III. t. 134. — *Cornutioides* Linn. Flor. Zeyl. no. 416?? — Crescit in India orientali prope Calcuttam.

9. PR. LATIFOLIA Rxb. l. c. 76. — Arborea: ramis patentibus cinereis glabris; foliis petiolatis rotundato–cordatis ovalibusve integris acuminatis vel obtusis subpuberulis: corymbis terminalibus axillaribusque trichotomis; bracteis minutis deciduis; calyce campanulato quinquedentato persistente; corollae ad faucem lanatae labio superiore trifido, inferiore emarginato; drupa pisiformi glabra nigra, putamine quadriloculari. ♄ — Petioli pollicares teretiusculi, folia 2½–pollicaria. Flores numerosi sordide lutei. Antherae coerulescentes. Stylus corolla longior. — Crescit per totam fere oram Coromandelianam.

10. PR. CORDIFOLIA Rxb. l. c. 78. — Fruticosa: ramis virgatis ramulosis; foliis oppositis breviter petiolatis cordatis vel cordato–ovatis integris acuminatis bullatis, utrinque glabris, supra nitidis; corymbis terminalibus; bracteis oblongis; calyce bilabiato; corollae bilabiatae labio superiori angusto integro, inferiori aequilongo lato trilobo; stylo corolla longiore; drupa pisiformi, putamine 3–4-loculari. ♄ — Frutex 6–8-pedalis, rami virgati simplices vel ramulosi. Folia 3–6-pollicaria. Corymbi ramificationes primariae decussatae, reliquae dichotomae teretes villosae olivaceae. Corollae faux albo–villosa. Stamina corollae circiter longitudine. — *Folium hircinum* seu *Gumira domestica* Rmph. Herb. Amboin. III. 208. t. 133.*) — Crescit in India orientali in „Prince of Wales Island".

** *Pubescentes.*

11. PR. TOMENTOSA Willd. Spec. plant. III. 314. — Foliis ovatis acuminatis integerrimis, subtus tomentosis. ♄ — Rami teretiusculi, cortice flavescente, juniores tomentosi. Folia opposita petiolata-ovata valde acuminata integerrima venosa, supra glabra, subtus tomentosa. Cyma multiflora terminalis coarctata dichotoma. Pedunculi tomentosi. Bracteae minutissimae subulatae ad pedunculorum ramificationes. Flores magnitudine *Pr. integrifoliae.* Calyx florifer bilobus valde tomentosus, laciniis obtusis obsolete dentatis, calyx fructifer bilabiatus, labio altero 2–, altero 3–dentato. Drupa parva, putamine duro. — *Cornutia corymbosa* Lam. Encycl. I. 54. — Crescit in India orientali.

12. PR. CORDATA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 363. (edit. N. ab E.) — Foliis reniformi–cordatis acuminatis, adultis integerrimis, utrinque tomentosis, subtus mollissimis. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

13. PR. OVATA R. Br. l. c. — Foliis ovatis acutis integerrimis, petiolo quadruplo quintuplove longioribus, subtus ramulisque tenuissime tomentosis; paniculis supradecompositis. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

14. PR. ARBOREA Rth. Nov. plant. spec. 287. † — Foliis subrotundo–cordatis breviter acuminatis trinerviis venosis, subtus cinereo–tomentosis integerrimis; racemis simplicibus. ♄ — Rami teretes grisei glabri. Folia opposita petiolata, palmam longa et lata, supra glaberrima, trinervia venosa, basi subinaequalia, lobo altero paullo rotundiore, vel cordata vel retusa vel juniora in petiolum subattenuata. Petioli teretes digitales, cinereo–pubescentes. Racemus terminalis simplicissimus laxus tomentosus, flores oppositi magni, pedicelli 3 lin. longi nudi; bracteae ad basin pedicellorum solitariae oblongo–lanceolatae tomentosae, illum aequantes. Calyx brevissimus truncatus subbilobus 5–dentatus. Corolla magna,

*) *Hanc cum* Pr. foetida *et* Pr. parasitica *ad proprium genus convocavit Hasskarl (Flora [B. Z.] XXV. II. Beibl.* 26.) — Gumira *Rmph. l. c. — Calyx cyathiformis obsolete quadridentatus, nunc bilabiatus persistens. Corolla infundibuliformi–hypocraterimorpha, limbo patente quadripartito. Stamina* 4 *subaequalia, antherae biloculares subrotundae. Stylus filiformis, stigma bifidum.*

extus cinerascenti-tomentosa, tubus 2 lin. longus, limbus magnus inaequaliter 5-fidus. — Crescit in India orientali.

15. PR. MOLLISSIMA Rth. l. c. 286. † — Foliis ovatis subcordatis obtusis villosis mollissimis integerrimis. ♄ — Rami cinerei glabri, ad ramificationes compressi, annotini rufescentes et pubescentes. Folia opposita petiolata, basi vel subcordata vel obtusissima integra et inaequalia, latere altero parum in petiolum producto, acumine brevi obtuso terminata, 1½-2-uncialia et totidem lata obscure viridia venosa, utrinque villo tenuissimo et densissimo obducta, tactu mollissima. Petioli cinerei pubescentes teretes folio paullo breviores. Cyma terminalis densa ferrugineo-tomentosa repetito-dichotoma. Bracteae ad dichotomias geminae oppositae albidae tomentosae, lineari-oblongae obtusae patentes, lineae circiter longitudine. Calyx parvulus truncatus tomentosus. Corolla tomentosa parva albida quadrifida. Drupa atra glaberrima nitida subglobosa magnitudine seminis *Raphani sativi* bilocularis, loculis dispermis, putamine duro. — Crescit in India orientali.

16. PR. MUCRONATA Rxb. Flor. Indic. III. 80. — Arborea: foliis oppositis petiolatis late ovatis, basi attenuatis apiceque acute acuminatis subvillosis; corymbis terminalibus. ♄ — Durissimum lignum usui est incolis ad aedificandum. Differt ab omnibus hujus generis speciebus foliis basi attenuatis. — Crescit in India orientali (Silhet).

17. PR. SCANDENS Rxb. l. c. 82. — Fruticosa scandens: ramis junioribus quadrangularibus villosis; foliis petiolatis anguste ovato-oblongis ad formam cordatam transeuntibus longe acuminatis integerrimis, interdum villosis; petiolis villosis; corymbis terminalibus; bracteis subulatis; calyce cupuliformi integro glabro; corollae laciniis 4 oblongis obtusis aequalibus. ♄ ◡ — Petioli pollicares, folia 4-6-pollicaria, 1½-4 poll. lata. Inflorescentiae ramificationes primariae decussatae, reliquae dichotomae, omnes villosae. Flores numerosi minimi virescenti-flavi. Corollae faux lanata. Drupa rotundata pisiformis nigra glabra. — Crescit in sylvis Indiae orientalis provinciae Silhet.

18. PR. FLAVESCENS Juss. Annales du mus. d'hist. natur. VII. 77. — Fruticosa: ramis, foliis et paniculis flavescenti-tomentosis; foliis petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis. ♄ — Paniculae terminales et axillares trichotomae, flores parvi. Drupa quadrilocularis tetrasperma, semine uno alterove interdum abortiente. — Crescit in ripa Coromandeliana.

19. PR. RETICULATA Juss. l. c. II. 68. — Foliis ovato-oblongis acuminatis subintegerrimis, subtus venoso-reticulatis subtomentosis; paniculae ramis decussatis; calycibus quadridentatis incanis. ♄ — Arbor mediocris, rami ramulique tetragoni sulcati incani. Folia opposita petiolata 5-6-pollicaria integra vel rarius tenuissime crenulata rugosula glabra, subtus reticulato-venosa tomentoso-scabrella ferruginosa. Petioli 1½-2-pollicares ferrugineo-pubescentes. Paniculae terminales et axillares folio breviores, pedunculi 2-3-pollicares tetragoni incani, rami decussati patuli. Flores parvuli. Calyx tetragonus incano-flavescens 4-dentatus. Corolla regularis quadrifida, stamina corolla parum longiora. Drupa coccinea calyci insidens dipyrena, pyrenis hemisphaericis bilocularibus dispermis. — *Citharexylum melanocardium* Swrtz. Fl. Ind. occid. II. 1046. — *Citharexylum paniculatum* Grtnr. De fructib. et seminib. I. 270. t. 56. — Crescit in campestribus Jamaicae insulae.

20. PR. PARASITICA Blume, Catal. pl. hort. Buitenzorg. 84. — Foliis majusculis subcordato-ovalibus acutis seu obtusis, basi interdum subcordato-peltatis(?), in venis utrinque margineque pubescentibus; panicula corymbosa terminali puberula; calyce bilobo. ♄ — Crescit in sylvis montanis insulae Javae parasitica in arboribus.

21. PR. ACUMINATA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 368. (edit. N. ab E.) — Foliis rhombeo-ovatis acuminatis integerrimis, petiolo duplo longioribus, subtus ramulisque tomentosis mollibus; cymis laxis. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

§. 2. *Serratifoliae.*

* *Foliis oppositis.*

22. PR. FOETIDA Reinwrdt. mss. ex Blume, Bijdragen 816. — Foliis ovalibus acuminatis, superne repando-crenulatis glabris, in axillis costarum infra pubescentibus; calycibus obsolete quinquedentatis subbilabiatis. ♄ — Crescit in sylvis montosis Javanicis.
23. PR. PUBESCENS Blume l. c. — Foliis ovalibus acuminatis, superne repando-dentatis, utrinque pubescentibus; calycibus quinquedentatis subbilabiatis. ♄ — Affinis dicitur praecedenti. — In sylvis Javanicis ad radices montis Tjerimai.
24. PR. SERRATIFOLIA Linn. Mantiss. plant. 253. — Foliis petiolatis ovatis obtusis laevibus serratis, basin versus integerrimis; stipulis sublanceolatis deciduis(!!); cymis terminalibus dichotomis; bracteis linearibus oppositis minutis. ♄ — *Cornutioides* Linn. Flor. Zeylanic. 416. — Crescit in Zeylania.
25. PR. HERBACEA Rxb. Flor. Indic. III. 80. — Herbacea perennis: foliis oppositis breviter petiolatis obovatis serratis, utrinque subvillosis; corymbis axillaribus terminalibusque parvis, folio brevioribus; floribus parvis (lutescenti-albis); corollae quadrifidae lacinia superiori rotundata, fauce pilosa. ♃ — Crescit in Dinagepore in Bengalo interiori.
26. PR. ESCULENTA Rxb. l. c. 81. — Fruticosa ramosa: foliis breviter petiolatis oblongis acuminatis grosse aculeque serratis; corymbis terminalibus breviter pedunculatis ramosissimis contractis; bracteis minutis; calyce inaequaliter quinquedentato; corollae breviter campanulatae lacinia suprema latiori obtuse tridentata, reliquis tribus subaequalibus; drupa parva rotundata purpurea. ♄ — Rami oppositi glabri virides. Folia 4–10-pollicaria, 2–5 poll. lata. Flores parvi virescenti-lutei. Faux pilosa. — Crescit in India orientali ad Chittagong.

** *Foliis verticillatis quaternis.*

27. PR. QUADRIFOLIA Schum. et Thonn. Kongl. Dansk. videnskab. Selsk. Afhandl. IV. 49. † — Foliis quaternis verticillatis cordato-ovatis acuminatis serratis; paniculae ramis subdichotomis. ♄ — Ramuli teretes tomentosi, punctis elevatis scabrelli. Folia versus apicem obtuse serrata subtomentosa, venosa, tripollicaria, petiolo pollicari tereti tomentoso. Panicula terminalis, rami verticillati quaterni, pedicellis brevissimis. Calyx brevis campanulatus obsolete bilobus persistens, lobo superiori obsolete emarginato. Corollae albidae tubus ventricosus, intus villosus, limbo inaequaliter quadrilobo, lacinia superiore longiore rotundata patente, lateralibus angustis erectis, inferiore latiore et breviore obtusa subemarginata erecta. Filamenta corolla vix longiora 4 subdidynama. Stylus filiformis declinatus, stigma bifidum acutum patens. Drupa magnitudine *Ribcos* globosa scabriuscula, „nuce obtusa, basi acuta quadriloculari rugosa". — Variat foliis angustioribus integerrimis, supra villosulis, subtus ferrugineo-tomentosis, praesertim in ramis fructiferis. — Crescit in Guinea.

† *Species vix notae.*

28. PR. ODORATA M. Blanco, Flora de Filipinas 488. — Foliis oppositis subcordatis acuminatis villosis (fragrantibus); floribus in umbella *(mui)* magna *(y llana)* terminali dispositis; calyce bilabiatim quinquepartito, florifero cylindrico, fructifero campanulato; corollae fauce pilosa, limbo quadrifido, lacinia superiori lateralibus parum majori, labio inferiori minori leviter emarginato *(y casi en linea con el tubo de la corola)*; staminibus 4 didynamis; stigmate bifido; drupa parva globosa, nuce ossea oblonga verrucosa, quadriloculari, tetrasperma. ♄ — Arbuscula 12–15-pedalis. — Crescit in insulis Philippinis.
29. PR. NAUSEOSA Blanco l. c. 489. — Foliis vix cordatis oblongis elongatis integris glabris; calyce quinquedentato. ♄ — Arbuscula vix nota 12-pedalis; folia et flores odorem gravem spargunt, sed folia floresve triti odorati. — Crescit in insulis Philippinis.
30. PR. CORDATA Blanco l. c. (nec R. Br.) — Foliis cordatis integris supra glabris, infra tomentosis; paniculis magnis umbellaeformibus, foliis duobus subulatis ad

pedunculorum pedicellorumque basin; calyce quinquedentato; drupa monopyrena, pyreno uniloculari monospermo. ♄ — Frutex 5–7-pedalis. — Crescit in insulis Philippinis.

†† *Species e genere excludenda.*

PR. SALVIFOLIA Spr. = PITYRODIA SALVIFOLIA.

XXXIV. (3701/1.) HOLOCHILOMA *Hochstetter.*

(Hochstetter, Flora [B. Z.] 1841. p. 371. — Endl. Gener. plant. Supplem. II. p. 58. — Meisn. Gener. plant. vascul. II. 366.)

1. H. RESINOSUM Hochstetter l. c. 372. † — Arborescens: ramis teretiusculis ramulis oppositis dichotomis sulcatis subtetragonis albidis, sub epidermide fusco-rubellis; foliis petiolatis oppositis alternisve ovatis vix pollicaribus obtusis integerrimis, utrinque, praesertim subtus parce resinoso-punctatis, caeterum glaberrimis; pedunculis dichotomis terminalibus, ad ramificationes minute bracteolatis; calycibus resinoso-punctatis; floribus parvis calycem duplum aequantibus vel paullo superantibus albidis? (exsiccatis fuscis); drupa globosa vix *Pisi* magnitudine apiculata vel styli vestigio umbonata glabra, basi calyce demum lateraliter fisso et late aperto cincta. ♄ — Habitat in fissuris rupium ad montem Cordofanum Arasch-Cool et circa Milbes. (v. s. specimina deflorata).

XXXV. (3702.) PITYRODIA *R. Br.*

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. I. 513. [edit. N. ab E.] — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 200.)

1. P. (PREMNA Spr. Syst. veg. II. 755. no. 12.) SALVIFOLIA R. Br. l. c. — Frutex oppositifolius pube stellari subsquamulosa furfuracea tectus. Folia simplicia lanceolata integra rugosa, odore gravi, sapore fere *Menthae.* Pedunculi axillares oppositi congesto-multiflori. Flores albi. — Ex affinitate proxima *Callicarpae.* — Crescit in Nova Hollandia.

XXXVI. (3704.) GMELINA *Linn.*

(Linn. Gener. pl. no. 763. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 200.)

1. GM. PHILIPPENSIS Chamisso, Linnaea VII. 109. — Foliis ellipticis, utrinque breviter acuminatis, apice obtusis, subcoriaceis nitidis subtus in nervo venisque pilosis, caeterum nudis; bracteis ellipticis membranaceis pilosis, calyce ter quaterve longioribus. ♄ — Num species distincta, an *Gm. Asiaticae* sit varietas, cl. auctor dubitat. — Folia supra nitida, subtus opaca leviter glaucescentia in nervo et venis pilis longiusculis laxis antrorsis munita, margine reflexa, bipollicaria, 14 lin. lata, petiolo semipollicari. Calyx callis glandulosis pariter infectus, major, corolla minor quam in *Gm. Asiatica* culta, ramulus florifer pariter spinis expers. Fructus nondum maturus axi semipollice breviori. — Crescit in insulis Philippinis.
2. GM. ASIATICA Linn. Spec. pl. 873. — Willd. Spec. pl. III. 313. — Spinosa vel inermis: foliis suboppositis ovalibus vel obcordatis, irregulariter sublobatis, utrinque glabris nitidis; racemis terminalibus et ex ramorum axillis; bracteis parvis lanceolatis caducis; corollae magnae labio superiori maximo. ♄ — Spinae axillares oppositae horizontales foliiferae. Folia in ramis junioribus opposita, in adultis fasciculata, gemma nempe axillari evoluta, 1–1½-pollicaria, pollicem circiter lata. Flores magni nutantes lutei oppositi approximati. Stigmatis bipartiti lobus inferior quadruplo longior revolutus. Drupa quadrilocularis, loculis 2–3 saepius abortivis. — *Jambosa sylvestris parvifolia* Rmph. Hb. Amboin. I. 129. t. 40. — *Gmelina inermis* M. Blanco, Flora de Filipinas 493. ab hac specie non differt. — Crescit in tota fere India orientali. (v. s. sp.)
3. GM. PARVIFOLIA Rxb. Pl. of the coast of Coromand. II. 32. t. 162. — Fruticosa spinosa: spinis foliiferis; foliis sessilibus cuneatis et obovato-cuneatis, integerrimis vel apice emarginatis vel (ramorum sterilium) majoribus apice grosse tridentatis; racemis terminalibus paucifloris. ♄ — Proxima *Gm. Asiaticae*, sed differt foliis multo minoribus semipollicaribus pollicaribusve, 2–5 lin. latis, spinis numerosioribus numquam deficientibus racemisque semper terminalibus. — *Arbus-*

cula Bisnagarica Pluk. Alm. t. 14. fig. 4. — *Gmelina parviflora* Rxb. Fl. Indic. III. 87. — *Gm. Coromandeliana* Burm. Flor. Indic. 32. — *Premna parvifolia* Rth. Nov. spec. plant. 288. — Cf. pag. 93. no. 6. — Crescit vulgaris in omni ora Coromandeliana.

4. GM. OBLONGIFOLIA Rxb. Flor. Indic. III. 83. † — Arborea: foliis oppositis oblongis ovalibusve integris subrugosis obtusiusculis, utrinque ad nervorum basin glanduloso-impressis; paniculis terminalibus solitariis decussatis; bracteis parvis caducis; calyce cyathiformi integro. ♄ — Arbor 20–30-pedalis, cortice cinereo rugoso. Ramuli subquadrangulares. Petioli bipollicares canaliculati, folia 6–12-pollicaria, 3–8 poll. lata. Paniculae magnae ramificationes ferrugineo-pulverulentae. Flores numerosi rosei fragrantes magni. Calyx extus pulverulentus parceque glandulosus. Drupa oblonga obtusa subtetragona, glabra, nuce tetragona clavata quadriloculari, basi perforata. — Crescit in Bengalo orientali.

5. GM. VILLOSA Rxb. l. c. 86. † — Arborea spinosa: ramulis subteretibus villosis; foliis oppositis petiolatis trapeziformibus, margine integris, supra glabris, subtus pallidioribus pubescentibus; racemis terminalibus simplicibus pubescentibus; floribus pedicellatis nutantibus; bracteis lanceolatis cuspidatis (ad florum explicationem usque persistentibus); calyce obsolete quadridentato subtus glanduloso. ♄ — Arbuscula humanae altitudinis, cortice olivaceo, rami numerosi penduli. Folia 1–4-pollicaria, 1–2 poll. lata, interdum sublobata. Flores oppositi pedicellati, quam illi *Gm. Asiaticae* fere minores obscure lutescentes, ferrugineo-puberuli. Corollae tubus anguste cylindricus curvatus, fauce oblique gibboso-campanulata, limbi quadripartiti lacinia infima maxima. Drupa carnosa sphaerica (*Cerasi* magnitudine) glabra, matura lutea, nuce obsolete tetragona quadriloculari. Semina ovato-oblonga. — *Radix deipara* Rmph. Herb. Amboin. II. 124. t. 39. — Crescit in India orientali (Pulo Penang).

6. GM. ARBOREA Rxb. l. c. 84. — Arborea inermis: foliis oppositis petiolatis cordatis acuminatis integris, supra glabris, infra pilosis, basi 2–4-glandulosis; paniculis terminalibus decussatis, ramis racemiferis; bracteis lanceolatis deciduis pubescentibus. ♄ — Arbor elata, rami cinerei glabri. Folia 4–10-pollicaria, 2–7 poll. lata, petioli teretes villosi 2–3-pollicares. Paniculae terminales ovatae e racemis decussatis compositae, pubescentes. Flores oppositi magni nutantes lutei. Calyx parvus villosus obsolete quinquedentatus. Corollae campanulatae limbus quadripartitus, laciniis 3 superioribus brevioribus, inferiori majori bifida. Filamenta 2 longiora incurvata, antheris bifidis. Stylus staminum longitudine, stigmatis bifidi lobus longior recurvatus. Drupa ovalis glabra, matura flava quadrilocularis, raro tetrasperma. — *Cumbulu* Rheede, Hort. Malab. I. t. 41. — Crescit in Indiae orientalis regionibus montosis.

7. GM. SPECIOSISSIMA D. Don, Prodr. fl. Nepal. 104. — Arborea inermis: foliis ellipticis acutis, subtus tomentosis; panicula terminali maxima; calycibus quadrilobis obtusis. ♄ ⌣ — Truncus crassitie corporis humani. Folia palmaria. Paniculae a foliis saepe remotae 2–3-pedales. — *Gm. Tacabushia* Hamilt. mss. — Crescit in Nepalia.

XXXVII. (3703.) TECTONIA *Linn. fil.*

(Linn. fil. Supplem. 151. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 200.)

1. T. GRANDIS Linn. l. c. — Rxb. Pl. of the coast of Coromand. I. 10. t. 6. — Grtnr. De fructib. et seminib. pl. I. 274. t. 57. — Foliis oppositis; calyce fructifero globoso. ♄ — Arbor elata. Rami cortice cinereo obsiti, juniores quadrangulares. Folia opposita brevissime petiolata patentia, supra glabra, juniora scabra, subtus pubescentia molli albida adspersa, 1–2-pedalia, 8–16 poll. lata, parabolica acuta, ovata vel ovali-elliptica, basi attenuata, suprema ovali-subrotundata, integerrima; petioli lateraliter compressi brevissimi. Paniculae terminalis maximae dichotomae rami patentes subpyramidales, pedunculi, pedicelli calycesque pulverulento-pubescentes pilosuli subferruginei. Pedunculus communis, — ramuli continuatio — quadrangularis quadrisulcatus. Bracteae oppositae lanceolatae ad dichotomias

binae. Flores parvi albi numerosissimi. Stamina saepius 6 quam 5, parum infra faucem corollae inserta. Stigmatis bifidi laciniae obtusae patentes. Drupa calyce valde globoso inflato inclusa obsolete quadrangulari-subglobosa, lanata spongiosa. Nux dura quadrilocularis, abortu trilocularis. — *Theka* Rheede, Hort. Malab. IV. 57. t. 27. — *Jatus* Rmph. Hb. Amboin. III. 34. t. 18. — Crescit in tota fere India orientali. (v. s. sp.)

2. T. HAMILTONIANA Wall. Plant. Asiat. rar. III. 68. † t. 294. — Foliis ternis quaternisve verticillatis; calyce fructifero oblongo. ♄ — Arbor 12–30-pedalis umbrosa elata. Tomentum albidum densissimum totam arborem praeter truncum, foliorum paginam superiorem corollamque tegens, aliquando lanatum, pili nonnulli stellati in foliorum pagina superiore. Rami hexagoni trisulcati lanati. Folia terna vel rarius quaterna, petiolata elliptica integerrima acuta nervosa, valde reticulata, superne papulosa hispida, nervis tomentosis, subtus albido-tomentosa mollia plana membranacea, palmaria vel pedalia. Petiolus brevissimus semiteres tomentosus. Corymbi axillares terni folio longiores patentes ramosissimi, divisionibus inferioribus 3–5-fidis, superioribus dichotomis, flore intermedio sessili. Pedunculus teres rigidus tomentosus, ramis patentibus. Bracteae binae breves lineares pubescentes ad basin singulae divisionis. Flores parvi coerulei erecti. Calyx monophyllus persistens, superne ampliatus quinquefidus, laciniis reflexis ovatis brevibus. Corolla infundibuliformis, tubus superne ampliatus longitudine calycis, faux inflata subpentagona, intus pilosa, limbus reflexus 5-partitus, laciniis ovatis obtusis. Filamenta 5 subulata erecta apici tubi inserta longitudine pilorum, antherae cordatae. Ovarium minutum in fundo calycis. Stylus teres longitudine staminum. Stigma acute bifidum. Nux quadrilocularis oblonga, calycis basi aucta tecta ejusque laciniis coronata. Semina solitaria. — *T. ternifolia* Hamilt. mss. — Crescit in India orientali ad ripas fluminis Irawaddi prope Loongye, Prome, Segain, Avam et in radicibus montis Taong-Dong.

XXXVIII. HEMIGYMNIA *Griffith.*

(Griffith in M'Clelland's Calcutta journal of natural history [1843.] III. 363.)

Calyx infundibuliformis striatus quinquedentatus. Corollae tubus infundibuliformis, laciniis quinque angustis, tubo duplo longioribus. Stamina 5 aequalia inclusa. Ovarium quadriloculare, quadriovulatum, ovula solitaria adscendentia. Stylus bifidus, rami profunde bipartiti, facie interiori stigmatosi. Fructus (immaturus) drupaceus rostrato-cuspidatus, calyce cupuliformi semicinctus. — Arbor Indiae centralis mediocris, partibus novellis pube ramosa tomentosis, foliis oppositis cordatis vel cordato-rotundatis. Inflorescentia terminalis cymoso-corymbosa. Flores congesti in apicibus pedicellorum brevium articulati albi?

1. H. MACLEODII Griffith l. c. — Habitus quodammodo *Rottlerae*, adspectus florum *Lythrariearum*, si mavis *Pemphidis*. ♄ — Crescit in India orientali centrali, in sylvis Jubbulpore vicinis.

XXXIX. (3707.) VOLKAMERIA *Linn.*

(Linn. Spec. plant. 889. excl. spec. plerisque. — Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 291. II. 200.)

1. V. ACULEATA Linn. Spec. plant. 889. — Jcq. Americ. 185. t. 117. — Fruticosa patentim ramosa: ramis inferioribus ternatis, superioribus oppositis ad basin ramorum et foliorum aculeo valido instructis; foliis breviter petiolatis oblongo-ellipticis obtusis vel vix acuminulatis integerrimis, vix subtus ad nervos puberulis, infra pallidioribus; pedunculis axillaribus folio brevioribus trichotomo-corymbosis paniculam amplissimam foliosam efficientibus. ♄ — Frutex pyramidalis, rami teretes glabri fusci, juniores tomentelli, inferiores verticillati terni, superiores oppositi, supremi subalterni. Foliorum eadem est dispositio. Petioli breves 3-5 lineas longi, folia 1–2½-pollicaria, 5–10 lin. lata subcoriacea, infra pallidiora. Aculei basilares crassi validi breves pungentes pubescentes. Pedunculi

axillares 9–12 lin. longi, apice simpliciter triflori vel bifidi cum flore in dichotomia, ramis trifloris, efficiunt ideo paniculam amplissimam pyramidatam. Flores pedicellati, bracteolae geminae minimae subulatae in medio pedicello. Calycis breviter campanulati pubescentis laciniae ovatae acutae. Corollae tubus 7–8 lin. longus, apice infundibuliformis, laciniae oblongae obtusae aequales. Stamina tubi longitudine exserta. Drupa baccata, calyce persistente scarioso suffulta nigra glabra, profunde bisulca dipyrena, pyrenis osseis bilocularibus disperma. — *Clerodendron fruticosum etc.* P. Br. Hist. Jamaic. 262. t. 20. fig. 2. — *Ligustroides* Linn. Hort. Cliff. 489. — *Duglassia spinosa* Amm. Herb. 576. — *Ligustrum aculeatum, fructu testiculato* Plum. Spec. 17. ic. 164. fig. 1. — *Paliuro affinis spinosa etc.* Sloane, Hist. Jamaic. II. 137. t. 166. fig. 2. 3. — Pluk. Phytogr. t. 352. fig. 2. — Sieb. Hb. flor. Martin. no. 159! — Crescit in insulis Jamaica, Barbadoes, Martinica et Sti. Thomae. (v. s. sp.)

2. V. ACERBIANA Visiani, Plant. Aeg. Arab. 95. t. 4. fig. 1. — Kotschy, Herb. flor. Nubic. no. 359! — Caule fruticoso inermi cum ramis, petiolis pedunculisque pallide tomentosis; ramis foliisque inferioribus ternato-verticillatis, superioribus saepe oppositis; foliis breviter petiolatis, e cordata basi ovatis ovatove-subrotundis, integerrimis vel subcrenato-repandis, breviter acuminatis, supra puberulis, infra, praesertim ad nervos venasque tomentellis; pedunculis axillaribus folio brevioribus subcapitato-corymbosis. ♄ — Frutex humilis? subsimplex? Internodia bipollicaria, sursum breviora. Petioli 3–6 lin. longi, folia caulina 2–3-pollicaria, 15–21 lin. lata, ramealia duplo minora. Pedunculi 12–15 lin. longi, apice brevissime subcapitato-corymbosi. Flores non vidi. Pedicelli, bracteae lineares acutae et calyces araneoso-lanati. Calyx campanulatus profunde quinquefidus, laciniis linearibus acutis, fructifer parum auctus scariosus glabrescens. Drupa spongiosa brunnea, profunde sulcata, magnitudine et forma *Rubi idaei* nostri polychorion omnino referens, dipyrena, pyrenis lignescentibus bilocularibus, loculo altero saepe abortivo. — Crescit in Nubiae provincia Berber Magrad. (v. s. sp.)

† *Species dubiae.*

3. V. CORDIFOLIA Hochstetter, Nov. pl. gen. Afric. 19. adnot. — Suffruticosa: foliis petiolatis ovato-cordatis glabris; caule petiolisque minute pubescentibus. ♃ — Crescit in Abyssinia.
4. V. SCANDENS Linn. fil. Suppl. 292. — Foliis cordato-ovatis obtusis integerrimis glaberrimis; panicula corymbosa terminali; calycibus obtusis tomentosis. ♄ — In Zeylania crescit.
5. V. GRANDIFLORA M. Blanco, Flora de Filipinas 512. — Caule erecto; ramis pallidis glabris; foliis oppositis oblongis acuminatis integris glabris rugosis, breviter petiolatis, petiolis basi cum glandula; floribus paniculato-umbellatis; bracteis subulatis; calyce erecto cylindraceo profunde quinquefido, laciniis lanceolatis; corolla calycem duplo excedente, bilabiato-quinquepartita, laciniis ovalibus concavis revolutis; staminibus 4 didynamis corollae fauci insertis, antheris sagittatis; germine hemisphaerico, stylo lineari, stigmate bifido; drupa baccata obsolete tetragona, nuce quadriloculari, tetrasperma, loculis 1–2 saepe abortivis. ♄ — Species non satis nota, certe ad *Clerodendron* referenda. — Crescit in insulis Philippinis.

†† *Species indescriptae.*

V. ODORATISSIMA Fisch.
V. SPINOSA Juss.

††† *Species excludendae.*

V. ALTERNIFOLIA Burm. = CLERODENDRON CALAMITOSUM.
V. ANGULATA Lour. = CL. PANICULATUM.
V. ANGUSTIFOLIA Andr. = CL. ANGUSTIFOLIUM.
V. BUCHANANA Rxb. = CL. BUCHANANI.
V. BUXIFOLIA Willd. = CL. BUXIFOLIUM.

V. CAPENSIS Burm. = CAPPARIS VOLKAMERIAE.
V. CAPITATA Willd. = CLERODENDRON CAPITATUM.
V. COMMERSONII Poir. = CL. COMMERSONII.
V. COCCINEA Hb. Am. = CL. SQUAMATUM.
V. DENTATA Rxb. = CL. DENTATUM.
V. FARINOSA Rxb. = CL. FARINOSUM.
V. FOETIDA Hamilt. mss. = CL. BUCHANANI.
V. FRAGRANS Hort. = CL. FRAGRANS.
V. HERBACEA Rxb. = CL. HERBACEUM.
V. HETEROPHYLLA Vent. = CL. ANGUSTIFOLIUM.
V. JAPONICA Jcq. = CL. FRAGRANS.
V. INERMIS Linn. = CL. INERME.
V. KAEMPFERI Jcq. = CL. SQUAMATUM.
V. LAURIFOLIA Hort. = CL. VISCOSUM.
V. LIGUSTRINA Jcq. = CL. LIGUSTRINUM.
V. MULTIFLORA Burm. = CL. PHLOMOIDES.
V. NERIIFOLIA Rxb. = CL. NERIIFOLIUM.
V. OBOVATA Rxb. = CL. OBOVATUM.
V. ODORATA Ham. = CL. ODORATUM.
V. PETASITES Lour. = CL. VISCOSUM.
V. PUMILA Lour. = CL. PUMILUM.
V. SERRATA Linn. = CL. SERRATUM.
V. TOMENTOSA Vent. = CL. TOMENTOSUM.
V. URTICOIDES Rxb. = CL. INTERMEDIUM.
V. VERTICILLATA Rz. et Pav. = CITHAREXYLUM CYANOCARPUM.

XL. (3708/1.) **CYCLONEMA** *Hochstetter.*

(Hochstetter, Flora [B. Z.] 1842. pag. 225. et Nov. gen. pl. Afric. 18. — Endl. Gener. plant. Suppl. III. p. 77. — Meisn. Gener. plant. vascul. II. 367.)

1. C. (SPIRONEMA Hochst. Hb. fl. Abyss. no. 330. — CLERODENDRON B. Br.?) MYRICOIDES Hochstetter, Nov. gener. pl. Afric. 18. — Fruticosum: ramis foliisque oppositis; foliis obovato-lanceolatis acuminatis in petiolum attenuatis, integerrimis vel plerumque superne parce serratis, margine ciliato-scabris, superne pilis brevibus parce adspersis vel glabriusculis, subtus plerumque glabris reticulato-venosis obscuriusque punctatis; corymbi trichotomi ramis elongatis glabriusculis vel puberulis ad ramificationes bracteatis; pedicellis paullo infra florem infractis bracteolatis; bracteolis ciliatis minutis; floribus majusculis (subpollicaribus) foetidis; calycis glaberrimi subcolorati dentibus brevibus obtusis; corolla cyaneo-violacea, exsiccatione fulva. ♄ — Crescit in Abyssiniae montibus vulgaris.

2. C. SYLVATICUM Hochstetter l. c. 19. — Foliis obovatis superne dentato-serratis hirtis, praesertim ad venas; calycibus quinquefidis hirto-pubescentibus. ♄ — Praecedenti speciei simile, sed foliorum forma, calyce profundius inciso hirto floribusque minoribus satis diversum videtur. — Crescit in sylvis primitivis coloniae Natalensis prope Umlaas River in Africa australi.

3. C. SERRATUM Hochstett. l. c. — Foliis obovato-rhombeis inciso-serratis, basi cuneatis integerrimis, utrinque calycibusque quinquefidis hirtellis. ♄ — Vix nisi foliorum *Chenopodii muralis* similium forma a priori differt, cujus forsitan varietas. — Crescit in sylvis primitivis Natalensibus cum priori.

4. C.? HIRSUTUM Hochstett. l. c. 20. — Fruticulosum vel suffruticosum: ramis foliisque oblongis integerrimis hirsutis; calycis quinquefidi hirti segmentis angustis acutis. ♄ — Calyce potius ad *Volkameriam* pertinet, sed corolla omnino *Cyclonematis*. — Crescit in Promontorio bonae spei.

XLI. (3708.) CLERODENDRON *R. Br.*

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. [edit. N. ab E.] 366. — Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 291. II. 200.)

§. 1. *Calyce ampliato quinquefido.*

* *Foliis lobatis.*

1. CL. DIVERSIFOLIUM Vahl, Symbol. bot. II. 75. — Ramis tetragonis, sursum pubescentibus; foliis petiolatis integris ovalibus et inferioribus quinquelobis, superioribus trilobis, lobo medio longiori acuminato; panicula ampla terminali subdichotoma; calyce pubescente quinquepartito, laciniis oblongis acutis; corollae tubo puberulo, laciniis limbi subinaequalibus linearibus obtusis. ♄ — Folia supra glabra, subtus squamellata 7–8–pollicaria, 5–6 poll. lata, floralia parva sessilia lanceolata integra. Panicula 7–8–pollicaris. Corollae tubus pollicaris, stamina corolla duplo longiora. — Crescit in India orientali.

2. CL. TRICHOTOMUM Thnbrg. Flor. Japonic. 256. — Ramis tetragonis glabris; foliis petiolatis, inferioribus maximis trilobis, superioribus ovalibus glabris integris acuminatis; panicula terminali trichotoma glabra; calyce inflato quinquangulato acute quinquedentato, tubo corollae calycem duplo excedente. ♄ — Petioli puberuli folio breviores, folia 5–6–pollicaria. Panicula ebracteata et aphylla esse dicitur. Drupa subglobosa calyce tecta quadrilocularis tetrasperma. — *Seo–Kusitc* Kaempf. Amoen. 827. ic. 22. — Crescit in Japonia.

3. CL. PANICULATUM Vahl, Symb. bot. II. 74. — Rchb. Flor. exot. t. 208. — Ramis tetragonis glabris; foliis petiolatis quinquelobis, lobis lanceolatis denticulatis, utrinque glabris; panicula ampla ramosissima; bracteolis subulatis, calycis laciniis lanceolatis glabris. ♄ — Rami purpurascentes, folia 5–6–pollicaria, basi cordata, laciniae inaequales, media maxima, in petiolorum et paniculae axillis pili longiusculi albi reperiuntur. Panicula ampla glabra 8–10–pollicaris, ramis horizontalibus, folia floralia cordato–lanceolata. Corollae coccineae tubus pollicaris, limbi laciniae oblongae. — *Volkameria angulata* Loureiro, Flor. Cochinch. II. 473. — *Clerodendron pyramidale* Andrws. Bot. Reposit. t. 628. — Crescit in India orientali.

4. CL. HASTATUM Wall. Catal. 1786. — Lindl. Bot. Regist. t. 1307. — Hook. Bot. Magaz. t. 3398. — Foliis oppositis petiolatis subhastato–cordatis quinquelobis acuminatis; ramis pedunculisque villosis; panicula decussata dichotome ramosa; calycis late campanulati quinquefidi laciniis membranaceis lanceolatis acutis; corollae tubo filiformi longissimo, laciniis limbi lanceolato–linearibus obtusis. ♄ — Frutex quadripedalis ramosus. Rami obtuse tetragoni divaricati, pedunculi foliaque utrinque pilis mollibus copiosis dilute ferrugineis villosi, aetate glabrescentes. Petioli ad 3–12 poll. longi, folia maxima subseptempollicaria, 6 poll. circiter lata, saepe minora, basi cordata, 3–5–loba, lobo medio maximo acuminato, caeterum integra vel subrepanda, floralia integerrima ovato–cordata. Panicula pauciflora breviter pedunculata, dichotoma, cum flore in dichotomia, pedicelli 3–6 lin. longi, bracteae membranaceae pubescentes lanceolatae pollicares deciduae, quandoque, floribus abortientibus fasciculatae. Calyx pollicaris purpurascens vel flavescens persistens, profunde 5–fidus, laciniis lanceolatis acutis, duobus superioribus paullo majoribus. Corollae albae tubus 4–5–pollicaris filiformis, fauce parum ampliata, puberulus, laciniis limbi 10 lin. longis, 3 lin. latis obtusis ovali–linearibus, duabus paullo latioribus. Stamina 4 exserta, demum divaricata. Drupa atro–purpurea nitida, calyci aucto immersa succulenta, putamine quadriloculari, loculis 2–3 abortientibus, fertili obovato. — *Clerodendron sagittatum* Wall. Cat. 1786. — *Siphonanthus hastata* Rxb. Hort. Benghal. 46. — Crescit in India orientali. (v. v. c.)

** *Foliis simplicibus.*

† Foliis integerrimis vel subrepandis.

a. Glabris.

5. CL. SIPHONANTHUS R. Br. in Wall. Catal. 1784. et in Ait. Hort. Kewens. (edit. 2.) IV. 65. — Totum glaberrimum. caulibus ramisque quadrangularibus sulcatis; foliis verticillatis quaternis subsessilibus anguste lanceolatis acuminatis integerrimis repandisve; pedunculis axillaribus trifloris vel trichotomis; bracteolis lineari-lanceolatis acutis; calyce amplo quinquefido, laciniis ovatis obtusis; corollae tubo filiformi (omnium) longissimo, ad faucem infundibuliformi, laciniis limbi subaequalibus ovatis obtusis emarginatisve; staminibus tubo brevioribus. ♄ — Internodia sesquipollicaria vel breviora, folia subsessilia semipedalia, pollice non latiora saepeque minora, etiam terna verticillata vel interdum opposita, floralia bipollicaria, 4 lin. lata. Pedunculi 9-12 lin. longi, triflori vel trichotomi in axillis foliorum superiorum, paniculam laxam foliosam efficientes. Calyx laxus semipollicaris. Corollae tubus quadripollicaris vel longior, laciniis limbi (albis) semipollicaribus, 3 lin. latis. Stamina longissime exserta, tubo breviora. — *Siphonanthus Indica* Willd. Spec. plant. I. 606. — *Siphonanthus angustifolia* Willd. l. c. — *Ovieda mitis* Burm. Flor. Indic. t. 43. fig. 1. — Linn. Spec. plant. 889. — Willd. Herb. 11674. — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

6. CL. LONGICOLLE F. W. Meyer, Primit. fl. Esseq. 217. † — Ramis obsolete tetragonis subcanaliculatis; foliis inferioribus verticillato-ternis, superioribus oppositis breviter petiolatis, oblongis brevissime acuminatis utrinque glaberrimis; pedunculis axillaribus folio brevioribus subtrifloris; calycis laciniis subrotundo-ovatis mucronulatis; corollae tubo longissimo, laciniis limbi oblongis obtusis; staminibus longe exsertis, tubo corollino quadruplo brevioribus. ♄ — Petioli 3-4 lin. longi, folia 2½ poll. longa, pollicem lata. Pedunculi supremi uniflori. Bracteae lineares acuminatae. Corolla quadripollicaris et longior, laciniae limbi semipollicares. Stamina e tubo corollae pollice exserta, antheris sagittatis. Stylus longitudine staminum. — Crescit in fruticetis Essequiboensium.

7. CL. VERTICILLATUM D. Don, Prodr. fl. Nepal. 102. — Foliis quaternis lanceolatis acutis integerrimis glabris; pedunculis quaternis axillaribus; calycibus quinquepartitis; corollae tubo filiformi longissimo laevi. ♄ — Planta speciosa. Corollae tubus 3-pollicaris, apice incurvus. — *Ovieda verticillata* Rxb. mss. — Crescit in Nepalia.

8. CL. FORTUNATUM Linn. Spec. plant. 889. — Osbeck, Iter 228. t. 11. — Ramis teretiusculis; foliis petiolatis lanceolatis integerrimis vel subsinuatis serrulatisve, infra reticulato-venosis glaberrimis; corymbis paucifloris axillaribus; pedicellis puberulis; calycis laciniis ovalibus acutis persistentibus; corollae tubo calycem subaequante, laciniis limbi ovalibus obtusis. ♄ — Folia tripollicaria, pollicem lata vel latiora. Pedunculi pollicares, pedicelli brevissimi. Corolla ex albo lutescens, stamina corolla duplo longiora. — Crescit in India orientali.

9. CL. JAVANICUM Spr. Syst. veget. II. 759. no. 19. — Ramis teretibus glabris; foliis petiolatis ovalibus, ellipticis vel ovato-lanceolatis integerrimis coriaceis glaberrimis; panicula terminali glaberrima coarctata; calycis laciniis ovalibus acuminatis. ♄ — Folia bipollicaria, 8-10 lin. lata. Corolla, stamina et fructus ignota sunt. — *Cl. coriaceum* Poir. Encycl. méth. Suppl. IV. 353. — Latet forte sub specie quadam *Javanica* a Blumeo descripta. — Crescit in insula Java.

10. CL. LAEVIFOLIUM Blume, Bijdragen 808. — Caule tetraëdro; foliis petiolatis oblongo-lanceolatis, utrinque acuminatis integerrimis glaberrimis; panicula terminali brachiata; calyce campanulato profunde quinquefido purpurascente; corolla albida. ♄ — Crescit in insula Java.

11. CL. TERNIFOLIUM H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 244. † — Foliis ternis oblongo-ellipticis acuminatis integerrimis glaberrimis; pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis; calycibus quinquefidis. ♄ — Arbor 3-4-orgyalis op-

posite ramosissima, basibus petiolorum subpersistentibus aculeata glabra, ramulis junioribus albo-verrucosis. Folia basi angustata membranacea reticulato-venosa glabra, sublus in nervo prominente parce pilosa et pallidiora, bipollicaria, 10-11 lin. lata, petiolis bilinearibus canaliculatis glabris. Pedunculi subseptemflori folio paullo longiores, adpresse pubescentes dichotomi. Flores pedicellati 8 lin. longi odoratissimi, pedicellis puberulis. Bracteae lineares puberulae. Calycis glabri quinquefidi laciniae lanceolatae acuminatae patentes. Corollae albae tubus semipollicaris cylindraceus, limbus patens quinquefidus, laciniis obovato-oblongis. Stamina 4 longissime exserta secunda, filamentis rubris glabris, antheris ovatis bilocularibus. Stylus longitudine staminum glaber, stigma obtusum indivisum. Drupa......? — Crescit in calidis juxta Novam Barcellonam et Angosturam Orinocensium.

12. CL. PHYLLOMEGA Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) I. 382. — Foliis magnis ovalibus, utrinque acutiusculis integerrimis coriaceis glabris; panicula terminali brachiata; calyce quinquefido; corolla albida. ♄ — *Cl. macrophyllum* Blume, Bijdragen......? — Crescit in insula Java.

13. CL. DEFLEXUM Wall. Catal. no. 1808. et Plant. Asiat. rar. III. 10. † t. 216. — Ramis subteretibus, junioribus cum petiolis, pedunculis pedicellisque tomentellis; foliis breviter petiolatis ex ovata basi ellipticis acuminatis coriaceis integerrimis, supra glabris, subtus in nervis ferrugineo-tomentellis; pedunculis axillaribus folio brevioribus; paniculis coarctatis; bracteis lanceolato-linearibus subulatisque; calycibus vix puberulis profunde quinquefidis, laciniis lanceolato-acuminatis, tubo corollino dimidio(?) brevioribus. ♄ — Petioli pollicares, folia 8-pollicaria, 2¼ poll. lata vel majora, longiuscule attenuata, obtusiuscula, basi semper ovata, numquam attenuata. Pedunculi 1½-2½-pollicares dichotomi, flores dense aggregati corymboso-paniculati, explicatos bene conservatos non vidi. — Crescit in Pulo Penang Indiae orientalis. (v. s. sp.)

14. CL. NUTANS Wall. Catal. no. 1793! — Hook. Bot. Magaz. t. 3049. — Fruticosum erectum glabrum: ramis acute tetragonis, apice nutantibus; foliis ternis vel oppositis oblongis longe acuminatis integerrimis, basi attenuatis brevissime petiolatis; panicula laxissima pendula; pedunculis 1-3-floris; calyce ventricoso corollae tubo parum breviore, laciniis limbi obovatis subsecundis reflexis. ♄ — Frutex 2-4-pedalis, rami glaberrimi nutantes, folia opposita vel ternata elliptico-oblonga vel lanceolata acuminata, 4-7-pollicaria, 9-12 lin. lata, longe acuminata, nervo venisque obliquis subtus valde prominentibus, venis marginem versus anastomosantibus, petioli vix semipollicares supra canaliculati, linea pilorum tenuissimorum petiolos connectente, pilis mox deciduis. Panicula terminalis oblonga laxa pendula, rami oppositi simplices uni-triflori, bracteae ad basin ramificationum minutae subulato-lineares, pedunculi acute quadrangulares, pedicellis semipollicaribus vel pollicaribus. Flores albi inodori satis magni. Calyx purpurascens ovatus inflatus quinquangularis profunde quinquefidus, laciniis ovalibus acutiusculis tubum corollae subaequantibus demum reflexis. Corollae tubus gracilis cylindricus, laciniis limbi subaequalibus tubum circiter aequantibus. Filamenta tubo infra faucem inserta longe exserta alba ascendentia, stylus filiformis staminibus parum longior. Drupa baccata obscure purpurea calyce inclusa, 2-vel rarius 4-sperma. — Crescit in Bengalia boreali-orientali. (v. s. sp.)

15. CL. PENDULIFLORUM Wall. Catal. 1795. — Foliis longe petiolatis elliptico-lanceolatis utrinque attenuatis, apice longe acuminatis crenulato-subrepandis integerrimisque, utrinque glaberrimis, subtus glaucescentibus; panicula terminali laxa pendula; pedunculis oppositis 1-3-floris. ♄ — Petioli 2-pollicares, folia maxima 7½ poll. longa, 2¾ poll. lata. Inflorescentia omnino praecedentis. Calyx minor laxus acute quinquedentatus, laciniae limbi tubum aequantes obovatae obtusae. — Forte praecedentis habenda est varietas. — Crescit in India orientali.

16. CL. JACKIANUM Hook. Bot. Miscell. I. 281. — Foliis lanceolatis acuminatis glabris; paniculis longissimis terminalibus nutantibus; pedunculis remotis diva-

ricatis paucifloris. ♄ — Flores albi pauci, raro ultra tres in pedicello. — *Cl. nutans* Jack in Hook. l. c. — Differre dicitur a *Cl. nutante* Wall. — Crescit in India orientali.

17. CL. ATTENUATUM R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 367. (edit. N. ab E.) — Foliis ellipticis subundulatis acutis, basi attenuatis, utrinque glabris; corymbis.....?; calycibus puberulis, laciniis acutissimis tubum aequantibus; corollis glabris. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

18. CL. FLORIBUNDUM R. Br. l. c. — Foliis elliptico-lanceolatis glabris; calycis laciniis acutiusculis tubo brevioribus corollisque glabris. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

19. CL. OVATUM R. Br. l. c. — Foliis ovatis acutis, adultis glabris, petiolo vix duplo longioribus; pedunculis axillaribus terminalibusque (corymbosis?) ♄ — *Ovieda ovalifolia* Juss. Ann. du Mus. VII. 76. — *α*. Folia calycesque glabri. — *β*. Folia calycesque pubescentes. — Crescit in Nova Hollandia.

β. Foliis pubescentibus vel tomentosis.

20. CL. MOLLE H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 244. † — Foliis ternis ovato-ellipticis obtusiusculis, basi angustatis integerrimis, supra glabris, subtus molliter canescenti-pubescentibus; pedunculis axillaribus terminalibusque dichotomis; calycibus quinquefidis. ♄ — Arbuscula orgyalis et altior, rami teretes basibus petiolorum persistentibus subaculeati verrucosi glabri albidi. Folia basi angustata integerrima, reticulato-venosa, supra viridia, subtus molliter canescenti-pubescentia 1½-2-pollicaria, petiolis 4 lin. longis canaliculatis pubescentibus. Pedunculi 7-9-flori dichotomi pubescentes folio longiores. Flores pedicellati pollicares suaveolentes. Bracteae lineares pubescentes. Calyx campanulatus quinquefidus pubescens, laciniis ovatis acutis patentibus. Corollae rubescentis tubus subpollicaris cylindraceus, limbi quinquefidi laciniae oblongae. Stamina 4 longissime exserta secunda. Ovarium quadrisulcatum, stylus longitudine staminum glaber, stigma trifidum(?). Drupa baccata sulcata globosa tetrasperma. — Crescit locis inundatis prope Guayaquil Quitensium.

21. CL. MEDIUM R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 366. (edit. N. ab E.) — Foliis ellipticis breviter acuminatis, subtus tomentosis; corymbis terminalibus axillaribusque laxiusculis; calycibus adultis corollisque glabriusculis. ♄ — In Nova Hollandia.

22. CL. CORIACEUM R. Br. l. c. 367. — Foliis ovatis acutis subcordatis, subtus reticulato-venosis subrugosis petiolisque tomentosis; pedunculis terminalibus axillaribusque trichotomis. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

23. CL. COSTATUM R. Br. l. c. — Foliis ovatis obtusiusculis, subtus tomentosis costatis rugosis; corymbis terminalibus axillaribusque trichotomis. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

24. CL. CASTANEIFOLIUM Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 205. — Ramis minute strigilloso-pubescentibus; foliis petiolatis oblongo-lanceolatis, basi cuneatis integerrimis, apicem versus irregulariter dentatis, supra minute sparseque puberulis, subtus glabris venosis; corymbis axillaribus folio triplo brevioribus; bracteis bracteolisque subulatis deciduis; calycis quinquepartiti segmentis ovatis acuminatis, demum auctis. ♄ — Crescit ad Cantonem Chinensium.

25. CL. PUMILUM Spr. Syst. vegetab. II. 759. no. 27. — Caule fruticoso erecto ramoso; foliis lanceolatis tomentosis subintegerrimis petiolatis; corymbis axillaribus 5-6-floris; calyce magno inflato; corollae tubo elongato. ♄ — Frutex pedalis inermis. Folia magna. Calyx acute 5-fidus persistens. Corollae purpureae limbus aequaliter 5-fidus. Drupa baccata exsucca quadrisulca bilocularis monosperma. — *Volkameria pumila* Loureiro, Flor. Cochinch. II. 472. — Species nonnisi verbis supra redditis nota. — Crescit ad Cantonem Chinensium.

26. CL. CANESCENS Wall. Catal. no. 1804! — Ramis obsolete tetragonis canescenti-tomentosis; foliis petiolatis cordatis acuminatis integerrimis vel crenato-dentatis,

supra in nervis puberulis, subtus, petiolis pedunculisque albo-tomentosis; paniculis terminalibus coarctatis subfastigiatis; bracteis magnis foliaceis ovato-lanceolatis acutis puberulis, calyce acute quinquefido longioribus vel eum subaequantibus. ♄ — Petioli bipollicares, folia 3–5-pollicaria, basi $2\frac{1}{2}$–$3\frac{1}{2}$ poll. lata, longe sensimque attenuata, rarius ovata obtusa. Paniculae terminalis pedunculi plures subfastigiati, flores congesti subcapitati, evoluti a me non visi. — Species proxima *Cl. viscoso*. — Crescit in China. (v. s. sp.)

27. CL. VELUTINUM Wall. Catal. 1797. — Caule erecto tetragono; foliis cordatis acuminatis integerrimis tomentosis; panicula terminali; tubo corollae calycem vix excedente; calyce fructifero carnoso albo ampliato. ♄ — Frutex 3–6-pedalis erectus parum ramosus, caule acute tetragono villoso. Folia opposita petiolata cordata acuminata integerrima, molliter tomentosa. Panicula terminalis opposite trichotoma erecta, bracteae foliaceae. Calyx 5-partitus tomentosus, laciniis ovatis acutis erectis, margine reflexis. Corolla tomentosa, tubo calycem aequante, limbo 5-partito patente secundo, laciniis subaequalibus, margine undulatis; stamina exserta unilateraliter horizontalia deflexa. Stylus erectus staminum longitudine, stigmate bifido. Drupa baccata 1–4-sperma. — Proximum *Cl. infortunato* L. — *Cl. molle* Jack in Hook. Bot. Miscell. I. 283. nec H. B. Kth. — Crescit in insula Sumatra et ad Pulo Penang. (v. s. sp.)

28. CL. BRACTEATUM Wall. Catal. no. 1800! — Ramis teretiusculis tomentosis; foliis longe petiolatis ovatis longe acuminatis acutis integerrimis, supra pubescentibus, subtus incano-tomentosis; pedunculis axillaribus folio brevioribus tomentosis; floribus corymboso-fastigiatis; bracteis lanceolatis acuminatis puberulis calyces aequantibus; calycibus inflatis membranaceis acute quinquefidis, tubo corollino ultra duplo brevioribus; laciniis limbi ellipticis obtusis, tubo multoties brevioribus. ♄ — Petioli 2–3-pollicares, folia maxima semipedalia, $2\frac{1}{2}$ poll. lata. Pedunculi 4–5-pollicares tomentelli. Bracteae lanceolatae semipollicares 3 lin. latae vel majores. Calyx 6–9 lin. longus vel major. Corollae tubus $1\frac{1}{2}$-pollicaris. — Crescit in India orientali (Pundua). (v. s. sp.)

29. CL. VILLOSUM Blume, Bijdragen 811. — Villosum: foliis oppositis petiolatis ovatis acuminatis, basi plerumque cordatis integerrimis; panicula terminali; calycibus ampliatis quinquefidis corollae tubum subaequantibus. ♄ — *Peragu* Rheede, Hort. Malabar. II. t. 25. — Crescit in insula Java, in provinciis Bantam et Buitenzorg.

30. CL. TOMENTOSUM R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 366. (edit. N. ab E.) — Foliis breviter petiolatis ovato-ellipticis breviter acuminatis integerrimis, supra pubescentibus, subtus adpressissime tomentosis, in nervis utrinque ferrugineis; corymbis terminalibus congestis; pedunculis calycibusque tomentosis; calycis laciniis ovatis obtusis. ♄ — Ramuli obsolete tetragoni glabri rubiginosi. Petioli 4–5 lin. longi vix puberuli. Folia coriacea 2–3-pollicaria, $1\frac{1}{4}$–$1\frac{1}{2}$ poll. lata subcoriacea. Bracteolae lineari-subulatae calyce breviores caducae. Calyx campanulatus acute quinquedentatus pubescens; corollae tubus filiformis glabriusculus, superne infundibuliformi-ampliatus, laciniis limbi ovalibus, extus tomentosis, acutis. Stamina tubum corollae circiter aequantia longe exserta. — Sieber, Hb. flor. Nov. Holl. no. 267. — Crescit in Nova Hollandia.

†† Foliis dentatis, serratis vel subincisis.

31. CL. SERRATUM Spr. Syst. veget. II. 758. no. 9. — Ramis subtetragonis glabris; foliis verticillato-ternis subsessilibus e basi longe cuneata obovatis obtusiusculis vel acuminatis acutis remote acuteque serrato-dentatis coriaceis glaberrimis, supra nitidis, supremis obovatis integerrimis acutis pubescenti-tomentellis; pedunculis axillaribus breviter trichotomis ad racemum interrupte spicatum condensatis; bracteis lanceolatis; calycibus quinquedentatis, dentibus obtusiusculis; corollae tubo calycem duplo excedente, laciniis limbi obovatis obtusis tubo paullo brevioribus. ♄ — Internodia brevia $1\frac{1}{2}$–2-pollicaria. Folia 3–5-pollicaria, 12–18 lin. lata, basi longe attenuata integerrima, acuminata vel obtusa cum mucrone.

Inflorescentia terminalis more *Viticum* interrupte subspicata corymboso-trichotoma, corymbulis semper ternis verticillatis. Folia inflorescentiae ad summum pollicaria, semipollicem lata ovata vel obovata cum acumine, cum pedicellis calycibusque pulverulento-tomentella. Stamina longe exserta, corolla ultra duplo longiora. Stylus staminibus longior, stigma acute bifidum. — *Volkameria serrata* Linn. Mantiss. pl. 90. — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

32. CL. FARINOSUM Wlprs. mss. — Ramis farinosis; foliis oppositis petiolatis oblongis serratis; panicula terminali lineari-oblonga foliosa. ♄ — *Volkameria farinosa* Rxb. Flor. Indic. III. 64. — Species valde incomplete descripta. — Crescit in India orientali in Silhet, ubi appellatur *Taleuser.*

33. CL. TERNIFOLIUM D. Don, Prodr. flor. Nepal. 103. — Ramis sulcatis laevibus; foliis ternis sessilibus lanceolatis mucronatis glabris, superne dentato-serratis; pedunculis axillaribus ternis, plerumque trifloris in apice caulis racemoso-paniculatis calycibusque tomentosis campanulatis quinquedentatis; corollae tubo calycem subaequante. ♄ — Folia 5-6-pollicaria. — Crescit in Nepalia (in Sirinagur).

34. CL. TRIFLORUM Vis. l'Orto bot. di Padova 137. — Fruticosum canescens: ramis subtetragonis; foliis longe petiolatis late ovalibus, medio grosse dentatis, subtus nervosis; pedunculis axillaribus subtrifloris nutantibus; pedicellis lateralibus bracteolatis, apice incrassatis; calycibus campanulato-conniventibus pentagonis 5-fidis, dentibus lanceolatis; corollae calyce triplo longioris tubo filiformi gracili, limbi lobis ellipticis reflexis; stigmate indiviso. ♄ — Crescit in Nubia.

35. CL. PHLOMOIDES Linn. Supplem. 292. — Vahl, Symbol. bot. II. 74. — Ramis teretiusculis petiolisque incano-tomentellis; foliis ovato-rhombeis acuminatis, irregulariter obtuseque serratis, apice integris, supra glabriusculis, infra puberulis; pedunculis axillaribus, apice umbellato-trifloris vel trichotomis, paniculam amplam efficientibus; bracteis obovatis obtusis; calycibus laxis acute quinquefidis, tubo corollino triplo brevioribus. ♄ — Folia 1-1½-pollicaria, 9-15 lin. lata, basi cuneata, petioli utplurimum semipollicares, infra canescentia puberula. Panicula laxa terminalis, pedicelli incano-tomentelli. Tubus corollae filiformis pollicaris vix puberulus. Stamina tubo dimidio circiter (?) breviora. — *Volkameria multiflora* Burm. Flor. Indic. 157. t. 45. fig. 1. — (Wall. Catal. no. 1787.) — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

36. CL. LIVIDUM Lindl. Bot. Regist. t. 945. — Foliis oblongis repando-crenatis, utrinque lividis, costa subtus petiolisque hirsutis; cymis pedunculatis axillaribus; calycibus pentagonis inflatis coloratis. ♄ — (Spr. Syst. vegetab. cur. post. 231.) — Crescit in China.

37. CL. INFORTUNATUM Linn. Flor. Zeylan. 232. — Lindl. Bot. Regist. (New Ser.) 1844. t. 19. — Foliis maximis subrotundis profunde cordatis dentatis, supra pilosis, subtus tomentosis; panicula simplici pubescente, ramis coloratis; floribus in apice ramorum subsessilibus; calyce ampliato quinquefido; corollae laciniis planis obovatis obtusis quam stamina paullo brevioribus. ♄ — Folia saepe basi ovata nec cordata, 6-pollicaria, 4 poll. lata et majora, petiolo 3-pollicari, in eodem specimine integerrima et dentata, subacuminata. Panicula in spontaneis saepe maxima terminalis, corollis pulcherrime coccineis. — *Volkameria infortunata* Rxb. Fl. Ind. III. 59. — *Clerodendron depauperatum* Wall. mss. — *Petasites agrestis* Rmph. Hb. Amboin. IV. 180. t. 49? — Burm. Fl. Zeylan. 66. t. 29. — Wall. Catal. no. 1796! — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

38. CL. SQAMATUM Vahl, Symbol. bot. II. 74. — Maund et Henslow, The Botanist I. t. 13. — Bot. Regist. t. 649. — Lindl. l. c. adnot. — Foliis subrotundis profunde cordatis repando-dentatis, supra pilosulis, subtus dense glanduloso-squamatis; panicula composita terminali pilosula, ramis coloratis; floribus (quam praecedentis minoribus) in apice ramorum racemoso-corymbosis; calyce ampliato quinquefido; corollae laciniis obovatis revolutis, staminibus pluries brevioribus. ♄ — Folia subinde longissime petiolata, petiolo 3-7-pollicari, basi reniformi-cordata,

2-5-pollicaria, 2½-6 poll. lata acuminata, repando-dentata, infra patelliformi-squamellata, supra in nervis puberula. Panicula terminalis laxa, pedunculis apice trifloris. Calyx laxus fere basin usque quinquefidus, laciniis acuminatis. Corollae tubus 5 lin. longus, laciniis late obovatis. — Wall. Catal. no. 1798! — *Cl. coccineum* Hort. et D. Dietr. Synops. pl. plerumq. III. 616. no. 23. — *Volkameria coccinea* Herb. Amat. t. 519. — *Volkameria Kaempferi* Jcq. Ic. pl. rar. III. t. 500. — Bnks. Icon. Kampf. t. 58. — Willd. Spec. plant. III. 385. — Crescit in India orientali. (v. s. c. et sp.)

39. CL. FALLAX Lindl. l. c. — Foliis subrotundis profunde cordatis subdentatis, supra pubescentibus, subtus mollibus; panicula colorata composita pilosula; floribus in apice ramorum corymbosis (puniceis); calyce minimo quinquedentato; corollae laciniis obovatis planis, quam stamina paullo brevioribus. ♄ — *Cl. speciosissimum* Paxton, Magaz. of bot. III. 217. et 271. (c. icon.) — Crescit in India orientali??

40. CL. FOETIDUM Bnge. Mém. des sav. étrang. de St. Ptrsbrg. II. 126. — Suffruticosum: foliis petiolatis late cordatis acutis scabriusculis repando- aculeque dentatis, subtus ad nervorum axillas glandulosis; corymbis dense capitatis terminalibus; tubo corollae longissimo calycem quintuplo excedente, limbo quadripartito. ♃ — *Cl. Bungei* Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) I. 382. — Crescit in China boreali.

41. CL. GLANDULOSUM Lindl. Bot. Regist. (New Ser.) 1844. t. 19. (adnot.) — Foliis subrotundo-ovatis, basi truncatis vel parum cordatis pilosiusculis esquamatis subdentatis; panicula densa subcapitata; bracteis lineari-lanceolatis calyce longioribus, dorso glandula una alterave pellucida immersa notatis; calycis quinquefidi laciniis acuminatis; corollae laciniis oblongis reflexis, staminibus brevioribus; stylo longissimo. ♄ — Crescit......? — Affine *Cl. infortunato*.

42. CL. CORDATUM D. Don, Prodr. fl. Nepal. 103. — Ramis tetragonis hirsutissimis; foliis cordatis acutis dentato-serratis lanosis petiolatis; panicula terminali brachiata; laciniis calycinis foliaceis ellipticis mucronatis tomentosis; corollae tubo calycem parum superante. ♄ — Crescit in Nepalia inter Katmandu et Gossain Than.

43. CL. VISCOSUM Venten. Jard. de Malm. t. 25. — Ramis obsolete tetragonis, junioribus, petiolis foliisque subtus cum paniculae ramis tomentoso-villosis; foliis longe petiolatis ovatis obtusis vel acuminatis, irregulariter dentato-serratis, supra pilosulis, infra pubescentibus, in venis subvillosis; panicula terminali multiflora; calycibus amplis quinquefidis, laciniis ovatis acutis, corolla dimidio brevioribus; staminibus longissime exsertis, tubum corollae triplo superantibus. ♄ — Gemmae in axillis foliorum globosae villosissimae. Petioli 2-3-pollicares albo-tomentosi. Folia 2-6-pollicaria, 2-2½ poll. lata vel majora, ovato-subrotunda vel ovato-elliptica. Panicula terminalis ramosissima, ramulis ultimis subtrifloris, omnibus albo-villoso-tomentosis. Bracteolae in medio pedicello geminatae minimae ovatae villosissimae. Calyx viscosus ampliatus 4-5 lin. longus, laciniis ovatis acutis tomentellis. Corollae tubus semipollicaris pubescens, sursum ampliatus, laciniis subaequalibus 5 ovatis obtusis, stamina, quantum e tubo corollino exserta sunt, 15-16 lin. longa ascendentia purpurea glabra. Stylus staminibus brevior, stigmate acute bifido. Reliqua a me non visa sunt. — *Petasites agrestis* Rmph. Herb. Amboin. IV. 180. t. 49? — *Volkameria Petasites* Loureiro, Flor. Cochinch. II. 472. (at huic sunt folia rugosa glabra acuminata, corolla virescenti-lutea). — *Peragu* Rheede, Hort. Malabar. II. 41. t. 25. — Crescit in India orientali.

44. CL. (VOLKAMERIA Rxb. Fl. Indic. III. 60.) BUCHANANI Wlprs. mss. — Caule erecto; ramis junioribus pubescentibus quadrangularibus; foliis petiolatis cordatis crenulatis et integris, utrinque pubescentibus; corymbis terminalibus; pedunculis, pedicellis bracteisque parvis villosis coloratis; calyce quinquefido parvo glabro; corollae tubo gracili calycem quinquies sexiesque superante, limbo aequaliter quinquepartito. ♄ — Folia 4-6-pollicaria, 3-4 poll. lata. Pedicelli, bracteae

floresque coccinei. Drupa baccata coerulescenti-rubra, calyci rubro reflexo insidens. — *Cl. foetidum* D. Don, Prodr. fl. Nepal. 103. — *Volkameria foetida* Hamilt. mss. — Crescit in insulis Moluccanis.

45. CL. ODORATUM D. Don, Prodr. fl. Nepal. 102. — Ramis teretiusculis tomentosis; foliis ovatis ellipticisve acuminatis petiolatis, subtus tomentosis, e medio dentato-serratis; floribus confertis cymosis; pedunculis tripartitis; laciniis calycinis ellipticis acutis tomentosis; corollae tubo calyce paullo longiore. ♄ — Flores rubri odorati. — *Volkameria odorata* Hamilt. mss. ex Rxb. Hort. Benghal. 46. — Crescit ad Gorasan Nepalensium.

46. CL. CALAMITOSUM Linn. Mantiss plant. 90. — Ramulis teretiusculis puberulis; foliis petiolatis ovalibus obtusis vel acutis, integerrimis, subrepandis et irregulariter serrato-dentatis, supra glabris, subtus in nervis vix puberulis; paniculae laxae terminalis ramulis subtrilloris; calycis basin fere usque quinquefidi laciniis linearibus obtusis; corollae tubo puberulo calycem quadruplo excedente, laciniis limbi subaequalibus ovalibus obtusis; staminibus tubo corollino dimidio longioribus. ♄ — Folia petiolata opposita vel subalterna, petiolis 6–9 lin. longis, ovata vel rotundato-ovata, 1½–2-pollicaria, integerrima, repanda, vel uno alterove dente notata, superiora irregulariter serrato-dentata, glabra. Panicula laxa terminalis, ramis brachiatis brevibus patentibus, cum calycibus puberulis. Bracteae subulatae minutissimae. Calyx laxe campanulatus 4 lin. longus, fere basin usque in lacinias 5 aequales lineares obtusas divisus. Corollae albae tubus 12–15 lin. longus, sursum subinfundibuliformis, laciniae 3 lin. longae. Stylus staminibus parum longior, stigma capitatum subbilobum. — *Volkameria alternifolia* Burm. Flor. Indic. 137. t. 44. — Crescit in Insula Java. (v. s. c.)

47. CL. DISPARIFOLIUM Blume, Bijdragen 809. — Foliis oppositis longius petiolatis oblongis acuminatis, e medio ad apicem repando-dentatis, altero minore; panicula terminali brachiata laxa; caule tetragono; calycis laciniis lanceolatis acuminatis. ♄ — Corollae pallide flavescentes. Variat foliis obsolete denticulatis, integerrimis glaberrimisque vel utraque pagina puberulis. — Crescit in montibus insulae Javae.

48. CL. LANUGINOSUM Blume l. c. 810. — Foliis ovatis acuminatis, basi interdum subcordatis, remote denticulatis, utrinque mollibus, junioribus subintegerrimis cum ramulis calycibusque extus lanuginosis; pedunculis dichotomis; calycibus campanulatis quinquefidis, laciniis acuminatis. ♄ — Crescit in montosis insularum Moluccanarum.

49. CL. CAPITATUM Schum. et Thonn. Kongl. Dansk. vidensk. Selsk. Afhandl. IV. 61. † — Foliis ovato-oblongis repando-dentatis, basi subcordatis pubescentibus; floribus in capitulum terminale collectis. ♄ — Ramuli teretiusculi cinerei, juniores dense ferrugineo-pilosi. Folia sparsa, rugosa, superne pilosula tripollicaria breviter petiolata. Flores in capitulum hemisphaericum terminale multiflorum collecti. Bracteae anguste lanceolatae membranaceae pilosae calycis fere longitudine, pedicelli breves. Calyx tubuloso-campanulatus membranaceus profunde quinquefidus, laciniis ovato-lanceolatis purpurascentibus. Corolla bipollicaris alba, tubus calyce quadruplo longior glanduloso-puberulus, limbi subaequalis laciniae oblongae rotundatae. Filamenta 4 tubo triplo longiora, demum revoluta. Styli longitudine staminum stigma obsolete bifidum. Fructus desideratur. — *Volkameria capitata* Willd. Spec. plant. III. 384. hujus loci esse dicitur, differt tamen ramis glabris, foliis oppositis, utrinque scabris, capitulo quinquefloro et calyce trifido. — Crescit in Guinea.

50. CL. FRAGRANS Ait. Hort. Kewens. (edit. 2.) IV. 63. — Venten. Jard. de Malmais. t. 70. — Bot. Magaz. t. 1834. — Lindl. Bot. Regist. (New Ser.) XI. t. 41. — Foliis subrotundo-cordatis rugosis dentatis pubescentibus; floribus in capitulum magnum sphaeroïdeum aggregatis; corollae laciniis linearibus, apice rotundatis dilatatis; stylo quam stamina multo breviore. ♄ — Rami tetragoni, ad nodos compressi, juniores ferrugineo-pilosi, subtomentoso-pubescentes. Petioli ad

quatuor pollices usque elongati teretes pubescentes. Folia cordata vel cordato-subrotunda magis minusve acuminulata, margine irregulariter repando-denticulata, 8-pollicaria, 7 pollices lata vel minora, supra, praesertim in nervis piloso-hispida, sublus pallidiora reticulato-venosa, in nervis venisque pubescenti-tomentella. Corymbus terminalis breviter pedunculatus ramosissimus multiflorus, hemisphaericus, capituliformis. Bracteae lanceolato-lineares acuminatae membranaceae pollicares. Flores pulcherrime rosei albescentes fragrantissimi. (Flores simplices non vidi, in speciminibus spontaneis suppetentibus sunt flores pleni; calyce late campanulato amplo, profunde et acutissime quinquedentato, binc fere basin usque fisso, colorato, laciniis lanceolatis acuminatis. Corollae tubus calycis longitudine, limbus multiplicatus, laciniis obovatis obtusis irregulariter multiseriatis mox in unguem simplicem abeuntibus, mox pluribus in tubum completum vel incompletum connatis, antheris hinc inde laciniis corollinis adnatis.) — Sieb. Hb. fl. Martin. no. 160! — *Volkameria Japonica* Thnbrg. Flor. Japonic. 255. — *Volkmannia Japonica* Jcq. Hort. Schoenbr. t. 338. — *Agricolaea fragrans* Schrank, Rgnsbrgr. Dnkschrft. 1808. p. 98. — Crescit in China et in insula Martinica.

51. CL. SPINOSUM Spr. Syst. veget. II. 760. no. 29. — Ramis teretiusculis, summis tomentellis; foliis subsessilibus ellipticis acuminulatis acutis spinoso-dentatis, supra nitidis, in nervo puberulis, subtus reticulato-venosis, nervis venisque tomentosis; floribus in capitula terminalia coarctatis; bracteis obovato-lanceolatis acutis reticulato-venosis; calycibus amplis quinquangularibus acute quinquedentatis; corollae tubo longissimo puberulo, supra infundibuliformi, laciniis limbi ovato-lanceolatis; staminibus longissime exsertis, tubo corollino triplo circiter brevioribus. ♄ — Petioli 2 lin. longi, folia maxima 3-pollicaria, pollicem lata, acuminata vel obtusiuscula cum mucrone, saepe minora, ad modum *Ilicis* spinoso-dentata. Flores plurimi in capitulum terminale sessile aggregati. Calyx pubescenti-araneosus scariosus spinoso-quinquedentatus. Corollae tubus tripollicaris, supra infundibuliformi-ampliatus, laciniis 3 lin. longis. Stamina sesquipollicaria. — *Valdia Cardui folio, fructu subcoeruleo* Plum. Gen. 14. ic. 256. — *Ovieda spinosa* Linn. Spec. pl. 888. — Willd. Herb. 11675! — Crescit in insula St. Dominici. (v. s. sp.)

§. 2. *Calyce immutato truncato vel quinquedentato.*

52. CL. NERIIFOLIUM Wall. Catal. no. 1789! — Totum glaberrimum: ramis teretiusculis; foliis ternis verticillatis subsessilibus lineari-lanceolatis acutis integerrimis coriaceis uninerviis; pedunculis axillaribus folio triplo brevioribus, apice trifloris; bracteis lanceolatis, bracteolis in medio pedicello subulatis; calycibus brevibus acute quinquedenticulatis; corollae tubo elongato filiformi, laciniis limbi obovatis obtusis; staminibus longe exsertis. ♄ — Folia subsessilia, 2½-pollicaria, 3 lin. lata, supra nitida, acuta, internodia pollicaria. Inflorescentia axillaris, cum corolla folia subaequans. Corolla alba?? — *Volkameria nereifolia* Rxb. Flor. Indic. III. 64. — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

53. CL. GLABRUM E. Mey. Comment. plant. Afric. austr. I. 273. — Foliis oppositis ternisve ovatis obtuse acuminatis integerrimis subcoriaceis glaberrimis; paniculis terminalibus contractis; calyce quinquefido hirtello, tubo plicato multinervi, sub fructu ampliato; corollae glabrae tubo calycem duplo excedente; drupa abortu submonosperma. ♄ — Ramuli glaberrimi teretiusculi ad nodos dilatati, internodia parva ½-1-pollicaria. Folia petiolata, petiolo semipollicari, coriacea, utrinque acuminata sesquipollicaria, 9 lin. lata integerrima, margine subrevoluta, subtus pallidiora reticulato-venosa. Panicula terminalis et ex axillis foliorum supremorum contracta cymosa dichotoma. Bracteae lineari-subulatae breves. Calyx campanulatus acute quinquedentatus, dentibus subrevolutis. Corollae albae (?) tubus calyce multo longior, 3 lin. longus puberulus, laciniae limbi obovales acuminatae. Stamina 4 longissime exserta. Drupa (a me non visa) abortu monosperma. — β. *angustifolium:* foliis ovato-lanceolatis duplo minoribus. — *Cl. Ca-*

pense Eckl. et Zeyh. Hb. fl. Cap.! — Crescit in Promontorio bonae spei ad ripas fluvii Basche.

54. CL. EMIRNENSE Bojer mss. in Hook. Bot. Magaz. t. 2925. — Foliis oppositis ternisque petiolatis ovatis acutis vel obtusis integerrimis vel antice grosse serratis abrupteve acuminatis, utrinque glaberrimis; corymbis terminalibus; calyce campanulato brevi acute quinquedentato; corollae tubo gracili calycem multum excedente, limbi subaequalis laciniis parvis ovalibus obtusis; staminibus longe exsertis tubum longitudine aequantibus. ♄ — Frutex ramosissimus 10-20-pedalis, ramulis teretibus puberulis, adultis glaberrimis. Folia (cum petiolo 3 lin. longo) sesquipollicaria, 7 lin. lata vel minora, lanceolata, ovata obovataque obtusa vel acuminata, saepe abrupte acuminata, antice utrinque saepe 2-3-dentata, basi attenuata, subtus pallidiora, utrinque glaberrima. Corymbus terminalis brevis contractus paniculiformis. Bracteolae setaceae minutae. Calyx parvus campanulatus acute 5-dentatus vix puberulus. Corolla carnea, mox alba 9 lin. longa, tubo sursum infundibuliformi. Stylus staminibus brevior. Drupa baccata glabra globosa lutescens, calyci parum dilatato insidens tetrasperma. — *Cl. floribundum* Hort. Anglor. — Crescit in Madagascaria prope Tananarivou in provincia Emirnensi, locis montosis. — Affinis videtur *Cl. glabrato*. (v. s. c.)

55. CL. LIGUSTRINUM R. Br. in Ait. Hort. Kewens. (edit. 2.) IV. 64. — Fruticosum ramosissimum glabrum: ramulis subtetragonis; foliis brevissime petiolatis lanceolatis, utrinque acuminatis integerrimis glabris; panicula terminali ramosissima; bracteis lineari-subulatis; calycibus campanulatis parvis profunde quinquedentatis, dentibus lanceolatis acutis; corollae tubo calycem triplo superante, limbi laciniis obovatis obtusis; staminibus longissime exsertis tubo corollino longioribus; stylo staminum longitudine; stigmate bifido. ♄ — Rami teretiusculi, petiolorum basibus subpersistentibus subnodulosi, internodia brevia, foliis inferioribus deciduis. Petioli 2 lin. longi, folia 1-1¾ poll. longa integerrima, 2-4 lin. lata, utrinque attenuata glabra, subtus pallidiora. Panicula terminalis dichotoma corymbosa, cum flore in dichotomia saepissime non evoluto. Bracteae filiformes breves, in medio pedicello binae. Calycis laciniae profundae acute lanceolatae 2 lin. longae. Tubus corollinus laciniis calycinis ultra duplo longior vix puberulus, stamina tubo plus duplo longiora. — *Volkameria ligustrina* Jcq. Collectan. Supplem. 118. t. 5. fig. 1. — *Volkameria inermis β.* Ait. Hort. Kewens. (edit. 1.) II. 364. — Crescit ad Tampico Mexicanorum et in insula Sti. Mauritii.

56. CL. SCANDENS Palis. Beauv. Fl. d'Oware et de Benin II. 6. t. 62. — Caule volubili quadrangulari glaberrimo striato; foliis petiolatis glaberrimis ovalibus integerrimis acutis, basi ovatis, supra nitidis, infra lutescentibus; panicula terminali pauciflora; calycis pubescentis laciniis subulatis; staminibus corolla duplo longioribus. ♄ ⌒ — Caulis ramique purpurascentes. Folia coriacea tripollicaria, pollicem lata. Corollae albidae, ad faucem rubentis tubus pollice longior gracilis, laciniae limbi majusculae ellipticae acutae. — *Cl. umbellatum* Poir. Encycl. méth. V. 166. — Crescit in regno Owarensi.

57. CL. ANGUSTIFOLIUM Spr. Syst. veget. II. 758. no. 3. — Foliis verticillato-ternis oppositisque breviter petiolatis lanceolatis acuminatis vel lineari-lanceolatis linearibusve obtusiusculis integerrimis subrepandisve glaberrimis (vel junioribus tenuissime puberulis); pedunculis axillaribus terminalibusque corymbosis paucifloris, calycibus subtruncatis quinquedenticulatisve, corolla infundibuliformi duplo triplove brevioribus. ♄ — Simillimum *Cl. ligustrino* differt tamen calycibus truncatis nec quinquefidis. Ramuli juniores, pedunculi pedicellique minutissime pulverulento-puberuli. Folia bipollicaria, 2-12 lin. lata, petiolo saepe semipollicari. Corolla parva, infundibuliformi-tubulosa, laciniis limbi ovalibus tubum subaequantibus. — *Volkameria angustifolia* Andrws. Bot. Repos. t. 554. — *Volkameria heterophylla* Poir. Encycl. méth. VIII. 687. — *Clerodendron heterophyllum* R. Br. in Ait. Hort. Kewens. (edit. 2.) IV. 64. et in Wall. Catal. no. 1790! — Sieb. Hb. fl. Maurit. no. 158. et 311. — Crescit in insula Mauritius. (v. s. sp. et cult.)

58. CL. INERME R. Br. in Ait. Hort. Kewens. (edit. 2.) IV. 65. — Ramulis obsolete quadrangularibus glaberrimis; foliis breviter petiolatis ovatis vel ovato-lanceolatis integerrimis, utrinque glaberrimis obtusis; pedunculis axillaribus terminalibusque apice umbellato-trifloris; bracteolis in medio pedicello subulatis brevissimis geminis; calyce brevissimo campanulato acute quinquedentato; tubo corollae filiformi elongato glabro; limbi laciniis obovatis; staminibus longissime exsertis longitudine circiter tubi corollini. ♄ — Petioli 3 lin. longi, folia 1½-pollicaria, pollicem lata ovata, vel bipollicaria, 7-9 lin. lata ovato-lanceolata, integerrima glabra subcoriacea. Pedunculi saepe supraaxillares, folio breviores, triflori, paniculam ideo laxissimam efficientes. Corollae albae tubus calycem multoties superans, 12-14 lin. longus, sursum ampliatus infundibuliformis. — *Jasminum litoreum* Rmph. Herb. Amboin. V. 86. t. 46. — *Periclymeni similis myrtifolia arbor Maderaspatensis* Pluken. Almath. 287. t. 211. fig. 4. (mala). — *Jasmini flore frutex Philippensis foliis floribusque fere ternis* Petiv. Gaz. t. 42. fig. 7. — *Nir-notsjil* Rheede, Hort. Malab. V. 97. t. 49. — *Volkameria inermis* Linn. Flor. Zeylan. 231. — Jcq. Collect. Suppl. 117. t. 4. fig. 1. — *β.* foliis minoribus obtusissimis. — Crescit in India orientali. (v. s. cult.)

59. CL. BUXIFOLIUM Spr. Syst. veget. II. 758. no. 7. — Ramulis subtetragonis puberulis; foliis breviter petiolatis orbiculari-subrotundis obovatisque integerrimis, utrinque glabris, supra nitidis; pedunculis axillaribus folium aequantibus, medio bibracteolatis unifloris; calycibus parvis acute quinquedenticulatis; corollae tubo elongato, laciniis limbi obovatis. ♄ — Pro varietate *Cl. inermis* habeo parvifolia, sed specimen unicum tantummodo adest. Folia 6-9 lin. longa, 5-6 lin. lata brevissime petiolata. Corollae tubus 10 lin. longus, limbo parvo. Reliqua desunt. — *Volkameria buxifolia* Willd. Herb. 11681! — Crescit in India orientali.

60. CL. OBOVATUM Wlprs. mss. — Foliis obovatis integris coriaceis, subtus pubescentibus; panicula terminali decussata pubescente, ramificationibus ultimis elongatis secundifloris; calyce obsolete quinquedentato. ♄ — *Volkameria obovata* Rxb. Flor. Indic. III. 62. — Crescit in insulis Moluccanis.

61. CL. SPLENDENS G. Don in Jamieson's Journal XI. 349. — Lindl. Bot. Regist. (New Ser.) XV. t. 7. — Paxton, Magazine of botany IX. 103. (c. ic.) — Glabrum: foliis oblongis undulatis acutis, basi subcordatis; paniculis terminalibus corymbosis; calycibus quinquedentatis immutatis; corollae laciniis oblongis subaequalibus planis tubo brevioribus; staminibus rectis stylo multo longioribus; stigmate bidentato. ♄ — Fruticosum subscandens. Rami subteretes glabri, internodia 1½-2-pollicaria; folia breviter petiolata, basi cordata, acuminata, margine repando-undulata, cum petiolo semipollicari tripollicaria et longiora, pollices fere duos lata, suprema pollicaria. Panicula terminalis corymbosa, bracteae parvae lineari-subulatae, calyx campanulatus parvus acute quinquedentatus. Corollae pulcherrime coccineae tubus 9 lin. longus, sursum infundibuliformi-ampliatus, laciniae limbi subaequales late ovales obtusiusculae. Filamenta 4 virentia longe exserta; stylus staminibus dimidio brevior. Drupa desideratur. — Crescit in Sierra Leone.

62. CL. (VOLKAMERIA Poir. in Willd. Herb.) COMMERSONII Spr. Syst. vegetab. II. 758. no. 4. — Foliis ovatis, utrinque attenuatis integerrimis glabris; corymbis axillaribus trichotomis pubescentibus; corollae tubo elongato. ♄ — Crescit in insulis Philippinis.

63. CL. COROMANDELIANUM Spr. l. c. no. 5. — Foliis petiolatis ovatis acutis glaberrimis integerrimis; panicula terminali erecta; calycis laciniis subulatis obtusis; tubo corollae gracili. ♄ — Flores albidi. — *Cl. ovatum* Poir. Encycl. méth. Suppl. IV. 352. — Species non satis nota. — Crescit in ora Coromandeliana ad Pondichery.

64. CL. VOLUBILE Palis. Beauv. Flor. d'Ovare et de Benin I. 52. t. 32. — Caulibus teretiusculis glabris volubilibus; foliis petiolatis ovalibus integris longe acuminatis obtusis glabris; panicula terminali corymbosa; pedunculis capillaribus trifloris; floribus parvis pedicellatis. ♄⌒ — Folia 2-3-pollicaria. Stamina ad basin

tubi inserta et cum eo longitudinaliter connata, tubo duplo longiora. — Corolla rosea semipollicaris. — Crescit in regno Owarensi.

65. CL. ACUMINATUM Wall. Catal. 1792. — Totum glaberrimum: foliis longiuscule petiolatis, e basi ovata ellipticis in acumen longum abeuntibus membranaceis, utrinque glaberrimis; pedunculis axillaribus terminalibusque folio longioribus corymbosis, paniculam laxissimam efficientibus; bracteolis lineari-subulatis minimis; calycibus parvis acute quinquefidis, corollae tubo filiformi multo brevioribus. ♄ — Ramuli ultimi subtetragoni glaberrimi. Petioli 1½-2-pollicares, folia 3-4-pollicaria, pollicem lata. Paniculae rami filiformes trichotomi. Corollae tubus 9 lin. longus. — Crescit in India orientali ad Singapore. (v. s. sp. incomplet.)

66. CL. DIVARICATUM W. Jack in Hook. Bot. Miscell. II. 89. — Ramis oppositis ad nodos incrassatis; foliis breviter petiolatis obovato-lanceolatis acuminatis integris, interdum subdenticulatis glabris; panicula erecta terminali, ramis divaricatis subdichotomis multifloris; bracteis magnis ovatis acuminatis foliaceis; calyce cupuliformi subintegro; corollae tubulosae laciniis secundis. ♄ — Frutex bipedalis. Corollae laciniae inferiores coeruleae longiores. Stamina longe exserta. Drupa baccata intense purpurea calyci vix aucto insidens quadriloba tetrasperma, seminibus 1-3 interdum abortientibus. — Crescit ad Laye in insulae Sumatrae ora occidentali.

67. CL. JAVANICUM Wlprs. mss. — Fruticosum glabrum (exceptis inflorescentiae ramis et bracteis tomentellis): foliis brevissime petiolatis, inferioribus ovalibus, utrinque obtusis, superioribus subcordato-rotundatis orbiculatis orbiculato-rhombeisque acuminulatis, summis integerrimis, reliquis acute serrulato-denticulatis, utrinque glaberrimis, (vix supremis infra in nervis subpuberulis); pedunculis axillaribus, superioribus folio longioribus, trichotome paniculato-corymbosis; bracteis ad ramulorum basin lanceolatis acuminatis integerrimis; calyce laxo, obsolete quinquecrenato, fructifero subtruncato; corollae tubo vix calyce longiori, laciniis limbi tubo triplo longioribus ovatis obtusis; staminibus (basi lanatis) longissime exsertis lacinias dimidio superantibus. ♄ — Video ramorum summitates et folium 4½-pollicare, 2½ poll. latum, petiolo vix 3 lin. longo; folia reliqua sursum minora, 2½-pollicaria, minima semipollicaria, 2¼ poll. et minima 4 lin. lata. Panicula terminalis semipedalis foliosa vel si mavis corymbi axillares paniculati. Inflorescentiae rami ferrugineo-tomentelli, bracteis plerumque integerrimis, subinde dentatis pubescentibus. Corollae 7-8 lin. longae tubus brevissimus. Drupa calyci persistenti laxo imposita nigra glaberrima globosa quadrisulca, matura non visa. — Crescit in insula Java. (v. s. sp.)

68. CL. ODORATUM Rxb. in Wall. Catal. no. 1812. — Ramis quadrangularibus glabris, sursum canescenti-tomentellis; foliis breviter petiolatis ovatis longe acuminatis grosse serrato-dentatis, supra in nervis puberulis, adultis infra glabrescentibus, floralibus lanceolatis longe acuminatis remotiusque serrulatis, infra canescenti-tomentellis; corymbulis trichotomis triflorisque incano-tomentellis interrupte spicatis; calycibus parvis acute quinquedentatis. ♄ — Vidi specimen pessimum, quoad flores non bene extricandum. Petioli 4 lin. longi, folia quadripollicaria, 18-21 lin. lata. Panicula terminalis pyramidata, modo *Viticum* interrupte spicata. Bracteae lanceolatae obtusiusculae canescentes. — Crescit in India orientali ad Kamaon. (v. s. sp.)

69. CL. GRATUM Wall. l. c. 1813. — Ramis teretiusculis; foliis breviter petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis, supra vix puberulis, infra ad nervos puberulis, serrato-denticulatis summisque integris; paniculis axillaribus terminalibusque paucifloris, rhachi pedicellisque tomentellis; bracteolis subulatis; calycibus parvis acute quinquedentatis. ♄ — Affine praecedenti, sed ex specimine pessimo deflorato vix describendum. Folia tripollicaria, pollicem lata, petiolo 3 lin. longo, suprema lanceolata minora subintegra integerrimaque. — Crescit in India orientali ad Dheyra-Doon. (v. s. sp.)

70. CL. COLEBROKIANUM Wlprs. mss. — Ramis tetragonis glaberrimis; foliis longe petiolatis late ovatis vel subrotundato-ovatis subacuminatis, supra glaberrimis, subtus vix in nervo puberulis; paniculis axillaribus terminalibusque dichotomis fastigiatis; pedunculis pedicellis calycibusque minutissime puberulis; calycibus parvis acute quinquedentatis saepe ad basin laciniarum glandula callosa instructis; corollae glaberrimae tubo elongato, laciniis limbi elliptico-ovatis tubo quadruplo brevioribus. ♄ — Internodia in ramo florifero brevissima, pollicaria. Petioli bipollicares, folia semipedalia forteque longiora, 4–5 poll. lata membranacea vix repanda integerrima. Pedunculi axillares 2–2½–pollicares dichotomi, floribus fastigiatis. Corollae purpureae? tubus pollicaris, stamina longissime exserta. Drupa pyriformis quadrisulca glaberrima reticulato-rugosa, calyce vix mutato suffulta. — *Cl. glandulosum* Colebr. mss. in Wall. Catal. no. 1806. — Crescit in India orientali (ad Punduam). (v. s. sp.)

71. CL. LONGIFOLIUM Dcne. Nouv. Ann. du Mus. III. 400. — Ramis subtetragonis laevibus, junioribus puberulis; foliis magnis ovatis acuminatis, basi rotundatis integris aut medio apicem usque subrepandis breviter petiolatis; pedunculis axillaribus brachiatis subteretibus; calyce campanulato quinquepartito, segmentis ovato-lanceolatis acutis; corollae tubo tripollicari gracili glabro. ♄ — Crescit in insula Timor.

72. CL. INTERMEDIUM Cham. Linnaea VII. 105. † — Caule acute quadrangulo; foliis profunde cordatis ovatis acuminatis acutis subangulatis mucronato-dentatis, supra pilosis, subtus squamatis; panicula terminali glabriuscula e cymis bis bifidis, ramulis multifloris constante; laciniis calycinis ovatis acutis glabris brevibus quinquies brevioribus tubo corollae vix viscidulo-puberulo; genitalibus corollam plus duplo superantibus. ♄ — Habitat in Luçonia. — [Idem esse videtur ac *Cl. urticifolium* Wall. Hb. 1801. — Huic sunt folia majora longe petiolata (petiolis 8-pollicaribus), 8–9-pollicaria, 10 poll. lata, latissime cordata acuminata, irregulariter grosse aculeque dentato-incisa, supra nitida sparseque setuloso-hispida, infra in nervis vix puberula, suprema multo minora breviter petiolata, tripollicaria. Panicula laxa terminalis subtrichotoma, calyces acute quinquedentati, tubo corollino infundibuliformi multo breviores. — *Volkameria urticaefolia* Rxb. Flor. Indic. III. 61. — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)]

† *Species valde dubiae.*

73. CL. DENTATUM Wall. Cat. 1799. — Fruticosum: foliis rotundato-cordatis acutis aculeque dentatis, lobis baseos rotundatis incumbentibus; panicula terminali brachiata colorata. ♄ — *Volkameria dentata* Rxb. Flor. Indic. III. 61. — Species non satis nota inquirenda. — Crescit in India orientali, in districtu Silhet.

74. CL. MACROPHYLLUM Sims, Bot. Mag. t. 2536! † — Foliis late ovatis acuminatis; serratis subsessilibus, subtus tomentosis; floribus paniculatis; calycibus quinquedentatis; corollis labiatis. ♃? — Icon pessima et ideo species recognoscenda. — Rchb. Flor. exot. t. 209. — Crescit in insula Martinica.

75. CL. CAPSULARE M. Blanco, Flora de Filipinas 509. — Ramis quadrangularibus; foliis oppositis lanceolatis integris glabris, petiolis brevibus; pedunculis axillaribus umbellatim trifloris; calyce parvo campanulato quinquedentato subbilabiato; corolla longissima alba, tubo filiformi subincurvo; limbi laciniis quinque obtusis, subbilabiatis; staminibus 4 didynamis longissimis corollae tubo parum infra faucem insertis; stylo staminibus parum breviore, stigmate bifido; drupa (de figura de magra) tetrasperma. ♄ — In insulis Philippinis crescit.

†† *Species indescriptae a me non visae.*

CL. CAPENSE D. Don.
CL. HELIANTHEMIFOLIUM Wall. Catal. 1812.
CL. HERBACEUM Wall. Cat. 1815.
CL. MYRICOIDES R. Br.
CL. ORNATUM Wall. Cat. 1811.
CL. SACKEANUM Wall. Cat. 1794. (*Cl. nutans* Sack.)

CL. SEMISERRATUM Wall. Cat. 1785.
CL. SPLENDIDUM Wall. Cat. 1803.
CL. VENOSUM Wall. Cat. 1807.

††† *Species e genere expellendae.*

CL. CANUM D. Don. = TEUCRIUM MACROSTACHYUM.
CL. FRUTICOSUM P. Br. = VOLKAMERIA ACULEATA.
CL. LEUCOSCEPTRUM Don. = TEUCRIUM MACROSTACHYUM.
CL. PHLOMOIDES Hort. Ital. = VERBESINA ATRIPLICIFOLIA.

XLII. (3696.) TAMONEA *Aublet.*

(Aublet, Hist. des pl. de la Guian. II. 660. t. 268. — Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 291. II. 200.)

1. T. SCABRA Cham. et Schlchtd. Linnaea V. 99. et VI. 373. — Fruticosa, ex toto scabrido-pubescens: foliis ovatis acutis grosse serratis; spicis gracilibus sparsifloris elongatis; drupis quadrispinosis, spinis per paria brevioribus approximatis ♄ — Folia in petiolum brevem angustata ad summum sesquipollicaria. Flores coerulei.

β. minor: Foliis minoribus, drupa paullo majori brevius spinosa, ad earum basin usque calyce tecta. — Fruticosa, flores magni pallide rubelli, fundo atropurpureo. — Crescit in Mexico, in dumetis prope Jalapam, inter Mesachica et Mapilque, ad littora marina prope Laguna Salada etc. (v. s. sp.)

2. T. (GHINIA Swrtz. Flor. Ind. occid. II. 1089. † t. 21. fig. A.) VERBENACEA Swrtz. Prodr. fl. Ind. or. 94. — Drupis quadrispinosis; spicis axillaribus; foliis ovatis inciso-serratis pubescentibus. ♃ — Caulis basi suffruticosus erectus subramosus tetragonus pubescens, sesquipedalis, ramulis tetragonis erectiusculis. Folia opposita petiolata ovata inciso-serrata, superiora subpinnatifida nervosa pubescentia. Spicae axillares elongatae erectae, flores subsessiles solitarii remoti parvi albidi, bracteolis sub flore minutis. Calyx subcampanulatus membranaceus quinquestriatus, quinquedentatus, dentibus aristaeformibus subulatis erectis persistentibus. Corolla tubulosa irregularis, tubus angustus calyce longior, basi dilatatus, fauce contractus. Limbus subbilabiatus, lacinia suprema subrotunda emarginata erectiuscula, tribus inferioribus ovato-subrotundis, intermedia parum latiore. Filamenta 4, quorum 2 brevissima, 2 parum longiora medio squamula ovata subcarnosa aucta. Antherae ovatae. Germen tetragono-ovatum, stylus brevis, stigma capitatum quadrifidum. Drupa carnosa turbinato-tetragona, angulis quatuor terminalibus spinis patentibus armatis. Putamen quadriloculare, loculis monospermis. — *Verbena* (*Tamonea* Pers. Enchirid. II. 139.) *Curassavica* Linn. Spec. plant. 28. — *Kaempfera* Houst. Reliq. 3. t. 2. — *Veronicae similis fruticosa Curassavica* Horn. Paradis. 240. — Crescit in insulis Caribaeis.

3. T. SPICATA Aublet, Pl. de Guian. II. 660. t. 268. — Grtnr. De fructib. III. t. 213. — Herbacea annua: caule ramoso tetragono profunde sulcato, glabro vel sparse setoso; foliis brevissime petiolatis ovatis vel ovato-rotundatis grosse serrato-dentatis; spicis paucifloris; drupis inermibus. ⊙? — Planta ab Aubletio appellatur annua, pedalis vel bipedalis ramosissima. Rami virides tetragoni profunde sulcati setoso-pilosi. Folia parva, maxima pollicaria, 4 lin. lata, petiolo 3 lin. longo, pleraque plus duplo minora, utrinque, sed praecipue subtus setoso-pilosa. Pedunculi axillares recti pollicares vel sesquipollicares, apice laxe racemoso-pauciflori. Flores brevissime pedicellati, basi bracteola setacea suffulti. Calyx membranaceus truncatus quinquesubulato-mucronatus, drupam maturam semi-includens. Neque flores, neque fructus vidi. — *Leptocarpus chamaedryfolius* Willd. Hb. — *Tamonea mutica* Pers. Enchirid. II. 139. — *Ghinia mutica* Willd. ex Swrtz. l. c. 1092. — Crescit in Brasilia et Guiana. (v. s. sp.)

† *E genere expellendae.*

T. ARABICA Mirb. = PRIVA DENTATA.
T. LAPPULACEA Poir. = PRIVA LAPPULACEA.

B. Antherae apice poris 2 obliquis dehiscentes, stamina quinque exserta subaequalia.

XLIII. (3718.) **GEUNSIA** *Blume.*

(Blume, Bijdragen 819. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 291. II. 200.)

1. G. FARINOSA Blume l. c. — Foliis oppositis alternisve ovato-oblongis acuminatissimis, subtus reticulatis et farinoso-subtomentosis; cymis dichotomis axillaribus divaricatis. ♃? ♄? — Crescit in sylvis altioribus provinciarum Buitenzorg, Tjanjor, Krawang in insula Java.

Tribus III. *SYMPHOREMEAE* Meisn. Gener. plant. vascular. I. 292.

Flores plures in involucro calyciformi foliaceo uniseriali 3-8-phyllo patente sessiles. Stamina 4-8 summo corollae tubo vel fauci inserta exserta. Fructus monospermus.

XLIV. (3716.) **SYMPHOREMA** *Rxb.*

(Rxb. Plant. of the coast of Coromand. II. 46. t. 186. — Meisn. Gener. plant. vascul. I 292. II. 200.)

1. S. INVOLUCRATUM Rxb. l. c. — Caulis lignosus scandens, cortice cinereo; rami stricti, folia breviter petiolata ovalia, basi integerrima, caeterum serrata, acuminata 4-pollicaria, 1½-2 poll. lata pubescentia; pedunculi fasciculati in apicibus ramulorum aphyllorum et in axillis foliorum annotinorum, teretes pubescentes, apice umbellulam gerentes; involucrum 6-8-phyllum, foliolis lanceolatis pubescentibus persistentibus; flores 7-9 sessiles parvi albi. Calyx tubulosus 6-8-striatus, 6-8-dentatus persistens pubescens; corollae tubus brevis, limbus 6-8-fidus, partitionibus linearibus patentibus; stamina 7-8 corolla breviora, antherae oblongae. Stylus staminum longitudine, stigma bifidum. Drupa pisiformis monosperma calyce inclusa. — Crescit in ora Coromandeliana

† *E genere expellendum.*

S. PANICULATUM Heyne. = CONGEA PANICULATA.

XLV. (3715.) **CONGEA** *Rxb.*

(Rxb. Pl. of the coast of Coromand. III. 90. t. 293. — Meisn. Gener. pl. vascul. I. 292. II. 200.)

1. C. AZUREA Wall. Catal. 1733. — Ramulis junioribus subtetragonis; inflorescentiae ramis petiolisque ferrugineo-tomentosis; foliis brevissime petiolatis ovalibus acutis (vix acuminatis) integerrimis, supra scabris, infra hirto-pubescentibus reticulato-venosis; paniculis terminalibus amplis trichotomis; involucri triphylli foliolis anguste ellipticis obtusissimis, utrinque tomentellis coloratis. ♄◡ — Ramuli adulti subteretes glabri, internodia 1½-2-pollicaria, petioli vix 3 lin. longi, folia 2½-8-pollicaria, 1-5 poll. lata acuta vel breviter acuminata, nervi supra impressi tomentelli, subtus prominentes. Pedunculi in axillis foliorum superiorum et terminales, paniculam amplam latissimam opposite ramosam indeque trichotomam efficientes, pedicelli 9 lin. longi tomentelli, apice involucrum triphyllum floresque 5-10 sessiles gerentes. Involucri foliola pollicaria, 3 lin. lata, utrinque tomentella azurea? sicca rubicunda, infra venosa. Calyx campanulatus quinquedentatus, utrinque molliter albo-villosus. Corollae tubus cylindricus calyce longior, limbus inaequaliter bilabiatus, labio interiori in lacinias 3 breves rotundatas, exteriori in lacinias 2 obovatas tubum aequantes diviso. Stamina 4 didynama longe exserta varieque contorta. Ovarium oblongum biloculare, loculis dissepimentis duobus incompletis divisis biovulatis. Stylus staminum longitudine, stigma bidentatum. — *Roscoëa villosa* Rxb. Fl. Indic. III. 56. — Crescit in Martabania. (v. s. sp.)

2. C. TOMENTOSA Rxb. Pl. of the coast of Corom. III. 90. t. 293. — Ramis cinereis scabris, junioribus tomentosis; foliis breviter petiolatis cordatis integris magis minusve villosis; paniculis axillaribus terminalibusque; foliis floralibus oblongo-cordatis dense pubescentibus sessilibus; involucri 9-flori triphylli foliolis ellipticis obtusis pubescentibus roseis. ♄ ◡ — Folia 4–6-pollicaria 3–4 poll. lata. Pedicelli oppositi cum pedunculo communi tomentosi. Flores albi. Involucri foliola ultra pollicaria, semipollice latiora. Calyx tubulosus pilosissimus quinquedentatus. Corollae tubus calycis longitudine, limbo bilabiato, labio exteriori longissimo bifido, interioris trifidi segmentis ovalibus. Filamenta didynama longissima corolla multo longiora. — *Roscoëa tomentosa* Rxb. Hort. Benghal......? — Crescit in ora Coromandeliana. (v. s. sp.)

3. C. BARBATA Wall. Catal. 1738. — Ramis teretibus retrorsum ferrugineo-pilosis, ramulis oppositis patentibus petiolis nervisque foliorum subtus fulvo-tomentellis; foliis breviter petiolatis ovatis acutis vel basi subcuneato-attenuatis apiceque breviter acuminatis, supra nitidis sparse pilosis, demum glabris, infra pubescenti-hirtis, integerrimis; pedunculis axillaribus solitariis vel terminalibus ternis, folio quadruplo brevioribus; involucri hexaphylli foliolis elliptico-lanceolatis obtusiusculis fulvo-hirtis; calycibus pilosissimis. ♄ ◡ — Folia adjecto petiolo brevissimo, vix 3 lin. longo, 2–2½-pollicaria, 10–12 lin. lata, basi saepe longe cuneata oblongo-lanceolata membranacea. Pedunculi semipollicares pilosissimi. Involucri foliola saepius inaequalia, nunc semipollicaria, 2–2½ lin. lata, nunc 3 lin. longa ovato-rotundata. Flores 10 vel plures intra involucrum aggregati sessiles umbellati. — Mihi ipsi non contigit hujus generis speciem floribus explicatis gaudentem fructiferamve inquirere. — Crescit in insula Pulo-Penang. (v. s. sp.)

4. C. UNGUICULATA Wall. Catal. 1736. — Ramulis tetragonis, petiolis, pedunculis, involucri foliolis subtus calycibusque fulvo-tomentellis; foliis brevissime petiolatis ovalibus vel ovato-lanceolatis acuminatis subcoriaceis integerrimis, junioribus utrinque tenuissime fulvo-tomentellis, adultis glaberrimis; paniculis axillaribus terminalibusque trichotomis laxissimis; involucri hexaphylli foliolis saepe inaequalibus, lanceolatis, ovatis, oblongis obovatisque, semper in petiolum contractis. ♄ ◡ — Petioli 3 lin. longi, folia 4–5–6-pollicaria forteque majora, 1½–2½ poll. lata, superiora ad paniculae ramificationes primarias bipollicaria, saepe longe sensimque acuminata. Pedunculi partiales saepe sesquipollicares, involucri foliola maxima sesquipollicaria, semipollice latiora, saepe semipollicaria, 2 lin. lata. — Crescit in India orientali (Sillet, Pundua). (v. s. sp.)

5. C. (ROSCOEA Rxb. Flor. Ind. III. 54?) PENTANDRA Wall. Catal. 1734. — Ramis subtetragonis, junioribus virescenti-tomentellis; foliis brevissime petiolatis ovatis acuminatis coriaceis integerrimis, utrinque nitidis glaberrimis nervosis; paniculis axillaribus terminalibusque amplissimis, pedunculis oppositis capillaribus folio ovato-obtuso duplo longioribus; involucri plerumque hexaphylli foliolis ellipticis obtusis membranaceis, utrinque glabris inaequalibus. ♄ ◡ — Folia brevissime petiolata 2½–3-pollicaria, 1–1½ poll. lata coriacea. Pedunculi axillares oppositi saepe semipedales, pedicellos oppositos 9 lin. longos capillares simplices gerentes. Ad pedicelli basin est folium breviter petiolatum rotundato-ovatum obtusum utrinque piloso-hispidum, vix semipollicare, saepius minus. Involucri plerumque hexaphylli foliola 6–10 lin. longa, 4 lin. lata membranacea, supra nitida, infra magis opaca. — Crescit in India orientali (Pandua). (v. s. sp.)

6. C. JACKIANA Wall. Catal. 1735. — Ramis subtetragonis ad ramificationes tomentosis; foliis breviter petiolatis, oblongo-ellipticis acuminatis, in nervo infra tomentellis, caeterum glabris; pedunculis axillaribus folium aequantibus vel superantibus, ad nodos tomentosis; pedicellis folio subaxillari breviter petiolato ovato-elliptico acuto aequalibus longioribusque; involucri hexaphylli foliolis elliptico-linearibus obtusis membranaceis, supra glaberrimis, infra sparse pilosulis inaequalibus, pedicello longioribus. ♄ — Valde affinis *C. pentandrae*, cujus forte erit habenda forma. Petioli 3 lin. longi, folia 3–4-pollicaria, 18–21 lin. lata vel

superiora oblongo-lanceolata 2½ poll. longa, 10 lin. lata. Pedunculi 3-4½-pollicares, pedicelli 9 lin. longi, folia subaxillaria plerumque breviora. Involucri foliola pollicaria, 3 lin. lata et majora. Flores intra involucrum seni sessiles purpurei inodori. Calyx cyathiformis pentagonus subtruncatus 5-costatus persistens villosus. Corollae tubus brevis, faux densissime lanata, limbus subaequaliter 5-6-fidus, laciniis subrotundis. Stamina 5-6 corolla multo longiora. Bacca globosa pilosa pisiformis calyce semiinclusa. — *Sphenodesme pentandra* Jack in Hook. Bot. Misc. I. 285. — *Roscoëa pentandra* Rxb. Flor. Indic. III. 54. — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

† *Species mihi incognitae.*

C. FERRUGINEA Wall. Cat.

C. (SYMPHOREMA Heyne Herb.) PANICULATA Wall. Cat.

Tribus IV. *AEGIPHILEAE* Endl. Gener. plant. p. 637.

Flores exinvolucrati. Bacca 4-1-locularis, 4-1-sperma. Germen 4-loculare, loculis uniovulatis.

XLVI. (3713.) AEGIPHILA *Jcq.*

(Jcq. Americ. edit. pict. t. 16. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 200.)

§. 1. *Glomeratae. Flores axillares glomerati subsessiles.*

1. AE. CORDATA Poeppig. Herb.! — Ramis obsolete tetragonis densissime ferrugineo-hirsutissimis; foliis subsessilibus, basi cordatis ovato-ellipticis acuminatis integerrimis, utrinque, sed praesertim subtus ad venas nervosque setoso-hirtis; corymbis axillaribus multifloris brevissimis ad glomerulum contractis, pedicellis brevissimis calycibusque ferrugineo-hirsutissimis. ♄ — Species e ramo suppetente solae sequenti affinis. Internodia 1½-3-pollicaria, petioli vix 2 lineas longi ferrugineo-hirsutissimi, folia basi (an semper?) inaequilateralia, 4-5-pollicaria, 2½-3 poll. lata, margine ciliata, infra ferrugineo-hirsuta, supra subnitida. Flores in glomerulos axillares oppositos dense congesti, breviter pedicellati. Calyx obconico-campanulatus subtruncatus ferrugineo-hirsutissimus Corollae rubro-purpureae infundibuliformis tubus calyce triplo longior, laciniae ovales acutiusculae. Stamina subinclusa? Stylus inclusus? Drupa........? — Maynas. (v. s. sp.)

2. AE. MULTIFLORA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 50. t. 67. fig. 6! — Ramis obsolete tetragonis hirsutis; foliis petiolatis oblongo-obovatis vel ovato-lanceolatis acuminatis, subtus lanuginoso-pubescentibus, integerrimis; floribus axillaribus et in axillis foliorum annotinorum geminis ternisque subsessilibus. ♄ — Frutex *Corni* habitu triorgyalis. Rami ad articulationes compressi purpurei granuloso-hirsuti. Folia cum petiolo subsemipollicari tripollicaria, 15 lin. lata. Flores brevissime pedicellati ad axillas congesti terni quaternive. Calyx hirsutus campanulatus obsolete quadridentatus. Corolla ante explicationem subclavata, tandem rubro-purpurea, tubus calyce triplo longior, limbi quadripartiti laciniae ovatae acutae. Stylus et stamina corolla breviora. Drupa baccata tetragono-subrotunda purpurea tetrapyrena, pyrenis obovato-trigonis monospermis. ♄ — *Ae. verticillata* Arrabida, Flor. Flumin. I. t. 91?? — Lignum durissimum ad stapedas conficiendas adhibetur. — Crescit in Peruvia ad fluviorum margines in vicinia Chaillac, Huassanuassi et Pillao. (v. s. sp.)

§. 2. *Paniculatae. Flores subcorymboso-paniculati.*

* *Foliis glabris.*

3. AE. (OMPHALOCOCCA Willd. in Schult. Mantiss. III. 132.) CORNIFOLIA Kth. Abhandlungen der Berlin. Akad. 1831. p. 215. — Ramis subtetragonis foliisque glabris oppositis ternisque verticillatis, basi in petiolum brevem decurrentibus, integerrimis membranaceis; paniculae terminalis ramis oppositis ternisque

patentissimis corymbos referentibus rhachique canescenti-puberulis; floribus pedicellatis. ♄ — Folia 5–6-pollicaria. Calyx membranaceus ventricoso-subglobosus, fauce vix constrictus, obsoletissime angulato-quadridentatus. Corolla monopetala hypogyna? glabra, externe punctulis lepidotis conspersa, tubus cylindraceus calycem superans, limbus parum longior quadripartitus, laciniis subobliquc elliptico-oblongis obtusis aequalibus patentissimis, fauce pubescente. Praefloratio imbricata. Stamina 4 fauci inserta longe exserta aequalia? glabra. Antherae ellipticae utrinque emarginatae biloculares. Ovarium sessile liberum subrotundo-truncatum glabrum 4-loculare?, ovula solitaria axi centrali affixa peritropa. Stylus terminalis tubum vix superans filiformis glaber, stigma bifidum, lobis elongatis subulatis aequalibus. Fructus calyce cupuliformi suffultus depresso-orbicularis placentiformis laevis glaber, immaturus 4-locularis, loculis monospermis. — Crescit in Brasilia. (v. s. sp.)

4. AE. MARTINICENSIS Linn. Mantiss. plant. 198. — Jcq. Observ. II. 3. t. 27. (edit. pict. t. 16.) — Ramis teretibus; inflorescentia foliisque utrinque glaberrimis breviter petiolatis ovato-lanceolatis vel lanceolato-ellipticis, basi acutis, in acumen saepius abruptum longe attenuatis, integerrimis; pedunculis supraaxillaribus terminalibusque folio fere duplo brevioribus trichotome corymbosis subpaniculatis, vel in paniculam thyrsoideam terminalem dispositis, pedicellis infra medium bibracteolatis calycibusque truncatis. ♄ — Ramuli vix unquam novelli subpulveracei. Foliorum delapsorum cicatrices crescunt et protuberantiam oblique applanatam sistunt. Petioli 3–6 lin. longi. Folia 4–6-pollicaria, 15–21 lin. lata, acumine haud raro pollicari. Pedunculi supraaxillares 1–2-pollicares vel saepe breviores in paniculam thyrsoideam trichotomam digesti. Bracteolae subulatae brevissimae. Calyx cupuliformis subtruncatus, drupam globosam Pisum circiter aequantem semiincludens. — *Ae. glabra* Lam. Ill. gener. t. 70. fig. 1. — Crescit in insulis Trinitatis et Martinica, etiam ad fluvium Amazonum prope Egam. (v. s. sp.)

5. AE. ELATA Swrtz. Prodr. fl. Ind. occid. 31. et Fl. Ind. occid. I. 254. — Ramis teretibus foliisque utrinque glaberrimis, basi subcordatis ovato-oblongis acuminatis coriaceis; paniculis terminalibus subthyrsoideis tripartitis; calycibus campanulatis subquadrifidis, extus puberulis. ♄ — Frutex sexpedalis, interdum scandens. Petioli 3–4 lin. longi una cum foliorum nervo medio subtus et inflorescentiae ramulis tenuissime ferruginei pulverulento-puberuli, folia 4½-pollicaria, basi, ubi sunt latissima 2 poll. lata parumve latiora, ovata nec attenuata, saepius subcordata coriacea, nitida. Panicula terminalis thyrsoidea pluripollicaris rami oppositi trichotomi, pedunculis ½–1-pollicaribus apice trichotome cymosis. Bracteae inferiores foliaceae lanceolatae, superiores subulatae. Calycis laciniae ovatae. Corolla lutescens, hypocraterimorpha, tubus cylindricus calyce multo longior, laciniae limbi oblongae obtusae. Filamenta (formae masculae) tubo corollae multo longiora, stylus fauce inclusus. Bacca subrotunda calyce persistente obvoluta lutea tetrapyrena, ossiculis hinc planis, inde convexis. — *Ae. laevis* Poepp. Herb.! (nec Willd.) — *Ae. racemosa* Arrabida, Flor. Flumin. I. t. 88. — *Knoxia scandens, foliis cordato-ovatis, pedunculis multipartitis alaribus* P. Br. Jamaic. 140. t. 3. fig. 3. — Crescit in fruticetis insulae Jamaicae et in Brasilia. (v. s. sp.)

6. AE. (MANABEA Aublet, Hist. des pl. de la Guian. I. 66. t. 25.) LAEVIS Willd. Spec. pl. I. 617! — Ramis foliisque glabris oblongo-ellipticis acuminatis integerrimis; corymbis folio triplo brevioribus; calycibus glabris; staminibus vix exsertis. ♄ — Frutex biorgyalis laete viridis, ramis subcompresso-tetragonis glabris. Folia utrinque angustata apiceque acuminata 2–3-pollicaria membranacea, reticulato-venosa. Petioli canaliculati 2–3 lin. longi. Corymbi terminales et axillares trichotomi, foliis triplo breviores. Pedunculi pubescentes pollicares. Calyx turbinatus quadridentatus viridis glaber, dentibus ovatis obtusis, uno alterove interdum bifido. Corolla flava infundibuliformis glabra, laciniis limbi quadrifidi ovatis obtusiusculis suberectis. Stamina vix exserta. Drupa carnosa lutea calyce

corollaque tecta 3–4–sperma. — *Ae. laeta* H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 249. — *Ae. Manabea* Swrtz. Flor. Ind. occid. I. 256. † — *Ae. lutea* Lam. Illustr. gener. t. 70. fig. 3. — Crescit locis calidissimis ad ripam fluvii Magdalenae juxta villam Buena-Vista et in insula Jamaica.

7. AE. TRIFIDA Swrtz. l. l. c. c. 32. et 260. — Ramis teretibus foliisque utrinque glabris nitidis breviter petiolatis ovato-lanceolatis acuminatis integris; pedunculis axillaribus pluribus aggregatis simplicibus tripartitisve trifloris. ♄ et ♄ — „Rami subsimplices longi patentes. Folia coriacea atro-virentia. Pedunculi breves. Flores albidi. Calyx tetragonus quadridentatus. Corollae tubus subpollicaris angustus teretiusculus, laciniae limbi quadripartiti lanceolatae reflexae, una apice subcucullata, carnosa. Stamina 4 medio tubo inserta inclusa. Stylus apice bifidus inclusus. Bacca oblonga magna calyce obvoluta, matura nigra tetrasperma." — Crescit locis montosis insulae Jamaicae.

8. AE. FLUMINENSIS Arrabida, Flor. Flumin. I. t. 95. — Fruticosa ramosissima: ramis teretibus glabris, junioribus tetraquetris (cum inflorescentiae ramis) adpressissime pulverulento-tomentellis; foliis breviter petiolatis ovatis acuminatis vel oblongo-ellipticis, integerrimis, utrinque glaberrimis; pedunculis axillaribus folio (plerumque) brevioribus, apice dichotome cymosis densifloris; bracteis foliaceis ovali-ellipticis; calycibus albo-tomentellis truncatis vel obsolete denticulatis; corollae tubo brevi infundibuliformi, laciniis oblongis obtusis; staminibus fauci insertis, corolla duplo longioribus. ♄ — Folia adjecto petiolo 3–5 lin. longa, 2½–3–5–pollicaria, 9–18 lin. lata membranacea, utrinque acuminata vel rarius obtusa. Pedunculi axillares saepe tripollicares folio raro longiores, apice cymoso-dichotomi cum flore pedicellato in dichotomia, multiflori subumbelliformes. Bracteae foliaceae oblongae ellipticae acuminatae vel obtusae flore plerumque breviores, saepe infra tomentellae. Calyx adpresse albo-pulverulentus tomentellus, vix quinquedenticulatus, plerumque truncatus. Corolla coerulea infundibuliformis glaberrima 6–9 lin. longa. Fructus......? — Crescit in Brasiliae monte Corcovado. (v. s. sp.)

9. AE. LAXIFLORA Bth. Ann. of natur. hist. II. 449. et Hook. Journ. of bot. II. 54. — Frutescens, undique glaberrima: foliis brevissime petiolatis ovali-ellipticis obtuse acuminatis, basi angustatis; paniculis laxis terminalibus basi foliatis; calycis limbo ampliato breviter quadrifido; corollae infundibuliformis tubo calycem plus duplo superante. ♄ — Flores albi. — Prope accedit ad *Ae. elatam*, sed diversa esse dicitur. — Crescit in Guiana Britannica.

10. AE. OLEIFERA Casaretto, Novar. stirp. Brasil. decad. 47. — Ramis teretibus ad nodos complanatis; foliis oppositis late ovatis, utrinque acuminatis glabriusculis; cymis axillaribus longiuscule pedunculatis, fructiferis laxe capitatis; fructibus ovoideis calyce aucto cupulari margineque eroso-truncato semiinclusis lutescentibus unilocularibus monospermis. ♄ — Folia 3–5½ poll. longa, 1½–2½ poll. lata, nervis supra valde impressis, subtus prominentibus. Cotyledones quammaxime oleosae. Flores non visae. — Crescit in Brasilia in monte Mocco de Babylonia prope Rio de Janeiro.

11. AE. MACROPHYLLA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 251. † — Ramis glabris, junioribus subpubescentibus; foliis ovatis acutis, basi rotundatis integerrimis subcoriaceis glaberrimis; corymbis trifido-dichotomis folio duplo brevioribus; calycibus pubescentibus. ♄ — Arbor triorgyalis et altior, rami tetragoni. Folia acuta breviterve acuminata subcoriacea reticulato-venosa 5–6-pollicaria, breviter petiolata. Petiolus canaliculatus glaber 4–6 lin. longus. Pedunculi sesquipollicares axillares terminalesque solitarii, trifido-trichotomi corymbosi. Calyx pubescens quadridentatus, dentibus ovatis acutis. Corolla subhypocraterimorpha alba quadrifida, laciniis oblongis acutis. Stamina 4 exserta. Stylus vix exsertus. Fructus baccatus subglobosus calyce et corolla persistente tectus, tetraspermus. — *Ae. latifolia* Willd. Herb. 2831. — *Ae. laevigata* Juss. Ann. du mus. d'hist. nat. VII. 76? — Crescit rarissime in regione temperata prope Cumanacoam.

12. AE. GRANDIFOLIA Dsf. Catal. pl. hort. Paris. (edit. 3.) — Arborea: foliis oppositis ellipticis obtusis glabris integerrimis petiolatis perennantibus. ♄ — Folia 6–8-uncialia, 3–4 uncias lata, nervi transversales obliqui paralleli distantes. Petiolus uncialis, superne depressus. Rami juniores teretes. — Crescit......?

** *Foliis pubescentibus vel tomentosis.*

13. AE. TOMENTOSA Cham. Linnaea VII. 110. † — Subsericeo-incano-tomentosa: ramis obtuse tetragonis; foliis pseudo-oppositis alternisque subsessilibus ellipticis breviter acuminatis, utrinque acutis, supra calvescentibus, cymis axillaribus densifloris breviter pedunculatis folio quater brevioribus, dentibus calycinis late ellipticis acuminatis acutis. ♄ — Folia supra demum calvescentia pilosula, tandem glabra, tomento infra tunc rarescente, 3-4-pollicaria, 18–28 lin. lata, internodiis subpollicaribus. Formae masculae calyx obconicus tomentosus, intus glaber, 3 lin. longus. Corolla infundibuliformis glaberrima, laciniae limbi lanceolatae, filamenta laciniis duplo fere longiora. Stylus calyce parum longior, apice bifidus, germine utplurimum? abortivo. Formae foemineae calyx paullo brevior, corolla eadem, stamina brevissima sterilia, stylus corolla longior bifidus, lobis laciniarum corollae fere longitudine. Germen quadriloculare. Fructus......? — Crescit in Brasilia.

14. AE. SELLOWIANA Cham. l. c. 111. † — Ramis tetragonis, angulis acutis linea prominente obsolete subalatis; foliis oppositis obovatis in petiolum acuminato-attenuatis, apice breviter acuminatis, subtus lanuginoso-pubescentibus, supra glabrescentibus; cymis axillaribus breviter pedunculatis densifloris petiolum brevem superantibus; calycibus cano-tomentosis, dentibus brevibus latis obtusangulis acutis; antheris minutis subrotundis. ♄ — Rami hornotini pubescentes, annotini calvescentes, internodiis subpollicaribus, ad nodos complanati, acutanguli. Folia juniora lanuginoso-canescentia, adulta supra glabrescentia, 3-4-pollicaria, 1½–2 poll. lata, petiolo 3–5 lin. longo, in speciminibus fructiferis sunt folia 6–7-pollicaria, 2½ poll. lata. Formae masculae calyx obconicus intus glaber 2 lin. longus. Corolla infundibuliformis glaberrima, laciniae oblongae, stamina laciniis limbi duplo longiora. Stylus corolla brevior bifidus; forma foeminea differt stylo lacinias limbi duplo superante, staminibus brevissimis inclusis, antheris effoetis. Bacca ellipsoidea obtusa glandis instar calyci cupuliformi insidens laevis nitida lutea, abortu saepe unilocularis monosperma, rarius bilocularis disperma. — In Brasilia meridionali crescit.

15. AE. LOTSKYANA Cham. l. c. 112. † — Ramis obsolete tetragonis teretibusve; foliis oppositis subsessilibus obovatis ellipticisque, utrinque acutis, supra glabrescentibus, subtus tomentosis; cymis axillaribus densifloris breviter pedunculatis, dentibus calycinis latis obtusis. ♄ — Rami hornotini ad nodos compressi tomentosi, annotini grisei-glabri. Folia 2½–3 poll. longa, 14–18 lin. lata, supra glabrescentia subscabrida, subtus leviter ferrugineo-tomentosa reticulato-venosa. Pedunculus et inflorescentiae rami laxius tomentosi, bracteolae filiformes breves. Calyces sub fructificatione aucti obsolete striati, margine scariosi, dentibus 4 nunc obsoletis nunc latis. Bacca immatura alata obtusa laevis nitida lutea, abortu saepius unilocularis monosperma. — Crescit in Brasilia meridionali. (v. s. sp.)

16. AE. (MANABEA Aublet, Hist. des pl. de la Guian. I. 62. t. 23.) VILLOSA Vahl, Ecloge pl. Americ. I. 16. † — Ramis tetragonis; pedunculis, calycibus foliisque subtus incano-tomentosis elliptico-lanceolatis, utrinque obtusis integerrimis; corymbis axillaribus terminalibusque pedunculatis. ♄ — Ramuli villosi sordide cinerei. Folia 3-4-pollicaria subtus mollia venosa. Corymbi terminales terni, axillares oppositi bis vel ter dichotomi fastigiati. Corolla glabra. Stylus corolla longior. — Crescit in Guiana.

17. AE. LANUGINOSA Gardn. in Hook. Lond. journ. of bot. 1845. p. 134. — Ramis, petiolis, pedunculis, calycibus foliisque subtus fulvo-tomentoso-lanuginosis breviter petiolatis oblongo-lanceolatis acuminatis, basi acutis, margine integerrimis

revolutis, supra glaberrimis nitidis; pedunculis axillaribus folio brevioribus cymoso-multifloris; calycibus subbilabiatim quadridentatis; corolla glabra. ♄ — Frutex 6-pedalis. Petioli 9 lin longi. Folia 5-6-pollicaria, 1½ poll. lata. Corollae laciniae oblongae acutae tubo aequales. Filamenta laciniis paullo breviora. — Crescit in Brasilia in montibus dos Orgaos.

18. AE. HIRTA Casaretto, Novar. stirp. Brasil. decad. 47. — Villosa: villis aureo-virescentibus hirtis; caule obtuse tetragono; foliis oppositis suboppositisve obverse lanceolatis in petiolum attenuatis; cymis corymbosis axillaribus pedunculatis; pedicellis filiformibus, basi bractea lineari-filiformi instructis; dentibus calycinis apice lineari-setaceis. ♄ — Folia 2-3¼ poll. longa, 7-14 lin. lata. Flores albo-luteoli. Fructus desideratur. — Crescit in Brasilia in monte Corcovado prope Rio de Janeiro.

19. AE. BRACHIATA Cham. et Schlchtd. Linnaea VI. 371. — Ramis brachiatis obsolete tetragonis; foliis ovatis, basi subcuneata obtusiusculis, antice subattenuatis, apice in acumen breve angustumque contractis, supra laevibus, nervo venisque puberulis, subtus molliter pubescentibus reticulato-venosis; paniculis terminalibus axillaribusque amplissimis e cymis trichotomis oppositis decussatis, foliis suffultis compositis. ♄ — Folia supra plana, semipedalia et longiora 3-3½ poll. lata, petiolo 4 lin. longo. Calyx obtuse quadrilobus, lobis submucronulatis. Corolla alba calyce demum multo longior, 5 lin. longa glabra, tubo gracili sensim ampliato in limbum 4-partitum, laciniis ellipticis obtusis. Stamina (formae masculae) longe exserta. Stylus corollae tubum subaequans. Fructus......? — Pube molli densa canescente e pilis simplicibus constante calyces ramos foliaque subtus vestiente ab *Ae. macrophylla* H. B. Kth. diversa foliisque basi angulo obtuso cuneatis nec omnino rotundatis. — *Ae. Deppeana* Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) I. 29. — Crescit in Mexico prope Estero. (v. s. sp.)

20. AE. (MANABEA Aublet, Hist. des pl. de la Guian. I. 64. t. 24.) ARBORESCENS Vahl, Eclog. I. 15. t. 10. — Ramis foliisque subtus incano-pubescentibus, supra hirtis ovato-oblongis acuminatis, basi angustatis integerrimis; corymbis dichotomis folio duplo brevioribus; calycibus cano-pubescentibus. ♄ — Rami tetragoni. Folia membranacea reticulato-venosa, supra hirta, subtus albida sericeo-pubescentia 3-4-pollicaria. Petiolus semipollicaris canaliculatus albidus pubescens. Pedunculi subpollicares cum ramulis albo-sericei dichotomi. Calycis clavato-infundibuliformis quadrifidi laciniae ovatae acutae patulae. Corollae infundibuliformis albae tubus longitudine calycis, laciniae limbi ovatae acutae patentes. Stamina exserta. Fructus......? — *Callicarpa integrifolia* Jcq. Americ. 15. t. 173. fig. 7?? — Crescit in ripa fluminis Tuamini juxta Javitam, prope ad confluentem Temem (Missiones del Orinoco).

21. AE. FOETIDA Swrtz. Prodr. fl. Ind. occid. 32. et Fl. Ind. occid. I. 258. — Ramis teretibus foliisque pubescentibus brevissime petiolatis lanceolato-ovatis obtusis integris, petiolis nervoque medio subtus hirsutis; pedunculis axillaribus brevibus medio bibracteatis pubescentibus trifloris. ♄ — Fruticulus 1-2-pedalis. Rami juniores hirsuti. Folia nervosa subrugosa. Bracteae parvae setaceae villosae. Flores pedunculis longiores flavescentes. Calyx campanulatus subtruncatus. Corolla cylindracea apice ampliata, limbo 4-partito. Stamina subinclusa. Stylus longitudine tubi corollini, stigmata incrassata. Bacca majuscula rubra rotunda, calyce suffulta, tetrasperma. — Folia tactu foetida. — Crescit in lapidosis Jamaicae borealis.

22. AE. MUTISII H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pl. II. t. 131. — Ramis foliisque subtus albidis lanato-tomentosis, supra hirtis ellipticis acuminatis, basi rotundatis integerrimis; paniculis terminalibus foliatis; calycibus villosis; staminibus longe exsertis. ♄ — Rami subtetragoni. Folia membranacea 3-4-pollicaria, petioli 2-3 lin. longi crassi lanato-hirti. Paniculae rami albido-hirti, inferiores tri-, superiores dichotomi. Calyx subquadridentatus. Corollae hypocraterimorphae extus pilosae tubus calyce duplo longior, laciniae limbi quadripartiti ovato-oblongae

acutiusculae. Stylus bifidus exsertus. Drupa......? — Praecedenti valde affinis. — In calidis regni Novo-Granatensis crescit.

23. AE. SALUTARIS H. B. Kth. l. c. 249. — Ramis molliter hirto-tomentosis; foliis ovato-ellipticis, utrinque acutis integerrimis, supra hirtis, subtus molliter canescenti-pubescentibus; calycibus pubescentibus; staminibus longe exsertis. ♄ — Rami juniores subteretes fuscescenti-hirti. Folia brevissime acuminata, basi angustata, membranacea, 3-4-pollicaria. Petioli 2-3 lin. longi canaliculati pubescentes. Paniculae terminalis sessilis bracteatae 2-3-pollicaris rami dichotomi pubescentes. Calyx campanulatus brevissime acuteque quadridentatus. Corollae infundibuliformis glabrae flavae tubus calyce triplo longior, laciniae limbi 4 ovatae acutiusculae. Stamina longissime exserta. — Tota planta odorem nauseosum fundit. — Decoctum foliorum ab incolis ad serpentium venenatarum morsum medendum adhibetur. — *Contracoulevra* ab incolis appellatur. — Crescit in ripa fl. Orinoci in confinibus Guianae et Brasiliae.

24. AE. VITELLINIFLORA Kltzsch. mss. — Ramis subteretibus demum glabrescentibus; foliis breviter petiolatis oblongis vel oblongo-lanceolatis breviter acuminatis basique vix attenuatis, supra in nervo medio setulosis, infra in nervo venisque et petiolis setoso-hirtis; pedunculis in paniculam terminalem digestis, apice subcapitato-corymbosis calycibusque quadridentatis subferrugineo-hirsutissimis. ♄ — Rami adulti teretes glaberrimi grisei, hornotini et inflorescentiae rami quadrangulares adpresse setoso-hirsuti. Folia adjecto petiolo 3 lin. longo 2½-4-pollicaria, 10-18 lin. lata, ad ramificationem inflorescentiae primam duplo minora lanceolata, omnia integerrima, basi nunc attenuata, nunc ovata. Pedunculi ½-1-pollicares in paniculam simplicissimam digesti oppositi, apice subcapitato-corymbosi pauciflori. Calyx campanulatus hirsutissimus quadridentatus, dentibus ovatis acutis. Corolla glaberrima infundibuliformis brevis, calyce duplo longior vitellina quadrifida, laciniis ovalibus obtusis. Formae masculae stamina 4 corollae tubo prope basin inserta exserta eaque duplo longiora. Stylus brevissimus bifidus. Forma foeminea et fructus a me non visi sunt. — *Distigma vitelliniflorum* Kltzsch. mss. — Crescit......? (v. s. c.)

25. AE. MOLLIS H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 250. t. 130. — Ramis foliisque hirto-lanatis, obovato-oblongis acuminatis, basi angustatis, apicem versus subdentatis; corymbis axillaribus terminalibusque paniculatis; calycibus villosis; staminibus vix exsertis. ♄ — Rami subtetragoni fuscescentes. Folia apicem versus grosse remoteque dentata, utrinque flavescenti-lanata reticulato-venosa quadripollicaria. Petiolus 2-3 lin. longus canaliculatus lanatus. Corymbi trifido-dichotomi axillares folio breviores, terminales paniculato-congesti hirto-lanati patuli. Pedunculi semipollicares et longiores; calyx campanulatus quadridentatus villosus acute dentatus. Corolla hypocraterimorpha extus pilosa, tubo calycem duplo excedente, laciniae limbi oblongae acutae. Stamina 4 medio tubo inserta, corollam aequantia. Stylus longissimus. Drupa baccata oblonga 2-4-sperma. — Crescit in sylvis Orinocensibus.

26. AE. CESTRIFOLIA Gardener in Hook. Lond. journ. of bot. V. 184. — Ramis tetragonis; foliis breviter petiolatis oppositis oblongo-lanceolatis utrinque acutis adpresse villosis; cymis axillaribus pedunculatis multifloris; calycibus adpresse villosis quadridentatis, dentibus brevibus latis acuminatis. ♄ — Frutex 10-pedalis, rami rufo-villosi. Folia 4-6-pollicaria, 1½-2 poll. lata. Petioli 4 lin. longi. Pedunculi ramique cymarum rufo-villosi. Flores tetrameri. Corolla infundibuliformis longe tubulosa, laciniis oblongis obtusis, filamenta infra laciniis inserta iisque duplo longiora. Antherae oblongae. Stylus apice bifidus corolla brevior. Fructus......? — Crescit in Brasiliae monte Corcovado prope Rio de Janeiro.

† *Species dubiae.*

27. AE. LAEVIGATA Juss. Ann. du mus. d'hist. nat. VII. 76. — „Frutex ramis subverrucosis, folia breviter petiolata ovato-lanceolata integerrima glabra, apice obtusa, flores axillares opposite paniculati, panicula multiflora, corollis brevibus.

Fructus ignotus. Habitus *Aegiphilae*, unde huc revocata." — Crescit in India (orientali??).

28. AE. VIBURNIFOLIA Juss. l. c. — „Frutex; folia (*Viburni*) petiolata subcoriacea ovata integra; flores ignoti; fructus opposite corymbosi axillares et terminales, bacca sicca parva acuminata, basi attenuata, foeta nuce biloculari disperma, seminibus aliis forsan abortivis. — Habitus *Aegiphilae*, unde huc revocata, an affinior *Petitiae?*" — Crescit in insulis Philippinis.

†† *Species indescriptae recognoscendae.*

AE. BRACHIATA Arrabida, Flor. Flumin. I. t. 93. (nec Cham. et Schlchtd.)
AE. DIFFUSA Andr.
AE. INFLEXA Arrabida l. c. t. 96.
AE. MEDITERRANEA Arrabida l. c. t. 94.
AE. OBDUCTA Arrabida l. c. t. 97.
AE. RACEMOSA Arrabida l. c. t. 88. = AE. ELATA Swrtz.?
AE. SERRATA Arrabida l. c. t. 92.
AE. STIPULATA Arrabida l. c. t. 90. non est hujus ordinis.
AE. UMBELLATA Arrabida l. c. 89.
AE. VERTICILLATA Arrabida l. c. t. 91. = AE. MULTIFLORA Rz. et Pav.?

††† *E genere expellenda.*

AE. NUXIA Willd. = NUXIA VERTICILLATA.

XLVII. (3711.) AMASONIA *Linn. fil.*

(Linn. fil. Supplem. 294. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 200.)

1. A. ERECTA Linn. fil. l. c. — Vahl, Eclog. plant. II. 51. — Foliis lanceolato-ovatis subserratis scabris; bracteis sessilibus flore longioribus. ♃ — Caulis herbaceus tripedalis simplicissimus teres. Folia alterna petiolata remota elliptico-lanceolata subserrata scabra. Racemus terminalis simplex pedalis, pedicellis subtrifloris. Bracteae ovatae floribus paullo longiores sessiles. Flores secundi nutantes lutei. — Herba bi-tripedalis perennis, rami hornotini simplices, folia alterna petiolata ovata acuta dentata subvillosa, infima lata majora, floralia parva ex rubro et luteo eleganter variegata. Flores in spicam axillarem dispositi, pedicellis unifloris vel 3-5-floris. Corolla lutea. Drupa nigra glabra sphaerica. — *Taligalea campestris* Aubl. Fl. Guian. II. 625. † t. 252. — Crescit in Cayenne, in Guiana tum Britannica tum Gallica et in terra Surinamensi. (v. s. sp.)

2. A. PUNICEA Vahl l. c. — Fruticosa: foliis ovato-lanceolatis serratis laevibus; bracteis sessilibus flore longioribus. ♄ — G. Bentham (Ann. of nat. hist. II. 450.) hanc cum specie praecedente consociandam esse censet. — Crescit in insula Trinitatis.

3. A. ARBOREA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 253. † — Arborea: foliis lanceolato-oblongis dentatis glabris; bracteis petiolatis flore brevioribus. ♄ — Rami subangulati puberuli. Folia in apice ramulorum congesta alterna breviter petiolata lanceolato-oblonga acuta, basi in petiolum angustata, margine remote dentata reticulato-venosa, nervo medio subtus valde prominente, membranacea glabra, subtus violacea subpedalia, 3½ poll. lata. Petioli subteretes vix supra canaliculati semipollicares glabriusculi. Spicae compositae terminales pedunculatae 6-8-pollicares, ramis sparsis 2-3-floris, basi bractea suffultis, pedicello pubescente, medio bracteolis 2 subulatis instructo. Bracteae petiolatae ovato-oblongae acutae subintegerrimae reticulato-venosae integerrimae membranaceae glabriusculae purpureae, flore breviores. Calyx campanulatus subpentagonus quinquefidus puberulus, laciniis ovatis acuminatis subaequalibus purpurascentibus. Corolla calyce multo longior 14-15 lineas longa tubulosa, superne paullo ventricosa pallide lutea, extus puberula, limbo patente quinquelobo subaequali, laciniis ovatis. Stamina 4 didynama basi corollae inserta eaque longiora, fila-

menta pubescentia, antheris subsagittatis. Drupa......? — Crescit locis sylvaticis juxta Javitam Orinocensium in ripa fluminis Tuamini (Missiones del Orinoco).

4. A. INTEGERRIMA Spr. Syst. vegetab. II. 765. no. 2. — Caule arborescente, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis glabris; bracteis sessilibus minimis. ♄ — Crescit ad flumen Magdalenae.

5. A. HIRTA Bth. Ann. of natur. histor. II. 451. — Perennis vel suffruticosa erecta: foliis obovato-oblongis basi longe attenuatis cauleque hirsutissimis; bracteis oblongis attenuatis villosis; calycibus amplis coloratis corollisque longe pilosis. ♃ — Tota planta pilis flavicantibus obsita est. Calyces coccinei. Corollae tubus ultra pollicaris, laciniis limbi acutiusculis. — Crescit in Guiana Britannica.

XLVIII. (3714.) **CORNUTIA** *Plum.*

(Plum. Gener. 32. icon. 106. fig. 1. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 200.)

1. C. PYRAMIDATA Willd. Spec. plant. III. 322. — Lam. Illustr. gener. t. 541. — Rami acute tetraquetri, folia elliptico-ovata integerrima, panicula terminalis nuda elongata. ♄ — *Cornutia* Linn. Hort. Cliffort. 319. — *Cornutia flore pyramidato, foliis incanis* Plum. l. l. c. c. — *Agnathus Viburni folio* Vaill. Act. acad. Paris. 1722. p. 273. — *Hosta pyramidata* A. Dietr. in Lnk. Schwgrch. et Dietr. Spec. pl. I. 253. — Crescit in Campechia.

† *E genere expellendae.*

C. CORYMBOSA Burm. = PREMNA INTEGRIFOLIA.
C. CORYMBOSA Lam. = PREMNA TOMENTOSA.
C. LONGIFOLIA Spr. = HOSTA LONGIFOLIA.
C. ODORATA Poepp. = HOSTA ODORATA.
C. PYRAMIDATA Spr. = HOSTA LATIFOLIA.

XLIX. (3712.) **CALLICARPA** *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 135. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 200.)

§. 1. *Integrifoliae.*

1. C. ARBOREA Rxb. Flor. Ind. orient. I. 390. — Arborea: foliis longe petiolatis oblongis ventricosis, utrinque valde acuminatis integris, infra pilosis; paniculis axillaribus solitariis vel geminis dichotomis, pedunculis petiolum aequantibus. ♄ — Ramuli obsolete tetragoni pulverulenti. Folia supra glabra, infra albo-tomentella, juniora utrinque pulverulenta, cum petiolo folii quartam partem attingente, semipedalia vel pedalia. Panicula 6-8-ies dichotoma, ramis pulverulentis quadrangularibus. Flores parvi livide purpurascentes vel lilacini, graveolentes. Bracteae minutae. Calyx obsolete quadridentatus pulverulentus. Corollae tubus calyce multo longior. Filamenta corolla duplo longiora. Bacca rotunda purpurea livida, magnitudine grani *Piperis* unilocularis tetrasperma. — Crescit in India orientali ad Chittagong. (v. s. sp.)

2. C. WALLICHIANA Wlprs. mss. — Ramis, petiolis et pedunculis pedicellisque densissime ferrugineo-tomentosis; foliis a basi ovata subcordatis, ovalibus oblongisque, longiuscule acuminatis integerrimis vel minutissime serrulatis, supra glaberrimis, infra mollissime albo-tomentosis reticulato-venosis, nervis venisque subferrugineis; cymis axillaribus dichotomis breviter pedunculatis, petiolo saepius brevioribus, vix eum superantibus. ♄ — Petioli 1-2½-pollicares. Folia 5-10-pollicaria, 4-6 pollices lata subcordato-ovata acuminata (adest etiam folium singulum basi longe cuneata ovato-ellipticum acuminatum 5-pollicare, 2¾ poll. latum) supra glaberrima, in nervo medio ferrugineo-tomentella, infra reticulato-venosa mollissime albo-tomentosa. Pedunculi ½-1-pollicares dichotome ramosissimi, cymosi, calyces parvuli tomentosi minutissime 4-denticulati. — *C. lanata* Wall. Catal. 1831. (nec Vahl). — Crescit in India orientali. (v. s. sp.)

3. C. REEVESII Wall. Catal. 1830! — Ramulis junioribus foliisque subtus densissime fulvo-tomentosis elliptico-lanceolatis acuminatis, basi ovatis, breviter petiolatis integerrimis obsolete subdentatis; corymbis axillaribus longe pedunculatis

dichotomis folio brevioribus calycibusque tomentellis. ♄ — Rami obsolete tetragoni cum petiolis foliisque subtus tomento albescenti-fulvo obducti, petioli 3–5 lin. longi, folia 4-pollicaria, 1½ poll. lata vel majora acuminata, supra demum glabra, in nervo medio tomentella, juniora supra pulverulento-tomentella, infra molliter densissimeque tomentosa, subpenninervia reticulato-venosa integerrima, vel obsolete irregulariter acuteque dentata. Corymbi axillares 2½ poll. longi pedunculati, pedunculo 15 lin. longo, dichotomi tomentelli. Drupa globosa purpurea baccata parvula, calyce subrotato truncato suffulta tetrapyrena. — Crescit in China ad Kanton et in India orientali. (v. s. sp.)

4. C. VILLOSA Vahl, Symbol. bot. III. 14. — Ramis obsolete tetragonis, pedunculis, petiolis (?) foliisque subtus villoso-incanis oblongo-ovatis acuminatis integerrimis, subtus venoso-reticulatis; pedunculis axillaribus folia aequantibus, apice cymoso-multifloris. ♄ — Folia 3–4-pollicaria, uncias duas vel ultra lata, supra glabra. Flores brevissime pedicellati. Bractea linearis ad basin pedicellorum. Calyx parvus quadridentatus, uti corolla extus villosus. — In India orientali.

5. C. (AEGIPHILA??) INTEGRIFOLIA Jcq. Hist. stirp. Americ. 15. t. 173. fig. 7. — Ramis teretibus (?) foliisque petiolatis ovalibus acutis integerrimis, subtus incano-tomentellis; racemis compositis axillaribus terminalibusque (paniculatis) incanis multifloris. ♄ — Arbuscula 12-pedalis. Folia subaromatica 2–3-pollicaria. Flores odorati numerosi albi. Calyx obtuse quadridentatus. Corolla longe tubulosa, limbi laciniae ovales obtusae. Stamina longe exserta. Stylus filiformis bifidus inclusus. Bacca obovata flava nitida, apicem versus virescens, tetrasperma, ossiculis oblongis. — Verosimiliter est *Aegiphilae* species forteque eadem ac *Ae. arborescens.* — Crescit in Carthagenae sylvaticis.

§. 2. *Serratifoliae.*

* *Folia petiolata.*

6. C. SUBINTEGERRIMA H. B. Kth. Nov. gen. et sp. pl. II. 252. † — Ramis foliisque subtus floccoso-tomentosis albidis ellipticis acuminatis apicem versus subdentatis, basi acutis; corymbis axillaribus dichotome ramosissimis petiolos superantibus. ♄ — Rami teretes. Folia decussato-opposita, infra reticulato-venosa 7–9-pollicaria, juniora utrinque incano-tomentosa. Petioli semipollicares tomentosi. Pedunculi pollicares et longiores, rami ramulique tomentosi. Flores albi. Drupa nigra. — *C. acuminatae* et *macrophyllae* affinis, differt jam corymbis petiolo multo longioribus, foliis subintegerrimis nec crenatis et corymbis brevioribus minus divaricatis. — *C. mollis* Willd. Herb. no. 2856! — Crescit in regno Novo-Granatensi. (v. s. sp.)

7. C. ACUMINATA H. B. Kth. l. c. 252. † — Ramis foliisque subtus albo-tomentosis ovali-ellipticis longe acuminatis denticulatis, basi acutis; corymbis dichotomo-ramosissimis petiolo multo longioribus. ♄ — Rami tetragoni ad nodos compressi stellato-pilosi. Folia petiolata decussata reticulato-venosa, supra glabra, 6–7-pollicaria. Petioli semipollicares canaliculati tomentosi. Corymbi axillares oppositi pedunculati folio paullo breviores, pedunculi (bipollicares) et ramuli albido-tomentosi. Flores suaveolentes pedicellati. Calyx campanulatus minimus subquadridentatus pilosulus. Corolla rotato-campanulata quadrifida. Stamina 4 exserta. Drupa calyce suffulta baccata rubra sphaerica tetrapyrena, ossiculis monospermis. — Sequenti proxima. — Prope Honda in regno Novo-Granatensi.

8. C. AMERICANA Linn. Mantiss. II. 198. — Ramis foliisque subtus albescenti-tomentellis, ovatis, utrinque acuminatis serratis vel serrato-crenatis; corymbis axillaribus dichotomis petiolum subaequantibus. ♄ — Rami teretiusculi tomento stellato flavescenti-viridi cum foliis infra nervoque medio supra et inflorescentiae ramulis tecti. Folia 5–6-pollicaria, 2-2½ poll. lata vel majora, utrinque longe acuminata indeque saepe subrhombea serrata vel serrato-crenata, basi integerrima in petiolum ½-1-pollicarem tomentosum attenuata. Corymbi axillares oppositi brevissime pedunculati, petiolo saepe breviores vix unquam longiores

dichotomo-ramosissimi. Bracteolae subulatae parvae. Calyx campanulatus parvus obsolete quadridentatus. Corolla infundibuliformi-subcampanulata quadrifida. Stamina 4 exserta corolla duplo longiora. Drupa sphaerica calyce subtruncato demum glabro cincta baccata rubra tetrapyrena. — Vidi specimen cultum foliis basi ovatis elliptico-lanceolatis, apice longe acuminatis, irregulariter dentatis brevissime petiolatis, corymbis axillaribus pedunculatis dichotomis, pedunculis petiolo triplo longioribus. Caeteris notis convenit omnino cum speciei typo. — *Sphondylococcus* Mitch. Ephem. nat. cur. VIII. 218. — *Burchardia* Duham. Arbor. I. 111. t. 44. — *Johnsonia Americana* Mill. Dict. no. 1. — *Anonymos baccifera etc.* Pluk. Alm. 33. t. 136. fig. 3. — *Frutex baccifer verticillatus etc.* Catesb. Carolin. II. 47. t. 47. — Crescit in Carolina et in Virginia. (v. s. sp. et cult.)

9. C. CANA Linn. l. c. — Vahl, Symbol. bot. III. 12. — Ramis foliisque subtus densissime cinereo-tomentosis; foliis ovatis, elliptico-ovatis subrotundatisque breviter acuminatis, basi in petiolum brevissimum attenuatis, supra in nervo medio tomentosis irregulariter denticulatis; corymbis axillaribus dichotomis petiolum aequantibus dense cinerascenti-tomentosis. ♄ — Rami teretiusculi, cinerascenti-tomentosi, juniores subferruginei. Folia supra in nervo medio basique tomentella, mox glabra nitida, infra reticulato-venosa mollissime cinereo-tomentosa, maxima 5-6-pollicaria, 2-2½ poll. lata, basi longe attenuata et acumine brevi integerrima. Corymbi breves dichotomi, ramuli calycesque etiam fructiferi cinereo-lanati. Bracteolae subulatae breves. Calyx fructifer subtruncatus, drupa nigra sphaerica duplo brevior. — *C. tomentosa* Lam. Encycl. méth. I. 556. — *C. Americana* Lour. Flor. Coch. 88? — Bot. Magaz. t. 2167. — Crescit in Malabaria et Cochinchina. (v. s. c.)

10. C. LANATA Vahl l. c. 13. — Ramis foliisque subtus cinereo-tomentosis ovatis longe acuminatis, acute dentatis, basi obtusissimis apiceque integerrimis; cymis axillaribus dichotomis petiolo longioribus. ♄ — Rami teretes. Folia digitalia et palmaria, apice in acumen unciale integerrimum attenuata, basi obtusa integerrima, caeterum acute dentata, supra scabrella sparseque pilosa. Petioli 3 lin. longi. Cymae subsupraaxillares pedunculatae, pedunculo unciali, dichotomae cinereo-tomentosae. Bracteae subulatae. Calyx exiguus quadridentatus tomentosus. Corolla tubuloso-campanulata, laciniis 4 rotundatis. Stamina 4 corolla duplo songiora. Drupa......? — *C. (Tomex* Linn. Spec. plant. III. 172.) *tomentosa* Murr. Syst. veget. 153. — *Callicarpa dentata* Rth. Nov. plant. spec. 81. — *C. pedunculata* R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. (edit. N. ab E.) 369. — *Arbor Malabarica Illa dicta* Burm. Flor. Zeyl. 26. — Crescit in India orientali et in Nova Hollandia.

11. C. TOMENTOSA Willd. Enum. plant. hort. Berol. 158. — Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 205. — Ramis foliisque subtus dense fulvo-tomentosis ovatis acuminatis inaequaliter crenatis, basi rotundato-attenuatis integerrimis, supra sparse pilosis; corymbis trichotomis densifloris calycibusque villosis; pedunculis petiolum subaequantibus. ♄ — Folia 3-4-pollicaria. — Habitu foliorumque forma proxime accedit ad *C. Americanam*, a *C. lanata* toto coelo differre dicitur. — *C. Americana* Lour. Flor. Cochinch. I. 88? — Crescit in China ad Kanton et alibi.

12. C. MACROPHYLLA Vahl, Symbol. bot. III. 13. t. 53. — Ramis obsolete tetragonis; pedunculis, petiolis foliisque subtus tomentoso-incanis, breviter petiolatis ovato-lanceolatis vel lanceolato-ellipticis acuminatis, supra rugoso-venosis parceque villosis, basi integerrimis, caeterum crenatis; pedunculis axillaribus petiolum aequantibus dichotome ramosissimis paniculato-cymosis. ♄? — Internodia 2-3-pollicaria. Petioli pollicares vel parum breviores. Folia maxima 9-pollicaria, infra medium, ubi sunt latissima, 3 poll. lata. Paniculae bipollicares divaricato-ramosissimae. Bracteae ad ramificationes oppositae lineares. Calyx parvus incanus quadridentatus. Corollae laciniae oblongo-subcuneatae glabrae. — *C. tomentosa* Koenig mss. — Crescit in India orientali.

13. C. ROXBURGHII Wall. Catal. 1833. — Ramis teretibus, petiolis et inflorescentiae ramis densissime ferrugineo-lanatis; foliis brevissime petiolatis, e basi ovata el-

liptico-lanceolatis acuminatis, basi integris, caeterum serrulato-dentatis, supra glabriusculis nervoque medio ferrugineo-tomentello, infra densissime albo-tomentosis subpenninerviis; cymis axillaribus subglomeratis brevissimis dichotomis; calycibus albo-lanatis. ♄ — Petioli 3 lin. longi, folia 8-pollicaria, 2–2½ poll. lata vel majora, longe acuminata, basi attenuata, infra densissime stellato-tomentosa. Cymae brevissimae, dichotomae glomeratae. — *C. incana* Rxb. non *C. cana* Linn. — Crescit in India orientali. — An re vera a *C. macrophylla* diversa?? (v. s. sp.)

14. C. ALBIDA Blume, Bijdragen 818. — Ramulis obsolete tetragonis cinereo-farinosis; foliis lanceolatis exigue denticulatis, utrinque acuminatis, apice obtusiusculis basique integerrimis, subtus albidis et tenuissime tomentosis; cymis dichotomis axillaribus interdum supraaxillaribus petiolo subaequalibus. ♄ — Prope accedit ad *C. longifoliam*. — Crescit in Javae montanis.

15. C. LONGIFOLIA Lam. Encycl. méth. I. 556. et Illustr. gener. t. 69. fig. 2. — Bot. Regist. t. 864. — Hook. Exotic. flor. t. 133. — Ramis foliisque utrinque glaberrimis late lanceolatis, apicem versus serrulatis basi integerrimis; corymbis parvis axillaribus dichotome cymosis villosis divaricatis multifloris. ♄ — Rami obsolete tetragoni glaberrimi laeves articulati, geniculis margine villosis. Folia petiolata 4–6-pollicaria, sesquiunciam lata glaberrima venosa, infra integerrima, superne serrulata. Petiolus unguicularis. Paniculae axillares oppositae, supra decompositae solitariae dichotomae, rami divaricati subvillosi. Bractea lanceolata ad basin pedicellorum. Calyx truncatus integer glaber. — Crescit in peninsula Malaccensi.

16. C. ROXBURGHIANA Schult. Mantiss. ad Syst. veget. 54. — Ramulis tetragonis foliisque subtus pube stellari fusco-tomentosis longiuscule petiolatis late lanceolatis serrulatis, supra glabris, utrinque acuminatis, apicem versus serrulatis; corymbis axillaribus dichotomis petiolum aequantibus. ♄ — Fructus albi. — *C. longifolia* Rxb. Flor. Indic. I. 394. nec Lam. — Crescit in India orientali, in insula „Prince of Wales".

17. C. HEYNEI Rth. Nov. plant. spec. 82. — Ramis foliisque subtus albido-tomentosis ovatis inaequaliter dentatis, utrinque attenuatis integerrimis, supra reticulato-rugosis ad venas pubescentibus; cymis axillaribus pedunculatis petioli longitudine dichotomis conglomeratis. ♄ — Differt a *C. lanata* foliis utrinque attenuatis, supra rugosis, ad venas pubescentibus, infra densius tomentosis, cymis brevioribus densioribus vix petioli longitudine floribusque conglomeratis. — In India orientali crescit.

18. C. ACUMINATA Rxb. Flor. Indic. I. 394. — Ramis junioribus foliisque subtus stellato-pubescentibus late lanceolatis acuminatis remote repandis denticulatis; corymbis axillaribus longe pedunculatis dichotomis folio brevioribus. ♄ — Folia 4–5-pollicaria, fere 2 poll. lata. — *C. nudiflora* Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 206. t. 46? *) — Crescit in India orientali ad Silhet.

19. C. CUSPIDATA Rxb. l. c. — Ramis foliisque subtus lanatis breviter petiolatis ellipticis dentatis cuspidatis longe acuminatis; corymbis axillaribus dichotomis calycibusque pulverulento-lanatis. ♄ — Drupa minima glabra purpurea. — Reliqua ignota. — Crescit in Moluccis insulis.

20. C. BICOLOR Juss. Ann. du Mus. d'hist. nat. VII. 77. — Ramulis foliisque subtus molliter albido-tomentosis ovato-lanceolatis in petiolum attenuatis crenatis, su-

*) *C. NUDIFLORA Hook. et Arn. l. c. — Ramis, petiolis, foliis subtus corymbisque cano-velutinis; foliis oblongo-lanceolatis, basi ovatis, margine crenato-dentatis, supra nervis venisque incanis caeteraquin glabratis laevibus, junioribus pulverulentis; pedunculis folio subdimidio brevioribus; corymbis dichotomis laxis; calyce glabro; staminibus exsertis. ♄ — Petioli 6–8 lin. longi, folia 5–6-pollicaria, 2–2½ poll. lata, basi rotundata integerrima, fere apicem usque serrato-dentata. Pedunculi supraaxillares bipollicares dichotomi, laxe corymbosi, inflorescentia tota quadripollicaris, folio brevior. — Habitat ad Kanton Chinensium.*

pra glabris (nigro-virentibus); pedunculis axillaribus petiolum aequantibus dichotome cymosis multifloris. ♄ — Drupa minima tetrapyrena. Flores minimi. — Crescit in Praliniano Novae Britanniae portu.

21. C. PARVIFOLIA Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 305. — Ramis, pedunculis foliisque subtus dense stellatim cano-tomentosis obovatis obtusissimis coriaceis, breviter petiolatis, leviter serratis, supra glabris; pedunculis axillaribus petiolum aequantibus capitato-cymosis dichotomis. ♄ — Folia sesquipollicaria, juniora subtus subferruginea. — Crescit in Mexico.

22. C. ADENANTHERA R. Br. Prodr. flor. Nov. Holl. (edit. N. ab E.) I. 369. — Foliis ovatis, basi apiceque acutis minutissime dentatis, adultis supra glabriusculis laevibus, glandulis conspersis, subtus cinereo-tomentosis; pedunculis (dichotome corymbosis?) petiolo brevioribus. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

23. C. PURPUREA Juss. Ann. du Mus. d'hist. nat. VII. 69. — Wall. Catal. 1828. — Ramulis et corymbi ramulis ferrugineo-puberulis; foliis subsessilibus lanceolato-ovatis, acuminatis serratis, basi integerrima longe attenuatis, supra glaberrimis, infra glanduloso-punctatis; corymbis axillaribus dichotomis folio pluries brevioribus. ♄ — Ramulorum pubescentia subsquamulosa stellata ferruginea. Folia, adjecto petiolo brevissimo, 1½-2-pollicaria, 6-9 lin. lata, utrinque, sed basi longius attenuata, glaberrima, subtus punctis ferrugineis glandulaeformibus odoratis adspersa, infra nervo venisque prominulis. Corymbi axillares vel supraaxillares pulverulento-pubescentes. Flores odorati purpurei glanduloso-punctati minimi. Calyx turbinatus quadridenticulatus. Corolla infundibuliformis, laciniis limbi ovalibus obtusis. Drupa minima purpurea baccata 1-2-pyrena, 3-2 abortientibus. — *Porphyra dichotoma* Lour. Flor. Cochinch. I. 87. — Crescit in China. (v. s. sp.)

24. C. LANCEOLARIA Rxb. Flor. Indic. I. 395. — Ramis teretibus foliisque subtus pilosissimis lanceolatis serrulatis acuminatis; corymbis axillaribus breviter pedunculatis subglobosis; drupis albis. ♄ — Flores minimi purpurei. — Crescit in India orientali ad Silhet.

25. C. ATTENUATA Wall. Catal. 1835! — Ramis teretibus, inflorescentiae ramificationibus foliisque subtus ferrugineo-tomentellis oblongo-ellipticis lanceolatisque serrulatis acuminatis basique in petiolum longe attenuatis integerrimis; corymbis axillaribus dichotomis divaricato-paniculatis, folio multoties brevioribus. ♄ — Petioli ad summum semipollicares. Folia 3-5-pollicaria, 1-1½ poll. lata minoraque, membranacea, supra vix in nervo tomentella, infra in nervo venisque praecipue stellato-tomentella. Pedunculi axillares 2-3 lin. longi dichotomi, ramulis saepe subsemipollicaribus, paniculatis. Bracteolae subulatae acutae breves. Calyx campanulatus subtruncatus minutissime quadridenticulatus tomentellus. Corollae subinfundibuliformis laciniae ellipticae obtusae. Stamina 4 corolla duplo longiora. — A praecedente vix differre videtur. — Crescit in Java insula. (v. s. sp.)

26. C. SUBPUBESCENS Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 305. — Ramis foliisque adultis infra sparse stellato-pubescentibus petiolatis oblongo-lanceolatis, utrinque attenuatis serratis, supra glabris; pedunculis axillaribus petiolum aequantibus cymoso-dichotomis. ♄ — Folia subspithamaea, ad summum 2 poll. lata. — Crescit in Mexico.

27. C. JAPONICA Thnbrg. Flor. Japonic. 60. — Ramis teretibus glabris; foliis breviter petiolatis oblongis acuminatis serratis, utrinque integerrimis, supra viridibus, subtus pallidioribus; pedunculis axillaribus paniculato-trichotomis folio triplo brevioribus. ♄ — Rami purpurei divaricati. Folia bipollicaria. Pedunculi supraaxillares semipollicares, pedicelli brevissimi. Panicula supradecomposita subfastigiata. Calyx quadridentatus. Corolla alba quadrifida. Stamina 4 brevissima. Stylus corolla brevior, stigma simplex. Fructus......? — Cum *C. longifolia* Lam. consociavit Sprengelius, sed ut videtur immerito. — Crescit in Japonia.

** *Folia sessilia.*

28. C. SESSILIFOLIA Wall. Catal. 1837. — Ramis obsolete tetragonis foliisque sessilibus, infra cinerascenti-tomentosis ternis verticillatis, e basi subcordata lineari-lanceolatis acuminatis, basi integris, supra serrulato-denticulatis; pedunculis axillaribus dichotome cymosis multifloris, folio multoties brevioribus tomentosis. ♄ — Folia 4–5-pollicaria, 10 lin. lata, basi vix attenuata, exacte sessilia vel subsessilia acuminata, supra glabriuscula, infra mollissime cinereo-tomentosa subpenninervia. Pedunculi semipollicares verticillato-terni divaricato-dichotomi cymosi, subferrugineo-tomentosi. Drupa minima nitida globosa quadrisulcata, vix grani *Cannabini* magnitudine. — Crescit in India orientali (Pundua). (v. s. sp.)

29. C. RUBELLA Lindl. Bot. Regist. XI. t. 883. — Suffruticosa: foliis sessilibus basi cordatis, obovatis acuminatis ultra medium dentatis, utrinque tomentosis; cymis pedunculatis axillaribus villosis bipartitis, folio duplo (?) brevioribus. ♃ — Suffrutex erectus undique pilosus, in olla bipedalis. Rami teretes densi tomentosi. Folia decussata plana luteo-viridia, versus basin paullulum constricta indeque subpanduriformia, ultra medium aequaliter dentata, subtus magis tomentosa, 4–5-uncialia, 2–2½ uncias lata. Cymae tomentosae dichotomae multiflorae, pedunculo semiunciali insidentes. Bracteae subulatae. Calyx parvus dense tomentosus obtusissime quadridentatus. Corolla rosea brevis infundibuliformis calyce longior, quadrifida, laciniis erectis obtusis. Stamina 4 breviter exserta. Antherae majusculae oblongae, basi emarginatae. Stylus staminibus parum longior, stigma subclavato-capitatum. — Crescit in China.

† *Species dubiae, forte non hujus generis.*

30. C. UMBELLATA Loureiro, Flor. Coch. I. 88. — „Arbor mediocris, ramis ascendentibus. Folia turbinato-ovata integerrima glabra alterna margine reflexa. Flos albo-viridis parvus, umbellis sessilibus quinquefloris subterminalibus. Calyx obtuse quadrifidus. Corolla campanulata, tubo brevi. Stamina et stigma sessilia. Bacca carnosa subrotunda parva tetrasperma". ♄ — Crescit in sylvis Cochinchinae.

31. C. TRILOBA Loureiro l. c. 89. — „Frutex scandens longe ramosus, cirrhis bifidis. Folia cordato-triloba serrata glabra, petiolis longis. Flos pallidus axillaris, pedunculis dichotomis. Calyx quadridentatus. Bacca subrotunda tetrasperma. Corolla quadrifida. Stamina quatuor." ♄◡ — Crescit in China et in Cochinchina.

32. C. GLOBIFLORA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 49. t. 57. fig. b. — Ramis tetragonis incanis; foliis oblongo-lanceolatis, utrinque attenuatis, basi integerrimis, sursum serrato-dentatis integerrimisque; pedunculis axillaribus folio triplo brevioribus dichotomis corymbosis cymoso-multifloris. ♄ — Frutex triorgyalis glaber. Rami ad articulationes compressi. Folia in petiolum brevissimum longe attenuata apiceque longiuscule acuminata 4–5-pollicaria, sesquipollicem lata, suprema duplo minora. Cymae subglobosae cinereae. Pedicelli bracteolis subulatis suffulti. Calyx subcampanulatus quadrifidus cinerascens. Corolla infundibuliformis alba, tubus calycis longitudine, laciniae 4 ovales acutae. Stamina 4 corolla longiora. Bacca globosa rubicunda unilocularis 4-sperma Pisi magnitudine, semina trigona. — Crescit in Peruviae nemoribus ad Chinchao. — Species forte ad *Aegiphilam* referenda.

33. C. CORDIFOLIA Rz. et Pav. l. c. 50. t. 57. fig. a. — Ramis obsolete tetragonis dense pubescentibus; foliis brevissime petiolatis cordatis longe acuminatis integerrimis, utrinque hirsutis, superioribus ovato-acuminatis, omnibus integerrimis; pedunculis axillaribus folio dimidio brevioribus brachiato-cymosis multifloris. ♄ — Frutex triorgyalis hirsutus. Rami ad nodos compressi. Petioli 3 lin. longi, folia quadripollicaria, basi 1¾ poll. lata, superiora minora. Pedunculi sesquipollicares in axillis foliorum superiorum, subregulariter trichotomi multiflori. Calyx campanulato-quadrifidus, laciniis ovatis obtusis. Corolla infundibuliformis albo-lutescens, tubus calycis longitudine, laciniis limbi ovatis obtusis. Filamenta basi villosa subexserta. Stylus filiformis corolla duplo longior, apice bifidus.

Drupa baccata obovata aurantiaca umbilicata, Cerasi minoris magnitudine. Nuces 4 obovato-oblongae. — Certe erit *Aegiphilae* species. — Crescit in Peruviae provincia Panatahuarum nemoribus ad Muña.

34. C. RETICULATA Swrtz. Prodr. flor. Ind. occid. 31. et Flor. Ind. occid. I. 252. — Ramis teretibus foliisque subtus incano-tomentosis petiolatis, e basi rotundata elliptico-lanceolatis subserratis, superioribus integris rugosis, reticulato-nervosis; pedunculis axillaribus oppositis elongatis, apice dichotomo-cymosis. ♄ — Petioli teretes breves. Calyx incanus quadrifidus, laciniis brevibus erectis. Corolla quadrifida, extus tomentosa. Formae foemineae stamina 4 corolla breviora, stylo ea longiore, stigmata crassiuscula. Drupa baccata calyce membranaceo suffulta, sericea tetrapyrena, pyrenis monospermis. — Crescit in insula Jamaica.

35. C. FERRUGINEA Swrtz. l. l. c. c. 31. et 250. — Ramis teretibus, ramulis tetragonis ferrugineo-farinosis; foliis petiolatis late lanceolatis acutis argute serratis, subtus scabriusculis; cymis terminalibus axillaribusque folia aequantibus; pedunculis dichotomis ferrugineis multifloris. ♄ — Frutex orgyalis, caulis cortex laevis. Folia nervosa et venosa, supra laevia. Petioli mediocres ferrugineo-farinosi. Pedunculi teretes. Flores parvi congesti coerulescenti-albidi. Calyx tetragonus quadridenticulatus. Corolla hypocraterimorpha quadrifida, laciniis lanceolatis patulis. Filamenta staminum basi latiora corollae tubo duplo longiora. Germen inferum subrotundum? Stylus staminibus brevior bifidus vel indivisus, stigmata crassiuscula, quando stylus simplex, stigma subcapitatum. Bacca parva subrotunda, apice quasi biloba seu dicocca tetrasperma coccinea, bipartibilis. Semina oblongo-trigona. Flores hujus speciei polygami An recte hujus generis? an ad *Aegiphilas* referenda? — Crescit in sylvis montium altissimorum insulae Jamaicae.

36. C. PENTANDRA Rxb. Flor. Indic. I. 395. — Ramis foliisque junioribus farinosis oppositis, alterno hinc inde accedente, oblongis integris cuspidatis; corymbis axillaribus; floribus pentandris; stigmate 3–4-partito. ♄ — Crescit in insulis Moluccis. — Certe non hujus generis erit.

†† *Species e genere excludendae.*

C. INTEGRIFOLIA Jcq. = AEGIPHILA ARBORESCENS??
C. RETICULATA Poepp. = PETITIA DOMINGENSIS.
C. DISCOLOR Willd. Herb. = AEGIPHILA ARBORESCENS.

Tribus V. *AVICENNIEAE* Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 292. — Endl. Gener. plant. p. 688.

Semen intra pericarpium germinans. Cotyledones crassae conduplicatae latissimae, basi bilobae, radicula infera barbata, plumula diphylla scapo imposita.

L. (3722.) AVICENNIA *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 1237. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 200. — R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. I. p. 518.)

1. A. TOMENTOSA Linn. Syst. veget. 484. — R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. I. 518. (edit. N. ab E. 374.) — Jcq. Americ. 178. t. 112. fig. 2. — Lam. Illustr. t. 540. — H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 283. † — Wall. Plant. Asiat. rarior. III. 44. t. 271. — Dene. Ann. sc. natur. 1835. pag. 79? — Cham. et Schlchtd. Linnaea VI. 751. — Foliis infra tomentosis. ♄ — Arbor magnitudine varians, nunc excelsa, nunc mediocris, modo arbusculae staturam vix attingens. Rami cylindrici fusco-canescentes patentes. Folia approximata patentia opposita ovalia, ovali-oblonga, ovato-lanceolata, lanceolata, elliptico-lanceolata, elliptico-oblonga vel sublinearia, acuminata acuta vel obtusa saepeque apice obtusissima subrotunda, 1½–4½-pollicaria, 8–24 lin. lata, formaque ideo valde variabilia obtusa integerrima, basi subattenuato-acuta coriacea, supra lucida, subtus mollia incana vel flavicantia

obtectaque squamulis minutissimis dense adpressis, costa elevata, nervis tenerrimis, intra marginem inaequaliter arcuato-anastomosantibus venisque capillaceis reticulatis, siccitate tantum conspicuis. Petiolus semipollicaris, supra leviter sulcatus, sulco versus basin dilatato cano-villoso marginato, insertione lineola ad petiolum oppositi folii trans ramum excurrens. Panicula terminalis erecta subbrachiata palmaris simpliciter ramosa, constans florum parvorum sessilium fasciculis remotiusculis bracteolatis, aliquando ramulus unus alterve oritur ex alis foliorum superiorum apice fasciculos paucos gerens. Pedunculi obsolete quadrangulares villosuli. Bracteae infra divisuras paniculae oppositae lineari-oblongae patentes coriaceae. Calyx sessilis coriaceus ovatus quinquepartitus, laciniae bracteolaeque aliquot suffulcientes ovatae obtusae ciliatae, mox fuscescentes. Corolla flava crassiuscula campanulata, tubus amplus calyce longior sursum limbusque quadrifidus villosus, laciniae ovatae acutiusculae patentes subaequales, postica brevissime fornicata. Filamenta quatuor subulata patentia, fauce perviae, inter lacinias inserta, iisdem breviora, antherae ovatae crassiusculae biloculares. Ovarium ovatum dense villosum biloculare quadriovulatum, ovula oblongo-cuneata pendula ex apice axeos compresse tetragonae, stylus cylindricus tubo corollino parum longior villosus, stigma bifidum acutum. Pericarpium oblique ovatum compressum sesquipollicare, attenuato-acutum, styli basi persistente cuspidatum, dense et molliter cano-tomentosum, basi rotundata suffultum calyce bracteisque persistentibus emarcidis. Integumentum simplex coriaceum, tertiam partem lineae crassum, intus laevissimum argenteo-nitens. Embryo maximus coriaceo-carnosus saturate viridis erectus, cavitatem omnino replens, pericarpio forma similis, basi concaviusculae adfixus receptaculo parvulo convexo, cujus vertici adhaerent ovula tria sterilia pendula emarcida membranacea fusca. Cotyledones latissimae reniformi-cordatae crassissimae laeves nitidae, lobi basis magni rotundati inaequales imbricantes. Radicula longa et crassa densissime barbata lanugine alba longa et molli oblique inter cotyledones ascendens eosque apice adfigens, basi nuda papillosa, scapus primum nullus, sed mox semine intra pericarpium germinante elongatus cylindricus attenuatus laevis, plumula diphylla. (Wall.) — *Donatia* Loefl. It. 133. — *Bontia foliis integris oblongis oppositis, petiolis crassis brevissimis subamplexicaulibus, floribus racemosis* P. Br. Jamaic. 263. — *Mangle Laurocerasi foliis, flore albo tetrapetalo* Sloan. Jamaic. 156. — *Anacardium* Bauh. Pinx. 511. — *Oëpata* Rheede, Hort. Malab. IV. 95. t. 45. — *Halodendrum* Aub. du Petit Thouars, Gener. pl. Madagasc. 8. no. 26. — *Sceura marina* Forsk. Plant. Aeg. Arab. 37. — *Bontia germinans* Linn. Spec. pl. (edit. 2.) 891. — [*Guapira Guianensis* Aublet, Pl. Guian. I. 308. t. 119. a Candolleo huc relata nullo modo hujus generis est.*)] — *Mangium album* Rmph. Hb. Amboin. III. 115. t. 76. — *Rack* Bruce, It. t. 34. — *Avicennia resinifera* Forst. Prodr. no. 246. — Willd. Spec. pl. III. 395. — *Avicennia Africana* Palis. Beauv. Flor. d'Oware et de Benin I. 79. t. 47. — *A. Oëpata* Hamilt. mss. — *A. elliptica* Thnbrg.? ubi? — *A. alba* Blume, Bijdragen 821?

a. Cumanensis H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 283. — Foliis oblongis aut elliptico-oblongis, utrinque rotundatis brevissime petiolatis, supra nigro-viridibus. — Ramuli teretes laeves, tenuissime canescenti-tomentelli. Folia 18-24 lin. longa, 8-9 lin. lata, petiolis lineam longis. Spicae axillares et terminales ternae, adjecto pedunculo bipollicares. — Crescit ad littora maris Cumanensis.

*) *Guapira Aubl. l. c. — Perianthium 4-5-phyllum, foliolis brevibus subrotundis acutis. Corolla monopetala tubulosa, limbo patente 4-5-dentato. Stamina sex, tria longiora, tria breviora, receptaculo pistilli inserta. Germen ovatum. Stylus cylindraceus, stigma 5-6-fidum, laciniis linearibus acutis. Drupa monosperma, ovata sexstriata, coronata denticulis corollae, quae evadit pulposa. Semen unicum membrana alba obvolutum. — Genus in Endl. Gener. pl. omissum.*

1. *G. GUIANENSIS Aubl. l. c. t. 119. — Arbor mediocris, ramis oppositis nodosis. Folia opposita petiolata ovata acuta integerrima glabra, ad summitatem ramulorum 3-4 verticillata. Flores albi racemosi. Pedunculus florifer longus simplex e divaricatione ramorum. Fructus coccineus. — Crescit in Guiana Gallica.*

β. *Campechiensis* H. B. Kth. 284. — Foliis oblongis obtusis, basi cuneatis, supra nigro-viridibus. — Rami ramulique tereliusculi laeves tenuissime cano-tomentosi. Folia 39-42 lin. longa, 14-16 lin. lata, petiolis 3 lin. longis. — Crescit prope Campeche Mexicanorum, in Antillis et in Brasilia. (v. s. sp.)

γ. *Guayaquilensis* H. B. Kth. l. c. — Foliis oblongo-lanceolatis acutiusculis, basi cuneatis, supra laete viridibus. — Rami ramulique teretes cinerascentes, internodiis brevibus. Folia 48-56 lin. longa, 12-15 lin. lata, petiolis 6-9 lin. longis. — Crescit prope Guayaquil Quitensium, in insula Sti. Thomae et in Surinam. (v. s. sp.)

δ. *Asiatica:* Foliis ovalibus obtusis, supra lucidis, infra molliter incanis (floribus luteis). — An species distincta?? — Folia 3-4-pollicaria, 1½-2 poll. lata. — Wall. Plant. Asiat. rarior. t. 271. — Crescit in India orientali.

ε. *Arabica:* Foliis subsessilibus ovali-lanceolatis acuminatis obtusissimisque, supra lucidis, infra ramisque argenteo-tomentellis. — Folia 2-3-3½-pollicaria, 10-20 lin. lata acuminata vel obtusissima, basi cuneata vix petiolata, spicae cum pedunculo pollicares vel etiam breviores. — *Sceura marina* Forsk. Fl. Aeg. Arab. 37. — Crescit in Arabiae desertis prope mare Rubrum ad Essmain et in Promontorio bonae spei in limosis salsis ad maris littora prope Port Natal. (v. s. sp.)

ζ. *Owarensis:* Foliis elliptico-oblongis obtusissimis linguaeformibus, basi longe attenuatis petiolatis, supra nitidis, infra tomentosis. — Folia 3½-4½-pollicaria, 10-11 lin. lata, parte petiolari semipollicari. Spicae cum pedunculo ½-1½-pollicares axillares et terminales. Flores albi. — *Avicennia Africana* Palis. Beauv. Flor. d'Oware t. 47. — Crescit ad Chama, Koto et Apam in regno Owarensi.

η. *Australasica:* Foliis ovali-lanceolatis acuminatis vel obtusis longissime in petiolum attenuatis, supra nitidis, infra glaucescenti-tomentosis. — Folia 2-3-3½-pollicaria, pollicem lata, basi longe attenuata, petiolis 6-9 lin. longis vel etiam pollicaribus. — *Avicennia resinifera* Forst. Prodr. no. 246. — Crescit in Nova Hollandia. (v. s. sp.)

2. A. NITIDA Jcq. Americ. 177. t. 112. fig. 1. — Willd. Spec. plantar. III. 395. — Foliis lanceolatis, utrinque nitidis. ♄ — Flores albi. — Crescit in insulae Martinicae littoribus maritimis.

† Genera incertae sedis et non satis nota.

LI. HYMENOPYRAMIS *Wall.*

(Wall. Catal. 774. — Griffith in M'Clelland's Calcutta journal of natural history III. [1843.] 365.)

Calyx quadridentatus. Corolla subinfundibuliformis subregularis quadripartita. Stamina 4 exserta. Ovarium biloculare, ovula cujusque loculi bina pendula. Stylus exsertus, stigma bifidum. Capsula calyce ampliato tetragono quadrialato inclusa, dicresile (?) quadrivalvis, placenta libera, bipartibilis. Semina pendula exalbuminosa. — Frutex Indiae orientalis subscandens, ramis elongatis, ramulis fructigeris brachiatis. Folia opposita ovato-lanceolata subintegra, subtus tomento brevi albida. Cymae axillares et terminales. Flores subumbellati congesti albi parvi. Ovarium glabriusculum, apice glandulosum. Pedicelli fructiferi elongati capillacei. Capsula pilosa, glandulis sessilibus fragrantibus luteis adspersa.

1. H. BRACHIATA Wall. Catal. 774. — Griffith l. c. — ♄◡ — Crescit in India orientali centrali.

LII. GLOSSOCARYA *Wall.*

(Wall. Catal. 1741. — Griffith in M'Clelland's Calcutta journal of natural history III. [1843.] 366.)

Calyx infundibuliformis 4—5-dentatus. Corolla subhypocrateriformis, tubo cylindraceo gracili, limbi 4—5-partiti laciniae subaequales. Stamina

4—5 exserta. Ovarium uniloculare, placentae bilamellatae, lamellis recurvato-incurvis, ovula 4 pendulo-appensa. Stylus filiformis exsertus. Stigma bifidum. Capsula semiexserta quadrivalvis, valvulis cum placentae parte superiore seminifera secedentibus. Placentae pars infera libera persistens. Semina......? — Frutex Indiae orientalis cano-pubescens. Folia cordato-ovata. Flores parvi in corymbis terminalibus digesti. Corymbi fructiferi magis expansi. Capsulae pilosae ascendentes secundae. Valvae semina basi alata simulantes.

1. GL. MOLLIS Wall. Catal. 1741. — Griffith l. c. — ♄ — Crescit in rupibus calcareis ad speluncas Demithawt editas, ad flumen Attran provinciae Molmain in regno Burmannico.

†† Genera indescripta.

ANALECTIS *Juss. apud Vahl ex Wall. Catal.* 1734.

„Genus inter *Congeam* et *Symphorema* intermedium." — Meisn. Gener. pl. II. 198.

COCHRANEA *Miers, Trav. in Chili II.* 529. — *Meisn. l. c.*

††† Genera ex ordine excludenda.

COBAMBA *M. Blanco, Flora de Filipinas* 510. — *Meisn. Gener. plant. II.* 200. *pertinet ad SCROPHULARINAS dubias.*

Cf. Wlprs. Repert. bot. syst. III. 437.

HILSENBERGIA *Tausch in Sib. Herb. flor. Martin. II.* 160. — *Meisn. Gener. plant. vascul. II.* 198. *ad SOLANACEAS pertinet.*

Cf. Wlprs. Repert. bot. syst. III. 125.

PERAMA *Aublet, Guian. I.* 54. *t.* 18. — *Meisn. l. c. I.* 290. *II.* 198. *ad RUBIACEAS spermacoceas pertinet.*

Cf. Wlprs. Repert. bot. syst. II. 467.

Addantur:

Pag. 57. no. 59. LIPPIA SCABRA Hochstett. Flora (B. Z.) XXVIII. 68. — Foliis subsessilibus oblongis crenatis, versus basin attenuatis integerrimis, supra scabris, subtus resinoso-punctatis subtomentosis; capitulis axillaribus cylindricis hirtellis; pedunculo scabro folium subaequante; drupa calyce bivalvi tecta bipartibili. ♄ — Planta aromatica. — Crescit in Promontorio bonae spei ad Natalbay.

Pag. 58. no. 5. CLOANTHES (??) BARTLINGII Lehm. Delect. semin. hort. Hamburg. 1844. no. 8. — Foliis sparsis ternisque sessilibus, subtus ramisque tomentosis; calycibus foliisque floralibus lanatis. ♄? — Crescit in Australasia ad radices montium Darling'srange.

Ordo CLVII. MYOPORINEAE *R. Br.*

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 370. — Endl. Gener. plant. p. 642. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

I. (3733.) MYOPORUM *Forst.*

(Forst. Prodr. 44. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

§. 1. *Folia alterna integerrima.*

1. M. OBSCURUM Endl. Prodr. flor. Norfolk. p. 54. no. 110. † — F. Bauer, Illustr. plant. Norfolk. t. 101. (inedit.) — Endl. Iconogr. gener. t. 65. — Foliis alternis integerrimis late lanceolatis acuminatis vel obtusiusculis, basi angustatis ramulisque resinoso-punctatis; foliolis calycinis lineari-lanceolatis acutissimis; corollae limbo barbato. ♄ — Ramuli calami sciptorii crassitie, cortice cinereo rugoso, basi foliorum delapsorum cicatricibus torosi, gemmarum axillarium rudimentis viscidis exasperati, apice fucati resinoso-viscosi. Folia alterna approximata late lanceolata acuminata vel obtusiuscula tripollicaria, sesquipollicem lata, basi in petiolum angustata, exsiccatione obscure viridia glabra, utrinque, imprimis subtus glandulis resinosis minimis confertis obsessa, nervo centrali cum petiolo continuo, supra impresso, subtus prominente e latiori basi sensim angustato percursa, secundariis oppositis prope marginem combinatis, pagina inferiore prominentibus, supra obsoletis. Flores axillares solitarii ex eadem axilla bini ternive ebracteati, pedicellis 2–3 lin. longis teretiusculis, apice incrassatis viscidis. Calycis quinquepartiti laciniae lineari-lanceolatae acutissimae, 5 lin. longae, 4 lin. latae, supra punctis atropurpureis conspersae pilosiusculae, duabus superioribus nonnihil angustioribus approximatis. Stamina 4 corollae lobis alterna, locus quintus inter labii superioris lobos vacuus, tubo inserta, dimidiam limbi longitudinem aequantia. Filamenta teretiuscula e basi crassiore angustata. Antherae introrsae biloculares basifixae, loculis apice rotundato contiguis. Ovarium ovato-globosum disco annulari cinctum quadriloculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis staminum longitudine, ovario triplo fere longior basique ultra medium patentim pilosus, apice uncinato-incurvus, stigmate truncato-dilatato glanduloso terminatus. — Crescit in insula Norfolk.
2. M. MONTANUM R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. I. 516. — Bth. in Hügel. Enumer. plant. Nov. Holland. 78. adnot. — Ramis laevibus; foliis anguste lanceolatis acuminatis, basi angustatis integerrimis uninerviis; pedicellis crassiusculis subrecurvis; laciniis calycinis basi latioribus corolla et drupa baccata ovata subduplo brevioribus; corollae limbo barbato. ♄ — In Nova Hollandia ad Port Jackson.
3. M. ELLIPTICUM R. Br. l. c. 515. — Foliis ellipticis obtusiusculis mucronulatis, basi attenuatis ramulisque laevibus; calycis laciniis lanceolatis acutissimis; corollae fauce villosula, limbo imberbi. ♄ — Rami glabri eglandulosi, novelli resinoso-viscidi. Folia oblongo-elliptica, basi attenuata, apice obtusiuscula vel acuminulata mucronata, 21–36 lin. longa, 6–9 lin. lata, integerrima coriacea, utrinque glabra. Pedunculi axillares bini quaternive uniflori longitudine saepe inaequales sed quatuor lineis non longiores. Calycis laciniae lanceolatae acuminatae acutissimae. Corolla campanulata patens, tubo lacinias calycinas aequante, laciniis ovalibus

obtusis, intus barbato-villosis, extus glabris. Stamina 4 tubo non longiora cum laciniis alterna, loco quinto vacuo. — Sieb. Herb. flor. Nov. Holland. no. 223. — *Pogonia (Andrewsia* Venten. Jard. de Malmais. t. 108.) *glabra* Andr. Bot. Reposit. t. 283. — Crescit in Nova Hollandia. (v. s. sp.)

4. M. ACUMINATUM R. Br. l. c. — Foliis latiuscule lanceolatis acuminatis acutissimisve, basi attenuatis ramisque laevibus; laciniis calycis ovato-lanceolatis; limbo corollae barbato. ♄ — Folia basi longe attenuata 3–5-pollicaria, ½–1 poll. lata, basis attenuata saepe pollicaris vel sesquipollicaris acuminata acuta, integerrima, utrinque glabra subcoriacea. Pedunculi axillares plures (seni octonive) fasciculati 3–4 lin. longi uniflori. Corollae campanulatae laciniae ovato-oblongae obtusissimae intus barbatae. — Crescit in Nova Hollandia. (v. s. sp.)

5. M. CAPRARIOIDES Bth. in Hügel. Enumer. plant. Nov. Holland. 77. — Ramis laevibus; foliis anguste lanceolatis acuminatis, basi angustatis integerrimis uninerviis; pedicellis filiformibus suberosis; laciniis calycinis subulatis corollae tubum et drupam depresso-globosam exsuccam subaequantibus; corollae limbo basi barbato. ♄ — Crescit in Nova Hollandia ad fluvium Cygnorum.

6. M. CUNNINGHAMII Bth. l. c. 78. adnot. — Ramis laevibus; foliis lanceolatis acuminatissimis, basi angustatis, inferioribus penninerviis; pedicellis crassiusculis subrecurvis; calycis laciniis lanceolatis acutissimis corollae tubo et drupa ovoidea baccata subtriplo brevioribus; corollae limbo barbato. ♄ — Crescit in Nova Hollandia ad Moreton Bay.

7. M. DESERTI A. Cunningh. mss. ex Bth. l. c. — Ramis subviscosis; foliis oblongo-linearibus acutiusculis, basi angulatis uninerviis; pedicellis reflexis; laciniis calycinis late lanceolatis acutis brevissimis; corollae limbo imberbi. ♄ — Crescit in Novae Cambriae australis interioris locis sterilibus copiosissimum.

8. M. FLORIBUNDUM A. Cunningh. mss. ex Bth. l. c. — Ramis glandulosis; foliis elongato-linearibus minute et remote denticulatis; pedicellis fasciculatis filiformibus brevibus; corollae limbo imberbi; staminibus exsertis; drupa compressa calyce longiore. ♄ — Rami glandulis sanguineis resinosis hinc inde adspersi, ramuli angulo fere recto patentes. Folia tripollicaria vel etiam semipedalia, 1–1½ lin. lata integerrima vel obsolete remoteque subserrulata. Flores seni vel duodeni fasciculati axillares. Pedunculi 2 lin. longi. Calycis laciniae subulatae, corollae laciniae obovales acutiusculae, supra pilis paucis sparsis instructae. Stamina limbo paullo longiora. — Crescit in Nova Hollandia. (v. s. sp.)

9. M. PARVIFOLIUM R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. I. 516. — Bot. Magaz. t. 1693. — Loddig. Bot. Cabin. t. 837. — Rchb. Ic. pl. cult. et colend. I. t. 2. — Foliis alternis linearibus obtusiusculis, apice nunc dentatis, basi attenuatis ramulisque glandulosis; pedunculis passim bipartitis folio dimidio longioribus; caule diffuso. ♄ — Frutex habitu *Lycio barbaro* nostro haud dissimilis, rami foliaque glandulis resinosis conspersi, folia maxima pollicaria, 1½–2 lin. lata, integerrima vel apicem versus obsolete denticulata, hinc inde glandulis conspersa glabra patenti-reflexa, Pedunculi axillares solitarii, bini vel etiam plures, folium subaequantes vel eo dimidio longiores, filiformes glabri uniflori. Calycis laciniae lanceolatae acutiusculae corolla triplo breviores. Corollae campanulatae albae laciniae elliptico-ovatae, supra rubro-punctulatae sparseque pilosae. Stamina 4 longitudine laciniarum. — *Pogonia tuberculata* Hort. — *Pogonia scabra* Hort. — *Pogonia aspera* Hort. — *Myoporum parviflorum* Hb. Reg. Berol. — Nimis forsan affine *M. humili*. — Crescit in Nova Hollandia meridionali. (v. s. sp. et cult.)

10. M. TENUIFOLIUM Forst. Prodr. 44. — R. Br. l. c. 515. — Foliis lanceolatis acutissimis ramulisque laevibus; calycis laciniis lanceolatis acutis; limbo corollae imberbi. ♄ — *Citharexylum tenuifolium* Forst. — Crescit in Nova Hollandia ad littora intra tropicos.

11. M. HUMILE R. Br. l. c. 516. — Foliis spathulato-linearibus obtusiusculis aveniis; caule procumbente. ♄ — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali.

§. 2. *Folia alterna serrata. Drupa ventricosa quadrilocularis.*

12. M. ASCENDENS R. Br. Prodr. flor. Nov. Holl. I. 516. — Foliis obovato-oblongis obtusiusculis extra medium obtuse serratis ramisque laevibus ascendentibus; caule diffuso. ♄ — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali.

13. M. INSULARE R. Br. l. c. — Rchb. Icon. plant. cult. et colend. I. t. 26. — Foliis lanceolatis, basi attenuatis, apice serratis ramisque laevibus, novellis viscidis; caule erecto. ♄ — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali.

14. M. SERRATUM R. Br. l. c. — Lindl. Bot. Regist. 1845. (New Ser.) t. 15. — Foliis lanceolatis acutissimis serratis ramisque laevibus. ♄ — *Pogonia tetrandra* Labill. Nov. Holland. I. 59. t. 83. — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali.

15. M. TUBERCULATUM R. Br. l. c. — Foliis lanceolatis acutis serratis ramisque glanduloso-tuberculatis. ♄ — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali.

16. M. VISCOSUM R. Br. l. c. — Foliis ellipticis acutis serratis reflexis ramisque viscidis glandulosis. ♄ — *Bertolonia glandulosa* Spinola, Catal. hort. pag. 24? — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali.

§. 3. *Folia alterna dentata. Drupa compressa saepe bilocularis.*

17. M. PLATYCARPUM R. Br. l. c. — Foliis lineari-lanceolatis, apice dentatis ramisque laevibus; drupis compressis bilocularibus calyce quadruplo longioribus; caule erecto. ♄ — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali.

18. M. DEBILE R. Br. l. c. — Bot. Magaz. t. 1830. — Foliis lanceolatis, apice dentatis, basi integerrimis; drupis compressiusculis calyce brevioribus; pedunculis solitariis; caule prostrato. ♄ — Rami prostrati purpurei tuberculoso-glandulosi. Folia 1½–2-pollicaria, 3–7 lin. lata, utrinque glaberrima coriacea, integerrima vel saepius apice acute denticulata serrulata obtusa. Pedunculi axillares solitarii vel bini vix 3 lin. longi uniflori. Calyx semipollicaris basin usque fere 4–5-fidus, laciniis foliaceis ovato-lanceolatis acuminatis acutissimis integris vel serrulatis, laciniae etiam lineares acutae, apice parum dilatatae observantur. Corolla rosea calycis circiter longitudine profunde 4–5-fida, laciniis ovalibus acutiusculis glabris, si quadrifida est, lacinia quarta e duabus conflata obovata reliquis latiori. Stamina 4 laciniis duplo breviora. Drupa calyce persistente inclusa compressa ovalis profunde bisulca quadrilocularis, loculis duobus sterilibus. — *Pogonia debilis* Andrws. Bot. Reposit. t. 212. — *Andrewsia debilis* Venten.? — Hac specie *Myoporineae* transitum ad *Verbenacearum* genus *Casseliam* efficere mihi videntur. — Crescit in Nova Hollandia ad Port Jackson. (v. s. sp.)

19. M. DIFFUSUM R. Br. l. c. — Foliis lanceolatis, basi dentatis, dentibus subrecurvis, apice integris dentatisve; caulibus diffusis glandulosis; pedunculis solitariis; drupis compressiusculis calyce brevioribus. ♄ — Crescit in Novae Hollandiae littoribus intra tropicum. (v. s. c.)

§. 4. *Folia opposita.*

20. M. OPPOSITIFOLIUM R. Br. l. c. — Rchb. Icon. pl. cult. et colend. I. t. 2. — Foliis serratis cordatis sessilibus. ♄ — Rami creberrime glanduloso-tuberculati. Folia 5–12 lin. longa, 3–6 lin. lata, acuminata argute serrulata, supra glabra, infra dense glandulosa. Pedunculi axillares bini 5–6 lin. longi filiformes, apice incrassati. Calycis laciniae lineari-lanceolatae acutae. Corollae laciniae supra barbatae, stamina laciniis breviora. — *Pogonia scabra* Hort. Berol. — Crescit in Nova Hollandia. (v. s. c.)

21. M.? EUPHRASIOIDES Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 67 — Foliis oppositis ovatis subdentatis in petiolum attenuatis; floribus geminis; pedunculo petiolum aequante; calycibus ampliatis; drupa biloculari, loculis monospermis. ♄ — Frutex erectus, ramis oppositis pubescentibus. Folia opposita vix semiuncialia ovata acutiuscula integra vel crenato-dentata imo quandoque incisa, inferne in petiolum brevem attenuata pubescentia, sicca nigricantia. Pedicelli geminati axillares breves. Calyx subcampanulatus quinquefidus pubescens, laciniis ovatis acutis, demum ampliatis, tubo lineis quinque elevatis notato. Corolla subcampanulata

quinqueloba, lobis fere aequalibus. Stamina 4 didynama tubo inserta, antherae bilobae, lobis basi divaricatis mucronatis. Germen ovatum in stylum filiforme attenuatum, stigma dilatatum obtusum. Drupa ovali-globosa stylo mucronata pubescens, calyce persistente cincta bilocularis, loculis monospermis. — Habitu *Euphrasiae* vel *Bartsiae* simillimum sed ob loculos monospermos *Scrophularinis* adnumerari nequit. — Crescit in „Whilsunday Island."

† Species non satis notae.

22. M. LAETUM Forst. Prodr. 44. — Spr. Syst. veget. II. 766. no. 15. — Foliis oblongis acutis, apice obsolete serratis, basi attenuatis ramisque erectis glabris; pedunculis aggregatis; laciniis calycinis cuspidatis. ♄ — *Citharexylum perforatum* Forst. — Crescit in Nova Zeelandia.
23. M. CRASSIFOLIUM Forst. l. c. ex Spr. l. c. no. 17. — Foliis oblongis subserratis carnosis. ♄ — Crescit in insulis Societatis.
24. M. PUBESCENS Forst. l. c. ex Spr. l. c. no. 18. — Foliis oblongo-ellipticis serratis pubescentibus. ♄ — Crescit in Nova Zeelandia.
25. M. VERRUCOSUM Poir. Encycl. méth. XII. 42. — Caule fruticoso; ramis subdecumbentibus teretibus glabris; foliis alternis carnosis verrucosis sessilibus spathulato-linearibus; floribus subgeminis; pedunculis folia aequantibus. ♄ — *Pogonia verrucosa* Dsvx. Journ. de Bot. IV. 141. t. 35. — In Nova Hollandia.

†† E genere excludendum.

M. OPHIOGLOSSOIDES Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) II. 176. = POGONIA OPHIOGLOSSOIDES Ker, (quae ad *Orchidearum* ordinem pertinet).

II. EREMODENDRON *DC.*

(DC. mss. ex Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

1. E. CUNNINGHAMI DC. mss. in Meisn. l. c. II. 201. — Arbor: ramulis angulatis; foliis linearibus integerrimis mucronatis, novellis subcanescentibus; pedunculis axillaribus solitariis unifloris calyce paullo brevioribus; corollis purpureis. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

III. (3794.) PHOLIDIA *R. Br.*

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 517. — Endl. Gener. plant. p. 642. et 1401. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

1. PH. RESINOSA Endl. Ann. des Wien. Mus. II. 202., Nov. stirp. decad. I. 50. no. 58. † — Foliis obovatis planis. ♄ — Ramuli fili emporetici crassitie obsolete tetragoni, furfure stellato albido densissime obtecti, tuberculis resinosis subglobosis crebris epidermidem lacerantibus conspersi. Folia approximatim alterna obovata 4 lin. longa, 1½–2 lin. lata plana, basi angustata, apice obtusa vel in acumen brevissimum patentiusculum contracta crassiuscula plana, glandulis immersis subrugosa, utrinque pilis stellatis canescentia. Pedunculi axillares solitarii brevissimi vix dimidia linea longiores. Calyx profunde quinquefidus, basi angulatus 3 lin. longus, laciniis lineari-lanceolatis acutis, squamulis furfuraceis minutissimis conspersis. Corolla infundibuliformis, 6½ lin. longa, tubo cylindrico calycem vix superante, fauce ampliata, hinc gibba, apice subcontracta, limbo vix semilineam superante bilabiato, labio superiore bilobo recurvo, inferiore trilobo aequali patulo, extus praeter imam tubi partem pilis stellatis furfuraceis conspersa, intus praeter lineam barbatam antice decurrentem glabra. Stamina tubo inserta 4 didynama inclusa, filamenta basi barbata, antherae biloculares, loculis divaricatis barbatis, apice confluentibus. Ovarium ovato-conicum dense tomentosum quadriloculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis glaberrimus, stigma minute capitatum vix emarginatum. — Crescit in Novae Hollandiae austro-occidentalis interioribus inter Swan River et King George's Sound.
2. PH. SCOPARIA R. Br. l. c. — Endl. Iconograph. t. 66. — Foliis lineari-subulatis. ♄ — Differt a praecedente foliis lineari-subulatis 9 lin. longis oppositis. Pedunculi in axillis foliorum superiorum 2 lin. longi. Flores 6–8 lin. longi coerulei. Corolla extus furfuracea, intus villosa. — Crescit in Nova Hollandia.

IV. (3733/1.) DASYMALLA *Endl.*

(Endl. Nov. stirp. mus. Vindob. decad. p. 11. et Gener. plant. Suppl. I. p. 1401. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

1. D. AXILLARIS Endl. l. c. no. 12. † — Floccoso-lanata: pedicellis axillaribus fasciculatis folio brevioribus. ♄ — Fruticulus pedalis multicaulis, a basi opposite ramosus. Rami tetragoni fere pennae anserinae crassitie, lana alba dense vestiti. Folia opposita, paribus inferioribus remotis, supremis approximatis, obovato-oblonga, pollicaria vel sesquipollicaria, 4–5 lin. lata, integerrima obtusa, basi angustata, densissime albo-lanata, lana ad margines longiore subfloccosa, scalpello derasa sub indumento rugosa, nervo medio prominente. Pedicelli in axillis foliorum 3–4 congesti filiformes 4 lin. longi rigiduli, antice et postice lana patente plumosi, margine utroque glabriusculi, basi utrinque bracteola lineari-setacea dense lanata, mox obliterata stipati. Calyx ad basin quinquepartitus, laciniis subaequalibus subcampanulato-conniventibus linearibus obtusis 4 lin. longis, tres quartas unius lineae partes latitudine vix superantibus, extus densissime lanatis, lana ad margines longiore patente subplumosis, intus nudis trinerviis, nervis lateralibus marginantibus. Corollae tubus 5½ lin. longus, intus sesquilineae supra basin altitudine annulo staminigero densissime piloso munitus, sursum ad medium ampliatus, ex sicco inferne flavescens, superne cum limbo purpureus, limbus bilabiatus, labiis subaequilongis, superiore bilobo, inferiore trifido, lobis obtusis, circiter 3 lin. longis, labii inferioris lobo medio paullo longiore. Stamina 4 subdidynama corollae faucem aequantia, filamenta filiformia glaberrima, antherae biloculares dorso insertae, apice obtusae, basi bifidae. Ovarium compresso-conicum dense pilosum, carpidiorum marginibus introflexis bilamellatis ad axin haud pertingentibus, prima juventute uniloculare, mox ad axin connatis marginibusque parietem oppositam attingentibus quadriloculare. Ovula in loculis solitaria ex angulo pendula anatropa. Stylus terminalis filiformis staminum longitudine, apice breviter bifidus, lobis acutis. Drupa baccata, putamine quadriloculari tetraspermo. Semina inversa. — Crescit in Novae Hollandiae austro-occidentalis interioribus.

2. D. TERMINALIS Endl. l. c. p. 12. no. 13. † — Tomentoso-lanata: cymis oppositis in racemum terminalem dispositis. ♄ — Rami teretiusculi tomento denso albo induti. Folia opposita obovato-oblonga 10 lin. longa, 4 lin. lata dense tomentosa, in apicibus ramulorum conferta, floralia paullo minora minus lanata paribus tribus ad quinque, internodiis 1–2-pollicaribus minus dense lanatis sejunctis. Cymae in axillis foliorum floralium oppositae simplices iisdem breviores. Flores quam in praecedente specie paullo minores, calycis parcius lanati laciniis lanceolatis. — Crescit in Novae Hollandiae austro-occidentalis interioribus.

V. (3735.) EREMOPHILA *R. Br.*

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 518. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

1. E. VISCIDA Endl. Nov. stirp. decad. I. 51. no. 59. † — Foliis alternis planis elliptico-lanceolatis integerrimis; pedunculis axillaribus solitariis vel congestis. ♄ — Ramuli pedales teretes, cortice rubro-fusco viscido nitente. Folia alterna dimidium pollicem dissita elliptico-lanceolata sesquipollicaria vel bipollicaria, 4–5 lin. lata, utrinque basi in petiolum brevissimum angustata uninervia obsolete venosa, utraque pagina nitida viscida, integerrima. Pedunculi in axillis foliorum solitarii gemini vel terni uniflori ebracteati 4-5 lin. longi compressi sursum dilatati, utrinque carinati glabri. Calyx quadrilinearis quinquepartitus, laciniae obovatae obtusae subaequales, fructiferae auctae scariosae reticulato-venosae 5 lin. longae, 4 lin. latae, duae interiores paullo angustiores. Corollae tubus amplus 5 lin. longus, 4 lin. latus, limbus trilinearis bilabiatus, labia subaequilonga, superius fornicatum breviter emarginatum, inferius trilobum, lobis obtusis, intus striis purpureis interruptis pictus. Stamina 4 didynama paullo supra corollae basin inserta longeque exserta, filamenta filiformia glaberrima, antheris

reniformi-bilobis, loculis apice confluentibus glaberrimis. Ovarium ovatum compressiusculum villosum. Ovula in loculis solitaria pendula anatropa. Stylus filiformis glaberrimus, stigma minutissime capitatum indivisum. Drupa subcompressa bicarinata pubescens 2½ lin. longa, 1½ lin. lata quadrilocularis. Semina in loculis solitaria inversa. — Crescit in Novae Hollandiae austro-occidentalis interioribus.

2. E. OPPOSITIFOLIA R. Br. Prodr. flor. Nov. Holland. I. 518. — Foliis oppositis semiteretibus; pedunculis axillaribus solitariis unifloris calycibusque eglandulosis, laciniis unguiculatis. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

3. E. ALTERNIFOLIA R. Br. l. c. — Foliis sparsis semiteretibus; pedunculis axillaribus solitariis unifloris calycibusque glandulosis, laciniis sessilibus. ♄ — Prior habitu *Pholidiae*, altera glandulis *Myoporo* non dissimilis. — Crescit in Nova Hollandia.

VI. (3736.) STENOCHILUS *R. Br.*

(R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 517. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

1. ST. RACEMOSUS Endl. Annal. des Wien. Mus. II. 202. et Nov. stirp. mus. Vindob. I. 50. no. 57. † — Glaberrimus: foliis oblongo-lanceolatis, basi angustatis integerrimis; pedunculis folia superantibus flexuosis in apice ramorum subracemosis. ♄ — Ramuli pennae corvinae crassitie teretes glaberrimi cortice rufo nitido. Folia confertim alterna oblongo-lanceolata, basi angustata acutiuscula pollicaria, 2 lin. lata integerrima glaberrima avenia. Flores in axillis supremorum foliorum longiuscule pedunculati racemum terminalem efficientes. Pedunculi ebracteolati teretiusculi superne incrassati, foliis sextante vel quadrante longiores flexuoso-declinati. Calyx herbaceus ad basin quinquepartitus laxiusculus, laciniis ovato-acuminatis, 2 lin. longis, sesquilineam latis, margine obsoletissime membranaceis, omnibus aequalibus, basi imbricantibus. Corolla 8 lin. longa ex sicco aurantiaca subclavato-tubulosa, tubo ima basi globoso-constricto, superne ampliato, limbo tubo paullo longiore bilabiato. Labium superius rectum, dorso convexum, apice breviter quadrifidum, laciniis acutis sesquilinearibus, duabus intermediis paullo altius connatis, lateralibus margine vix reflexis, explanatum 4 lin. latum, intus venosum pilis raris albis conspersum, labium inferius superiori aequilongum lineare acutum sesquilineam latum subdeflexum. Stamina 4 didynama supra corollae basin globosam inserta breviter exserta, filamenta e basi complanata paullulum dilatata filiformia, antherae reniformi-bilobae, loculis apice confluentibus. Ovarium ovatum glaberrimum calycis longitudine quadriloculare, loculis uniovulatis. Stylus filiformis apice uncinato-incurvus corollae longitudine, stigma minute capitatum. — Crescit in Novae Hollandiae austro-occidentalis interioribus.

2. ST. INCANUS Lindl. Bot. Regist. (New Ser.) 1839., Pl. Misc. 70. — Pilis incanis stellatis tomentosus: foliis ovali-lanceolatis obtusis in petiolum angustatis; floribus axillaribus pedunculatis; corolla tomentosa; labio superiore cymbaeformi quadridentato, inferiore semilibero revoluto multo longiore. ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

3. ST. VISCOSUS Grah. in Edinbrgh. philos. journ. 1829. p. 387. — Hook. Bot. Mag. t. 2930. — Glaber: ramis junioribus scabris glutinosis; foliis ovali- vel elliptico-lanceolatis, basi integerrimis, apicem versus obsolete serrulatis, junioribus nitidis viscosis; floribus axillaribus solitariis brevissime pedunculatis, labio superiore cymbaeformi acute quadridentato, inferiori lineari acuto revoluto, labium superius aequante. ♄ — Frutex erectus pluripedalis, cortice brunneo. Folia sessilia sparsa approximata pollicaria vel sesquipollicaria, 3–5 lin. lata subacuta coriacea rigida suberecta glutinosa nitida, remote obtuseque apicem versus serrata. Flores axillares in apicibus ramorum subracemosi. Pedunculi 3 lin. longi virides. Calycis 3 lin. longi quinquefidi laciniae lanceolatae acuminatae. Corollae intense luteae puberulae glutinosae pollicaris tubus basi globoso-constrictus, ampliatus bilabiatus, labio superiori naviculari acute profundeque quadridentato, dentibus duobus intermediis parum productioribus, labium inferius subsemipollicare li-

neare acutum revolutum. Stamina 4 didynama imo corollae tubo inserta exserta, longiora duo 18–21 lin. longa. Stylus purpureus filiformis quam stamina longiora paullo brevior. — Crescit in Nova Hollandia. (v. s. c.)

4. ST. GLABER R. Br. Prodr. fl. Nov. Holland. I. 517. — Bot. Regist. t. 572. — Bot. Magaz. t. 1942. — Endlich. Iconogr. t. 92. — Ramulis tomentellis; foliis lanceolatis ellipticis vel obovatis breviter acuminulatis integris vel apice subdentatis glabris, basi longiuscule attenuatis; lloribus axillaribus solitariis breviter pedunculatis; corollae labio superiori breviter et acute quadridentato, inferiori lineari acuminato reflexo superius subaequante. ♄ — Frutex prostratus, cortice griseo, ramis glabris, junioribus pulverulento-tomentellis. Folia maxima sesquipollicaria, semipollicem lata, pleraque pollicaria, 3 lin. lata, coriacea, utrinque glabra, vel juniora tenuissime pulverulenta. Pedunculi 3 lin. longi. Calycis profunde quinquefidi laciniae lanceolatae acuminatae glabrae. Corolla basi subgloboso-constricta aurantiaca, infra lutea, sursum ampliata bilabiata. Stamina breviter exserta didynama. Stylus purpureus staminibus parum longior. Drupa ovalis compressa calyce brevior glaberrima bilocularis disperma, loculis duobus abortivis. — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali. (v. s. c.)

5. ST. MACULATUS Ker, Bot. Regist. t. 647. — Caule ramisque erectis sericeis; foliis spathulato- vel ligulato-lanceolatis (flore plurimum brevioribus); floribus axillaribus solitariis longiuscule pedunculatis; pedunculis folia subaequantibus flexuoso-declinatis. ♄ — Rami villosuli. Folia sparsa opaca firmia erectiuscula, internodiis plurimum longiora spathulato-lanceolata obtusiuscula uninervia avenia, pube brevissima glandulosa obsolete canescentia subciliata subsessilia vel longius ad petioli instar attenuata, pollicaria, 3 lin. lata. Flores nutantes pedunculati axillares solitarii pauci, pedunculi folio subaequales flexuosi. Calyx corolla pluries brevior herbaceus quinqueqartitus campanulatus, segmentis erectis ovato-cuspidatis, basi imbricatis, supra distantibus. Corolla subsesquipollicaris rubicunda, intus flavo-pallens, purpureo-maculata pilosaque, pilis circa faucem densioribus, oblonga clavato-tubulosa, e fundo globoso-extumescente in faucem tubulosam constrictiorem compressiusculam, limbo longiori inaequaliter semiringente terminatam continuata, labium superius oblongum rectum, lateribus reflexis, breviter quadrifidum, laciniis acutis, duabus intermediis brevius divisis, lateralibus retrorsum obliquatis, labium inferius plurimum angustius ligulatum integrumplanum mucronatum recurvatum, intus superne glabrum. Stamina didynama imae fauci inserta ascendentia breviter exserta, antherae postice e summo margine vibrato-pensiles reniformi-didymae, loculis margine superiori connexis, pollen album granulosum. Stylus albus corollae aequalis glaber, germen continuans, curvo lenissimo ascendens, stigma simplex. Ovarium ovato-rostratum. — Crescit in Novae Hollandiae colonia New South Wales. (v. s. c.)

6. ST. LONGIFOLIUS R. Br. l. c. 517. — Foliis lanceolato-linearibus elongatis integris, apice uncinatis, adultis glabris; ramulis tomentosis; caule erecto. ♄ — Folia 3–5-pollicaria. — Crescit in Novae Hollandiae ora meridionali.

VII. (3737.) BONTIA *Plum.*

(Plum. Gener. t. 23. – Linn. Spec. plant. 890. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

1. B. DAPHNOIDES Linn. l. c. — Rami teretes glabri fusci. Ramuli dense foliosi. Folia lanceolata, basi longiuscule attenuata subpetiolata, 3–3½-pollicaria, 6–9 lin. lata integerrima, utrinque glabra subcoriacea. Pedunculi axillares fere pollicares solitarii uniflori, apicem versus incrassati. Calyx patentissimus brevissimus quinquepartitus, laciniis orbiculato-rotundatis ciliatis mucronatis subcoriaceis persistentibus. Corolla 9 lin. longa tubulosa lutea, extus punctis glandulosis creberrimis adspersa, fere ad medium bilabiata, labio superiore acute bidentato, inferiore (reflexo?) profundius trifido, tota corolla intus ad faucem usque dense purpureo-(?)barbata. Stamina 4 didynama corolla non longiora, imo tubo, longiora supra, breviora infra adnata filiformia glabra. Stylus staminibus brevior.

Drupa baccata semipollicaris, stylo persistente ornata. — *Bontia minor* Grtnr. fil. De fructib. et seminib. III. 168. t. 212? — *Bontia arborescens Thymelaeae facie* Plum. l. c. — *Bontia Laureolae facie* Dill. Hort. Eltham. 57. t. 49. fig. 57. — *Olea sylvestris Barbadensis folio angusto pingui leviter crenato* Pluk. Almath. 269. t. 209. fig. 2. — Sieb. Herb. fl. Martinic. no. 263! — Crescit in insulis Antillis. (v. s. sp.)

† *E genere excludenda.*

B. GERMINANS Linn. = AVICENNIA TOMENTOSA.

*

Genus Myoporinearum indescriptum.

VIII. **SPARTOTHAMNUS** *A. Cunningh. in Loudon, Hort. Brit. Suppl. p.* 600. — *Endl. Gener. plant. p.* 643. *adnot.* — *Meisn. Gener. plantar. vascul. II.* 201. *(Eremophilae et Pholidiae affine dicitur).*

1. *SP. JUNCEUS A. Cunningh. l. c. — ♄ — Crescit in Nova Hollandia.

Ordo CLVIII. SELAGINEAE *Juss.**)

(Juss. Ann. du Mus. d'hist. natur. VII. 71. — Choisy, Mémoires de la société d'hist. natur. de Genève II. 2. p. 71. — Endl. Gener. plant. p. 640. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

I. (3726.) **POLYCENIA** *Choisy.***)

(Choisy, Mémoir. de la sociét. de phys. et d'hist. natur. de Genève II. 2. p. 91. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 292. II. 201.)

1. P. HEBENSTREITIOIDES Choisy l. c. 91. † t. 2. fig. 1. — Caule diffuso herbaceo; foliis linearibus subdenticulatis glabris, summis apice tridentatis; bracteis ovatis obtuse apiculatis; fructibus subgloboso-didymis apiculatis. ⊙ — Caulis herbaceus ascendens ramosus, vix pedalis teres rubicundus, subpruinoso-pubescens, rami numerosi patuli aut recti. Folia linearia obliqua 4-8 lin. longa glabra, apice tridentata acutiuscula. Spicae terminales ultra pollicares densiflorae numerosae, flores alterni et quasi biseriatim dispositi. Bracteae ovato-lanceolatae acutae glaberrimae, 1¼ lin. longae. Calyx spathaeformis lineari-lanceolatus glaberrimus non scariosus, bractea paullo brevior. Corolla calyce bracteaque duplo longior, tubo brevi donata, limbo unilabiato, basi denticulis 2 lateralibus instructo, apice breviter 4-lobo, lobis obtusissimis. Stamina 4 corollae limbo breviora, 2 lateralia denticulis corollae insidentia filamentoque semilineam longo donata, 2 intermedia paullo longiora. Fructus globoso-quadrangularis quadrisulcatus bilocularis, loculis non sponte secedentibus monospermis, utrinque loculis 2 spuriis accedentibus, fructuque ideo quasi sexloculari. — Crescit in Promontorio bonae spei in arenosis prope urbem Duikervalei, inter Tafelberg et Kampsbaai et alibi. (v. s. sp.)

---

*) *Selaginearum et reliquorum omnium ordinum species novas vel indeterminatas, quibus Herbarium Regium Berolinense abundat, videndas et inquirendas* **Fr. Klotzsch,** *Herbarii Regii Berolinensis custos mihi prorsus denegavit, quod illud ad monographorum usum, nec tamen ad Synopsin elaborandam institutum esset!*

) *Errore gravissimo, vix ferendo generum Polyceniae et Walafridiae characteres in* **Meisneri *Gener. plant. vascul. I.* 292. *ita confusi sunt, ut* Polyceniae *characteres ad* Walafridiam *pertinerent et vice versa* Walafridiae *definitio ad* Polyceniam *referenda esset.*

2. P. (HEBENSTREITIA Spr. in Sieb. Hb. flor. Capens. no. 3141!) TENERA Wlprs. mss. — Caule erecto herbaceo; foliis angustissime linearibus subfiliformibus glabris integris vel hinc inde denticulo instructis, plerisque apice trilobis, lobis lateralibus brevissimis saepe evanescentibus; bracteis ovatis acuminatis; fructibus subgloboso-quadrangularibus. ⊙? — Maxime affinis *P. hebenstreitioidi* sed differt foliis angustioribus apice numquam aequaliter trilobulatis, laciniis lateralibus semper brevioribus, saepe ad denticulos reductis. — Folia 6–12 lin. longa, vix semilineam lata, glauca glaberrima solitaria vel subfasciculata. Spicae terminales laxae 1–2-pollicares. Bracteae ovatae saepe abrupte acuminatae, calyce duplo longiores. Flores inter minores albi?, filamenta pro corollae magnitudine longiuscula. — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. sp.)

3. P. FENESTRATA E. Mey. Comment. pl. Afric. Austr. I. 246. — Caule erecto herbaceo; foliis linearibus remote denticulatis glabris; bracteis ovato-lanceolatis obtusiusculis; fructu ovato acutiusculo quadrisulcato, ad commissuram submarginato, loculamentis spuriis ventre medio incompletis. ⊙? — Carpellis fenestratis inter *Polycenias* et *Hebenstreitias* ambigit. — Crescit in Promontorio bonae spei prope Duikervalei et Paarl.

4. P. (HEBENSTREITIA Thnbrg. Flor. Capens. 478??) FRUTICOSA E. M. Comment. pl. Afric. austr. I. 245. — Caule fruticuloso erecto; ramis sparsis; foliis lanceolatis dentatis glabris decurrentibus; bracteis ovatis apiculatis; fructu subgloboso-ovato sexsulcato, apice mamillari. ♄ — Rami virgati pedales — longioresque? — foliis decurrentibus angulati glabri. Folia lanceolata, basi ad folium proximum decurrentia, inaequaliter profunde aculeque inciso-dentata semipollicaria, 1½–2 lin. lata glabra glaucescentia, nervo medio subtus prominulo pilosulo. Spica semipedalis densa multiflora cylindrica. Bracteae infimae steriles lanceolatae acuminatae, fertiles ovato-subrotundae longiuscule acuminatae carnosulae virides, margine saepe infra acumen membranaceae, 3–4 lin. longae. Calyx bractea duplo brevior hyalinus membranaceus antice fissus, apice breviter aculeque tridentatus. Corolla tubulosa, tubo ultra medium fisso unilabiata, 6–8 lin. longa, limbi quadrilobi laciniis lateralibus duabus brevioribus, duabus intermediis paullo longioribus, omnibus ovalibus obtusis brevibus. Stamina 4 didynama brevissima, utrinque gemina superposita marginalia. Stylus incurvatus, inter lacinias corollae subcontortus. Stigma simplex. Fructus subrotundus brunneus bipartibilis, loculis 4 sterilibus brevioribus, duobus fertilibus longioribus unde fructus quasi umbonatus apparet, loculi steriles a fertilibus sulcis profundis discreti sunt. — Planta *Thunbergiana* vix hujus loci esse videtur. — Crescit in Promontorio bonae spei in montosis rupestribus umbrosis prope Gnadenthal. (v. s. sp.)

5. P. (HEBENSTREITIA Linn. Mantiss. pl. 420.) CORDATA E. Meyer, Comment. pl. Afric. austr. I. 245. — Caule fruticuloso ascendente; ramis subumbellatis; foliis cordatis integerrimis subcarnosis; achaeniis subalato-marginatis. ♄ — Fruticulus semipedalis ramosissimus, rami cinerascentes retrorsum strigoso-pilosuli. Folia alterna et subopposita aggregata sessilia semiamplexicaulia cordata acuta, 1½–2 lin. longa totidemque fere lata, integerrima glabra carnosa, (sed etiam crenata dicuntur), sensim in bracteas abeunt. Spicae breves densae in ramulo terminales vel in ramificationibus subsessiles. Bractea sub flore singula oblongo-ovata complicata acutiuscula carnosula, margine submembranacea, floris longitudine eumque semiincludens. Calyx tenuissime membranaceus hyalinus spathaceus antice basin usque fissus, corolla paullo brevior. Corolla tubulosa, tubo antice ultra dimidium fisso, unilabiata, limbo breviter quadridentato. Corolla infra, quantum est tubulosa hyalina, caeterum aurantiaca (nec rosea). Stamina 4 didynama, antherae 2 sessiles ad basin laciniarum corollae extimarum, et stamina 2 brevissima paullo infra labio corollae adnata. Ovarium cylindricum subcompressum biloculare biovulatum, loculis utrinque spuriis subsexloculare. Stylus basi incrassatus incurvus, stigma simplex inter lacinias corollae curvatum. Fructus......? — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus arenosis ad ostia fluminis Gariep et ad littora maris prope Port Elizabeth. (v. s. sp.)

6. P. LANCEOLATA E. Mey. Comment. pl. Afric. Austr. I. 245. — Caule subherbaceo erecto subsimplici vel ramoso; foliis lanceolatis (non decurrentibus) integerrimis vel subdentatis glabris hirtellisque; bracteis lanceolatis acuminatis; fructu elliptico-oblongo multistriato, mamilla apicali destituto. ♄? ♃? — A *P. fruticosa* certe diversa. Caulis crassior magisque herbaceus flexuosus. Rami virgati subsimplices glabri vel hirsuto-pubescentes. Folia alterna vel subopposita sessilia nec decurrentia, basi saepe attenuata lanceolata acuminata, integra vel irregulariter dentata, saepe sesquipollicaria, pleraque minora, 6–10 lin. longa, 2 lin. lata, glabra vel hirsuto-pubescentia, suprema in bracteas steriles angustas lineari-lanceolatas abeunt. Spica ante anthesin densissima ovalis, sub anthesi elongata 5–6-pollicaris multiflora. Bracteae lanceolatae acuminatae acutae glabrae vel pubescenti-hirtae, calyce fere duplo longiores. Calyx membranaceus hyalinus spathaceus antice fissus, integer vel breviter acuteque tridenticulatus. Corolla tubulosa calyce plus triplo longior, postice ad medium fissa, limbo unilabiato quadrilobo, laciniis oblongis obtusis, duabus lateralibus brevioribus. Stamina 4 didynama per paria superposita brevissima, parum supra incisuram corollae utrinque marginalia. Stylus staminum longitudine. Fructus ovali-ellipticus apice vix mamillaris, bipartibilis bilocularis, loculis spuriis evanescentibus. *α. Glabra:* — *β. Pubescenti-hirsuta:* — Crescit in Promontorio bonae spei ad Piquetberg, Port Natal et Groenevalei. (v. s.)

II. (3732.) WALAFRIDIA *E. Mey.*

(E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 272. — Meisn. Gener. plant. vasc. I. 292. [nomen et character *Polyceniae*] II. 201.)

1. W. NITIDA E. Mey. l. c. — „Fruticulus circiter pedalis ramique erecti subflexuosi, juniores foliis subdecurrentibus angulosi, ad angulos hirti. Folia ovata subcoriacea acuta vel breviter acuminata, nunc iis *Myrti communis* quoad formam simillima, nunc breviora multo latiora minusque acuta et ad basin fere subcordata. Spicae terminales, floribus sub anthesi fastigiatis, demum elongatae cylindricae. Bracteae lanceolato-acuminatae, calyce multo longiores, corollae tubo tres lineas longo breviores. Corolla caerulescens". — Folia pleraque opposita subsessilia 3–5 lin. longa, 2–3½ lin. lata. — Crescit in Promontorio bonae spei inter Gamtoosrivier et Kabeljousrivier et in rupestribus Vanstaadesberg. (v. s. sp.
2. W. TRIMERA Hochstett. Flora (B. Z.) XXVIII. 70. — Fruticosa: ramis tetragonis ad angulos pubescentibus; foliis ovatis vel ovato-lanceolatis integerrimis subtrinerviis coriaceis glaberrimis; spicis solitariis terminalibus; calyce profunde trifido. ♄ — A *W. nitida* E. M. non differt nisi calyce profunde trifido. — Crescit in Promontorio bonae spei in solo lapidoso ad latera collium Uitenhage.

III. (3727.) HEBENSTREITIA *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 770. [excl. spec.] — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

1. H. DENTATA Linn. Spec. plant. 878. — Lam. Illustr. gen. t. 521. — Bot. Magaz. t. 483. — Grtnr. De fructib. et semin. I. 138. t. 51. — Choisy, Mém. de Genève, II. 2. p. 92. (ex p.) t. 1. fig. 1. et t. 2. fig. 2. — Caule herbaceo erecto; foliis linearibus erectiusculis integris vel argute serrato-dentatis glabris; corollae laciniis apice rotundatis subaequalibus; fructu oblongo; carpello posteriori subnaviculari, anteriori quinquesulcato. ♃ — Caules adulti lignescentes, rami herbacei, tenuissime puberuli, in planta culta glaberrimi. Folia plantae spontaneae densissima, cultae laxiora, alterna subfasciculata linearia, 1–1½-pollicaria, vix lineam lata, glabra, glauca, integerrima, fere subulata vel saepius argute remoteque serrulata. Spicae plures pedunculatae in apice ramorum, pedunculi 1–1½-pollicares vix tenuissime puberuli, bracteis paucis sterilibus instructi. Spica densa cylindrica multiflora sesquipollicaris, fructifera demum elongata. Bracteae inferiores lanceolatae, superiores ovatae acuminatae acutae, margine membranaceae, tubum corollae subaequantes. Calyx bractea duplo brevior spathaceus superne fissus

hyalinus. Corollae intense luteae tubus longiuscule connatus, postice fissus, limbo breviter obtuseque quadrilobo, macula oblonga, intense singuinea picto. Stamina 4 brevissima infra limbi lacinias utrinque marginalia. Stylus staminibus brevior. Fructus drupaceus pallide brunneus sexsulcatus suberosus, obsolete 6-locularis monospermus, loculis 5 abortientibus subevanescentibus. Planta culta a spontanea recedit foliis longioribus nec latioribus laxioribus, spicis non pedunculatis laxioribus longioribusque, bracteis longioribus floribusque majoribus, laciniis labii profundioribus ellipticis obtusis, nec abbreviatis rotundatis.

α. Foliis ubique dentatis. — *Pedicularis foliis angustissimis dentatis, floribus spicatis* Burm. Afric. 114. t. 42. fig. 2. — *Valerianella Africana foliis angustis, flore macula rubicante notato* Commel. Hort. Amstelod. II. 217. t. 109. — *Hebenstreitia pulchella* Salisb. Prodr. 93?

β. Foliis apice tantum dentatis.

γ. Foliis integerrimis. — *Hebenstreitia integrifolia* Linn. Spec. pl. 878. — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus ad ostia fluminis Omsamcaba, in montosis humidis Katberg et alibi. (v. s. sp. et cult.)

2. H. SCABRA Thnbrg. Flor. Capens. 477. — „Foliis linearibus integris ciliato-scabris, spicae bracteis integris glabris. ♃ — Caulis herbaceus villoso-scabridus flexuoso-erectus simplex vel parum ramosus pedalis. Folia sparsa obtusa tenuissime ciliata frequentia incurva unguicularia. Spicae terminales erectae digitales. Bracteae ovatae incurvatae." — Planta hujus nominis hortensis ad praecedentem certe pertinet. — *H. scabra* Spr. in Sieb. Herb. fl. Capens. 484. est *Selago leptostachya* E. M. — Crescit in Promontorio bonae spei.

3. H. ROBUSTA E. Mey. Comment. de pl. Afric. Austr. I. 246. — Endl. Iconogr. gener. plant. t. 76. — Caule fruticoso erecto; foliis lineari-lanceolatis subintegerrimis; corollae laciniis oblongis, lateralibus latioribus subfalcatis; antheris caeruleis; fructu subgloboso; carpello posteriori naviculari, anteriori quinquesulcato. ♃? — Species distinctissima, *H. dentatae* proxima sed multo major atque robustior. Fructus pisum minus adaequans. Color antherarum coeruleus huic soli competit. — Folia 3–5 lin. longa carnosula subintegerrima subfalcata obtusa. Spicae densae multiflorae terminales, basi laxiores. Bracteae ovato-lanceolatae breviter acuminatae margine membranaceae. Calyx bractea parum brevior spathaceus hyalinus. Corolla bractea duplo longior, limbus macula sanguinea notatus. — α. Caule, foliis, bracteisque canescenti-hirtis. — β. Caule rhachique hirtellis; foliis bracteisque glabris. — Crescit in Promontorio bonae spei in arenosis inter Jakhalsrivier et Olifantsrivier, inter Pikenierskloof et Pretoriskloof alibique. (v. s. sp.)

4. H. TENUIFOLIA Schrad. Catal. Hort. Goetting. ex Rchb. Hort. botanic. II. 13. t. 133. (excl. synon.) — Caule herbaceo erecto; foliis angustissime linearibus subintigerrimis latis glabris; corollae laciniis sublanceolato-linearibus subaequalibus; fructu oblique ovato, carpello posteriori naviculari, anteriori quinquesulcato. ⊙? ♃? — Herba a basi ramosa ascendens pedalis saturate et glauco-virens glaberrima. Caulis teres striatus, basi cum radice sublignosus patentim ramosus. Folia angustissime linearia obtusiuscula crassiuscula, plurima integerrima, alia obtuse paucidentata, juniora tantum tenuissime pilosula. Spicae terminales cylindricae (in specimine spontaneo laxissimae). Bracteae ovato-acuminatae, margine membranaceae, corollae tubo duplo breviores. Calyx spathaceus hyalinus acutus, bractea duplo brevior. Corolla curvula tubulosa flavescens, limbo albo ascendente quadrifido, laciniis subaequalibus, exterioribus paullo latioribus, macula miniato-coccinea in medio limbo. Stamina 4 brevissima didynama infra lacinias limbi corollini utrinque marginalia. Stylus subulatus staminibus brevior e corollae incisura exsertus reflexus. Fructus pallide brunneus grano secalino paullo minor, sexsulcatus monospermus. — Pro sola varietate *H. dentatae* habeo. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus prope Mierenkasteel et inter Koussie et Zilverfontein. (v. s. c.)

5. H. AUREA Andrws. Bot. Reposit. t. 252. — E. Mey. Comment. pl. Afric. Austr. I. 248. — Caule herbaceo erecto; foliis filiformibus glabris patulis; corollae laciniis oblongis inaequalibus; fructu oblongo; carpello posteriori naviculari, anteriori marginato-alato levissime sulcato. ♃ — Species foliis teretiusculis, supra sulco medio insculptis ab *H. dentata* (quacum conjunxit *Choisy*, Mém. de Genève II. 2. p. 92.) diversissima. Caules ramique subradicales simpliciusculi virgati. — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus prope Visehbaai.

6. H. FRUTICOSA (Linn. Supplem. 287?) Sims, Bot. Magaz. t. 1970. — Multicaulis: caulibus suffruticosis ascendentibus; foliis linearibus dentato-pinnatifidis recurvatis glabris; bracteis infimis foliaceis, superioribus ovatis; corollae laciniis intermediis linearibus, lateralibus subaequilongis oblique ovatis; fructu oblongo; carpello posteriori subnaviculari, anteriori quinquesulcato. ♃ — Rami virgati pedales glaberrimi pallidi. Folia denso aggregata fasciculata angustissime lineari-lanceolata, basi integerrima attenuata, caeterum argute serrulato-denticulata carnosula glabra glauca recurvata (sed pinnatifida ea non appellarem), tres lineas longa, semilinea vix latiora. Spica terminalis densa, basi laxiuscula 3-4-pollicaris. Bracteae inferiores foliis omnino conformes, corollam superantes, superiores ovatae acuminatae acutae integerrimae, corolla breviores. Calyx spathaceus hyalinus, dorso virescens, ovalis acutus corolla ultra duplo brevior. Corollae tubus intense luteus, limbo aurantiaco, macula sanguinea instructo, limbi laciniae intermediae angustissime lineares, lateralibus parum longiores. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus montosis prope Ezelsfontein et Modderfontein, ad Drakensteensbergen et alibi. (v. s. sp.)

7. H. MACRA E. Mey. l. c. — Caule herbaceo ascendente, foliis angustissime linearibus laxis; corollae tubo bractea ovato-lanceolata breviore, limbi laciniis intermediis linearibus, lateralibus oblique subovatis brevioribus; fructu oblique oblongo; carpellis subaequalibus exsulcatis, posterioris marginibus magis expansis amplectentibus, iis anterioris ventrem versus contractis. ♃ — Haec et sequentes ab antecedentibus differunt carpellis minus inaequalibus vel etiam aequalibus, ita tamen, ut certi limites desiderentur. — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus asperis prope fluvium Klein Vischrivier.

8. H. PARVIFLORA E. Mey. l. c. 249. — Caule herbaceo ramosissimo; foliis angustissime linearibus integerrimis glabris laxis; corollae tubo bracteam ovatam vix aequante, limbi laciniis oblongis subaequalibus; fructu oblongo; carpellis subaequalibus dorso trisulcatis, posterioris marginibus amplectentibus, iis anterioris ventrem versus contractis. ⊙? — Herba 1½-6-pollicaris ramosissima glabra, rami oppositi vel alterni purpurascentes. Folia semipollice numquam longiora, saepius breviora, semilinea angustiora, obtusa, carnosula, integerrima vel hinc inde remote obsoleteque paucidenticulata. Spicae terminales brevissimae pauciflorae vel elongatae multiflorae ad tres pollices usque longae. Bracteae ovatae acuminatae carnosulae. Calyx bractea parum brevior spathaceus antice longitudinaliter fissus integer. Corolla minima alba, limbo quadricrenato (lacinias 4 oblongas videre non possum); stamina 4 didynama, utrinque marginalia. Stylus recurvatus staminibus brevior. — Crescit in Promontorio bonae spei inter Koussie et Zilverfontein, Ezelsfontein et Modderfontein, Nieuweveldsbergen et alibi. (v. s. sp.)

9. H. VIRGATA E. Mey. l. c. — Caule suffruticuloso virgato; foliis filiformibus scabris; corollae tubo bracteam lanceolatam superante, limbi laciniis oblongo-linearibus subaequalibus; fructu oblongo-didymo, carpellis subaequalibus teretiusculis. ♃ — Habitus fere *H. aureae*. — Crescit in Promontorio bonae spei.

10. H. HAMULOSA E. Mey. l. c. — Caule herbaceo erecto; foliis angustissime linearibus integerrimis bracteisque inferioribus foliaceis, superioribus lanceolatis medio refractis; corollae bractea brevioris laciniis abbreviatis subaequalibus; fructu ovato-didymo; carpellis subaequalibus teretiusculis. ♃ — Planta palmaris, spicis fere a radice incipientibus et bracteis hamatis distinctissima. — Crescit in Promontorio bonae spei prope Karakuis.

11. H. DISCOIDEA E. Mey. l. c. — Caule herbaceo erecto; foliis angustis subtridactyloideis; corollae tubo bracteam ovato-lanceolatam superante, limbi laciniis oblique ovatis subaequalibus; filamentis anthera longioribus; fructu orbiculato averso ad margines incrassato seminifero, medio membranaceo. ♃ — Fructus loculamenta teretia incurvata sunt, ita, ut basi et apice sint contigua, medio remota, nec nisi membrana duplici cohaerentia, juniora arcte cohaerent, an demum sponte secedunt? — Crescit in Promontorio bonae spei.

12. H. COMOSA Hochstett. Flora (B. Z.) XXVIII. I. 70. — Herbacea erecta: ramis teretibus virgatis tenuissime puberulis vel glaberrimis; foliis sessilibus oblongo-lanceolatis vel lineari-oblongis, basi trinerviis, integris vel antice argute serrulatis; spica terminali solitaria stricta densissima cylindrica; bracteis ovato-lanceolatis acuminato-subulatis corollam subsuperantibus, ante anthesin densissime imbricatis comosis. ♃ — Habitus fere *Polyceniae lanceolatae.* Rami virgati herbacei teretes striati glabri vel tenuissime puberuli. Folia pollicaria vel sesquipollicaria, 3-4½ lin. lata glabra glaucescentia sessilia, nec decurrentia obtusa, integra vel a medio apicem versus argute serrulato-denticulata, alterna solitaria subremota, superiora minora. Spica terminalis quinquepollicaris densa cylindrica multiflora, floribus inferioribus remotiusculis, superioribus densis. Rhachis profunde sulcata. Bracteae ovato-lanceolatae longiuscule subulato-acuminatae, 3-4 lin. longae, ante anthesin densissime imbricatae comosae, glabriusculae concavae, corolla saepe parum longiores saepeque subbreviores. Calyx spathaceus bractea duplo brevior. Corolla aurantiaca? postice longitudinaliter fere basin usque fissa unilabiata, laciniis limbi brevissimis rotundatis. Achaenia (immatura) aequalia semiteretia coalita, calyce inclusa eoque parum longiora. — Fructus maturus forte *Polyceniae??* — Crescit in Promontorio bonae spei circa Natal-Bay. (v. s. sp.)

† *Species indescriptae.*

H. FASTIGIATA Jarosz. — In Promontorio bonae spei.
H. REPENS Jarosz. — In Promontorio bonae spei.

†† *Species e genere expellendae.*

H ALBA Jcq. = DISCHISMA CILIATUM.
H. ALBIFLORA Lnk. = DISCHISMA CILIATUM.
H. CAPITATA Thnbrg. = DISCHISMA CAPITATUM.
H. CHAMAEDRYFOLIA Lnk. = DISCHISMA CHAMAEDRYFOLIUM.
H. CILIATA Linn. = DISCHISMA CILIATUM.
H. CORDATA Linn. = POLYCENIA CORDATA
H. ERINOIDES Thnbrg. = DISCHISMA CHAMAERYFOLIUM??
H. FRUTICOSA Thnbrg. = POLYCENIA FRUTICOSA??
H. HISPIDA Lam. = DISCHISMA CILIATUM.
H. SCABRA Spr. = SELAGO LEPTOSACHYA.
H. SPICATA Thnbrg. = DISCHISMA SPICATUM.
H. TENERA Spr. = POLICENIA TENERA.

IV. (3728.) **DISCHISMA** *Choisy.*

(Choisy, Mémoires de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. pag. 93. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 292. II. 201.)

1. D. FLACCUM E. Mey. Comment. plant. Afric. austr. I. 250. — Foliis anguste lanceolatis serrato-dentatis, basi integerrimis cuneatis; spicis laxis; bracteis ovato-lanceolatis ciliatis corollae tubum subaequantibus; fructu ovato ad commissuram marginulato. ♃ — Caules vix spithamaei ramique ascendentes flexiles sparse minutissimeque asprelli. Folia 9 lin. longa, lineam lata saepeque minora lanceolata, apicem versus serrato-dentata vel integerrima, glabra. Spicae terminales multiflorae breves, pollicares. Bracteae ovatae concavae abrupte longeque acuminatae, corolla parum breviores. Calycis diphylli foliola lanceolato-linearia acuta bractea breviora, margine membranacea. Corolla alba? Fructu ad com-

missuram non contracto sed in marginem protruso ab omnibus reliquis speciebus discedit. — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus arenosis prope Port Elizabeth (v. s. sp.)

2. D. CILIATUM Choisy, Mémoires de la soc. de phis. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 94. — Fruticosum: caule, ramis, foliis, bracteis calycibusque sparse albo-pilosis; foliis angustissime linearibus alternis fasciculatisque integris saepiusve acute dentato-incisis; spicis terminalibus elongatis cylindricis; bracteis lanceolato-linearibus corollam subaequantibus, demum elongatis, apice recurvatis. ♃ — Frutex pedalis, apicem versus corymboso-ramosus. Folia pleraque 6–9 lin. longa, etiam breviora, linea non latiora integerrima vel supra medium acute serrato-dentata, glabra vel sparse piloso-ciliata carnosula. Spicae cylindricae saepe quadripollicares. Bracteae e basi latiori lanceolato-lineares hirsuto-pubescentes 3 lin. longae corollam subaequantes, fructiferae saepe semipollicares, apice recurvatae. Corolla pure alba 4½ lin. longa, tubo longo gracili filiformi post anthesin sensim sensimque longitudinaliter fere basin usque rumpente, limbi laciniis ellipticis obtusis, duabus lateralibus brevioribus profundioribusque. Stylus sub anthesi longitudine fere staminum, demum elongatus corolla longior. Fructus cylindricus drupaceus bilocularis, loculo altero interdum sterili evanescente. — *Hebenstreitia ciliata* Linn. Mantiss. plant. 420. — *H. albiflora* Lnk.! Enumer. pl. hort. II. Berol. 124. — *H. erinoides* Bergius mss. — *H. alba* Jcq. Eclog. pl. II. t. 151.

β. Caule bracteisque glanduloso-hispidis. — [*Hebenstreitia erinoides* Linn. Supplem. 286?]

γ. Spica longissima, tubo corollae filiformi longiori, caule hispidiore. — Verosimiliter distincta species. — *Ranunculus foliis inferioribus multifidis, superioribus simplicibus dentatis, floribus spicatis* Burm. Afric. 109. t. 41. fig. 1. — *Melampyrum Africanum spicatum, foliis angustissimis dentatis* Herm. Afric. 116. — *Hebenstreitia ciliata* Berg. Flor. Capens. 154. — *H. hispida* Lam. Encycl. III. 78. — Diagnosis *Meyeriana* (Comment. pl. Afr. I. 250.) fere tot mendis quam verbis composita est. — [Sieb. Hb. fl. Capens. no. 145!] — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus ad Wynberg, Paarlberg, Nieuwekloof, ad fluvium Zondereinde alibique. (v. s. sp. et c.)

3. D. CHAMAEDRYFOLIUM Wlprs. mss. — Fruticosum: caule, ramis, foliis, bracteis calycibusque sparse albo-pilosis hirsutisve; foliis alternis oppositisque obongo-lanceolatis sessilibus, basi integerrima longe attenuatis, a medio grosse acuteque serratis; spicis terminalibus elongatis cylindricis; bracteis lanceolato-linearibus acutis corollam subaequantibus; stylo sub anthesi corollam aequante, demum superante. ♄ — Toto habitu praecedenti simillimum, differt foliis ultra duplo longioribus latioribusque bracteis post anthesin non elongatis stylisque jam sub anthesi corollae longitudine. — Folia 1–2-pollicaria ad 3 lin. lata vel latiora, omnia a medio apicem versus grosse acuteque inciso-dentata, superiora minora, saepe in axilla florem singulum gerentia, supra glabra, infra sparse pilosula. Spicae 1–5-pollicares cylindricae multiflorae, infra laxiores; bracteae inferiores semper dentatae, superiores sensim integerrimae lanceolato-lineares, apice recurvatae pubescentes ciliatae, corollam subaequantes. Calycis sepala lanceolata membranacea, bractea saepe duplo breviora. Corollae pure albae tubus filiformis gracilis, limbus quadrilobus unilabiatus, laciniis oblongo-ellipticis obtusis, duabus lateralibus paullo brevioribus profundioribus. Stylus demum elongatus. Fructum non vidi. — *Hebenstreitia chamaedryfolia* Lnk. Enumer. plant. hort. Berol. II. 125. — *H. erinoides* Thnbrg. Flor. Capens. 478? Linn. Suppl. 286?*) — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. cult.)

---

*) *HEBENSTREITIA ERINOIDES Thnbrg. Flor. Cap. 478. — „Foliis lanceolato-oblongis serratis pilosis; bracteis integris ciliato-hispidis. ♄ — Caulis frutescens villoso-hispidus erectus ramosus. Folia oblonga utrinque attenuata obtusiuscula villosa patentia unguicularia. Spica florum ovata densa. Bracteae lanceolatae villoso-ciliatae.“ — Crescit in Promontorio bonae spei.*

4. D. ARENARIUM E. Meyer, Comment. pl. Afric. austr. I. 251. — Pusillum annuum: cauliculis foliisque paucis linearibus integris denticulatisque araneoso-lanuginosis; spicis solitariis pluribusve subcorymbosis ovatis; bracteis late ovatis carinatis, abrupte acuminatis ciliatis florem superantibus. ☉ — Plantula ½-2-pollicaris simplicissima vel corymboso-ramosa, folia pauca 3-4 lin. longa vix semilineam lata. Spicae solitariae, plantula tunc simplicissima, vel corymbosae, ovatae densae 3-5 lin. longae. Bracteae ovato-rhombeae acuminatae, dorso glabrae, ciliatae, flore longiores. Calycis sepala brevissima elliptica obtusa membranacea. Corolla minima alba. Fructus cylindricus utrinque truncatus bilocularis, ad carpellorum commissuram paullo constrictus. — E. Meyer habet pro varietate *D. ciliati* iniquitate loci natalis profecta. — Crescit in Promontorio bonae spei in ripa arenosa lacus salsi Roodepan. (v. s. sp.)

5. D. LEPTOSTACHYUM E. Mey. l. c. — Foliis linearibus subintegerrimis glabris; spicis elongatis; floribus remotiusculis; bracteis e basi latiori lanceolatis villoso-ciliatis corollae tubo longioribus. ♄ — Habitus fere *Gnaphalii sylvatici*. Caules, folia (parcius) et bracteae pubescentia alba araneosa obsiti. Fruticulus 9-pollicaris virgato-ramosus. Folia 7-10 lin. longa, lineam lata, integerrima vel apice paucidentata, carnosula glabrescentia vel juniora araneosa, acuminata vel obtusiuscula. Spicae quinquepollicares filiformes, tenues, flores laxiusculi arcte adpressi. Bracteae e basi latiori lanceolatae integerrimae araneosae, corollae tubo longissimo breviores. Calycis corolla duplo brevioris sepala anguste lanceolata membranacea ciliata. Corollae albae tubus longissimus, demum longitudinaliter postice fissus, limbus unilabiatus breviter quadrilobus, laciniis angustis linearibus, lateralibus brevioribus. — Crescit in Promontorio bonae spei inter Goedemanskraal et Kaus, in arenosis inter Pikenierskloof et Pretoriskloof. (v. s. sp.)

6. D. SPICATUM Choisy, Mémoir. de la soc. de phys. et d'hist. natur. de Genève II. 2. p. 94. — Pusillum annuum simplicissimum: foliis linearibus, superne denticulatis, ad basin angustissimis, subvillosis; spicis cylindricis; bracteis ovalibus abrupte acuminatis ferrugineo-villosis, acumine glabro; corollae tubo bracteam paullo superante. ☉ — Planta tripollicaris simplicissima vel ramosa?, fere ex infimorum foliorum axillis florifera, piloso-hispidula. Folia 6-9 lin. longa, angustissime linearia, integerrima vel apice denticulata, fasciculata. Spica 2½-pollicaris crassiuscula cylindrica densa multiflora. Bracteae demum divaricato-patentes, corolla alba? parumper breviores. Sepala brevissima membranacea elliptica, ferrugineo-pubescentes. — *Hebenstreitia spicata* Thbnrg. Prodr. fl. Capens. 103. — Crescit in Promontorio bonae spei in montosis prope Honigvalei, Giftberg et ad ostia fluminis Garip in arenosis. (v. s. sp.)

7. D. CAPITATUM Choisy l. c. 94. — Annuum, simplicissimum vel diffuse ramosum, demum subaphyllum: caule, ramis foliisque linearibus, apice denticulatis pilosulis; spicis breviter pedunculatis corymbosis subcapitatis vel cylindricis densissimis compactis; bracteis subrotundo-ovatis ciliatis longe abrupteque acuminatis squarrosis, acuminibus integris denticulatisque, basi vaginante florem subaequante. ☉ — Herbula pusilla pollicaris simplicissima monocephala, habitu *D. arenarii*, vel prostrata adscendensve 2-8-pollicaris ramosissima, foliis demum deciduis subaphylla. Caules ramique teretes purpurascentes corymbosi subfastigiati. Folia angustissima semipollicaria vel minora. Spicae capitatae semipollicares, vel cylindraceae 1¼-pollicares crassissimae. Bracteae pars vaginans 3 lin. longa membranacea, acumen foliaceum saepe semipollicare, rigidum squarroso-patens. Flores a me non visi sunt. Fructus pallidus cylindraceus utrinque truncatus, in achaenia duo demum sponte secedens. — *Hebenstreitia capitata* Thnbrg. Prodr. flor. Capens. 183. et Flor. Capens. 477. — *Selago hispida* Sieb. Herb. fl. Capens. 375. (nec Thbnrg.) — Crescit in Promontorio bonae spei in arenosis prope Paarl et Ebenezar. (v. s. sp.)

8. D. CLANDESTINUM E. Mey. l. c. — Annuum, ramosissimum diffusum hispido-pubescens: foliis angustissime linearibus integerrimis vel apice paucidentatis,

basi pubescentibus ciliatis, floralibus basi dilatata membranacea florem includentibus, floribus minimis in axillis foliorum supremorum arcte adpressorum absconditis. ⊙ — Valde suspicor hanc non esse veram speciem, sed varietatem praecedentis cultura locisque humidis sponte ortam, video enim ramum genuini *D. capitati* plantae nostrae haud dissimilem. Herba 3–6-pollicaris ramosissima. Folia pleraque semipollicaria, maxima pollicaria, angustissima integerrima vel (in specim. culto) apice denticulata. Flores minimi albi. Fructum non vidi. — *Hebenstreitia capitata* Hort. Berolin. (nec Thnbrg.) — Crescit in Promontorio bonae spei in arenosis ad fluvium Haazenkraalsrivier. (v. s. sp. et cult.)

V. (3731.) SELAGO *Linn.*

(Linn. Gener. plant. 710. 769. [excl. spec. pl.] — Meisn. Gener. plantar. vascular. I. 292. II. 201.)

Sectio I. EUSELAGO Endlich. Gener. pl. p. 651.

Calyx pentamerus, laciniis dentibusve subaequalibus vel duobus anticis paullo longioribus, interdum fere ad basin inter se distinctis.

§. 1. *Fruticuli ramosi: foliis solitariis alternis subacicularibus, saepe imbricatis; spicis terminalibus erectis subsolitariis; calycibus liberis profunde quinquefidis hirsutis ciliatisve, laciniis subaequalibus obtusiusculis.*

1. S. TRIQUETRA Thnbrg. Flor. Capens. 461. — Glabra vel vix puberula, fruticosa ramosissima: ramis tenuibus filiformibus; foliis subtrigonis obtusis, basi imbricatis, superne recurvatis; spicis ovatis, demum oblongis; bracteis trigono-oblongis appressis; calycis tubo subplicato, laciniis subaequalibus obtusiusculis ciliatis. ♄ — Fruticulus 9-pollicaris ramosissimus, ramulis subumbellatis vel secundis, annotini foliorum delapsorum basi persistente nodulosi, fusci glabri, apice subspinosi. Folia carnosula subtriquetra, lineam longa, dense imbricata, apice recurvata viridia glabra vel vix puberula. Spicae in apice ramulorum sessiles solitariae breves, semipollice nunquam longiores. Bracteae — non trigono-oblongas sed lineari-trigonas eas appellarem — calyce paullo longiores appressae; calyx plicatus subinaequaliter 5-denticulatus, laciniis brevibus subulatis. Corolla alba? tubulosa, tubo calycem duplo excedente, laciniis limbi brevibus ellipticis obtusis. Stamina breviter exserta. — *Selago diffusa* Sieb. Herb. flor. Capens. no. 327! (nec Thnbrg.) — *Selago divaricata* Choisy, Mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 99? (nec Thnbrg., qui plantam foliis fasciculatis descripsit), caeterum Choisy plantae suae calycem et corollam semper quadrifidos tribuit, quos semper quinquefidos vidi. — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. sp.)

2. S. ERICINA E. Mey. Comment. de pl. Afric. austr. I. 254. — Ramis irregulariter sparsis puberulis; foliis subtrigonis obtusis imbricatis vernicatis; spicis cylindricis; bracteis subtrigono-oblongis; calycis tubo subplicato, laciniis subaequalibus obtusiusculis ciliatis. ♄ — Fruticulus humilis semipedalis virgato-ramulosus. Folia sesquilinearia crassiuscula obtusa subtrigona adpressa vel patentia. Spicae filiformes densae pollicares multiflorae. Flores parvi albi. Bracteae foliaceae, basi paullo latiores tubum corollinum subaequantes. Calyx pallidus subplicatus obtuse et subaequaliter 5-dentatus, dentibus ciliatis costaeformibus. Corolla alba infundibuliformi-tubulosa glabra, laciniis limbi ovalibus obtusis. Genitalia inclusa. Drupa calyce subinclusa minima pyriformis bilocularis disperma. — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. sp.)

3. S. COMOSA E. Mey. l. c. 255. — Ramis elongatis flexuosis pubescentibus; foliis oblongis, nervo medio subtus incrassatis, obtusis imbricatis glabris; spicis elongatis flexuosis; bracteis oblongo-lanceolatis hirsutis; calycis hispiduli laciniis acuminatis, posteriore sublongiore. ♄ — Flores superiores sero, ut videtur, aperiuntur, quo fit ut eorum bracteae ut in *Polygala comosa* diu comam sistant. — Crescit in Promontorio bonae spei in graminosis prope Kovi.

4. S. GLUTINOSA E. Mey. l. c. — Ramis subumbellatis glabris; foliis subacicularibus confertis patulis vernicatis; spicis elongatis cylindricis terminalibus; bracteis folia simulantibus; calycibus turgidis profunde quinquefidis villosis, laciniis conniventibus obtusiusculis ciliatis. ♄ — Fruticulus fere pedalis ramosissimus, rami subumbellati breviter virgati spicaque terminati. Folia densa subimbricata, erecto-patentia glabra, acicularia 3 lin. longa. Ramuli annotini foliorum basi persistente nodulosi. Spicae terminales 9–18 lin. longae, (juniores nondum evolutae insecti cujusdam aculeo punctae difformes monstrosae) densae multiflorae. Bracteae omnino foliis conformes, calyce duplo longiores, corollae tubum subaequantes. Calyx subgloboso-campanulatus subaequaliter quinquedentatus villosus, dentibus obtusiusculis ciliatis. Corolla tubulosa infundibuliformis pallide alba glabra, tubo quam bractea paullo longiore, limbi laciniae parvae ovales obtusae. Stamina et stylus exserta vel stamina 2 breviora subinclusa. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus Cederbergen, Roodeberg et Modderfonteinsberg. (v. s. sp.)

5. S. PINEA Lnk. Enumer. pl. hort. Berolin. II. 123. — Ramis sparsis subfastigiatis glabris; foliis acicularibus confertis laxis subvernicatis; spicis cylindricis; bracteis basi ovatis longe acuminatis hirsutis; calycibus profunde quinquefidis hirsutis, laciniis obtusis conniventibus. ♄ — Frutex 2–3-pedalis, rami pubescentes. Folia conferta at non imbricata 4–6 lin. longa, sub lente angustissime linearia anguste marginata. Spicae densae, bracteae foliaceae flores superantes. Corollae laciniae acutae. — (Errore typographico in Lnk. Enumer. II. 122. legitur *S. spinea*). — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus Roodezand.

6. S. PINGUICULA E. Mey. Comment. pl. Afr. austr. I. 255. — Ramis sparsis puberulis; foliis confertis angustissime linearibus oblongisve crassiusculis obtusis patulis; spicis oblongis; bracteis ovatis ciliatis; calycibus profunde quinquefidis, laciniis ciliatis lanceolatis, postrema ovata. ♄ — Fruticulus erectus 5-pollicaris ramosissimus, ramuli purpurascentes nodulosi glabri. Folia tres lineas longa, $^3/_4$ lin. lata plana carnosula lineari-lanceolata vel oblonga, margine revoluta, glauca glabra. Spicae terminales densae breves. Bracteae ovatae acutae concavae ciliato-pubescentes. Flores a me non visi sunt. — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. sp.)

§. 2. *Herbae suffruticosae multicaules: caulibus saepe simplicibus; foliis solitariis alternis latiusculis; spicis terminalibus ante anthesin nutantibus, postinde parum elongatis; calycibus liberis puberulis ciliatisve profunde quinquefidis, fissura anteriori fere ad basin producta, tubo subplicato, laciniis subaequalibus obtusiusculis.*

7. S. HETEROPHYLLA Thnbrg. Flor. Capens. 463. — Glabra: caulibus ima basi ascendentibus, inferne dense foliosis, superne nudiusculis; foliis lineari-lanceolatis acutis denticulatis subheteromallis; spicis subglobosis, demum oblongis; bracteis subspathulato-linearibus ciliatis; calycis subplicati laciniis linearibus, margine pellucidis subciliolatis. ☉ — „Herba erecta glabra spithamaea. Folia radicalia ovata serrata, caulina linearia denticulata unguicularia. Caules saepius simplicissimi.“ — Crescit in Promontorio bonae spei prope Ezelsbank.

8. S. APICULATA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 256. — Caulibus ascendentibus, undique foliosis puberulis; foliis obovatis obtusis denticulatis crassiusculis glabris; spicis ovatis; bracteis late obovatis apiculatis ciliatis coloratis; calycis plicati laciniis ellipsoideis, margine pellucidis ciliolatis. ♄ — Fruticulus semipedalis ramosus, rami simplices erecti virgati dense foliosi. Folia inferiora semper opposita, suprema alternantia, obovata, basi angustiora integerrima, apice obtusa vel acuminata, denticulata carnosula glabra glauca, 3–5 lin. longa, 2 lin. lata, superiora laxiora, alterna angustiora lanceolata. Spica densa compacta oblonga subcapitata terminalis solitaria magnitudine *Cerasi minoris* multiflora. Bracteae

inferiores foliaceae serrulatae glaucae, superiores purpurascentes obovatae apiculatae integerrimae breviter ciliatae, corolla parum breviores. Calyx membranaceus tubuloso-plicatus bractea parum brevior eique appressus quinquedentatus, dentibus ellipsoideis obtusis, ciliolatis. Corolla alba. — Crescit in Promontorio bonae spei summis montibus Witbergen. (v. s. sp.)

9. S. CEPHALOPHORA Thnbrg. Flor. Capens. 464. — Hirsutiuscula: caulibus ima basi ascendentibus; foliis distantibus, radicalibus lanceolato-oblongis in petiolum elongatum attenuatis serrato-dentatis, superioribus sessilibus sublinearibus integerrimis; spicis ovatis; bracteis lanceolato-ovatis hispidulis; calycis plicati laciniis oblongis pellucidis puberulis. ⊙ — Planta *Thunbergiana* a *Meyeriana* (Comment. I. 256.) differt villositate omnium partium, at eadem esse videtur. Caules basi decumbentes simplices vel parum ramosi ascendentes spithamaei. Folia alterna semipollicaria, superiora minora angustiora. Corollae limbus eleganter aurantiacus. — Crescit in Promontorio bonae spei in praeruptis graminosis prope Witbergen.

§. 3. *Herbae annuae vel perennantes: foliis latioribus vel omnibus vel saltem inferioribus oppositis; spicis solitariis compositisve; calycibus liberis hirsutis quinquefidis vel quinquedentatis, tubo tereti cum fructu aucto; corollis minutissimis.*

10. S. CORDATA Thnbrg. Flor. Capens. 464. — Multicaulis procumbens ramulosa pubescens: foliis inferioribus oppositis subcordato-ovatis serrato-dentatis, basi cuneatis petiolatis; spicis in apicibus ramulorum abbreviatis densifloris; bracteis ovatis florem superantibus; calycibus ad medium quinquefidis hirsutiusculis ciliatis, corollae tubum subaequantibus. ⊙ — Planta admodum variabilis. Radix subsimplex multicaulis, caulibus subfiliformibus tenuissimis saepeque pennam passerinam crassitie aequantibus spithamam longis procumbentibus, ramulis floriferis saepe frequentissimis brevissimis. Folia inferiora cum petiolo subsemipollicaria in speciminibus tenuioribus tenuissime membranacea viridia puberula, in rigidioribus crassiuscula, serraturae infimae profundiores, superiores sensim diminutae, folia superiora sensim angustiora subintegerrima, saepe alterna. Spicae capituliformes, floribus minutis albicantibus vel subcoerulescentibus. Carpella immatura medio non farcta, sed fere cava sunt. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus ad montem Roodeberg, Nieuweveldsbergen et in rivulo quodam exsiccato prope Zuureplaats. (v. s. sp.)

11. S. HAMULOSA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 257. — Minima herbacea: caule erecto solitario ramoso puberulo; foliis oppositis lanceolatis, basi cuneato-attenuatis, ramulis omnibus spicigeris; spicis erectis tenuibus, floribus alternis sessilibus; bracteis basi ovatis carinatis acuminatis, apice retrorsum subhamatis flore longioribus; calycibus pubescentibus citra medium quinquefidis corollam minimam subaequantibus. ⊙ — Herba tenera 2–2½-pollicaris, habitu quodammodo refert *Lythri hyssopifolii* specimina minora, radice simplice filiformi fibrillosa. Caulis solitarius ramulosus, purpurascens vix puberulus, ramulis erectis brevibus mox floriferis, cauli caeterum similibus. Folia opposita, basi longe angustata lanceolata, interdum subfalcata, semipollicaria vel parum longiora, lineamque lata obtusa, integerrima vel denticulo uno alterove obsoleto apicem versus notata, carnosula viridia glabra. Spica terminalis et ramuli saepe per totam suam longitudinem florigeri. Bracteae patentes nec imbricatae, basi ovatae ferrugineo-puberulae sensim acuminulatae concavae, acumine hamato-reflexo saepeque recto. Calyx minimus ovalis, profunde quinquefidus puberulus, dentibus triangularibus ciliatis conniventibus, corollam minimam subincludentibus. Corollae limbus luteus. Carpella calyce vix longiora laevia, intus farcta. — Crescit in Promontorio bonae spei in graminosis prope Haazenkraalsrivier. (v. s. sp.)

12. S. HIRTA Thnbrg. Flor. Capens. 464. (nec Choisy.) — E. Mey. l. c. 258. — Herbacea minima: caule solitario erecto spicisque incano-villosis; foliis oppositis

ellipticis serratis petiolatis glabriusculis; spicis compositis terminalibus subaphyllis elongatis; bracteis late ovatis acuminatis, basi concavis, apicibus rectis florem superantibus; calycibus quinquedentatis corollae minimae tubum aequantibus; carpellis transversim rugosis. ⊙ — „Thunbergium sub *S. hirta* hanc nec *S. fasciculatae* varietatem hirtam intellexisse, cuique ejusdem descriptionem cum planta utraque comparanti patebit. Habitus omnino *S. hamulosae.* Sed caulis, spicarum rhachis bracteae calycesque dense vestiti pilis longis albis, basi complanatis decumbentibus, apice attenuatis flexuosis, unde partes dictae videntur hirtae licet tactu molles sint. Foliorum paria duo vel quatuor tunc spicae alternae plures erectae digitales. Calyces circa fructum subinflati, demum saepe in duas partes, alteram anteriorem, alteram posteriorem rupti. Corollae luteae limbus minimus, ut in antecedente, sed tubus paullo longior, unde limbus magis in conspectum venit. Ab omnibus tamen speciebus hucusque cognitis differt carpellis latere utroque transversim rugosis. Pro genere peculiari haberi posset, nisi praecedens species carpellis laevibus calycibusque quinquefidis huic nimis affinis esset." — E. Mey. l. c. — Crescit in Promontorio bonae spei prope Paarl.

§. 4. *Herbae perennes vel fruticosae: foliis solitariis oppositis vel saepius alternis; spicis plerumque corymboso-fastigiatis; calycibus profunde quinquefidis glabris bracteae ad basin adnatis, laciniis anterioribus sensim longioribus.*

13. S. VERBENACEA Thnbrg. Flor. Capens. 464. — Suffruticosa erecta glabriuscula: caulibus singulis pluribusve simplicibus, apicem versus corymboso-ramosis acute quadrangularibus; foliis inferioribus oppositis, superioribus alternis subdecurrentibus oblongo-spathulatis vel spathulato-linearibus, basi attenuata integerrimis, caeterum grosse serrato-dentatis, spicis longiuscule pedunculatis corymbosis fastigiatis cylindricis densis multifloris; bracteis lineari-subulatis tubo corollino brevioribus. ♃ — Herba 18-21-pollicaris, habitu fere *Verbenam Bonariensem* quodammodo referens. Caules singuli vel plures ex eadem radice erecti quadrangulares, ad medium saepe dense foliosi, apicem versus semper parcius remotiusque foliosi nec raro subaphylli. Folia 1½-2-pollicaria, 3-5 lin. lata, basi attenuata decurrentia, inferiora semper opposita (cauleque inde quadrangulari), utrinque glabra vel puberula carnosula rigida, superiora remotiora alterna minora, suprema saepe squamaeformia. Spicae pedunculatae, pedunculi corymbosi trichotomi saepe quadripollicares, squamulis paucis obsiti, fastigiati, spicae cylindraceae ½-2-pollicares densae multiflorae. Flores arcte imbricati albi? Bracteae lineari-subulatae setaceae glabrae, calyci semiadnatae eoque parum longiores. Calyx fere basin usque quinquefidus, laciniis subulato-setaceis glabris, antica breviori. Corolla alba? tubuloso-filiformis, tubo quam bractea paullo longiori, limbo infundibuliformi 5-fido, laciniis oblongis. Stamina duo longiora et stylus exserta. Fructum maturum non vidi. — Crescit in Promontorio bonae spei in humidis ad fluvium Bergrivier, Paarlberg, Dutoitskloof, Groot Draakensteen et alibi. (v. s. sp.)

14. S. LOBELIACEA Hochstett. Flora (B. Z.) XXVIII. 69. — Herbacea pubescens: foliis obovato-lanceolatis sessilibus inferne cuneatis integerrimis, superne dentatis; spicis subsolitariis terminalibus. ♁ — Affinis *S. herbaceae* Chois., a qua recedit foliis (longius?) petiolatis. — Crescit in Promontorio bonae spei ad latus occidentale montis Tafelberg.

15. S. HERBACEA Choisy, Mémoir. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 109. — Caule herbaceo tereti hirsuto-scabrido; foliis petiolatis ovatis tenuiter serratis; spiculis terminalibus brevibus densifloris; bracteis lineari-lanceolatis ciliatis; calyce ciliato. ⊙ — Caulis herbaceus teres hirsuto-scabridus albidus simplex, apice tantum ramulos floriferos rectos gerens. Folia petiolata ovata tenuiter serrata approximata in axilla saepe fasciculata, inferiora subpollicaria, superiora breviora subspathulata glabra, petiolo quandoque ciliato. Flo-

rum spiculae terminales simplices breves densiflorae vix pollicares. Bractea lineari-lanceolata 2–3 lin. longa acuta ciliata. Calyx lineam longus profunde quinquepartitus, laciniis subaequalibus linearibus ciliatis acutissimis adpressis, dorso rubricantibus, margine submembranaceis. Corollae tubus filiformis calycem paullo superans, limbi quinquelobi laciniae ovales aequales minimae obtusae. Stamina 4 corollam non superantia, e tubo breviter exserta subaequalia, antherae minutae. „Capsula" linearis bilocularis glaberrima sesquilineam longa lucida. — Crescit in Promontorio bonae spei.

16. S. ASCENDENS E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 259. — Multicaulis herbacea: caulibus ramisque ascendentibus teretiusculis vix birtellis; foliis obovatis in petiolum attenuatis dentatis glabris; spicis paniculato-corymbosis pedunculatis cylindricis; bracteis linearibus apice subincrassatis. ♃ — Habitu omnino simillima praecedenti, sed duplo minor. Caules 9-pollicares simplices teretiusculi hirtello-pubescentes. Folia vix linea prominula decurrentia, obovata, basi cuneata integerrima, a medio apicem versus profunde paucidentata vix carnosula, glabra, 4–5 lin. longa, 1–2 lin. lata, pleraque opposita, superiora remotiora minora, suprema pauca alterna ad ramificationum basin sita. Spicae plures breviter pedunculatae, pedunculis ½–1-pollicaribus subpaniculatis fastigiatis, densae cylindricae ½–1-pollicares multiflorae. Bracteae lineares, apice paullo latiores subcochleaeformes acutiusculae, calyce parum longiores glabrae. Calyx fere basin usque 5-partitus, laciniis lanceolatis acuminatis acutis, margine membranaceis, antica minori, posticis duabus quam laterales paullo longioribus. Corolla a me non visa est. Achaenia duo demum sponte secedentia semicylindrica fusca glabra. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus montosis Dutoitskloof inter Uitkyk et Slangenhoek. (v. s. sp.)

17. S. TERETIFOLIA Lnk. Enumer. pl. hort. Berol. II. 124?? — Ramis virgatis; foliis teretibus filiformibus (angustissime linearibus, margine revolutis) integris vel apice subdentatis; spicis sessilibus vel pedunculatis fastigiatis elongatis; bracteis corollae tubo duplo fere brevioribus lanceolato-linearibus acuminatis calycis basi adnatis; calycis profunde quinquefidi laciniis lanceolato-subulatis glabris, antica minori; corollae tubo filiformi bracteam subduplo superante, apice late infundibuliformi, limbi laciniis quatuor superioribus minoribus rotundatis, infima elliptica fere duplo longiori. ♃ — Eadem nostra ac Ill. Linkii esse videtur planta, adest tamen specimen pessimum. Caulis erectiusculus, rami teretes glabri. Folia sessilia 2 lin. longa paullove longiora alterna vel opposita, gemmis axillaribus evolutis etiam fasciculata. Corollae albae in sicco pulchre roseae tubus 3 lin. longus subincurvus. Stamina 4 didynama exserta. Stylus longe exsertus. Fructus praecedentis. — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. c.)

18. S. GUTTATA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 259. — Radice multicauli; caulibus herbaceis ad basin declinatis tunc erectis simpliciusculis subangulatis glabris; foliis obovatis dentatis sessilibus, supremis minutissimis, spicis brevissimis cymoso-conglomeratis; bracteis linearibus. ♃ — Caules 7–8-pollicares simplices subangulati glabri. Folia infima opposita, mox alterna remota, basi obsolete decurrentia, maxima 4 lin. longa, 1½–2 lin. lata, superiora minora, omnia grosse acuteque serrata carnosula glabra. Spicae in apice caulis sessiles breves glomeratae ad capitulum contractae. Bracteae tubo corollae breviores lanceolatae lineares acuminato-setaceae. Calyx irregulariter quinquefidus, lacinia postica fere basin usque libera parum brevior, reliquis paullo arctius coalitis, omnibus subulato-setaceis glabris. Corolla fere eadem ac praecedentis at paullo minor, ad faucem miniata. Fructus non visus. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus prope Ezelsbank. (v. s. sp.)

19. S. FASCICULATA Linn. Mantiss. plant. 250. — Jcq. Icon. pl. rar. III. t. 496. — Grtnr. De fructib. et seminib. pl. I. 238. t. 51. — Lam. Illustr. gener. t. 521. fig. 1. — Choisy, Mémoires de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 107. — [Eckl. Herb. fl. Capens. un. itin. no. 61! — Sieb. Hb. fl. Cap. no. 260!] — Caulibus erectis subsimplicibus strictis densissime foliosis; foliis decurrentibus cu-

neato-obovatis obtusis vel subacuminatis acute dentato-serrulatis (rarissime integris) carnosulis, glabris vel canescenti-hirsutis; spicis plurimis in apice caulis cymoso-corymbosis fastigiatis laxis multifloris; bracteis lanceolatis acuminatis acutis corollae tubo brevioribus integris vel obsolete denticulatis; calycis profunde quinquefidi laciniis linearibus acuminatis, postica breviori. ♄ — Planta polymorpha, ima basi ramosa multicaulis, rami strictiusculi simplicissimi virgati, plerumque 1–1½-pedales sed in varietate etiam septempollicares, foliis longe decurrentibus acute angulato-alati, glabri vel canescenti-hirsuti. Folia plerumque opposita densissima approximata, dimidia sua longitudine decurrentia vel rarius libera sessilia non decurrentia cauleque tunc tereti, 6–10 lin. longa, 3–5 lin. lata, cuneato-obovata obtusa vel subacuminata, carnosula glabra vel incano-hirsuta, acute serrato-dentata vel rarius integra. Folia versus ramorum apicem minus densa, interdum remota alterna. Spicae plurimae racemoso-corymbosae in apice caulis, thyrsum densissimum subcapitatum efficientes, laxiusculae multiflorae fastigiatae. Bracteae complicatae, inferiores longiores steriles, fertiles tubo corollino breviores lanceolatae acuminatae integrae vel obsolete denticulatae. Calyx basi cum bractea coalitus fere basin usque quinquefidus, laciniis linearibus acuminatis acutis, antica reliquis breviori. Corollae violaceae(?) tubus filiformis infundibuliformi-ampliatus, laciniis limbi ellipticis obtusiusculis. Stamina 2 longiora breviter, stylus longiuscule exserta. Fructus fuscus in achaenia duo semicylindrica glabra sponte secedens. — *Tithymali facie planta Aethiopica brevibus serratis foliis ad caulem imbricatis, flosculis plurimas in spicas summo ramulo dispositis* Pluken. Almath. 202. t. 446. fig. 4. — *Selago serrata* Bergius, Flor. Capens. 159. — *S. fulvo-maculata* Lnk. Enumer. pl. hort. Berolin. II. 123! *S. spuria* Sieb. Herb. fl. Capens. 260! (nec alior.) — *Selago*......? Eckl. Herb. fl. Cap. un. itin. no. 61!

α. *Glabra:* Caule angulato foliisque decurrentibus obtusis glabris.

β. *Lanceolata:* Caule teretiusculo foliisque non decurrentibus lanceolatis acuminatis subintegerrimis glabris.

γ. *Hirta:* Caule angulato foliisque decurrentibus canescenti-hirtis subtomentosis. — *S. hirta* Choisy, Mémoires de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 107.

δ. *Minor:* Caule angulato minori; foliis remotis vix decurrentibus hirsutis. — [Memoratu non minus dignae videntur formae sequentes, quas tamen minus constantes esse contendo. 1. Foliis cunctis lata basi sessilibus planis. 2. Foliis plurimis basi in petiolum subcontractis planis. 3. Foliis plerisque carinatis.] — Crescit in Promontorio bonae spei in arenosis inter Bergvalei et Zwartsbastkraal, Dutoitskloof, Tafelberg, Honigvalei et in montosis rupestribus Nieuwekloof. (v. s. sp. et cult.)

20. S. ARGUTA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 260. — Caulibus erectis subsimplicibus laxe foliosis; foliis sessilibus subdecurrentibus oblongo-lanceolatis vel sublinearibus acuminatis acutis integris vel saepius argute serrulato-dentatis glabris; cymis spicigeris laxe corymboso-paniculatis fastigiatis; bracteis linearibus acuminatis corollae tubo brevioribus; calycis profunde 5-fidi laciniis subulatis corollae tubo plus duplo brevioribus, posteriori breviori. ♄ — Praecedenti simillima forteque in posterum ei consocianda, sed formae intermediae deesse dicuntur. — Caules 9-pollicares forteque longiores simplices virgati glabri. Folia 6–7 lin. longa, 2 lin. lata carnosula glabra pallide viridia subdecurrentia. Spicae corymboso-paniculatae fastigiatae laxae filiformes, thyrsum terminalem efficientes. Inflorescentiae rami inferiores bracteis sterilibus remotis instructi sulcati glabri. Bracteae apice subrecurvatae lineares acuminatae. Calycis laciniae subulatae tenuissime puberulae. Corollae tubus filiformis albidus, limbus violaceus quinquelobus, laciniis lineari-ellipticis, 4 superioribus infima subduplo brevioribus. Stamina cum stylo subinclusa. — Crescit in Promontorio bonae spei in valle montis Giftberg. (v. s. sp.)

21. S. BURMANNI Choisy, l. c. 108. — Caule anguloso glabro; foliis ovato-linearibus subdecurrentibus glabris acutis integris vel inferioribus apice denticulatis; spiculis florum longis tenuibus corymbum efformantibus; bracteis lineari-subulatis tubum corollae subaequantibus. ♃ — Folia carnosula cauli adpressa sessilia subdecurrentia 3–6 lin. longa approximata glaberrima acuta quandoque breviter aristata. Spiculae 7–10 terminales elongatae bipollicares vel pollicares corymbosae. Flores minimi sparsi. Bractea 2 lin. longa acutissima glaberrima. Calyx vix lineam longus, subinaequaliter in lacinias subulatas acutas 5 divisus. Corolla calyce multo longior, tubo filiformi, limbo quadrilobo (??), lobis ovato-linearibus lineam longis subinaequalibus. Stamina exserta didynama. Stylus paullo minor. Ovarium minimum. — Crescit in Promontorio bonae spei.

22. S. RAPUNCULOIDES Linn. Spec. plant. 877. — Suffruticosa erecta glabra: caule tereti crasso densissime folioso: foliis angustissime linearibus acuminatis acutis planis, integerrimis vel apicem versus subdentatis, apice callosis; spicis plurimis in corymbum terminalem fastigiatum subpaniculato-ramosissimum dispositis (demum valde? elongatis); bracteis linearibus acuminatis tubo corollino dimidio sublongioribus. ♃? — Caules 12-15-pollicares simplicissimi crassitie pennae cygneae, densissime undique foliis obsiti. Folia infima et suprema minora semipollicaria, media maxima ad duos pollices usque elongata, linea plerumque paullo angustiora, plana glauca, acuminata, apiculo calloso, integerrima vel paullo infra apicem dente unilaterali vel utrinque dente acuto notata. Pedunculi in apice caulis plurimi patentissimi ramosi corymbosi, spicas breves laxas gerentes fastigiati. Bracteae lineari-lanceolatae basi carinatae. Calyx tubo corollae plus duplo brevior praecedenti speciei analogus. Corollae laciniae ovales subaequales. Genitalia breviter exserta. — *Rapunculus foliis angustissimis dentatis, floribus umbellatis* Burm. Afric. 113. t. 42. fig. 1. — *S. spuria* Jacq. Fragm. t. 3. fig. 1. (nec Linn.) — Crescit in Promontorio bonae spei in montibus Piquetberg, prope Winterhoek, ad fluvium Breederivier et alibi. (v. s. sp.)

23. S. DENSIFOLIA Hochstett. Flora (B. Z.) XXVIII. I. 69. — Caule erecto lignoso ramoso; foliis confertissimis angustissime linearibus paucidentatis (½–1-pollicaribus) glabris; spicis elongatis corymbosis; bracteis lineari-lanceolatis calyce duplo longioribus; floribus minutis. ♄ — Ad *S. rapunculoidem* proxime accedit, sed differt foliis densius confertis floribusque plus duplo minoribus. — Crescit in Promontorio bonae spei prope Tulbagh.

24. S. SPURIA Linn. Spec. plant. 877. — Multicaulis erecta: caulibus simplicibus inferne foliisque inferioribus pilosulis; foliis confertis linearibus subfiliformibus integris vel apicem versus denticulatis, superioribus brevioribus remotioribus; spicis in corymbum terminalem brevem fastigiatum subumbellatis, demum elongatis. ♃ et ⊙. — Planta annua et perennis florifera a me visa est, annua simplicissima 9-pollicaris, perennis pluricaulis saepe sesquipedalis. Caules simplices teretes, inferne pilosiusculi, superne glaberrimi striati. Folia densa adpressa vel subrecurva lineari-filiformia 3–12 lin. longa, superiora parciora remotiora breviora, integra vel supra medium denticulata, inferiora saepe pilosiuscula, superiora glabra. Spicae plures interdum longiuscule pedunculatae (pedunculis 1–2-pollicaribus remote foliosis) corymbosae fastigiatae contractae, fructiferae elongatae cylindraceae. Bracteae ex ovata basi acuminato-setaceae tubo corollino plus duplo breviores. Calyx ut in praecedentibus, dente antico breviori. Corollae tubus filiformis, laciniae limbi breves ovales obtusae; stylus et stamina breviter exserta. — *Melampyrum Africanum spicatum foliis angustissimis* Burm. Afric. 115. t. 42. fig. 3. — *S. rapunculoides* Eckl. Herb. flor. Cap. un. itin. no. 135. (nec Linn.) — Eckl. Herb. flor. Cap. un itin. no. 736! 737! — *S. rapunculoidi* valde affinis, sed huic caulis saepe bipedalis, ad basin fere digiti minoris crassitie, folia saepe bipollicaria confertissima, semper glabra et tubus corollae duabus lineis longior, in nostra caulis penna scriptoria tenuior, folia ad summum pollicaria pilosula, corollae tubus sesquilinea non longior. — Crescit in Promon-

torio bonae spei, Wynberg, Bergrivier prope Paarl, Dutoitskloofbergen, Niewe-kloofbergen, Giftberg, Donkerhoekshoogte et alibi. (v. s. sp. et cult.)

25. S. COCCINEA Linn. Amoen. acad. VI. 21. — E. Mey. Comment pl. Afric. austr. I. 261. — Multicaulis erecta: caulibus teretibus glabris vel basi pilosiusculis simplicibus virgatis; foliis alternis linearibus acutis integerrimis vel denticulatis, superioribus brevioribus latioribusque, glabriusculis apiceque subcallosis; spicis brevibus in corymbum terminalem fastigiatum coarctatis; bracteis panduraeformibus acuminatis, tubo corollino fere duplo brevioribus. ♃ — Praecedenti simillima aegreque ab ea distinguenda, nisi bracteis ovalibus medio parum contractis acuminulatis (panduraeformibus), corollae tubo fere duplo longiore et limbo inaequali. — Caules pedales simplicissimi teretiusculi vel hinc inde linea a foliis decurrente notati, basi sparse pilosuli. Folia non coarctata sed per totam caulis longitudinem aequaliter sparsa, saepe sesquipollicaria, superiora brevissima tribus lineis non longiora, saepius denticulata. Folia ad basin inflorescentiae ramificationum lanceolata acuminata, sensim in bracteas transeuntia. Spicae breves in corymbum densissimum coarctatae. Bracteae 4 lin. longae, 1½—2 lineas latae. Corollae tubus semipollicaris filiformis, apicem versus infundibuliformis, limbi laciniae 2 superiores breviores altius coalitae rotundatae obtusae, laterales patentes ovales parum latiores, inferiori ovato-elliptica, superioribus plus duplo longiore. Stamina cum stylo longiuscule exserta. — Crescit in Promontorio bonae spei in arenosis Franschehoek, Draakensteensbergen, Dutoitskloofbergen et Paarlberg. (v. s. sp.)

§. 5. *Herbae suffruticosae: foliis alternis solitariis vel subfasciculatis latiusculis; floribus pedicellatis corymbosis vel subcymosis; pedicellis non ad basin, sed apice bracteatis.*

26. S. TRINERVIA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 261. — Herbacea erecta: foliis infimis oppositis lanceolatis marginatis, apice serratis, basi trinerviis breviter petiolatis, superioribus alternis sublinearibus integerrimis; corymbis subpaniculatis, pedicellis longitudine bracteae patulis; bractea ad basin calycis lanceolata carinata corollae tubum aequante; calycibus fere duplo brevioribus quinquefidis, laciniis subulatis. ♃ — Herba tenuis pedalis, caule erecto, ramis infimis ascendentibus cauli simillimis, apice ramuloso-cymosis. Folia inferiora sesquipollicaria, quinque lineas lata, superiora circiter pollicaria, lineam lata. Corymbi circiter decemflori, pedicellis inferioribus, sesquilineam longis, bractea pedicellum aequante, sed ejusdem apice ad calycis basin inserta, ut in Ononideis plerisque. Corolla luteola. Flos et fructus omnino hujus generis. — Crescit in Promontorio bonae spei in graminosis inter Omsamculo et Omcomas. (v. s. sp. pessim.)

27. S. RACEMOSA Brnhrdi. mss. in Flora (B. Z.) XXVIII. I. 69. — Suffruticosa erecta: ramis ascendentibus; foliis sparsis lineari-lanceolatis trinerviis subsessilibus integerrimis; racemis terminalibus bracteatis; bracteis florem pedicellatum subaequantibus lanceolato-linearibus; calycis laciniis subulatis. ♃ — Affinis *S. trinerviae* E. M., at flores non corymbosi sed racemosi; nervi foliorum laterales margini paralleli. — Crescit in Promontorio bonae spei in graminosis prope Natalbai.

28. S. PEDUNCULARIS E. Mey. l. c. 262. — Herbacea erecta: foliis alternis linearibus, utrinque acutis, axilla foliolis onustis; corymbis subcymosis; pedicellis capillaceis calyce duplo longioribus; bractea suborbiculari-ovata acutiuscula concava, calycis tubum vix superante; calycibus quinquefidis, laciniis obtusissimis, corollae tubum aequantibus. ♃ — Habitus fere praecedentium sed omnia tenuior, ramuli pauciores, corymbi 20—30-flori, nec tamen eis praecedentis multo majores. Pedicelli inferiores duas lineas longi. Flores una cum bractea subglobosi, lineam longi. Carpella subsemiglobosa. — Crescit in Promontorio bonae spei in graminosis inter Omsamculo et Omcomas.

§. 6. *Suffrutices: foliis fasciculatis; floribus subcorymbosis vel saepius spicatis; calycibus variis liberis vel vix ima basi bracteae adnatis. — Species priores quoad inflorescentiam subcorymbosam inter hanc paragraphum et praecedentem ambigunt.*

29. S. HYSSOPIFOLIA E. Mey. l. c. — Caule erecto, superne paniculatim ramoso pubescente; foliis fasciculatis lineari-oblongis lanceolatis ellipticisve, basi trinerviis; corymbis paniculatis subsexfloris; pedicellis brevissimis; bracteis calycisque laciniis aequilongis obtusissimis, corollae tubum aequantibus. ♃.

a. Foliis lineari-oblongis integerrimis; bracteis calycibusque glabris. — Crescit in Promontorio bonae spei in graminosis ad fluvium quendam minorem inter Cataractam magnam et Omsamcaba.

β. elliptica: Foliis ellipticis subintegerrimis; bracteis calycibusque glabris. — Crescit in Caffria.

γ. lanceolata: Foliis inferioribus lanceolatis, utrinque acutis, superne argute serrulatis. — Crescit inter Omsamwubo et Omsamcaba.

30. S. CORYMBOSA Linn. Spec. plant. 876. — Eckl. Hb. fl. Capens. un. itin. 740! — Sieb. Hb. fl. Cap. no. 259! — Choisy, Mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 100. — Caule ramisque erectis pubescentibus virgatis teretibus; foliis fasciculatis lineari-filiformibus margine reflexis flexuoso-patulis, scabrello-hispidulis; floribus subcorymboso-spiculatis; corymbulis plurimis cymoso-corymbosis; bracteis ovatis ciliatis calycem aequantibus; calycis profunde quinquefidi laciniis subaequalibus pellucido-marginatis obtusis ciliatis corollae tubum subaequantibus. ♃ — Suffrutex pedalis vel altior simplex vel ramosissimus subcanescenti-puberulus. Rami virgati simplices, apice corymboso-ramulosissimi myrianthi. Folia fasciculata densissima, fasciculi approximati polyphylli. Folia 3–5 lin. longa angustissima acuta, filiformia. Bracteae calycis longitudine ovales complicatae glabriusculae ciliatae. Calyx campanulatus membranaceus, obtuse et profunde quinquedentatus. Corolla minima alba?, limbi laciniae e calyce exsertae ovales obtusae. Stamina et stylus breviter exserta. — *Camphorata Africana umbeltata frutescens* Commel. Hort. Amstelod. II. 97. t. 42. — *Millefolio affinis Maderaspatana camphorata, foliis radiatim nascentibus* Moris. Oxon. hist. III. 39. — *Valerianoides Aethiopicum Thymeleae affine umbellatum, Psyllii crebrioribus crenatis foliis ramosissimum* Pluk. Almath. 20. t. 445. fig. 7. —

β. polystachya E. Mey. l. c. 263. — Foliis abbreviatis rigidis; spicis thyrsoideo-conglomeratis. — Folia abbreviata carnosula obtusa, vix lineam longa, bracteae pellucido-marginatae ciliatae. — *S. polystachya* Linn. Mantiss. pl. 250. (excl. syn. Commel.) — Choisy l. c. 110. (excl. syn. Jcq.) — Crescit in Promontorio bonae spei ad Leeuwenberg, Tafelberg, Bergrivier prope Paarl, Vanstaadesberg, in rupestribus Blaauwberg, inter Klaasniemandfontein et Bethelsdorp alibique (v. s. sp. et c.)

31. S. CINEREA Thnbrg. Flor. Capens. 463.?? — [Choisy, Mém. de la soc. de phis. et d'hist. nat. d. Genève II. 2. p. 101. — E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 263.] — Caule ramisque erectis virgatis pubescentibus; foliis fasciculatis linearibus, margine revolutis erectiusculis; spicis subcymosis; bracteis lanceolatis calyce fere duplo longioribus calycibusque profunde quinquefidis hirtis, laciniis lanceolatis aequalibus corollae tubo dimidio brevioribus. ♃ — A planta Thunbergiana notis quibusdam videtur differre, describitur enim l. c.: Frutex erectus purpurascens tenuissime pubescens, apice ramosus, pedalis et ultra; rami in summo caule virgati paniculati sensim breviores; folia integra margine reflexo patenti-erecta semipollicaria; capitula in ramulis minuta; bracteae et calyces integrae. — Nostra planta hasce offert notas: Caules pedales et longiores subangulati, praecipue apicem versus canescenti-puberuli. Foliorum fasciculi densi approximati alterni, internodia foliorum minorum circiter longitudine, folia in fasciculo terni senive, extimo majori 4–5 lin. longo, inferioribus saepe dimidio brevioribus, linearia

obtusiuscula crassiuscula, margine utrinque revoluta laete viridia setuloso-hispidula vel glabra. Spicae in apice caulis plurimae pedunculatae corymboso-fastigiatae, pedunculi pubescentes bracteis sparsis sterilibus lanceolato-linearibus obsiti; spiculae breves 10–20-florae. Bracteae lanceolato-lineares pubescentes, tubo corollino dimidio paullo longiores. Calyx fere basin usque in lacinias 5 lineari-subulatas pubescentes divisus. Corolla alba?, laciniae limbi ellipticae obtusiusculae, stamina cum stylo breviter exserta. Fructus glaber fuscus, apice calyce inclusus bilobus, demum in achaenia 2 semicylindricas eccdens. — *S. phylicaefolia* Hort. Berolin. — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus arenosis inter Bergvalei et Zwartbastkraal, inter Pikenierskloof et Pretoriskloof etiam in rupestribus prope Nieuwekloof. (v. s. sp. et cult.)

32. S. GLOMERATA Thnbrg. Flor. Capens. 461. — E. Mey. l. c. 264. — Caule ramisque hirtellis; foliis fasciculatis subsemiteretibus succulentis; spicis cymosis vel conglomeratis; bracteis ovatis acutis ciliatis calycem vix superantibus; calycis laciniis subaequalibus ciliatis corollae tubo duplo brevioribus. ♄ — Rami teretes adpresse hirtelli. Folia crassiuscula linearia, utrinque revoluta, 3—4 lin. longa (nec lineam longa ut habet **Thunberg**), quina septenave fasciculata. Spiculae plurimae in cymam terminalem hemisphaericam coarctatae. Bracteae ovato-acuminatae vix calyce longiores albescenti-ciliatae. Calyx profunde quinquefidus, laciniis linearibus acuminatis margine membranaceo-ciliatis, apice summo nudis; corollae tubus cylindraceus, basi puberulus, laciniae limbi ellipticae obtusae, duabus superioribus parum altius coalitis brevioribus, infima longiori, stamina et stylus breviter exserta. [De fructu refert Ill. E. Meyer l. c. sequentia: „Fructus hujus plantae, qui pauci adsunt, aut morbo quodam affecti sunt, aut novum genus postulant, quod equidem incertus aliis condendum relinquo. Sunt enim fructus alii Pisi magnitudine coriacei nigri intus vacui, nullo seminis rudimento; alii minus aucti minusque coriacei, nec tamen adeo fragiles, quam aliarum specierum, carpellis demum secedentibus, unam magnam cavitatem simul constituentibus, utroque vero in medio pariete aliam cavitatem angustissimam demonstrante, quam vero pro vero loculamento habeo, quamvis nullum umquam in iis semen reperiverim. Quoties autem in toto isto plantarum ordine semen non perficitur, toties loculamentum verum vel contrahi vel omnino claudi et cavitas interna eo magis amplificari solent. Caeterum habitus omnino *Selaginum*."] — Crescit in Promontorio bonae spei, inter Klaasniemandsfontein et Bethelsdorp, Zuurebergen et alibi. (v. s. sp.)

33. S. TEPHRODES E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 264. — Caule ramisque saepe laxioribus pubescentibus; foliis fasciculatis revoluto-filiformibus flexuoso-patulis; spicis racemosis paniculatisve, demum valde elongatis; bracteis ovatis acutis hirtis calyce parum longioribus; calycibus inaequaliter quinquedentatis subvilloso-hispidulis corollae tubum subaequantibus. ♄ — Fruticulus 9-pollicaris forteque altior, rami teretes glabri vel puberuli, folia fere *Selaginis corymbosae*, sed breviora fasciculique eorum minus densi. Spicae breves pauciflorae breviter pedunculatae in racemum dispositae vel (rarius?) corymboso-fastigiatae. Rhachis et pedunculi pubescentes, ad pedunculi basin positum est folium singulum lineari-lanceolatum angustissimum, in medio pedunculo saepisime observantur bracteae binae oppositae steriles. Flores pauci sessiles patentes. Bracteae ovales acutae concavae, corollae tubo parum breviores, dorso margineque villoso-pilosae fulvae. Calyx fere ad medium quinquedentatus villoso-hispidus, bractea duplo brevior. Corollae infundibuliformis parvae pallide violaceo-cinerascentis laciniae ovales subaequales. — A plerisque hujus paragraphi speciebus differt calyce dentato nec fisso, quamobrem ad *S. strictam* Bergii pertinere non potest, cujus calyx ab auctore accuratissime ultra medium quinquefidus describitur. — *S. stricta* Choisy, Mém. de Genève II. 2. 103. (nec Berg.) — Crescit in Promontorio bonae spei prope Paarl, Paarlberg et in montibus rupestribus prope Niewekloof (v. s. sp.)

34. S. RAMULOSA E. Mey. l. c. 265. — Caule erecto glabriusculo, inde a basi ramosissimo, ramis simplicibus abbreviatis erectiusculis hirtellis; foliis fasciculatis revoluto-filiformibus rectis; spicis in apicibus ramorum racemosis subglobosis paucifloris; bracteis ovato-lanceolatis calyce subsesquilongioribus glabris; calycibus subaequaliter profunde quinquedentatis subcilitatis, corollae tubum aequantibus. ♄ — Praecedenti valde affinis, ramificatio in toto genere singularis. Folia 2–3 lin. longa carnosula utrinque revoluta glabra. Bracteae foliaceae ovato-lanceolatae corollae tubum subaequantes, calyce minimo globoso subaequaliter et obtuse quinquedentato sesquilongiores. Corolla parva coerulea hypocraterimorpha, laciniae limbi ellipticae acutiusculae, genitalia exserta limbo breviora. — Crescit in Promontorio bonae spei in ripa fluminis Karmelksrivier. (v. s. sp. pessim.)

35. S. CANESCENS Thnbrg. Flor. Capens. 460. — Caule erecto ramisque canescentibus, junioribus albido-hirtellis; foliis fasciculatis linearibus, margine revolutis scabriusculis patulis; spicis subracemosis; bracteis oblongis calycem aequantibus calycibusque profunde quinquedentatis hirtis corollae tubum aequantibus. ♄ — Frutex erectus ramosissimus bipedalis vel altior. Rami cinerei, adulti glaberrimi, juniores canescenti-tomentelli subhirti. Folia fasciculata, fasciculis approximatis, primaria fasciculum in axilla gerentia majora persistentia 3–4 lin. longa, interiora saepe vix lineam longa, omnia patentia crassiuscula linearia obtusissima, glabra vel tenuissime canescenti-puberula. Spicae breves versus ramorum apicem racemosae, laxiusculae multiflorae ½–1-pollicares, terminali longiori laxiori. Bracteae oblongae obtusae concavae calyce longiores, corollae tubo paullo breviores crassiusculae, dorso canescenti-tomentellae. Calyx minutus, fere basin usque in lacinias quinque inaequales acutas, (anticas breviores) divisus, incano-pubescens hispidulus, corollae tubo plus duplo brevior. Corollae carneae? tubus cylindricus superne ampliatus, limbi laciniae ovali-ellipticae subaequales; stamina didynama breviter exserta, stylus staminibus longior, apice incurvus. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus inter Koussie et Zilverfontein, prope Gaatje, inter Compasberg et Rhinosterbergen alibique. (v. s. sp.)

36. S. SCABRIDA Thnbrg. Flor. Capens. 461.? — E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 265. — Caule ramosissimo; ramis ramulisque divaricatis filiformibus hirtellis; foliis caulinis fasciculatis, ramealibus subsolitariis linearibus revoluto-teretiusculis hispidulis; spicis terminalibus subsolitariis; bracteis lanceolatis calyce subsesquilongioribus calycibusque profunde quinquefidis hispidulis corollae tubo cylindrico duplo longioribus. ♄ — Hanc veram esse plantam Thunbergianam valde dubito, describitur enim illa foliis piloso-scabridis lineam longis spicisque unguicularibus, planta Meyeriana contra gaudet foliis vix umquam tenuissime puberulis 2–2½ lin. longis, vix ullis lineam longis spicisque semipollice non longioribus. — Rami adulti glabri purpurascentes, cortice rimoso tecti, juniores pubescenti-hirtelli dense foliosi, foliis plerisque alternis solitariis fasciculatisque inundatis. Bracteae omnino a foliis non distinctae sed hirtellae, corollae tubum vel etiam totam corollam aequantes. Calyx fere basin usque quinquefidus, laciniis aequalibus lineari-acuminatis piloso-hispidis. Corollae tubus cylindricus subcurvatus, fauce ampliatus, limbi laciniae breves ovales, stamina et stylus breviter exserta. Fructus subglobosus fuscus glaber minutissime papillosus in achaenia duo minima semicylindracea secedens. — Crescit in Promontorio bonae spei in montosis asperis prope Gnadenthal et Wupperthal. (v. s. sp.)

37. S. DISTANS E. Mey. l. c. 266. — Caule subtrichotome ramoso; ramulis pubescentibus; foliis fasciculatis subincurvatis semiteretiusculis obtusis, junioribus viscidulis; spicis solitariis terminalibus dissitifloris; bracteis oblongis calyce sesquilongioribus; calycibus inaequaliter quinquefidis viscidulis, laciniis acuminatis corollae tubo brevioribus. ♄ — Caules adulti glaberrimi, juniores tomentelli pubescentes. Foliorum fasciculi approximati. Folia 2–3 lin. longa, semilineam lata

crassa, dorso convexa, facie plana. Spicae terminales laxissimae, interstitia inter singulos flores jam ante anthesin longitudine calycis. Bracteae foliaceae lineares succulentae, tubum corollae aequantes calyce sesquilongiores (oblongas, ut habet diagnosis, videre nequeo). Calycis ovalis hispiduli profunde quinquefidi lacinia antica minor, omnes lineari-lanceolatae acuminatae, margine membranaceae. Corolla albescens? vel lutea?, tubus bracteae longitudine, limbi laciniae 2 superiores breviores altius coalitae oblongae obtusae, inferior longior. Genitalia breviter exserta. — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus siccis Kendo (v. s. sp. pessim.)

38. S. LEPTOSTACHYA E. Mey. l. c. — Caule ramisque flexuoso-ascendentibus puberulis; foliis fasciculatis revoluto-subfiliformi-linearibus acutiusculis, fasciculis callo demum lignescente fultis; spicis terminalibus solitariis longissimis gracilibus; bracteis lanceolatis ciliatis calyce parum longioribus; calycis profunde quinquefidi laciniis ciliatis inaequalibus corollae tubo brevioribus. ♄ — Fruticulus 10–11-pollicaris jam a basi ramosissimus, ramulis annotinis ob callos foliorum anni praeteriti persistentes lignescentes nodulosis, glabris vel junioribus vix puberulis. Foliorum fasciculi approximati vel subremoti, folia suprema interdum alterna, omnia lineari-filiformia carnosula 2–4 lin. longa glabra. Spicae in ramulis terminales filiformes 1–2½-pollicares densae, flores inferiores subremoti, omnes minimi albidi? Bractea lanceolata acuta corolla parum brevior, calyce sublongior. Calyx minutissimus, profunde quinquefidus, laciniae ciliatae, postica minor; corollae calyce parum longioris albidae parvae laciniae rotundatae, parvulae; stamina vix exserta, stylus demum longius exsertus. Fructus minimus calyce inclusus fuscus glaber, stylo persistente coronatus, demum bipartibilis. — *Hebenstreitia glabra* Sieb. Herb. fl. Capens. 484. (nec Thnbrg.) — Crescit in Promontorio bonae spei locis depressis et inundatis ad flumina prope Zeekoerivier, in Sneeuwbergen, prope Steelkloof in Uitvlugt. et alibi. (v. s. sp.)

39. S. TENUIS E. Mey. l. c. 267. — Caule erecto ramosissimo; ramis ramulisque divaricatis, apice tenuissime puberulis; foliis fasciculatis brevissimis revoluto-teretiusculis; spicis terminalibus subsolitariis vel corymboso-racemosis; bracteis ovato-lanceolatis obtusiusculis calycem superantibus glabris; calycibus profunde quinquefidis valde irregularibus, laciniis pellucido-marginatis lanceolatis subciliolatis, corollae tubo duplo brevioribus. ♄ — Fruticulus humilis ramosissimus. Ramuli adulti aphylli persistentes pungentes. Folia ½–1 lineam longa divaricato-patentia carnosula glabra teretia. Spicae terminales densae, subdecemflorae, parum elongatae. Bracteae ex ovato lanceolatae obtusae, calyce paullo longiores (in diagnosi false legitur *calycem aequantibus*), tubum corollinum aequantes vel subaequantes. Calyx subglobosus profunde quinquelobus, laciniis duabus posticis concavis ovalibus obtusis, tribus anticis multo brevioribus acutis, omnibus membranaceo-marginatis ciliolatis. Corollae violaceae lacinia antica reliquis paullo longior. Genitalia vix exserta. — Crescit in Promontorio bonae spei locis siccis ad radices montis Geelbekskraal. (v. s. sp.)

40. S. ADPRESSA Choisy, Mémoir. de la soc. de phys. et d'hist. natur. de Genève II. 2. p. 103. t. 4. — Caule erecto ramosissimo; ramis ramulisque incurvato-erectis, superne subviscoso-hirsutiusculis; foliis fasciculatis brevissimis revoluto-erectiusculis subsucculentis; spicis terminalibus oblongis rariusve lateralibus sessilibus subglobosis; bracteis lanceolatis obtusiusculis florem subaequantibus pubescentibus; calycibus inaequaliter quinquefidis hirsutis, corollae tubum aequantibus. ♄ — Fruticulus erectus 6–7-pollicaris ramosissimus, rami incurvati densissime foliosi, adulti glabri, juniores viscoso-pubescentes. Foliorum fasciculi densi approximati, folia semilinea vix longiora, crassiuscula teretia glabriuscula obtusa. Spicae breves densae subglobosae, breviter pedunculatae, racemoso-subspicatae cum terminali oblonga. Calyx et bracteae aequilongae lanceolatae obtusae pilosulae, calycis laciniae parum inaequales corollae tubum aequantes (nec eo breviores ut habet icon laudata) obtusiusculae ciliatae viscido-puberulae.

Corollae minimae albae laciniae rotundatae obtusae, stamina breviter exserta, stylo longius exserto. — Crescit in Promontorio bonae spei inter Compasberg et Rhinosterbergen. (v. s. sp.)

41. S. INCISA Hochstett. Flora (B. Z.) XXVIII. I. 69. — Fruticosa: foliis pinnatifido-incisis glabriusculis, versus basin attenuatis integerrimis, supremis minutis inciso-dentatis; floribus spicatis paucis corymbosis. ♄ — Crescit in Promontorio bonae spei ad latera montium prope Gnadenthal et Zwellendam.

42. S. STRICTA Bergius, Plant. Capens. 155. — Choisy, Mémoir. de la soc. de phys. et d'hist. natur. de Genève II. 2. p. 103. — Foliis filiformibus fasciculatis; floribus per spiculas subcapitatas breviter pedunculatas terminales aut laterales laxam paniculatam spicam generalem constituentes dispositis; bracteis ovato-ellipticis; calyce villoso. ♄ — Caulis teres ramosus, ramuli erecti villosuli. Folia filiformia fasciculata internodiis longiora, 3-4 lin. longa, nigra (?) glabra aut raris pilis hispidula. Bractea sesquilineam longa ovato-elliptica subacuta. Florum spiculae subcapitatae breviter pedunculatae terminales aut laterales, paniculata spica generalis laxa. Calyx minimus quinquedentatus villosus acutus aequalis. Corolla calycem tubo superans, limbo quinquelobo, lobis parvis obtusis subaequalibus. Floralium spicularum pedunculi 4-6 lin. longi filiformes, saepe in medio bibracteati. — *S. paniculata* Thnbrg. Prodr. flor. Capens. 99?, Flor. Capens. 462? *) — Crescit in Promontorio bonae spei.

43. S. GENICULATA Thnbrg. Fl. Capens. 460. — Choisy l. c. 102. — E. Mey. Comment. plant. Afric. austr. I. 267. — Caule ramisque flexuoso-geniculatis, junioribus puberulis; foliis fasciculatis summisve solitariis, callo demum lignescente fultis lanceolato-linearibus planis glabris; spicis subcorymboso-racemosis subsecundis laxifloris; bracteis linearibus calyce parum longioribus; calycibus inaequaliter quinquefidis puberulis, laciniis sublinearibus obtusiusculis, corollae tubo subtriplo brevioribus. ♄ — Caulis ramique teretes, apice praesertim hispiduli. Folia linearia glabra 3 lin. longa. Florum spiculae elongatae laxiflorae, laterales pedunculatae, pedunculo filiformi quandoque bracteato, panicula terminalis divaricata laxa. Bractea ciliata villosa (sicca) nigra, 1-2 lin. longa ovato-lanceolata. Calyx villosus bractea paullo brevior aequaliter quinquedentatus. Corolla tubo calycem superante filiformi, laciniis limbi 5 obtusis ovatis subaequalibus. Stamina corollam superantia subaequalia. — In herbariis observantur plantae duae diversissimae ab ipso **Thunbergio** nomine *S. geniculata* inscriptae, in herbario **Candolleano** servatur planta supra descripta quae forte eadem ac *Florae Capensis*, in herbario contra **Jussieuano** servatur planta ab ipso **Thunbergio** illo sub nomine missa, quae tamen ad *S. micrantham* Choisy pertinet. — [Choisy l. c.] — Crescit in Promontorio bonae spei in arenosis citra Noagaspoort.

44. S. HERMANNIOIDES E. Mey. Comm. plant. Afric. austr. I. 267. — Caule ramisque leviter flexuosis tenuissime puberulis; foliis fasciculatis solitariisve oblongis planis tenuissime puberulis subcanescentibus; spicis longe racemosis brevissime pedunculatis subglobosis; bracteis ovatis acutis calycibusque quinquefidis subaequalibus villosiusculis; corollae tubo parum brevioribus. ♄ — Habitu omnino *Hermanniam hyssopifoliam* refert. Rami teretes purpurascentes, juniores tenuissime puberuli. Folia maxima 9 lin. longa, supra medium 3 lin. lata, superiora 3-5 lin. longa, 2 lin. lata, oblongo-elliptica obtusa, basi in petiolum brevissimum attenuata, utrinque puberula, margine subrevoluta uninervia crassiuscula.

---

*) *S. PANICULATA Thnbrg. l. l. c. c. — Foliis lanceolatis glabris, margine reflexis; capitulis lateralibus subspicatis. ♄ — Frutex teres glaber erectus, apice ramosus pedalis. Rami in supremo caule alterni filiformes tenuissime pubescentes patentissimi simplices palmares. Spicae in ramis alternae sessiles, rarius subpedunculatae plurimae minutae. Variat capitulis spicatis et in ultimis ramulis terminalibus. Bracteae et calyx integrae. — Valde affinis* S. fruticosae. — *Crescit in Promontorio bonae spei.*

Spicae brevissime pedicellatae vel subsessiles globosae pauciflorae in apice ramulorum racemosae. Bracteae ovatae acutae concavae, calyce plus duplo longiores, corollae tubo parum breviores, dorso sericeae pubescentes. Calyx minimus, corollae tubo plus duplo brevior, fere basin usque quinquefidus, laciniis linearibus acutis pilosis ciliatis, postica breviori. Corollae albidae? tubus cylindricus, bractea parum longior, laciniae limbi ovales obtusae aequales. Stamina 2 breviter exserta, duo subinclusa. — Crescit in Promontorio bonae spei prope Uitkomst. (v. s. sp.)

Sectio II. MACRIA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 268.

Calyx trifidus, lacinia posteriore plerumque minore, lateralibus integris sub apice obsolete bidentatis.

§. 1. *Foliis fasciculatis.*

45. S. MINUTISSIMA Choisy, Mémoir. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 100. t. 3. — E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 268. — Caule fruticuloso ramosissimo; ramis divaricatis puberulo-pubescentibus canescentibus; foliis fasciculatis divaricatis oblongis obtusis succulentis; spicis subglobosis, demum elongatis racemosis; bracteis oblongis glabris, florem subaequantibus; calycibus trifidis, laciniis lateralibus apice bifidis ciliatis, corollae quadrifidae tubum subaequantibus. ♄ — Fruticulus pedalis, divaricato-ramosissimus, ramuli approximati breves racemosi, spica brevi subglobosa, demum elongata terminati, cinereo-puberuli teretes. Folia in caule ramisque fasciculata, fasciculis approximatis, minima carnosa oblonga obtusissima, saepe divaricato-reflexa vix semilineam longa puberula, vel majora lineam longa glabra. Ramuli capituligeri saepe brevissimi, saepe semipollicares longioresque, eorum folia fasiculata vel etiam solitaria alterna. Spica florum subglobosa, deinde elongata ovato-oblonga semipollicaris vel saepius brevior densa multiflora. Bractea oblonga flore paullo brevior foliacea carnosula. Calyx corollae tubo duplo brevior irregulariter trifidus, laciniis lateralibus apice bifidis, antica breviori, omnibus inciso-ciliatis, vidi etiam calycem irregulariter quinquefidum, numquam tamen regulariter quinquefidum ut in icone. Corolla parvula alba, limbi quadrifidi laciniis rotundatis obtusis, superiori latiori profunde emarginata. Stamina et stylus breviter exserta. — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus asperis prope Ukuip, inter Riviertje et Nieuwkerksboogte, inter Hexriviersberg et Driekoppen. (v. s. sp.)

46. S. CHOISYANA E. Mey. Comment. pl. Afric. aust. I. 268. — Suffruticosa multicaulis canescens: caulibus erectis, inferne subsimplicibus; foliis fasciculatis minimis planiusculis; spicis dense caudato-racemosis; racemis longissimis, inferne subpaniculatis; bractea calycem vix superante; calyce profunde trifido ciliolato, lacinia postica minima, lateralibus corollae tubum aequantibus. ♃ — Planta spithamaea habitu accedens ad praecedentem. Caulis teres, demum subaphyllus, tenuissime canescenti-puberulus. Folia minima vix semilinea longiora crassiuscula glabra. Bracteae ovales dorso puberulae corolla longiores vel etiam breviores, vix calyce longiores. Calyx corolla brevior profunde et inaequaliter trifidus, laciniis ciliatis. Corolla infundibuliformi-tubulosa alba minima, limbo minimo obtuse quinquelobo. Stylus demum longe exsertus. — *Selagini adpressae* Chois. et *saxatili* E. M. affinis sed satis distincta. — Crescit in Promontorio bonae spei ad Rhinosterkop. (v. s. sp.)

47. S. SAXATILIS E. Mey. l. c. 269. — Caule fruticuloso erecto subumbellatim ramoso; ramis subviscoso-puberulis; foliis fasciculatis subsemiteretibus divaricatis minutis; spicis subglobosis, demum parum elongatis racemosis; pedunculis spicarum tectis bracteis dense imbricatis late ovatis turgidis, singulorum florum bracteis calycem aequantibus; calycis profunde trifidi ciliati lacinia posteriore anterioribus corollae tubum aequantibus duplo breviore. ♄ — Foliorum fasciculi dense aggregati, folia lineam longa et minora patentia obtusa. Spicae breviter pedunculatae racemosae, pedunculi basi bracteis sterilibus tecti. Corolla

minima alba infundibuliformis, laciniae limbi ellipticae obtusae, stamina et stylus laciniarum longitudine exserta. — *Selagini adpressae* habitu simillima est, sed bractearum sterilium ad spicarum basin calycisque forma satis superque differt. — Crescit in Promontorio bonae spei inter saxa prope Colesberg. (v. s. sp.)

48. S. MICRANTHA Choisy, Mémoir. de la soc. de phys. et d'hist. natur. de Genève II. 2. p. 98. — E. Mey. l. c. — Suffruticosa glabra canescens: caule ramisque ascendentibus flexuosis; foliis fasciculatis linearibus planis valde inaequalibus; spicis oblongis longissime racemosis vel subspicatis; bracteis oblongis calycem vix superantibus; calycis trifidi ciliati lacinia posteriore anterioribus corollae tubum aequantibus duplo breviore. ♃ — Caules ramique quasi volubiles, licet nil comprehendant. Folia primaria 3–4 lin. longa, semilineam lata, folia secundaria in primariorum axillis orta, sensim minora, usque ad lineae unius longitudinem. Spiculae florum brevissime pedunculatae densiflorae 3–4 lin. longae racemoso-subspicatae, anthurum saepe semipedalem efficientes, saepe in axillis foliorum ortae, internodio linearum 2–3 separatae. Bracteae vix lineam longae ovato-lanceolatae glabrae subcarinatae. Corolla alba? vel lutescens? minima glaberrima, laciniae limbi acutiusculae. Stamina minima in fauce subsessilia. Stylus corolla paullo longior. — *S. geniculata* Thnbrg. in Hb. Juss. (nec Fl. Capens.) — Crescit in Promontorio bonae spei prope Nieuwe Hantom vel Zeekoerivier? (v. s. sp.)

49. S. FRUTICOSA Linn. Mantiss. plant. 87. — Thnbrg. Flor. Capens. 460. — E. Mey. l. c. 269. — Fruticulosa, tenuissime puberula: ramis filiformibus erectis; foliis fasciculatis linearibus planiusculis inaequalibus; spicis subglobosis terminalibus, in ramulis superne frequentioribus: bracteis linearibus subnigricantibus (?), flore fere longioribus; calycibus profunde trifidis, excepto nervo dorsali, subscariosis pellucidis ciliatis, lacinia posteriore minima, anterioribus corollae tubum aequantibus. ♄ — Caules 9–12-pollicares simplices, apicem versus ramulosi, teretes tenuissime puberuli. Fasciculi foliorum approximati subsecundi, folia anguste linearia plana 3–5 lin. longa vel etiam breviora puberula. Ramuli versus apicem plures breves pollicares vel sesquipollicares, basi foliosi, apice spicam densam subcapitatam globosam Pisum magnitudine aequantem gerentes, flores nonnulli infra spicam sparsi solitarii. Flores minimi albi. Bracteae lineares, basi paullo latiores, florem aequantes vel subaequantes. Calycis trifidi laciniae lineares acuminatae ciliatae. Corollae minimae tubuloso-infundibuliformis laciniae ellipticae obtusae, stamina breviter exserta, stylus iis paullo longior. — Planta culta subcanescens, folia densiora, ramuli saepe 3-4-pollicares, basi dense foliosi, spica filiformi, basi relaxata, apice incurva saepe pollicari terminati, caeterum non diversa. — *S. capitata* Hort. Berol. (nec alior.) — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. sp. et c.)

50. S. POLYCEPHALA Otto mss. — Fruticosa tenuissime puberula: ramis virgatis erectis; foliis fasciculatis subsecundis linearibus planiusculis acutiusculis inaequalibus; spicis densissimis capitatis ovato-subglobosis, basi interdum relaxatis, in apice ramorum racemoso-corymbosis; bracteis linearibus acuminatis, apice recurvatis, basi utrinque anguste membranaceo-marginatis, corollae tubo subduplo brevioribus; calycis profunde trifidi laciniis ovatis acuminatis acutis, membranaceo-marginatis ciliato-pilosiusculis, bractea duplo brevioribus, lacinia postica parum breviore; corollae tubuloso-infundibuliformis laciniis subaequalibus ellipticis obtusis; staminibus duobus longioribus breviter exsertis, brevioribus subinclusis. ♄ — Species *S. fruticosae* valde affinis, sed datis characteribus certe differt, nisi inter varietates cultura ortas rejicienda erit. — Rami virgati novempollicares densissime foliosi, folia subsecunda, fasciculis valde approximatis, 3–5 lin. longa, interiora breviora, semilineam lineamque fere lata carnosula plana acutiuscula glabra vel tenuissime puberula. Ramuli in apice ramorum racemoso-corymbosi 1–1½-pollicares, foliis paucis sparsis fasciculisque paucis obsiti puberuli, florum spica crassissima densa capitata globosa, 6–9 lin. longa terminati.

Bracteae ante anthesin densissime imbricatae, apice hamuloso-recurvatae, squarrosae, puberulae. Flores nivei, 4 lin. longi, quam *S. spicatatae* fere duplo majores. Fructum maturum non vidi. — In Promontorio bonae spei. (v. s. cult.)

51. S. WITBERGENSIS E Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 270. — Suffruticulosa multicaulis: caulibus ramisque erectis, apice ramulosis; foliis fasciculatis linearibus planis puberulis; spicis terminalibus subsolitariis oblongis; bracteis oblongis calyce multo longioribus, corollae tubum aequantibus; calycis subciliati lacinia posteriore anterioribus obtusis parum breviore. ♃ — A subsequente, cui simillima, differt tenuitate, licet folia vix breviora sint, spicis minime in thyrsum contractis, sed, si mavis, racemosis, ita tamen ut pedunculi inferiores saepe pollicem et ultra longi sint, tum bracteis latioribus obtusioribusque, inprimis vero corollae tubo breviore bracteam haud superante. — Crescit in Promontorio bonae spei in montosis Witbergen.

52. S. CINERASCENS E. Mey. l. c. — Fruticulosa: caule ramisque erectis subumbellatis; foliis fasciculatis linearibus planiusculis subaequalibus; spicis paniculato-thyrsoideis, ramulis nudiusculis; bracteis lanceolatis calyce subduplo longioribus, corollae tubo elongato subduplo brevioribus; calycis lacinia posteriore anterioribus obtusis parum breviore. ♄ — *Selagini cinereae* Thnbrg. (cf. pag. 158. no. 31.) haud dissimilis, differt inprimis foliis minus revolutis, spicis minime fastigiatis, licet nonnumquam laxius sint dispositae et calyce trifido. Utra autem sit vera *S. cinerea* Thnbrg. dubitandum erit. — Foliorum fasciculi oligophylli, folia linearia, basi attenuata, apice saepe parum crassiora, 3–5 lin. longa glabra vel asperata, plana, acutiuscula vel obtusa Spicae breviter pedunculatae subglobosae thyrsoideo-paniculatae, pedunculis puberulis brevibus vix semipollicaribus aphyllis vel foliis paucis alternis obsitis. Bracteae lineares acuminatae corollae tubo subduplo breviores. Calycis minimi trifidi laciniae bractea fere duplo breviores membranaceae acuminatae, postica breviore. Corollae violaceae cylindraceae infundibuliformis laciniae ellipticae obtusae, stamina 2 longiora brevissime exserta, 2 breviora inclusa.

α. Foliis glabriusculis laevibus; ramis pubescentibus. (v. s. sp.)

β. Exasperata: foliis brevioribus praesertim ad marginem scabris; ramis hispidulis. — Crescit in Promontorio bonae spei.

53. S. DECIPIENS E. Mey. l. c. — Fruticulosa erecta superne ramosa: foliis fasciculatis linearibus, margine subrevolutis pubescentibus; spicis in ramulis filiformibus nudiusculis subcymosis semiglobosis, demum oblongis; bracteis lineari-lanceolatis, demum squarrosis calyce multo longioribus corollae tubum subaequantibus; calycis lacinia posteriore anterioribus duplo breviore. ♄ — Frutex 9–12-pollicaris, virgato-ramosus. Rami teretes ferruginosi tenuissime pubescentes, sursum subcanescentes. Folia in fasciculis pauca terna senave lineari-lanceolata carnosula, 3–6 lin. longa, ½–1 lin. lata, glabra, margine subrevoluta, infra uninervia. Spicae pedunculatae corymboso-racemosae breves, sub anthesi semiglobosae, demum elongatae cylindricae. Bracteae lanceolato-lineares acuminatae, basi membranaceo-marginatae subciliatae, dorso puberulae. Calycis laciniae majores bractea dimidio circiter breviores, basi marginatae. Corollae tubus bracteae longitudine, laciniae limbi ellipticae obtusae. Fructus bractea parum brevior fuscus glaber bipartibilis. — *S. angustifolia* Sieb. Herb. fl. Capens. no. 94. (nec Thnbrg.) — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. sp.)

54. S. CILIATA Thnbrg. Flor. Capens. 465. — Choisy, Mém. de la soc. de phys. et d'hist. natur. de Genève II. 2. p. 109. t. 5. — E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 271. — Fruticulosa: ramis hispidis; foliis subsolitariis fasciculatisve ovato-lanceolatis acuminatis rugulosis, ad marginem hispido-ciliatis; spicis terminalibus solitariis cylindraceis; bracteis lanceolatis acuminatis corollae tubum aequantibus hispido-ciliatis; calycis profunde trifidi hispiduli laciniis subaequalibus, apice subulatis, corollae tubo duplo brevioribus. ♄ — Caules subsimplices virgati 7–8-pollicares, apice corymboso-ramosi teretes hispido-pilosi. Folia approximata,

pleraque alterna solitaria, fasciculatis paucis intermixtis, sessilia, ovato-lanceolata acuminata integerrima, primaria saepe semipollicaria, 2–3 lin. lata, axillaria minora 2–3 lin. longa (secundum Thunbergium omnia *lineam* longa, secundum Choisy [Mém. de Genève II. 2. p. 109.] tres lineas longa), supra glabriuscula, infra sparse pilosula, margine longiuscule ciliata. Spicae terminales cylindraceae breves, folia sensim in bracteas lanceolatas acuminatas abeunt corollae tubum aequantes. Corollae laciniae breves ellipticae obtusae. Stamina vix exserta. — Crescit in Promontorio bonae spei in collibus inter Buffeljagtrivier et Karmelksrivier. (v.s.sp.)

55. S. ROTUNDIFOLIA Thnbrg. l. c. — Fruticulosa erecta: ramis subfastigiatis erectis subsimplicibus elongatis puberulis; foliis fasciculatis (saepe quaternis) obovatis subcoriaceis pallidis subaequalibus; spicis subcorymboso-fastigiatis, demum parum elongatis; bracteis oblongo-naviculariibus obtusis calyce multo longioribus, corollae tubo elongato brevioribus; calycis subtripartiti puberuli lacinia posteriori sublineari, fere duplo breviore, anterioribus oblongis obtusis. ♄ — Caules virgati pedales et altiores simplices, apice corymboso-ramulosi canescenti-tomentelli, dense foliosi. Folia omnia vel saltem pleraque fasciculata obovata obtusa vel acutiuscula coriacea, 2–4 lin. longa, 1–2 lin. circiter lata crassiuscula glabra vel tenuissime puberula. Ramuli in corymbum racemosum terminalem coarctati 1–1½-pollicares. Spicae breves laxiusculae. Bracteae oblongo-naviculares obtusae calyce triente circiter longiores. Corollae purpurascentis? laciniae ovales obtusae. — Crescit in Promontorio bonae spei in depressis humidis inter Klaasniemandfontein et Bethelsdorp. (v. s. sp.)

§. 2. *Foliis solitariis sparsis.*

56. S. RECURVA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 271. — Fruticulosa: ramis ramulisque subumbellatis curvatis scabriusculis; foliis sparsis lata basi sessilibus lanceolatis acutis, basi appressis subimbricatis, apice recurvatis, margine hispidulo-ciliatis; spicis terminalibus cylindraceis; bracteis lanceolato-acuminatis calyce parum longioribus, corollae tubum aequantibus; calycis subtripartiti laciniis lanceolato-subulatis hispido-ciliatis, posteriore subduplo breviore. ♄ — Rami simplices virgati semipedales angulati puberuli, foliis dense imbricatis tecti. Folia 3 lin. longa, 1–1½ lin. lata adpressa (apice recurvata), superiora laxiora, sensim in bracteas lanceolato-acuminatas transeuntia corollae tubum aequantes. Spica pollicaris cylindrica densa multiflora. Corollae albae? laciniae ellipticae obtusae breves. — Crescit in Promontorio bonae spei in planitie calcarea inter Kuga et Zondagrivier. (v. s. sp.)

57. S. MYRTIFOLIA Rchb.! Hort. botanic. III. 10. t. 223. — Fruticulosa: ramis subvirgatis simplicibus vix puberulis; foliis alternis oppositisque sessilibus ovali-ellipticis, utrinque acutiusculis integerrimis glabris crassiusculis; spicis terminalibus laxis elongatis; bracteis lanceolatis foliaceis corollae tubo filiformi cylindraceo duplo brevioribus; calycis profunde trifidi laciniis lateralibus ex ovato lanceolatis bractea duplo brevioribus, postica paullo angustiore et breviore. ♄ — Species pulcherrima, habitu *Polygalas* nonnullas aemulans. Fruticulus 9-pollicaris virgato-ramosus, rami vix puberuli foliisque breviter subdecurrentibus angulati, demum teretes. Folia semipollicaria, 2–2½ lin. lata laete viridia glabra crassiuscula, opposita vel alterna, internodia foliorum duas tertias saepe attingunt, suprema sensim in bracteas breviores et acutiores ovali-lanceolatas acutas abeunt. Corollae pulchre violaceae tubus saepe 5–6 lin. longus cylindraceus rectus, laciniae limbi ellipticae obtusae breves. Stamina 2 superiora breviter exserta, 2 breviora subinclusa. Stylus longiuscule exsertus. Fructus......? — *S. polygaloides* Sieb. Herb. flor. Capens. 181. (nec Thnbrg.) — *Selago Gillii* Lindl. Bot. Regist. t. 1504. — Hook. Bot. Magaz. t. 3028. — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. sp. et c.)

58. S. GLABRATA Choisy, Mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 101. (excl. syn.) — Foliis fasciculatis linearibus glabris; floribus per spiculas

laxas laxam racemosam terminalem spicam efformantes, dispositis; bracteis ovato-acutis; calycibus glabris. ♄ — Caulis glaber teres ramosus fruticosus. Folia glabra linearia fasciculata 2–3 lin. longa. Bracteae acutae glabrae ovatae sesquilineam longae integrae. Calyx glaber minimus trifidus margine membranaceus acutus aequalis. Corolla calyce longior tubulosa, limbus quadrilobus obtusus subaequalis. Stamina corollam superantia, filamenta longa, antherae luteae. Stylus tubum superans. Florum spiculae laxae terminalem laxam spicam efformantes. — Huc pertinere dicuntur *S. triquetra* Thnbrg., *S. canescens* Thnbrg. et *S. fruticosa* Thnbrg., species diversissimae nec ejusdem sectionis! — Crescit in Promontorio bonae spei.

† *Species non satis notae.*

59. S. OHLENDORFFIANA Lehm. Linnaea VI. Literaturb. 74. — Caule fruticoso ramoso; foliis oblongo-lanceolatis integerrimis glabris coriaceis tenuissime albo-marginatis, inferioribus revolutis; spicis ovatis simplicibus terminalibus subsolitariis. ♄ — Crescit in Promontorio bonae spei.

60. S. POLYGALOIDES Thnbrg. Flor. Capens. 462. — „Foliis linearibus glabris imbricatis; spicis fasciculato-terminalibus; bracteis carinatis ciliatis. ♄ — Frutex erectus scaber a casu foliorum cinereus glaber ramosus bipedalis et ultra. Rami inferne pauci cauli similes elongati divaricato-patentes erecti, apice ramulosi. Ramuli in apicibus ramorum frequentes filiformes erecti virgati pubescentes digitales. Folia in ramis et inferiore parte ramulorum sparsa acuta integra, margine reflexo, apice patula pollicaria. Spicae in apice ramulorum fasciculatorum terminales digitales. Flosculi distincti. Bracteae ovatae acuminatae concavae subciliatae glabrae. Calyx scaber, imprimis carina.“ — Ab *Agathelpide angustifolia* Choisy, Mém. de Genève II. 2. p. 95. differre videtur. — Crescit in Promontorio bonae spei.

61. S. DECUMBENS Thnbrg. l. c. 465. — „Foliis obovatis dentatis hirsutis; caule decumbente; capitulis aphyllis. ♄ — Caulis radicalis fruticosus. Rami sparsi et oppositi filiformes et capillares hirsuti villo albo subsecundi flexuoso-erecti. Folia opposita petiolata, apice serrata, serraturis circiter tribus utrinque, patentia unguicularia. Petioli longitudine foliorum. Capitula terminalia in apicibus ramulorum ovata. Calyx hirsuto-hispidus.“ — Crescit in Promontorio bonae spei.

62. S. SCABRIDA Thnbrg. l. c. 461. — (Cf. supra p. 160. no. 36.) — „Foliis lanceolatis scabris; spicis terminalibus ovatis.“ ♄ — Frutex erectus palmaris, spithamaeus vel ultra. Rami subverticillati divaricati erecti simplices vel apice ramulosi. Folia sparsa sessilia integra, margine revoluta piloso-scabrida frequentia, lineam longa. Axillae foliis onustae. Spicae unguiculares. Calyces et bracteae ciliato-hispidae.“ — Crescit in Promontorio bonae spei.

63. S. RAMULOSA Lnk. Enumer. pl. hort. Berolin. II. 124. — „Caule diffuso superne pubescente; foliis lanceolatis obtusatis argute serratis glabris; spicis terminalibus subsolitariis. ♄ — Caulis 1–2-pedalis, superne diffusus debilis. Folia sessilia 8–10 lin. longa, 3–4 lin. lata obtusata, at acuta basi attenuata, in ramulis florentibus abbreviata linearia integerrima acuta copiosa. Spicae breves in apicibus ramulorum. Calycis laciniae lineares pubescentes valde inaequales. Corollae albae tubus 3 lin. longus, limbus brevis.“ — Crescit in Promontorio bonae spei.

64. S. BRACTEATA Thnbrg. Flor. Capens. 465. — „Foliis obovatis obtusis decurrentibus glabris; bracteis ovatis acutis imbricatis. ♄ — Caulis fruticosus nodosus glaber fuscus erectus, pedalis et ultra. Rami subverticillati ramulosi cauli similes divaricati erecti subfastigiati. Folia subverticillata sessilia integra imbricata, subtus medio costata unguicularia. Spicae terminales oblongae. Bracteae integrae, dorso costatae glabrae.“ — Crescit in Promontorio bonae spei.

65. S.? PUSILLA Thnbrg. l. c. 463. — „Foliis ovatis serratis pilosis, flore terminali solitario. ⊙ — Radix fibrosa annua. Caulis herbaceus striatus filiformis simplex erectus pollicaris. Folia opposita sessilia obtusiuscula, margine reflexa nervosa,

lineam longa. Flores ex apice pedunculati. Pedunculi solitarii vel bini erecti, unguicularis alter, alter brevissimus. Calyx pilosus quam corolla alba brevior. — Crescit in Promontorio bonae spei.

†† *Species omnino incognitae.*

66. *S. COERULEA Brnhrdi.
67. *S. PTEROPHYLLA Otto.
68. *S. PURPUREA Cels.

††† *Species e genere expellendae.*

S. ANGUSTIFOLIA Thnbrg. = AGATHELPIS ANGUSTIFOLIA
S. CAPITATA Bergius. = MICRODON OVATUM.
S. DUBIA Linn. = AGATHELPIS ANGUSTIFOLIA.
S. ERICOIDES Linn. = STILBE ERICOIDES.
S. LUCIDA Vent. = MICRODON LUCIDUM.
S. LYCHNIDEA Linn. = ERINUS FRAGRANS.
S. OVATA Thnbrg. = MICRODON OVATUM.
S. PINASTRA Linn. = STILBE PINASTRA.
S. ROTUNDIFOLIA Linn. = MICRODON LUCIDUM.
S. SPICATA Lnk. = MICRODON LINKII.
S. TOMENTOSA Linn. = MANULEA TOMENTOSA.

VI. (3730.) MICRODON *Choisy.*

(Choisy, Mémoires de la societé de phys. et d'hist. natur. de Genève II. 2. p. 97. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 292. II. 201.)

1. M. LUCIDUS Choisy l. c. 97. — Foliis obovatis, obovato-oblongis vel obovato-ellipticis, basi cuneato-attenuatis subimbricatis; spicis cylindricis densis terminalibus; bracteis late ovatis abrupte acuminulatis integris vel subdenticulatis. ♄ — Frutex humilis ramosus, rami teretes sub lente puberuli. Folia obovata obtusa 6–8 lin. longa, 3 lin. lata, erecto-patentia subimbricata densa coriacea glabra integerrima, basi cuneata in petiolum brevissimum adpressum attenuata, sensim in bracteas abeunt orbiculari-ovatas breviter acuminulatas, latiores quam longas, integras vel cartilagineo-subdenticulatas, corollae tubum subaequantes, calyce fere duplo longiores. Spicae breves cylindricae terminales multiflorae. Calyx tubulosus quinquedenticulatus laxiusculus brevis. Corolla calyce plus duplo longior alba(?), tubo cylindraceo-filiformi, limbo quinquelobo, laciniae parvae subaequales ellipticae obtusae. Stamina didynama, duo longiora breviter exserta. — „Calyx fructifer infra pubescens. Semina duo, quorum alterum saepe abortivum, alterum in pericarpio subosseum." — *Selago lucida* Venten. Jard. de Malmais. t. 26. — *Selago rotundifolia* Linn. fil. Supplement. 285?

α. Foliis exacte obovatis, basi cuneatis; bracteis ovatis acuminatis, cartilagineo-subdenticulatis lucidis.

β. Oblongatus: Foliis obovato-oblongis, basi cuneatis; bracteis ovatis acuminatis integerrimis laevibus.

γ. Ellipticus: Foliis ellipticis obovatisve; bracteis late ovatis, brevissime acuminatis integerrimis laevibus. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus montosis Piquetberg et Nieuwekloof. (v. s. sp.)

2. M. OVATUS Choisy l. c. 97. t. I. fig. 4. — Foliis fasciculatis linearibus; floribus dense spicatis; bracteis ovato-rotundatis in appendicem foliaceum productis. ♄ — Caulis teres, sub lente pubescens. Folia linearia fasciculata integra glabra. Flores dense spicati, quandoque subcapitati. Bracteae membranaceae glabrae ovato-rotundatae in obtusiusculum foliaceum acumen productae. Calyx tubulosus membranaceus quinquedentatus glaber. Corolla vix tubo calycem superans, apice quinqueloba, lobis subaequalibus obtusis. Stamina didynama e tubo exserta, antherae biloculares(?), loculis juxta lineam insertionis filamenti sese aperientibus. Semen unicum saepe abortivum. — *Selago ovata* Ait. Hort. Kewens

(edit. 2.) III. 432. — Lam. Illustr. t. 521. fig. 1. — Curt. Bot. Magaz. t. 186. — *Lippia ovata* Linn. Mantiss. pl. 89. — *Selago capitata* Bergius, Flor. Capens. 157. — Willd. Spec. pl. III. 184. — *Dalea Lippiastrum* Grtnr. De fructib. et seminib. pl. I. 235. t. 51. — (Cf. supra pag. 43. adnot. ad no. 3.) — Crescit in Promontorio bonae spei.

3. M. LINKII Wlprs. mss. — Foliis sparsis lineari-lanceolatis, basi angustatis glabris alternis; spicis terminalibus; bracteis obovatis rhombeisque vel ovatis abrupte acuminatis membranaceis glabris. ♄ — Caulis erectiusculus, rami angulati pubescentes. Folia approximata 9 lin. longa, 1–2 lin. lata, superiora breviora, 4–6 lin. longa, lineam lata lanceolato-linearia, basi attenuata plana membranacea sparsa subremota. Spica terminalis, a foliis breviter disjuncta sesquipollicaris densa multiflora. Bracteae florum inferiorum lineari-ellipticae subfoliaceae, superiorum mox rhombeo-ovatae abrupte acuminatae membranaceae, margine subscariosae integrae, calyce triente longiores, corollae tubo parum breviores. Calyx tubulosus quinquedentatus, dentibus brevibus triangularibus vix acutiusculis subaequalibus. Corollae albae (siccae obscure violascentis) tubus cylindricus 4 lin. longus, laciniae subaequales ellipticae obtusae. Stamina 2 longiora brevissime exserta, duo breviora cum stylo in fauce. — *Selago spicata* Lnk. Enumer. plant. hort. Berol. II. 124. — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. c.)

4. M. CYLINDRICUS E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 253. — Foliis linearibus sparsis fasciculatisque; spicis cylindricis; bracteis ovatis carinatis cum calyce demum reflexis. ♄ — Species polymorpha. Rami fere pedales virgati simplices vel apice spicas plures subracemosas gerentes glaberrimi vel vix tenuissime puberuli. Folia densissima solitaria ramos per totum ambitum tegentia erecta subimbricata linearia, basi attenuata, margine subrevoluta, glabra vel infra tenuissime puberula, in varietate remotiora fasciculata, maxima pollicaria, vix lineam lata glaberrima glauca. Spica terminalis $2\frac{1}{2}$-pollicaris densiuscula, demum elongata relaxata, in varietate plures versus apicem ramorum racemosae laxae 3–4-pollicares. Bracteae inferiores lanceolato-lineares acuminatae foliaceae, corollae tubum aequantes, superiores ovatae acuminatae carinatae membranaceae, corollae tubo parum breviores, calyce longiores, demum cum calyce reflexae. Flores brevissime pedicellati. Calyx tubulosus basi cum bractea coalitus, breviter quinquedentatus. Corollae tubus cylindricus 3 lin. longus, laciniae limbi ellipticae obtusae. Ovarii loculum alterum abortivum, achaenium calyce inclusum.

β. Foliis fasciculatis; spicisque in apice ramorum racemosis laxioribus. — Crescit in Promontorio bonae spei in montosis saxosis Dutoitskloof. (v. s. sp.)

VII. (3729.) AGATHELPIS *Choisy.*

(Choisy, Mémoir. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. p 95. — Meisner, Gener. plant. vascular. I. 292. II. 201.)

1. A. NITIDA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 252. — Foliis lineari-filiformibus patentissimis, rhachi retorsum hirta; bracteis oblongo-lanceolatis nitidis; calycis angulis anterioribus submuricellatis. ♄ — Rami virgati pedales teretes tenuissime puberuli. Folia approximata sparsa, angustissime linearia subfiliformia plana obtusiuscula glabra, basi attenuata semipollicaria vel parum longiora, uninervia, interdum margine subrevoluta. Spica terminalis a foliis non sejuncta 2–3-pollicaris densa, flores patentes. Bracteae oblongo-lanceolatae carinatae subtrinerviae, 4 lin. longae, sesquilineam latae, vernice quasi abductae nitidae membranaceae pellucidae, calycem duabus tertiis superantes, quam corolla duplo vel tertia parte breviores. Calyx tubuloso-quinquangularis, fere medium usque cum bractea coalitus brevissime quinquedentatus, incisura postica profundiori. Corolla tubulosa incurvata semipollicaris paullove longior, laciniae limbi quinquepartiti parvulae ovales acutiusculae subaequales. Stamina duo, tubo corollino per totam fere longitudinem adnata, apice brevissime libera inclusa, antherae lineares uniloculares. Stylus staminibus brevior inclusus. Fructus a me non vi-

sus. — Flores anantheros foemineos in eadem spica vidisse credo. — Crescit in Promontorio bonae spei ad Cataractam in monte Duivelsberg. (v. s. sp.)

2. A. MUCRONATA E. Mey. l. c. — Foliis linearibus erectiusculis, rhachi cauleque subpubescentibus; bracteis oblongo-ovatis mucronulatis; calycis angulis anterioribus muricellatis. ♄ — Rami virgati sesquipedales teretes glaberrimi vel tenuissime puberuli, versus apicem ramulosi, ramulis similibus. Folia approximata sparsa solitaria vel superiora accedentibus nonnullis axillaribus subfasciculata, linearia plana erecta patentia vel subrecurvata rigida glabra acuta uninervia 6–7 lin. longa, lineam lata, basin versus parum attenuata. Spicae semipedales brevioresque a foliis non distinctae laxiusculae multiflorae terminales solitariae. Bracteae oblongo-ellipticae (vix oblongo-ovatae!) acuminulato-mucronatae, apicem versus membranaceae, glabrae, vix carinatae, 3 lin. longae, calyce parum longiores, corolla saepe quadruplo, semper tamen triplo breviores. Calyx tubuloso-quinquangularis brevissime quinquedenticulatus, basi cum bractea breviter coalitus, angulis duobus anterioribus argute muriculatis. Corollae tubus saepe semipollicaris filiformi-tubulosus incurvatus, limbi laciniae ovales obtusiseulae. Stamina 2 inclusa brevissime libera. Stylus breviter exsertus. Fructus desideratur. — Crescit in Promontorio bonae spei in montosis asperis inter Wagenmakersvalei et Dutoitskloof, Piquetberg et prope Gnadenthal. (v. s. sp.)

3. A. PARVIFOLIA Choisy, Mém. de la soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève II. 2. p. 96. — Foliis ovato-linearibus acutis glabris subimbricatis; floribus dense spicatis; bracteis ovato-acutis concavis carinatis; calycis tubulosi quinquedentati dentibus duobus superioribus brevioribus. ♄ — „Folia vix longitudine unguinis. Ramuli teretes scabriusculi cicatrisati. Corolla alba, tubus filiformis bractea longior, laciniae limbi ovato-oblongae obtusae, tubo breviores." — *Frutex Africanus Ericae folio glutinosus, flore spicato albo* Commel. Hort. Amstelod. II. 119. t. 60. — *Thymelaea Africana foliis Lini, floribus in capitulum congestis* Herrm. Afric. 33. — *Eranthemum parviflorum* Bergius, Plant. Capens. pag. 2. — *Eranthemum parvifolium* Linn. Mantiss. pl. 171. — Lam. Dict. II. 384. et Illustr. gen. t. 17. fig. 2. — Crescit in Promontorio bonae spei.

4. A. (SELAGO Thnbrg. Prodr. flor. Capens. 98., Flor. Capens. 462.) ANGUSTIFOLIA Choisy l. c. 95. t. 1. fig. 3. — Foliis lineari-subfiliformibus patulis; rhachi glaberrima; bracteis oblongis acutiusculis; calyc laevi. ♄ — Frutex pedalis vel bipedalis ramosus, rami vix puberuli, foliorum basi persistente obsiti teretes. Folia sparsa ramotiuscula vel densa subimbricata lineari-subfiliformia plana glabra obtusiuscula carnosula, basi parum attenuata, 5–9 lin. longa, semilineam lata paullove latiora. Spicae terminales laxae bipollicares vel etiam pedales, floribus alternantibus interstitio aequali dispositis. Rhachis stricta angulato-sulcata glaberrima vel vix retrorsum puberula. Bracteae ovali-oblongae acuminulatae nec acutiusculae (*obtusiusculae* appellandae) glaberrimae, subcarinatae, cum calyce basi coalitae eoque parum longiores, tubo corollino plus duplo breviores, 1½–2 lin. longae, lineam latae. Calyx tubuloso-quinquangularis acute quinquedentatus, dentibus subaequalibus, glaber. Corollae tubus incurvatus cylindrico-filiformis 4–5 lin. longus, laciniae limbi ellipticae obtusae. Stamina more generis inclusa brevissima. Stylus longiuscule exsertus. Achaenium solitarium calyce inclusum eoque paullo longius semiteres glaberrimum. Carpelli alterius rudimentum nullum. — *Valeriana Africana fruticans foliis Ericae* Commel. Hort. Amstelod. 221. t. 111.? — *Thymelaea foliis angustissimis linearibus, flosculis spicatis* Burm. Afric. 127. t. 47. fig. 3. — *Thymelaea Aethiopica spicata glabra, foliis longioribus angustis* Pluken. Mantiss. 180. t. 445. fig. 6. — *Selago dubia* Linn. Spec. plant. 877. — *Eranthemum angustifolium* Linn. Syst. nat. 55. — Lam. Encycl. méth. II. 384. t. 17. fig. 1. (Illustr. gen.) — *Eranthemum angustatum* Linn. Mantiss. 171. — *Selago polygaloides* Linn. fil. Supplem. 284.? — Thnbrg. Fl. Cap. 462.???? — Calyx fructifer pendulus dicitur, sed a me semper erecto-patens visus est. — Crescit in Promontorio bonae spei in montibus Tafelberg et Paarlberg. (v. s. sp.)

5. A. ADUNCA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 252. — Foliis lineari-subfiliformibus erectiusculis, rhachi cauleque tenuissime puberulis; bracteis oblongo-linearibus, apice retrorsum aduncis; calycis angulis anterioribus submuricellatis. ♄ — Bracteas apice retrorsum aduncas in speciminibus ab ipso Meyero missis conspicere nequeo; ab *A. angustifolia* differunt foliis laxioribus ad pollicem usque elongatis (sed etiam breviora semipollicaria reperiuntur) et bracteis oblongo-linearibus vel lineari-lanceolatis acuminulatis acutiusculis; caeterum in eodem specimine calyces muricellati et glaberrimi conspiciendi sunt. — Species igitur dubia et recognoscenda. — Crescit in Promontorio bonae spei in arenosis ad Groenekloof et Klipberg, inter Pikenirskloof et Pretoriskloof alibique. (v. s. sp.)

6. A. BREVIFOLIA E. Mey. l. c. 253. — Foliis lineari-oblongis, rhachi glaberrima; bracteis ovato-lanceolatis acuminatis; calycis angulis anterioribus muricellatis. ♄ — Rami annotini foliorum basi persistente lignescente subtuberculosi glaberrimi cinerascentes. Folia approximata densa subimbricata lineari-oblonga vel ovalia, acutiuscula vel obtusa carnosula laete viridia glaberrima 2—3 lin. longa, lineam lata paullove angustiora. Spica terminalis, infra adeo relaxata, ut eam pedunculatam appellares. Rhachis glaberrima. Bracteae ovato-lanceolatae acuminatae acutae, inferiores steriles, submembranaceae, dorso uninerviae subcarinatae, calyce parum longiores, corollae curvatae tubo cylindraceo-filiformi duplo fere breviores, calycis basi adnatae. Calyx tubulosus acute quinquangularis, angulis duobus anterioribus basi argute muricellatis acute et aequaliter quinquedentatus, quam corollae tubus duplo circiter brevior. Laciniae corollae brevissimae ellipticae obtusae; stylus exsertus. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus prope Honigvalei et Ezelsbank. (v. s. sp.)

Ordo CLIX. STILBINEAE *Kth.*

(Kth. Hndbch. der Botanik 393. et Abhndlngn. der Berliner Akademie 1831. pag. 201. — Endl. Gener. plant. pag 639. — Meisner, Gener. plant. vascul. I. 315. II. 225.)

I. (3724.) STILBE *Bergius.*

(Bergius, Flor. Capens. 30. t. 4. fig. 6. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 315. II. 226.)

1. ST. (SELAGO Linn. Mantiss. plant. 87. — LUEHEA W. Schmidt in Usteri, Annal. der Bot. X. 115.) ERICOIDES Linn. Mantiss. plant. 305. — Foliis quaternis ovatis subimbricatis; bracteis conformibus. ♄ — Fruticulus habitu ericoideo pedalis vel minor virgato-ramosus, rami pallescentes subsimplices glaberrimi dense foliosi. Folia quaterna imbricata adpressa ovata obtusiuscula 2-2½ lin. longa carnosula glabra. Spicae breves cylindricae terminales multiflorae solitariae, a foliis non distinctae; bracteae foliis omnino conformes. Calycis laciniae inaequales, stamen superius deficit. Caeterum structura floris simillima est sequentibus. — *St. virgata* Lam. Encycl. méth. XIII. 252? *) — β. Foliis ovato-sublinearibus patulis. — Descriptionem uberiorem addere nequeo, quum manca tantummodo viderim specimina. — Crescit in Promontorio bonae spei in planitie arenosa inter Tygerberg

---

*) *ST. VIRGATA Lam. Encycl. méth. XIII.* 252. *et Illustr. gener. t.* 356. *fig.* 3. — *Foliis minimis imbricato-sparsis; floribus capitulatis; ramis virgatis; ramulis subverticillatis saepeque bifidis.* ♄ — *Folia* 2 *lin. longa.* — *Crescit in Promontorio bonae spei.*

et Simonsberg et inter Cap Agulhas et Potberg, etiam in planitie ad Wynberg. (v. s. sp.)

2. ST. ALBIFLORA E. Mey. Comment. pl. Afric. austr. I. 279. — Foliis subsenis linearibus erectiusculis, apice subrecurvis; bracteis unguiculatis oblongo-lanceolatis acuminatis. ♄ — Frutex erectus pedalis et altior, rami virgati simplices erecti glaberrimi, foliorum delapsorum cicatricibus eleganter areolato-insculpti pallescentes fuscescentes. Folia densa subimbricata, ordine simplice spirali, in caule dextrorso, in ramis sinistrorso disposita, spirae, 18 folia amplectentis cycli rameales quaterni, caulini bini, rameales praerupti, caulini planiusculi. Folia linearia acuminata acuta, basi parum attenuata acicularia glaberrima glauca, supra plana enervia, infra lineis duabus impressis apicem versus confluentibus notata, apicem versus semiteretia pungentia, 3-4 lin. longa, semilinea parum latiora, infra spicam densius imbricata breviora, ordine tamen eorum non turbato. Spicae in ramis terminales densissimae ovali-globosae, 6-9 lin. longae solitariae, interdum ramulo infra spicam accessorio accedente spicaque ideo demum laterali. Flores densissime imbricati, ordine ut videtur paullo alio sed nisi spica laesa non extricando. Rhachis teres areolata pilis brevibus albis dense obsita. Bracteae oblongo-lanceolatae acuminatae unguiculatae, dorso supra medium lineis duabus brevissime impressis confluentibus notatae, 4 lin. longae, lineam latae glaucescentes glaberrimae. Bracteolae utrinque ad calycis basin laterales oblongo-lineares concavae acutiusculae, basin versus longe attenuatae, bractea intermedia parum breviores, in alabastro florem arcte includentes, margine apicem versus tenuissime albo-ciliatae, caeterum glaberrimae membranaceae, vix apice virescentes. Calyx tubulosus subpentagonus glaberrimus brunneus coriaceo-scariosus aequaliter 5-dentatus, dentibus brevibus obtusiusculis triangularibus, e latere interiori dense albo-villoso-ciliatis corollae tubum arcte includentibus. Corolla pallide alba tubulosa, tubo filiformi calycis longitudine, ad faucem barbellato, limbi quinquepartiti laciniae subaequales lineares obtusae, tubo parum longiores, staminibus summo tubo insertis parum breviores glaberrimae. Stamina 5 cum laciniis corollae alterna, quinto postico ananthero vel etiam (saepius) plane deficiente. Stylus staminibus parum longior, stigmate simplici instructus. Fructus desideratur. — *St. ericoides* Lam. Encycl. méth. et Illustr. gener. t. 856. fig. 2? (nec Linn.) — A vera *St. ericoide* diversissima est toto habitu, omnium partium magnitudine florumque colore albo, licet characteribus certis aegre distinguatur. Bracteae foliis semper dissimiles. — Crescit in Promontorio bonae spei in rupestribus montosis subhumidis ad Cataractam prope Tulbagh, Piquetberg et inter Biedow et Honigvalei. (v. s. sp.)

3. ST. PINASTRA Linn. Mantiss. plant. 305. — Foliis subsenis patulis linearibus, apice incurvatis. ♄ — Frutex erectus virgato-ramosus pedalis, rami virgati simplices densissime foliosi, pallide fuscescentes, una cum caule foliorum delapsorum cicatricibus eleganter tuberculosi. Folia exacte verticillata, verticillis valde approximatis, subimbricata sena anguste linearia acuminata acuta primum adpressa, demum patula, apice incurvata pungentia, tres lineas longa, vix lineam lata saepeque minora, supra plana, infra nervis geminis impressis infra apicem convergentibus notata, glaberrima glauca. Capitula terminalia solitaria densissima multiflora, floribus arcte imbricatis, ovato-globosa, 8 lin. longa, semipollicem circiter crassa. Bracteae ternae, intermedia exterior brevissime unguiculata ovata longe angusteque attenuata, dorso carinata, concava, parte attenuata omnino foliacea nervisque geminis leviter impressis infra apicem confluentibus notata virescens, infra cartilagineo-membranacea, margine utrinque et in pagina interiori ad partem attenuatam usque villosa. Bracteae laterales aequilongae oblongo-lanceolatae acuminatae carinatae calycem subincludentes membranaceae, apicem versus villoso-ciliatae. Calyx pentagonus tubulosus brunneus glaberrimus nitidissimus coriaceus, ad tertiam partem quinquefidus, dentibus acutiusculis, pagina interiore albo-villosis ciliatisque. Corolla tubulosa (rosea? alba?) ad faucem parum ampliata, tubo calycis longitudine vel parum longior, laciniae

limbi quinquefidi lineares obtusae, longitudine filamentorum. Stamina 5 cum laciniis corollae alterna summo tubo inserta, quinto breviori antheram sterilem gerente. Stylus staminibus brevior. — *Stilbe vestita* Bergius, Flor. Capens. 30. t. 4. fig. 6. — *Selago Pinastra* Linn. Spec. plant. p. 836. — Crescit in Promontorio bonae spei in monte Tafelberg et prope Witteboom. (v. s. sp.)

† *Species dubia.*

4. ST. MYRTIFOLIA Lam. Encycl. méth. XIII. 252. — Foliis ovato-lanceolatis acuminatis dense imbricatis; floribus terminalibus fasciculatis. ♄ — Rami recti saepe inaequales et apice bifidi dense foliosi, folia 4 lin. longa, 2 lin. lata. Flores in apice ramorum fasciculati, bracteae breves acuminatae; corollae tubus gracilis, calyce duplo longior, limbi laciniae 5 lanceolatae acuminatae. — Crescit in Promontorio bonae spei.

†† *Species indescripta.*

ST. PHYLICOIDES Lichtenstein (?) mss. in Hb. Reg. Berolin.

††† *Species e genere excludendae.*

ST. CERNUA Thnbrg. = CAMPYLOSTACHYS CERNUA.
ST. SERRULATA Hochstett. = EURYLOBIUM SERRULATUM.

II. (3723/1.) EURYLOBIUM *Hochstett.*

(Hochstett. Flora [B. Z.] XXV. I. p. 228. — Endl. Gener. plant. Supplem. III. p. 77. — Meisn. Gener. plant. vascul. II. 368.)

1. EU. SERRULATUM Hochstett. l. c. 229. — Frutex 1–2-pedalis, habitu proxime accedens ad *Stilben albifloram:* foliis quaternis erectis rigidis coriaceis angustis linearibus, subtus impresso-punctatis, margine serrulato-scabris; floribus terminalibus dense spicatis albis. ♄ — *Stilbe serrulata* Hochst. mss. in Hb. Kraussii — Crescit in Promontorio bonae spei inter rupes in cacumine montis Gnadenthal.

III. (3723.) CAMPYLOSTACHYS *Kth.*

(Kth. Abhndlngn. der Berlin. Akad. 1831. p. 206. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 315. II. 226.)

1. C. (STILBE Thnbrg. Flor. Capens. 146.) CERNUA Kth. l. c. — Spicis oblongis cernuis; corollis quadrifidis; antherarum thecis parallelis. ♄ — Frutex erectus pedalis ramosus, rami virgati subverticillati fastigiati glabri teretes dense foliosi. Folia quaterna verticillata dense approximata patentia 5 lin. longa acicularia crassiuscula subteretia, margine etenim utrinque revoluta, acuta subpungentia glabra. Spicae terminales globosae sessiles, demum cernuae solitariae multiflorae. Bracteae ternae, intermedia paullo majori rhombeo-acuminata, lateralibus lanceolatis. Calyx quinquefidus, laciniis oblique lanceolato-oblongis acuminatis subcoriaceis subaequalibus planis, quinta carinata paullo minori. Corolla infundibuliformis ad faucem hirsuta, limbo quadripartito regulari patente, laciniis oblongis obtusis trinerviis. Stamina 4 summo tubo inter lacinias inserta, erecta aequalia. Antherae dorso affixae biloculares, loculis parallelis intus dehiscentibus. Discus nullus. Ovarium sessile oblongum compressum glabrum biloculare ovulis solitariis erectis. Stylus terminalis filiformis. Stigma simplex emarginatum. — Crescit in Promontorio bonae spei. (v. s. sp.)

2. C. ABBREVIATA E. Mey. Comment. de pl. Afric. austr. I. 279. — Spicis brevissimis erectiusculis; corollis quinquefidis, antherarum thecis divaricatis, apice confluentibus. ♄ — Frutex erectus ramosissimus, ramis plerumque dichotomis cum rhachi persistente in dichotomia subspinescente brevissima. Folia quaterna verticillata dense imbricata erecta, subsemipollicaria, lineari-acicularia acuta glaberrima planiuscula. Spicae brevissimae a foliis omnino inclusae nec exsertae erectae multiflorae. Bracteae ternae, intermedia omnino foliacea, flore duplo fere longior, laterales florem aequantes lanceolato-acuminatae subcoriaceo-membranaceae, basi complicatae semiincludentes calycem. Calyx viridis

herbaceus fere basin usque quadrifidus, laciniis lanceolato-acuminatis subciliolatis, quarta latiori profunde aculeque bidentata. Corolla alba? infundibuliformis calyce parum longior quinquefida, laciniis ellipticis obtusis, intus barbellatis. Stamina 5 brevia cum laciniis alterna summo tubo inserta, quinto reliquis duplo breviori imperfecto. — Crescit in Promontorio bonae spei in Draakensteensbergen. (v. s. sp.)

† **Genus excludendum.**

SOLENOSTIGMA Kltzsch. in Herb. Kraussiano jam ad **Retziam** relatum est. Cf. Repert. III. p. 125.

Ordo CLX. GLOBULARIEAE *Lam.*

(Lam. in DC. Flor. Franc. III. 427. — Endl. Gener. plant. pag. 639. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 315. II. 226. — Cambessèdes in Annales des sciences naturelles IX. 15.)

I. (3725.) GLOBULARIA *Linn.*

(Linn. Gener. pl. no. 112. — Meisn. Gener. plant. vasc. I. 315. II. 226. — Cambessèdes, Ann. sc. natur. IX. 22.)

1. GL. NUDICAULIS Linn. Spec. plant. 140. — Jcq. Fl. Austriac. I. 230. — Cambess. l. c. 23. † — Herbacea: foliis spathulatis uninerviis integerrimis; calyce bilabiato, fauce nuda; corollae bilabiatae labio superiori rudimentali vel abortivo, inferiore profunde trifido. ♃ — Caulis herbaceus erectus. Folia radicalia longa oblongo-obovata, apice integerrima, in petiolum gradatim attenuata uninervia, caulina paucissima (3–5) minima sessilia lineari-lanceolata, acuta quinquenervia glabra, margine ciliolata. Calyx breviter quinquefidus bilabiatus, tubo tetragono obpyramidato, extus ad angulos laterales ciliolato, fauce nuda, segmentis ovatis acutis, margine ciliolatis. Corolla bilabiata, labio superiori rudimentali bipartito vel saepius labio superiori omnino abortivo unilabiata, inferiore profunde trifido multo longiori. — (*Scabiosa Bellidis folio humilis, caule nudo, radice non repente* Moris. Oxon. histor. III. 50. sect. 6. t. 15. fig. 4.) — Crescit in toto Alpium jugo a Delphinatu ad Austriam usque, in Pyranaeis et in regno Neapolitano.

2. GL. SPINOSA Linn. Spec. plant. 139. — Cambessèd. l. c. 24. † t. 40. — Herbacea: foliis spathulatis 3–5-nerviis, apice 3–7-dentatis; calyce bilabiato; corolla bilabiata, labio superiore bipartito, inferiore trifido. ♃ — Radix perennis crassiuscula fusca. Caulis basi veterum foliorum cicatricibus exasperatus simplex pedalis et ultra foliosus subascendens striatus glaberrimus laevis. Folia coriacea glaberrima laevia glaucescentia, radicalia numerosa 3–5-nervia, nervis dorso prominulis, 3-4-uncialia, limbus ellipticus 16–22 lin. longus, saepissime apice profunde tridentatus, dentibus acutis, rarius 5–7-dentatus, dentibus inferioribus minoribus, vel integer, apice mucronatus, petiolus limbo paullo longior, basin versus attenuatus; folia caulina 10–14 subaequidistantia alterna sessilia lanceolata acuminata, inferioribus unciam longis, 3 lin. latis, superioribus gradatim brevioribus. Involucrum polyphyllum, foliolis triplici vel quadruplici serie imbricatis lineari-lanceolatis glabriusculis, margine longe ciliatis, pilis subulatis septiferis. Paleae lanceolatae subulatae florem subaequantes, dorso supra medium villosae.

Calyx profunde bilabiatus 2½ lin. longus pilosulus, labio superiore tripartito, lobis approximatis, inferiore bi- vel rarissime tripartito, lobis remotiusculis, omnibus subaequalibus subulatis rigidis, margine ciliatis, tubo obpyramidato tetragono compresso, extus ad angulos laterales (labiorum sinubus respondentes) ciliato, fauce pilis clausa. Corolla tubulosa bilabiata, tubo calycem vix aequante, labio superiore bipartito, lobis lineam longis filiformibus, inferiore duplo longiore (2 lin. longo) trifido, segmentis linearibus obtusiusculis. Stamina longiora labio inferiore triente breviora. Ovarium ovoideum glabrum. Stylus filamentis paullo longior filiformis, apice emarginatus.

α. Foliis radicalibus 3–7-dentatis, dentibus minimis acutis.

β. Foliis radicalibus profunde tridentatis seu integris, apice mucronatis. — *Gl. linifolia* Lam. Dict. II. 731. (excl. syn. Pluken.) — *Gl. caespitosa* Ortega. — Crescit in insulis Balearicis et in Hispaniae privincia Granadensi.

3. GL. MACRANTHA C. Koch. mss. — Herbacea pluriceps: foliis rosulatis subcartilagineis spathulatis, caulinis rarioribus; paleis lanceolatis hirsutis; calyce ad basin paene partito, laciniis setaceis (ad 3 lin. longis), labii inferioris laciniis longissimis tubum calycis semel et bis superantibus. ♃ — Forte eadem ac sequens. — Crescit in Olympo Bithyno.

4. GL. TRICHOSANTHA Fisch. et Mey. Ann. sc. natur. (2 Sér.) XI. 312. — Glaberrima glaucescens: radice multicipite; caule herbaceo folioso monocephalo; foliis radicalibus uninerviis spathulatis subtridentatis, caulinis sublinearibus mucronatis; calycis laciniis tubo quadruplo longioribus; corollae laciniis filiformibus tubo duplo longioribus. ♃ — Toto habitu similis est *Gl. vulgari*, sed foliis glaucescentibus uninerviis nec non forma calycis corollaeque ab illa diversissima, a *Gl. linifolia* characteribus datis differre videtur. Capitulum floriferum majusculum multiflorum coeruleum forma omnino aemulatur *Erigeron alpinum*. — Crescit in Natolia.

5. GL. VULGARIS Linn. Spec. plant. 139. — Cambessèd. l. c. 25. † I. 41. fig. 1. — Sweet, Brit. flow. gard. I. t. 20. — Bot. Magaz. t. 2256. — Sturm, Dtschlnds. Flora Hft. 27. (c. ic.) — Herbacea: radice multicipite; foliis spathulatis quinquenerviis subintegris; calyce aequali; corolla bilabiata, labio superiore bipartito, inferiore tripartito. ♃ — Caulis erectus herbaceus 4–15-uncialis. Folia radicalia spathulata longe petiolata palminervia, nervis 5, limbo obovato, apice obtuso seu emarginato, rarius brevissime tridentato, caulina multo breviora numerosa ovato-lanceolata elliptica, apice acuta sessilia. Involucri foliola ovato-lanceolata acuminata, dorso villosa, pilis subulatis septiferis. Calyx profunde quinquefidus aequalis, tubo piloso tetragono, segmentis lineari-lanceolatis acutis longe ciliatis, fauce pilis clausa. Corolla bilabiata, tubo calycem aequante, labio superiore minore bipartito, inferiore multo longiore tripartito. — *Aphyllanthes anguillare* Cam. Hort. 18. t. 7. — Crescit in Europa fere omni locis calcareis, a Gallia ad Caucasum et a regno Neapolitano ad Ingriam (v. s. sp.)

6. GL. INCANESCENS Viviani, Flor. Ital. fragment. I. 2. t. 3. — Cambessèd. l. c. 26. † — Herbacea multicaulis: foliis spathulatis trinerviis pulverulento-leprosis, apice emarginatis: calyce aequali; corolla bilabiata, labio superiori indiviso, inferiore profunde trifido. ♃ — Caulis herbaceus ascendens 3-6-uncialis, a basi usque ad medium foliosus, apice subnudus. Folia spathulata petiolata subcoriacea, facie impresso-punctata pulverulento-leprosa, radicalia trinervia, limbus subrotundus apice emarginatus, petiolo brevior, caulina minora brevius petiolata uninervia. Involucri foliola lineari-subulata pilis brevibus villosula. Calyx profunde quinquefidus aequalis, tubo piloso tetragono, segmentis subulatis margine ciliolatis, fauce pilis longis clausa. Corolla bilabiata minutissime glanduloso-punctata, tubo incluso, labio superiore indiviso lineari, inferiore profunde trifido. — *Globularia alpina minima Origani folio* Tournef. Instit. 467. et Hb. — *Gl. glauca* Balbis. — Crescit in Liguriae orientalis montibus Sagro, Tambura etc. (v. s. sp.)

7. GL. CORDIFOLIA Linn. l. c. — Jcq. Flor. Austriac. t. 245. — Sweet, Brit. flow. gard. I. t. 34. — Cambess. l. c. 26. † — Suffruticosa: foliis spathulatis; calyce aequali; corolla bilabiata, labio superiore bipartito, inferiore trifido vel subtripartito. ♃ vel ♄ — Caulis fruticulosus ramosus prostratus humilis. Scapi breves, foliis plurimis lineari-lanceolatis minimis instructi. Folia spathulata uninervia, limbo obovato, apice tridentato emarginato integro vel brevissime mucronulato. Involucri foliola ovato-lanceolata acuta margine ciliolata, dorso pilis brevissimis scabrella. Calyx quinquefidus aequalis, tubo tetragono villoso, ad angulos longe ciliato, segmentis subulatis glabris, margine ciliolatis, fauce pilis longiusculis clausa. Corolla bilabiata, tubo incluso, labio superiori bipartito brevi, inferiori subtripartito vel trifido, triplo longiore, segmentis saepe minutissime glanduloso-punctatis.

α. cordifolia Cambess. l. c. 27. — Foliorum limbo subrotundo, apice tridentato, labio inferiore corollae subtripartito. — *Scabiosa Bellidis folio humilis, caule nudo, radice repente, foliis cordatis* Moris. Oxon. Histor. III. 50. sect 6. t. 15. (fig. ultim.) — *Gl. minima* Vill. Dauph. II. 292.

β. nana Cambess. l. c. — Foliorum limbo sublineari oblongo, apice subintegro, labio corollae inferiore trifido. — *Scabiosa Bellidis folio minima Pyrenaica* Moris. Oxon. Histor. III. 51. — *Gl. cordifolia β.* Bertol. Amoen. Ital. 335. — *Gl. nana* Lam. Dict. II. 371. (excl. syn.) — *Gl. punctata* Lapeyr. Abr. Pyren. 57. — *Gl. bellidifolia* Tenore, Prodr. fl. Neapol. p. 11., Flor Neapol. t. 109. — Crescit in Pyrenaeis, in Cebennorum monte la Rozère, in toto alpium jugo, in Delphinatu, Helvetia, Germania, in Jurasso, in regno Neapolitano et in Tauria. (v. s. sp.)

8. GL. ORIENTALIS Linn. l. c. 140. — Cambessèd. l. c. 28. † I. 41. fig. 2. — Fruticosa: foliis spathulatis integris; capitulis florum pluribus confertis; calyce aequali: corolla bilabiata, labio superiore bipartito, inferiore profunde trifido. ♄ — Rami erecti ramosi. Folia spathulata uninervia integra, apice mucronulata, utrinque pulverulento-leprosa. Rami floriferi elongati erecti foliis 6–7 minimis linearibus acutis instructi. Florum capitula (in specimine unico suppetente) 7 terminalia subsessilia, duo inferiora remotiuscula, 5 superiora conferta. Involucri foliola obovoideo-oblonga acutiuscula, basi attenuata, dorso dense pilosa. Calyx campanulatus breviter quinquefidus, pilis densis longis vestitus, tubo latere exteriore convexo, interiore ad axim spectante complanato, segmentis acutiusculis. Corolla bilabiata, labio superiore bipartito, inferiore profunde trifido, triplo longiore. — *Globularia orientalis floribus per caulem sparsis* Tournef. Coroll. 35. — Crescit in Natolia.

9. GL. ALYPUM Linn. l. c. — Cambessèd. l. c. 28. † — Fruticosa: foliis obovato-oblongis, apice mucronatis tridentatisque; calyce aequali; corolla bilabiata, labio superiori rudimentali bifido, inferiore longissimo tridentato. ♄ — Frutex bipedalis ramosus. Folia obovato-lanceolata, rarius sublinearia, apice mucronulata seu acute tridentata, utrinque saepius viridia, sub lente utrinque minutissime glandulosa, rarius, granulis densioribus, dorso glauca, facie viridia. Involucri foliola late ovata, apice mucronulata glabra, margine ciliata (in speciminibus Aegyptiacis et Persicis) dorso pilosa. Calyx profunde quinquefidus longe pilosus aequalis, segmentis filiformibus subulatis, basi plumosis. Corolla bilabiata, tubo brevi, labio superiori brevissimo rudimentali bifido, inferiore longissimo tridentato. — *Alypum Monspeliense seu frutex terribilis* Bauh. Histor. I. 589. — Hist. Act. 1712. p. 336. I 18. — *Hippoglossum Valentinum* Barrel. Icon. p. 180. — Crescit in insula Madeira, in regionibus ad mare Mediterraneum adjacentibus et in Oriente Persiam usque.

10. GL. SALICINA Lam. Diction. II. 732. — Cambess. l. c. 29. † — Fruticosa: foliis lanceolatis integerrimis; pedunculis axillaribus; calyce aequali; corolla unilabiata, labio profunde tridentato. ♄ — Frutex erectus ramosus. Folia lanceolata integerrima, apice acutiuscula, basi in petiolum brevem attenuata. Capitula in api-

cibus ramorum axillaria, pedunculo foliis breviore villoso-tomentoso, foliis minimis squamaeformibus 3–4 instructo. Involucri foliola ovato-oblonga obtusa, dorso glabriuscula, margine longe ciliata, bracteis ovato-lanceolatis acutis ciliolatis. Calyx profunde quinquefidus villosus, pilis longis albis vestitus, tubus brevis, segmenta filiformia subulata longe ciliata. Corolla labio superiori deficiente unilabiata, tubo incluso, labio inferiore profunde tridentato. — *Gl. longifolia* Ait. Hort. Kewens. (edit. 1.) I. 130. — Bot. Regist. t. 685. — *Alypum Solandri* Auctor. nonnull. — *Alypum salicifolium* Fisch. Cat. hort. Gorenk. 19. — Crescit in insulis Teneriffa et Madeira.

† Species valde dubia, verosimiliter excludenda.

11. GL. BISNAGARICA Linn. Spec. plant. 139. — Caule fruticoso; foliis radicalibus cuneiformibus retusis, caulinis lanceolatis. ♃ — *Scabiosa Bisnagarica seu Globularia frutescens, rigidis foliis ad radicem rotundioribus cordatis* Pluken. Almagest. 336. t. 58. fig. 5. — Crescit in sylvis Bisnagariae.

†† Species indescripta.

12. *GL. TRICHOCALYX Steudel in Hb. Arab. petr. no. 406. — In Arabia petraea.

Ordo CLXI. PLANTAGINEAE *Venten.*

(Vent. Tabl. II. 269. — Endl. Gener. plant. p. 346. — Meisn. Gener. plantar. vascul. I. 315. II. 226. — F. Marius Barnéoud, Monographie générale de la famille des Plantaginées. Paris. 1845. 4to.) *)

Tribus I. *PLANTAGINEAE ANOMALAE* Barnéoud l. c. 5.

Flores monoici vel polygami. Ovarium uniloculare 1-2-ovulatum. Capsula ossea indehiscens monosperma. Stylus humilis. — Plantae linearifoliae humiles. — (*Littorelleae* Nees ab Esenb. Gener. fl. Germanic. fasc. XVI.)

I. (2168.) LITTORELLA *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 1328. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 315. II. 226. — Barnéoud, Monogr. génér. des Plantagin. 5.)

1. L. LACUSTRIS Linn. Mantiss. 160. — [Hook. Flor. Londin. t. 168. — Schknhr, Hndbch. der Bot. t. 287. — Nees ab Esenb. jun. Gener. fl. Germ. fasc. XVI.] —

---

*) *Monographiae alteri hujus ordinis (Die Plantagineen in Bezug auf die naturhistorische Species, von Franz Leydolt. Mit einer lithographirten Tafel. Wien.* 1836. 8*vo. pag.* 54.) *nihil novi inest.*

Barnéoud l. c. — Glaberrima: foliis gramineis semiteretibus. Flos masculus solitarius longe et gracillime pedicellatus. Flores foeminei ad basin foliorum occulti. ♃

β. pubescens Zuccar. in Flora (B. Z.) 1821. pag. 613. — *Plantago uniflora* Linn. Spec. plant. 167. — Crescit locis inundatis et ad ripas lacunm in Europa boreali et centrali, ad littora marina rarius observatur.

II. (2169.) BOUGUERIA *Dcne.*

(Dcne. Ann. scienc. natur. [2. Sér.] V. 132. — Meisn. Gener. plant. vascular. I. 315. II. 226. — Barnéoud, Monogr. génér. des Plantag. 6.)

1. B. NUBICOLA Dcne. l. c. — Barnéoud l. c. — Caespitosa conferta: foliis linearibus glabratis scapo longioribus; spica globosa densa; bracteis magnis florem obtegentibus. ♃ — Exsiccatione nigrescit. — Crescit in montibus nivosis Americae circa Potosi.

Tribus II. *PLANTAGINEAE VERAE* Barnéoud l. c. 6.

Flores hermaphroditi, ovarium biloculare pluri-ovulatum. Capsula cartilaginea circumscisse dehiscens polysperma. Stylus exsertus.

III. (2170.) PLANTAGO *Linn.*

(Linn. Gener. plant. no. 142. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 315. II. 226. — Barnéoud, Monogr. générale des Plantag. 6.)

Divisio I. POLYSPERMAE Barnéoud l. c. 7.

Capsulae loculi 2-pluriovulati, 2-10-spermi. Semina parva, facie umbilicali non excavata. — Tubus corollae glaber.

Sectio I. VIRGINICA Steinheil mss. ex Barnéoud l. c.

Corollae laciniae rectae vel rostratim conniventes acutae. Stamina occulta.

1. PL. BUNGEI Steud. Nomencl. bot. (2. edit.) II. 348. — Barnéoud l. c. — Pusilla: foliis linearibus; spica ovata pauciflora glabra; calyce obtuso; corollae minimae laciniis obtusis. ☉ — *Pl. pusilla* Bnge. Mém. de sav. étrang. de St. Petersbrg. II. 530. — Crescit locis salsis in Sibiria.
2. PL. POLYSPERMA Karel et Kirilow, Bullet. de Moscou 1842. no. 2. — Barnéoud l. c. — Pusilla: foliis linearibus; spica ovata; bracteis truncatis; capsula conica calycem obtusum plus duplo excedente. ☉ — Crescit in salsis Soongariae.
3. PL. TENUIFLORA Waldst. et Kit. Plant. rar. Hungar. I. 37. — Barnéoud l. c. — Erecta: foliis linearibus; spica cylindracea gracili laxiflora; floribus oblongis; capsula conoidea calycem duplo superante; bracteis acutis. ☉ — *Pl. Loefflingii* M. Bieberst. Flor. Casp. Cauc. appdx 208. — Schult. Mantiss. III. 82. — Crescit in arenosis Hungariae et Asiae centralis.
4. PL. PUSILLA Nutt. Gen. pl. Americ. 100. — Barnéoud l. c. 8. — Gracillima: scapis multis filiformibus; foliis linearibus subcarnosis; spicis cylindraceis laxis; floribus globosis; capsula subrotunda calycem parum excedente. ☉ — *Pl. hybrida* Bart. Comp. fl. Philad. II. 214. in Add. fl. Bor. Am. ill. III. 77. t. 98. fig. 1. — *Pl. maritima* Barton, Prodr. flor. Philad. (non Linn.) — *Pl. linearifolia* Mühlenbrg. Catal. pl. Am. sept. 1. — *Pl. elongata* Prsh. Fl. Amer. sept. II. 729. — *Pl. pauciflora* Prsh. l. c. I. 99. (non Lam.) — *Pl. oliganthos* Roem. et Schult. Syst. veget. III. 722. — Crescit in arenosis Americae borealis.
5. PL. VIRGINICA Linn. Spec. plantar. II. 164. (non Gisecke). — Barnéoud l. c. — Hirsuta: foliis lanceolato-ovatis pubescentibus; spica cylindrica pilosa; floribus laxis; corollis rostratis; stigmate incluso. ☉ — *Pl. connivens* Mnch. Method. pl. ex Steud. Nomencl. bot.

α. Spica glabra. — Lam. in Poir. Encycl. méthod. V. 375.

β. Tota canescens pilis sericeo-argenteis. — Crescit per totam Americam.

6. PL. MYOSUROS Lam. Illustr. gener. 342. et Encycl. méth. V. 384. — Barnéoud l. c. 9. — Glabra: foliis anguste lanceolatis; spica cylindrica conferta; floribus glabris; corollis conniventibus non rostratis; stigmate incluso. ⊙ — Crescit in maritimis circa Montevideo.

7. PL. CANDOLLEI Rapin. Mém. soc. Linn. de Paris VI. 453. — Barnéoud l. c. — Robusta, fere bi-tripedalis: foliis oblongis obtusis; spica longa crassa, basi laxa; floribus glabris; corollis subrostratis; stigmate exserto. ♃ — *Pl. Chilensis* Dsf. Catal. hort. Paris. (non Rapin.) — *Pl. d'Urvillei* Delile, Cat. hort. Monspel. — *Pl. media* Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. (non alior.) — Crescit locis humidis in regno Chilensi.

8. PL. HIRTELLA H. B. Kth. Nov. gen. et sp. pl. II. 187. t. 127. fig. 1. — Barnéoud l. c. — Basi patula: foliis ovatis dentatis; spica cylindrica inferne laxa; bracteis minutis; corolla subconnivente; stigmate exserto. ♃ — *Pl. major* Bertero mss. — Crescit in America meridionali.

Sectio II. MAJOR Barnéoud l. c. 10.

Corollae laciniae patulae acutae fuscae. Calyces et bracteae obtusi. Genitalia exserta. Spicae longae laxiflorae, saepius macilentae, rarissime parvae ovatae.

§. 1. *Foliis ovatis latis; spicis cylindricis.*

9. PL. MAJOR Linn. Spec. plantar. 163. (non Loureiro). — Flor. Danic. t. 461. — Barnéoud l. c. 10. — Foliis rotundatis integris; spica cylindrica gracili; bracteis et corollis minutis; capsula violacea. ♃ — Crescit in toto orbi terrarum sub qualibuscunque climatibus.

Variat: 1. *Pl. bracteata* Mnch. Methód. pl. 439. — Moris. Oxon. Histor. III. t. 15. — *Pl. major β.* Lam. Illustr. 1630. — *Pl. major ε.* et *ζ. phyllostachya* et *rhodostachya* Mert. et Koch, Flor. Deutschl. I. 801.

2. *Pl. major γ. polystachya* Mert. et Koch l. c. 802. — Moris. l. c. t. 15. — Linn. Spec. plant. 163.

α. Pl. exaltata Hornem. Hort. Hafn. I. 140.

β. Pl. limosa Kitaib. in Roem. et Schult. Syst. III. 111.

γ. Pl. intermedia Gilib. Elem. 601.

δ. Pl. minima DC. Flor. Franc. no. 2297. — *Pl. nana* Trattin. Archiv I. 42. — *Pl. major β.* Poir. Encycl. méth. V. 368. — *Pl. major β. leptostachya* Wallrth. Schedul. critic. — *Pl. major γ. brachystachya* Wallrth. l. c. ex Mert. et Koch l. c. 801.

ε. Pl. subsinuata Hornem. Hort. Hafn. I. 139.

ζ. Pl. uliginosa Schmidt, Flor. Bohem.

η. Pl. sinuata Lam. Illustr. no. 1651.

10. PL. CRISPA Jacq. Collect. Supplem. 34. t. 16. — Barnéoud l. c. 11. — Conferta: foliis crassis undulatis; spica compacta cylindrica; corollis minutis. ♃ — *Pl. bullata* Donn, Catal. hort. Cantabrig. 15. — *Pl. crassifolia* Rth. Catal. I. 29. — *Pl. crassa* Willd. Phytogr. I. 3. — Crescit in herbosis Europae et Americae borealis.

11. PL. MAXIMA Ait. Hort. Kewens. I. 151. — Jacq. Icon. rarior. plant. I. t. 26. — Gmel. Flor. Sibiric. IV. 71. t. 35? — Barnéoud l. c. — Robusta: foliis amplissimis cucullatis; spica longa densa; corollis albis; filamentis antherarum longissimis. ♃ — *Pl. cucullata* Lam. Illustr. I. 339. — Crescit in pascuis Sibiriae, alpium Altaicarum et Americae borealis.

12. PL. CORDATA Lam. Illustr. I. 338. — Barnéoud l. c. 12. — Glabra: foliis magnis cordatis; spica longa laxiflora; bracteis obtusissimis; corollis fuscis. ♃ — *Pl. Ca-*

nadensis Hort. Paris. — *Pl. Kentuckensis* Michx. Fl. Amer. bor. I. 94. — Crescit in herbosis Americae borealis.

13. PL. MEDIA Linn. Spec. plant. 163. — Barnéoud l. c. — Elongata: foliis ovatis rosulatis; spica cylindrica densa; corollis albis; staminum filamentis violaceis. ♃ — Moris. Oxon. Histor. III. 8. fig. 7.

β. rosea: bracteis roseis. — *Pl. Strutia* Tenore, Fl. Neapol. Prodr. suppl. I. 59. — *Pl. Calabrica* Gaudin mss. ex Rapin. Mém. soc. Linn. Paris. VI. 452.

γ. Pl. Urvilliana Rapin. l. c. 453. — *Pl. media* d'Urville, Mém. I. 273. — Crescit locis herbosis in tota fere Europa et in Oriente.

14. PL. ASIATICA Linn. Spec. plant. 163. — Gmelin, Flor. Sibiric. IV. 71. t. 36. (fig. pessima.) — Barnéoud l. c. — Pubescens: foliis dentatis; spica tenui laxiflora cylindracea; corollae laciniis obtusiusculis. ♃ — Scapus profunde striatus. — *Pl. erosa* Wall. Catal. — *Pl. depressa* Willd. Enumer. pl. hort. Berol. Suppl. 8.

α. Foliis glaucis subrotundis; spica tenuissima. — *Pl. paludosa* Turcz. mss.

β. Foliis oblongis; spica longissima. — *Pl. Sibirica* Fisch. mss. — Crescit in tota Asia et in insulis „*de la Sonde.*"

15. PL. KAMTSCHATIKA Lnk. Enumer. pl. hort. Berol. I. 120. — Barnéoud l. c. — Foliis oblongis denticulatis; scapo angulato; spica cylindrica densa. ♃ — Crescit in Kamtschatka.

16. PL. GENTIANOIDES Sibthrp. et Sm. Prodr. fl. Graec. I. 101. — Barnéoud l. c. — Parva: foliis glabris obtusis; spica tenui; floribus minutis; corollis acutis. ♃ — Habitus omnino *Gentianae acaulis.* — Crescit in Olympo Bithyno.

17. PL. LOUREIRII Roem. et Schult. Syst. veget. III. 112. — Barnéoud l. c. — Foliis glabris; scapis teretibus; spica longissima; floribus densis albis. ☉ — *Pl. major* Loureiro, Flor. Cochinch. I. 91. (non Linn.) — *Pl. crenata* Man. Blanco, Flora de Filipinas 56. — Crescit in China.

18. PL. CORNUTI Gouan, Illustr. 6. (non Jcq.) — Zannichelli, Ist. delle piante 212. t. 75. — Magn. Bot. 205. — Barnéoud l. c. — Foliis carnosis integerrimis; spica longissima laxiflora; capsulis spurie subquadrilocularibus. ♃ — *Pl. Gouani* Gmel. Syst. I. 251. — *Pl. Coronopus* var. *γ.* Lam. Illustr. no. 1678. — *Pl. Adriatica* Camp. Herb. Ferr. cat. 22. — *Pl. maxima* Buch. Flor. Venet. (nec All.) — *Pl. gracilis* Hort. (ex Steud. Nomencl. bot.) — *Pl. major* Scopol. Fl. Carniol. I. 167. — *Pl. altissima* Loisel. Fl. Gallic. 88. — *Pl. Asiatica* Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 269. (nec Linn.) — Crescit locis salsis regionum Mediterranearum et in Asia centrali.

19. PL. TOMENTOSA Lam. Illustr. 340. — Barnéoud l. c. 14. — Fulva: foliis oblongis vel ovatis integris vel dentatis villosis; spica laxiuscula; corollis ferrugineis; bracteis carinatis. ♃ — *Pl. Cumingiana* Fisch. et Mey. Animadv. bot. no. 1526. — *Pl. Eschscholtziana* Fisch. et Mey. l. c. no. 1530.

α. Spica longa gracilior pubescens, folia glabriuscula longe petiolata. — Crescit in tota America meridionali.

20. PL. TRUNCATA Cham. et Schlchtd. Linnaea I. 170. — Barnéoud l. c. — Minuta: radice truncata; foliis ovato-lanceolatis integris; spica brevi villosa; corollis ferrugineis. ☉ — Crescit in arenosis Chilensibus.

21. PL. PURPURASCENS Nutt. mss. ex Rapin. in Mém. soc. Linn. Paris. VI. 454. — Barnéoud l. c. 15. — Pubescens: radice tenui; foliis ovato-lanceolatis denticulatis; spica oblonga; corolla ferruginea. ☉ — Crescit in America boreali.

§. 2. *Foliis angustis linearibus; spicis cylindricis, rarissime ovatis.*

22. PL. HISPIDA R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. 425. — Barnéoud l. c. — Hirsuta: foliis anguste lanceolatis remote dentatis; spica hispida, basi laxa; bracteis ciliatis. ♃ — Crescit in arenosis Novae Hollandiae et in Chili.

23. PL. VARIA R. Br. l. c. 426. — Barnéoud l. c. — Pilosa: foliis dentatis integrisve angustis, basi glabris vel villosis; spica tenui laxiflora; corollis fuscis. ♃ — *Pl. debilis* R. Br. l. c. — Crescit in Nova Hollandia.

24. PL. GAUDICHAUDII Barnéoud l. c. — Longa stricta: foliis linearibus; scapo striato; spica basi laxa; bracteis acutis; corollis mucronulatis. ♃ — Planta 1–1½–pedalis. Folia glabra longissima acuta trinervia, basi villosa, scapum aequantia. Scapus leviter pubescens teres. Spica 2–3–pollicaris. Flores laxi, basi pilosuli. Bracteae acutae calyce longiores. Calycis sepala obtusa, margine membranacea, dorso linearia. Corollae tubus elongatus, laciniae ovatae concavae mucronulatae. Genitalia exserta. Capsula laevis bilocularis tetrasperma. Semina glabra ovata. — Crescit in littoribus Novae Hollandiae.

25. PL. DECIPIENS Barnéoud l. c. 16. — Pubescens: foliis linearibus acutis; spica brevi; bracteis ciliolatis; corollis minutis acutis; staminibus vix exsertis. ⊙ — Planta 5–6–pollicaris. Radicis collum crassiusculum. Folia puberula trinervia integerrima plana, basi lanata, scapo breviora. Scapus pubescens teres. Spica pollicaris. Bracteae acutae latae calycem aequantes. Calycis segmenta obtusa ciliolata. Corollae tubus brevis, laciniae parvae. Stamina stigmate breviora. Capsula depressa bilocularis tetrasperma. — Crescit in Labrador.

26. PL. LIMENSIS Pers. Enchirid. I. 139. — Barnéoud l. c. — Incana: foliis lineari-lanceolatis; spica oblonga; bracteis linearibus; corollae laciniis angustissimis. ⊙ — *Pl. hirsuta* Rz. et Pav. Fl. Peruv. et Chil. I. 51. t. 78. fig. a. — Crescit in collibus Peruviae.

27. PL. HISPIDULA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 51. t. 78. fig b. — Barnéoud l. c. — Foliis linearibus integerrimis; scapis scabris; spica oblonga; staminibus corollam aequantibus. ⊙ — Crescit in arenosis regni Chilensis.

28. PL. NUTANS Lam. Encycl. méth. V. 381. — Barnéoud l. c. 17. — Subcaulescens: foliis lanceolato-acutis; pedunculis filiformibus; spica capitata nutante. ♃? — Crescit in Hispania.

29. PL. NITIDA Roem. et Schult. Syst. veget. III. 149. — Barnéoud l. c. — Pilosa: foliis linearibus carnosulis ciliatis; spica ovata; corollae laciniis linearibus mucronatis; capsula biloculari monosperma? — Crescit......? (in horto Heidelbergensi colitur).

Sectio III. OLIGANTHOS Barnéoud l. c. 17.

Spicula 1–6–flora glabra. Corollae laciniae lineares acutae patulae. Calyx obtusus. Stamina longe exserta. Stigma elongatum. — Herbae humiles caespitosae Americanae foliis linearibus.

30. PL. PAUCIFLORA Lam. Illustr. no. 1684. (non Prsh.) — Barnéoud l. c. — Pusilla: foliis lineari-oblongis glaberrimis; scapo tereti; spica globulosa 3–6–flora; bracteis latis obtusis. ♃

α. major: Spica multiflora; foliis brevibus. — *Pl. Andicola* Dcne. mss.

β. parva: Foliis dense caespitosis scapos obtegentibus. — *Pl. barbata* Forster, Comm. Goetting. IX. t. 4. — Crescit in rupestribus maritimis terrarum Magellanicarum et Oceaniae.

31. PL. MONANTHOS d'Urville, Flor. des Malouines 37. — Barnéoud l. c. 18. — Densissime caespitosa: foliis linearibus obtusis subcarnosis; scapis brevissimis 1–3–floris. ♃ — *Pl. carnosa* R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 425. (non Lam.) — *Pl. Brownii* Rapin, Mém. de la soc. Linn. de Paris VI. 484. — *Pl. Browniana* Schult. Mantiss. III. 86. — *Pl. triantha* Spr. Syst. veget. I. 439. — Crescit in freto Magellanico et in insulis Maluinis.

32. PL. RIGIDA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. plant. II. 185. t. 126. fig. 2. — Barnéoud l. c. — Uncialis: foliis linearibus caespitosis laete viridibus; flore unico gracillime pedunculato; corollae tubo longissimo. ♃ — Caespites globosi. — In summis Andibus Peruviae crescit.

Sectio IV. **ERIANTHA** Barnéoud l. c. 18.

Corollae parvae tubus pilosus. Calycis segmenta obtusa; spicae cylindricae strictae densae. Capsula bilocularis vel spurie 3–4-locularis. — Sectio valde polymorpha, sed valde naturalis.

§. 1. *Foliis pinnatifidis; capsulis 3-4-spermis.*

33. **PL. CORONOPUS** Linn. Spec. plantar. 166. — Barnéoud l. c. 19. — Foliis basi lanatis pinnatifidis patulis; scapo tereti pilosulo; calyce ciliato; capsula tetrasperma. ♂ — Spica gracilis densa. Bracteae calycem aequantes vel superantes acutae. Corollae laciniae acutissimae. — Crescit in tota Europa, in Oriente, in Africa boreali et in insulis vicinis.

α. Glabra: foliis carnosis. — Desvx. Journ. bot. II. 47.
β. Hirsuta: spica subrotunda brevi. — Dill. in Ray Synops. 206.
γ. Brevifolia: Gouan. Ill. 6. — DC. Flor. Franc. 2316. B.
δ. Latifolia: bracteis longioribus. — *Pl. Columnae* Gouan. l. c. — *Pl. Cornuti* Jcq. Miscell. II. 351. et Ic. pl. rar. I. t. 27. — *Pl. Jacquini* Roem. et Schult. Syst. veget. III. 140.
ε. Foliis lanatis; bracteis calyce duplo brevioribus. — *Pl. Cupani* Guss. Flor. Sicul. I. 190.
ζ. Serrariaefolia: foliis latis.
η. Filiformis: foliis tenuissime pinnatifidis.
ϑ. Tlemceniana: foliis rosulatis coriaceis regulariter pinnatifidis ciliatis; pinnulis superioribus basi 1–2-dentatis, inferioribus integris subpungentibus; radice crassa. — Crescit ad Tlemcen et Masourah.

34. **PL. MACRORHIZA** Poir. Voy. Barb. XI. 154. — Histor. philos. IV. 194. t. 50. — Barnéoud l. c. 20. — Boccon. Sicul. 30. t. 15. — Foliis spathulatis carnosis subpinnatifidis; radice tortuosa; spica crassa tereti; corollae laciniis obtusiusculis. ♃ — Capsula trilocularis, 2–3-sperma. — *Pl. crithmoides* Dsf. Flor. Atlant. I. 140. — *Pl. Coronopus* Bertol. Amoenit. Ital. XI. 175. — In regionibus Mediterraneis.

§. 2. *Foliis linearibus integris dentatisve; capsulis dispermis, seminibus reliquis semper abortivis.*

35. **PL. SERRARIA** Linn. Spec. plant. I. 166. — Barrel. Icon. I. 749. — Barnéoud l. c. 20. — Hispidula: foliis lanceolatis dentato-serratis; spica gracili; corollae laciniis acutis. ♃ — Crescit locis humidis in regionibus Mediterraneis.

α. Foliis crassis, pilis rigidis canescentibus.
β. Foliis linearibus raro dentatis. — *Pl. alopecuroides* Lam. Illustr. no. 1679.
γ. Africana: Planta 1–1½-pedalis, foliis oblongo-lanceolatis integerrimis vel parce et brevissime denticulatis hispidissimis, basi lanatis; radice crassa. — Circa Bonam crescit.

36. **PL. HIRSUTA** Thnbrg. Prodr. fl. Capens. 29. — Jcq. Hort. Schoenbrunn. III. 4. t. 258. — Barnéoud l. c. 21. — Hispida: foliis linearibus integris; scapo hirsuto; spica longa; corollae laciniis obtusis. ♃ — *Pl. Thunbergii* Poir. Encycl. méthod. IV. Suppl. 431.

α. Caule lignoso multicipite; foliis remotis dentatis.
β. Hirsutissima bipedalis: foliis basi lanatis integris. — Crescit in Promontorio bonae spei.

37. **PL. SCORZONERAEFOLIA** Lam. Illustr. p. 342. — Barnéoud l. c. — Glabra: foliis longissimis linearibus falcatis; spica longa; corollae laciniis obtusiusculis. ♃ — Bracteae carinatae, dorso virides. — Crescit in Armenia locis herbidis.

38. **PL. CARNOSA** Lam. Illustr. no. 1672. — Barnéoud l. c. 22. — Pubescens: foliis lanceolato-linearibus carnosis; scapo apice incrassato; corollae laciniis obtusiusculis; bracteis latis. ♃ — Crescit in Promontorio bonae spei.

39. PL. GRACILIS Poir. It. in Barb. II. 115. — Barnéoud l. c. — Elongata: foliis quinquenerviis glabris denticulatis; spica gracili; bracteis et corollae laciniis acutis. ♃ — Crescit in arenosis Barbariae.

40. PL. MARITIMA Linn. Flor. Suecic. 233. — Barnéoud l. c. — Glabra: foliis carnosis semicylindricis integris; spica tenui; corollae laciniis acutis; staminibus parum exsertis. ♃ — *Pl. teretifolia* Sieb. mss. — *Pl. Wulfenii* Spr. Flor. Halens. 54. — *Pl. squamata* Flor. Danic. IV. t. 691. — Crescit in maritimis locisque salsis totius orbis.

α. Pubescens: — *β.* Foliis ciliatis basi glabris. — *Pl. crassifolia* Forsc. Fl. Aeg. Arab. 31.

γ. Foliis crassis carnosis.

δ. Foliis planis dentatis glabris. — *Pl. graminea* Lam. Illustr. no. 1685. — Var. *Pl. graminea* Rapin, Mém. de la soc. Linn. de Paris VI. 478.

ε. Foliis linearibus crassis integris. — *Pl. integralis* Gaud. Fl. Helvet. I. 404. — *Pl. Coronopus* Sauss. Voy. Alp. 66? — *Pl. Coronopus* var. *integralis* DC. Flor. Franc. Suppl. 2316.

ζ. Foliis integris dentatisve planis; bracteis angustis longis. — *Pl. maritima* Pall. inedit. — *Pl. salsa* Pall. Itin. I. 480. no. 100. — *Pl. remota* M. Bieb. mss.

η. Minor: spica brevi. — *Pl. juncoides* Lam. Illustr. no. 1683.

ϑ. Foliis semiteretibus hinc inde dentatis; bracteis obtusissimis. — *Pl. dentata* Rth. Flor. Germanic. II. 173. — *Pl. marina* Lobel. Icon. 306. — *Pl. Loefflingii* Huds. Angl. 64.

41. PL. SUBULATA Linn. Spec. plant. I. 166. — Lobel. Icon. 429. — Barnéoud l. c. 23. — Caespitosa multiceps: foliis subulatis duris fasciculatis; spica gracillima glabriuscula; corollae laciniis acutiusculis; staminibus parum exsertis. ♃ — *Pl. Wulfeni* Sturm, Dtschlnds. Flor. Hft. 21. — *Pl. Gerardi* Schult. Oestr. Flor. II. 298. — *Pl. carinata* Schrad. Catal. — *Pl. triquetra* Pers. l. c. — *Pl. radicata* Hffmnsgg. et Lnk. Flor. Portug. I. 428. (c. ic.)

α. Pungens: foliis brevissimis spinulosis, basi tomentosis. — *Pl. pungens* Lapeyr. Abr. Pyren. 71. — *Pl. brachyphylla* Roem. et Schult. Syst. III. 136.

β. Sessiliflora Lapeyr. Abr. Pyren. 72.

γ. Serpentina: Foliis longioribus convexiusculis; spicis saepe incurvatis. — *Pl. serpentina* Lam. Illustr. gener. no. 1686. — *Pl. recurvata* Linn. Mantiss. II. 198. — *Pl. incurvata* Murr. Comm. Goetting.......? p. 19. t. 6. — *Pl. hirsuta* Pourr. Chlor. Narbon. — *Pl. Lagascae* Duf. mss.

δ. Foliis planis late linearibus. — *Pl. Wulfeni* Willd. Enumer. I. 161.

ε. Caudice elongato lignoso; foliis rigidis; bracteis longis. — Crescit in rupibus maritimis et in montibus calcareis regionum Mediterranearum.

42. PL. ALPINA Linn. Spec. plant. I. 165. — Barnéoud l. c. 24. — Foliis mollibus lineari-lanceolatis; scapo piloso; spica tenui; corollae laciniis acutis; bracteis violaceo-coloratis. ♃ — Crescit in excelsis jugis alpium Europae australis.

α. Minima: spicis paucifloris. — *Pl. capitellata* Ramond in DC. Fl. Fr. no. 2310.

β. Erecta: foliis tomentosis. — *Pl. incana* Ramond l. c. no. 2309.

γ. Cinerea: foliis cinereis; bracteis pilosis. — *Pl. cinerascens* Seringe mss.

δ. Scabra: foliis bidentatis saepe glabris. — *Pl. bidentata* Murith, Bot. Val. 85. — *Pl. graminea* Schleich. Cat. 35. — *Pl. serrata* Haller fil. mss.

43. PL. WELDENII Rchb. Flor. excurs. 396. et Plant. critic. IX. t......? — Barnéoud l. c. 25. — Foliis linearibus teretiusculis; scapo gracili; spica pauciflora; bracteis brevibus. ♃ — *Pl. parvula* Welden mss. — *Pl. pumila* Welden mss. — Crescit in Dalmatia.

Divisio II. DISPERMAE Barnéoud l. c. 25.

Capsulae loculi bi- vel uniovulati, monospermi. Semina ovata lucida, facie umbilicali excavata, tubus corollae glaber. — Plantae herbaceae vel rarius frutescentes, foliis alternis radicalibus vel caulinis.

Sectio V. MONTANA Barnéoud l. c. 25.

Corollae laciniae acutae fuscae; calyx obtusus; bracteae obtusae latissimae, apice barbato-ciliatae. Stamina longa. Antherae magnae. — Folia lineari-lanceolata pilosa; spicae breves.

44. PL. ARGENTEA Lam. Illustr. no. 1660. (nec Vill.) — Barnéoud l. c. 25. — Sericeo-argentea: foliis integris albis; spica ovato-capitata; bracteis barbatis; corollae tubo brevi. ♃ — *Pl. monosperma* Pourr. Chlor. Narbon. 29 no. 884. — *Pl. nivalis* Boiss. Voyage bot. dans le midi de l'Espagne 1412. † t. 156. — *Pl. Azorica* Hochstett.? *) — Crescit in summis alpibus calcareis Galliae et Hispaniae, in Arabia, Aegypto et in insulis Azoris.

β. Foliis mucronatis niveis. — *Pl. lanata* Lagasca ex Rapin, Mémoir. de la soc. Linn. de Paris VI. 462.

45. PL. MONTANA Lam. Illustr. no. 1670. — Barnéoud l. c. 26. — Foliis integris glabris; scapo hirsuto, spica rotunda nigricante; calyce ciliolato; seminibus nigris. ♃ — Collum radicis crassum. — *Pl. Monspeliensis* Bern. Juss. in Poir. Encycl. méth. (nec alior.) — *Pl. atrata* Hppe. Centur. et Hffm. Flor. Germ. III. 76. — *Pl. quinquenervia* Schleich. Catal. 38. — *Pl. alpina* Vill. Delphin. II. 302. (non Linn.) — Jcq. Hort. Vindob. II. 58. t. 125. — *Pl. sphaerocephala* Poir. Encycl. méthod. V. 381. — *Pl. lanceolata β. atrata* Pers. Enchirid. I. 138. — *Pl. lanceolata β. alpestris* Whlnbrg. Fl. Carpath. 44 — *Pl. nigricans* Auctor. — Crescit in summis alpium jugis Jurassi, Cebennarum, Hungariae et Pyrenaearum.

β. minor: foliis trinerviis.

γ. major: foliis aurantiaco-pilosis. — *Pl. holosericea* Gaud. Fl. Helvet.

46. PL. ARACHNOIDEA Schrenk, Enumer. plant. Soong. 16. — Barnéoud l. c. 27. — Arachnoideo-incana: foliis integris; scapo angulato; spica cylindracea; calyce barbato. ♃ — Crescit in montibus Soongariae.

47. PL. SAXATILIS M. Bieb. Flor. Taur. Caucas. 109. — Barnéoud l. c. — Virens: foliis longis integris; scapo tereti; spica ovata vel cylindracea glabriuscula; stylo longissimo. ♃ — Collum radicis crassum. — Crescit in montibus Caucasicis.

48. PL. SCIRPOIDES Lam. Illustr. p. 342. — Barnéoud l. c. — Foliis linearibus longis; scapo pubescente; spica ovata; stylo longissimo. ♃ — Crescit in Hispania.

49. PL. AMPLEXICAULIS Cavan. Icon. plant. II. 22. t. 125. — Basi fruticulosa: foliis integris vel denticulatis amplexicaulibus; scapis axillaribus; spicis ovatis; seminibus translucidis. ♃ — *Pl. lagopoides* Dsf. Fl. Atlant. I. 133. t. 39. fig. 2.

β. Indica: minor 1–2-pollicaris: floribus glaberrimis; foliis scapo multo longioribus. — In Hispania, in insulis Canariensibus et in India boreali-orientali.

50. PL. BRASILIENSIS Sims, Bot. Magaz. t. 2616. — Barnéoud l. c. 28. — Subcaulescens: foliis integris trinerviis, basi amplexicaulibus; spica elongata cylindrica. ♃ — Crescit in Brasilia.

---

*) *PL. AZORICA Hochstett. in Seubert. Flor. Azoric. 50. t. 7. fig. 2. — Acaulis: foliis rosulatis terrae appressis lanceolatis, basi attenuata sessilibus parce denticulatis quinquenerviis, utrinque praesertim in nervis sericeo-hirsutissimis; scapis ascendentibus sulcatis; spicis subrotundo-ovatis obtusis; bracteis longe acuminatis calyceque glabris.* ♃ — *A* Pl. argentea, sericea *et affinibus distinguitur scapo profunde sulcato nec tereti et bracteis calyce corollaque glabris.* — Pl. lanceolata *var.* eriophylla *B. Webb et Berthelot, Phytograph. Canar. inedit. — Crescit in pascuis pratisque siccis insulae Terceirae.*

Sectio VI. LANCIFOLIA Barnéoud l. c. 28.

Corollae laciniae acutissimae; calyx obtusus; bracteae angustae saepissime acuminatae glabriusculae, stigmata parum papillosa; semina parva oblonga. — Folia lanceolata 3–5-nervia; spicae cylindricae densae, rarissime laxiflorae.

51. PL. LANCEOLATA Linn. Spec. plant. 164. — Barnéoud l. c. — Glabra: foliis lanceolatis integris vel denticulatis; scapo angulato saepe contorto; spica ovata vel cylindrica; floribus glabris; staminibus albis. ♃ — *Pl. attenuata* Wall. Catal. — *Pl. longistipes* Royle mss. — Crescit locis herbidis per Europam totamque fere Asiam, in Africa boreali et in Pennsylvania.

α. Spica apice foliosa. — Pall. Flor. Palatin. 189.

β. Calycis segmentis et bracteis foliaceis. — Moris. Oxon. Histor. III. sect. 8. t. 15. fig. 10.

γ. Prolifera. — C. Bauh. Pinx.

δ. Polycephala: spicis digitatis 3–5-nis.

ε. *Decumbens:* calyx in carina sepalorum barbatus. — *Pl. decumbens* Bernh. in Rchb. Flor. Germanic. excurs. p. 396. — *Pl. humifusa* Brnhrdi. in Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) II. 349.

ζ. Foliis hirsutis sublanuginosis, aliquando denticulatis. — *Pl. lanuginosa* Bossard, Essai 160. — *Pl. lanata* Host, Flor. Austriac. I. 210. — *Pl. Hungarica* Waldst. et Kit. Plant. rar. Hungar. III. t. 203. — *Pl. lanceolata* var. *montana* Tenore, Viaggio in Abruz. 47. — *Pl. ambigua β.* Guss. Prodr. fl. Sicul. I. 185.

η. Foliis integerrimis villosis, exsiccatione rubescentibus. — *Pl. rubens* Host l. c. 211.

ϑ. Radice crassa; bracteis longis acutatis. — *Pl. eriophora* Lnk. et Hffmnsegg. Flor. Portug. I. 423. — *Pl. lanceolata, altissima, argentea* Brotero, Flor. Lusitan. I. 156. — *Pl. variabilis* Lnk. — *Pl. Linkii* Schrad. Journ. für Bot. I. 57.

ι. Canescens: spica hirta oblonga. — *Pl. canescens* Adans, Iter in Sibir. t. 13. ic. 1. p. 223.

κ. Microcephala pusilla: spicis globulosis. — *Pl. microcephala* Royle mss.

λ. Altissima: foliis dentatis; spicis 2–2½-pollicaribus; calyce piloso. — *Pl. altissima* Linn. Spec. plant. 164. — Jcq. Observ. bot. IV. 5. (c. ic.) — *Pl. sylvatica* Mart. in Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) — *Pl. Dalmatica* Schott. — *Pl. Schottii* Roem. et Schult. Syst. veget. III. 118. — *Pl. irrigua* Fisch. mss.

μ. Parva coriacea: spica glabra cylindrica. — *Pl. Abysssinica* Hochstett. mss.

52. PL. VICTORIALIS Poir. Encycl. méthod. V. 377. — Barnéoud l. c. 30. — Villosa: radice praemorsa; foliis lineari-lanceolatis pilosis; scapo vix angulato; spica densissima subrotunda; bracteis acutissimis. ♃ — *Pl. argentea* Choix. in Vill. Delphin. II. 302. (nec alior.) — *Pl. pilosa* Waldst. et Kit. — Spr. Syst. veget. I. 435. — *Pl. sericea* Waldst. et Kitaib. Plant. rarior. Hungar. II. 163. t. 151. — *Pl sericea* Tenore, Viaggio in Abruz. 48. — *Pl. capitata* Hppe. mss. ex Rchb Flor. excursor. 395. — Ten. Flor. Neapolit. II. t. 112. fig. 1. — *Pl. Preslii* Tenore, Flor. Neapol. Appndx. VII. — *Pl. ambigua* var. *sericea* Guss. Prodr. fl. Sicul. I. 185. — *Pl. victorialis* Bertol. Flor. Ital. II. 160. — Crescit in montibus apricis et calcareis Galliae meridionalis, Hispaniae, Italiae, Siciliae et Hungariae.

53. PL. LEIOPETALA Lowe, Transact. of the Cambridge philos. soc. IV. 17. — Barnéoud l. c. 31. — Caulescens glabra: foliis integris, basi lanatis; pedunculis profunde striatis axillaribus; spicis oblongis compactis; bracteis longis. ♃ — In montibus insulae Madeirae crescit.

54. PL. LAGOPUS Linn. Spec. plant. 165. — Sibthrp. Flor. Graec. t. 144. — Moris. Oxon. Histor. III. sect. 8. t. 16. fig. 13. — Barnéoud l. c. — Erecto-pilosa: foliis obtusis denticulatis; spica brevi ovata; corollae laciniis dorso ciliolatis. ♃ — *Pl. Catanance* Rauwlf. Itin. 4. t. 6.

α. Foliis hispidis; spica oblonga. — *Pl. intermedia* Lapeyr. Flor. Pyren. 69. — *Pl. arvensis* Prsl. Flor. Sicul. prodr. 64. — *Pl. eriostachya* Tenore, Flor. Neapol. I. 13.

β. Spicis cylindricis gracilibus. — *Pl. Madritensis* Lagasca mss. — *Pl. aliena* Schrad.

γ. Foliis latis quinquenerviis; spica elongata. — *Pl. Lusitanica* Linn. Spec. plantar. Appndx. 1667. — *Pl. lagopodioides* Schrank in München. Abhndlngn. IV. 71. — *Pl. pseudo-lusitanica* Roem. et Schult. Syst. vegetab. III. 121. — Crescit locis sabulosis in Europa mediterranea et in insulis Canariensibus.

55. PL. VAGINATA Venten. Hort. Cels. 29. t. 29. — Barnéoud l. c. 32. — Caulescens: foliis denticulatis amplexicaulibus; caule fruticoso vaginato; spicis ovatis longe pedunculatis villosis. ♃ — *Pl. Lagopus* var. ε. et ζ. Rapin, Mém. de la soc. Linn. de Paris VI. 460. — *Pl. fruticosa* Hort. Paris. — Crescit in Mauritania.

56. PL. SETOSA Bertol. Nov. Comment. act. Bonon. V......? — Barnéoud l. c. — Annua: foliis obverse lanceolatis mucronulatis glabris; scapo tereti piloso; spica cylindracea densiflora; bracteis corollisque aristatis. ⨀ — Crescit ad littora Euphratis.

57. PL. GLAUCA C. A. Mey. Verz. der Pflnzen. am Caucas. 115. — Barnéoud l. c. 33. — Annua: foliis denticulatis glabriusculis; scapo angulato; spica densa oblonga; corollis glabris. ⨀ — Crescit in deserto Baku.

58. PL. AUSTRALIS Lam. Illustr. p. 339. — Barnéoud l. c. — Parva: foliis glabris integris vel denticulatis, basi villosis; scapo striato; spica cylindrica; corollis glabris; staminibus parum exsertis; bracteis parvis obtusis. ⨀ — In Bonaria.

59. PL. VIRESCENS Barnéoud l. c. † — Glabra: foliis lanceolatis subcoriaceis; spica longissima laxiflora; bracteis obtusis; corollae laciniis albis acutiusculis. ♃ — Sesquipedalis, radix perennis fibrosa. Folia longa 5–7-nervia integerrima glabra obtusa, basi attenuata scapo breviora. Scapus erectus pubescens striatus. Spica glabriuscula 3–5-pollicaris laxiflora. Bracteae calyci aequales. Calycis segmenta obtusa. Corollae laciniae albae patulae. Stamina breviora stigmate longe exserto. Capsula glabra. — *Pl. lanceolata* γ. Hook. Fl. Bor. Amer. II. 123. — Crescit in America boreali.

60. PL. REMOTA Lam. Illustr. gener. p. 341. — Barnéoud l. c. 34. — Foliis linearibus, basi fulvo-lanatis; scapo striato subcontorto; spica gracili laxissima; corollis fuscis. ⨀ — Crescit in Promontorio bonae spei.

61. PL. MACROCARPA Cham. et Schlchtd. Linnaea I. 166. — Barnéoud l. c. — Glabra: foliis longissimis obtusis; scapo striato pubescente; spica laxa; bracteis obtusis margine dilatatis; capsula magna raro circumscissa. ♃ — Crescit in America boreali et in Kamtschatka.

62. PL. BROGNIARTII Barnéoud l. c. 35. — Glabra: foliis integerrimis carnosis; spica crassa laxiflora; bracteis et corollae laciniis angustis et acutissimis; capsula ad basin circumscissa. ♃ — Herba rigida 6–7-pollicaris. Folia 7-nervia obtusa, basi attenuata, scapo breviora. Scapus glaber angulatus. Spica laxiflora glabra. Bracteae basi pilosae calycem aequantes. Calycis segmenta obtusiuscula margine membranacea. Corollae tubus glaber, laciniae patulae fuscae. Stamina et stigma exserta. Capsula bilocularis disperma. — Crescit in insulis Sandwicensibus.

63. PL. CAPENSIS Thnbrg. Prodr. fl. Capens. 29. — Barnéoud l. c. — Glabra: foliis oblongis integris vel denticulatis; spica gracili laxiflora; bracteis parvis; calycis segmentis dorso laete viridibus; staminibus stigmate brevioribus. ♃

β. Longissima bipedalis: foliis lanceolatis 9-nerviis. — *Pl. leptostachya* E. Mey. mss. — Crescit in Promontorio bonae spei.

64. PL. CAROLINIANA Walt. Flor. Carol. 85. — Barnéoud l. c. — Glabra: foliis integerrimis longis; floribus remotis; caule tereti. ♃? — Crescit in Carolina.

65. PL. ULIGINOSA Baumgarten, Enumer. stirp. Transylv. I. 89. — Barnéoud l. c. — Foliis ovato-lanceolatis dentatis trinerviis glabris; spica cylindrica brevi; filamentis antherisque niveis. ♃ — Crescit in Transylvania.

Sectio VII. ALBICANS Steinheil mss. ex Barnéoud l. c. 36.

Corollae laciniae fuscae acutae. Calyx obtusus. Bracteae saepissime dilatatae obtusae vel acutae. Spicae cylindricae vel ovatae densae vel laxiflorae pilosae. — Herbae foliis linearibus vel lineari-lanceolatis albicantibus.

§. 1. *Spicae cylindricae vel ovatae multiflorae.*

66. PL. ALBICANS Linn. Spec. plant. t. 165. — Moris. Oxon. Hist. III. sect. 8. t. 16. fig. 23. — Matthioli, Comment. 687. (ic.) — Cavanilles, Icon. II. 21. t. 124. — Barnéoud l. c. — Pilis rufis albicans: foliis integris; spica longa sparsiflora; bracteis magnis obtusissimis; calycibus ciliatis. ♃ — Floribus ad apicem spicae in capitulum lanatum mutatis *Pl. Lagurus* Boiss. et Auch. mss. — Crescit in tota regione Mediterranea.

67. PL. CYLINDRICA Forsk. Flor. Aeg. Arab. 31. — Barnéoud l. c. — Lanata: foliis integris; spica densa, basi laxa; bracteis latissimis; calycibus ciliatis. ♃ — *Pl. setosa* Clarke, Reise III. 163. — *Pl. argentea* Sieb. — Crescit in Aegypto et in Oriente.

68. PL. COMMERSONIANA Dcne. mss. ex Barnéoud l. c. 37. — Tomentosa gracilis: foliis angustis integris; scapo striato; spica tenui laxiflora; bracteis parvis. ⊙ — Herba 7-10-pollicaris. Folia acuta utrinque sericea scapum aequantia. Scapus teres tomentosus. Spica pilosa. Bracteae acutae calyce subbreviores. Flores minores quam *Pl. albicantis.* Calyx glabriusculus. Corollae tubus glaber elongatus, laciniae ovatae nec basi rotundatae. Stamina exserta, stigma staminibus longius. Semina nigricantia. — Crescit in Montevideo.

69. PL. SPARSIFLORA Michx. Flor. bor. Americ. I. 94. — Barnéoud l. c. — Puberula: foliis lanceolatis subintegris; spicis longis; floribus solitarie sparsis glabris. ⊙ — *Pl. interrupta* Poir. Encycl. méth. V. 375. — Crescit in Carolina.

70. PL. ISPAGHUL Rxb. Asiat. Research. XI. 174. — Barnéoud l. c. — Pubescens: foliis integris; spica glabriuscula compacta cylindrica; bracteis magnis; corollae laciniis rotundatis. ⊙ — Crescit in India orientali.

71. PL. OLIVIERI Dcne. mss. ex Barnéoud l. c. — Patula ferruginea: foliis lanceolatis profunde dentatis; spica oblonga compacta lanata; bracteis latissimis. ♃ — Herba 4-6-pollicaris. Folia acuta rufo-tomentosa. Scapi plures foliis breviores. Bracteae obtusae lanatae calycem includentes. Calycis segmenta membranacea obtusa. Corollae laciniae rotundatae fuscae acutiusculae. — Crescit in calidis Aegypti.

72. PL. PATAGONICA Jcq. Collect. Supplem. 35. Icon. rar. II. t. 306. — Barnéoud l. c. 38. — Subincana: foliis integris; spica compacta; bracteis linearibus flore longioribus; corollae laciniis ovatis; staminibus vix exsertis. ⊙ — Crescit in Patagonia.

73. PL. STEINHEILII Barnéoud l. c. — Tenuis: foliis sericeis integris; spica oblonga densa; floribus sericeis; bracteis ovatis calyce brevioribus; corollae laciniis angustissimis subrectis; staminibus longe exsertis. ⊙ — Tota sericeo-argentea. Folia linearia acuta scapo breviora; scapi plures non striati. Spica sericea. Calycis segmenta margine membranacea obtusa. Corollae tubus brevis, laciniae lineares acutissimae vix patulae. Stamina stigmate exserto longiora. Capsula violacea tumida. — Crescit in arenosis Chilensibus.

74. PL. BICARINATA F. W. Meyer, Primit. fl. Esseq. 88. — Barnéoud l. c. — Suffruticosa hirta: spicis compactis; bracteis parvis hispidulis; corollae laciniis ovatis. ♃ — Crescit in Guiana.

75. PL. CRETICA Linn. Hort. Cliff. 36. — Sibthrp. Flor. Graec. t. 147. — Barnéoud l. c. 39. — Conferta, rufo-lanata: scapis pluribus incurvatis brevissimis; foliis longioribus integris; spica globosa densa vel oblonga; floribus arachnoideo-pilosis. ♃ — *Pl. Catananche* Clarke in Spr. Neue Entdeck. III. 264.

α. Decumbens: spicis glabriusculis; scapis longioribus. — *Pl. decumbens* Forsk. Fl. Aeg. Arab. 30. — Crescit in regione Mediterranea et in Oriente.

76. PL. CILIATA Dsf. Flor. Atlant. I. t. 39. fig. 3. — Barnéoud l. c. — Incana: spicis rotundis pubescentibus; corollae laciniis ovatis ciliatis; foliis integris; planta tota 3–4–pollicari. ⊙ — *Pl. bellidifolia* Viv. Pl. Aegypt. decad. 23. fig. 26. — In Aegypto et Arabia crescit.

77. PL. PENICILLATA Fnzl. et Endlich. Sert. Cabulic. I. 1. t. 1. — Barnéoud l. c. — Floccoso-lanata: foliis oblongis; spica cylindrica villosa; corollae laciniis subulatis hirsutissimis. ♃ — Crescit in Asiae planitiebus ad Daman.

78. PL. BELLARDI All. Flor. Pedem. no. 300. — Barnéoud l. c. — Fulvo-pilosa: spica densa villosa cylindrica; bracteis subulatis calyce longioribus; corollae laciniis subulatis acutissimis. ⊙ — *Pl. pilosa, holostea, villosa* Lam. Illustr. no. 1665. 1667. 1669. — *Pl. pilosa* Cav. Icon. pl. rar. III. t. 249. fig. 1. — *Pl. lanata* Poir. Iter II. 115. — *Pl. tenuis* Lnk. et Hffmnsgg. Fl. Portug. I. 426. — *Pl. minuta* Lnk. in Schrad. Journ. 1800? — *Pl. parvula* Roem. et Schult. Syst. vegetab. III. 125.

β. Pygmaea: Spica globulosa. — *Pl. pygmaea* Lam. Illustr. p. 341. — Crescit in regionibus Mediterraneis.

79. PL. BAUPHULA Edgeworth in Hook. Journ. of bot. II. 285. — Barnéoud l. c. 40. — Subhirsuta: spicis ovatis densis; bracteis latis apiculatis; foliis remote denticulatis. ♃ — Crescit in India (orientali?).

80. PL. MINUTA Pall. Itin. II. appdx. no. 69. (non Lnk.) — Barnéoud l. c. — Pilosa procumbens: foliis integris; spica ovata glabra; bracteis dorso nigricantibus; staminibus vix exsertis. ⊙ — Crescit in tota Asia centrali, ad mare Caspium.

81. PL. LOEFFLINGII Linn. Syst. veget. 123. — Jcq. Hort. Vindob. II. 58. t. 126. — Barnéoud l. c. — Virescens: foliis denticulatis; spicis globulosis glabris; bracteis carinatis acutis; corollis minutis. ⊙ — *Pl. marina* Petiv. Herb. fig. 9. — *Pl. carinata* Mnch. Method. pl. I. p. 460.

β. Caspica Fisch. mss. — Pusilla: spicis parvis; foliis integris. — *Pl. minuta* C. A. Mey. Vrzchnss. der Pflnzn. am Caucas. no. 1011. — Crescit in tota Europa meridionali, in Oriente, in Promontorio bonae spei et in insulis Canariensibus.

82. PL. PRAECOX C. A. Mey. Verzchnss. der Pflnzn. am Caucas. p. 115. — Barnéoud l. c. 41. — Lanuginosa prostrata: foliis profunde dentatis; spicis ovatis pilosis; corollae laciniis rotundatis; bracteis obtusissimis. ♂ — Crescit in Asia ad Baku.

§. 2. *Folia lineari-filiformia; spicae globulosae pauciflorae.*

83. PL. GLOMERATA Poir. Encycl. méth. V. 385. — Barnéoud l. c. — Pusilla: scapo filiformi pubescente; spica glaberrima. ⊙ — Crescit in Teneriffa.

84. PL. PHILIPPICA Cavanilles, Icon. IV. 35. t. 359. fig. 2. — Barnéoud l. c. — Pusilla: foliis villosis; spica 6–8–flora pilosiuscula; corollae laciniis albis; staminibus longis. ⊙? — Crescit in insulis Philippinis.

85. PL. LESSINGII Fisch. et Mey. Indx. semin. hort. Petropolit. II. 22. — Barnéoud l. c. — Pusilla: foliis et spicis pilosis; corollae laciniis minimis; staminibus vix exsertis. ⊙ — Crescit in arenosis Asiae borealis.

86. PL. NANA Bertol. Nov. Comment. acad. Bonon. V. 422. (non Trattin.) — Barnéoud l. c. — Hirsuta: foliis pilosis; spicis subtrifloris; corollae laciniis lanceolatis. ⊙? — Crescit in Asia centrali.

87. PL. UNCIALIS Dcne. mss. ex Barnéoud l. c. 42. — Minima, basi lignosa: foliis pilosis; scapo filiformi unifloro; flore glabro unibracteato. ♃ — Planta vix sesquipollicaris. Cauliculi stipes incrassatus lucido-nigricans. Folia scapo sublongiora. Scapus teres tenuis pilosus. Calyx obtusus. Corollae laciniae ovatae. Stamina longe exserta. — Crescit in rupibus vulcanicis Andium Chilensium.

88. PL. NUBIGENA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pl. II. 185. — Barnéoud l. c. — Caespitosa sericea: foliis fasciculatis scapo brevissimo longioribus; spica 3–5–

flora pilosa; corollae laciniis oblongis; staminibus vix exsertis. ♃ — *Pl. frigida* Willd. mss. ex Schult. Mantiss. III. 76. — Crescit in summis rupibus Andium in Columbia.

89. PL. MULTICEPS H. B. Kth. l. c. 186. — Barnéoud l. c. — Caespitosa: foliis sericeo-argenteis scapo brevioribus; spica globosa pubescente; corollae laciniis rotundatis; staminibus longe exsertis. ♃ — Crescit in montibus regni Mexicani.

Sectio VIII. GNAPHALOIDES Barnéoud l. c. 42.

Corollae laciniae rotundato-obtusae, basi concavae maculatae brunneae. Calyx obtusus. Bracteae obtusae vel acutae. Spicae cylindricae, rarius oblongae pilosae. — Species omnes Americanae foliis linearibus pilosis vel lanatis.

§. 1. *Flores ordinarii densi.*

90. PL. GNAPHALOIDES Nutt. Fl. Am. bor. I. 100. — Barnéoud l. c. 43. — Tota fusco-lanata: foliis integris; spica longa densa; staminibus inclusis; stigmate vix exserto. ♃ — *Pl. Purshii* Roem. et Schult. Syst. veget. III. 120. — *Pl. Lagopus* Prsh. Flor. Amer. sept. I. 99. (non Linn.) — Crescit in siccis provinciae Texas.
β. Foliis denticulatis. — *Pl. Hookeriana* Fisch. et Mey. Linnaea XII. Literaturb. 113.

91. PL. ARISTATA Michx. Flor. Bor. Americ. I. 95. — Barnéoud l. c. — Stricta: foliis pubescentibus integris; scapis teretibus; spica cylindrica densa; bracteis flore triplo quadruplove longioribus; staminibus exsertis. ⊙ — In America boreali.

92. PL. NIVEA H. B. Kth. Nov. gener. et spec. pl. II. 185. — Barnéoud l. c. — Gracilis: foliis integris, utrinque lanatis; spicis cylindricis densis; bracteis linearibus florem subaequantibus; staminibus vix exsertis. ♃ — *Pl. lanata* Delile mss. — *Pl. curta* Engelm. mss. — *Pl. candicans* Schrad. mss. — Crescit in regionibus montosis regni Mexicani.

93. PL. NUTTALLII Rapin, Mém. de la soc. Linn. de Paris VI. 470. — Barnéoud l. c. — Subcaulescens: foliis glabris duris; spica oblonga pubescente; bracteis squarroso-subulatis, corolla brevioribus. ♃ — *Pl. squarrosa* Nutt. mss. — In territorio Arkansas crescit.

94. PL. MEXICANA Lnk. in Linnaea I. 168. — Barnéoud l. c. 44. — Stricta: foliis integris trinerviis pilosis; spicis cylindraceis densis; bracteis pubescentibus ovatis calyce brevioribus; staminibus parum exsertis. ♃ — *Pl. Xorullensis* H. B. Kth. l. c. 186. — *Pl. graminea* Willd. Herb. — *Pl. linearis* H. B. Kth. l. c. — *Pl. eriorhiza* Willd. Herb. — Crescit in jugis excelsis Andium Americae meridionalis.

95. PL. TUMIDA Lnk. Enumerat. I. 121. — Barnéoud l. c. — Cinereo-sericea: foliis integris vel denticulatis; spica oblonga laxiuscula; corollae laciniis ellipticis; staminibus vix exsertis; capsulis tumidis. ⊙.
β. supina: Staminibus longioribus. — *Pl. decumbens* Gay mss. — Crescit in arenosis Chilensibus.

96. PL. SERICEA Rz. et Pav. Flor. Peruv. et Chil. I. 51. t. 79. fig. B. — Barnéoud l. c. — Suffruticosa caespitosa: foliis subulatis sericeo-tomentosis; spica ovata pedicellata in axillis foliorum; staminibus non longe exsertis. ♃ — *Pl. vestita* Roem. et Schult. Syst. veget. III. 149. — *Pl. congesta* Rz. et Pav. l. l. c. c. fig. A. — Crescit in collibus Peruviae.

97. PL. MOLLIS Hook. et Arn. Bot. Beech. voy. 43. — Barnéoud l. c. 45. — Subcaulescens: foliis lineari-lanceolatis cinereo-sericeis; scapis hirsutis; spica cylindrica laxiuscula. ♃ — Crescit in Chili.

§. 2. *Foliis integris; floribus magnis intense brunneis.*

98. PL. FRIGIDA Knze. mss. in Poepp. Coll. pl. Chil. 49. ex Wlprs. Nov. act. acad. Caes. Leop. Carol. XIX. Suppl. I. 402. — Multiceps: foliis lineari-lanceolatis, basi glabris; spica pilosa 6–8-flora; calycibus ciliatis; corollis maximis. ♃ — Planta pedalis. Radix horizontalis lignosa. Folia acuta trinervia, utrinque fulvo-sericea vel hispida scapo duplo breviora. Scapi plures adpresse pilosi. Bracteae

obtusiusculae dorso hispidae, calyce breviores. Corollae tubus elongatus. Stamina longa ad faucem inserta. Stigma exsertum. Semina nigra dorso punctulata. — *Pl. grandiflora* Meyen, Reise I. 348. — *Pl. platypetala* Wallrth. Monogr. Plantagin. inedit. — *Pl. macrantha* Dcne. mss. ex Barnéoud l. c. 45. — Crescit in Andibus provinciae Colchaguae.

99. PL. DECAISNEI Barnéoud l. c. — Multiceps: foliis lineari-lanceolatis canosericeis, scapo multo brevioribus; spicis cylindraceis laxis multifloris; bracteis longe ciliatis. ♃ — Herba bipedalis. Radix lignosa horizontalis. Folia trinervia acuta, apice glabriuscula, basi lanugine densa fulva ornata. Scapi plures adpresse pilosi tactu rugulosi. Spica 1½–2–pollicaris lanata. Bracteae obtusae calyce subduplo breviores. Calycis segmenta carinata, margine membranacea. Corollae laciniae basi nigro-maculatae. Stamina ad faucem inserta stigmate longo breviora. — Crescit in excelsis Andium.

100. PL. PERREYMONDII Barnéoud l. c. 46. — Argenteo-candidissima: foliis lineari-lanceolatis scapum aequantibus; spicis cylindraceis laxis canis; bracteis acutis ciliatis; corollae laciniis ovatis acuminulatis. ♃ — Suffruticosa sesquipedalis, radix horizontalis ad collum squamosa. Folia utrinque nivea trinervia acuta. Scapi plures lanati axillares. Spica 2–3–pollicaris villosa. Bracteae dorso brunneae, margine membranaceae calycem aequantes. Calycis segmenta obtusa ciliata. Corollae tubus elongatus. Stamina ad faucem inserta stigmate exserto longiora. Semina punctulata. — Crescit in frigidis Andium Venezuelae.

101. PL. CORIACEA Cham. et Schlchtd. Linnaea I. 171. — Barnéoud l. c. — Suffruticosa: radice ad collum squamosa; foliis coriaceis, basi lanuginosis; spica cylindrica densa pubescente; staminibus longe exsertis. ♃ — *Pl. Chilensis* Rapin in Mém. de la soc. Linn. de Paris. VI. 475. — Crescit in Chili et Montevideo.

102. PL. GAYANA Dcne. mss. ex Barnéoud l. c. — Lignosa glabra: foliis lineari-lanceolatis; spicis verticillatim interruptis; bracteis ciliatis; corollae tubo elongato. ♃ — Herba 1–3–pedalis multiceps, radix horizontalis. Folia subcarnosa glaberrima acuta trinervia, scapo triplo quadruplove breviora. Scapi plures adpresse pilosi, basi hispidi. Spica interrupta, flores pubescentes 4–6–ni conjunctim verticillati. Bracteae obtusae calyce subduplo breviores. Calycis segmenta pubescentia. Stamina ad faucem inserta stigmate exserto longiora. Semina punctulata. — Crescit in rupibus vulcanicis Andium Chilensium.

Sectio IX. FERNANDEZIA Barnéoud l. c. 47.

Corollae laciniae acutissimae angustae, tubus elongatus. Bracteae acutae. Spica longa glabra laxiflora. — Arbusculae insignes simplices, foliis ad apicem trunci oblongo-lanceolatis glabris, basi lanatis.

103. PL. FERNANDEZIA Bertero mss. ex Barnéoud l. c. — Suffruticosa formosa glaberrima: caule nudo sesquipedali, apice folioso; calycibus acutis glabris; staminibus ad medium tubum corollinum insertis longis stigmate brevioribus. ♄ — Cortex trunci fungosus. Folia 7–9–nervia coriacea nitida integra vel apice denticulata. — Crescit in rupibus insulae Juan Fernandez.

104. PL. QUELENIANA Gaudich. Voy. Uran. I. 445. — Barnéoud l. c. — Suffruticosa: caule simplici nudo foliis deciduis cicatrisato, apice folioso barbato; foliis integris; calycibus obtusis glabris; staminibus vix exsertis tubo corollino prope basin insertis; seminibus nigrescentibus. ♄

α. major ramosa: foliis apice saepe denticulatis. — *Pl. princeps* Chamiss. et Schlchtd. Linnaea I. 167. — Crescit in montibus vulcanicis insularum Sandwicensium.

Sectio X. PSYLLIUM Tournef. — Barnéoud l. c. 47.

Corollae laciniae acutae fuscae, tubus glaber saepius crispus. Calyx obtusus vel acutus. Semina oblonga nitidissima. — Herbae ramosae, rarissime arbusculae, foliis linearibus, spicis axillaribus pedunculatis brevibus globosis vel ovatis.

105. PL. PSYLLIUM Linn. Spec. plant. 167. — Tabernaem. Kräuterbch. 145. (ic.) — Matthiol. Comment. 753. — Barnéoud l. c. 48. — Simplex, apice corymbosa: foliis

tactu viscidis saepe dentatis; spicis globulosis compressiusculis; bracteis angustis acutis; corollis subaristatis. ⊙ — *Pl. Pseudo-psyllium* Hort. Paris. — *Psyllium annuum* Mirbel. — *Psyllium erectum* St. Hil. Expos. 209. — *Pl. agrestis* Sltzm. mss.

α. Afra: Caule magno ramosissimo. — *Pl. Afra* Linn. Spec. pl. I. 168.

β. Divaricata: Caule nano; foliis integris. — *Pl. divaricata* Zuccagni, Obs. bot. cent. I. no. 33. — *Pl. cynopidea* Schult. Observ. bot. 25. — *Pl. hirsuta* Kitaib. ex Steud. Nomencl. bot. (edit. 2.) — *Pl. rigida* Hortul. (nec H. B. Kth.) — *Pl. Sicula* Prsl. Delic. Pragens. 70. — Crescit in tota regione Mediterranea et in insulis Canariensibus.

106. PL. STRICTA Schousb. Fl. Mar. 55. — Moris. Oxon. Histor. III. 262. t. 17. fig. 2. — Barnéoud l. c. 49. — Caule gracili; foliis integris angustissimis; spicis compressis; bracteis linearibus calycem superantibus; corollae laciniis acutis. ⊙ — Planta non viscida. — *Pl. parviflora* Hortul. (nec Dsf.) — *Pl. Rosettana* Poir. Encycl. méth. IV. Suppl. 433. — *Pl. pumila* Willd. Enumer. 162. — *Pl. exigua* Murr. Comment. Goetting.......? 94. t. 5. — Crescit in Africa boreali.

107. PL. PARVIFLORA Dsf. Flor. Atlant. I. 141. — Barnéoud l. c. — Parva: foliis integris; spica globulosa breviter pedicellata; bracteis subulatis parvis; corollae laciniis minutis. ⊙ — Crescit in Africa boreali.

108. PL. ARBORESCENS Poir. Encycl. méth. V. 389. — Barnéoud l. c. — Fruticosa prostrata glabra: foliis subulatis fasciculato-confertis, basi ciliolatis pedicello longioribus; spicis globulosis 5–6-floris. ♄ — Pedunculi axillares et terminales.

β. Compacta: Densa, foliis pilosis latioribus; calycis segmentis obtusis nec acutis. — Crescit in rupibus maritimis in insulis Canariensibus et Madeira.

109. PL. WEBBII Barnéoud l. c. 50. — Erecta fruticosa rufo-tomentosa: foliis subulatis involutis; spicis sesquipollicaribus in fasciculos paucifloros partitis; pedunculis sparsis axillaribus (non terminalibus); calyce obtuso. ♄ — Arbuscula sesquipedalis ramosissima. Radices durae. Folia confertissima opposito-connata canescentia ciliata, pedicello breviora. Pedicelli villosi, secus ramorum fere totam longitudinem dispositi. Flores spicati tomentosi. Bracteae acutae basi dilatatae florem subaequantes. Corollae tubus elongatus crispus, laciniis limbi acutissimis angustis. Stamina medio tubo inserta stigmate longe exserto breviora. Capsula ovoidea calyce subduplo longior. Semina nigrescentia lucida. — Crescit in excelsis insulae Teneriffae locis.

110. PL. ROBUSTA Rxbrgh. in Beats app. 317. — Barnéoud l. c. — Dumosa: foliis ad apicem ramorum robustorum confertis integris albicantibus; spicis cylindricis longe pedunculatis. ♃ — Crescit in montibus insulae Stae. Helenae.

111. PL. CYNOPS Linn. Spec. pl. 167. — Moris. Oxon. Hist. III. 262. t. 17. fig. 1. — Lobel. Icon. 437. — Jcq. Fragment. t. 182. — Barnéoud l. c. 51. — Caule lignoso erecto; foliis retrorsum asperis integris; spicis ovatis glabris; bracteis latis saepe foliaceis; corollae laciniis angustis; staminibus non longe exsertis. ♄ — *L. suffruticosa* Lam. Flor. Franc. II. 313. — *Pl. Genevensis* DC. Fl. Franc. — In Europa meridionali, in Arabia et in Africa boreali crescit.

112. PL. EUPHRATICA Dcne. mss. ex Barnéoud l. c. — Lignosa hirsutissima: foliis integris; spicis ovatis hirsutis; bracteis angustis acutis. ♄ — Planta 6–8-pollicaris multiceps. Caules adpresse pilosi ramosi. Pedicelli teretes folio breviores. Calyx acutiusculus pilosus. Corollae tubus elongatus. Stamina longa, antherae magnae. — Crescit in Oriente.

113. PL. ARENARIA Waldst. et Kitaib. Pl. rar. Hungar. I. 51. t. 51. — Lobel. Icon. 436? — Barnéoud l. c. — Ramosa, tactu aspera: foliis integris; spicis conoideo-compactis; bracteis inferioribus subacutis, aliis latis obtusissimis; calycibus apice angulato-obtusis; corollae laciniis acutiusculis. ⊙ — *Pl. Psyllium* Bulliard. Hb. I. 363. — *Psyllium annuum* Thuill. Fl. Paris. II. 81. — *Pl. cynops* Pall. Tauric. 131. — *Pl. Indica* Linn. Hort. Upsal. 29. — *Psyllium Indicum* Dumer. Cours. — Crescit in Europa australi, meridionali et in India orientali.

114. PL. SQUARROSA Murr. Comment. Goett.......? 38. t. 3. — Barnéoud l. c. 52. — Carnosa prostrata: foliis glabris, basi ciliatis; spicis viridibus rotundatis; bracteis inferioribus foliaceis longis; calycibus ciliatis. ⊙ — *Pl. Aegyptiaca* Jcq. Collect. I. 45. — *Psyllium Aegyptiacum* Mirbel. — *Psyllium squarrosum* Dumer. Cours. Bon jard. — Crescit in Aegypto, in Oriente et in insulis Canariensibus.

† *Species omissae recognoscendae.*

115. PL. ADSPERSA Brnhrdi. Linnaea XII. Literatb. 75. — A *Pl. Cynope* differt bracteis basi parum dilatatis flores non occultantibus foliisque vix pubescentibus. — Crescit......?

116. PL. (CORONOPUS) FIRMA Knze. in Poepp. Coll. pl. Chil. 44. ex Wlprs. Nov. act. acad. Caes. Leop. Carol. XIX. Suppl. I. 402. — Annua: collo radicis lanato; foliis lanceolatis obtusiusculis subintegris vel remote denticulatis, utrinque araneoso-lanatis; spicis axillaribus cylindraceis latiusculis; capsula biloculari dicocca. ⊙ — Herba tota araneoso-lanata. Folia bipollicaria et ultra, basi longe attenuata, 4 lin. lata, subquinquenervia. — Crescit in Peruvia circa Tacnam.

117. PL. (CORONOPUS) BRACHYSTACHYS Knze. l. c. 48. — Wlprs. l. c. — Annua pusilla: foliis lanceolatis integerrimis, basi attenuatis; pedunculis folio longioribus; spicis abbreviatis subquadrifloris; perigonii laciniis lanceolatis longe exsertis. ⊙ — *Pl. brachypetala* Wallrth. mss. — Crescit in Chili ad Copiapo.

118. PL. UNIGLUMIS Wallrtb. Monogr. Plantagin. inedit. ex Wlprs. l. c. — Rhizomate lignoso crassissimo caespitoso; foliis densis linearibus integris acutis sericeis; pedunculo foliis duplo longiore unifloro; capsula......? ♃ — Folia brevissima ¼–½-pollicaria lana sericea longa vestita. — Crescit in Cordillera de San Fernando in Chili.

†† *Species valde dubiae.*

PL. ACCEDENS Raf. Flor. Ludow. 33.
PL. CANALICULATA Hffmnsegg. Verzeichn. II. app. 51.
PL. CRASSINERVIS Hornem. Hort. Hafn. 2.
PL. GLABRA Nutt. Gen. Amer. I. 100.
PL. LUDOWICIANA Raf. l. c.
PL. POLYSTACHYA Vivian. Pl. Aegypt. decad. 22.
PL. SYRTICA Viv. Flor. Lybic. fragm. t. 2.
PL. TABERNAEMONTANI Baumgart. Flor. Transylv. I. 89.

††† *Species prorsus incognitae.*

PL. AUCKLANDIANA Hook. fil. Antarct. voy. of Erebus et Terror t. 43.
PL. ERIOPODA Torrey.
PL. GARGANICA Tenore.
PL. RECTIROSTRIS Wallrth.

†††† *E genere excludenda.*

PL. UNIFLORA Linn. = LITTORELLA LACUSTRIS.

INDEX ALPHABETICUS

ORDINUM, SUBORDINUM, TRIBUUM, GENERUM, SPECIERUM, SECTIONUM ET SYNONYMORUM

OMNIUM

IN

REPERTORII BOTANICES SYSTEMATICAE

FASCICULIS I—XXVI

OBVIORUM.

PRAEMONENDA.

Nomina ordinum literis Romanis maximis traduntur.
Nomina subordinum, tribuum et subtribuum literis Romanis crassioribus traduntur.
Nomina generum et specierum literis Romanis vulgaribus traduntur.
Nomina synonymorum et sectionum traduntur literis Italicis, synonyma ordinalia literis Italicis majoribus, tribualia literis Italicis remotioribus.
Illis generibus, quae signo * notavimus, nihil novi loco citato addendum videbatur.
Illarum specierum, quae eodem signo * notavimus, loco citato diagnosin omisimus.
Illarum specierum icon tantummodo quaedam nova commemoratur, quibus loco citato signum † appositum est.
Genera signo ° notata loco citato characteribus genericis illustrantur.

A

Abaremotemon Bth. V. 612.
Abasoloa Llaw et Lexarz. *II. 701. no. 2.
Abatia Rz. et Pav. *II. 112.
Abelia R. Br. II. 446. VI. 3.
— biflora Turcz. II. 446. no. 1.
— floribunda Dcne. VI. 3. no. 3.
— hirsuta Wlprs. VI. 3. no. 4.
— rupestris Lindl. VI. 3. no. 2.
— serrata Siebd. et Zucc. II. 446. no. 2.
— spathulata Siebld. et Zucc. II. 446. no. 3.
— uniflora R. Br. VI. 3. no. 1.
Abelmoschus DC. I. 302. no. 1. I. 308.
Abelmoschus Medik. I. 308. V. 92.
— aculeatus G. Don. I. 308. no. 4.
— angulosus Wall. I. 309. no. 16.
— angustifolius Hook. et Arn. I. 308. no. 10.
— aquaticus DC. I. 311. †
— ascendens G. Don. I. 310. no. 23.
— ciliaris Prsl. I. 308. no. 9.
— Cisplantinus St. Hil. I. 309. no. 12.
— congener Schum. et Thonn. I. 308. no. 5.
— crinitus Wall. I. 308. no. 2.
— cruentus Bertol. I. 310. no. 26.
— cryptocarpus A. Rich. I. 310. no. 29.
— Cubensis A. Rich. I. 309. no. 11.
— cucurbitaceus St. Hil. I. 310. no. 28.
— divaricatus Grah. I. 309. no. 14.
— esculentus Wght. et Arn. *I. 309. no. 15.
— ficulneus Wght. et Arn. *I. 308. no. 1.
— ficulnoides Lindl. I. 309. no. 19.
— Genevii Boj. I. 310. no. 25.
— Guineensis G. Don. I. 310. no. 22.
— Haenkeanus Prsl. I. 310. no. 31.
— laxiflorus St. Hil. I. 310. no. 27.
— maculatus Bartl. I. 309. no. 21.
— Manihot L. I. 311 †
— Marianus Prsl. I. 310. no. 30.
— moschatus Mnch. *I. no. 309. no. 18.
— palustris L. I. 311. †
Abelmoschus panduraeformis Hsskrl. V. 92. no. 2.
— persicifolius Eckl. et Zeyh. I. 308. no. 8.
— pseudo-abelmoschus Blume. I. 308. no. 3.
— quinquelobus G. Don. I. 310. no. 24.
— roseus Thon. I. 311. †
— rostellatus Guillem. et Perr. I. 308. no. 6.
— rugosus Wall. I. 309. no. 17. (III. Emend pag. 2.)
— splendens Fraser. I. 309. no. 13.
— sublobatus Prsl. I. 310. no. 32.
— tulipaeflorus Hook. V. 92. no. 1.
— venustus Blume. I. 309. no. 20.
— verrucosus Guillem. et Perr. I. 308. no. 7.
Aberia Hochstett. °V. 56.
— verrucosa Hochstett. V. 56. no. 1.
Ablania Aubl. *I. 352.
Abobra do mato V. 765. no. 1.
Abobrinha do mato V. 764. no. 1.
Aboremotemon cf. *Abaremotemon.*
Abrahamia DC. II. 128.
Abrineae Wgbt. et Arn. I. 791. V. 514. no. 4.
Abroma Jcq. I. 337. V. 111.
— Mariae Mart. I. 338. no. 3.
— *Mariae* Mart. V. 111. no. 3.
— mollis Blume. I. 337. no. 1.
— nitida Poepp. et Endl. V. 111. no. 1.
— obliqua Prsl. I. 337. no. 2.
Abrotanella Cass. * II. 643.
Abrotanum Tournef. II. 640. VI. 217. 731.
— *campestre Neapolitanum* Boccone. VI. 214. no. 6.
— *campestri simile Tingitanum* H. L. B. VI. 214. no 6.
— *mas angustifolium maximum* Bauh. VI. 215. no. 7.
— *mas angustifolium minus* C. Bauh. VI. 215. no. 7.
— *quoddam inodorum* Raj. VI. 214 no. 6.

Abrotanum tenuifolium medium Hispanicum Barrel. V. 215. no. 7.
Abrus L. I. 791. V. 541.
— fruticulosus Wall. I. 791. no. 1.
— laevigatus E. Mey. I. 791. no. 4.
— melanospermus Hsskrl V. 541. no. 1.
— *minor* Desv. I. 791. no. 2.
— *pauciflorus* Desv. I. 791. no. 2.
— precatorius L. *I. 791. no. 2.
— squamulosus E. Mey. I. 791. no. 3.
Absinthium DC. VI. 218.
— *Italicum elatius Delphinii folio inodorum* Vaill. VI. 214. no. 6.
— *lagocephalum* Fisch. VI. 218. no. 19. *a.*
— *minus, majoribus altiusque incisis foliis cinereis, Hispanicum* Barrel. VI. 213. no. 4.
— *Santonicum Judaicum* Shaw. VI. 215. no. 9.
Absus Auct. I. 827.
Absynthium virescens Juss. VI. 216. no. 12.
Abuta concolor Poepp. et Endl. I. 95. no. 1.
Abutilon Gaertn. I. 322. II. 793. V. 95.
— albidum B. Webb. *I. 323. no. 12.
— albidum Hook. et Arn. I. 325. no. 29.
— anodoides St. Hil. et Naud. II. 793. no. 5.
— Arnottianum Gill. I. 324. no. 26.
— Asiaticum G. Don. *I. 323. no. 5.
— Californicum Bth. V. 95. no. 1.
— calycinum Prsl. I. 326. no 40.
— carneum St. Hil. I. 326. no. 50.
— confertiflorum A. Rich. I. 324. no. 21.
— crispum G. Don. *I. 322. no. 3.
— densiflorum Hook. et Arn. I. 324. no. 27.
— dianthum Prsl. I. 324. no. 19.
— elegans Colla. I. 325. no. 28.
— elegans St. Hil. I. 327. no. 53.
— ellipticum Schlchtd. I. 325. no. 33.
— erosum Schlchtd. I. 325. no. 31.
— falcatum St. Hil. et Naud. II. 793. no. 4.
— floribundum Schlchtd. I. 325. no. 30.
— fruticosum Guill. et Perr. I. 323. no. 17.
— giganteum Prsl. *I. 325. no. 34.
— glechomaefolium St. Hil. I. 326. no. 42.
— graveolens Wght. et Arn. *I. 323. no. 7.
— Grevilleanum Gill. I. 324. no. 25.
— Guichenotianum Dcne. I. 323. no. 11.
— Haenkeanum Prsl. I. 325. no. 38.
— hirtum G. Don. *I. 323. no. 6.
— inaequilaterum St. Hil. I. 326. no. 41.
— Indicum G. Don. *I. 322. no. 4.
— Julianae Endl. I. 327. no. 57.
— laxiflorum Guill. et Perr. I. 323. no. 13.
— leucanthemum St. Hil. I. 326. no. 44.
— macranthum St. Hil. I. 327. no. 55.
Abutilon macrocarpum Guill. et Perr. I. 323. no. 15.
— macrocarpum St. Hil. et Naud. II. 793. no. 2.
— macrophyllum St. Hil. et Naud. II. 793. no. 1.
— malachroides St. Hil. et Naud. II. 793. no. 6.
— melanocarpum* St. Hil. et Naud. II. 793. no. 3.
— Mexicanum Prsl. I. 325. no. 39.
— montanum St. Hil. I. 327. no. 54.
— paeoniaeflorum Hook. V. 95. no. 2.
— parviflorum St. Hil. I. 326. no. 46.
— patens St. Hil. I. 326. no. 45.
— pauciflorum St. Hil. I. 327. no. 52.
— periplocifolium G. Don. *I. 322. no. 2.
— pictum Gill. I. 324. no. 24.
— polyandrum Wght. et Arn. I. 322. no. 1. (III. Emend. p. 2.)
— pulchellum Don. I. 327. †
— racemosum Schlchtd. I. 325. no. 32.
— ramiflorum St. Hil. I. 326. no. 43.
— ramosissimum Prsl. I. 325. no. 37.
— reflexum Prsl. *I. 324. no. 20.
— rivulare St. Hil. I. 326. no. 47.
— rufinerve St. Hil. I. 326. no. 51.
— sessiliflorum Prsl. I. 324. no. 18.
— sparmannioides Guill. et Perr. I. 323. no. 16.
— *spicatum* H. B. Kth. I. 327. no. 1.
— stipulare Prsl. I. 323. no. 9.
— striatum Dicks. I. 327. no. 56. V. 95. †
— terminale St. Hil. *I 326. no. 48.
— Timoriense Dcne. *I. 323. no. 10.
— tomentosum Wght. et Arn. I. 323. no. 8. (III. Emend. p. 2.)
— tortuosum Guill. et Perr. I. 323. no. 14.
— trichodum A. Rich. I. 324. no. 22.
— triquetrum Prsl. *I. 325. no. 35.
— umbelliflorum St. Hil. I. 326. no. 49.
— uratocarpum Hook. et Arn. I. 324 no. 23.
— *vesicarium* Plum. I. 236. no. 5.
— vitifolium DC. V. 95.
— vitifolium Prsl. *I. 325. no. 36.
Acacia Willd. °V. 587. I. 884. II. 905.
Acacia ....? Schlchtd. V. 594. no. 2.
— *abietina* Willd. I. 897. no. 119.
— *acanthocarpa* Willd. I. 881. no. 180.
— Acapulcensis Kth. I. 920. no. 346.
— *Acapulcensis* Kth. V. 591. no. 5.
— Acatlensis Bth. I. 916. no. 297.
— *acicularis* R. Br. I. 891. no. 53.
— acinacea Lindl. I. 898. no. 127.
— acuifera Bth. I. 910. no. 240.
— acuminata Bth. I. 903. no. 175.
— *acutistipula* Mart. I. 876. no. 117.
— acutistipula Mart. I. 923. no. 387.
— Adansonii Guill. et Perr. I. 910. no. 216.

Acacia adenantheroides Mart. et Galcotti. V. 591. no. 23.
— adenocarpa Hook. et Arn. I. 924. no. 395.
— adhaerens Bth. I. 917. no. 310.
— *adstringens* A. Cunn. I. 895. no. 100.
— adstringens Mart. *I. 921. no. 366.
— *adunca* Cunn. I. 897. no. 115. β.
— alata R. Br. I. 886. no. 4.
— *alba* Colla. I. 927. no. 25. V. 602. no. 19.
— *alba* Willd. I. 912 no. 266.
— albida Delile. I. 913. no. 273.
β. Senegalensis.
— *albida* Lindl. I. 909. no. 234.
— *alliacea* Hamilt. I. 917. no. 305.
— *amara* Willd. I. 925. no. 5. V. 597. no. 16.
— ambigua Vogel. I. 919. no. 326.
— amblygona Cunn. I. 889. no. 35.
— amentacea DC. I. 913. no. 271.
— *amoena* Sieb. I. 897. no. 112.
— amoena Wendl. I. 897. no. 113.
— *anceps* A. Cunn. I. 901. no. 160.
— anceps DC. I. 894. no. 82.
— *angulata* Desv. I. 907. no. 213. β.
— angulosa Bertol. I. 922. no. 382.
— *angustifolia* Lodd. I. 902. no. 168.
— angustifolia Wendl. *I. 895. no. 96.
— apiculata Meisn. V. 590. no. 16.
— *Arabica* Guill. et Perr. I. 911. no. 255. α.
— *Arabica* Rxb. I. 911. no. 255. δ.
— Arabica Willd. I. 911. no. 255.
δ. Indica.
β. Kraussiana.
γ. Nilotica Delile.
α. tomentosa.
— *Arar* Ham. I. 917 no. 305.
— arborea Bth. *I. 921. no. 353.
— *arborea* Bth. V. 594. no. 4.
— *arborea* Willd. V. 613. no. 26.
— arcuata Dcne. I. 923. no. 389.
— *arcuata* Sieb. I. 901. no. 154.
— arenosa Willd. *I. 920. no. 345.
— arida Bth. I. 902. no. 164.
— armata R. Br. I. 887. no. 19.
β. angustifolia.
γ. microphylla.
δ. ornithophora.
— *armatoides* Hortul. I. 888. no. 20. δ.
— *Aroma* Gill. I. 909. no. 233.
— *aromatica* Poepp. I. 909. no. 237.
— *arrophula* Don. I. 917. no. 306.
— asparagoides Cunn. I. 891. no. 52.
— aspera Lindl. I. 898. no. 130.
— *asplenioides* N. ab E. I. 927. no. 29. V. 605. no. 42.
— ataxacantha DC. I. 915. no. 289.
— *atomiphylla* Burch. I. 910. no. 245.
Acacia atramentaria Bth. I. 909. no. 235.
— Aucheri Bth. I. 911. no. 252.
— aulacocarpa Cunn. I. 904. no. 192.
— aureonitens Bth. I. 887. no. 15.
— auriculaeformis Cunn. I. 904. no. 186.
— aurita Schlchtd. I. 921. no. 365.
— *aurita* Schlchtdl. V. 594. no. 3.
— axillaris Bth. I. 892. no. 61.
— *Balbisii* Spr. V. 620. no. 67.
— barbinervis Bth. I. 887. no. 14.
— Baueri Bth. I. 893. no. 73.
— Baxteri Bth. I. 887. no. 16.
— *bella* Mart. V. 607. no. 54.
— Benthamii Meisn. V. 589. no. 9.
— Berlandieri Bth. I. 919. 325.
— *Berteriana* DC. V. 620. no 67.
— *biceps* Willd. I. 884. no. 1. V. 586. no. 1.
— bidentata Bth. I. 890. no. 38.
— biflora R. Br. I. 889. no. 29. V. 593. †
— binervata DC. I. 905. no. 197.
— bivenosa DC. I. 896. no. 110.
— Bonariensis Gill. I. 915. no. 293.
— Bonplandii Gill. I. 874. no. 101.
— bossiacoides Cunn. I. 886. no. 3.
— brachybotrya Bth. I. 894. no. 84.
— brachyptera Bth. I. 886. no. 9.
— *brevifolia* Lindl. I. 895. no. 91.
— brevipes Cunn. I. 901. no. 155.
— Brownei Steud. I. 891. no. 53.
— bruniades A. Cunn. I. 893. no. 74.
— buxifolia Cunn. I. 898. no. 122.
— caduca H. B. *I. 920. no. 344.
— caesia Wght. et Arn. I. 917. no. 305.
— Caffra Willd. I. 914. no. 285.
β. Namaquensis Eckl. et Zeyh.
— calamifolia Sweet. I. 892. no. 67.
— Caleyi A. Cunn. I. 894. no. 86.
— *callistemon* Schlchtd. V. 608. no. 58.
— callosa Bertol. I. 922. no. 380.
— calyculata Cunn. I. 905. no. 193.
— Campbelii Arnott. I. 923. no. 391.
— *canescens* Grah. I. 917. no. 306. γ.
— canescens Martens et Galeotti. V. 592. no. 33.
— Capensis Colla. I. 923. no. 392.
— *Caracasana* Willd. I. 927. no. 26. V. 602. no. 19.
— *carbonaria* Schlchtdl. I. 920. no. 330.
— cardiophylla Cunn. I. 907. no. 215.
— *Cassia* Wall. I. 917. no. 306. γ.
— Catechu Willd. I. 914. no. 286.
— catechuoides Bth. I. 914. no. 287.
— Cavenia Hook. et Arn. I. 909. no. 237.
— chlorantha Zuccar. I. 922. no. 383.
— choriophylla Bth. I. 909. no. 239.
— chrysobotrys Meisn. II. 906. no. 4.

Acacia chrysostachys Sweet. I. 861. no. 2. V. 580. no. 2.
— *Chundra* Willd. I. 915. no. 288.
— celastrifolia Bth. 895. no. 92.
— *ciliata* R. Br. I. 908. no. 222.
— *cinerascens* Sieb. I. 903. no. 179.
— Clauseni Bth. I. 918. no. 312.
— *clavigera* E. Mey. I. 912. no 265.
— cochlearis Wendl. I. 890. no. 41.
— cochliacantha Bonpl. *I. 909. no. 238.
— *Collacana* Prsl. I. 927. no. 25.
— *Colleana* Portl. V. 602. no. 19.
— colletioides Bth. I. 890. no. 46.
— *colubrina* Mart. I. 860. no. 24.
— complanata A. Cunn. I. 901. no. 160.
— *compressa* Barron. I. 901. no. 160.
— concinna DC. I. 916. no. 299.
— conferta Cunn. I. 893. no. 76.
— congesta Bth. I. 887. no. 18.
— contorta DC. *I. 920. no. 349.
— *Cooleyi* Eaton. I. 864. no. 6.
— *cordifolia* Hortul. I. 889. no. 31.
— coriacea DC. I. 900. no. 150.
— coronillaefolia Desf. I. 911. no. 257.
— costata Bth. I. 891. no. 56.
— crassicarpa Cunn. I. 905. no. 194.
— crassistipula Bth. I. 887. no. 12.
— crassiuscula Wendl. I. 897. no. 115.
β. adunca.
— cultriformis A. Cunn. I. 894. no. 88.
— Cumingii Bth. I. 920. no. 335.
— cuneata Bth. I. 889. no. 32.
— *Cunnighamii* G. Don. I. 890. no. 43.
— Cunninghamii Hook. I. 903. no. 180.
— cuspidata Cunn. I. 891. no. 51.
— cuspidata Schlchtd. I. 920. no. 337.
— cyanophylla Lindl. I. 896. no. 101.
— Cyclopis A. Cunn. I. 901. no. 153.
— *cyclosperma* DC. I. 925. no. 17. V. 595. no. 1.
— cycnorum Bth. I. 908. no. 227.
— cylindriflora Mart. et Galeotti. V. 591. no. 24.
— dasyphylla Cunn. I. 898. no. 125.
— *dealbata* Cunn. I. 895. no. 90.
— dealbata Lindl. I. 907. no. 214.
— decipiens R. Br. I. 888. no. 27.
δ. elongata.
γ. incrassata.
β. praemorsa.
— decora Rchb. I. 898. no. 121.
— decurrens Willd. I. 907. no. 212.
β. mollissina Lindl.
— delibrata Cunn. I. 903. no. 177.
— deltoidea A. Cunn. I. 889. no. 37.
β. pungens Bth. I. 890. no. 37.
Acacia densifolia Bth. I. 898. no. 129.
— dentifera Bth. I. 899. no. 139. II. 906. †
— denudata Lehm. V. 591. no. 20.
β. graçilis.
γ. spinossissima.
— dependens Cunn. I. 902. no. 171.
— desmostachya Bth. I. 921. no. 354.
— *desmostachya* Bth. V. 591. no. 6.
— detinens Burch. I. 913. no. 278.
— diffusa Lindl. I. 891. no. 50.
— dimidiata Bth. I. 906. no. 202.
— diptera Bth. I. 886. no. 6.
β. erioptera I. 886. no. 6. II. 906. †.
— discolor Willd. I. 906. no. 210.
β. Fraseri.
— dissitiflora Bth. I. 902. no. 169.
— distachya DC. *I. 920. no. 342.
— divaricata Willd. *I. 921. no. 352.
— *divaricata* Willd. V. 594. no. 9.
— divergens Bth. I. 888. no. 28.
— *diversifolia* Schlchtd. I. 884. no. 3.
— dodonaeaefolia Willd. I. 899. no. 135.
— dolabriformis Wendl. *I. 886. no. 7.
— *Domingensis* Bert. I. 881. no. 178.
— doratoxylon Cunn. I. 903. no. 174.
— Drummondii Bth. I. 908. no. 228.
— *dumetorum* DC. I. 915. no. 294.
— dumetorum DC. *I. 921. no. 358.
— dysophylla Bth. I. 894. no. 80.
— eburnea Willd. I. 912. no. 260.
— *edulis* Willd. I. 909. no. 236.
— eglandulosa DC. I. 900. no. 147.
— elata Cunn. I. 906. no. 205.
— *elata* Grah. I. 926. no. 10. V. 597. no. 12.
— elegans Mart. et Galeotti. V. 592. no. 27.
— elegans Schlchtd. I. 924. no. 398.
— *elephantorrhiza* Burch. I. 861. no. 1.
— elliptica A. Cunn. I. 894. no. 83.
— elongata Sieb. I. 899. no. 140.
β. hebecephala.
— *emarginata* Wendl. I. 899. no. 136.
— Endlicheri Meisn. V. 590. no. 19.
— ephedroides Bth. I. 901. no. 162.
— ericaefolia Bth. I. 893. no. 75.
— erinacea Bth. I. 898. no. 128.
— erioloba E. Mey. I. 910. no. 241.
— erythrocephala Cunn. I. 899. no. 138
— erythropus Ten. II. 906. no. 3.
— exsudans Lindl. I. 899. no. 132.
— extensa Lindl. I. 893. no. 68.
— fagonioides Bth. I. 908. no. 223.
— falcata Willd. I. 896. no. 103.
— falciformis DC. I. 895. no. 100
β. propinqua.
— *fallax* E. Mey. I. 914. no. 285.

Acacia farinosa Lindl. I. 900. no. 145.
— Farnesiana Willd. I. 909. no. 236.
— fasciculata Guill. et Perr. I. 912. no. 263.
— fasciculata Kth. *I. 920. no. 341.
— ferox Mart. et Galeotti. V. 593. no. 34.
— ferruginea DC. I. 914. no. 282.
— filicina Willd. I. 920. no. 332.
— *filicoma* Mart. I. 859. no. 6.
— filicoma Mart. I. 923. no. 388.
β. tenuior.
— filifolia Bth. I. 901. no. 161.
— *fimbriata* Cunn. I. 898. no. 120.
— flavescens Cunn. I. 905. no. 199.
— flexicaulis Bth. I. 913. no. 272.
— flexifolia Cunn. I. 898. no. 124.
— flexuosa H. B. Kth. I. 909. no. 233.
— floribunda Willd. I. 902. no. 168.
β. latifolia.
— *formosa* Kth. I. 927. no. 21. V. 601. no. 14.
— *Fraseri* Hook. I. 894. no. 85.
— *frondosa* Willd. I. 884. no 1. V. 586. no. 1.
— *fruticosa* Mart. I. 859. no. 1.
— *fulgens* Labill. I. 925. no. 18. V. 595. no. 1.
— furcata Gill. I. 919. no. 329. (I. 924. no. 396.)
— *furcifera* Lindl. I. 887. no. 19.
— *furfuracea* G. Don. I. 895. no. 90.
— galioides Bth. I. 893. no. 71.
— genistifolia Lk. I. 890. no. 44.
— Giraffae Burch. I. 910. no. 242.
— glabrata Schlchtd. I. 920. no. 336.
— gladiiformis Cunn. I. 896. no. 108.
— *glauca* Willd. I. 884. no. 1. V. 585. no. 1.
— glaucescens Willd. I. 903. no. 179.
— glaucifolia Baumann. V. 590. no. 13.
— glomerosa Bth. I. 919. no. 321.
— gonoacantha Mart. I. 924. no. 401.
— gracilis Mart. et Galeotti. V. 592. no. 26.
— graminea Lehm. V. 588. no. 2.
— *grandiflora* Willd. V. 608. no. 58.
— grandisiliqua Bth. I. 918. no. 311.
— grandistipula Bth. I. 915. no. 291.
— *granulosa* Labill. I. 925. no. 19. V. 595. no. 2.
— *graveolens* Lodd. I. 899. no. 133.
— Guachapella H. B. Kth. *I. 920. no. 350.
— *Guianensis* Willd. I. 859. no. 3.
— gummifera Willd. I. 911. no. 256.
— Gunnii Bth. I. 889. no. 34.
β. hirsutior.
— *haematoma* Bert. I. 927. no. 20.
— *haematomma* DC. V. 603. no. 29.
— Haematoxylon Willd. I. 910. no. 245.
Acacia hakeoides A. Cunn. I. 896. no. 107.
— Hamiltonii Desv. I. 921. no. 369.
— hamulosa Bth. I. 914. no. 283.
— Hartwegi Bth. I. 920. no. 340.
— hastulata Sm. I. 889. no. 31.
— hebeclada DC. I. 911. no. 254.
— *Hemu* Willd. V. 598. no. 18.
— heteracantha Burch. I. 910. no. 244.
— heteroclita Meisn. V. 590. no. 17.
— heterophylla Willd. I. 901. no. 158.
β. latifolia.
— Hindsii Bth. I. 913. no. 269.
— hippuroides Heward. I. 893. no. 72.
— hirsuta Schlchtd. I. 920. no. 333.
— hirta Boj. *I. 922. no. 373.
— hirta Mart. et Galeotti. V. 593. no. 36.
— hirta Nutt. I. 920. no. 338.
— hirtella E. Mey. I. 912. no. 262.
— hispidissima DC. I. 908. no. 226.
— hispidula Willd. I. 894. no. 81.
— holosericea Cunn. I. 905. no. 201.
— homomalla Wendl. *I. 903. no. 181.
— Hookeri Meisn. V. 589. no. 10.
— horrida Willd. I. 912. no. 264.
— horridula Meisn. V. 589. no. 7.
— *Houstoni* Willd. I. 926. no. 3. V. 607. no. 57.
— Hügelii Bth. I. 188. no. 22.
— humifusa Cunn. I. 906. no. 203.
— *humilis* Schlchtdt. I. 927. no. 32.
— hybrida Lodd. I. 887. no. 20.
— idiomorpha Cunn. I. 888. no. 23.
— implexa Bth. I. 901. no. 156.
— *impressa* A. Cunn. I. 896. no. 105.
— *incrassata* Hook. I. 888. no. 7. γ.
— incurva Bth. I. 886. no. 10.
— insignis Mart. et Galeotti. V. 592. no. 29.
— insularum Guill. I. 923. no. 384.
— *intermedia* Cunn. I. 902. no. 168. β.
— *intertexta* Sieb. I. 903. no. 173.
— Intsia Willd. I. 916. no. 303.
— *Intsiae var.?* I. 917. no. 305.
— *intsioides* DC. I. 917. no. 305.
— inundata Mart. *I. 921. no. 367.
— *Isembergiana* Schimp. I. 925. no. 15. V. 598. no. 18.
— ixiophylla Bth. I. 900. no. 142.
— Jacquemontii Bth. I. 911. no. 251.
— *Julibrissin* Willd. I. 925. no. 7. V. 597.
— julifera Bth. I. 903. no. 176.
— juncifolia Bth. I. 892. no. 63.
— juniperina Willd. I. 891. no. 55.
— Jupunba Willd. *I. 921. no. 359.
— Kraussiana Meisn. I. 917. no. 304.
— Kunthii Dehnhardt. I. 924. no. 394.
— lacerans Bth. I. 915. no. 292.

Acacia laeta R. Br. I. 914. no. 280.
— Lahaï Steud. et Hochst. I. 913. no. 276.
— lanata Mart. u. Galeotti. V. 593. no. 37.
— *Lambertiana* Don. I. 927. no. 27. V. 602. no. 22.
— Langsdorffii Bth. I. 919. no. 324.
— lanigera Cunn. I. 890. no. 42.
— laricina Meisn. V. 588. no. 4.
— lasiocarpa Bth. I. 908. no. 225.
— latescens Bth. I. 905. no. 196.
— latifolia Bth. I. 906. no. 204.
— latipes Bth. I. 890. no. 40.
— latronum Willd. I. 913. no. 275.
— laurifolia Willd. I. 901. no. 159.
— *laxa* Willd. I. 927. no. 22.
— *laxiflora* DC. V. 616. no. 41.
— *laxifolia* Cunn. I. 890. no. 43.
— *Lebbek* Willd. *I. 925. no. 1. V. 596. no. 6.
— *lebbekioides* DC. V. 596. no. 11.
— *lebbekioides* Willd. I. 925. no. 3.
— leiophylla Bth. I. 895. no. 99.
— lenticularis Ham. I. 914. no. 281.
— *lepidota* Hook. et Arn. I. 874. no. 101. β.
— leprosa Sieb. I. 899. no. 134.
— leptocarpa A. Cunn. I. 904. no. 183.
— leptoclada Cunn. I. 907. no. 216.
— leptoneura Bth. I. 892. no. 64.
— Letrobii Meisn. V. 589. no. 8.
— Leucadendron Cunn. I. 903. no. 178.
— *leucocephala* Lk. I. 884. no. 1. V. 586. no. 1.
— leucophlaea Willd. I. 912. no. 266.
— *leucophylla* Lindl. I. 900. no. 149.
— leucophylla Lindl. II. 906. no. 2.
— ligulata A. Cunn. I. 899. no. 137.
— linarioides Bth. I. 902. no. 166.
— Lindleyi Meisn. V. 589. no. 12.
— linearis Desv. I. 921. no. 370.
— linearis Sims. I. 902. no. 167.
β. Tasmannica.
— lineata A. Cunn. I. 898. no. 126.
— linifolia Willd. I. 897. no. 119.
— longifolia Willd. I. 903. no. 173. V. 593. †
— *longissima* Wendl. I. 902. no. 167.
— *Lophantha* Willd. I. 925. no. 16. V. 595. no. 3.
— *lophanthoides* DC. I. 920. no. 330.
— loxocarpa Bth. I. 904. no. 189.
— lucens Boj. *I. 922. no. 374.
— lunata Sieb. I. 895. no. 91.
— *lutea* Leaw. I. 863. no. 6.
— lycopodiifolia A. Cunn. I. 893. no. 70.
— macracantha H. B. Kth. I. 909. no. 231.
— macracanthoides Bert. I. 909. no. 232.
— *macrocentra* Mart. I. 876. no. 116.
— macroloba Willd. *I. 921. no. 356.
Acacia *macrophylla* Bnge. V. 596. no. 6. γ.
— macrostachya Rchb. I. 915. no. 290.
— *Magdalenae* Bert. I. 927. no. 19. V. 604. no. 32.
— *malacaphylla* Steud. V. 596. no. 9.
— Mangium Willd. I. 905. no. 200.
— mannifera Schlchtd. I. 921. no. 362.
— marginata R. Br. I. 895. no. 94.
— *marginata* Hamilt. I. 925. no. 14. V. 598. no. 19.
— maritima Bth. I. 906. no. 211.
— Martii Bth. I. 918. no. 314.
— Mauroceana DC. I. 910. no. 243.
— media Mart. et Galeotti. V. 592. no. 31.
— *megaladena* Desv. I. 917. no. 306.
— Meisneri Lehm. V. 589. no. 11.
β. angustifolia.
— Melanoxylon R. Br. I. 901. no. 154.
— mellifera Bth. I. 913. no. 277.
— *metrosideriflora* Schlchtd. I. 927. no. 31. V. 608. no. 57.
— micradenia Bth. I. 918. no. 313.
— micrantha Desv. I. 922. no. 371.
— *micrantha* Dietr. I. 888. no. 20. δ.
— microbotrya Bth. I. 896. no. 104.
— *microcephala* Mefd. I. 909. no. 233.
— microneura Meisn. V. 590. no. 18.
— *microphylla* Rxb. V. 597. no. 15.
— Miersii Bth. I. 919. no. 328.
— Mirbeli Dehnhardt. I. 922. no. 377.
— Mitchelii Bth. I. 908. no. 221.
— modesta Wall. I. 914. no. 279.
— ? mollicula Mart. et Galeotti. V. 592. no. 28.
— *mollis* Wall. I. 925. no. 8. V. 598. no. 18. β.
— mollissima Willd. I. 907. no. 213.
β. angulata.
— *monacantha* Willd. I. 915. no. 294.
— montana Bth. I. 898. no. 131.
— mucronata Willd. I. 902. no. 170.
— multiflora H. B. Kth. *I. 920. no. 348.
— *multiflora* H. B. Kth. V. 620. no. 68.
— multinervia DC. I. 900. no. 146.
— *myriadenia* Guillem. V. 622. no. 1.
— myriobotrya Meisn. V. 590. no. 14.
— *myriophylla* Grah. I. 925. no. 11. V. 597. no. 15.
— myrtifolia Willd. I. 895. no. 93.
— Natalitia E. Mey. I. 912. no. 265.
— *Nellyrenza* Grah. V. 597. no. 16.
— *Nemu* Willd. I. 925. no. 6.
— neriifolia Cunn. I. 897. no. 117.
— nervosa DC. I. 887. no. 17. V. 593. †
— *neurocarpa* Cunn. I. 905. no. 201.
— nigricans R. Br. I. 907. no. 219.

Acacia nitida Willd. *I. 921. no. 360.
— *nitida* Willd. I. 931. no. 33. V. 611. no. 16.
— Nubica Bth. I. 910. no. 248.
— nudiflora Willd. I. 915. no. 296.
— obliqua Cunn. I. 890. no. 39.
—? obliquifolia Mart. et Galeotti. V. 593. no. 35.
— obovata Bth. I. 888. no. 24.
— obscura DC. fil. I. 907. no. 220.
— *obtusa* H. B. Kth. I. 909. no. 233.
— obtusata Sieb. I. 896. no. 109.
— *obtusifolia* Cunn. I. 903. no. 173.
— *odoratissima* Willd. V. 596. no. 10.
— officinalis Dehnhardt. I. 923. no. 386.
— oleaefolia A. Cunn. I. 894. no. 90.
— omalophylla A. Cunn. I. 900. no. 148.
— oncinocarpa Bth. I. 904. no. 190.
— oncinophylla Bth. I. 902. no. 165.
— *ornithophora* Sweet. I. 887. no. 19. δ.
— ovoidea Bth. I. 891. no. 57.
— Oxycedrus Sieb. I. 892. no. 59. V. 593. †
— oxyphylla Grah. I. 916. no. 300.
— paniculata Willd. *I. 918. no. 315.
— paniculiflora Steudel. V. 591. no. 25.
— *papulaeformis* Cunn. I. 898. no. 122.
— *paradoxa* DC. I. 887. no. 19. β.
— parvifolia Willd. *I. 920. no. 347.
— *parvifolia* Willd. V. 621. no. 76.
— pedicellata Bth. I. 919. no. 327.
— *pedunculata* Willd. I. 909. no. 236.
— pellacantha Vogel. I. 908. no. 230.
— pendula A. Cunn. I. 900. no. 149.
— penicillifera Lag. *I. 920. no. 334.
— pennata Willd. I. 917. no. 306.
β. Drégeana.
γ. Heyneana.
— pennatula Bth. I. 908. no. 229.
— penninervis Sieb. I. 896. no. 105.
— pentadenia Lindl. I. 907. no. 218. (I. 923. no. 385.)
— *peregrina* Willd. I. 860. no. 21.
— Philippinarum Bth. I. 916. no. 302.
— piligera Cunn. I. 893. no. 78.
— *pilosa* Bertero. V. 603. no. 26.
— planifrons Wght. et Arn. I. 910. no. 249.
— platyacantha Schlchtd. I. 921. no. 364.
— platyptera Lindl. I. 886. no. 5. II. 906. † *V. 588. no. 3.
— plectocarpa Cunn. I. 903. no. 182.
— *plumosa* Lowe I. 917. no. 309.
— pluricapitata Steud. I. 917. no. 307.
— podalyriaefolia A. Cunn. I. 894. no. 85.
— *polyacantha* Willd. I. 914. no. 286.
— polybotrya Bth. I. 906. no. 209.
— polycephala DC. I. 916. no. 301.
— *polycephala* Grah. I. 917. no. 307.
Acacia polyphylla DC. I. 918. no. 320.
— polystachya A. Cunn. I. 904. no. 184.
— *Portoricensis* Willd. I. 927. no. 24. V. 601. no. 19.
— *prensans* Lowe. I. 917. no. 306.
— *procera* Willd. I. 925. no. 2. V. 596. no. 12.
— prominens Cunn. I. 897. no. 120. I. 922. no. 379.
— *prostrata* Lodd. I. 891. no. 50.
— pruinosa A. Cunn. I. 906. no. 207.
— *pruinosa* A. Cunn. V. 615. no. 38.
— *pseudotrichodes* DC. I. 884. no. 4. V. 586. no. 2.
— *psilostachya* DC. I. 859. no. 8.
— pteridifolia Bth. I. 919. no. 323.
— pubescens R. Br. I. 907. no. 217.
— pubescens Schlchtd. I. 921. no. 363.
— pugioniformis Wendl. I. 892. no. 62.
— pulchella R. Br. I. 908. no. 224. V. 593. †
— pulcherrima Willd. *I. 921. no. 357.
— pulverulenta A. Cunn. I. 892. no. 66.
— *pulverulenta* Schlchtd. I. 884. no. 2.
— pycnantha Bth. I. 895. no. 98.
— pyrifolia DC. I. 888. no. 26.
— *quadrangularis* Lk. I. 927. no. 28. V. 601. no. 18.
— quadriglandulosa Mart. I. 924. no. 397.
— *quadrilateralis* DC. I. 892. no. 62.
— Raddiana Savi. I. 924. no. 393.
— ramosissima Bth. I. 897. no. 116.
— recurva Bth. I. 918. no. 317.
— restiacea Bth. I. 886. no. 1.
— *reticulata* Willd. I. 910. no. 242.
— retinervis Bth. I. 905. no. 195.
— *revoluta* Kth. I. 881. no. 179.
— Riceana Henslow. I. 892. no. 60.
— rigens Cunn. I. 892. no. 65.
β. humilis.
— rigidula Bth. I. 913. no. 270.
— robusta Burch. I. 911. no. 258.
— *Rohriana* DC. I. 916. no. 296. V. 594. no. 8.
— rostellifera Bth. I. 897. no. 114.
— rostrata H. B. *I. 921. no. 355.
— *rostrata* Humb. V. 594. no. 7.
— rotundifolia Hook. II. 905. no. 1.
— Roxburghii Wght. et Arn. I. 911. no. 250.
—? rubescens Mart. et Galeotti. V. 592. no. 30.
— rubida Cunn. I. 897. no. 112.
— rufa Hsskrl. V. 593. no. 38.
— rugata Ham. I. 916. no. 298.
— *runciformis* A. Cunn. I. 898. no. 126.
— *ruscifolia* All. Cun. I. 892. no. 58. β.
— *rutaefolia* Hort. II. 906. no. 4.
— *rutaefolia* Lk. I. 907. no. 219.
— saccharata Bth. I. 913. no. 274.
— salicina Lindl. I. 896. no. 106.

Acacia saligna Wendl. *I. 896. no. 102.
— *sapindoides* A. Cunn. V. 615. no. 38.
— scandens Willd. I. 917. no. 309.
β. laxa.
— scapuliformis A. Cunn. I. 894. no. 89.
— schinoides Bth. I. 906. no. 206.
— scleroxyla Lindl. I. 900. no. 144.
— sclerophylla Tuss. I. 915 no. 295.
— selenicarpa Desv. I. 922. no. 372.
— semiverticillata Knowles et Westc. I. 922. no. 375.
— sericata Cunn. I. 905. no. 198.
— sericea Mart. et Galleotti. V. 591. no. 22.
— *sericocephala* Fnzl. V. 597. no. 17.
— Serra Bth. I. 918. no. 316.
— sertiformis Cunn. I. 893. no. 77.
— sessilis Bth. I. 890. no. 48.
— *setigera* Hook. I. 892. no. 60.
— setosa Dehnhardt. I. 924. no. 400.
— Seyal Delile. I. 912. no. 261.
— Shuttleworthii Meisn. V. 588. no. 5.
— siculaeformis Cunn. I. 891. no. 49.
β. bossiaeoides.
— Sieberiana DC. I. 910. no. 247.
— Sieberiana Scheele. V. 591. no. 21.
— Simsii Cunn. I. 901. no. 157.
— smilacifolia Gardn. V. 589. no. 6.
— *Smithiana* Wall. I. 925. no. 13. V. 598. no. 19.
— Sophorae R. Br. I. 903. no. 172.
— spadicigera Cham. et Schlchtd. I. 912. no. 268.
— spathulata Tausch. I. 922. no. 376.
— *speciosa* Willd. I. 925. no. 4. V. 596. no. 6.
— spectabilis Bth. II. 906. †
— spectabilis Cunn. I. 905. no. 208. V. 593. †
— sphacelata Bth. I. 891. no. 54.
— sphaerocephala Cham. et Schlchtd. I. 912. no. 267.
— spinescens Bth. I. 886. no. 2.
— *spini* Balb. I. 915. no. 294.
— spirorbis Labill. I. 904. no. 185.
— *Sprengelii* Hook. et Arn. I. 874. no. 99.
— squamata Lindl. I. 893. no. 69.
— *squarrosa* Mart. V. 604. no. 32.
— stellata Willd. *I. 920. no. 343.
— stenophylla Cunn. I. 900. no. 151.
— stenoptera Bth. I. 886. no. 8.
— stenostachya Desv. I. 921. no. 368.
— *stenostachya* Desv. I. 930. no. 27.
— *Stephaniana* M. Bieb. V. 582. no. 2.
— stigmatophylla Cunn. I. 901 no. 188.
— stipellata Schlchtd. I. 924. no. 399.
— *stipulata* DC. I. 925. no. 9. V. 598. no. 19.
— *stolonifera* Burch. I. 911. no. 254.
— striata H. B. Kth. *I. 919. no. 322.
Acacia striatula Bth. I. 890. no. 47.
— stricta Willd. I. 899. no. 136.
— *strigosa* Lindl. I. 898. no. 129.
— strigosa Lk. I. 908. no. 222.
— *strombulifera* Willd. I. 862. no. 21.
— suaveolens Willd. I. 895. no. 95.
— subbinervia Meisn. V. 590 no. 15.
— subcoerulea Lindl. I. 895. no. 97.
— subdimidiata Splitgerber. V. 592. no. 32.
— *subdimidiata* Splitgerber. V. 620. no. 68.
— suberosa Cunn. I. 911. no. 253.
— *subinermis* Bert. I. 909. no. 233.
— sublanata Bth. I. 889. no. 36.
— *subtilifolia* H. B. Kth. I. 859. no. 11.
— subulata Bonpl. I. 897. no. 118.
— sulcata R. Br. I. 890. no. 45.
— Sundra DC. I. 915. no. 288.
— tamarindifolia Willd. I. 917. no. 308.
— *tamariscina* Willd. V. 581. no. 1.
— taxifolia Lodd. I. 892. no. 59.
— tenuiflora Willd. *I. 921. no. 361.
— teretifolia Bth. I. 887. no. 13.
— *tetragona* Willd. I. 926. no. 7. V. 601. no. 18.
— tetragonocarpa Meisn. V. 588. no. 1.
— Texensis Torr. et Gr. I. 920. no. 339.
— tomentella I. Zp. I. 923. no. 390.
— tomentosa Willd. I. 912. no. 259.
— tortuosa Willd. I. 909. no. 234.
— translucens A. Cunn. I. 900. no. 143.
β. humilis.
γ. oblonga.
— triangularis Bth. I. 889. no. 30.
— *trichandra* Zucc. I. 884. no. 3.
— *trichodes* Willd I. 884. no. 4. V. 586. no. 2.
— *trigona* Alph. DC. I. 895. no. 94.
— trinervata Sieb. I. 890. no. 43.
— triptera Bth. I. 887. no. 11.
— triquetra Bth. I. 898. no. 123.
— *trisperma* Mart. I. 859. no. 13.
— tristis Grah. I. 888. no. 21.
— tubulifera Bth. I. 819. no. 318.
— umbellata A. Cunn. I. 904. no. 191.
— umbellulifera Kth. *I. 920. no. 331.
— *umbrosa* Cunn. I. 905. no. 197.
— *uncinata* Lindl. I. 894. no. 79.
— uncinata Lindl. I. 922. no. 378.
— undulaefolia A. Cunn. I. 891. no. 79.
— *undulata* Willd. I. 887. no. 19. β.
— *ungulata* Desv. I. 927. no. 23. V. 602. no. 19.
— *uniglandulosa* Seemann et Schmidt. V. 588. no. 3.
— urophylla Bth. I. 888. no. 25.
— vaga Willd. *I. 921. no. 351.
— velutina Bertol. I. 922. no. 381.

Acacia velutina DC. I. 915. no. 294.
— venulosa Bth. I. 900. no. 152.
— *vera* Willd. I. 911. no. 255. γ.
— Verek Guill. et Perr. I. 914. no. 284.
— verniciflua A. Cunn. I. 899. no. 133.
— verticillata Willd. I. 891. no. 58.
β. latifolia DC. I. 892. no. 58.
— *vespertina* Mcfd. I. 927. no. 33. V. 602. no. 19.
— vestita Ker. I. 894. no. 87. V. 593. †
— villosa Willd. I. 919. no. 330.
— *viridiflora* Kth. 859. no. 12.
— *viridiflora* Tweedie. V. 601. no. 15.
— *virgata* Lodd. I. 899. no. 133.
— *virgultosa* Vahl. I. 929. no. 11.
— viscidula Bth. I. 900. no. 141.
— *viscosa* Wendl. I. 899. no. 135.
— *visneoides* Colla. I. 901. no. 160.
— vomeriformis Cunn. I. 889. no. 33.
— *Wallichiana* DC. I. 914. no. 286.
— Westiana DC. I. 918. no. 319.
c. var. β. γ. et δ. ibid.
— Wickhami Bth. I. 904. no. 187.
— *Wightii* Grah. I. 925. no. 12. V. 597. no. 16.
— xanthina Bth. I. 897. no. 111.
— xylocarpa A. Cunn. I. 902. no. 163.
— *xylocarpa* Willd. I. 884. no. 1. V. 587. no. 1.
Acacieae Bth. I. 884. II. 905. V. 587.
Acaena Vahl. II. 43. V. 655.
— *aculeata* Meyen. V. 655. no. 1.
— alpina Poepp. V. 655. no. 3.
— *andicola* Gill. II. 43. no. 1.
— ascendens Vahl. *II. 43. no. 9. *V. 655. no. 1.
— caespitosa Gill. II. 43. no. 5.
— cuneata Hook. et Arn. II. 43. no. 6.
— Eupatoria Cham. et Schlchtd. II. 43. no. 8.
— *Grahamiana* Gill. II. 43. no. 9.
— *incisa* Lindl. II. 43. no. 1.
— integerrima Gill. II. 43. no. 4.
— macrocephala Poepp. II. 43. no. 2.
— *macrocephala* Poepp. V. 655. no. 1.
— myriophylla Lindl. II. 43. no. 7. *V. 655. no. 1.
— *pinnatifida* Lindl. II. 43. no. 10.
— pinnatifida Rz. et Pav. *II. 43. no. 1.
— splendens Hook. et Arn. II. 43. no. 3.
— *stellaris* Meyen. V. 655. no. 2.
— trifida Rz. et Pav. *II. 43. no. 10.
Acanthobotrya Eckl. et Zeyh. I. 607.
— *angustifolia* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 9.
— *armata* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 14.
— *cinerea* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 13.
— *decumbens* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 16. V. 453. no. 1.
— *disticha* Eckl. et Zeyh. I. 608. no. 6.
Acanthobotrya pungens Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 11.
— *sericea* Eckl. et Zeyh. V. 453. no. 3.
— *sessilifolia* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 15. I. 608. no. 4. V. 454. no. 8.
Acanthocarpae Bth. (Mimosae sectio *Ameria.*) I. 881. V. 585. no. 7.
Acanthocephaleae Ldb. VI. 275.
Acanthocephalus Karel. et Kiril. II. 666. VI. 327.
Acanthocephalus Kar. et Kiril. °VI. 275.
— *amplexifolius* Kar. et Kiril. II. 666. no. 1.
— amplexifolius Kar. et Kiril. *VI. 275. no. 1.
Acantholepis Lssng. *II. 667.
Acanthonychia DC. I. 261.
Acanthophora (Solanum) Dunal. III. 85.
Acanthophyllum C. A. Mey. I. 282. II. 785.
— bracteatum Boiss. II. 786. no. 6.
— caespitosum Boiss. II. 785. no. 3.
— crassifolium Boiss. II. 785. no. 4.
— Fontanesii Boiss. II. 785. no. 2.
— microcephalum Boiss. II. 785. no. 5.
— *mucronatum* Fzl. II. 785. no. 1.
— mucronatum C. A. Mey. I. 282. no. 1.
— spinosum C. A. Mey. I. 282. no. 2.
— Tournefortii Fzl. II. 785. no. 1.
— versicolor Fisch. et Mey. I. 282. no. 3.
Acanthophyton Lssng. *II. 684.
Acanthoprasium Bth. III. 865.
Acanthospartum (Genista) Spach. V. 465.
Acanthospermum Schrank. *II. 606.
Acanthotheca DC. *II. 637.
Accorombona Endl. I. 672.
— tricolor Bth. *I. 672. no. 1.
Acer Mnch. I. 408.
— acuminatum Wall. I. 409. no. 9.
— affine Hffmsegg. I. 410. no. 24.
— *barbatum* Hook. I. 409. no. 19.
— *Buzimbala* Hamilt. I. 409. no. 10.
— campestre L. I. 410. †
— *Carolinianum* Walt. I. 409. no. 21.
— caudatum Wall. I. 409. no. 13.
— circinnatum Prsh. I. 410. †
— *coccineum* Michx. I. 409. no. 21.
— coriaceum Bosc. I. 409. no. 22.
— *Creticum* L. I. 408. no. 5.
— cultratum Wall. I. 409. 14
— glabrum Torr. I. 409. no. 17.
— *glaucum* Prsh. I. 409. uo. 21.
— *Granatense* Boiss. I. 408. no. 1.
— grandidentatum Nutt. I. 409. no. 19.
— Hyrcanum Fisch. et Mey. I. 408. no. 6.
— laetum C. A. Mey. 408. no. 7.
— laevigatum Wall. I. 409. no. 11.
— laurifolium D. Don. I. 409. no. 10.
— Lobelii Ten. I. 408. no. 3. et var. β ibid.
— macrophyllum Prsh. I. 410. †

Acer Marucum Guss. I. 408. no. 4.
— Monspessulanum L. I. 410. †
— neglectum Hffmsgg. I. 410. no. 23.
— *nigrum* Michx. I. 409. no. 20.
— *oblongum* Wall. I. 409. no. 10.
— oblongum Wall. I. 410. †
— opulifolium Vill. *I. 408. no. 1.
β. Granatense Boiss.
— Opulus Ait. I. 410. †
β. obtusatum Kit. I. 410. †
— *pectinatum* Wall. I. 409. no. 13.
— Pennsylvanicum L. *I. 409. 16.
— platanoides L. I. 410. †
— Pseudo-plantanus L. I. 410. †
— rubrum L. *I. 409. no. 21.
— *rubrum* var. Prsh. 409. no. 21.
— saccharium L. *I. 409. no. 20.
β. nigrum.
— *sanguineum* Spach. I. 409. no. 21.
— *scandens minus Apocyni facie, folio subrotundo* Sloane. V. 214. no. 30.
— *scandens minus Apocyni folio* Sloane. V. 219. no. 45.
— *sempervirens* L. I. 408. no. 5.
— sempervirens Tausch. I. 408. no. 5.
δ. nanum.
γ. obtusifolium.
— sterculiaceum Wall. I. 409. no. 12.
— *striatum* Lam. I. 409. no. 16.
— suberosum Dumort. I. 408. no. 2.
— Tataricum L. I. 410. †
— tripartitum Nutt. I. 409. no. 18.
— truncatum Bge. I. 408. no. 8.
— villosum Wall. I. 409. no. 15.
Aceranthus Morr. et Dcne. I. 101.
— diphyllus Morr. et Dcne. I. 101. no. 1.
Acerates Ell. *VI. 483.
ACERINEAE DC. I. 408.
Acetosellae (Oxalis) DC. I. 478.
Achaetostephia Endl. II. 546.
Acharia Thbg. II. 222.
— tragodes Thbg. *II. 222. no. 1.
Achetaria Cham. III. 284. °III. 961.
Achaetaria Wlprs. VI. 642.
— Sprengelii Chamisso. III. 284. no. 1.
Achillea Neck. II. 634. II. 991. VI. 190.
— *arborea* Hornem. VI. 211. no. 1.
— Aucheri Boiss. VI. 190. no. 3.
— callichroa Boiss. VI. 191. no. 4.
— Fraasii C. H. Schultz. II. 991. no. 1.
— *Mongholica* Spr. VI. 190. no. 1.
— Pannonica Scheele. VI. 190. no. 1.
— peucedanifolia Griseb. VI. 190. no. 2.
— *Sibirica* Ldb. VI. 190. no. 1.
— trichophylla Schrenk. II. 634. no. 1.
Achimenes P. Br. II. 643. et 719. VI. 400.
Achimenes Vahl. III. 296.
— argyrostigma Hook. VI. 400. no. 3.
— *atrosanguinea* Morren. VI. 737.
— *cornifera* DC. VI. 403. no. 6.
— cornifera DC. *II. 719. no. 4.
— divaricata Poepp. et Endl. II. 719. no. 10.
— *divaricata* Wlprs. VI. 403. no. 12.
— *erinoides* DC. VI. 403. no. 5.
— foliosa Morren. VI. 737.
— grandiflora DC. II. 993. no. 1 VI. 400. †
— hirsuta Lindl. II. 993. no. 2. VI. 400. †
— longiflora DC. II. 720. † VI. 400.
— *maculata* Mart. et Galeotti. II. 719. no. 2.
— maculata Poepp. et Endl. II. 719. no. 3.
— *maculata* Wlprs. VI. 403. no. 7.
— Martensiana Wlprs. II. 719. no. 2.
— mollis Poepp. et Endl. *II. 719. no. 7.
— *mollis* Wlprs. VI. 403. no. 10.
— multiflora Gardn. II. 719. no. 11. VI. 400. †
— pedunculata Bth. II. 720. † VI. 400. no. 1.
— picta Bth. VI. 400. no. 2.
— rosea Lindl. II. 719. no. 1.
— rupestris Gardn. II. 720. no. 12.
— scabra Poepp. et Endl. II. 719. no. 5.
— *scabra* Wlprs. VI. 403. no. 8.
— *sesamoides* Vahl. III. 296. no. 3.
— tenerrima Poepp. et Endl. II. 719. no. 8.
— *tenerrima* Wlprs. VI. 403. no. 11.
— urticaefolia Poepp. et Endl. II. 719. no. 6.
— *urticaefolia* Wlprs. VI. 403. no. 9.
Achlys DC. I. 100.
— triphylla DC. *I. 100. no. 1.
Achras ferruginea Casaretto. VI. 455. no. 1.
Achyrachaena Schauer *II. 625. VI. 175.
— mollis Schauer *VI. 175. no. 1.
Achyracharna cf. Achyrachaena.
Achyraca Torr. et Gr. II. 960.
Achyrideae DC. II. 585. 951. 958. VI. 127.
Achyrobacchariдeae C. H. Schultz. II. 955.
Achyrobaccharis C. H. Schultz. *II. 952. no 3. *II. 955. no. 1.
Achyrocline DC. VI. 244. *II. 646.
— madioides Meyen et Wlprs. VI. 244. no. 2.
— mollis Bth. VI. 244. no. 3.
— saturejoides DC. *VI. 244. no. 1.
β. remotifolia Wlprs.
Achyronia Wendl. *I. 580.
Achyropappus H. B. Kth. *II. 625.
Achyrophorus Scop. *II. 688. *VI. 328.
— *ambiguus* DC. VI. 338. no. 1.
— Andinus DC. VI. 930. no. 5.
— apargioides DC. VI. 335. no. 19.
— *arenarius* Hook. fil. VI. 335. no. 19.
— *aurantiacus* DC. VI. 333. no. 12.
— *Balbisii* Hornem. VI. 340. no. 4.

Achyrophorus Balbisii Hort. VI. 340. no. 4.
— Brasiliensis Gardn. VI. 336. no. 24.
— Brasiliensis C. H. Schultz. VI. 331. no. 9.
— Chilensis C. H. Schultz. VI. 330. no. 8.
— chrysanthus DC. VI. 333. no. 13.
— ciliatus C. H. Schultz. VI. 336. no. 21.
— coronopifolius C. H. Schultz. VI. 334. no. 18.
— *fere glaber Bellidis glauco dentatoque folio* Vaill. VI. 342. no. 1.
— *graminifolius* C. H. Schultz. VI. 333. no. 14.
— grandiflorus C. H. Schultz. VI. 332. no. 12.
— *Helveticus* Hornem. VI. 332. no. 11.
— *hirsutus Bellidis obtuso folio* Vaill. VI. 343. no. 1.
— *hispidus* Hornem. VI. 338. no. 1.
— hispidus Hornem. VI. 330. no. 7.
— incanus C. H. Schultz. VI. 330. no. 4.
— Jussieui C. H. Schultz. VI. 320. no. 1.
— Lessingii C. H. Schultz. VI. 329. no. 3.
— maculatus Scopol. VI. 331. no. 10.
— Meyenianus Wlprs. VI. 336. no. 23.
— *minimus* Hornem. VI. 340. no. 3.
— odoratus Wlprs. VI. 336. no. 25.
— *oxyodontus* DC. VI. 338. no. 1
— petiolaris DC. VI. 334. no. 17.
— *pinnatifidus* DC. VI. 330. no. 6.
— *praemorsus* B. Webb. VI. 329. no. 2.
— Quitensis C. H. Schultz. VI. 334. no. 16.
— *radicatus* Scop. II. 687. no. 2. VI. 342. no. 7.
— Robertia C. H. Schultz. VI. 335. no. 20.
— *Scorzonerae* DC. VI. 333. no. 13. *α.*
β. glabratus DC. l. c. *β.*
γ. ramosus DC. l. c. *γ.*
— *serioloides* DC. VI. 338. no. 1.
— *sessiliflorus* DC. VI. 334. no. 16.
— *sonchoides* DC. VI. 334. no. 16.
— taraxacifolius C. H. Schultz. VI. 330. no. 6.
— taraxacoides Wlprs. VI. 336. no. 22.
— tenuifolius DC. VI. 333. no. 14.
— uniflorus Blff. et Fingerhut. VI. 332. no. 11.
— variegatus C. H. Schultz. VI. 334. no. 15.
— Webbii C. H. Schultz. VI. 329. no. 2.
Achyroseris C. H. Schultz. °VI. 346.
— macrosperma C. H. Schultz. *VI. 346. no. 1.
Achyrospermum Blume. III. 895. °III. 990.
— densiflorum Blume. III. 895. no. 1.
— fruticosum Bth. III. 895. no. 3.
— phlomoides Blume. III. 895. no. 2.
Acicarpha Juss. *II. 537.
Acinos Mnch. III. 729.
— *Alpinus* Moench. III. 730. no. 11.
— *canus* Reichb. III. 730. no. 12.
Acinos diffusus Bnningh. III. 730. no. 11.
— *graveolens* Link. III. 730. no. 12.
— *incanus* Griseb. III. 727. no. 1.
— *Patavinus* Pers. III. 729. no. 9.
— *purpurascens* Pers. III. 730. no. 13.
— *rotundifolius* Frivaldsky. III. 730. no. 11. *β.*
— *rotundifolius* Pers. III. 730. no. 14.
— *thymoides* Mnch. III. 729. no. 8.
— *villosus* Pers. III. 729. no. 8. *β.*
— *vulgaris* Pers. III. 729. no. 8.
Aciotis Don. *II. 137.
Aciphylla Forster. °V. 868.
— squarrosa Forst. V. *868. no. 1.
Aciphyllum Rth. I. 568.
Acisanthera R. Br. *II. 112.
Ackama A. Cunn. II. 374. V. 834.
— rosaefolia A. Cunn. *II. 374. no. 1. V. 834. no. 1.
Acleia DC. *II. 653.
Acmadenia Bartl. et Wendl. I. 509. V. 391.
— juniperina Bartl. et Wendl. *I. 509. no. 1.
— laevigata Bartl. et Wendl. *I. 509. no. 3.
— obtusata Bartl. et Wendl. *I. 509. no. 2.
— rosmarinifolia Bartl. V. 391. 1.
Acmanthera Adr. Juss. V. 181.
Acmella DC. II. 621.
— ? *occidentalis* Nutt. II. 987. no. 1.
Acmena DC. II. 181.
— acuminata Wght. II. 181. no. 3.
— bracteolata Wght. II. 181. no. 9.
— claviflora Wght. II. 181. no. 1.
— grata Wght. II. 181. no. 7.
— lanceolata Wght. *II. 181. no. 5.
— leptantha Wght. II. 181. no. 2.
— oblata Wght. II. 181. no. 8.
— parviflora DC. *II. 181. no. 6.
— Wightiana Wght. II. 181. no. 4.
— *Zeylanica* Wght. II. 181. no. 6.
Acmonich VI. 64. no. 3.
Acnistus Schott. III. 112. °III. 955. °VI. 619.
— *aggregatus* Miers. VI. 619. no. 1.
— arborescens Schlchtd. III. 112. no. 1.
— *arborescens* Schlchtd. VI. 619. no. 1.
— *Benthami* Miers. VI. 619. no. 1.
— breviflorus Sendtner. VI. 619. no. 4.
β. glabratus.
γ. spinescens.
— *cauliflorus* Schott. III. 112. no. 1.
— cauliflorus Schott. *VI. 619. no. 1.
— cestroides Miers. *VI. 619. no. 3.
— ellipticus Hook. fil. VI. 620. no. 7.
— floribundus G. Don. III. 112. no. 3.
— grandiflorus Miers. *VI. 620. no. 8.
— Guayaquilensis G. Don. III. 112. no. 2.
— Plumieri Miers. VI. 619. no. 5.

Acnistus ramiflorus Miers. VI. 620. no. 6.
— sideroxyloides G. Don. III. 113. no. 5.
— spathulatus G. Don. III. 113. no. 4.
— umbellatus Miers. *VI. 619. no. 2.
Acoma Bth. °VI. 170.
— dissecta Bth. *VI. 170. no. 1.
Aconitum Tournef. I. 57. II. 745. V. 7.
— achranthum C. A. Meyer. I. 57. no. 1.
— acuminatum Rchb. I. 58. †
— acutum Rchb. I. 59. †
— angustifolium Bernh. I. 59. †
— Anthora L. 58. †
β. velutinum et γ. Jacquinianum I. 59. †
— *atrox* Wall. I. 57. no. 9.
— autumnale Clusius. I. 59. †
— barbatum Patrin. I. 58. †
— Bernhardianum Rchb. I. 59. †
— callibotryon Rchb. I. 59. †
— Cammarum Jcq. β. gracile. γ. Judenbergense. δ. macranthum. I. 58. †
— Chinense Sieb. I. 58. † *V. 7. no. 1.
— cernuum Wulf. cum var. β. rubella. I. 58. †
— Columbianum Nutt. I. 58. no. 14.
— cordatum Royle. I. 57. no. 6.
— *delphinifolium var. Americanum* DC. I. 58. no. 12.
— dissectum Don. I. 58. no. 11.
— eminens Koch. I. 59. †
— exaltatum Rchb. I. 59. †
— *ferox* Wall. I. 57. no. 9.
— *Fischeri* Rchb. I. 58. no. 13
— formosum Rchb. I. 59. †
— heterophyllum Royle. I. 50. no. 7.
— hians Rchb. I. 59. †
— Koelleanum Rchb. I. 59. †
— laetum Rchb. β. rigidum. γ. Koehleri. δ. plicatum. I. 59. †
— laeve Royle. I. 57. no. 5.
— laxum Rchb. I. 59. †
— leucanthemum Wendrtb. I. 58. no. 16.
— macrorhynchum Turcz. II. 745. no. 1.
— molle Rchb. I. 58. †
— multifidum Koch. α. tenuisectum. β. latisectum. γ. microphyllum. I. 59. †
— multifidum Royle. I. 57. no. 4.
— myoctonum Rchb. cum var. lasiantha I. 58. †
— Napellus Dod. I. 59. †
— Napellus L. *I. 58. no. 12.
— nasutum Fisch. I. 58. no. 13.
— Neubergense Clus. I. 59. †
— ochroleucum Willd. I. 58. †
— ovatum Lindl. I. 57. no. 8.
— pallidum Nutt. *I. 58. no. 15.
— palmatifidum Rchb. I. 59. †
Aconitum palmatum Don. I. 58. no. 10.
— paniculatum Lam. I. 58. †
— pubescens Mnch. I. 59. †
— pyramidale Mill. I. 59. †
— Pyrenaicum L. I. 58. †
— ranunculifolium Rchb. I. 58. et †
— ranunculoides Turcz. I. 57. no. 3. *II. 745. no. 3.
— rostratum Bernh. I. 58. †
— rotundifolium Karel. et Kiril. II. 745. no. 2.
— Sczukini Turcz. I. 57. no. 2.
— speciosum Otto. I. 59. †
— Stoerkeanum Rchb. I. 59. † cum var. versicolor.
— strictum Bernh. I. 59. †
— Tauricum Wulf. I. 59. †
— thelyphorum Rchb. I. 58. †
— toxicum Rchb. I. 58. †
— variegatum L. β. album I. 58. †
— virgatum Rchb. I. 59. et †
— virosum Don. *I. 57. no. 9.
— Vulparia Rchb. cum var. α. Phtora. I. 58. †
Aconychia cf. *Acronychia*.
Acosmia Nutt. II. 979.
Acosmium Schott. *I. 809.
Acosmus pruriens Dsf. V. 349. no. 2.
Acourtia Don. *II. 683. *VI. 324.
Acranthera Arn. II. 523. VI. 77.
— Zeylanica Arn. *II. 523. no. 1. VI. 77. no. 1.
Acridocarpus Guill. et Perrottet. °V. 285.
— adenophorus Adr. Juss. V. 287. no. 7. β. porantherus.
—? Angolensis Adr. Juss. V. 288. no. 10.
—? argyrophyllus Adr. Juss. V. 290. no. 13.
— Cavanillesii Adr. Juss. V. 286. no. 3.
— excelsus Adr. Juss.. V. 288. no. 9.
— galphimiaefolius Adr. Juss. 289. no. 11.
— Guineensis Adr. Juss. V. 286. no. 4.
— Natalitius Adr. Juss. V. 287. no. 6.
— orientalis Adr. Juss. V. 277. no. 8.
— plagiopterus Guill. et Perrott. V. 285. no. 1.
— pruriens Adr. Juss. V. 289. no. 12.
— Smeathmanni Guill. et Perrott. V. 286. no. 2.
— Zanzibaricus Adr. Juss. V. 286. no. 5.
Acrocarpus Wght. et Arn. I. 855. V. 573.
— fraxinifolius Wght. et Arn. I. 855. no. 1. V. 573. no. 1.
Acrocentron DC. VI. 297.
Acrocephalus Bth. III. 497. °III. 977.
— Blumei Bth. III. 497. no. 2.
— capitatus Bth. III. 497. no. 1.

Acrocephalus villosus Bth. III. 497. no. 3.
Acrolasia Prsl. II. 223. V. 776.
— bartonioides Prsl. *II. 223. no. 1. V. 776. no. 1.
Acrolophus DC. VI. 296.
Acronodia Blume. I. 365.
— punctata Blume. I. 365. no. 1.
Acronychia Forst. I. 623. II. 825.
[*Acronychia* Forst. I. 262. no. 11. V. 75. no. 4.]
— *arborea* Blume. I. 161. no. 4.
— Baueri Schott. II. 825. no. 2.
— Cunninghami Hook. II. 825. no. 3.
— Endlicheri Schott. II. 825. no. 1.
— *laurifolia* Blume. I. 261. no. 3.
Acrophyllum venosum Bth. V. 829. no. 1.
— *venosum* Henslow. II. 373. no. 2.
— *verticillatum* Hook. V. 829. no. 1.
Acroptilion Cass. II. 676.
— *obtusifolium* Cass. II. 677. no. 1.
— *Picris* DC. II. 676. no. 1.
— Picris Jaub. et Spach. *II. 676. no. 1.
— *repens* DC. II. 676. no. 1.
— *serratum* Cass. II. 677. no. 1.
— *subdendatum* Cass. II. 677. no. 1.
Acrotome Bth. *°III. 989.
Acrotrema W. Jack. I. 65.
— Arnottianum Wght. I. 65. no. 3.
— costatum W. Jack. I. 65. no. 1.
— lanceolatum Hook. I. 65. no. 5.
— uniflorum Hook. I. 65. no. 4.
— Wightianum Wall. I. 65. no. 2.
Acrosanthes Eckl. et. Zeyh. II. 248.
— angustifolia Eckl. et Zeyh. II. 248. no. 3.
  α. dodecandra.
  β. icosandra.
— decandra Fzl. II. 248. no. 2.
— fistulosa Eckl. et Zeyh. II. 248. no. 1.
— teretifolia Eckl. et Zeyh. II. 248. no. 4. (c. varr. α. et β. ibid.)
Acrostemon Bth. *II. 729.
Acrotriche R. Br. *II. 732. VI. 429.
— Manglesii Sonder. VI. 429. no. 1.
Acrozus Spr. I. 365.
Actaea L. I. 60.
— acuminata Wall. I. 60. no. 1.
— alba Bigel. I. 60. no. 3.
— *Americana β. alba* Prsh. I. 60. no. 3.
— arguta Nutt. I. 60. no. 4.
— *brachypetala α. δ.* DC. I. 60. no. 3.
— *cordifolia* DC. I. 61. no. 2.
— gyrostachya Wndrth. I. 60. adn. no. 2.
— *Japonica* Thnbrg. V. 7. no. 1.
— *monogyna* Walt. I. 60. no. 1.
— orthostachys Wndrth. I. 60. adn. no. 1.
— *pachypoda* Ell. I. 60. no. 3.
Actaea palmata DC. I. 59. no. 1.
— *pentacarpa* Michx. I. 61. no. 4.
— *podocarpa* DC. I. 61. no. 4.
— *racemosa* L. I. 60. no. 1.
— rubra Bigel. I. 60. no. 2.
— spicata L. I. 60. †
— *spicata β. alba* Michx. I. 60. no. 3.
Actegiton Blume. I. 539.
— sarmentosum Blume. *I. 539. no. 1.
Actinanthus Ehrnbrg. *II. 391.
Actinaphoria Nutt. II. 591. II. 968. no. 3.
Actinea acaulis Spr. VI. 179. no. 2.
— *integrifolia* Torr. VI. 179. no. 4.
Actinella DC. VI. 179.
Actinella Pers. °VI. 179.
— acaulis Nutt. VI. 179. no. 2.
— glabra Nutt. VI. 179. no. 5.
— lanata Nutt. VI. 179. no. 4.
— linearifolia Torr. et Gr. VI. 180. no. 7.
— Richardsonii Nutt. VI. 179. no. 1.
— scaposa Nutt. VI. 180. no. 6.
  β. linearis.
— Torreyana Nutt. VI. 179. no. 3.
Actinobole Fnzl. °VI. 229.
—...... Fnzl. *VI. 229. no. 1.
Actinodium Schauer °V. 727.
— Cunninghami Schauer V. 727. no. 1.
— *Cunninghami* Schauer II. 153. no. 1.
Actinolema Fnzl. II. 391. V. 937. 845.
— eryngioides Fnzl. *II. 391. *II. 937. no. 1. V. 845. no. 1.
Actinolepis DC. II. 626.
— multicaulis DC. *II. 626. no. 1.
Actinomeris Nutt. II. 615. II. 982.
— alba Torr. et Gr. II. 982. no. 2.
— *alternifolia* DC. II. 982. no. 1.
— nudicaulis Nutt. *II. 615. no. 1.
— *oppositifolia* Fresen. II. 982. no. 1. β.
— squarrosa Nutt. *II. 982. no. 1.
  β. oppositifolia.
— *squarrosa var. alba* Nutt. II 982. no. 2.
Actinospermum angustifolium Torr. et Gr. II. 988. no. 1.
Actinospora Turczan. I. 60.
— Dahurica Turcz. *I. 60. no. 1.
— frigida Fisch. et Mey. I. 60. no. 2.
— *petrosperma* Turcz. I. 60. no. 1.
Actinotus Endl. V. 844. (ex p.)
Actinotus Labill. *II. 387.
— *leucocephala* Endl. V. 844. no. 1.
Acutiflorae Mart. I. 88. (Anona.)
Acutiflorae (Manulea) III. 319.
Adamia Wall. II. 377.
— cyanea Wall. *II. 377. no. 1.
— sylvatica Meisn. *II. 377. no. 2.
Adansonia L. I. 329.

Adansonia digitata L. *I. 329. no. 1.
Adelbertia Meisn. II. 118.
— calophylla Meisn. II. 118. no. 1.
Adelobotrys DC. *II. 128.
Adenachaena DC. *II. 636.
Adenandra Willd. I. 506. V. 390.
— *alba* R. et Schult. I. 507. no. 2.
— alternifolia Cham. et Schlchtd. I. 509. no. 6.
— *Bartlingiana* Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 8.
— brachyphylla Schlchtd. I. 506. no. 2.
β. pubescens Eckl. et Zeyb. l. c.
— cistoides Eckl. et Zeyh. *I. 507. no. 6.
— flaccida Eckl. et Zeyh. I. 509. no. 7.
— *fragrans* Eckl. et Zeyh. V. 391. no. 1.
— gracilis Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 11.
— humilis Eckl et Zeyh. I. 506. no. 4.
— intermedia Eckl. et Zeyh. I. 506. no. 3.
— linifolia Bartl. V. 391. no. 2.
— *marginata* Eckl. et Zeyh. V. 391. no. 2.
— mundiaefolia Eckl. et Zeyh. I. 506. no. 1.
— Mundiana Eckl. et Zeyh. I. 509. no. 8.
— muraltioides Eckl. et Zeyh. I. 509. no. 9.
— pungens Bartl. et Wendl. *I. 509. no. 4.
— rotundifolia Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 10.
— serpyllacea Bartl. V. 390. no 1.
— tetragona Bartl. et Wendl. *I. 509. no. 5.
— *tetragona* Sweet. I. 509. no. 3.
— trigona Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 7.
— uniflora Willd. *I. 507. no. 8.
β. heterophylla Schlchtd.
α. isophylla Schlchtd.
— viscida Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 9.
— Wendlandiana Eckl. et Zeyh. *I. 507.
Adenanthera L. I. 861. °V. 580.
— *aculeata* Rxb. I. 861. no. 1. V. 582. no. 1.
— chrysostachys Bth. I. 861. no. 2. V. 580. no. 2.
— falcata Linn. V. 580. no. 3.
— Pavoniana L. *I. 861. no. 1. V. 580. no. 1.
— *tetraptera* Schum. et Thonn. I. 861. no. 1. II. 581. no. 1.
Adenanthereae Bth. I. 858. V. 578.
Adenaria H. B. Kth. II. 112.
— parvifolia Hook. II 112. no. 1.
Adenilema Blume II. 375. V. 835.
— fallax Blume *II. 375. no. 1. V. 835. no. 1.
Adenium Roem. et Schult. VI. 471.
— Honghel Alph. DC. *VI. 471. no. 1.
Adenobasium laurifolium Bth. I. 352. no. 4.
— *salicifolium* Prsl. I. 352. no. 1. V. 115. no. 1.
Adenocalymna Martius. VI. 513.
— comosum A. P. DC. *VI. 513. no. 1.
Adenocarpum tuberculatum Don. II. 619. no. 1. VI. 169. no. 1.
Adenocarpus DC. I. 624. II. 838.
— Boissieri B. Webb. I. 624. no. 2.
— Cebennensis Delile I. 624. no. 3.
— Graecus Griseb. II. 839. no. 2.
— *grandiflorus* Boiss. I. 624. no. 1.
— *decorticans* Boiss. I. 624. no. no. 2.
— Telonensis DC. *I. 624. no. 1.
— villosus Boiss. II. 838. no. 1.
Adenocaulon Hook. II. 557. VI. 716.
— bicolor Hook. *II. 557. no. 1.
β. integrifolium.
— Himalaïcum Edgwrth. VI. 716. no. 1.
— *integrifolium* Nutt. II. 557. no. 1.
Adenocyclus Less. *II. 538.
Adenogramma Rchb. II. 250.
— diffusa Fnzl. II. 250. no. 2.
— galioides Fnzl. II. 250. no. 5.
β. planifolia.
— lampocarpa E. Mey. II. 250. no. 3.
— Mollugo Rchb. II. 250. no. 6.
(c. varr. α. et β. ibid.)
— physocalyx Fnzl. II. 250. no. 4.
— sylvatica Fnzl. II. 250. no. 1.
Adenogrammeae Fnzl. II. 250. V. 790.
Adenolepis Lssng. *II. 619.
Adenopappus Bth. II. 624. °VI. 173.
— persicaefolius Bth. *II. 624. no. 1. VI. 174. no. 1.
Adenophora Fisch. *II. 711. V. 387.
— coronata Alph. DC. *VI. 387. no. 1.
— *crispata* Trcz. VI. 387. no. 1. γ.
— *intermedia* Ldb. VI. 387. no. 1. β.
— *marsupiiflora* Ldb. VI. 387. no. 1.
Adenophyllae DC. (Oxalis) I. 478.
Adenophyllum Pers. *II. 623.
Adenopis cf. *Adenopsis*.
Adenopsis DC. I. 861. V. 582.
Adenosacme Wall. II. 505.
— longifolia Wall. *II. 505. no. 1.
— *Malayana* Wall. II. 505. no. 6.
Adenosepalum DC. I. 384. no. 8. II. 808. no. 21. 25. II. 809. no. 26.
Adenosma cuspidatum Bth. III. 265. no. 3.
— *macrophyllum* Bth. III. 265. no. 4.
— *villosum* Bth. III. 265. no. 3.
Adenosolen DC. *II. 642.
Adenospermum Hook. et Arn. II. 619. VI. 169.
— tuberculatum Hook. et Arn. *II. 619. no. 1. VI. 169. no. 1.
Adenostegia Bth. III. 397. °III. 971. *VI. 651.
— rigida Bth. *III. 397. no. 1.
Adenostemma Forst. *II. 546. VI. 106.
— hirtiflorum Bth. VI. 106. no. 1.
Adenostoma Blume *III. 437.
Adenostoma Hook. et Arn. II. 43. V. 655.

Adenostoma brevifolia Nutt. II. 43. no. 1. V. 655. no. 1. β.
— fasciculata Hook. et Arn. *II. 43. no. 1. V. 655. no. 1. c. varr. α. et β. ibid.
Adenostyleae DC. II. 548. II. 949. VI. 107. VI. 701.
Adenostyles Cass. *II. 556.
Adenotrias Jaub. et Spach. II. 810. °V. 143.
— Kotschyi Jaub. et Spach. II. 810. no. 2. V. 143. no. 2.
— Phrygia Jaub. et Spach. II. 810. no. 1. V. 143. no. 1.
Adesmia DC. I. 728. II. 889.
— *alpina* Gill. I. 731. no. 34. β.
— angustifolia Hook. I. 728. no. 2.
— arborea Bert. I. 729. no. 18.
— *arborea* Bert. I. 731. no. 30.
— *argentea* Gill. I. 731. no. 34. β.
— argentea Meyen. I. 730. no. 28.
— *Arnottiana* Gill. I. 731. no. 34.
— aspera Gill. I. 729. no. 10.
— balsamica Bert. I. 730. no. 19.
— bracteata Hook. et Arn. I. 730. no. 22.
— *caespitosa* Gill. I. 731. no. 35.
— calycina Vogel. I. 730. no. 24.
— *capricornica* Gill. I. 731. no. 35.
— ciliata Vogel. I. 729. no. 14.
— coluteoides Gill. I. 731. no. 32.
— conferta Hook. I. 728. no. 4.
— coronilloides Gill. I. 729. no. 11.
— cuneata Meyen. I. 729. no. 15.
— *dentata* Gill. I. 729. no. 7.
— *Doniana* Gill. I. 731. no. 34.
— Echinus Prsl. I. 731. no. 38.
— floribunda G. Don. II. 889. no. 3.
— fruticulosa G. Don. II. 889. no. 1.
— genistoides Prsl. I. 731. no. 40.
— Gilliesii Hook. et Arn. I. 729. no. 7.
— glabriuscula Vogel. I. 728. no. 5.
— glutinosa Hook. I. 731. no. 31.
— gracilis Meyen. I. 732. no. 43.
— grandiflora Gill. I. 729. no. 12.
— *Hookeriana* Gill. I. 731. no. 34.
— horrida Gill. I. 731. no. 35.
β. minor.
— incana Vogel. I. 730. no. 25.
— *Lambertiana* Gill. I. 731. no. 34. β.
— latifolia Vogel. I. 729. no. 13.
— leiocarpa Hook. et Arn. I. 729. no. 8.
— Loudonia Hook. et Arn. I. 730. no. 23.
— Meyeriana Wlprs. I. 729. no. 17.
— microphylla Hook. I. 730. no. 30.
— mimosoides G. Don. II. 889. no. 2.
— mucronata Hook. et Arn. I. 729. no. 9. c. varr. α. et β. ibid.
— *muricata* Gill. I. 728. no. 6.
Adesmia pauciflora Vogel. I. 732. no. 42.
— pedicellata Hook. et Arn. I. 731. no. 33.
— pendula DC. I. 732. †
— pinifolia Gill. I. 731. no. 37.
— psoraleoides Vogel. I. 730. no. 20.
— retrofracta Hook. et Arn. I. 728. no. 6.
— spinosissima Meyen. I. 732. no. 41.
— tenella Hook. I. 728. no. 3.
— tomentosa Meyen. I. 730. no. 29.
— trifoliolata Gill. I. 728. no. 1.
— trijuga Gill. I. 731. no. 34.
β. robustior.
— tristis Vogel. I. 730. no. 26.
— ulicina Prsl. I. 731. no. 39.
— Uspalatensis Gill. I. 731. no. 36.
— *vesicaria* Bertero. I. 728. no. 2.
— viscida Bert. I. 729. no. 16.
— viscosa Gill. I. 730. no. 21.
— *Wallichiana* Gill. I. 729. no. 10. β.
Adinandra W. Jack. I. 375. V. 130. (*V. 136.)
— acuminata Krthls. I. 376. no. 6.
— dasyantha Krthls. I. 376. no. 4.
— dumosa W. Jack. *I. 375. no. 1. V. 130. no. 1.
— excelsa Krthls. I. 376. no. 5.
— Jackiana Krthls. I. 376. no. 2.
— trichocoryna Krthls. I. 376. no. 3.
Adlumia Raf. I. 118.
— cirrhosa Raf. *I. 118. no. 1.
Adonis Dill. I. 32.. V. 4.
— aestivalis L. I. 33. †
— *aestivalis* Lk. I. 32. no. 1.
— Aleppica Boiss. I. 32. no. 4.
— autumnalis L. I. 33. †
— *citrina* DC. I. 32. no. 1.
— *dentata* Auct. β. I. 32. no. 1.
— flammea Jcq. I. 33. †
— fulgens Hochstett. V. 4. no. I.
— Inglesii Royle. I. 32. no. 2.
— intermedia B. Webb et Berthelot. *I. 32. no. 1.
— vernalis L. I. 33. †
— villosa Ldb. I. 32. no. 3.
Adoxa Linn. *II. 429.
Adrastea DC. *I. 64.
Adyseton DC. I. 143. no. 5. 6. 7. 8. 10. 16. 17. V. 36. no. 1.
Aechmandra Arn. II. 196.
— deltoidea Arn. *II. 196. no. 3.
— epigaea Arn. *II. 196. no. 2.
— *epigaea* Arn. II. 198. no. 7.
— rostrata Arn. II. 196. no. 1.
— *rostrata* Arn. II. 198. no. 8.
Aechmolepis Dcne. *VI. 479.
AEGICERACEAE Alph. DC. VI. 453.
Aegiceras Grtnr. VI. 453.

Aegiceras majus Grtnr. *VI. 453. no. 1.
— *corniculata* Blanco. VI. 453. no. 1.
AEGICEREAE Meissn. VI. 453. (ex p.)
Aeginetia Linn. III. 481. °III. 975.
— abbreviata Hamilt. III. 481. no. 3.
— acaulis Wlprs. III. 481. no. 4.
— *capitata* Grah. II. 503. no. 1.
— *coccinea* Juss. III. 481. no. 4.
— pedunculata Wall. III. 481. no. 2.
— Indica Rxb. III. 481. no. 1.
Aegiphila Jcq. IV. 118. VI. 692.
— arborescens Vahl. IV. 122. no. 20.
— brachiata Arrabida. *IV. 124.
— brachiata Cham. et Schlchtd. IV. 122. no. 19.
— cestrifolia Grdnr. IV. 123. no. 26.
— cordata Poepp. IV. 118. no. 1.
— cornifolia Kth. IV. 118. no. 3.
— *Deppeana* Steud. IV. 122. no. 19.
— diffusa Andr. *IV. 124.
— elata Swrtz. IV. 119. no. 5. *IV. 124.
— Fluminensis Arrabida. IV. 120. no. 8.
— foetida Swrtz. IV. 122. no. 21.
— *glabra* Lam. IV. 119. no. 4.
— grandiflora Hook. VI. 692. no. 1.
— grandifolia Dsf. IV. 121. no. 12.
— hirta Casaretto. IV. 122. no. 18.
— inflexa Arrabida. *IV. 124.
—? *integrifolia* Jcq. IV. 126. no. 5.
— *laeta* H. B. Kth. IV. 120. no. 6.
— laevigata Juss. IV. 123. no. 27.
— *laevigata* Juss. IV. 120. no. 11.
— *laevis* Poepp. IV. 119. no. 5.
— laevis Willd. IV. 119. no. 6.
— lanuginosa Grdnr. IV. 121. no. 17.
— *latifolia* Willd. IV. 120. no. 11.
— laxiflora Bth. IV. 120. no. 9.
— Lhotskyana Cham. IV. 121. no. 15.
— *lutea* Lam. IV. 120. no. 6.
— macrophylla H. B. Kth. IV. 120. no. 11.
— *Manabea* Swartz. IV. 120. no. 6.
— Martinicensis Linn. IV. 119. no. 4.
— mediterranea Arrabida. *IV. 124.
— mollis H. B. Kth. IV. 123. no. 25.
— multiflora Rz et Pav. IV. 118. no. 2.
— Mutisii H. B. Kth. IV. 122. no. 22.
— obducta Arrabida. *IV. 121.
— oleifera Casaretto. IV. 120. no. 10.
— racemosa Arrabida. IV. 119. no. 5. *IV. 124.
— salutaris H. B. Kth. IV. 128. no. 23.
— Sellowiana Cham. IV. 121. no. 14.
— serrata Arrabida. *IV. 124.
— stipulata Arrabida. *IV. 124.
— tomentosa Cham. IV. 121. no. 13.
— trifida Swrtz. IV. 120. no. 7.
Aegiphila umbellata Arrabida *IV. 124.
— verticillata Arrabida. *IV. 124.
— *verticillata* Arrabida. IV. 118. no. 2.
— viburnifolia Juss. IV. 124. no. 28.
— villosa Vahl. IV. 121. no. 16.
— vitelliniflora Klzsch. IV. 123. no. 24.
Aegiphileae Endl. IV. 118. VI. 692.
Aegle Corr. I. 382.
— Marmelos Corr. *I. 382. no. 1.
Aegopodium Linn. II. 392. V. 850.
— alpestre Ldb. II. 392. no. 1.
— latifolium Turczan. V. 850. no. 1.
Aegopordon Boiss. °VI. 310.
— berardioides Boiss. VI. 310. no. 1.
Aeolanthus Mart. III. 521. °III. 977.
— suavis Mart. III. 521. no. 1.
Aeonium B. Webb. II. 935. °V. 799.
— balsamiferum B. Webb et Berthelot. V. 801. no. 9.
— barbatum B. Webb et Berthelot. V. 800. no. 4.
— caespitosum B. Webb et Berthelot. V. 801. no. 7.
— Canariense B. Webb et Berthelot. V. 803. no. 13.
— ciliatum B. Webb et Berthelot. V. 803. no. 12.
— cruentum B. Webb *II. 935. no. 1. V. 799. no. 1.
— cuneatum B. Webb et Berthelot. V. 804. no. 16.
— frutescens B. Webb et Berthelot. *V. 804. no. 17.
— Goochiae A. Webb et Berthelot V. 801. no. 6.
— Haworthii B. Webb et Berthelot V. 802. no. 10.
— holochrysum B. Webb et Berthelot. V. 802. no. 9.
— laxum B. Webb et Berthelot. *V. 804. no. 18.
— Lindleyi B. Webb et Berthelot V. 800. no. 5.
— Smithii B. Webb et Berthelot V. 800. no. 3.
— strepsicladum B. Webb et Berthelot V. 799. no. 2.
— undulatum B. Webb et Berthelot. V. 801. no. 14.
— urbicum B. Webb et Berthelot. V. 803. no. 11.
— Youngianum B. Webb et Berthelot. V. 801. no. 15.
Aërope Arn. II. 70.
Aeschynantheae A. P. DC. VI. 520.
Aeschynanthus W. Jack. VI. 520.

Aeschynanthus albidus Alph. DC. VI. 521. no. 5.
— atropurpureus Van Houtte. VI. 521. no. 6.
— Boschianus Vriese. VI. 521. no. 4. VI. 743. no. 4.
— Lobbianus Hook. VI. 520. no. 1.
— miniatus Lindl. VI. 621. no. 3.
— pulcher Steudel. VI. 521. no. 2. VI. 743. no. 2.
— purpurascens Hsskrl. VI. 521. no. 5.
— *radicans* Wall. VI. 521. no. 3.
— *zebrinus* Van Houtte. VI. 521. no. 6.
Aeschynomene L. I. 732. II. 889. V. 521.
— *aquatica* Rxb. I. 733. no. 7.
— *aspera?* Herb. Linn. I. 732. no. 6.
— aspera Linn. *I. 732. no. 7.
— *aspera* Wall. I. 733. no. 8.
— atropurpurea Spanoghe. I. 734. no. 25.
— *bispinosa* Jcq. I. 680. no. 1.
— Cachemiriana Cambess. I. 734. no. 24.
— *cannabina* Rxb. I. 680. no. 1.
— cassioides Desv. I. 734. no. 27.
— *cassioides* Rz. et Pav. II. 858. no. 1.
— ciliata Vogel. I. 732. no. 4.
— coluteoides A. Rich. I. 734. no. 30.
— conferta Bth. I. 734. no. 21.
— densiflora Bth. I. 733. no. 19.
— *diffusa* Rxb. I. 680. no. 2.
— *diffusa* Willd. I. 733. no. 8. β.
— Echinus Vogel. I. 733. no. 13.
— elegans Schltd. et Cham. I. 734. no. 28.
— erubescens E. Mey. I. 734. no. 22.
— fascicularis Schlchtd. et Cham. I. 734. no. 29.
— floribunda Mart. et Galeotti. V. 522. no. 5.
— Fluminensis Vellozo. I. 732. no. 5.
— *fruticulosa* N. ab E. II. 889. no. 1.
— gracilis Miquel. V. 521. no. 2.
— gracilis Vogel. I. 733. no. 10.
— Guayaquilensis G. Don. II. 889. no. 1.
— hedysaroides Mart. et Galeotti. V. 522. no. 7.
— incana Vogel. I. 733. no. 12.
— Indica L. *I. 833. no. 8. *II. 889. no. 4.
— *Indica* Wall. I. 733. no. 7.
— interrupta Bth. I. 733. no. 18.
— laevis Mart. et Galeotti. V. 522. no. 6.
— *Lagenaria* Lour. I. 733. no. 7.
— latifolia Spr. 729. no. 13.
— *mimosoides* N. ab E. II. 889. no. 2.
— montana Spanoghe. I. 734. no. 26.
— Montevidensis Vogel. I. 732. no. 3.
— mucronulata Bth. I. 734. no. 20.
— paniculata Willd. I. 733. no. 17.
— paucillora Vogel. I. 733. no. 15.
— paucifolia Vogel. I. 733. no. 16.
Aeschynomene pluriarticulata G. Don. II. 889. no. 2.
— podocarpa Vogel I. 733. no. 11.
— *procumbens* Rxb. I. 680. no. 2.
— *pumila* L. I. 733. no. 8. β.
— quadrata Schum. et Thonn. I. 732. no. 1.
— racemosa Vogel. I. 733. no. 14.
— rudis Bth. V. 522. no. 4.
— scabra G. Don. II. 889. no. 3.
— scoparia Splitgerber. V. 521. no. 3.
— Selloi Vogel. I. 732. no. 2.
— *spinulosa* Rxb. I. 680. no. 1.
— Surattensis Wght. et Arn. I. 732. no. 6.
— tecta Vogel. I. 733. no. 9.
— *triflora* Poir. I. 740. no. 29. β.
— uniflora E. Mey. I. 734. no. 23.
—? versicolor Wenderoth. V. 521. no. 1.
Aesculus L. I. 423.
— Californica Nutt. I. 424. no. 5.
— *carnea* Wats. I. 425. no. 10.
— carnea Willd. I. 425. no. 9.
— Chinensis Bnge I. 423. no. 2.
— *discolor* Prsh. I. 424. no. 6. β.
— *echinata* Riedel. I. 424. no. 3.
— flava Ait. I. 424. no. 7.
— glabra Willd. I. 424. no. 3.
— Hippocastanum L. *I. 423. no. 1.
— humilis Lindl. I. 425. no. 11.
— Indica Jacquem. I. 425. no. 8.
— *lutea* Wang. I. 424. no. 7.
— *macrostachya* Michx. I. 424. no. 4.
— *macrostachys* Pers. I. 424. no. 4.
— *neglecta* Lindl. I. 425. no. 7.
— *Ohioënsis* Michx. I. 424. no. 3.
— *pallida* Willd. 424. no. 3.
— parviflora Walt. I. 424. no. 4.
— Pavia L. I. 424. no. 6. (III. Emend. p. 2.)
β. discolor } I. 424. no. 6.
γ. livida } I. 424. no. 6.
δ. mutabilis } I. 424. no. 6.
ε. versicolor } I. 424. no. 6.
— *Pavia* Wats. I. 424. no. 6. ε.
— *rubicurda* Lodd. I. 425. no. 10.
— *rubicunda* Loisel. I. 425. no. 9.
— Watsoniana Spach. I. 425. no. 10.
Aetheorhiza Cassini. *VI. 357.
Aethionema R. Br. I. 179.
— Arabicum Andrz. I. 179. †
— Armenum Boiss. I. 179. no. 3.
— Beyrichii Tausch. I. 179. no. 2.
— *Buxbaumii* DC. I. 179. †
— clandestinum Delile. I. 179. no. 6.
— diastrophis Bnge. I. 179. no. 8.
— fimbriatum Boiss. I. 179. no. 5.
— Fischeri Tausch. 179. no. 1.
— gracile DC. I. 180. †

Aethionema leptocarpium Delile. I. 179. no. 7.
— membranaceum DC. I. 179. †
— saxatile R. Br. I. 180. †
— stenopterum Boiss. I. 179 no. 4.
Aethiopis Bth. III. 612. VI. 661.
Aethiopis Besl. III. 615. no. 60.
Aethusa Linn. *II. 401.
Affonsea St. Hil. I. 932. °V. 644.
— bullata Bth. V. 645. no. 4.
— comosa Bth. V. 645. no. 3.
— densiflora Bth. V. 645. no. 2.
— juglandifolia St. Hil. *I. 932. no. 1. V. 645. no. 1.
Afzelia Sm. I. 844.
— Africana Sm. *I. 844. no. 1.
— *cassioides* Gmel. III. 381. no. 1.
Agalma DC. II. 700.
Agalmanthus umbellatus Hombr. et Jacquinot. V. 741. no. 1.
Agalmyla Blume. VI. 521.
— staminea Blume. *VI. 521. no. 1.
Aganippea DC. *II. 633. *II. 702. no. 1.
Aganosma G. Don. VI. 474.
— elegans G. Don. *VI. 474. no. 1.
Agapetes D. Don. *II. 723.
Agarista DC. *II. 613.
Agassizia Chavannes. III. 230.
— *Limensis* Chavannes. III. 230. no. 1.
Agastia DC. VI. 418. no. 1.
Agasyllis Hffm. *II. 417.
Agathea Cass. *II. 559. *II. 951. no. 4. II. 956.
— amelloides DC. β. oblongifolia C. H. Schultz. II. 956. no. 2.
— amoena C. H. Schultz. II. 956. no. 1.
— Kraussii C. H. Schultz. II. 956. no. 3.
— Natalensis C. H. Schultz. II. 956. no. 4.
— spathulata Knze. II. 956. no. 5.
Agathelpis Choisy. IV. 169.
— adunca E. Mey. IV. 171. no. 5.
— angustifolia Chois. IV. 170. no. 4.
— brevifolia E. Mey. IV. 171. no. 6.
— mucronata E. Mey. IV. 170. no. 2.
— nitida E. Mey. IV. 169. no. 1.
— parvifolia Choisy. IV. 170. no. 3.
Agathisanthes Blume *II. 68.
Agathosma Willd. I. 510. V. 392.
— acerosa Eckl. et Zeyh. I. 515. no. 76.
— acuminata Willd. *I. 512. no. 41.
— adenocaulis Eckl. et Zeyh. I. 516. no. 81.
— alaris Cham. et Schlchtd. I. 512. no. 47.
— apiculata Meyer. *I. 512. no. 43.
— asperifolia Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 68.
— aulonophila Eckl. et Zeyh. I. 516. no. 82.
— *barbata* Spr. I. 517. no. 1.
— barosmaefolia Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 70.
— Bartlingiana Eckl. et Zeyh. *I. 515. no. 78.
Agathosma berzeliaefolia Eckl. et Zeyh. I. 516. no. 83.
— bifida Bartl. et Wendl. *I. 511. no. 13.
— biophylla Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 63.
— bisulca G. Don. *I. 510. no. 1.
— blaerioides Cham. et Schlchtd. I. 511. no. 15.
— bruniades G. Don. *I. 510. no. 10.
— cerefolium G. Don. *I. 511. no. 20.
— chortophila Eckl. et Zeyh. I. 516. no. 85.
— ciliata G. Don. *I. 511. no. 19.
— collina Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 62.
—? corymbosa G. Don. *I. 512. no. 34.
— *cuspidata* Bartl. et Wendl. I. 510. no. 10.
— cyminoides Eckl. et Zeyh. 516. no. 87.
— decumbens Eckl. et Zeyh. I. 516. no. 84.
— EcklonIana Schlchtd. I. 513. no. 56.
— elegans Cham. et Schlchtd. I. 511. no. 21.
— erecta Bartl. et Wendl. *I. 510. no. 4.
— ericoides Schlchtd. I. 513. no. 52.
— fastigiata Eckl. et Zeyh. I. 516. no. 89.
— filipetala Eckl. et Zeyh. I. 515. no. 72.
— geminifolia Eckl. et Zeyh. I. 515. no. 80.
— glabrata Bartl. et Wendl. *I. 512. no. 26.
— glauca Eckl. et Zeyh. 515. no. 71.
— gnidioides Schlchtd. I. 513. no. 51.
— Gonaquensis Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 65.
— graveolens Meisn. V. 392. no. 1.
— hirta G. Don. *I. 512. no. 45.
— *hirta* Ker. I. 512. no. 24.
— hispida Bartl. et Wendl. *I. 510. no. 2.
— hybrida G. Don. *I. 512. no. 27.
— hyboneyra Eckl. et Zeyh. I. 515. no. 77.
— imbricata G. Don. *I. 512. no. 40.
— involucrata Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 60.
— Joubertiana Schlchtd. I. 513. no. 54.
— juniperifolia Bartl. V. 392. no. 2.
— lasiophylla G. Don. *I. 512. no. 24.
— lancifolia Eckl. et Zeyh. I. 513. no. 59.
— laxa G. Don. *I. 512. no. 23.
— lediformis Eckl. et Zeyh. I. 513. no. 57.
— linifolia Lichtst. *I. 511. no. 14.
— lycopodioides G. Don. *I. 512. no. 42.
— marifolia Eckl. et Zeyh. I. 515. no. 73.
— microphylla Meyer. I. 512. no. 30.
— minuta Schlchtd. I. 513. no. 50.
— *mollis* Bartl. et Wendl. I. 512. no. 28.
— montana Schlchtd. I. 513. no. 55.
— Mundtii Cham. et Schlchtd. I. 511. no. 16.
— myrsinites G. Don. *I. 512. no. 37.
— nigra Eckl. et Zeyh. I. 516. no. 88.
— nigromontana Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 67.
— obtusa Bartl. et. Wendl. *I. 512. no. 29.
— obtusata G. Don. *I. 512. no. 46.
— orbicularis G. Don. *I. 512. no. 31.

Agathosma parviflora G. Don. *I. 510. no. 9.
— patentissima Eckl. et Zeyh. I. 515. no. 79.
— patula G. Don. *I. 310. no. 3.
—? perforata G. Don. *I. 512. no. 36.
— pilifera Schtdl. I. 513. no. 49.
— platypetala Eckl. et Zeyh. I. 516. no. 86.
— prolifera Bartl. et Wendl. *I. 511. no. 17.
— pubescens G. Don. *I. 512. no. 25.
— punctata G. Don. *I. 512. no. 35.
— reflexa Lk. *I. 510. no. 5.
— robusta Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 64.
— *rubra* Willd. IIb. I. 512. no. 44.
— rufescens G. Don. I. 512. no. 44.
— rugosa Lk. *I. 512. no. 28.
— salina Eckl. et Zeyh. *I. 514. no. 69.
— Schlechtendaliana Eckl. et Zeyh. *I. 514. no. 61.
— sedifolia Schlchtd. I. 513. no. 53.
— serpyllacea Lichtst. *I. 511. no. 18.
— *serpyllacea β. latifolia* Schlchtd. I. 514. no. 61.
— serruriaefolia Eckl. et Zeyh. I. 513. no. 58.
— spicata Lichtst. *I. 512. no. 33.
— squammosa G. Don. *I. 512. no. 38.
— Stadensis Eckl. et Zeyh. I. 515. no. 75.
—? stenopetala Steud. I. 508. no. 4.
— suaveolens Eckl. et Zeyh. I. 515. no. 74.
— tenuissima G. Don. *I. 510. no. 6.
—? teretifolia G. Don. *I. 510. no. 11.
— Thunbergiana G. Don. *I. 511. no. 12.
— *Thunbergiana* Bartl. et Wendl. I. 515. no. 78.
— thymifolia Schlchtd. I. 512. no. 48.
— thyoides G. Don. *I. 510. no. 7.
— trachyphylla Eckl. et Zeyh. I. 514. no. 66.
— Ventenatiana G. Don. *I. 512. no. 22.
— vestita G. Don. *I. 512. no. 39.
— virgata G. Don. *I. 510. no. 8.
— Wendlandiana G. Don. I. 512. no. 32.
— *villosa* Willd. I. 512. no. 24.
Agathyrsus Floridanus Beck. II. 700. no. 3.
— *leucophaeus* Don. II. 700. no. 4.
Agati Rheede. I. 681.
— *coccinea* Desv. I. 681. no. 1. β.
— grandiflora Desv. *I. 681. no. 1.
β. coccinea.
Agdestis Moç. et Sess. *I. 93.
Agerateae Less. II. 545. II. 949. VI. 106.
Ageratoides DC. II. 545. no. 1. 2.
Ageratum Linn. *II. 546.
Aglaia Lour. I. 428. V. 373.
— argentea Blume. I. 428. no. 2.
— elliptica Blume. I. 428. no. 4.
— ordorata Lour. I. 428. no. 1. *V. 373. no. 1.
Aglaia odoratissima Blume. I. 428. no. 6.
— speciosa Blume. I. 428. no. 5.
— Sulingi Blume. I. 428. no. 3.
Agnathus Viburni folio Vaill. IV. 125. no. 1.
Agonis DC. II. 922. V. 739.
Agonis DC. II. 166.
— angustifolia Schauer. V. 739. no 7.
— conspicua Schauer. V. 739. no. 6.
— flexuosa Schauer. V. 739. no. 1.
α. angustifolia.
β. latifolia.
— hypericifolia Schauer. V. 739. no. 2.
— juniperina Schauer. V. 740. no. 8.
— linearifolia Schauer. V. 739. no. 5.
— marginata Schauer. V. 739. no. 3.
— parviceps Schauer. V. 740. no. 9.
— spathulata Schauer. V. 739. no. 4.
Agonolobus C. A. Meyer. I. 168.
Agoranthus Endl. I. 80.
Agoseris Raf. *II. 700.
Agrestes (Stachys) Bth. III. 831. VI. 680. no. 8.
Agrianthus Mart. *II. 548.
Agricolaea fragrans Schrank. IV. 110. no. 50.
Agrimonia Tournef. II. 37. II. 914.
— acutifolia Dumort. II. 41. no. 11. *II. 42. no. 19. α. discolor. β. laevigata. γ. pallida. } II. 41. no. 11.
— agrimonioides L. II. 37. no. 1.
— Blumei G. Don. II. 42. no. 17.
— bracteata E. Mey. II. 42. no. 18.
— canescens Dumort. II. 41. no. 12.
— Caffra E. Mey. *II. 42. no. 20.
— *conophea* Tschernaj. II. 41. no. 7.
— *Dahurica* Willd. II. 39. no. 7. II. 41. no. 7.
— Dahurica Willd. II. 38. no. 7.
α. pilosa. β. glabrata. Wllrth. II. 39. no. 7.
— *elata* Mnch. II. 40. no. 14.
— *Eupatoria* Beyrich. II. 39. no. 10.
— Eupatoria L. II. 39. no. 9. II. 40. no. 2.
— *Eupatoria* Thnbrg. II. 40. no. 13.
— *Eupatoria β. Americana* Beyrich. II. 38. no. 3.
— *Eupatoria β. Americana* Kinn. II. 38. no. 5.
— *Eupatoria* var. *Dahurica* Fisch. II. 39. no. 7.
— Eupatoria L. II. 39. no. 9.
β. longifolia.
α. rotundifolia.
— Eupatorium Linn. II. 914. †
— *foliis pinnatis* Hall. II. 39. no. 9. β.
— *glabrata* Spr. II. 39. no. 7. II. 41. no. 7.

Agrimonia Goeletiana Andrz. II. 41. no. 7.
— *grandis* Andrz. II. 40. no. 2.
— gryposepala Wllrth. II. 39. no. 10.
— hirsuta Bongd. II. 41. no. 8.
— *humilis* Tournef. II. 40. no. 14.
— humilis Wllrth. II. 38. no. 2.
— incisa Torr. et Gr. II. 41. no. 16.
— *inodora* Moris. II. 39. no. 9. β.
— lanata Wall. II. 40. no. 13.
— *lanata* Wall. II. 41. no. 5.
— leucantha Knze. II. 914. no. 1.
— microcarpa Wllrth. II. 38. no. 4.
— *minor* Mill. II. 39. no. 9. β.
— Nepalensis D. Don. II. 41. no. 5.
— *Nepalensis* Don. II. 40. no. 13.
— *odorata* Auct. II. 40. no. 12.
— odorata Camer. II. 40. no. 14.
— *odorata* Lej. II. 40. no. 11.
— odorata Mill. II. 40. no. 3.
— *officinalis* Lam. II. 39. no. 9. β.
— *officinarum* Tournef. II. 39. no. 9. β.
— *orientalis major* Rupp. II. 40. no. 14.
— parviflora Ait. II. 41. no. 9.
— *parviflora* Ait. II. 38. no. 5.
— *parviflora* Auctor. II. 38. no. 4. II. 39. no. 10.
— *parviflora* Kinn. II. 39. no. 8.
— pilosa Ldb. II. 41. no. 7.
— *pilosa* Ldb. II. 39. no. 7.
— platycarpa Wallrth. II. 38. no. 3.
— procera Wallrth. II. 39. no. 11.
— pubescens Wallrth. II. 39. no. 8.
— *repens* Hb. Berol. II. 40. no. 13.
— repens L. II. 40. no. 1.
— *repens* L. II. 40. no. 14.
— *repens* Mutel. II. 40. no. 11.
— rostellata Wallrth. II. 38. no. 6.
— *suaveolens* Auct. II. 40. no. 3.
— *suaveolens* Blume. II. 42. no. 17.
— suaveolens Pursh. II. 40. no. 12. II. 41. no. 15.
— serrifolia Wallrth. II. 38. no. 5.
— sessiliflora Dumort. II. 41. no. 10.
— *similis* Bauh. II. 37. no. 1.
— sororia Fisch. et Mey. II. 41. no. 4.
— stipularis Dumort. II. 41. no. 13.
— *striata* Michx. II. 38. no. 5.
— striata Michx. 2. 41. no. 14.
— viscidula Bnge. II. 41. no. 6.
Agrimonoides Column. II. 38. no. 1.
Agrocharis Hochstett. °V. 896.
— melanantha Hochstett. V. 896. no. 1.
Agrostemma Bungeana Don. I. 281. no. 6. V. 83. no. 3.
Aguaraquiya Piso. VI. 585. no. 13. ε.
Aichryson B. Webb et Berthelot. °V. 797.
Aichryson dichotomum B. Webb et Berthel. II. 263. no. 2.
— dichotomum B. Webb et Berthelot. V. 797. no. 1.
— *pulchellum* C. A. Mey. II. 935. no. 2.
— *punctatum* B. Webb et Berthel. II. 264. no. 3.
— punctatum B. Webb et Berthel. V. 797. no. 2.
— *pygmaeum* B. Webb II. 264. no. 6.
— pygmaeum B. Webb et Berthel. V. 799. no. 5.
— *radicescens* B. Webb et Berthel. II. 264. no. 4.
— radicescens B. Webb et Berthel. V. 798. no. 3.
— *tortuosum* B. Webb et Berthel. II. 264. no. 5.
— tortuosum B. Webb et Berthel. V. 798. no. 4.
Aïdia Lour. *II. 525.
Ailanthus Desf. I. 523.
— excelsa Rxb. *I. 523. no. 1.
Αἰμόδωρον Theophr. III. 462. no. 22.
Ainsliaea DC. *II. 680. *VI. 314.
Ainsworthia Boiss. °V. 894.
— cordata Boiss. V. 894. no. 1.
Aiolotheca DC. *II. 604.
Aithales B. Webb et Berthel. °V. 796.
— caespitosa B. Webb et Berthel. V. 797. no. 2.
— *rubens* B. Webb et Berthel. II. 260. no. 8.
— rubens B. Webb et Berthel. V. 796. no. 1.
Aitonia L. fil. I. 436.
— Capensis Linn. *I. 436. no. 1.
Aitrorhynchus C. A. Mey. II. 694. no. 1.
Ajuga Linn. III. 924. °III. 992. VI. 684.
— acaulis Brocchi. III. 927. no. 11.
— *Africana* Pers. III. 908. no. 19.
— *alpestris* Dumort. III. 928. no. 6.
— *Alpina* Linn. III. 926. no. 6.
— australis R. Br. III. 927. no. 9.
— bracteosa Bth. III. 926. no. 14.
— *Capensis* Pers. III. 906. no. 10.
— Chamaecistus Ging. III. 929. no. 21.
— *Chamaepithys* Guss. III. 930. no. 24.
— Chamaepithys Schreb. III. 930. no. 25.
— Chia Schreb. III. 930. no. 24. β. minor.
— ciliata Bunge. III. 926. no. 5.
— *decumbens* Ten. III. 927. no. 11.
— decumbens Thunb. III. 928. no. 16.
— densiflora Bth. III. 928. no. 15.
— Diemenica Bth. III. 927. no. 10.
— *disticha* Rxb. III. 815. no. 5.
— euphrasioides Boiss. VI. 685. no. 4.

Ajuga folioso Tratt. III. 926. no. 6.
— *fruticosa* Rxb. III. 816. no. 8.
— *furcata* Lck. III. 847. no. 1.
— Genevensis Linn. III. 926. no. 6.
— glabra Prsl. III. 930. no. 26.
— *integrifolia* Hamilt. III. 928. no. 14.
— Iva Schreb. III. 329. no. 22.
— *Iva* Sbthrp. et Sm. III. 929. no. 22. *β.*
— Laxmanni Bth. III. 928. no. 18.
— lobata D. Don. III. 924. no. 1.
— macrosperma Wall. III. 928. no. 17.
— Mesogitana Boiss. VI. 684. no. 1.
— *moschata* Schreb. III. 929. no. 22.
— *multiflora* Bnge. III. 926. no. 6.
— oblongata M. Bieb. III. 929. no. 19.
— Ophrydis Burch. III. 926. no. 8.
— orientalis Linn. III. 925. no. 3.
— parviflora Bth. III. 927. no. 13.
— *Pseudo-Iva* DC. III. 929. no. 22. *β.*
— pyramidalis Linn. III. 925. no. 4.
— *pyramidalis* M. Bieb. III. 926. no. 6.
— remota Bth. III. 926. no. 7.
— repens Rxb. III. 931. no. 29.
— reptans Linn. III. 925. no. 2.
— *rugosa* Host. III. 926. no. 6.
— *rupestris* Schleich. III. 926. no. 4.
— salicifolia Schreb. III. 929. no. 20.
— *salicifolia* Stev. III. 929. no. 19.
— scoparia Boiss. VI. 685. no. 3.
— sinuata R. Br. III. 927. no. 12.
— *Tenorei* Prsl. III. 927. no. 11.
— tridactylites Ging. III. 930. no. 23.
—? tridentata Bth. III. 930. no. 28.
— vestita Boiss. VI. 685. no. 2.
— virgata Bth. III. 930. no. 27.
Ajugoideae Bth. III. 902. III. 991. VI. 684.
Aizoideee Fnzl. II. 231. V. 783.
Aizoon L. II. 231.
— argenteum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 2.
— contaminatum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 7.
— crystallinum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 10.
— elongatum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 4.
— hirsutum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 3.
— *microphyllum* Bartl. II. 232. no. 1.
— papulosum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 9.
— propinquum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 6.
— pubescens Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 5.
— sarmentosum L. fil. *II. 232. no. 11.
  γ. hirsutum.
  β. strigosum.
— spathulatum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 1.
— squamulosum Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 8.
Aizoonia Tausch. V. 824. no. 1. 2. 3. 4. 5.
Aizopsis DC. I. 147. 148. no. 1. II. 758.
Akanthoplia Wllrth. VI. 152.
Akebia Dcne. I. 98.
Akebia clematifolia Siebold et Zucc. I. 99. no. 3.
— lobata Dcsne. I. 99. no. 2.
— quercifolia Siebold et Zucc. I. 99. no. 4
— quinata Desne. I. 98. no. 1.
Akokanthera G. Don. III. 122. °III. 955. VI. 630.
— Lamarkii G. Don. III. 123. no. 2.
— lycioides G. Don. III. 123. no. 3.
— pubescens G. Don. III 123. no. 4.
— venenata G. Don. III. 122. no. 1.
— *venenata* G. Don. VI. 467. no. 1.
Akosmia Nutt. II. 612. no. 3.
Alafia Pet. Thouars. *VI. 472.
ALANGIEAE DC. II. 150. II. 919. V. 725.
Alangium Lam. II. 150. V. 725.
— decapetalum Lam. *II. 150. no. 1. V. 725. no. 1.
— hexapetalum Lam. *II. 150. no. 1.
— *hexapetalum* Rxb. II. 150. no. 1.
— *tomentosum* Lam. II. 150. no. 1.
Alarçonia DC. II. 608.
— *angustifolia* DC. II. 608. no. 5.
— *helenioides* DC. II. 608. no. 5. II. 977. no. 1.
Alatae (Acacia) I. 886.
— (Crotalaria) V. 437.
Alberta E. Mey. II. 523. *II. 524. VI. 76.
— magna E. Mey. *II. 523. no. 1. VI. 76. no. 1.
Albertia cf. Alberta.
Albertinia Spr. *II. 542. VI. 100.
— arborea Gardn. VI. 101. no. 3.
— Candolleana Gardn. VI. 101. no. 2.)
— stellata Gardn. VI. 100. no. 1.
Albertinieae DC. II. 542. II. 949. VI. 99.
Albicans (Plantago) Steinheil. IV. 187. VI. 696. no. 5.
Albinea Hombr. et Jacqinot. *VI. 181. adn.
— oresigenesa Hombr. et Jacq. *VI. 181. adn.
Albizzia Durazzini. I. 925. °V. 595.
— amara Bth. *I. 925. no. 5.
— amara Boivin. V. 597. no. 16.
— cyclosperma Bth. *I. 925. no. 17.
— elata Bth. *I. 925. no. 10.
— ferruginea Bth. V. 596. no. 9.
— Forbesii Bth. V. 598. no. 20.
— fulgens Bth. *I. 925. no. 18. V. 595. no. 1.
— glaberrima Bth. V. 596. no. 8.
— granulosa Bth. *I. 925. no. 19. V. 595. no. 2.
— Isembergiana Bth. *I. 925. no. 15.
— Julibrissin Boivin. *I. 925. no. 7. V. 597. no. 18.
— *latifolia* Boivin. V. 596. no. 6.

Albizzia Lebbek Bth. *I. 925. no. 1. V. 596. no. 6.
γ. parviflora.
β. pubescens.
— lebekioides Bth. *I. 925. no. 3. V. 596. no. 11.
— Lophantha Bth. *I. 925. no. 16. V. 595. no. 3.
— lucida Bth. V. 595. no. 4.
— marginata Bth. *I. 925. no. 14.
— *micrantha* Boivin. V. 596. no. 10
— Milletti Bth. V. 597. no. 13.
— *mollis* Boivin. V. 598. no. 18. β.
— mollis Bth. I. 925. no. 8.
— myriophylla Bth. *I. 925. no. 11. V. 597. no. 15.
— Nemu Bth. *I. 925. no. 6.
— odoratissima Bth. V. 596. no. 10.
— procera Bth. *I. 925. no. 2. V. 596. no. 12.
— retusa Bth. V. 597. no. 14.
— rhombifolia Bth. V. 596. no. 7.
— sericocephala Bth. V. 597. no. 17.
— Smithiana Bth. *I. 925. no. 13.
— speciosa Bth. *I. 925. no. 4.
— stipulata Bth. *I. 925. no. 9. V. 598. no. 19.
— umbrosa Bth. V. 595. no. 5.
— Wightii Bth. I. 925. no. 12.
Alcea Linn. II. 788. no. 2.
Alchemilla L. II. 42.
Alchimilla Tournef. II. 42. II. 914. V. 655.
— Abyssinica Fresen. II. 42. no. 2.
— *argentea* G. Don. II. 42. no. 1.
— conjuncta Babingt. II. 42. no. 1.
— cuneifolia Nutt. II. 42. no. 6.
— elongata Eckl. et Zeyh. II. 42. no. 3.
— Eupatoria L. *II. 42. adn. no. 1.
— *Eupatoria* Michx. II. 42. adn. no. 2.
β. hirsuta / *γ. mollis.* / *γ. parviflora* } Torr. II. 42. adn. no. 1.
— fissa Genth. et Schum. II. 43. †
— galioides Bth. V. 655. no. 1.
— microcarpa Boiss. et Reut. II. 42. no. 4.
— occidentalis Nutt. II. 42. no. 5.
— parviflora Ait. *II. 42. adn. no. 2.
— *parviflora* DC. II. 42. adn. no. 1.
— pubescens M. B. II. 43. †
— *suaveolens* Prsh. II. 42. adn. no. 2.
— *striata* Michx. II. 42. adn. no. 1.
— venusta Schlchtd. II. 914. no. 2.
— vulcanica Schlchtd. II. 914. no. 1.
— vulgaris L. II. 43. †
Alciope DC. *II. 557.
Aldama Llaw. et Lex. VI. 160. no. 1.
Aldina Endl. I. 843. V. 565.
Aldina insignis Endl. *I. 843. no. 1. V. 565. no. 1.
Aldrovanda Monti. I. 230.
— vesiculosa L. *I. 230. no. 1.
Alectorolophus Hall. III. 434. °III. 792.
Alectorolophus M. Bieb. VI. 653.
— alpinus Wlprs. III. 434. no. 5.
— *alpinus primus* Clus. III. 423. no. 67.
— angustifolius Wlprs. III. 434. no. 4.
γ. angustifolius.
— grandiflorus Wllrth. III. 434. no. 2.
— *grandiflorus β. pubens* Wallrth. III. 434. no. 3.
— hirsutus All. III. 434. no. 3.
— *Italica luteo-pallida* Barrel. III. 408. no. 5.
— *major* Rchb. III. 434. no. 2.
— *minor* Rchb. III. 434. no. 1.
— *montana flore albo* Barrel. III. 417. no. 38.
— parviflorus Wallrth. III. 434. no. 1.
γ. angustifolius Rchb.
β. fallax Wimm. et Grbwsk.
— *tertius* Clus. III. 423. no. 63.
— *Trixago* M. Bieberst. III. 409. no. 8.
Alectra Thnbrg. *VI. 641.
— *Capensis* Thnbrg. III. 390. no. 2.
Alectryon Gaertn. *I. 422. II. 816.
— excelsum Grtnr. *II. 816. no. 1.
Alepidea Laroch. II. 388.
— amatymbica Eckl. et Zeyh. II. 389. no. 3.
— ciliaris Laroch. II. 388. no. 1.
β. latifolia.
— serrata Eckl. et Zeyh. II. 388. no. 2.
Aleuritia Duby. VI. 442. no. 16. VI. 742.
Aleurodendron album Reinw. I. 351. no. 2. V. 115. no. 2.
Aleuteritia cf. *Aleuritia.*
Alexandra Schombrgk. °V. 564.
— imperatricis *V. 564. no. 1.
Alfredia DC. II. 677.
— acantholepis Kar. et Kir. II. 677. no. 2.
— nivea Kar. et Kir. II. 677. no. 3.
— stenolepis Kar. et Kir. II. 677. no. 1.
Algarobia DC. I. 861. V. 582.
— *dulcis* Bth. I. 862. no. 11.
— *glandulosa* Torr. et Gr. I. 861. no. 5.
Algeria candida DC. I. 353. no. 6.
Algue Laguen Feuill. III. 845. no. 6.
Alhageae DC. I. 749. II. 899. V. 528.
Alhagi Tournef. I. 749.
— Kirghisorum Schrenk. I. 749. no. 1.
Alibertia A. Rich. *II. 490.
Alibrexia Miers. °VI. 550.
— revoluta Miers. VI. 551. no. 3.
— rupicola Miers. VI. 550. no. 1.
— tomentosa Miers. VI. 551. no. 2.

Alibum Less. *II. 544.
Alicteres Hook. I. 334.
— *hispida* Prsl. I. 334. no. 22.
Alisma Tragus. VI. 219. no. 1.
Alkanna Tausch. VI. 561.
— frigida Boiss. VI. 651. no. 1.
Alkekengi Feuill. III. 22.
— *Barbadense nanum Alliariae folio* Dill. III. 24. no. 9. β.
— *Bonariense repens, bacca turbinata viscosa* Dill. III. 23. no. 3. α.
— *amplo floro violaceo* Feuill. III. 22. no. 1.
— *fructu parvo verticillato* Tournef. III. 23. no. 1. β.
— *Indicum glabrum Capsici folio* Dill. III. 25. no. 14. γ.
— *Indicum glabrum Chenopodii folio* Dill. III. 25. no. 14.
— *officinarum* Tournef. III. 23. no. 5.
— *procumbens* Mnch. III. 24. no. 9.
Allagopappus Cass. *II. 954. no. 1.
Allamanda Linn. VI. 464.
— cathartica Linn. *VI. 464. no. 1.
— *cathartica* Sieb. VI. 465. no. 4.
— latifolia Prsl. VI. 465. no. 4.
— parviflora Prsl. VI. 465. no. 5.
— verrucosa Gardn. VI. 465. no. 3.
— violacea Gardn. et Fielding. VI. 464. no. 2.
Allamandeae Alph. DC. VI. 464.
Allania Bth. I. 843. V. 565.
— *insignis* Bth. I. 843. no. 1. V. 565. no. 1.
Allardia Dcne. II. 637. °VI. 204.
— glabra Dcne. II. 637. no. 2. VI. 204. no. 2.
— tomentosa Dcne. II. 637. no. 1. VI. 204. no. 1.
Allasia Lour. *II. 205.
Allegria Moc. et Sess. I. 352. V. 116.
Allendea Llaw. et Lexarz. *II. 701. no. 3.
Alletima Endl. II. 371.
Alliaria Rmph. I. 329. no. 1.
Allocarpus H. B. Kth. II. 629.
— scabrifolius Hook. et Arn. II. 629. no. 1
Allochroa Fisch. et Mey. II. 80.
Allodape Endl. II. 733.
— Americana Endl. *II. 733. no. 1.
— *Americana* Endl. VI. 432. no. 1.
Alloizonium Knze. °VI. 277.
— arctotideum Knze. *VI. 277. no. 1.
Allomorphia Blume. II. 143. II. 918.
— exigua Blume. *II. 143. no. 1.
— pauciflora Bth. II. 918. no. 1.
Alloplectus Mart. II. 716. VI. 406.
— dichrous DC. VI. 406. no. 1 *VI. 740. no. 1.
— dimidiatus Bth. VI. 407. no. 3.
Alloplectus pendulus Poepp. et Endl. II. 716. no. 2.
— Pinelianus Van Houtte. VI. 740. no. 2.
— repens Hook. VI. 406. no. 2.
— *Schottii* G. Don. VI. 406. no. 1.
— semicordatus Poepp. et Endl. II. 716 no. 1.
— *sparsiflorus* Martius. VI. 406. no. 1.
— speciosus Poepp. et Endl. II. 717. no. 3.
— tenuis Bth. VI. 407. no. 4.
Almeidea St. Hil. I. 499.
— lanceolata St. Hil. et Tulasne. I. 499. no. 5.
— lilacina St. Hil. I. 499. no. 2.
— longifolia St. Hil. I. 499. no. 4.
— myriantha Cham. et Schlchtd. I. 499. no. 1.
— rubra St. Hil. I. 499. no. 3.
Aloëxylon Lour. *I. 855.
Alomatium DC. I. 132. no. 21. II. 756. no. 6. 7. 8.
Alomieae Less. II. 545. VI. 105.
Alomia H. B. Kth. *II. 545.
Alona Lindl. °VI. 548.
— baccata Lindl. VI. 548. no. 6.
— carnosa Lindl. VI. 548. no. 5.
— coelestis Lindl. VI. 548. no. 1. VI. 745. no. 1.
— ericifolia Miers. VI. 549. no. 7.
— glandulosa Lindl. VI. 548. no. 4.
— *longifolia* Lindl. VI. 548. no. 6.
— microphylla Miers. VI. 549 no. 8.
— obtusa Lindl. VI. 548. no. 3.
— *revoluta* Lindl. VI. 551. no. 3.
— rostrata Lindl. VI. 548. no. 2.
— *tomentosa* Lindl. VI. 551. no. 2.
Alonsoa Rz. et Pav. III. 150. °III. 958. *VI. 636.
— acutifolia Rz. et Pav. III. 151. no. 5.
— caulialata Rz. et Pav. III. 151. no. 6.
— hirsuta Steud. III. 151. no. 9.
— incisifolia Rz. et Pav. III. 150. no. 3.
— linearis Rz. et Pav. III. 150. no. 1.
— Mutisii G. Don. III. 151. no. 8.
— parviflora G. Don. III. 151. no. 7.
— procumbens Rz. et Pav. III. 151. no. 4.
— quadrifolia G. Don. III. 150. no. 2.
Alopecuroidei (Astragalus) DC. II. 869. V. 518.
Alopecuros Bth. III. 816.
Alophotropis Jaub. et Spach. II. 885.
Aloysia Ortega. IV. 41. VI. 687.
— attenuata Wlprs. IV. 42 no. 8.
— chamaedryfolia Cham. IV. 41. no. 3.
— citriodora Ortega. IV. 41. no. 1.
— floribunda Mart. et Galeotti. VI. 687. no. 1.

Aloysia lycioides Cham. IV. 42. no. 5.
— polygalaefolia Cham. IV. 41. no. 3.
— scorodonioides Cham. IV. 41. no. 2.
— urticoides Cham. et Schlcbtd. IV. 42. no. 6.
— virgata Cham. IV. 42. no. 7.
Aloysioides Wlprs. IV. 13.
Alpigeni (Aster) N. ab. E. II. 571.
Alpina (Tanacetum) C. H. Schultz. VI. 223.
Alseïs Schott. II. 508.
— floribunda Schott. *II. 508. no. 1.
Alseuosmia A. Cunn. II. 453.
— atriplicifolia A. Cunn. II. 453. no. 5.
— Banksii A. Cunn. II. 453. no. 3.
— Ilex A. Cunn. II. 453. no. 6.
— ligustrifolia A. Cunn. II. 453. no. 2.
— linariaefolia A. Cunn. II. 453. no. 1.
— macrophylla A. Cunn. II. 453. no. 8.
— palaeiformis A. Cunn. II. 453. no. 4.
— quercifolia A. Cunn. II. 453. no. 7.
Alsinastrum Torr. et Gr. II. 238.
Alsine erecta Burm. II. 240. no. 3. *α.*
— *lotoides* Pluk. II. 239. no. 1. β.
— *media* Febs. III. 336. no. 5.
— *palustris exigua, foliolis lanceolatis* Mentz. III. 335. no. 1.
— *palustris repens, foliis lanceolatis* Pluken. III. 335. no. 1.
— *parva erecta, folio Alsines hederaceo* Lobel. III. 338. no. 12.
— *procumbens* Herm. II. 250. no. 5.
— *pumila* Amm. II. 241. no. 4.
— *spuria pusilla repens foliis Saxifragiae aureae* Pluken. III. 334 no. 1.
ALSINEAE Bartl. *I. 266. * V. 77.
Alsinoides Koch. III. 335.
Alsodeia Thouars I. 224. V. 60.
Alsodeia DC. I. 224. V. 60.
— *Benghalensis* Wall. I. 224. no. 2.
— brevipes Bth. I. 224. no. 5.
— castaneaefolia St. Hil. I. 224. no. 1.
— deflexa Bth. V. 60.
— laxiflora Bth. I. 224. no. 6.
— *macrophylla* Dene. I. 225. no. 5.
— paniculata Mart. I. 224. no. 3.
— physiphora Mart. I. 224. no. 2.
— pubiflora Bth. I. 224. no. 4.
Alsodineae R. Br. I. 224. II. 767.
Alsoidea cf. *Alsodeia.*
Alstonia R. Br. *VI. 471.
Alstonieae G. Don. VI. 171.
Alternasemina Silva Manso. °V. 765.
— Taynia Silva Manso *V. 765. no. 1.
Alternatim-pinnatae (Indigofera) I. 666.
Alternifoliae (Eucalyptus) V. 743.
Althaea Cav. I. 291. II. 788.
— Armeniaca Ten. I. 291. no. 5.
Althaea cannabina L. I. 292. †
— Coromandeliana Cav. *I. 291. no. 1.
— Cretica Weinm. II. 788. no. 1.
— *flexuosa* Sims. I. 291. no. 1.
— hirsuta L. I. 292. †
— *Kraussiana* Buchinger. V. 90. no. 2.
— Kurdica Schlchtd. II. 788. no. 2.
— longiflora Boiss. et Reut. I. 291. no. 4.
— *maritima* P. Br. I. 306. no. 46.
— meonantha Link. I. 291. no. 3.
— multiflora Rchb. I. 292. †
— nudiflora Lindl. I. 292. no. 6.
— officinalis L. I. 292. †
— pallida Kit. 292. †
— *Simsii* Wall. I. 291. no. 1.
— speciosa Vis. II. 788. no. 3.
— sylvestris Briganti. I. 591. no. 2.
— Taurinensis DC. I. 292. †
Althaeastrum DC. I. 291.
Alypum Monspeliense seu frutex terribilis Bauh. IV. 176. no. 9.
— *salicifolium* Fisch. IV. 177. no. 10.
— *Solandri* Auctor. IV. 177. no. 10.
Alysicarpus Neck. I. 749. II. 528. II. 899.
— Belgaumensis Wght. II. 899. no. 3.
— bupleurifolius DC. *I. 749. no. 3.
— *bupleurifolius* Rxb. I. 749. no. 2.
— *cylindraceus* Desv. I. 749. no.5.
— *diversifolius* Wall. I. 749. no. 1. et no. 2.
— *glumaceus* Wall. I. 749. no. 6.
— Heyneanus Wght. et Arn. I. 750. no. 7.
— longifolius Wght. et Arn. I. 749. no. 4. *II. 899. no. 2.
— *ludens* Wall. I. 749. no. 3.
— nummularifolius DC. *I. 749. no. 1.
— *nummularifolius* DC.? I. 750. no. 8.
— *nummularioides* Zipp. I. 750. no. 8.
— *pilifer* Wall. I. 749. no. 5. *α.*
— pubescens Llawe. II. 899. no. 1.
— *Rubiharna* Wall. I. 749. no. 2.
— scaber Spanoghe. I. 750. no. 8.
— *scariosus* Grab. I. 749. no. 5. β.
— styracifolius DC. *I. 749. no. 5. c. var. *α.* et β.
— *styracifolius* Wall. I. 750. no. 7.
— Timorensis Spanoghe. I. 750. no. 9.
— vaginalis DC. *I. 749. no. 2.
β. Americanus Miquel. V. 528. no. 1.
— *vaginalis* Wall. I. 749. no. 4.
— *varius* Wall. I. 749. no. 1.
— Wallichii Wght. et Arn. I. 749. no. 6: (III. Emend. p. 4.)
Alyssineae DC. I. 139. V. 36.
Alyssoides DC. I. 141.
Alyssopsis Boiss. I. 134.

Alyssopsis deflexa Boiss. I. 134. no. 1.
Alyssum L. I. 142. II. 757. V. 36.
— affine Ten. I. 143. no. 2.
— aïzoides Boiss. I. 143. no. 8.
— alpestre All. I. 145. †
— Altaicum C. A. Meyer. I. 144. no. 19.
α. dasycarpum.
β. leiocarpum.
— *arcticum* Oed. I. 140. no. 4.
— arenarium Lois. I. 145. †
— arenarium Prsl. I. 143. no. 4.
— argenteum Vitm. I. 145. †
— Aucheri Boiss. I. 143. no. 11.
— *bidentatum* Nutt. I. 152. no. 53.
— calycinum L. I. 145. †
— campestre L. I. 145. †
— *Canariense* Delile. I. 142. no. 4.
— *canescens. α. abbreviatum* DC. I. 145. no. 1.
— *canescens* β. *elongatum* DC. I. 146. no. 2.
— *cochlearioides* Rchb. I. 154. no. 10.
— compactum Notaris. V. 36. no. 1.
— *dasycarpum* Stev. I. 142. no. 1.
— *dentatum* Nutt. I. 151. no. 47.
— *Dioscoridis* Column. III. 340. no. 21.
— *Dioscoridis montanum* Column. III. 344. no. 41.
— *dubium* Bory. I. 142. no. 1.
— edentulum W. et K. I. 145. †
— filifolium Wahlenbrg. I. 144. no. 15.
— foliosum Bory et Jaub. I. 143. no. 5.
— *fulvescens* Fleisch. I. 144. no. 17.
— Gemonense L. I. 145. †
— gnaphalodes DC. I. 140. no. 3.
— *halimifolium* Falk. I. 146. no. 2.
— hirsutum M. B. I. 145. †
— Horebicum Boiss. I. 143. no. 10.
— lepidotum Boiss. II. 757. no. 1.
— leucadeum Guss. I. 143. no. 3.
— *longicaule* Boiss. I. 142. no. 2.
— marginatum Steud. I. 144. no. 12.
— meniocoides Boiss. I. 144. no. 13.
— *meniscoides* Boiss. V. 36. no. 2.
— micranthum Fisch. et Mey. I. 144. no. 18.
— micropetalum Fisch. I. 145. †
— minimum Willd. I. 145. †
— minutiflorum Boiss. II. 758. no. 2.
— minutum Schlchtd. pat. *I. 144. no. 20.
— montanum L. I. 145. †
— murale W. et K. I. 145. †
— Nebrodense Tin. I. 145. †
— *obtusifolium* DC. I. 145. no. 3.
— parvulum Schrad. I 144. no. 21.
— peltarioides Boiss. I. 144. no. 14.
— Persicum Boiss. I. 143. no. 6.
— *purpureum* Lag. I. 142. no. 1.
Alyssum Rochelii Andrz. I. 145. †
— rostratum Stev. I. 145. †
— saxatile L. I. 145. †
— Scovitzsianum Fisch. et Mey. I. 144. no. 16.
— *serpyllifolium* M. B. I. 145. no. 1. *β.*
— *Sibiricum* Trevir. I. 142. no. 1.
— *Sibiricum* Willd. I. 145. no. 2.
— sinuatum L. I. 145. †
— Smyrnaeum C. A Meyer. I. 144. no. 17.
— *spatulathum* Steph. I. 140. no. 1.
— spinosum L. I. 142. no. 3.
— *tortuosum* DC. I. 145. no. 1. *α.*
— tetrastemon Boiss. I. 143. no. 7.
— tortuosum W. K. I. 145. †
— *tortuosum β.* DC. I. 145. no. 1. *β.*
— *tortuosum β. flexuosum* Rchb. I. 145. no. 1. *α.*
— vernale Kit. I. 145. †
— *versicaria* L. I. 141. no. 1.
— Wierzbickii Heuffel. I. 142. no. 1. I. 145. †
— Wulffenianum Bernh. I. 145. †
— xanthocarpum Boiss. I. 143. no. 9.
Alyxia R. Br. *VI. 467.
Alyxieae Alph. VI. 467.
Amajoua Aubl. II. 523. VI. 77.
— affinis Miquel. VI. 77. no. 2.
— grandifolia Miquel. VI. 77. no. 1.
— hirsuta Poepp. et Endl. II. 523. no. 1.
— Laureaster Mart. II. 523. no. 3.
— longifolia Poepp. et Endl. II. 523. no. 2.
— Surinamensis Steudel. VI. 77. no. 3.
— *dulcis* Gerard. III. 44. no. 43.
Amaracarpus Blume *II. 485.
Amaracus Mnch. III. 692. °III. 982.
— cordifolius Monbr. et Auch. III. 693. no. 3.
— Dictamnus Bth. III. 692. no. 1.
— *tomentosus* Mnch. III. 692. no. 1.
— Tournefortii Bth. III. 692. no. 2.
AMARANTHACEAE Juss. I. 260. ex p. III. 74.
Amaranthi Siculi Bocconis spica etc. Pluken. IV. 37. no. 1.
Amaria Mutis I. 850.
Amaria Nutt. *I. 855.
Amasonia Linn. fil. IV. 124.
— arborea H. B. Kth. IV. 124. no. 3.
— erecta Linn. fil. IV. 124. no. 1.
— hirta Bth. IV. 125. no. 5.
— integerrima Spr. IV. 125. no. 4.
— punicea Vahl. IV. 124. no. 2.
Amatula flava Medic. III. 101. no. 8.
— *rubra* Medic. III. 102. no. 9.
Amauria Bth. °VI. 183.
— rotundifolia Bth. VI. 183. no. 1.
Ambelania Aubl. *VI. 466.
Amberboa Pers. II. 670.

Amberboa carthamoides DC. VI. 291. no. 5.
— muricata DC. *II. 670. no. 1.
— *phaeopappa* DC. VI. 291. no. 1.
— *spectabilis* DC. VI. 291. no. 2.
Amblachaenium aurantiacum Turcz. VI. 333. no. 12.
Amblatum Dodon. III. 479. no. 1.
Amblotum Endl. III. 481.
— *Tournefortii* G. Don. III. 481. no. 5.
Ambleja Bth. III. 837. VI. 681. no. 15.
Ambloma Endl. II. 494.
Amblyanthus Alph. DC. *VI. 449.
Amblyocarpeae C. H. Schultz. II. 953.
Amblyocarpum Fisch. et Mey. *II. 650. *II. 953.
Amblyolepis DC. *II. 629.
Amblyopappus Hook. et Arn. II. 626.
— pusillus Hook et Arn. *II. 626. no. 1.
Amblysperma Bth. *II. 680. *VI. 317.
Ambraria Cruse. *II. 462.
Ambrosia Tournef. II. 606. II. 976. VI. 154.
— *absynthiifolia* Michx. II. 976. no. 1.
— *acanthocarpa* Hook. II. 606. no. 6.
— artemisiaefolia Linn. *II. 976. no. 1.
— artemisioides Meyen et Wlprs. VI. 154. no. 2.
— Chilensis Hook. et Arn. II. 606. no. 1.
— coronopifolia Torr. et Gr. II. 976. no. 2.
— *elatior* Linn. II. 976. no. 1.
— *fruticosa β.* DC. II. 607. no. 2.
— *heterophylla* Willd. II. 976. no. 1. *β.*
— *hispida* Torr. II. 976. no. 2.
— longistylis Nutt. II. 607. no. 3.
— *orobanchifera* Meyen. VI. 154. no. 1.
— *paniculata* Michx. II. 976. no. 1. *γ.*
— Peruviana Willd. *VI. 154. no. 1.
— scabra Hook. et Arn. II. no. 606. no. 2.
β. robusta. II. 607. no. 2.
α. tenuior.
— *Tacorensis* Meyen. VI. 153. no. 2.
Ambrosidium Nutt. II. 606. no. 5.
Ambrosieae DC II. 606. II. 976. VI. 150.
Amechania DC. *II. 724.
Amelanchier Medic. II. 55. II. 660.
— *alnifolia* Nutt. II. 55. no. 2. *δ.*
— Asiatica Endl. II. 55. no. 1.
— *Botryapium* DC. II. 55. no. 2. *α.*
— Canadensis Torr. et Gr. II. 55. no. 2.
δ. alnifolia.
α. Botryapium.
β. oblongifolia.
ζ. oligocarpa.
ε. pumila.
γ. rotundifolia.
— *florida* Lindl. II. 55. no. 2. *δ.* et diagnos. ibid. in adn.
— integrifolia Boiss. V. 660. no. 1.
Amelanchier intermedia E. Spach. II. 55. no. 2. β.
— *ovalis* DC. II. 55. no. 2. *γ.*
— *ovalis* Hook. II. 55. no. 2. *α.*
β. *semiintegrifolia* Hook. II. 55. no. 2. *δ.*
— parviflora Boiss. V. 660. no. 2.
— *pumila* Nutt. II. 55. no. 2. *ε.*
— *sanguinea* DC. II. 55. no. 2. ζ.
Ameletia DC. II. 101.
— Indica DC. II. 101. no. 1.
— *repens* Rottb. II. 101. no. 1.
— rotundifolia Wght. II. 101. no. 3.
— tenuis Wght. II. 101. no. 2.
Amelleae DC. II. 558. VI. 118.
Amelleae C. H. Schultz. II. 954.
Amelleae legitimae C. H. Schultz. II. 954.
Amelloideae N. ab E. II. 560. (Aster)
Amelloidei DC. II. 577. (Diplopappus)
Amellus Cass. *II. 558. *II. 954.. no. 1.
— *flosculosus* DC. II. 974. no. 1.
Ameria Bth. I. 864. I. 879. (Mimosa)
— *Acanthocarpae* (§. 4.) I. 881. V. 585. no 7.
— *Antrorsae* (§. 1.) I. 879.
— *Ephedroideae* (§. 7.) I. 879.
— *Paucifoliatae* (§. 6.) I. 872.
— *Pachycarpae* (§. 2.) I. 879.
— *Pedunculosae* (§. 5.) I. 881.
— *Stipellares* (§. 3.) I. 880.
Amerimnum P. Br. *I. 792.
— *Sieberi* Rchb. I. 792. no. 1.
Amerina A. P. DC. *VI. 555.
Amethystea Linn. III. 902. °III. 991.
— coerulea Linn. III. 902. no. 1.
— *corymbosa* Pers. III. 902. no. 1.
Amesthystoides Bth. III. 511..
Amherstia Wall. I. 844. V. 567.
— nobilis Wall. *I. 844. no. 1. V. 567. no. 1.
Amherstiae Bth. I. 843. II. 904. V. 565.
Amicia H. B. Kth. *I. 725. II. 288.
— Zygomeris DC. *II. 888. no. 1.
Amida Nutt. II. 630. *VI. 182.
— gracilis Nutt. II. 630. no. 1.
— hirsuta Nutt. II. 630. no. 2.
Amirola Pers. I. 421.
— *glandulosa* Hook. et Arn. I. 421. no. 1.
Ammannia Houst. II. 101. II. 916.
— aspera Guill. et Perr. II. 102. no. 9.
— *auriculata* DC. II. 102. no. 12. *δ.*
— *auriculata* Willd. II. 102. no. 12. *β.*
— *Borystenica* DC. V. 674. no. 1.
— *catholica* Cham. et Schlchtd. II. 102. no. 10.
— *coccinea* Pers. II. 101. no. 1.
— cordata Wght. II. 102. no. 15
— crassicaulis Guill. et Perr. II. 102. no. 8.
— *dodecandra* DC. II. 103. no. 5.
— floribunda Guill. et Perr. II. 102. no. 6.

Ammannia glauca Wall. II. 102. no. 16.
— gracilis Guill. et Perr. II. 102. no. 4.
— *hastata* DC. II. 102. no. 11.
— humilis Michx. *II. 102. no. 10.
— *humilis* Michx. var. β. II. 102. no. 10.
— *Indica* Spr. II. 101. no. 1.
— latifolia L. *II. 102. no. 11.
— *latifolia L. var.* β. II. 102. no. 11.
— *nana* Rxb. II. 101. no. 2.
— *occidentalis* DC. II. 102. no. 10.
— octandra L. *II. 101. no. 1.
— *pentandra* Rxb. var. *α.* et *β.* II. 101. no. 2.
— pentandra Rxb. *II. 101. no. 2.
— Prieureana Guill. et Perr. II. 102. no. 7.
— *racemosa* Poir. II. 102. no. 12. *γ.*
— *ramosior* Michx. II. 102. no. 10. β.
— robusta Heer. II. 916. no. 3.
— *rosea* Poir. II. 101. no. 2. *α.*
— rotundifolia Ham. II. 103. no. 18.
— *rubra* Wall. II. 101. no. 2.
— *sagittata* DC. II. 102. no. 11.
— salsuginosa Guill. et Perr. II. 102. no. 5.
— *Senegalensis* DC. II. 102. no. 12. *δ.*
— Senegalensis Lam. *II. 102. no. 12. *α.* Brasiliensis St. Hil.
— stylosa Fisch. et Mey. II. 102. no. 17.
— subspicata Bth. II. 916. no. 1.
— tenella Guill. et Perr. II. 102. no. 3.
— undulata C. A. Mey. II. 916. no. 2.
— verticillata Lam. *II. 102. no. 14. (c. var. *α* et *β.*)
— Wormskioldii H. Berol. II. 102. no. 13.
Ammi Tournef. *II. 392.
Ammileta Endl. II. 371.
Ammineae Koch. II. 391. V. 848.
Ammobium R. Br. *II. 641.
Ammodendron Fisch. I. 806.
— Eichwaldii C. A. Mey. I. 806. no. 1.
— Sieversii Fisch. I. 806. †
Ammodia Nutt. (II. 952.) II. 593. VI. 131.
— Oregona Nutt. *II. 593. no. 1. VI. 131. no. 1.
Ammogeton Schrad. *II. 697. *VI. 341.
— *scorzoneraefolium* Schrad. II. 685. no. 2.
Ammoseris Endl. *II. 695. II. 993.
— sarmetosa DC. *II. 993. no. 2.
— Surinamensis Miq. II. 993. no. 1.
Amolciachyris Torr. et Gr. *II. 951. no. 2.
Amonia agrimonoides Nestl. II. 37. no. 1.
Amoora Rxb. I. 428.
— ficiformis Wght. I. 428. no. 2.
— grandifolia Wlprs. I. 429. no. 5.
— Perrottetiana Wlprs. I. 429. no. 3.
— Rohituka Wght. et Arn. I. 428. no. 1. (III. Emend. p. 2.)
Amoora Timoriensis Wlprs. I. 429. no. 4.
Amooria Prsl. I. 641. no. 26.
— *calycina* Prsl. I. 640. no. 13.
— *macropoda* Prsl. I. 640. no. 14.
Amoreuxia Moç. et Sess. *II. 52.
Amorpha L. I. 654.
— Californica Nutt. I. 655. no. 3.
— Caroliniana Croom. I. 655. no. 2.
— *cyanostachya* Curtis. I. 655. no. 2.
— fragrans Sweet. I. 655. †
— fruticosa L. *I. 654. no. 1. (var. β.)
— *glabra* Desf. I. 654. no. 1. β.
— humilis Tausch. I. 655. no. 7.
— laevigata Nutt. I. 655. no. 4.
— nana Nutt. I. 655. †
— paniculata Torr. et Gr. I. 655. no. 5.
— Rabiae Llaw et Lexarz. I. 655. no. 6.
Ampacus latifolius Rmph. I. 520. no. 11.
AMPELIDEAE Kth. II. 817. I. 437. V. 377.
Ampelosicyos Pet. Thouars. V. 759. no. 1.
Ampelopsis DC. I. 441. V. 377. no. 3.
Ampelopsis Michx. I. 437.
— *aconitifolia* Bnge. I. 441. no. 50.
— *heterophylla* Blume. I. 441. no. 47.
— *Himalayana* Royle. I. 441. no. 48.
— *humulifolia* Bnge. I. 441. no. 49.
— *Indica* Blume. I. 441. no. 46.
— *latifolia* Tausch. I. 441. no. 53.
— *pubescens* Schlchtd. I. 441. no. 52.
— *serjaniaefolia* Bnge. I. 441. no. 51.
— *ternata* DC. I. 443. no. 30. β.
Amphiachaenia Nutt. II. 627. no. 3.
— *hirsuta* Nutt. II. 989 no. 1.
Amphianthus Torr. III. 335. °III. 968. *VI. 641.
— .... III. 335. no. 1.
— pusillus Torrey. III. 938.
Amphicarpaea Ell. I. 750.
— *monoica* Ell. I. 750. no. 1.
— monoica Torr. et Gr. *I. 750 no. 1.
— Pitcheri Torr. et Gr. I. 750. no. 2.
— *sarmentosa* Ell. I. 750. no. 1.
Amphicome Lindl. VI. 516. (*VI. 655.)
— arguta Royle. *VI. 516. no. 1.
Amphidoxa DC. *II. 647.
Amphiglossa DC. *II. 648.
Amphilochia Mart. *II. 68. II. 915.
— acuminulata Gardn. II. 915. no. 1.
Amphilophium Kth. *VI. 513.
Amphinomia decumbens DC. I. 592. no. 92. V. 457. no. 26.
Amphiotis DC. II. 496.
Amphirhaphis DC. II. 590. *II. 952. no. 29.
— leiocarpa Bth. II. 590. no. 1.
Amphiorhox Spr. I. 224.
— longifolius Spr. *I. 224. no. 1.

Amphodus Lindl. 751.
— ovatus Lindl. *I. 751. no. 1.
Amphithalea Eckl. et Zeyh. I. 581. II. 835.
— *ciliaris* Eckl. et Zeyh. I. 582. no. 1.
— *cuneifolia* Eckl. et Zeyh. I. 582. no. 1.
— cuneifolia Eckl. et Zeyh. II. 835. no. 1.
— densa Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 1. *II. 835. no. 2.
β. humilis I. 581. no. 1.
— densiflora Eckl. et Zeyh. I. 831. no. 3.
— *densiflora* Eckl. et Zeyh. II. 835. no. 5.
— ericaefolia Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 5. *II. 835. no. 6.
— hilaris Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 2.
— *hilaris* Eckl. et Zeyh. II. 835. no. 6.
— *humilis* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 1. β. II. 835. no. 4.
— *incurvifolia* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 5. β. II. 235. no. 5.
— *intermedia* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 4.
— intermedia Eckl. et Zeyh. II. 835. no. 4.
— *Kraussiana* Meisn. II. 835. no. 7.
— micrantha Wlprs. I. 582. no. 9.
α. nitida.
β. villosa.
— multiflora Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 4. *II. 835. no. 5.
— perplexa Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 8.
— phylicoides Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 7.
— spinosa Wlprs. I. 582. no. 12.
— verticillata Wlprs. I. 582. no. 11.
— violacea Bth. II. 835. no. 3.
— virgata Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 6. *II. 835. no. 7.
— Vogelii Wlprs. I. 582. no. 10.
Amphynemium H. B. Kth. I. 793.
— mediterraneum Mart. I. 793. no. 5.
— orbiculatum Bth. *I. 793. no. 2.
— pubescens H. B. Kth. *I. 793. no. 3.
— Rohrii H. B. Kth. *I. 793. no. 1.
— villosum Mart. I. 793. no. 4.
— violaceum Vogel. I. 793. no. 6.
Amsinkia Lehm. *VI. 562.
Amsonia Walt. *VI. 470.
AMYGDALEAE Endl. II. 8. II. 907. V. 648.
AMYGDALEAE Juss. V. 648.
Amygdalo-Persica Duham. II. 909. no. 8. δ.
Amygdalophora Neck. II. 8.
Amygdalus L. II. 8. II. 907.
— *amara* C. Bauh. II. 908. no. 8. α.
— Arabica Olivier. II. 907. no. 1.
— *argentea* Lam. II. 909. no. 11.
— *Besseriana* Schott. II. 908. no. 5.
— Bovei Spach. II. 910. no. 18.
— campestris Besser. II. 908. no. 5.
— Cochinchinensis Lour. *II. 910.
Amygdalus collina Wall. *II. 910.
— communis Linn. II. 908. no. 8.
α. amara II. 908. no. 8.
δ. Amygdalo-Persica II. 909. no. 8.
β. dulcis II. 908. no. 8.
γ. fragilis II. 909. no. 8.
— *communis α.* Ser. II. 908. no. 8. α.
— *communis β. dulcis* Ser. II. 908. no. 8. β.
— *communis δ. macrocarpa* Ser. II. 908. no. 8. β. II. 8. †
— *communis ε. persicoides* Ser. II. 909. no. 8. δ.
— *dulcis* C. Bauh. II. 908. no. 8. β.
— *dulcis* Mill. II. 909. no. 8. γ.
— eburnea Spach. II. 910. no. 16.
— elaeagnifolia Spach. II. 909. no. 12.
— Fischeriana Spach. II. 910. no. 19.
— *fragilis* Borkh. II. 909. no. 8. γ.
— frutescens Wendrth. *II. 910.
— furcata Spach. II. 910. no. 17.
— Georgica Dsfont. II. 908. no. 6.
— glandulosa Hook. II. 8. no. 1.
— horrida Spach. II. 909. no. 14.
— *hybrida* Dierbach. II. 909. no. 8. δ.
— incana Pall. II. 8. †
— *incana* Pall. II. 911. no. 2.
— Kotschyi Hohenack. II. 909 no. 9.
— lycioides Spach. II. 909. no. 13.
— *macrocarpa* Duham. II. 908. no. 8. β.
— *microcarpa* Duham. II. 908. no. 8. β.
— microphylla H. B. Kth. *II. 910.
— nana Linn. II. 907. no. 4.
γ. angustifolia II. 908. no. 4.
β. biserrata II. 908. no. 4.
δ. latifolia II. 908. no. 4.
— *nana δ. campestris* Ser. II. 908. no. 5.
— *nana β. Georgica* Ser. II. 908. no. 6.
— *nana* Thbrg. II. 9. no. 6.
— orientalis Mill. II. 909. no. 11.
β. discolor.
— *Pallasii* Turcz. II. 908. no. 7.
— pedunculata Pall. II. 908. no. 7.
— *Persica var. alba* Lindl. II. 8. †
— *Persico-amygdala* Dalech. II. 909. no. 8. δ.
— pilosa Turcz. II. 8. no. 2.
— *sativa* C. Bauh. II. 908. no. 8. β.
— scoparia Spach. II. 907. no. 3.
— Scorpius Spach. 910. no. 15.
— Sibirica Lodd. *II. 910.
— *Sibirica* Tausch. II. 908. no. 4. δ.
— Sinensis Hortor. *II. 910.
— spartioides Spach. II. 907. no. 2.
— tomentosula Hortor. *II. 910.
— Webbii Spach. II. 909. no. 10.
Amyrideae Endl. I. 560. V. 420.
Amyris L. I. 560. II. 831. V. 420.

Amyris? acuminata Rxb. I. 558. no. 2.
— *Agallocha* Rxb. I. 558. no. 2.
— *anisata* Willd. I. 559. no. 4.
— *commiphora* Rxb. I. 558. no. 2.
— decandra Brotero. V. 420. no. 1.
— *dentata* Willd. I. 381. no. 2.
— *Gileadensis* Linn. II. 830. no. 1.
— *Gileadensis* Rxb. I. 558. no. 1.
— heptaphylla Rxb. *II. 831. no. 1.
—? hexandra Hamilt. I. 560. no. 2.
— *Opobalsamum* Linn. II. 830. no. 1.
— papyrifera Delile. I. 560. no. 1.
— *papyrifera* Delile. V. 419. no. 1.
— *polygama* Cav. I. 551. no. 2. *α*.
— *pubescens* Willd. II. 830. no. 1.
— punctata Rxb. *II. 831. no. 2.
— *spinosa* Hb. Madr. I. 558. no. 1.
— terebinthifolia Tenore. I. 560. no. 3.
— *Zeylanica* Retz. I. 558. no. 1.
Anabata Willd. * VI. 499.
Anacampseros Linn. *II. 234.
ANACARDIEAE Lindl. I. 549. II. 829. V. 411.
Anacardium Bauhin. IV. 132. no. 1.
Anacardium Rottb. I. 555.
— occidentale L. I. 555. †
— curatellaefolium A. St. Hil. I. 555. no. 1.
— pumilum A. St. Hil. I. 555. no. 2.
Anacolosa Blume. I. 378.
Anactidea DC. VI. 194.
Anacyclus Pers. *II. 634.
Anagallideae Endl. VI. 447.
Anagallidium Griseb. * VI. 508.
Anagallis Tournef. * VI. 447.
— *aquatica* Dodon. III. 350. no. 78.
— *aquatica caule concavo* Caesalp. III. 349. no. 77.
— *aquatica major folio oblongo* C. Bauh. III. 349. no. 77. *β*.
— *aquatica minor altera* Tabernaem. III. 349. no. 77. *γ*.
— *aquatica minor folio oblongo* C. Bauh. III. 349. no. 77. *γ*.
— *aquatica quarta* Lob. III. 349. no. 75.
— *procumbens* Krok. III. 297. no. 1.
Anaglypha DC. *II. 585. *II. 951. no. 3.
Anagyris L. I. 562.
—? *barbata* Grah. II. 831. no. 1.
— *Indica* Hort. II. 831. no. 1.
— *Napalensis* Grah. V. 422. no. 1.
— Neapolitana Ten. I. 562. no. 1.
— *Nepalensis* Grah. II. 831. no. 1.
Anaïtis DC. *II. 622.
Analectis Juss. *IV. 134.
Anamirta Colebr. I. 95.
— *Baueriana* Endl. I. 96. no. 1.
— Cocculus Wght. et Arn. *I. 95. no. 1.
Anamirta paniculata Colebr. I. 95. no. 1.
Anandria DC. VI. 315.
Anandria (Gerbera) Sigesb. VI. 316.
Anandria Sigesb. *II. 680.
— *Bellidiastrum* DC. VI. 316. no. 18.
Anaphalis DC. *II. 649.
Anaphrenium E. Mey. V. 414.
— argenteum Arnott. V. 414. no. 1.
— longifolium Bernhardi. V. 415. no. 2.
— *mucronatum* Bernhardi. V. 415. no. 2.
Anaphysea Btb. II. 141. no. 7.
Anarmosa gracilis Miers. II. 265. no. 1. V. 807. no. 1.
Anarrhinum Dsfont. III. 186. °III. 959. * VI. 637.
— bellidifolium Dsfont. III. 186. no. 1.
— Duriminium Chavannes. III. 186. no. 2.
— fruticosum Dsfont. III. 187. no. 5.
— laxillorum Boiss. III. 187. no. 4.
— pedatum Dsfont. III. 187. no. 3.
— pubescens Fresen. III. 187. no. 6.
— *tenellum* Willd. III. 188. no. 1.
Anarthrosyne E. Mey. I. 736.
— robusta E. Mey *I. 736. no. 1.
Anastatica Gaertn. *I. 159.
Anastaticeae DC. I. 159.
Anastrabe E. Mey. III. 262. °III. 962. * VI. 641.
— integerrima E. Meyer. III. 262. no. 1.
— serrulata E. Meyer. III. 262. no. 2.
Anastraphia Don. * VI. 318.
Anatropa tenella Ehrenbg. I. 519. no. 1.
Anaxagorea St. Hil. I. 80.
— Javanica Blume. I. 80. no. 3.
— phaeocarpa Mart. I. 80. no. 2.
— prinoides St. Hil. *I. 80. no. 1.
Anaxanthus Endl. I. 80.
Anaxeton Cass. *II. 649.
Anblatum orientale, flore purpurascente Tournef. III. 481. no. 5.
— *Tataricum* Fisch. III. 462. no. 19.
Ancathia DC. *II. 670.
Anchieta St. Hil. I. 223.
— pyrifolia G. Don. I. 223. no. 2.
— salutaris St. Hil. I. 223. no. 1.
— Sellowiana Cham. et Schlchtd. I. 223. no. 3.
Anchonieae DC. I. 183.
Anchonium DC. *I. 183. II. 762.
— Tournefortii Boiss. II. 762. no. 1.
Anchusa Linn. VI. 559.
— lateriflora Dumort. VI. 559. no. 2.
— linearifolia Hochstett. VI. 559. no. 1.
— *verrucosa* Lej. VI. 559. no. 2.
Anchuseae A. P. DC. VI. 558.
Ancistrolobus Spach. I. 391.
— ligustrinus Spach. *I. 391. no. 1.
Ancistrostigma Fzl. II. 233. V. 784.
— cypseloides Fzl. *II. 233. no. 1. V. 784. no. 1.

Ancistrum Forst. II. 43.
Ancylanthus Dsf. *II. 489.
Ancylocalyx Tulasne. °V. 542.
— acuminata Tulasne. *V. 542. no. 1.
Ancyrostemma Poepp. et Endl. °V. 778.
— micranthum Poepp. et Endl. V. 778. no. 1.
Andersonia R. Br. II. 733. VI. 432.
— *acuminata* Rxb. II. 63. no. 3.
— *altissima* Rxb. II. 63. no. 2. *a.*
— aristata Lindl. II. 733. no. 1. VI. 433. no. 11.
— brevifolia Sonder. VI. 433. no. 7.
— Fraseri Sonder. VI. 433. no. 4.
— heterophylla Sonder. VI. 433. no. 9.
— involucrata Sonder. VI. 433. no. 5.
— *lanceolata* Rottl. II. 63. no. 3.
— Lehmanniana Sonder. VI. 432. no. 1.
— patens Sonder. VI. 432. no. 2.
— pauciflora Sonder. VI. 433. no. 6.
— prostrata Sonder. VI. 433. no. 8.
— pubescens Sonder. VI. 432. no. 3.
— *Rohituka* Rxb. I. 428. no. 1.
— variegata Sonder. VI. 433. no. 10.
β. subconcolor.
Andicola (Gentiana) VI. 504. no. 1.
Andina Salisb. III. 513.
Andira Lam. I. 803.
— acuminata Bth. I. 804. no. 19.
— Amazonum Mart. I. 803. no. 2.
— anthelmintica Bth. I. 803. no. 7.
— Aubletii Bth. *I. 803. no. 8.
— bracteosa Bth. I. 803. no. 1.
— fraxinifolia Bth. I. 803. no. 10.
— frondosa Mart. I. 803. no. 4.
— grandiflora Guill. et Perr. I. 804. no. 20.
— *Horsfieldii* Leschen. I. 804. no. 1. V. 546. no. 1.
— humilis Mart. I. 804. no. 15.
— laurifolia Bth. I. 804. no. 14.
— nitida Mart. I. 804. no 18.
— ormosioides Bth. I. 803. no. 5.
— paniculata Bth. I. 804. no. 17.
— parvifolia Mart. I. 804. no. 11.
— paucillora Bth. I. 804. no. 16.
— Pisonis Mart. I. 803. no. 6.
— rosea Mart. I. 803. no. 9.
— spinulosa Mart. I. 804. no. 12.
— stipulacea Bth. I. 803. no. 3.
— vermifuga Mart. I. 804. no. 13.
Andreoskia DC. I. 163.
Andreusia Don. *II. 723.
Andrewsia Galedupensis Dunal. VI. 740. no. 1.
— *glabra* Venten. IV. 136. no. 3.
Andrieuxia DC. *II. 612. VI. 160.
— Quitensis Bth. VI. 160. no. 1.
Androcera lobata Nutt. III. 91. no. 376.
Andromachia Humb. et Bonpl. II. 544.
— excelsa Poepp. et Endl. II. 544. no. 1.
Andromeda Linn. II. 728. VI. 419.
— *empetrifolia* Lam. VI. 417. no. 4. β.
— *humilis* Bnks. et Soland. VI. 417. no. 4. *a.*
— Karthagenensis Hook. II. 728. no. 1.
— phillyreaefolia Hook. VI. 419. no. 1.
Andromedeae Endl. II. 726. VI. 417.
Androsace Tournef. VI. 444.
— alismoides Hornem. VI. 444. no. 2.
— Jacquemontii Duby. VI. 445. †
— lactiflora Fisch. VI. 444. no. 3.
— Olympica Boiss. VI. 444. no. 1.
— parviflora Jacquem. VI. 445. †
— primuloides Duby. VI. 445. †
— sempervivoides Jacquem. VI. 444. †
Androsaemum Spach. II. 810.
— *Webbianum* E. Spach. I. 386. no. 27.
— xylosteifolium Spach. *II. 810. no. 1.
Androstoma Hook. fil. °VI. 423.
— empetrifolia Hook. fil. VI. 423. no. 1.
Andryala Linn. II. 698. *VI. 366.
Andryala Rth. II. 698.
— Agardhii Haensel. *II. 698. no. 1.
— *macrocephala* Boiss. II. 698. no. 2. β.
— Ragusina Linn. *II. 698. no. 2.
β. macrocephala. Boiss.
Andryaloidea DC. VI. 364. no. 13.
Andrzejowskia Rchb. I. 124.
— cardamine Rchb. *I. 124. no. 1.
Anemonanthea DC. I. 20.
Anemone L. I. 14. II. 738. V. 4.
— acanthifolia Rich. *II. 738. no. 4.
— *aconitifolia* Mchx. I. 28. no. 59.
— aconitifolia Turcz. I. 30. no. 69. a. II. 738. no. 1.
— *acutipetala* Schleich. I. 17. no. 6.
— aequinoctialis Poepp. I. 29. no. 64.
— *alba* Gilib. I. 25. no. 41.
— *alba* Juss. I. 23. no. 32.
— *alba* Lobel. I. 19. no. 15.
— Albana Stev. I. 18. no. 10.
— *albo-rosea* Gilib. I. 14. no. 1.
— alchemillaefolia E. Meyer. I. 10. no. 18.
— alpina L. I. 19. no. 15.
β. sulphurea.
— *alpina* Scop. I. 23. no. 31.
— Altaica Fisch. I. 25. no. 42.
— angulosa Lam. I. 31. no. 73.
— angustifolia Turczan. I. 16. no. 5. *a.*
— anomala Rafin. *I. 31. no. 7.
— *Antucensis* Knze. I. 27. no. 49.
— Antucensis Poepp. I. 26. no. 49.
— Apennina L. I. 21. no. 33.
— *Apennina* L. β. *parvula* DC. I. 24. no. 33.

Anemone apiifolia Scop. I. 19. no. 15.
— *arborea* Hort. I. 20. no. 16.
— *arctica* Fisch. I. 24. no. 37.
— Asiaticae I. 32. no. 16—19.
— Baikalensis Turcz. I. 30. no. 69 b. *II. 738. no. 2.
— *Baikalensis* Fisch. I. 26. no. 44.
— *Baldensis* Lam. I. 19. no. 15.
— Baldensis Linn. I. 23. no. 31.
— *Baldensis* L. β. I. 31. no. 2.
— *Baldensis* Sieb. I. 19. no. 15.
— barbulata Turcz. I. 29. no. 60.
— Berlandieri Pritzel. I. 22. no. 26.
— *bicolor* Poepp. I. 22. no. 23.
— biflora DC. I. 23. no. 29.
α. bifoliata.
β. trifoliata.
— *biflora. β. trifoliata* DC. I. 23. no. 28.
— Bogenhardiana Pritzel. I. 17. no. 7.
β. laciniata Bogenh.
— *borealis* Richards. I. 23. no. 30.
— Bungeana Pritzel. I. 18. no. 11.
— *Burseriana* Scop. I. 19. no. 15.
— *Canadensis* L. I. 28. no. 59.
— Capensis Lam. I. 20. no. 16.
— coerulea DC. I. 26. no. 46.
— Caroliniana Walt. I. 22. no. 25.
β. heterophylla.
— *Caucasica* Willd. I. 24. no. 33.
— cernua Thbg. I. 16. no. 3.
— *Chilensis* Spreng. I. 22. no. 24.
— Chinensis Bunge. I. 19. no. 14.
— *coerulea* Fisch. I. 17. no. 6.
— *coerulea* Lam.? I. 24. no. 33.
— *collina* Salisb. I. 17. no. 6.
— *Commersoniana* Rich. I. 28. no. 55.
— coronaria L. I. 20. no. 19.
β. pusilla.
— crassifolia Hook. I. 24. no. 34.
— *cuneata* Schlcht. pat. I. 23. no. 30.
— *cuneifolia* Juss. I. 23. no. 30.
— curta Wall. *I. 32. no. 12.
— cylindrica Gray. I. 27. no. 53.
— Daburica Fisch. I. 19. no. 13.
— *Dahurica* Lucae. I. 18. no. 9.
— decapetala L. I. 22. no. 23.
— deltoidea Hook. I. 24. no. 36.
— *dichotoma* L. 28. no. 59.
— discolor Royle. I. 27. no. 51.
— dubia Bell. *I. 31. no. 2.
— *dubia* Wall. I. 27. no. 50. β.
— *egregia forma* Rchb. I. 18. no. 9.
— elongata Don. I. 29. no. 62.
— *fasciculata* L. I. 30. no. 68.
— *fasciculata* Vahl. I. 30. no. 68.
— Fischeriana DC. I. 26. no. 44.
Anemone flava Gilib. I. 26. no. 45.
— flavescens Zucc. I. 16. no. 5 b.
— *Flemmensis* Scop. I. 19. no. 15.
— formosa Clark. I. 23. no. 28.
— fulgens Gay. I. 21. no. 20.
β. sepalis numerosis angustioribus.
— *fumariaefolia* Juss. I. 22. no. 27.
— *fragifera* Wulf. I. 23. no. 31.
— geraniifolia Wall. *I. 32. no. 14.
— *globosa* Nutt. I. 28. no. 56.
— Gmeliniana Prsl. *I. 31. no. 5.
— Gordschakowii Kar. et Kir. II. 738. no. 3.
— *Gouaniana* Wall. I. 29. no. 65.
— *Govaniana* Wall. V. 4. no. 2.
— *grandiflora* Hoppe. I. 19. no. 15.
— *Hackelii* Pohl. I. 15. no. 2. β. et δ.
— *Hackelii* Rchb. I. 16. no. 2. γ.
— Halleri All. I. 15. no. 2.
γ. auricoma.
β. Bohemica.
δ. Styriaca.
α. villosissima I. 15. no. 2.
— *Halleri* Schult. I. 14. no. 1.
— *Halleri* Tausch. I. 15. no. 2. β.
— helleborifolia DC. I. 29. no. 63.
— *helleborifolia* DC. var. I. 22. no. 23.
— *helloboriflora* Richter. I. 18. no. 9.
— Hepatica L. I. 30. no. 72.
β. acuta.
α. acutiuscula.
γ. obtusa.
— hepaticaefolia Hook. I. 30. no. 71.
— *heterophylla* Nutt. I. 22. no. 25.
— *hirsuta* Gilib. I. 23. no. 32.
— *hirsuta* Moench. I. 28. no. 55.
— *hispida* Wall. I. 29. no. 61.
— *hortensis* L. I. 31. no. 2.
— hortensis L. I. 21. no. 21.
— hortensis Willd. I. 21. no 20.
— *hortensis* Thor. I. 21. no. 20.
— *hortensis* var. *α. acutiflora* Spach. I. 21. no. 20.
— *Hudsoniana* Rich. I. 28. no. 55.
β. *sanguinea* Rich. I. 28. no. 56.
— *hybrida* Mik. I. 15. no. 2. β.
— Jamesonii Hook. V. 4. no. 1.
— Japonica Zucc. et Sieb. I. 28. no. 57.
— *incisa* Ldb. I. 26. no. 46.
— *indeterminata* Banks. I. 23. no. 30.
— *integrifolia* G. Don. I. 31. no. 74.
— integrifolia Spr. I. 31. no. 74.
— *intermedia* Schult. I. 18. no. 9.
— *intermedia* Winkl. I. 25. no. 41. γ.
— *irregularis* Lam. I. 28. no. 59.
— isopyroides Juss. I. 26. no. 43.
— *lancifolia* Pursh. I. 24. no. 38.

Anemone latifolia Bellard. I. 21. no. 20.
— lineariloba Fisch. *I. 31. no. 3
— *linearis* Schlchtd. I. 26. no. 46.
— *lobata* Hort. I 21. no. 22.
— *longipetala* Schleich. I. 17. no. 8.
— longiscapa Wall. *I. 32. no. 13.
— *Ludoviciana* Cutt. I. 16. no. 4.
— *lutea* DC. I. 19. no. 15.
— *lutea* Lam. I. 26. no. 45.
— *macrorhiza* Domb. I. 22. no. 23.
— *malvifolia* L. I. 21. no. 22.
— Mexicana H. B. Kth. I. 27. no. 54.
— *micrantha* Hort. I. 19. no. 15.
— *millefoliata* Bert. I. 19. no. 15.
— minima DC. I. 25. no. 39.
— minuta Laxm. I. 31. no. 6.
— mollis Wall. *I. 32. no. 11.
— montana Hoppe. I. 17. no. 8.
— *montana* Wirtgen. I. 17. no. 7.
— multifida Poir. I. 28. no. 55.
γ. globosa.
β. sanguinea.
— myrrhidifolia Vill. I. 19. no. 15.
— narcissiflora L. I. 30. no. 68.
var. monantha I. 31. no. 2.
— *narcissiflora* var. E DC. I. 30. no. 69 a.
— nemorosa L. I. 25. no. 41.
— *nemorosa* Linn. δ. *biflora* Hoppe. I. 25. no. 41.
— nemorosa L. β. coerulea I. 25. no. 41.
— *nemorosa* γγ. *flava* Peterm. I. 25. no. 41. γ.
— *nemorosa* L. γ. *hirsuta* Wierzb. I. 25. no. 41.
— *nemorosa* var. *Kamtschatkensis* Chamiss. I. 25. no. 42.
— *nemorosa* L. var. β. Mackay. I. 25. no. 41. α.
— *nemorosa* L. δδ. *micrantha* Peterm. I. 25. no. 41. ε.
— *nemorosa* L. β. *minor* Sutt. I. 25. no. 41. ε.
— nemorosa L. ε. parviflora Schlchtd. I. 25. no. 41. ε.
— nemorosa L. α. rubra I. 25. no. 41.
— nemorosa L. ϑ. *semiplena* I. 25. no. 41.
— *nemorosa* Linn. var. *Sibirica* Spreng. I. 26. no. 44.
— nemorosa L. γ. sulphurea I. 25. no. 41.
— *Nuttaliana* DC. I. 16. no. 4.
— *obsoleta* Hort.? I. 18. no. 10.
— obtusiloba D. Don. I. 29. no. 65. *V. 4. no. 2.
— *Ocholensis* Fisch. I. 23. no. 32. β.
— octopetala Patrin. *I. 31. no. 4.
— *Oenanthe* Ucria. I. 20. no. 19.
— palmata L. I. 21. no. 22.
Anemone parviflora Mchx. I. 23. no. 30.
— *patens* Hoppe. I. 15. no. 2. β. I. 17.
— patens L. I. 16. no. 4.
var. elongata I. 16. no. 5. ×
var. flaccida Lasch. I. 16. no. 3. ×
var. multifida I. 16. no. 4. ×
var. subintermedia Lasch. I. 16. no. 2. ×
— *pavonina* Lam. I. 21. no. 20. β.
β. *fulgens* DC. I. 21. no. 20.
— *pavonina* Lois. I. 21. no. 20.
— pedata Rafin. *I. 31. no. 8.
— Pennsylvanica L. I. 28. no. 59.
— *pentaphylla* Hook. I. 25. no. 41.
— *Pisciensis* Sism. I. 17. no. 6.
— polyanthes D. Don. I. 30. no. 70.
— *praecox* Salisb. I. 31. no. 72.
— *pratensis* C. Koch. I. 17. no. 8.
— *pratensis* Fl. Lyon. I. 17. no. 8.
— pratensis L. I. 17. no. 9.
— *pratensis* With. I. 17. no. 6.
— *pratensis* Pall. I. 23. no. 32.
β. *alba* Tausch. I. 18. no. 9.
var. *chlorantha* et *bicolor* Rchb. I. 18, 9. × 5.
var. *cylindriflora* I. 18. 9. × 2.
β. *intermedia* Schult. I. 17. no. 8.
β. *minor* Besser. I. 18. 9. × 4.
var. *multiplex* Tausch. I. 18. no. 9.
var. *patula* I. 18. 9. × 3.
β. *sulphurea* Tausch. I. 18. no. 9.
β. *versicolor* Andrzj. I. 18. 9. × 4.
— *propinqua* Lasch. I. 15. no. 1. ×
— *Pulsatilla* Hort. I. 15. no. 2. γ.
— Pulsatilla L. I. 17. no. 6.
— *Pulsatilla* var. *amoena* Lasch. I. 17. no. 6.
var. *angustisecta* Rchb. I. 17. no. 6.
var. *angustisepala* Bogenh. I. 17. no. 6.
var. *bicolor* Bess. I. 17. no. 6.
var. *calcarea* Hampe. I. 17. no. 6.
var. δ. *Dahurica* Herb. Lamb. I. 17. no. 6.
var. *inamoena* Lasch. I. 17. no. 6.
var. *latisecta* Rchb. I. 17. no. 6.
var. *nutans* Gaud. I. 17. no. 8.
var. *nutans* Schmitz et Regel. I. 17. no. 7.
— *punicea* Sism. I. 17. no. 6.
— *pusilla* DC. I. 20. no. 19.
— *Pyrenaica* Pall. I. 24. no. 33.
— *quinquefolia* L. I. 25. no. 41.
— ranunculoides L. I. 26. no. 45.
— *ranunculoides* Richards. I. 24. no. 37.
var. gracilis Cham. I. 26. no. 46.
— *ranunculoidi* × *nemorosa* Knze. I. 25. no. 41. γ.
— *reflexa* Led. (olim) I. 26. no. 46.
— *reflexa* Led. I. 26. no. 43.
— reflexa Steph. I. 26. no. 48.

Anemone Richardsoni Hook. I. 24. no. 37.
— rivularis Hamilt. I. 29. no. 61. *V. 4. no. 3.
— *rubra* Lam.? I. 17. no. 6.
— *rupestris* Jacq. I. 32. no. 21 b.
— rupestris Wall. *I. 32. no. 15.
— rupicola Cambess. I. 32. no. 21 b.
— *Salesovii* Fisch. I. 25. no. 42.
— *sanguinea* Pursh. I. 28. no. 56.
— Sellowii Pritzel. I. 27. no. 52.
— *Sibirica* Herb. Willd. I. 21. no. 21.
— Sibirica L. I. 24. no. 35.
— *silvestris* Vill. I. 18. no. 9.
— *speciosa* Adams. I. 30. no. 68.
— *sphenophylla* Knze. I. 22. no. 24.
— sphenophylla Poepp. I. 22. no. 24.
— *stellata* Lam. I. 21. no. 21.
— *sulphurea* All. I. 14. no. 1.
— *sulphurea* L. I. 19. no. 15.
— sylvestris L. I. 23. no. 32.
— *sylvestris β. alba minor* Schrank. I. 23. no. 30.
— *tenella* Banks. I. 23. no. 30.
— tenella Prsh. I. 22. no. 25.
— *tenuifolia* Schleicher. I. 17. no. 7.
— tenuifolia DC. I. 20. no. 17.
— tetrasepala Royle. I. 29. no. 67.
— trifolia L. I. 24. no. 38.
— *trilobata* Juss. I. 22. no. 23.
— triternata Vahl. I. 22. no. 27.
— *umbellata* Lam. I. 30. no. 68.
— *umbellata* Willd. I. 30. no. 68.
— *Uralensis* DC. I. 23. no. 31.
— Uralensis DC. I. 26. no. 47.
— *Uralensis* Fisch. I. 26. no. 46.
— umbrosa C. A. Meyer. I. 25. no. 40.
— *Vahlii* Hornem. I. 24. no. 37.
— Vahlii Hornem. *I. 32. no. 10.
— vernalis L. I. 14. no. 1.
— *vernalis γ.* L. I. 19. no. 15.
— *versicolor* Salisb. I. 21. no. 21.
— villosa Royle. I. 29. no. 66.
— Virginiana L. I. 28. no. 55.
— vitifolia Hamilt. I. 28. no. 58.
— Wallichiana Royle. I. 18. no. 12.
— Walteri Pursh. *I. 31. no. 9.
— Wightiana Hook. I. 27. no. 50.
β. major.
α. minor.
— *Wightiana* Wall. I. 27. no. 50. *α.*
— *Wolfgangiana* Bess. I. 16. no. 4.
Anemoneae DC. I. 9. II. 737. V. 4.
Anemopaegma Martius. *VI. 511.
Anemospermos DC. I. 27.
Anerincleistus Korthals. °V. 681.
— hirsutus Korthals. V. 681. no. 1.
Anesorhiza Cham. et Schlchtd. II. 400.
— Capensis Cham. et Schlchtd. *II. 400. no. 1.
— elata Eckl. et Zeyh. II. 400. no. 6.
— filicaulis Eckl. et Zeyh. II. 400. no. 4.
— hirsuta Eckl. et Zeyh. II. 400. no. 3.
— macrocarpa Eckl. et Zeyh. II. 400. no. 7.
— montana Eckl. et Zeyh. II. 400. no. 2.
— spuria Eckl. et Zeyh. II. 400. no. 5.
Anethum Tournef. II. 413.
— *Capense* Thnbrg. II. 400. no. 1.
— *segetum* d'Urv. II. 396. no. 1.
— Sowa Rxb. *II. 413. no. 1.
Anetia Endl. *I. 548.
Aneura Endl. I. 159. (ex p.)
Aneuriscus exserens Prsl. I. 394. no. 3.
Angelandra Endl. II. 605. II. 976. °VI. 149.
— pinnatifida Endl. *II. 976. no. 1. VI. 149. no. 1.
Angelica Linn. II. 406. II. 938.
— anomala Lallem. II. 938. no. 1.
— *Archangelica* Cham. et Schlchtd. V. 790. no. 1.
— *Archangelica* Linn. V. 873. no. 1.
— *Archangelica* Nees ab Esenb. V. 873. no. 1. *α.*
— *Archangelica β. litoralis* Whlnbrg. V. 873. no. 1. *β.*
— arguta Nutt. II. 406. no. 3.
— *chaerophyllea* Lottermoser. V. 870. no. 1.
— *Fischeri* Spr. II. 405. no. 1.
— genuflexa Nutt. II. 406. no. 2.
— *Gmelini* Wormskiold. V. 920. no. 1.
— *hirsuta* Mühlbrg. II. 407. no. 3.
— maculata Turcz. II. 406. no. 1.
— *maculata* Turcz. V. 920. no. 1.
— officinalis Hffm. *V. 873. no. 1.
α. sativa V. 763. no. 1.
— pachyptera Lallem. II. 938. no. 2.
— rosaefolia Hook. II. 938. no. 3. (c. var. *β.*)
— *saxatilis* Turcz. V. 871. no. 1.
— *scabra* Petit. II. 403. no. 1.
— *sylvestris* Turcz. II. 938. no. 1.
— *sylvestris alta* Gronov. II. 407. no. 3.
— *triquinata* Nutt. II. 407. no. 3.
— *verticillaris* Linn. V. 881. no. 1.
Angeliceae Koch. II. 406. V. 872.
Angelicoides DC. II. 410.
Angelonia Humb. et Bonpl. III. 178. III. 450. °III. 958. *VI. 636.
Angelonia Wlprs. VI. 636.
— *ciliata* Gardn. III. 450. no. 1.
— cornigera Hook. III. 450. no. 1.
— Gardneri Hook. III. 179. no. 7.
— hirta Cham. et Schlchtd. III. 179. no. 4.
— integerrima Spr. III. 179. no. 5.
— minor Fisch. et Mey. III. 179. no. 6.

Angelonia procumbens Nees et Mart. III. 178. no. 2.
— pubescens Bth. III. 178. no. 1.
— salicariaefolia Humb. et Bonpl. III. 178. no. 3.
Angiantheae DC. II. 643. VI. 228.
Angianthus Wendl. *II. 643. VI. 229.
— flavescens Steetz. *VI. 229. no. 1.
Angophora Cav. *II. 164. *II. 923.
Angulatae (Micania) DC. VI. 715. no. 23.
Anguria Linn. II. 197. V. 760.
— bignoniacea Poepp. et Endl. II. 197. no. 7.
— capitata Poepp. et Endl. II. 197. no. 5.
— dubia Hook. et Arn. II. 197. no. 1.
— eriantha Poepp. et Endl. II. 197. no. 3.
— multiflora Miquel. V. 760. no. 1.
— rhizantha Poepp. et Endl. II. 197. no. 6.
— speciosa Poepp. et Endl. II. 197. no. 2.
— spinulosa Poepp. et Endl. II. 197. no. 4.
Angustifoliae (Piptadenia) Bth. V. 579.
Angustifoliae (Salvia) Bth. III. 631.
Anhalonium Lemaire. °V. 812.
Anhalonium Lem. II. 309.
— elongatum Salm Dyck. V. 812. no. 2.
— prismaticum Lem. II. 309. no. 1.
— *prismaticum* Lem. V. 812. no. 2.
— *pulvilligerum* Lem. V. 812. no. 2.
— retusum Salm Dyck. V. 812. no. 1.
Anisadenia Wall. I. 259.
— saxatilis Wall. *I. 259. no. 1.
Anisandra Bartl. °VI. 675.
— glabra Bartl. *VI. 676. no. 1.
Aniseia Choisy. *VI. 541.
Anisocarpus Nutt. II. 632. VI. 184.
— madioides Nutt. *II. 632. no. 1. VI. 184. no. 1.
Anisochaeta DC. *II. 546.
Anisochilus Wall. III. 520. °III. 977.
— carnosum Wall. III. 520. no. 1.
γ. glabrum Bth.
β. purpurascens.
— dysophylloides Bth. III. 521. no. 4.
— *glabrum* Schrad. III. 520. no. 1. γ.
— pallidum Wall. III. 520. no. 2.
—? polystachyum Bth. III. 520. no. 3.
Anisodontia G. Don. III. 110.
Anisodus Lnk. III. 22. °III. 951.
— luridus Lnk. *III. 22. no. 1.
— *stramonifolius* G. Don. III. 22. no. 1.
Anisolepis Steetz. °VI. 231.
— Pyrethrum Steetz. *VI. 231. no. 1.
Anisolobus Alph. DC. *VI. 470.
Anisolotus anthylloides Bernh. I. 650. no. 24.
— *Wrangeliana* Bernh. I. 650. no. 25.
Anisomeles R. Br. III. 814. °III. 988.
— *australis* Spreng. III. 905. no. 9.
Anisomeles candicans Bth. III. 815. no. 6.
— *disticha* Heyne. III. 815. no. 5.
— Heyneana Bth. III. 814. no. 3.
— inodora R. Br. III. 814. no. 2.
— intermedia Wght. III. 815. no. 7.
— Malabarica R. Br. III. 815. no. 8.
— *mollissima* Wall. III. 815. no. 5. β.
— moschata R. Br. III. 814. no. 1.
— *Nepalensis* Spr. III. 847. no. 1.
— ovata R. Br. III. 815. no. 5.
β. mollissima.
— salviaefolia R. Br. III. 815. no. 4.
Anisomeris Prsl. II. 524. VI. 78.
— spinosa Prsl. *II. 524. no. 1. VI. 78. no. 1.
Anisopappus Hook. et Arn. *II. 700.
Anisopetala crispa DC. I. 459. } Pelargonium.
— *purpurascentia* DC. I. 458. } Pelargonium.
— *Radulae* DC. I. 459. } Pelargonium.
— *tomentosa* DC. I. 458. } Pelargonium.
Anisopleura Fnzl. °V. 863.
— crenata Fnzl. V. 863. no. 1.
Anisoptera Krthls. V. 124.
— costata Krthls. V. 125. no. 2.
— marginata Krthls. V. 124. no. 1.
Anisopterae Juss. V. 301. (Tetrapterys.)
Anisorhamphus DC. *II. 700. *VI. 366.
Anisosciadium DC. *II. 424.
Anisothea DC. I. 580. II. 834.
Anisotoma Fnzl. °VI. 494.
— cordifolia Fnzl. *VI. 494. no. 1.
Anisotome Hook. fil. °V. 868.
— antipoda Hook. fil. V. 869. no. 2.
— latifolia Hook. fil. V. 869. no. 1.
Anisotrichia DC. VI. 190.
Anisum DC. II. 395. V. 856.
— *Caffrum* Eckl. et Zeyh. II. 395. no. 5.
— *Stadense* Eckl. et Zeyh. II. 395. no. 6.
Ankyropetalum Fnzl. °V. 77.
— gypsophiloides Fnzl. V. 78. no. 1.
Anna Pinta V. 765. no. 2.
Anneslea Wall. I. 367.
— fragrans Wall. *I. 367. no. 1.
Annulares (Astragalus) DC. I. 702. II. 867.
Annularia Natalensis Hochstett. VI. 468. no. 1.
Anoda Cav. I. 313. II. 791.
brachyantha Rchb. I. 313. no. 1.
— *brachyantha* Rchb. II. 791. no. 3.
crenatiflora Ortega. II. 791. no. 4.
— cristata Schlchtd. II. 791. no. 1.
— *Dilleniana* Cav. II. 791. no. 1.
Dilleniana Schlchtd. II. 791. no. 2.
— ? incarnata H. B. Kth. *II. 792. no. 6.
— hastata Cav. II. 791. no. 2.
— lanceolata Hook. et Arn. I. 313. no. 2.
— *ovata* Meyen. V. 91. no. 8.

Anoda parviflora Cav. I. 313. †
— *parviflora* Cav. II. 791. no. 4.
— pubescens Schlchtd. II. 792. no. 5.
— triangularis DC. II. 791. no. 3.
— *triloba* Cav. II. 791. no. 1.
Anodendron Alph. DC. VI. 475.
— inflatum Hsskrl. VI. 475. no. 1.
Anodon Bnge. III. 427.
Anodontea DC. I. 143. no. 9. 11. 12. 13. 14. 21.
Anodopetalum Cunn. *II. 373.
Anogeissus Wall. II. 63.
— acuminata Wall. *II. 63. no. 3.
— latifolia Wall. II. 63. no. 2. c. varr. *α.* et *β.* ibid.
— leiocarpa Guill. et Perr. *II. 63. no. 1.
Anogra Spach. II. 79.
— *Douglasiana* Spach. II. 80. no. 4.
— *Nuttalliana* Spach. II. 80. no. 5.
— *pinnatifida* Spach. II. 79. no. 1.
Anoma Lour. *I. 855.
Anomalae (Physalis) G. Don. III. 26.
Anomalopteris longifolia G. Don. V. 286. no. 4.
— *obovata* G. Don. V. 286. no. 1.
— *spicata* G. Don. V. 286. no. 2.
Anomostephium DC. *II. 612.
Anona L. I. 86. II. 748. V. 15.
— acutiflora Mart. I. 87. no. 13.
— *arenaria* Thonn. et Schum. I. 89. no. 40.
— *Asiatica* L. I. 86. no. 1.
— *australis* St. Hil. I. 87. no. 15. *α.*
—? bibracteata Hook. I. 89. no. 35.
— bullata A. Rich. I. 89. no. 37.
— cauliflora Mart. I. 88. no. 26.
— Cherimolia Mill. *I. 88. no. 25.
— chrysocarpa Leprieur. I. 90. no. 42.
— chrysopetala Steudel. V. 15. no. 3.
— chrysophylla Bojer. V. 15. no. 1.
— coriacea Mart. I. 87. no. 5.
— cornifolia St. Hil. *I. 88. no. 19.
— crassiflora Mart. I. 87. no. 6.
— crotonifolia Mart. I. 88. no. 18.
— densicoma Mart. I. 87. no. 12.
— dioica St. Hil. *I. 87. no. 9.
— *dolabripetala* Raddi. I. 90. no. 1.
— *exalbida* Vellozo. I. 90. no. 5.
— *exsucca* Dun. I. 91. no. 13.
—? fagifolia St. Hil. et Tulasne. I. 89. no. 33.
— foetida Mart. I. 88. no. 27.
— furfuracea St. Hil. *I. 87. no. 10.
— *glabra* Forsk. I. 88. no. 23.
— glauca Schum. et Thonn. I. 89. no. 41.
— globiflora Schlchtd. I. 89. no. 39.
— *grandiflora* Bartr. I. 79. no. 53.
— grandifolia St. Hil. et Tulasne. I. 88. no. 31.
Anona hexapetala L. I. 80. no. 1.
— Hostmanni Steudel. V. 15. no. 2.
— hypoglauca Mart. I. 88. no. 21.
— laevigata Mart. I. 88. no. 30.
—? lasiocalyx Mart. I. 88. no. 28.
— laurifolia Dun. I. 90. †
— Marcgravii Mart. I. 86. no. 2.
— monticola Mart. I. 87. no. 7.
— *mucosa* Jcq. I. 88. no. 20.
— muricata L. *I. 86. no. 1.
— *muricata* Vand. I. 88. no. 23. et no. 24.
— nitida Mart. I. 87. no. 11.
— *obovata* Willd. I. 79. no. 53.
— obtusiflora Tussac. *I. 88. no. 20.
— paludosa Aubl. *I. 87. no. 8.
— palustris L. *I. 87. no. 15.
β. grandifolia Mart.
— peduncularis Steudel. V. 15. no. 4.
— Perrottetii Alph. DC. I. 89. no. 36.
— phaeoclados Mart. I. 87. no. 17.
— Pisonis Mart. I. 86. no. 3.
— reticulata L. *I. 88. no. 24.
— *reticulata* Sieb. I. 91. no. 15.
— rufa Prsl. I. 89. no. 38.
— Salzmanni Alph. DC. I. 87. no. 4.
— Senegalensis Pers. *I. 89. no. 40.
— sericea Dun. *I. 88. no. 22.
β. angustifolia Mart.
— sphaerocarpa Splitg. II. 748. no. 2.
— spinescens Mart. I. 87. no. 16.
— squamosa L. *I. 88. no. 23.
— *squamosa* Fl. Flum. I. 88. no. 20.
— *sylvatica* St. Hil. I. 90. no. 3.
— *sylvestris* Vellozo. I. 90. no. 3.
— tenuiflora Mart. I. 87. no. 14.
— tenuifolia Alph. DC. I. 90. no. 43.
— *triloba* L. I. 79. no. 51.
— *tripetala* Ait. I. 88. no. 25.
— velutina St. Hil. et Tulasne. I. 88. no. 32.
— vepretorum Mart. I. 88. no. 29.
— *xestropetala* Spr. I. 90. no. 1.
—? xylopiaefolia St. Hil. et Tulasne. I. 89. no. 34.
ANONACEAE Juss. I. 73. II. 747. V. 14.
ANONACEAE DC. (ex p.) I. 92. V. 15.
Anoneae Endl. I. 80. II. 747. V. 15.
Anonychium Bth. I. 861. V. 562.
Anonyma s. Gregorii, radice Dentariae Columm. III. 436. no. 1.
Anonymos baccifera etc. Pluk. IV. 127. no. 1.
— *Carolinensis* Walt. IV. 31. no. 79.
— *ciliatus* Walt. II. 550. no. 10. *δ.*
— *discoroides* Croom. I. 104. no. 1.
— *procumbens* Walt. II. 496. no. 34.
— *umbrosa* Walt. III. 291. no. 1.
— *uniflora* Walt. II. 551. no. 2.

Anoplanthus Endl. III. 480. °III. 975.
— coccineus Wlprs. III. 481. no. 4.
— comosus Wlprs. III. 480. no. 2.
— fasciculatus Wlprs. III. 480. no. 3.
— Tournefortii Wlprs. III. 481. no. 5.
— uniflorus Endl. III. 480. no. 1.
Anoplia Wllrth. VI. 150.
Anoplon G. Don. III. 480.
Anoplon Wllrth. III. 480.
— *Biebersteinii* C. A. Meyer. III. 481. no. 4.
— *biflorum* G. Don. III. 480. no. 1.
— *fasciculatum* G. Don. III. 480. no. 3.
— *Tournefortii* G. Don. III. 481. no. 4.
Anoplonychia Fnzl. V. 74. no. 1. 2. 3.
Anopterus Labill. *II. 379.
Anosmia Bernhrdi. II. 426.
— Idaea Bernhrdi. *II. 426. no. 1.
Anotis DC. II. 494. II. 497. (ex p.)
— *gentianoides* Endl. II. 495. no. 30.
— *lanceolata* DC. II. 496. no. 36.
— *longiflora* Bth. II. 497. no. 40.
— *rotundifolia* DC. II. 496. no. 34.
Antarctophila Griseb. VI. 505. no. 9.
Antennaria R. Br. II. 649.
— dimorpha Torr. et Gr. II. 649. no. 6.
— dioica Gaertn. *II. 649. no. 3.
β. parvifolia.
— luzuloides Torr. et Gr. II. 649. no. 2.
— *parvifolia* Nutt. II. 649. no. 3. β.
— *plantaginea* DC. II. 649. no. 4.
— plantaginifolia Hook. *II. 649. no. 4.
β. monocephala.
— racemosa Hook. II. 649. no. 5.
— rubicunda C. Koch. II. 649. no. 1.
Antennaricae Lssng. II. 648. VI. 219.
Antheeischima Krthls. V. 134.
— *excelsa* Krthls. II. 802. no. 1.
Anthema DC. I. 291.
— *Tenoreana* Prsl. I. 291. no. 10.
Anthadenia Van Houtte. °VI. 518.
— sesamoides Van Houtte. *VI. 518. no. 1.
Anthemideae Cass. II. 633. II. 991. VI. 185.
Anthemis DC. II. 633. VI. 185.
— absynthiifolia Boiss. et Spruner. VI. 189. no. 17.
— aciphylla Boiss. VI. 188. no. 14.
— Aizoon Griseb. VI. 187. no. 11.
β. Scardicola.
— arvensis Linn. *II. 633. no. 1.
β. Granatensis Boiss.
α. incrassata Boiss.
— auriculata Boiss. VI. 186. no. 3.
— Brachmanni Boiss. VI. 186. no. 5.
— carnea Boiss. VI. 185. no. 2.
— Chilensis Meyen et Wlprs. VI. 187. no. 9.
Anthemis chrysocephala Boiss. et Reut. II. 633. no. 2.
— Dalmatica Scheele. VI. 188. no. 12.
— *diffusa* Slzm. II. 633. no. 1. α.
— *fruticosa* C. H. Schmidt. VI. 210. no. 2.
— fumarioides Hochstett. VI. 185. no. 1.
— *glabra* Jcquem. II. 637. no. 2. VI. 201. no. 2.
— *Granatensis* Boiss. II. 633. no. 1. β.
—? *grandiflora* Jacquem. II. 637. no. 1.
— *incrassata* Lois. II. 633. no. 1. α.
— leucanthemoides Boiss. VI. 189. no. 18.
— odontostephana Boiss. VI. 187. no. 7.
— ormenioides Boiss. VI. 186. no. 4.
— pauciloba Boiss. VI. 189. no. 20.
— pectinata Boiss. et Reut. VI. 188. no. 13.
α. discoidea.
β. radiata.
— Persica Boiss. VI. 187. no. 8.
— Pseudocotula Boiss. VI. 186. no. 6.
— pterygantha C. Koch. II. 634. no. 4.
— pygmaea Bertoloni. VI. 722.
— Reuteriana Boiss. VI. 188. no. 16.
— *revoluta* C. H. Schmidt. VI. 210. no. 2.
— *rosea* Jcq. II. 637. no. 2.
— Sibthorpii Griseb. VI. 187. no. 10.
— Smyrnaea Boiss. VI. 188. no. 15.
— Taygetea Boiss. VI. 189. no. 19.
— tuberculata Boiss. II. 633. no. 3.
γ. discoidea.
β. microcephala.
— *vulgatior* Lobel. VI. 194. no. 1.
Antherura Lour. *II. 475.
Antherylium Rohr. *II. 112.
Anthocephalus A. Rich. II. 491.
— Chinensis A. Rich. *II. 491. no. 1.
— morindaefolius Krthls. II. 491. no. 2.
Anthocercis Labillard. III. 235. °III. 960. *VI. 633.
— albicans Cunningh. III. 235. no. 2.
— anisantha Endl. III. 236. no. 4.
— littorea Labill. III. 235. no. 1.
— viscosa R. Br. III. 235. no. 3.
Anthocleiste Afzel. *VI. 499.
Anthodiscus G. F. W. Meyer. I. 410.
— Guianensis G. F. W. Meyer. *I. 410. no. 1.
Anthodon Rz. et Pav. I. 400.
— *undulatum* Mart. I. 400. no. 3.
Anthodus undulatus Mart. I. 400. no. 3.
Antholoma Labill. *I. 399.
Anthonema Nutt. II. 372.
— *rhombifolia* Nutt. II. 372. no. 3.
Anthonota Palis. I. 845.
— elliptica Desv. I. 845. no 1.
Anthopterus Hook. *II. 724. VI. 415.
— mucronatus Bth. VI. 415. no. 1.

Anthospermeae Cham. et Schlchtd. II. 462. VI. 25.
Anthospermum Linn. II. 462. VI. 25.
— ciliare Linn. *II. 462. no. 1.
γ. angustifolium.
β. macrophyllum.
δ. scabrum.
— confertum Cruse. *II. 462. no. 3.
β. confertum.
γ. elongatum.
— ferrugineum Eckl. et Zeyh. II. 462. no. 2.
— *Galopina* Thnbrg. II. 462. no. 1.
— Lichtensteinii Cruse. *VI. 25. no. 1.
— rigidum Eckl. et Zeyh. II. 462. no. 4.
— spermacoceum Rchb. II. 462. no. 5. *VI. 25. no. 2.
Anthotroche Endl. III. 236. °III. 960. *VI. 655.
— pannosa Endl. III. 236. no. 1.
Anthotium R. Br. *II. 713. *VI. 394.
Anthriscus Hffm. *II. 422. V. 904.
— Anatolica Boiss. V. 904. no. 1.
— laevigata Griseb. V. 905. no. 4.
— lamprocarpa Boiss. V. 904. no. 2.
— tenerrima Boiss. et Spruner. V. 905. no. 3.
α. leiocarpa.
β. scabricarpa.
Anthyllis I. 634. II. 846.
— argentea Desvx. I. 634. no. 8.
— *argentea* Desvx. II. 847. no. 1.
— Chilensis Dsvx. I. 650. no. 24.
— *Cretica* Lam. II. 898. no. 1.
— *erinacea* L. I. 626. no. 1.
— *Gerardi* L. I. 647. no. 1.
— hamosa Dsf. *I. 634. no. 7.
— Hermanniae L. I. 635. †
— *heterophylla* L.? I. 647. no. 1.
— macrocarpa Wendrth. I. 634. no. 5.
— montana L. I. 635. †
— *onobrychioides* Cav. I. 647. no. 1.
— podocephala Boiss. I. 634. no. 2.
— Pseudocytisus Wlprs. II. 846. no. 1.
— Ramburei Boiss. I. 634. no. 4.
— *sericea* Willd. II. 899. no. 6.
— Tejedensis Boiss. I. 634. no. 3.
— tetraphylla L. *I. 634. no. 6.
— *vulneraria* I. 634 no. 5.
— Webbiana Hook. I. 634. no. 1.
— *Webbiana* B. Webb. I. 634. no. 3.
Anthylloidei DC. I. 706. II. 875.
Anticharis Endl. III. 284. °III. 965. *VI. 641.
— Arabica Endl. III. 284. no. 1.
Antidaphne Poepp. et Endl. II. 436. V. 935.
— viscoidea Poepp. *II. 436. no. 1. V. 935. no. 1.
Antiphytum A. P. DC. *VI. 562.
Antirhoea Commers. *II. 487.
Antirrhinastrum Chavannes. III. 222.
Antirrhineae Chavannes. III. 186. III. 959. VI. 637.
Antirrhinideae Bth. VI. 634.
Antirrhinon Caesalp. III. 222. no. 1.
Ἀντίῤῥινον Theophr. III. 224. no. 11.
Antirrhinum Dodon. III. 223. no. 6.
Antirrhinum Juss. III. 221. III. 451. °III. 959. *VI. 638.
— *acutangulum* Ten. III. 191. no. 9. β.
— *Aegyptiacum* Linn. III. 195. no. 26.
— *Aegyptiacum foliis ovatis glabris subdentatis* Forsk. III. 195. no. 26.
— *aerugineum* Gouan. III. 214. no. 85.
— *albifrons* Sm. III. 212. no. 81.
— *album* Lam. III. 209. no. 72.
— *alpinum* Linn. III. 216. no. 89.
— *amethysteum* Lam. III. 219. no. 100.
— *angustifolium* Poir. III. 224. no. 8.
— *angustifolium* d'Urville. III. 224. no. 8. γ.
— *angustifolium sylvestre* J. Baub. III. 225. no. 11.
— *angustissimum* Loisel. III. 203. no. 53.
— *aparinoides* Willd. III. 205. no. 59.
— aquaticum Lour. *III. 225.
— *arenarium* Poir. III. 217. no. 93.
— *arvense* α. Linn. III. 213. no. 83.
— *arvense* β. γ. Linn. III. 213. no. 83. β.
— *arvense* Rivin. III. 225. no. 11.
— *arvense majus* C. Bauh. III. 225. no. 11.
— *arvense minus* C. Bauh. III. 190. no. 6.
— Asarina Linn. III. 221. no. 1.
— *asarinum* Lam. III. 222. no. 1.
— aureum Nois. *III. 225.
— *Bauhini* Gaud. III. 203. no. 53.
— *bellidifolium* Linn. III. 186. no. 1.
— *bicorne* Linn. III. 183. no. 13.
— *bipartitum* Vent. III. 208. no. 68.
— *bipunctatum* Cav. III. 219. no. 100.
— *bipunctatum* Hortul. III. 206. no. 62.
— *bipunctatum* Linn. III. 219. no. 101. β.
— *bipunctatum* Thuill. III. 214. no. 87.
— *Broussonnettii* Poir. III. 218. no. 98.
— *caesium* Lagasca. III. 220. no. 105.
— *Canadense* Linn. III. 210. no. 73.
— *calycinum* Lam. III. 225. no. 11.
— *Capense* Thnbrg. III. 184. no. 17. III. 185. no. 26.
— *capitatum* Prsl. III. 224. no. 7.
— *capitellatum* Lam. III. 219. no. 101. β.
— *Chalepense* Linn. III. 209. no. 72.
— *commune* Lam. III. 203. no. 54.
— cordatum Buch. *III. 225.
— Corsicum Vilm. *III. 226.
— *crassifolium* Cav. III. 189. no. 3. γ. VI. 637. no. 4.

Antirrhinum Cymbalaria Linn. III. 190. no. 9.
— *Cymbalaria* Sieb. III. 191. no. 9. δ.
— *Cymbalaria* β. Lois. III 191. no. 10.
— *Dalmaticum* Lam. III. 201. no. 48.
— *dentatum* Poir. III. 185. no. 28.
— *dentatum* Vahl. III. 192. no. 14.
— *diffusum* Bernh. III. 223. no. 5.
— *dubium* Vill. III. 215. no. 87. β.
— *Duriminium* Broter. III. 186. no. 2.
— *Elatine* Linn. III. 193. no. 19.
— elatiniflorum Whlbrg. III. 225. no. 12.
— *elatinoides* Tenore. III. 194. no. 19.
— *elatinoides* Willd. III. 192. no. 15.
— *elegans* Dsf. III. 219. no. 100.
— *elegans* Tenore. III. 225. no. 11.
— *filiforme* Poir. III. 189. no. 5.
— *flavum* Poir. III. 199. no. 41.
— flexuosum Willd. III. 189. no. 4.
— *floribus luteis* Lobel. III. 223. no. 5.
— *foliis oppositis cordatis crenatis* Linn. III. 222. no. 1.
— *fruticans* Thnbrg. III. 181. no. 18.
— *fruticosum* Willd. III. 195. no. 27.
— *galioides* Lam. III. 211. no. 76. γ.
— *genistifolium* Lapeyr. III. 203. no. 54.
— *genistifolium* Linn. III. 201. no. 50.
— *genistifolium* γ. M. Bieb. III. 201. no. 50. β.
— *genistifolium* Vill. III. 203. no. 53.
— *gibbosum* Wall. III. 225. no. 11. β.
— *glandulosum* Lej. III. 204. no. 54. β.
— glandulosum Lindl. III. 224. no. 9.
— *glaucum* Cav. III. 219. no. 101. β.
— *glaucum* Lapeyr. III. 215. no. 87. β.
— *glaucum* Linn. III. 219. no. 101.
— *glaucum* Thore. III. 200. no. 43.
— *Graecum* Bory et Chaub. III. 194. no. 21.
— *grandiflorum* Stock. III. 223. no. 6.
— *Haelava* Forsk. III. 216. no. 90.
— *hederaceum* Lam. III. 191. no. 9.
— *hederaefolium* Poir. III. 191. no. 9. γ.
— *hepaticaefolium* Poir. III. 191. no. 10.
— *heterophyllum* Willd. III. 196. no. 31.
— *hexandrum* Forst. III. 292. no. 4.
— *hirtum* Linn. III. 198. no. 35.
— Hispanicum Chavannes. III. 222. no. 4.
— *Hispanicum altissimum angustissimo folio* Tournef. III. 221. no. 8. γ.
— *Hispanicum saxatile Dictamni Cretici folio* Vaill. III. 222. no. 2.
— *Hispanicum villosum, Origani folio* Tournef. III. 222. no. 4.
— *hybridum* Hth. III. 223. no. 5. β.
— *Jamaicense* Fisch. III. 225. no. 11.
— *incarnatum* Lam. III. 208. no. 69.
— Italicum Mill. III. 226.
Antirrhinum junceum Lam. III. 208. no. 66.
— *junceum* Linn. III. 208. no. 67.
— *junceum* Pall. III. 203. no. 52.
— *lagopodioides* Linn. III. 217. no. 94.
— *lanigerum* Brot. III. 193. no. 16.
— *lanigerum* Willd. III. 193. no. 17.
— latifolium DC. III. 222. no. 5.
β. hybridum Chav. III. 223. no. 5.
— *latifolium β. striatum* DC. III. 223. no. 5. β.
— *latifolium* Mill. III. 223. no. 5. β.
— *latifolium pallido amplo flore* Bocc. III. 223. no. 5.
— *Lilii candore* Cup. III. 221. no. 8.
— *Linaria* Linn. III. 203. no. 54.
— *Linaria* var. Linn. III. 203. no. 53.
— *Linaria* M. Bieb. III. 204. no. 55.
— *linarioides* Linn. III. 221. no. 112.
— linarioides Linn. III. 225. no. 13.
— *linifolium* Linn. III. 202. no. 51.
— *linifolium* Pall. III. 205. no. 58.
— *littorale* Bernhardi. III. 190. no. 8.
— *longicorne* Thnbrg. III. 180. no. 8.
— *Lusitanicum* Lam. III. 200. no. 44.
— *luteo flore* C. Bauh. III. 223. no. 5.
— *macrocarpum* Ait. III. 185. no. 23.
— *macrourum* M. Bieb. III. 205. no. 58.
— *majus* Bessl. III. 223. no. 6.
— majus Linn. III. 223. no. 6.
— *majus α.* Linn. III. 223. no. 5.
— *majus alterum folio longiore* C. Bauh. III. 223. no. 8.
— majus Linn. β. angustifolium III. 223. no. 6.
— *majus angustifolium amplo flore purpureo Romanum* Barrel. III. 221. no. 7.
— *majus angustissimis foliis, flore purpurascente minore* Barrel. III. 224. no. 8.
— *majus flore rubro* Cast. III. 221. no. 7.
— *majus β. latifolium* Duby. III. 223. no. 5.
— majus L. var. quadricolor Paxt. III. 935.
— *marginatum* Lam. III. 213. no. 81.
— *maritimum* Poir. III. 215. no. 87. γ.
— *meonanthum* Lnk. et Hffmsgg. III. 222. no. 3.
— *micranthum* Cavan. III. 212. no. 82.
— *minimum* J. Bauh. III. 190. no. 6.
— *minimum forsan Archigenis Orontium* Lob. III. 225. no. 11.
— *minus* Linn. III. 190. no. 6.
— *minus amplo flore albo* Barrel. III. 225. no. 11.
— *minus* etc. Tabern. III. 190. no. 6.
— *minus flore carneo* Barrel. III. 225. no. 11.
— molle Linn. III. 222. no. 2.

Antirrhinum molle St. Am. III. 222. no. 3.
— *Monspessulanum* Linn. III. 211. no. 76. β.
— *Monteridense* Hort. III. 223. no. 6.
— Montevidense Martius. III. 223. no. 6. adn.
— *multicaule* Linn. III. 219. no. 101. γ.
— *multicaule* Ten. III. 206. no. 59.
— *multipunctatum* Brot. III. 219. no. 100. β.
— *murale* Salisb. III. 223. no. 6.
— *neglectum* Spr. III. 198. no. 37.
— *ocymifolium* Pourr. III. 221. no. 113.
— ocymifolium Pourr. III. 225. no. 14.
— *odoratissimum* Güldenst. III. 202. no. 52.
— *odorum* M. Bieb. III. 202. no. 52.
— *oppositiflorum* Poir. III. 188. no. 2.
— orbiculare Medic. *III. 226.
— *orchidiflorum* Hort. Paris. III. 208. no. 68.
— *origanifolium* Gouan. III. 189. no. 5
— *origanifolium* Linn. III. 188. no. 3.
— Orontium Linn. III. 224. no. 11.
— *Orontium β. album* Rth. III. 225. no. 11.
γ. grandiflorum Chav. III. 225. no. 11.
β. Indicum Chavannes. III. no. 11.
— *Osyris* Cyrill. III. 209. no. 72.
— Osyris Raeusch. *III. 226.
— papilionaceum Linn. *III. 226.
— *parviflorum* Jcq. III. 213. no. 83.
— *parviflorum* Willd. III. 212. no. 82.
— *patens* Thnbrg. III. 185. no. 27.
— *pauciflorum* Poeppig. III. 210. no. 73.
— *pedunculatum* Linn. III. 199. no. 40.
— *Pelisserianum* Linn. III. 212. no. 79.
— *pilosum* Linn. III. 192. no. 12.
— *pinifolium* Poir. III. 206. no. 61.
— pinnatum Linn. *III. 226.
— *polygalaefolium* Poir. III. 203. no. 53.
— *polygonifolium* Poir. III. 218. no. 97.
— porcinum Lour. *III. 226.
— *primum et secundum* Matth. III. 223. no. 6.
— *prostratum* Cyrill. III. 199. no. 39.
— *pubescens* Pers. III. 190. no. 8.? III. 217. no. 93.
— *pubescens* Ten. III. 191. no. 11.
— *purpureum* Schkuhr. III. 210. no. 76.
— *purpureum sive album* Ger. III. 223. no. 6.
— *Pyrenaicum* Ramond. III. 215. no. 87. β.
— *quartum* Matth. III. 225. no. 11.
— *quinquelobum* Stok. III. 191. no. 9.
— *reflexum* Linn. III. 199. no. 39.
— *repens* Linn. III. 210. no. 76.
— *repens β. Monspessulanum* Pers. III. 211. no. 76. β.
— *reticulatum* Sm. III. 206. no. 61.
— *ryditocarpum* G. Don. III. 224. no. 10.
— ryditospermum Fisch. et Mey. III. 224. no. 10. *III. 451. no. 1.
Antirrhinum ryditospermum Fisch. et Mey. III. 451. no. 117.
— *sagittatum* Poir. III. 196. no. 31.
— *sapphirinum* Brot. III. 219. no. 100.
β. *incarnatum* Pers. III. 208. no. 69.
— *saturejaefolium* Vaill. III. 224. no. 8. γ.
— *saxatile* Linn. III. 217. no. 94.
— *saxatile minus Origani folio viscoso, flore albo amplo* Barrel. III. 188. no. 2.
— *saxatile Serpylli folio* C. Bauh. III. 189. no. 5.
— *saxatile* Bonam. III. 217. no. 93.
— scabridum Bnks. III. 185. no. 21.
— *scabrum* Thnbrg. III. 185. no. 23.
— *scariosum* Lam. III. 192. no. 14.
— sempervirens Lapeyr. III. 222. no. 3.
— *serpyllifolium* Pourr. III. 188. no. 2.
— *Siculum γ.* Guss. III. 224. no. 8. β.
— Siculum Ucria. III. 224. no. 8.
γ. elatum Chavannes.
β. glandulosum Chavannes.
— *simplex* Lnk. III. 214. no. 87.
— *simplex* Willd. III. 213. no. 83. β.
— *sparteum* Linn. III. 208. no. 66.
— *sparteum* Slzm. III. 199. no. 40.
— *speciosum* Donn. III. 208. no. 68.
— *spinescens* Viv. III. 195. no. 26.
— *spurium* Linn. III. 193. no. 18.
— *striatum* Lam. III. 210. no. 76.
— *strictum* Sm. III. 205. no. 59.
— *strumosum* Bnks. III. 182. no. 1.
— *subalpinum* Brot. III. 219. no. 100.
— *subulatum* Cyrill. III. 203. no. 52.
— *supinum β. γ.* Lapeyr. III. 215. no. 87. β.
— *supinum* Linn. III. 214. no. 87.
— *supinum* Sibthrp. et Sm. III. 451. no. 121.
— *sylvestre minimum* Park. III. 190. no. 6.
— *sylvestre sive Phyteuma* Dod. III. 225. no. 11.
— *tenellum* Cav. III. 188. no. 1.
— *tenellum* Prsh. III. 231. no. 1.
— tenue Viv. III. 225. no. 15.
— *tenue* Viv. III. 221. no. 114.
— *tertium* Cam. III. 190. no. 6.
— *thymifolium* Vahl. III. 200. no. 43.
— tortuosum Rosc. III. 224. no. 7.
— *Tournefortii* Poir. III. 217. no. 94.
— *tricolor* Hortor. III. 198. no. 37.
— *tricolor* Pourr. III. 219. no. 101. γ.
— *triornithophorum* Linn. III. 197. no. 33.
— *triphyllum* Cavan. III. 198. no. 36.
— *triphyllum* Linn. III. 198. no. 37.
— *triste* Linn. III. 214. no. 85.
— variabile Lnk. *III. 226.
— *versicolor* Lapeyr. III. 215. no. 87. β.
— *versicolor* Linn. III. 206. no. 62.

Antirrhinum villosum Lapeyr. III. 189. no. 3. *β.*
— *virgatum* Brot. III. 208. no. 67.
— *virgatum* Poir. III. 199. no. 38.
— *viscosum* Aubry. III. 217. no. 93.
— *viscosum* Curtis. III. 198. no. 35.
— *viscosum* Linn. III. 207. no. 64.
— *vulgare* J. Bauh. III. 223. no. 6.
— *vulgo caput canis et caput vituli* Lob. III. 223. no. 6.
Antistrophe Alph. DC. *VI. 449.
Antithrixia DC. *II. 650.
Antomarchia rubra Colla. I. 506. no. 6.
Antonia Pohl. *VI. 497.
Antonieae Endl. VI. 497.
Antopetitia A. Rich. I. 724. V. 519.
— Abyssinica A. Rich. *I. 724. no. 1. *VI. 519. no. 1.
Antrorsae Bth. I. 879. (Mimosae sect *Ameria.*)
Antrospermum C. H. Schultz. °VI. 277.
— Kraussii C. H. Schulz. VI. 277. no. 1.
Anvillea DC. *II. 602.
Anychia Baldwinii Torr. et Gr. I. 262. no. 14.
— *Canadensis* Ell. I. 262. no. 13. *α.*
— *capillacea* Nutt. I. 262. no. 13.
— *dichotoma* Michx. I. 262. no. 13. *β. capillacea* Torr.
Aotus Sm. I. 572. [*II. 832.] V. 429.
— cordifolius Bth. I. 572. no. 1.
—? dillwynioides Meisn. V. 430. 4.
— gracillima Meisn. V. 429. no. 1. *β.* uncinata.
— intermedia Meis. V. 429. no. 2.
— passerinoides Meisn. V. 430. no. 5.
— procumbens Meisn. V. 430. no. 3.
Apargia DC. II. 688.
Apargia Lssng. *VI. 325.
— *borealis* Bngrd. VI. 362. no. 1.
— *Chilensis* H. B. Kth. VI. 330. no. 8.
— *variegata* Willd. VI. 334. no. 15.
Apargidium Torr. et Gr. II. 698. °VI. 362.
— boreale Torr. et Gr. *II. 698. no. 1. VI. 362. no. 1.
Apatanthus Viv. *II. 701. no. 1.
Apeiba Aubl. *I. 352. II. 798. V. 116.
— *australis* A. Rich. I. 353. no. 1. V. 117. no. 1.
— hypoleuca Steudel. V. 116. no. 1.
— laevis G. Don. II. 798. no. 1.
Aphanamixis grandifolia Blume. I. 429. no. 5.
— *Perrottetiana* A. Jussieu. I. 429. no. 3.
— *Timoriensis* A. Juss. I. 429. no. 4.
Aphanes Linn. II. 42.
Aphania Blume. I. 420.
— montana Blume. I. 420. no. 1.
Aphanochilus Bth. III. 581.
— *blandus* Bth. III. 582. no. 5.
— *eriostachyus* Bth. III, 583. no. 1.
— *flavus* Bth. III. 281. no. 11
— *foetens* Bth. III. 582. no. 6.
— *paniculatus* Bth. III. 582. no. 6.
— *pilosus* Bth. III. 583. no. 10.
— *polystachyus* Bth. III. 582. no. 3.
Aphanopappus Endl. VI. 170. II. 620.
— Nuttallii Wlprs. VI. 170 no. 1. *II. 620. no. 1.
Aphanopetalum Endl. II. 373. V. 829
— resinosum Endl. *II. 373. no. 1. V. 829. no. 1.
Aphanostemma St. Hil. I. 33.
— apiifolium St. Hil. *I. 33. no. 1.
Aphanostephus DC. *II. 585. II. 958. *II. 951. no. 9.
Riddellii Torr. et Gr. II. 958. no. 1.
Aphelexis Boj. *II. 646.
Aphloïa Bennet. I. 204.
— integrifolia Endl. *I. 204. no. 1.
— theaeformis Endl. *I. 204. no. 2.
Aphragmus Andrz. I. 174.
— Eschscholtzianus Andrz. *I. 174. no. 1.
Aphyllae (Acacia) Bth. I. 883. V. 588.
Aphyllanthes anguillare Cam. IV. 175. no. 5.
Aphyllon (Chorozema) DC. V. 425. no. 3.
Aphyllopoda DC. VI. 364. no. 11.
Apiastrum Nutt. II. 428.
— angustifolium Nutt. II. 428. no. 1. *β.* tenellum.
— latifolium Nutt. II. 428. no. 2.
Apios Boerh. I. 770.
— *pubescens* Nutt. I. 770.
— tuberosa Mech. *I. 710. c. varr. *β.* et *γ.* ibid.
Apium Hffm. II. 391.
— Chilense Hook. et Arn. II. 391. no. 2.
— *Chilense* Hort. Paris. II. 391. no. 1.
— decumbens Eckl. et Zeyh. II. 391. no. 1.
— *involucratum* Rxb. II. 395. no. 3.
— *prostratum* Rnge. V. 849. no. 2.
— *radice crassa etc.* Burm. II. 400. no. 1.
— *trifoliatum* Rxb. II. 392. no. 2.
Aplectreae Boiss. V. 33.
Aplectrocapnos Boiss. et Reuter °V. 33.
— Baetica Boiss. *V. 33. no. 1.
Aplectrum Blume. II. 145.
— rostratum Blume. *II. 145. no. 2.
— stipulare Blume. *II. 145. no. 3.
— vininale Blume. *II. 145. no. 1.
Aplocarya Lindl. °VI. 551.
— divaricata Lindl. °VI. 551. no. 1.

Aplodiscus DC. II. 968.
Aplolepideae DC. VI. 292.
Aplopappus cf. Haplopappus.
Aplopappus canescens DC. II. 960. no. 10.
— *ciliatus* DC. II. 592. no. 1.
— *ericoides* DC. II. 592. no. 1.
— *florifer* Hook. et Arn. II. 967. no. 6.
— *linearifolius* DC. II. 967. no. 5.
— *spinulosus* DC. II. 587. no. 1.
— *squarrosus* Hook. et Arn. II. 591. no. 5.
Aplophyllum cf. Haplophyllum.
Aplophyllum perforatum Karel. II. 824. no. 1.
— *suaveolens* G. Don. I. 518. no. 3.
Aplotaxis cf. Haplotaxis.
Aplotaxis discolor DC. VI. 282. no. 1.
— *obvallata* DC. VI. 282. no. 2.
Apochoris Duby. VI. 447.
— pentapetala Duby. *VI. 447. no. 1.
APOCYNACEAE Lindl. VI. 464.
Apocynum Tournef. VI. 474.
— *bursiflorum* Norenh. VI. 464. no. 1.
— pictum Schrenk. VI. 474. no 1.
Apodanthera Arn. II. 203. V. 761.
— gracilis Bth. V. 761. no. 2.
— Mathewsii Arn. *II. 203. no. 1. *V. 761. no. 1.
Apodotes Bth. III. 526.
Apodynomene E. Mey. I. 673.
— aemula E. Mey. I. 673. no. 3.
— diffusa E. Mey. I. 673. no. 4.
— grandiflora E. Mey. I. 673. no. 1.
— macropoda E. Mey. I. 673. no. 2.
β. angustifolia.
α. latifolia.
Apodytes E. Mey. II. 802. V. 136.
[— ? E. Mey. *II. 802. no. 1.]
— dimidiata E. Mey. V. 136. no. 1.
Apogon Ell. II. 683. *VI. 327.
— *humilis* DC. II. 683. no. 1.
α. gracilis DC. II. 683. no. 1.
— humilis Ell. *II. 683. no. 1.
β. lyrata *I. 683. no. 1.
— *lyratum* Nutt. II. 683. no. 1. β.
Apophragma Griseb. *VI. 501.
Aploplanesia Prsl. I. 805. V. 547.
— paniculata Prsl. *I. 805. no. 1. V. 547. no. 1.
Aposeris Neck. *II. 684. *VI. 328.
Apoterium Blume. I. 397.
— Sulatri Blume. I. 397. no. 1.
Apoxyanthera Hochstett. VI. 480.
— *pubescens* Hochstett. VI. 480. no. 3.
Appendicularia DC. *V. 687.
Aptosimeae Bth. VI. 641.
Aptosimum Burchell. III. 234. °III. 960. *VI. 641.
Aptosimum abietinum Burchell. III. 235. no. 6.
β. elongatum
— depressum Burchell. III. 234. no. 2.
— eriocephalum E. Mey. III. 234. no. 1.
— indivisum Burchell. III. 234. no. 3.
— tragacanthoides E. Mey. III. 235. no. 5.
— viscosum Bth. III. 235. no. 4.
Aptera (Helichrysum) DC. VI. 241. no. 17.
Apteranthes Mikan. *VI. 495.
Apteropodae DC. I. 929. (Inga.)
Apterygieae Juss. V. 150.
Apterygium Wlprs. IV. 38.
Apuleja Mart. I. 854.
— *praecox* Mart. I. 801. no. 4.
— praecox Mart. I. 854. no. 1.
Aquartia aculeata Jcq. III. 70. no. 245.
— *microphylla* Lam. III. 70. no. 244.
— *tomentosa* Lam. III. 70. no. 245.
Aquifolium amplissimis foliis ex insulis fortunatis Pluk. V. 403. no. 1.
Aquilaria Lam. I. 549.
— Agallocha Rxb. I. 549. no. 1.
AQUILARINEAE R. Br. I. 549. V. 409.
Aquilegia Tournef. I. 50. V. 6.
— *alpina* Deless. I. 50. no. 2.
— Alpina L. I. 51. †
— brevistyla Hook. I. 51. no. 12.
— Canadensis L. β. hybrida Hook. I. 51. no. 10.
— coerulea Torr. I. 51. no. 11.
— fragrans Bth. I. 50. no. 8.
— glandulosa Fisch. I. 51. †
— *glandulosa* Fisch. *α. discolor* DC. I. 50. no. 2.
— glauca Lindl. I. 50. no. 7.
— jucunda Fisch. et Lallem. I. 50. no. 2.
— Kanaoriensis Jacquem. I. 51. no. 9.
— lactiflora Kar. et Kiril. I. 50. no. 3.
— leptoceras Fisch. et Mey. I. 50. no. 1.
— *leptoceras* Nutt. I. 51. no. 11.
— Moorcroftiana Wall. I. 50. no. 6.
— nigricans Baumg. I. 51. †
— Olympica Boiss. I. 50. no. 4.
— pubiflora Wall. I. 50. no. 5.
β. Mussooriensis.
— Pyrenaica DC. I. 51. †
— Sibirica Lam. I. 51. †
— Skinneri Hook. I. 51. no. 13. V. 6. †
— Sternbergii Rchb. I. 51. †
— truncata Fisch. Mey. et Lallem. V. 6. no. 1.
— viscosa Gouan. I. 51. †
— vulgaris L. I. 51. †
var. platysepala Rchb. I. 51. †
— *vulgaris*? Richards. I. 51. no. 12.

Aquilicia Ottilis Gaertn. I. 444. no. 3. *α.*
Arabideae DC. I. 123. V. 34.
Arabidium DC. I. 162. no. 16. II. 760. no. 1. V. 825. no. 9.
Arabidopis DC. I. 163. no. 4. I. 164. I. 166. II. 760. no. 1.
Arabis L. I. 130. II. 756. V. 34.
— albida Stev. *I. 131. no. 9.
— Allionii DC. I. 134. †
— alpestris Schleich. I 134. †
— alpina L. *I. 130. no. 1. I. 134. †
β. declinata Tausch. I. 130. no. 1.
— Apennina Tausch. I. 131. no. 7.
— androsacea Fzl. II. 756. no. 5.
— arenosa L. I. 133. †
var. albiflora l. c.
— Aucheri Boiss. I. 131. no. 11.
— auriculata Lam. I. 134. †
— *auriculata β. dasycarpa* DC. II. 756. no. 1.
— bellidifolia Jcq. I. 134. †
— *Billardieri* DC. I. 131. no. 9.
— blepharophylla Hook. et Arn. I. 132. no. 28.
— Boryi Boiss. I. 130. no. 5.
— *brachypoda* Boiss. I. 130. no. 4.
— brassicaeformis Wallr. I. 134. †
— *brevifolia* DC. I. 131. no. 9.
— bryoides Boiss. I. 131. no. 16.
— *bulbosa* Mühlbrg. I. 136. no. 16. *α.*
— Canadensis L. *I. 133. no. 37.
— canescens Nutt. I. 133. no. 38.
— ciliata R. Br. I. 134. †
— coerulea Wulf. I. 134. †
— collina Ten. I. 133. †
— colorata Tausch. I. 133. no. 39.
— *conferta* Willd. I. 132. no. 19. *β.*
— conferta Willd. I. 134. †
— cordata Boiss. I. 131. no. 10.
— Crantziana Ehrh. I. 133. †
— crispata W. 134. †
— dentata Torr. et Gr. I. 133. no. 29.
— *Douglasii* Tor. I. 136. no. 16. *β.*
— drabaeformis Boiss. I. 131. no. 15.
— erysimoides Kar. et Kir. II. 756. no. 8.
— *falcata* Michx. I. 133. no. 37.
— fruticulosa C. A. Meyer. I. 131. no. 17.
— gigantea Hook. I. 132. no. 25.
— glandulosa Kar. et Kir. II. 756. no. 7.
— glastifolia Rchb. I. 134. †.
— Halleri L. I. 134. †
— heterophylla Nutt. I. 133. no. 33.
— *hirsuta* DC. I. 132. no. 19. *β.*
— hirsuta Lod. *I. 132. no. 19. I. 134. †
γ. incisa C. A. Mey. I. 132. no. 19.
α. sagittata C. A. Mey. l. c.
β. subcordata C. A. Mey. l. c.
— Hollboellii Hornem. I. 132. no. 27.
Arabis hybrida Reuter. V. 34. no. 2.
— incarnata Pall. *I. 132. no. 18.
— lanata Wlprs. V. 34. no. 3.
— *lasioloba* Hort. I. 167. no. 2.
— *longifolia* DC. I. 131. no. 9.
— Ludowiciana C. A. Mey. V. 34. no. 1.
— *lyraefolia* Raf. I. 133. no. 37.
— lyrata L. *I. 133. no. 30.
— Macloviana Hook. II. 756. †
— *Marschalliana* Hortor. I. 132. no. 19. *β.*
— microphylla Nutt. I. 133. no. 36. (III. Emend. p. 1.)
— *mollis* Raf. I. 133. no. 37.
— Monbretiana Boiss. I. 131. no. 12.
— *moschata* Auct. I. 132. no. 19. *β.*
— muralis Bertol. I. 134. †.
— nivalis Guss. I. 130. no. 6.
— nuda Belang. I. 131. no. 13.
— Ovirensis Wulf. I. 133. †
— O-Waihiensis Cham. et Schlchtd. I. 132. no. 26.
— pachyrhiza Kar. et Kir. II. 756. no. 6.
— parvula Dufor. I. 130. no. 4.
— *Patriniana* DC. I. 132. no. 20.
— *patula β. pubescens* Wallr. II. 756. no. 1.
— Pedemontana Boiss. II. 756. no. 4.
— pendula L. *I. 132. no. 20.
— planisiliqua Pers. I. 134. †
— procurrens Waldst. et Kitaib. I. 134. †
— puberula Nutt. I. 133. no. 35. (III. Emendand. p. 1.)
— pumila Jcq. I. 134. †
— purpurascens Prsl. I. 131. no. 8.
— *retrofracta* Grah. I. 130. no. 8.
— *rhomboidea* Pers. I. 136. no. 16. *α.*
— rigida Wallr. II. 756. no. 1.
— rosea DC. I. 133. †
— rotundifolia Raf. I. 152. no. 54.
— rupestris Nutt. I. 133. no. 31.
— sagittata Bertol. I. 134. †
— *sagittata α.* DC. I. 132. no. 19.
— saxatilis All. I. 131. †
— scapigera Boiss. I. 131. no. 14.
— serpyllifolia Vill. I. 134. †
— Sieberi Tausch. I. 130. no. 3.
— sinuata Turcz. I. 132. no. 22. et 23. *II. 756. no. 9.
— sparsiflora Nutt. I. 133. no. 34. (III. Emendand. p. 1.)
— spathulata Nutt. I. 133. no. 32.
— stenocarpa Boiss. et Reut. II. 756. no. 3.
— stolonifera Host. I. 133. †
— stricta Huds. I. 134. †
— *stricta* Sieb. I. 130. no. 3.
— Sudetica Tausch. I. 130. no. 2.
— tenella Guss. et Ten. II. 756. no. 2.

Arabis thyrsoidea Sibthp. et Sm. I. 131. no. 9.
— *toxophylla* M. B. I. 164. no. 14.
— trichopoda Turczan. I. 132. no. 21.
— *tuberosa* Pers. I. 136. no. 16. *a.*
— Turczaninowii Ldb. I. 132. no. 24.
— turrita L. I. 134. †
— verna R. Br. I. 133. †
— Vochinensis Spr. I. 133. †
Arachis L. I. 727.
— glabrata Bth. I. 727. no. 2.
— hypogaea Linn. I. 727. no. 1.
— marginata Gardn. I. 728. no. 7.
— prostrata Bth. I. 728. no. 4.
— pusilla Bth. I. 727. no. 3.
— tuberosa Bth. I. 728. no. 6.
— villosa Bth. I. 728. no. 5.
Arachnites Regel. II. 688.
Arachnopogon heterospermum Hort. VI. 339. no. 1.
Arachnospermum heteropermum Hort. VI. 339. no. 1.
Aracium Neck. *II. 699.
Aragoa H. B. Kth. III. 376. °III. 969. *VI. 648.
— abietina H. B. Kth. III. 377. no. 2.
— cupressina H. B. Kth. III. 376. no. 1.
— *juniperina* H. B. Kth. III. 377. no. 1.
Aragoaceae D. Don. III. 376.
Aralia Linn. II. 430. II. 939. V. 925.
— Cachemirica Dcne. II. 430. no. 3.
— *Chinensis* Linn.? II. 431. no. 1.
— *cordata* Thbg. II. 431. no. 2.
— crassifolia Soland. II. 430. no. 2. *II. 939. no. 1.
— *digitata* Rxb. II. 433. no. 3.
— *echinops* Cham. et Schlchtd. II. 432. no. 14.
— *edulis* Siebd. et Zucc. II. 431. no. 2.
— *erinacea* Hook. II. 429. no. 7.
— *grandis* Miq. II. 431. no. 1.
— longifolia Reinwrdt. *II. 430. no. 1.
— *macrophylla* A. Cunn. II. 433. no. 1.
— macrophylla Lindl. V. 926. no. 2.
— polaris Hombr. et Jcq. V. 925. no. 1.
Araliacea Kleinii Wght. et Arn. II. 434. no. 1.
ARALIACEAE Juss. II. 429. II. 939. V. 924.
Araliastrum foliis ternis quinquepartitis Ginseng et Nizin officinarum Trew. V. 925. no. 4.
Aranthophytum cf. Acanthophytum
Arauja Brotero. *VI. 485.
Arbor Malabarica Illa dicta Burm. IV. 127. no. 10.
— *vernicis* Rmph. I. 555. no. 1. V. 415. no. 1.
Arbuscula Bisnagarica Pluk. IV. 98. no. 3.
Arbuteae DC. II. 725. VI. 416.
Arbutus Tournef. II. 725. VI. 416.
Arbutus empetrifolia Linn. fil. VI. 417. no. 4. *β.*
— floribunda Mart. et Galeotti. II. 725. no. 5.
— glandulosa Mart. et Galeotti. II. 725. no. 3.
— laurina Mart. et Galeotti. II. 725. no. 7.
— macrophylla Mart. et Galeotti. II. 725. no. 6.
— *microphylla* Forst. VI. 417. no. 1.
— ovata Mart. et Galeotti. II. 725. no. 4.
— paniculata Martens et Galeotti. II. 725. no. 8.
— procera Dougl. VI. 416. †
— *pumila* Linn. fil. VI. 417. no. 4. *a.*
— *rigida* Buks. et Soland. VI. 416. no. 3.
— rubescens Bertol. II. 725. no. 1.
— *serpyllifolia* Lam. VI. 417. no. 1.
— spinulosa Mart. et Galeotti. II. 725. no. 2.
— varians Bth. VI. 416. no. 1.
Arceuthobium M. Bieb. II. 437.
— Oxycedri M. Bieb. *II. 437. no. 1.
Archangelica Hffm. II. 407. V. 873.
— decurrens Ldb. II. 407. no. 1.
— *decurrens* Ldb. V. 873. no. 1. *γ.*
— dentata Chapm. II. 407. no. 5.
— *Gmelini* DC. V. 920. no. 1.
— hirsuta Torr. et Gr. II. 407. no. 3.
— *littoralis* Agardh. V. 873. no. 1. *β.*
— officinalis Hffm. V. 873. no. 1.
γ. decurrens Lallem.
β. discocarpa Lallem.
— *officinalis* Koch. V. 873. no. 1. *a.*
— peregrina Nutt. II. 407. no. 4.
— Roylei Lindl. II. 407. no. 2.
Archemora DC. *II. 414.
Archytaea Mart. et Zucc. I. 373. II. 801. V. 133.
— multiflora Bth. II. 801. no. 1.
— triflora Mart. et Zucc. *I. 373. no. 1. V. 133. no. 1.
Archiphyllum Elliot. I. 789.
— *simplicifolium* Ell. I. 789. no. 36. *a.*
Arctium Lam. *II. 669.
Arctocrania Endl. V. 932.
Arctogeron DC. *II. 576. *II. 952. no. 4.
Arctopus Linn. *II. 424.
Arctostaphylos Gal. II. 726. VI. 416.
— latifolia Mart. et Galeotti. II. 726. no. 2.
— longifolia Bth. II. 726. no. 4.
— nitida Bth. II. 726. no. 3.
— pungens H. B. Kth. II. 726. † *VI. 416. no 1.
— spinulosa Mart. et Galeotti. II. 726. no. 1.
Arctoteae DC. II. 666. VI. 276.
Arctotheca Wendl. *II. 666.
— *repens* C. H. Schultz. VI. 277. no. 1.
Arctotideae Cass. II. 666. VI. 275.
Arctotis Grtnr. *II. 666. VI. 276.

Arctotis aspera Linn. *VI. 276. no. 2.
β. cichoracea Berg.
— *Jacobaea* C. H. Schultz. VI. 276. no. 2. *α.*
— Kraussii C. H. Schultz. VI. 276. no. 1.
Arcturus Bth. III. 148. 416. VI. 636. no. 1.
Ardisia Swrtz. VI. 452.
— coccinea Junghuhn. VI. 452. no. 3.
— cuspidata Bth. VI. 452. no. 1.
— ferruginea H. B. Kth. VI. 452. no. 2.
β. macrophylla Bth. VI. 452. no. 2.
— *frondosa α. longifolia* Bnks. et Soland. VI. 435. no. 8.
— *frondosa β. squarrosa* Bnks. et Soland. VI. 435. no. 9.
Ardisieae Alph. DC. VI. 448.
Aremonia Neck. II. 37.
Aremonia Neck. *II. 42.
— *agrimonioides* Neck. II. 37. no. 1.
Arenaria DC. I. 264. ex p.
— *adenotrichia* Bongd. II. 775. no. 12. V. 79. no. 1.
— *Canadensis* Pers. I. 265. no. 5.
— *coerulescens* Rudolphi. II. 774. no. 10. II. 775. no. 12. V. 79. no. 1. V. 81. no. 7.
— *grandis* H. B. Kth. I. 265. no. 6.
— *marginata* DC. I. 265. no. 5. *β.*
— *media* L. I. 265. no. 5. *β.*
—? *prostrata* DC. I. 264. no. 9.
— *purpurea* Willd. II. 774. no. 12. V. 79. no. 12.
— *rubicunda* Spr. II. 774. no. 12. V. 79. no. 1.
— *rubra β. marina* L. I. 265. no. 5.
— *sericea* Ser. II. 774. no. 12. V. 79. no. 1.
— *spinuliflora* Ser. II. 770. no. 1. V. 77. no. 1.
— *succulenta* Ser. I. 263. no. 1.
— *violacea* Ldb. II. 774. no. 10. V. 81. no. 7.
Arenariae (Crotalaria) Bth. V. 435.
Arenbergia Martens et Galeotti. °VI. 500.
— glauca Martens et Galeotti. VI. 501. no. 1.
Aretia longiflora Fisch. VI. 444. no. 4.
Argania Roem. et Schult. *VI. 455.
Argemone Tournef. I. 109.
— alba Raf. I. 109. no. 1.
— *albiflora* Hornem. I. 110. no. 1.
— *Armeniaca* L. I. 112. no. 4. *δ.*
— *cochroleua* Sweet. I. 109. no. 1.
— *Georgiana* Croom. I. 109. no. 1.
— grandiflora Sweet. I. 110. no. 5.
— Hunnemanni Otto et Dietr. I. 110. no. 2.
— Mexicana L. *I. 109. no. 1.
— ochroleuca Sweet. I. 110. no. 4.
— *Pyrenaica* L. I. 111. no. 1. b. *ι.*
— rosea Hook. I. 110. no. 3.
— *spinosa* Mnch. I. 110. no. 1.
— *versicolor* Salisb. I. 110. no. 1.
Argenomeae Endl. I. 109. V. 20.
Argophyllaea (Eurybia) DC. VI. 717. no. 4.
Argophyllum Forst. *II. 380. *II. 724.
Argostemma Wall. II. 514. VI. 72. (*II. 502.)
— *acutum* Wall. II. 514. no. 5.
— borragineum Blume. II. 514. no. 11.
— calycinum R. Br. II. 515. no. 21.
— Courtallense Arn. VI. 72. no. 3.
— fulvum Zolling. et Moritzi. VI. 701.
— humile Bennet. II. 514. no. 2.
— inaequale Bennet. II. 515. no. 15.
— inaequilaterum Bennet. II. 514. no. 6.
— laeve Bennet. II. 515. no. 17.
— laevigatum Bennet. II. 515. no. 16.
— longifolium Bennet. II. 515. no. 20.
— montanum Blume. II. 515. no. 12.
— Neesianum Wlprs. VI. 72. no. 1.
— *obtusifolium* Wall. II. 511. no. 10.
— parvifolium Bennet. II. 515. no. 19.
— pauciflorum Blume. II. 515. no. 13.
— pictum Wall. II. 514. no. 3.
— pumilum Bennet. II. 514. no. 8.
— rostratum Wall. II. 514. no. 9.
— sarmentosum Wall. II. 514. no. 10.
— subinaequale Bennet. II. 515. no. 14.
— Tavoyanum Wall. II. 514. no. 4.
— Timorense Bennet. II. 514. no. 7.
— unifolium Bennet. II. 514. no. 1.
— uniflorum Blume. II. 515. no. 18.
— verticillatum Wall. II. 514. no. 5.
— Wallichii Wlprs. VI. 72. no. 2.
Argus rugosa Lour. I. 362. no. 27.
Argylia D. Don. *VI. 515.
Argyranthemum B. Webb. °VI. 199.
— *anethifolium* DC. VI. 201. no. 4.
— anethifolium B. Webb. VI. 201. no. 5.
— *coronopifolium* B. Webb. VI. 202. no. 2.
— foeniculaceum B. Webb. VI. 200. no. 3.
— frutescens C. H. Schultz. VI. 200. no. 4.
α. Linnaeanum B. Webb. VI. 201. no. 4.
β. majus VI. 201. no. 4.
— *frutescens δ. cuneiforme* B. Webb. VI. 200. no. 2.
β. gracile B. Webb. VI. 200. no. 2.
— gracile C. H. Schultz. VI. 200. no. 2.
— *jacobaeifolium* B. Webb. VI. 107. no. 1.
— ochroleucum B. Webb. VI. 200. no. 1.
— *pinnatifidum* B. Webb. VI. 202. no. 3. VI. 201. no. 6.
β. dissectum B. Webb. VI. 199. no. 2.
— Webbii C. H. Schultz. VI. 201. no. 6.
Argyreia DC. VI. 239.
Argyreia Lour. VI. 529.
— oblonga Bth. VI. 529. no. 1.
Argyreieae Choisy. VI. 528.
Argyrochaeta DC. VI. 156.

Argyrocoma seminuda Schrank. VI. 212. no. 1.
Argyrolobioides Jaub. et Spach. II. 838. no. 4.
Argyrolobium Eckl. et Zeyh. I. 630. II. 842. °V. 509.
Argyrolobium Spach. II. 842. ex. p.
— Abyssinicum Jaub. et Spach. II. 843. no. 7.
— Andrewsianum Steud. *V. 510. no. 4.
— angustifolium Eckl. et Zeyh. I. 630. no. 4.
— Arabicum Jaub. et Spach. II. 843. no. 5.
— argenteum Eckl. et Zeyh. *I. 632. no. 25.
— ascendens Wlprs. I. 631. no. 14.
— baptisioides Wlprs. I. 630. no. 3.
— barbatum Wlprs. II. 845. no. 16.
— Bottae Jaub. et Spach. II. 843. no. 6.
— *calycinum* Jaub. et Spach. II. 842. no. 1.
— candicans Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 10.
— collinum Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 9.
— *comanthum* Vogel. V. I. 630. no. 3.
— crassifolium Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 6
— crinitum Wlprs. I. 630. no. 1.
— crotalarioides Jaub. et Spach. II. 842. no 1.
— divaricatum Jaub. et Spach. II. 844. no. 9.
— filiforme Eckl. et Zeyh. I. 632. no. 20.
— flaccidum Jaub. et Spach II. 843. no. 8.
— goodioides Wlprs. II. 845. no. 15.
— gracile Fnzl. V. 510. no. 3.
— *incanum* Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 6.
— lanceolatum Eckl. et Zeyh. I. 632. no. 19.
— Linnaeanum Wlprs. *I. 632. no. 17. *II. 842. no. 2.
— longifolium Wlprs. II. 844. no. 14.
— modestum Hochstett. *V. 510. no. 5.
— molle Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 13.
β. pumilum.
— obovatum Eckl. et Zeyh. I. 632. no. 16.
— ornithopodioides Jaub. et Spach. II. 844. no. 12.
— patens Eckl. et Zeyh. I. 632. no. 22.
— pauciflorum Eckl. I. 631. no. 11.
— pedunculare Bth. V. 509. no. 1.
— petiolare Wlprs. I. 632. no. 21.
— polyphyllum Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 5.
— prostratum Boiss. II. 842. no. 3.
— pumilum Eckl. et Zeyh. I. 632. no. 15.
— roseum Jaub. et Spach. II. 844. no. 11.
— rupestre Wlprs. I. 632. no. 18.
— Schimperianum Hochstett. *V. 510. no. 6.
— *sericeum* Eckl. et Zeyh. I. 630. no. 2.
— speciosum Eckl. et Zeyh. I. 630. no. 2.
— splendens Wlprs. II. 845. no. 17.
— stipulaceum Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 7.
— strictum Steudel. V. 509. no. 2.
— *Syriacum* Boiss. II. 842. no. 1.
— tenue Wlprs. I. 632. no. 24.
— trigonelloides Jaub. et Spach. II. 844. no. 10.
Argyrolobium tuberosum Eckl. et Zeyh. I. 632. no. 23. *II. 844. no. 13.
— *umbellatum* Vogel. I. 630. no. 1.
— uniflorum Jaub. et Spach. II. 843. no. 4.
— velutinum Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 8.
— venustum Eckl. et Zeyh. I. 631. no. 12.
Argyrophytum Douglasii Hook. II. 629. no. 1.
Argyroxiphium DC. II. 629.
— Sandwicense DC. *II. 629. no. 1.
Aria DC. II. 53. no. 6.
Arietaria Jaub. et Spach. II. 883.
Ariocarpus retusus Scheidw. II. 309. no. 1. V. 812. no. 1.
Aristobulia Mart. I. 803.
Aristotelia Hérit. I. 376.
Armania Bertero. *II. 615.
Armatae Bth. (Acacia) I. 887. V. 588. 592.
Armeniaca Tournef. II. 8. V. 648.
Armeriastrum Ser. I. 268. no. 22. II. 771.
Arnebia Forsk. *VI. 561.
Arnica Linn. II. 651.
— amplexicaulis Nutt. II. 652. no. 3.
— Chamissonis Lssng. *II. 652. no. 4.
— *ciliata* Thnbrg. VI. 336. no. 21.
— cordifolia Hook. II. 652. no. 2.
— *foliosa* Nutt. II. 652. no. 4.
— *lanceolata* Nutt. II. 652. no. 1.
— latifolia Bngrd. *II. 652. no. 5.
— *Menziesii* Hook. II. 652. no. 5.
— *microphylla* Nutt. II. 652. no. 2.
— mollis Hook. II. 651. no. 1.
Arnicella Torr. et Gr. II. 968.
Arnoldia Blume. *II. 374.
Arnoseris Gaertn. *II. 684. *VI. 327.
Aromadendron Blume. I. 69.
— elegans Blume. *I. 69. no. 1.
Aromaria Bth. III. 514.
Aromia Nutt. II. 638. VI. 210.
— tenuifolia Nutt. *II. 638. no. 1. VI. 210. no. 1.
Aronia alnifolia Nutt. II. 55. no. 2. *δ*.
— *Asiatica* Sieb. et Zucc. II. 55. no. 1.
— *Botryapium* Pers. II. 55. no. 2. *α*.
— *nivea* Neum. II. 54 no. 12.
— *ovalis* Pers. II. 55. no. 2. *γ*.
— *praecox* Neum. II. 54. no. 13.
— *sanguinea* Nutt. II. 55. no. 2. *ξ*.
Aronicum Neck. *II. 652.
Aroy kikatandja VI. 466. no. 1.
— *pütjet hayam* VI. 474. no. 1.
— *tjungkang-kang* VI. 465. no. 1.
Arrabidaea A. P. DC. VI. 511.
— rosea A. P. DC. *VI. 511. no. 1.
Arracacha Bancrft. II. 425. V. 920.
— acuminata Bth. V. 920. no. 2.
— esculenta Bth. V. 425. no. 1.
— *glaucescens* Bth. V. 920. no. 1.

Arrenbenta Boy VI. 597. no. 101.
Arrowsmithia DC. *II. 700.
Artedia Linn. *II. 419.
Arrayan macho IV. 73. no. 5.
Arrostia dichotoma Raf. I. 270. no. 1.
Arrudea St. Hil. I. 394. II. 811.
— clusioides St. Hil. *I. 394. no. 1.
— purpurea Splitgrbr. II. 811. no. 1.
Arsis Lour. I. 202.
— rugosa Lour. *I. 202. no. 1.
Artabotrys R. Br. I. 80. V. 15.
— Burmanicus DC. fil. I. 81. no. 4.
— hamatus Bl. *I. 80. no. 2.
— intermedius Hsskrl. V. 15. no. 1.
— odoratissimus R. Br. *I. 80. no. 1.
— suaveolens Bl. I. 81. no. 3.
Artanema D. Don. III. 296. °III. 965. *III. 634.
— angustifolium Bth. III. 296. no. 2.
— fimbriatum D. Don. III. 296. no. 1.
— sesamoides Bth. III. 296. no. 3.
Artemisia Linn. II. 639. VI. 212.
— *abrotanoides* Nutt. II. 641. no. 20.
— affinis Hsskrl. VI. 218. no. 24.
— amygdalina Dcne. II. 641. no 22.
— arbuscula Nutt. II. 640. no. 8.
— arenaria DC. VI. 215. no. 8.
— *arenaria β. cernua* DC. VI. 214. no. 5. *α.*
γ. erecta DC. VI. 214. no. 5.
— Arragonensis Lam. II. 641. † VI. 219. †
— Barrelieri Boiss. II. 642. †
— Besseriana Ldb. VI. 217. no. 19.
β. integrifolia Ldb.
α. triloba Ldb.
— borealis Pall. *II. 639. no. 3.
— Californica Lssng. II. 641. no. 20.
— *campestris* Prsb. II. 639. no. 4.
— *campestris* Slzm. VI. 216. no. 10.
— *campestris var. erecta* Gay. VI. 214. no. 6. *α.* †††
— *campestris var. glutinosa* Tenore. VI. 216. no. 10.
— Canadensis Michx. *II. 639. no. 4.
— Canariensis Less. VI. 219. †
— *capillifolia* Fisch. VI. 218. no. 20.
— *cernua* Nutt. II. 639. no. 2.
— *Chinensis* Linn. VI. 218. no. 19. *α.*
— *commutata* Bess. II. 639. no. 4.
— Delileana Bess. VI. 217. no. 14.
— desertorum *γ. δ. ε. ξ. η.* Bess. II. 639. no. 4.
— dracunculoides Prsh. *II. 639. no. 2.
β. brevifolia Torr. et Gr.
— *dracunculoides var. glauca* Bess. II. 639. no. 2.
— dracunculoides Prsh. *II. 639. no. 2.
β. incana Torr. et Gr.
α. tenuifolia Torr. et Gr.
Artemisia Dracunculus Prsh. II. 639. no. 2.
— filifolia Torr. II. 639. no. 6.
— Fischeriana Bess. *II. 641. no. 21.
β. vegetior.
— *foliosa* Nutt. II. 641. no. 21. *β.*
— glabella Karel. et Kiril. II. 640. no. 11.
— *glauca β. fastigiata* Bess. II. 639. no. 2.
— *glutinosa* Boiss. VI. 214. no. 6. *α.* †
— glutinosa Gay. VI. 215. no. 10.
— *gnaphalodes* Nutt. II. 641. no. 16. *γ.*
— Granatensis Boiss. II. 642. †
— Halodendron Turcz. VI. 212. no. 3.
— *Hispanica* Auct. VI. 214. no. 6. *α.* †
— hypoleuca Edgwrth. VI. 723. no. 1.
— incompta Nutt. II. 641. no. 19.
— *inculta* Sieber. VI. 217. no. 14.
— inodora Hook. et Arn. II. 639. no. 2.
— *integrifolia* Richards. II. 641. no. 16. *ε.*
— juncea Karel. et Kiril. II. 640. no. 10.
— *juncea* Kar. et Kir. VI. 217. no. 17.
— Jussieuana Gay. VI. 216. no. 12.
— Koelreuteriana Bess. VI. 212. no. 1.
— *Kurilensis* Bess. VI. 217. no. 18.
— *lagocephala* DC. VI. 218. no. 19. *β.*
— lanata Lam. VI. 213. no. 4.
— lasiocline Boiss. VI. 218. no. 23.
— *Lercheana* Prescott. VI. 216. no. 11.
— Lessingiana Bess. VI. 217. no. 16.
— Lewisii Torr. et Gr. II. 639. no. 5.
— *linearis* Güldenst. VI. 212. no. 2.
— *Lippii* Bess. VI. 217. no. 14.
— *lithophila* Turcz. VI. 218. no. 19. *β.*
— Ludoviciana Nutt. *II. 641. no. 16.
γ. gnaphalodes Torr. et Gr.
ε. latifolia Torr. et Gr.
β. latiloba Nutt.
δ. serrata Torr. et Gr.
— macrorhiza Turcz. II. 640. no. 12.
— *matricarioides* Lssng. II. 639. no. 1. II. 642. no. 1. VI. 194. no. 4.
— Meyeriana Bess. *VI. 217. no. 18.
— *Mexicana* Willd. II. 641. no. 17. *δ.*
— monosperma Delile. VI. 216. no. 13.
— *monosperma* Delile. VI. 217. no. 14.
— *Neapolitana* Tenore. VI. 214. no. 6. *α.*
— *Nuttalliana* Bess. II. 639. no. 2. *β.*
— odoratissima Dsf. VI. 215. no. 9.
— *pacifica* Nutt. II. 639. no. 4.
— pacifica Nutt. II. 640. no. 13.
— paniculata Lam. VI. 215. no. 7.
— *pauciflora* Besser. VI. 215. no. 8.
— *pauciflora* M. B. VI. 216. no. 11.
β. cernua Bess. VI. 214. no. 5.
γ. erecta Bess. VI. 214. no. 5.
— pedatifida Nutt. II. 640. no. 15.
— Persica Boiss. VI. 218. no. 21.

Artemisia peucedanifolia Juss. II. 639. no. 1.
— *Plattensis* Nutt. II. 640. no. 6.
— *procera* Lapeyr. VI. 214. no. 6. *α*. †††
— pumila Nutt. II. 640. no. 14.
— *Purshiana α. latifolia* Besser. II. 641. no. 16. *ε*.
— *Pyrenaica* Auct. VI. 214. no. 6. *α*. †††
— reptans Chr. Schmidt. VI. 219. †
— revoluta Edgwrth. VI. 723. no. 2.
— *sabulosa* Willd. VI. 215. no. 8.
— *saligna* Tenore. VI. 214. no. 6. *γ*.
— salsoloides Willd. VI. 212. no. 2.
δ. fastigiata Bess.
β. heterophylla Bess.
γ. longifolia Bess.
α. normalis Bess.
— *Santonica* Prsh. II. 639. no. 5.
— Schrankiana Ldb. VI. 217. no. 15.
— scopaeformis Ldb. VI. 217. no. 17.
— *serrata* Nutt. II. 241. no. 16. *δ*.
— Soongarica Schrenk. II. 639. no. 1.
— *spithamaea* Prsh. II. 639. no. 3.
— stricta Edgwrth. VI. 723. no. 3.
— subspinescens Boiss. VI. 218. no. 22.
— subviscosa Turcz. VI. 218. no. 20.
— *Taurica* Lssng. VI. 217. no. 16.
— *tenuifolia* Clus. VI. 213. no. 4.
— Tilesii Ldb. *II. 641. no. 18.
δ. elatior Torr. et Gr.
γ. Unalaschkensis Bess.
— Trautvetteriana Bess. VI. 213. no. 5.
α. cernua Bess. VI. 214. no. 5.
β. erecta Bess. VI. 214. no. 5.
— tridentata Nutt. II. 640. no. 7.
— trifida Nutt. II. 640. no. 9.
β. rigida Torr. et Gr.
— Tscherniaeviana Bess. VI. 216. no. 11.
— variabilis Tenore. VI. 214. no. 6.
δ. Americana Besser. VI. 215. no. 6.
γ.? *Americana* Bess. II. 639. no. 5.
β. *canescens* DC. VI. 213. no. 4.
γ. *canescens* Tenore. VI. 214. no. 6.
β. Catalonica Bess. VI. 214. no. 6.
γ. Pyrenaica var. minor Bess. VI. 214. no. 214. *β*.
— *virescens* Besser. VI. 214. no. 6. *α*.
— *viscosa* DC. VI. 216. no. 10.
— vulgaris Linn. *II. 641. no. 17.
— *vulgaris var. Americana* Bess. II. 641. no. 17. *δ*.
δ. *Mexicana* Torr. et Gr. II. 641. no. 17.
— Wadii Edgwrth. VI. 723. no. 3.
Artemisieae Lssng. II. 639. VI. 211.
Arthritica Duby. VI. 441. no. 11.
Arthrolobium Desv. *I. 724. V. 519.
— Spasskyi Kaleniczenko. V. 519. no. 2.
Arthrolobium Tauricum Kaleniczenko. V. 519. no. 1.
Arthrophyllum DC. II. 806. no. 7. 8.
Arthrostemma Pav. II. 131.
— *Bouplandii* DC. V. 702. no. 11.
— brachyandrum Cham. II. 131. no. 3.
— *calcaratum* DC. V. 702. no. 9.
— Deppeanum Schlchtd. et Cham. II. 131. no. 1.
— *dicranantherum* DC. V. 702. no. 14.
— floribundum Schlchtd. II. 131. no. 5.
— *Humboldtianum* Kth. V. 703. no. 13.
— *lineatum* DC. V. 702. no. 15.
— *multiflorum* DC. V. 702. no. 12.
— *myrtoideum* DC. V. 702. no. 10.
— nitidum Grah. II. 131. no. 4.
— Uruguayense Cham. II. 131. no. 2.
— versicolor DC. II. 132. †
Artorhiza Nutt. II. 610.
Aruncus Ser. II. 50.
Arversia Cambess. I. 263.
— frankenioides Cambess. *I. 263. no. 1.
— Loefflingiae Wlprs. *I. 263. no. 2.
Asaphes DC. *I. 524.
Asarina Tournef. III. 221.
— *cordifolia* Mnch. III. 222. no. 1.
— *erecta* Mill. III. 244. no. 19.
— *Lobelii* Dalech. III. 222. no. 1.
— *Lobelii folio Hederae terrestris* J. Bauh. III. 222. no. 1.
— *procumbens* Mill. III. 222. no. 1.
— *seu Hederula saxatilis* Lobel. III. 222. no. 1.
Ascaricida Less. II. 940.
Ascium violaceum Vahl. I. 399. no. 3.
— *Aubletii* Spr. I. 399. no. 3.
Asclepiadae Dcne. VI. 486.
ASCLEPIADEAE R. Br. VI. 479.
Asclepiadeae verae R. Br. VI. 482.
Asclepias Linn. VI. 487.
— ovata Martens et Galeotti. VI. 487. no. 2.
— tuberosa Linn. VI. 487. †
— vestita Hook. VI. 487. no. 1.
Ascyreia Choisy. I. 385. no. 15. 16. 17. II. 808. no. 19. 20.
Ascyrum Linn. I. 383.
— amplexicaule Michx. *I. 383. no. 5.
— *Berterii* Spr. I. 399. no. 7.
— crux Andreae L. *I. 383. no. 2.
β. angustifolium Nutt.
— *helianthemifolium* Spach. I. 383. no. 2.
— *hypericoides* L.? I. 383. no. 2.
— *linifolium* Spach. I. 383. no. 2.
— *oblongifolium* Spach. I. 383. no. 2.
— microsepalum Torr. et Gr. I. 383. no. 1. (III. Emend. p. 2.)

Ascyrum multicaule Michx. I. 383. no. 2.
— **pauciflorum* Nutt. I. 383. no. 3.
— pumilum Michx. *I. 383. no. 3.
— *Selloi* Spr. I. 399. no. 6.
— *spathulatum* Spach. I. 383. no. 2.
— stans Michx. I. 383. no. 4.
— *stans* Willd. I. 383. no. 5.
Asimina grandiflora Michx. I. 79. no. 53.
— *parviflora* Dene. I. 79. no. 52.
— *triloba* Dunal. I. 79. no. 51.
Aspalathus L. I. 609. II. 837.
— acanthes Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 49.
— acanthophylla Eckl. et Zeyh. I. 617. no. 112.
— acicularis E. Mey. I. 616. no. 101.
— *aculeata* Willd. I. 611. no. 27.
— acuminata Lam. *I. 615. no. 86.
  β. inermis E. Mey.
— *adelphia* Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 67.
— aemula E. Mey. I. 611. no. 25.
— affinis Thbg. *I. 613. no. 54.
— Albanensis Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 82.
— *albens* Willd. I. 614. no. 77.
— *albiflora* Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 62.
— alopecuroides E. Mey. I. 617. no. 111.
— alpina Eckl. et Zeyh. I. 813. no. 58.
— appendiculata E. Mey. I. 614. no. 69.
— araneosa L. *I. 612. no. 37.
— argentea Eckl. et Zeyh. I. 611. no. 25.
— argyrea DC. *I. 614. no. 79.
— arida E. Mey. I. 613. no. 51.
  α. erecta.
  β. procumbens.
— armata Thbg. *I. 614. no. 77.
— *ascendens* E. Mey. I. 609. no. 2.
— aulogenea Eckl. et Zeyh. I. 611. no. 29.
— batodes Eckl. et Zeyh. I. 616. no. 102.
— bicolor Eckl. et Zeyh. I. 616. no. 105.
— biflora E. Mey. I. 617. no. 113.
— callosa L. *I. 612. no. 46.
— *canaliculata* E. Mey. I. 611. no. 24.
— canescens L. *I. 614. no. 75.
— capitata L. *I. 612. no. 45.
  γ. acuminata Wlprs.
  β. subcarnosa Wlprs.
— *Carmiiensis* Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 60.
— carnosa L. *I. 612. no. 43.
  β. sulcata Wlprs. I. 612. no. 43.
— *cerrhantha* Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 42.
— Chamissonis Vogel. I. 615. no. 88.
— chenopoda L. *I. 612. no. 36.
— *chortochila* Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 81.
— *ciliaris* Bot. Magaz. I. 612. no. 36.
— ciliaris L. *I. 612. no. 39.
— *ciliaris* Willd. I. 612. no. 40.
— *cinerascens* E. Mey. I. 615. no. 81.
— cinerea Thbg. I. 610. no. 12.
Aspalathus coerulescens E. Mey. I. 623. no. 3. V. 453. no. 5.
— collina Eckl. et Zeyh. I 616. no. 106.
— *comosa* Willd. I. 612. no. 45.
— corrudaefolia DC. *I. 614. no. 73.
— corymbosa E. Mey. I. 612. no. 35.
— cuneata E. Mey. I. 610. no. 20.
  β. hamulosa.
— cymbaeformis DC. *I. 613. no. 55.
  β. pubescens DC.
— *cytisoides* Lam. I. 610. no. 12.
— dasyantha Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 91.
— *deciduifolia* Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 47
— diffusa Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 64.
— *divaricata* Thbg. I. 615. no. 86.
— divergens Willd. *I. 613. no. 52.
— Drègeana Wlprs. I. 611. no. 30.
— dubia E. Mey. I. 617. no. 107.
— *echinata* E. Mey. I. 614. no. 74.
— *Ecklonis* Vogel. I. 612. no. 39.
— elongata Eckl. et Zeyh. I. 609. no. 2.
— *elongata* E. Mey. I. 611. no. 30.
— ericaefolia L. *I. 613. no. 61.
— *ericifolia* Willd. I. 613. no. 60.
— *ericoides* E. Mey. I. 613. no. 61.
— eriophylla Wlprs. I. 614. no. 76.
— *erythrodes* Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 43. γ.
— exigua Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 92.
— filicaulis Eckl. et Zeyh. I. 611. no. 34.
— filifolia E. Mey. I. 611. no. 33.
— *flexuosa* Thbg. I. 614. no. 69. I. 615. no. 85.
— *flexuosa* Willd. I. 613. no. 61.
— *frutescens* Vgl. I. 611. no. 31.
— galeata E. Mey. I. 611. no. 32.
— *galioides* Sieb. I. 615. no. 86.
— Garipensis E. Mey. I. 615. no. 93.
— genistoides Thbg. *I. 612. no 48.
— glauca Eckl. et Zeyh. I. 610. no. 17.
— globosa Andr. *I. 612. no. 42.
— *globulosa* E. Mey. I. 612. no. 47.
— heterophylla Thbg. *I. 609. no. 1.
— hiatuum Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 83.
— hilaris Eckl et Zeyh. I. 613. no. 53.
  β. pubescens Vogel.
— hirta E. Mey. I. 616. no. 103.
— *hispida* Thbg. I. 613. no. 60.
— holosericea E. Mey. I. 610. no. 19.
— *horrida* Eckl. et Zeyh. I. 615 no. 87.
— *Hystrix* Eckl. et Zeyh. I. 611. no. 28.
— Jacobaea E. Mey. I. 609. no. 3.
  β. microphylla.
— incurvifolia Vogel. I. 614. no. 71.
— *Indica* L. I. 667. no. 89.
— *iniqua* Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 65.
— inops Eckl. et Zeyh. I. 616. no. 95.

Aspalathus intermedia Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 81.
— *involucrata* E. Mey. I. 610. no. 16.
— *Joubertiana* Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 75.
— Kraussiana Meisn. II. 837. no. 1.
— lanata E. Mey. I. 615. no. 90.
— lanceolata E. Mey. I. 610 no. 18.
— *lanceolata* E. Mey. V. 457. no. 32.
— *lepida* E. Mey. I. 613. no. 64.
— *leptocoma* Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 52.
— leptophylla Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 89.
— *leptothria* Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 80.
— leucocephala E. Mey. I. 609. no. 11.
— linarifolia E. Mey. *I. 609. no. 8.
α. latifolia.
γ. pauciflora.
β. tenuifolia.
— *linearifolius* DC. I. 609. no. 8.
— linifolia E. Mey. I. 609. no. 8.
— linifolia Steudel. I. 617. no. 114.
— *lotoides* Willd. I. 611. no. 27.
— *macrocarpa* Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 79.
— marginalis Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 57.
— *melanoides* Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 47.
— *Meyeriana* Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 39.
— *micrantha* E. Mey. I. 613. no. 60.
— *microphylla* DC. I. 613. no. 52.
— microphylla Steud. I. 617. no. 117.
— minutifolia Vogel. I. 615. no. 84.
— mollis Lam. *I. 615. no. 85.
— *multiflora* Sieb. I. 613. no. 61.
— multiflora Thbg. *I. 613. no. 62.
— Mundiana Eckl. et Zeyh. I. 617. no. 108.
— *muraltoides* Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 85.
— *neanthes* Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 75.
— *nervosa* E. Mey. I. 613. no. 56.
— nigra L. *I. 612. no. 47.
— *nigrescens* E. Mey. I. 612. no. 47.
— *nivea* Willd. I. 611 no. 26.
— nodosa Vogel. I. 614. no. 68.
— opaca Eckl. et Zeyh. I. 616. no. 97.
— oresigona Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 38.
— *pallens* Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 47.
— pallescens Eckl. et Zeyh. I. 617. no. 109.
— papillosa Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 40.
— parviflora Berg. *I. 613. no. 59.
— pilosa L. *I. 609. no. 10.
β. Bergii E. Mey.
— *pilosa* Sieb. I. 612. no. 37.
— pinea Thbg. *I. 611. no. 31.
— *pinguis* Willd. I. 613. no. 54.
— Plukenetiana Eckl. et Zeyh. I. 609. no. 9.
— poliotes Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 80.
— polyantha Wlprs. I. 610. no. 22.
— polycephala E. Mey. I. 610. no. 14.
— procumbens E. Meyer. I. 609. no. 5.
Aspalathus propinqua E. Mey. I. 612. no. 44.
— prostrata Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 56.
— pulchella E. Mey. I. 610. no. 21.
— *pungens* Thbg. I. 615. no. 86.
— purpurascens E. Mey. I. 611. no 26.
— *purpurea* Eckl. et Zeyh. I. 611. no. 26.
— racemosa E. Mey. I. 616. no. 99.
— ramulosa E. Mey. I. 616. no. 94.
— remota Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 78.
— *rigescens* E. Mey. I. 614. no. 73.
— rubescens Thbg. *I. 613. no. 65.
— rubro-fusca Eckl. et Zeyh. I. 616. no. 98.
— *sanguinea* Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 66.
— sarcantha Vogel. I. 612. no. 41.
— *sarcodes* Vogel. I. 612. no. 4.
— *scaphoides* Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 55. β.
— *secunda* E. Mey. I. 612. no. 48.
— securifolia Eckl. et Zeyh. I. 610. no. 15.
β. spathulata Wlprs.
— sericantha E. Mey. I. 616. no. 100.
— *sericea* Eckl. et Zeyh. I. 609. no. 3.
— setacea Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 72.
α. canescens.
β. arachnoidea Hort. Berol.
— *Simsiana* Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 37. I. 612. no. 46.
— *spathulata* Eckl. et Zeyh. I. 610. no. 15.
— speciosa Steudel. I. 617. no. 116.
— *spinescens* DC. I. 613. no. 51.
— spinosa L. *I. 615. no. 87.
— stachyera Eckl. et Zeyh. I. 609. no. 4.
— staurantha Eckl. et Zeyh. I. 616. no. 96.
— stellaris Eckl. et Zeyh. I. 609. no. 7.
— stenophylla Eckl. et Zeyh. I. 611. no. 24.
— stricta Steudel. I. 617. no. 115.
— suaveolens Eckl. et Zeyh. I. 609. no. 6.
— subtingens Eckl. et Zeyh. I. 613. no. 67
— succulenta E. Mey. I. 617. no. 110.
— *sulcata* Vogel. I. 612. no. 43. β.
— teres Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 74.
— thymifolia L. *I. 613. no. 60.
— *thymifolia. δ. vermiculata* E. Mey. I. 613. no. 66.
— *tomentosa* E. Mey. I. 615. no. 82.
— *tridentata* Berg. I. 609. no. 10. β.
— tridentata L. *I. 611. no. 27.
— truncata Eckl. et Zeyh. I. 610. no. 13.
— tuberculata Wlprs. I. 614. no. 70.
— *tylodes* Eckl. et Zeyh. I. 612. no. 46.
— ulicina Eckl. et Zeyh. I. 616. no. 104.
— undulata Eckl. et Zeyh. I. 610. no. 16.
— *uniflora* Lam. I. 613. no. 55.
— *uniflora* Thbg.? I. 611. no. 31.
— *varians* Eckl. et Zeyh. I. 615. no. 85.
— variegata Eckl. et Zeyh. I. I. 612. no. 44.
— *venosa* E. Mey. I. 609. no. 6.

— vermiculata Lam. *I. 613. no. 66.
— *verrucosa* Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 70.
— verrucosa L. *I. 611. no. 28.
— versicolor E. Mey. I. 612. no. 50.
— viminea E. Mey. I. 611. no. 23.
— Wurmbeana E. Mey. I. 613. no. 63.
Asparago aculeato affinis triplici semper spina C. Bauh. V. 465. no. 9.
Asperatae Bth. I. 878. (Mimosa).
ASPERIFOLIAE Linn. VI. 553.
Asperugo Tournef. * VI. 563.
Asperula Linn. II 460. II. 941. VI. 22.
— acerosa C. Koch. VI. 22. no. 2.
— *Aparine* M. Bieb. VI. 12. no. 16.
— arvensis Linn. VI. 23. no. 12.
— asperrima Boiss. II. 461. no. 3.
β. hirsuta.
— azurea Jaub. et Spach. VI. 24. no. 13.
— brachyantha Boiss. VI. 700. no. 2.
— *ciliaris* DC. VI. 25. no. 15.
— *ciliata* Mnch. VI. 24. no. 12.
— *coerulea* Dodon. VI. 24. no. 12.
— *Cynanchica* DC. VI. 22. (ex p.)
— deficiens Viv. II. 461. no. 5.
— Danilevskiana Basiner. VI. 23. no. 8.
— *dubia* Willd. VI. 24. no. 12.
— elongata Schrenk. II. 461. no. 9.
— *eriocarpa* Boiss. II. 461. no. 3. *β*.
— *galioides* M Bieb. VI. 12. no. 17.
— glabra C. Koch. VI. 22. no. 1.
— gracilis C. A. Mey. II. 461. no. 10.
— incolucrata Wahlbrg. II. 461. no. 6. * VI. 23. no. 9.
— *laevigata* Linn. VI. 12. no. 21.
— lilaciflora Boiss. VI. 23. no. 6.
— *longifolia* Sibthrp. et Sm. VI. 12. no. 18.
— microphylla Boiss. VI. 23. no. 7.
— mollis Boiss. VI. 22. no. 3.
— odorata Dodon. * VI. 23. no. 11.
— *orientalis* Boiss. et Hohenack. VI. 24. no. 13.
— paniculata Boiss. II. 460. no. 2.
— paniculata Bnge. II. 461. no. 8.
— pendula Boiss. II. 430. no. 1.
— pumila Moris. II. 461. no. 4.
— *rivalis* Sibthrp. et Sm. VI. 12. no. 16.
— *sherardioides* Jaub. et Spach. VI. 19. no. 1.
— seticornis Boiss. VI. 699. no. 1.
— setosa Jaub. at Spach. VI. 21. no. 14.
— Sinaica Delile. II. 461. no. 7.
— stricta Boiss. VI. 22. no. 5.
β. glabrescens. } VI. 23. no. 5.
γ. scabrida. }
α. tomentosa. }
— stylosa Boiss. VI. 25. no. 15.
— suavis Fisch. Mey. et Lallem. II. 941. no. 1.
Asperula subvelutina DC. VI. 15. no. 34. *β*.
— Taurina Linn. * VI. 23. no. 10.
— tenuifolia Boiss. VI. 22. no. 4.
Aspicarpa Adr. Juss. ° V. 348.
— Hartwegiana Adr. Juss. V. 349. no. 1.
— *hirtella* A. Rich. V. 349. no. 2.
— urens Lagascà. *V. 349. no. 2.
Aspidanthera Bth. II. 514. VI. 72.
— rudgeoides Bth. * II. 514. no. 1. VI. 72. no. 1.
Aspidoglossum E. Mey. * VI. 486.
Aspidopterys Adr. Juss. ° V. 297.
— concava Adr. Juss. V. 297 no. 2.
— cordata Adr. Juss. V. 298. no. 8.
— elliptica Adr. Juss. V. 297. no. 1.
— glabriuscula Adr. Juss. V. 299. no. 5.
— lanuginosa Adr. Juss. V. 298. no. 7.
— hirsuta Adr. Juss. V. 298. no. 6.
— nutans Adr. Juss. V. 298. no. 9.
— oxyphylla Adr. Juss. V. 297. no. 3.
— Roxburghiana Adr. Juss. V. 298. no. 4.
— rotundifolia Adr. Juss. V. 299. no. 10.
— tomentosa Adr. Juss. V. 299. no. 11.
Aspidosperma Mart. et Zucc. * VI. 470.
Aspidostigma acuminatum Hochstett. V. 397. no. 1.
Aspiduxia Krthls. II. 438. no. 11.
Aspilia Thouars. * II. 612.
Assonia Cav. * I. 349.
Astartea DC. * II. 160. II. 922. ° V. 738.
— aspera Schauer. * II. 922. no. 5. V. 738. no. 4.
— corniculata Schauer. V. 739. no. 6.
— Endlicheriana Schauer. * II. 922. no. 2. VI. 738. no. 7.
— fascicularis DC. V. 738. no. 2.
— glomerulosa Schauer. * II. 922. no. 6. V. 738. no. 5.
— laricifolia Schauer. II. 922. no. 1.
— leptophylla Schauer. * II. 922. no. 3. V. 738. no. 1.
— scoparia Schauer * II. 822. no. 4. V. 738. no. 3.
Astelma Less. VI. 212.
Astemma Lssg. * II. 603.
Astephanae Dcne. VI. 482.
Astephanus R. Br. * VI. 482.
Aster N. ab E. II. 559. 952. 957. VI. 119.
— abbreviatus N. ab E. * II. 570. no. 85.
— *acris* Cav. II. 575. no. 1.
— acuminatus Michx. * II. 571. no. 113.
— adnatus Nutt. II. 561. no. 22.
— adulterinus Willd. * II. 570. no. 96.
— *aestivus* Ait.? II. 567. no. 52.
— aestivus Ait. * II. 570. no. 89.
— ageratoides Turcz. II. 574. no. 133.
— alpinus Linn. * II. 571. no. 105.

Aster Americanus multiflorus Pluk. II. 565. no. 48. *α.*
— amethystinus Nutt. II. 570. no. 71.
— *amplexicaulis* N. ab E. II. 562. no. 24.
— amplus Lindl. *II. 568. no. 60.
— andinus Nutt. II. 571. no. 107.
— *angustus* N. ab E. II. 567. no. 52. *γ.*
— angustus Torr. et Gr. *II. 573. no. 123.
— anomalus Engelm. II. 957. no. 2.
— *Argunensis* DC. II. 575. no. 139.
— *Arnottii* N. ab E. II. 562. no. 23. *γ.*
— *artemisiaeflorus* Poir. II. 567. no. 53. *γ.* b.
— ascendens Lindl. *II. 560. no. 15.
γ. ciliatifolius Lindl. II. 561. no. 15. *γ.*
β. denudatus Lindl. II. 560. no. 15.
— asper N. ab E. *II. 570. no. 93.
— asperrimus Lssng. II. 575. no. 136.
— *asperrimus* Nutt. II. 569. no. 68.
— asperulus Torr. et Gr. II. 563. no. 32.
— *attenuatus* Lindl. II. 562. no. 25. *γ.*
— *auritus* Lindl. II. 562. no. 23. *δ.*
— auritus Lindl. *II. 570. no. 83.
— *autumnalis* Wendrth. II. 563. no. 31.
— azureus Lindl. *II. 563. no. 29.
— Baldwinii Torr. et Gr. II. 565. no. 47. c. varr. *α.* et *β* ibid.
— Bellidiastrum N. ab E. VI. 119. no. 3.
— *bellidiflorus* N. ab E. II. 567. no. 53. *γ.* b.
— *bellilidiflorus* Willd. II. 567. no. 53.
— *biennis* Nutt. II. 587. no. 5.
— *biennis* Torr. II. 664. no. 41. *γ.*
— biflorus Michx. II. 559. no. 4.
— bifrons Lindl. *II. 570. no. 80.
— blandus Prsh. *II. 570. no. 77.
— bracteolatus Nutt. II. 565. no. 45.
— *bracteolatus* Nutt. II. 564. no. 42.
— brumalis N. ab E. *II. 570. no. 94.
— *bupleurifolius* Hort. Monspel. II. 562. no. 24. *β.*
— Cabulicus Lindl. II. 957. no. 1.
— *Cabulicus* Lindl. VI. 120. no. 1.
— *Californicus* Lssng. II. 580. no. 20.
— campestris Nutt. II. 564. no. 44.
— *canescens* Prsh. II. 587. no. 5.
— carneus N. ab E. *II. 567. no. 54.
γ. ambiguus Torr. et Gr.
β. subasper Torr. et Gr.
— Carolinianus Walt. *II. 570. no. 69.
— Chapmannii Torr. et Gr. II. 573. no. 121.
— Chilensis N. ab E. *II. 561. no. 16.
— *ciliatus* Nutt. II. 561. no. 18.
— ciliatus Walt. II. 570. no. 82.
— ciliolatus Lindl. *II. 564. no. 39.
— coerulescens DC. *II. 570. no. 74.
— *Collinsii* Nutt. II. 576. no. 3. *β.*
— *concinnus* Colla. II. 575. no. 142.
Aster concinnus Willd. *II. 562. no. 26.
— concolor Linn. *II. 561. no. 19.
— confertus N. ab E. *II. 571. no. 100.
— consanguineus Ldb. VI. 119. no. 2.
— conspicuus Lindl. *II. 560. no. 6.
— *coriaceus* Forst. VI. 117. no. 8.
— cordifolius Linn. *II. 563. no. 33.
— *cordifolius* Hook. II. 565. no. 47. *β.*
— *cordifolius* Michx. II. 565. no. 48. *β.*
— corymbosus Ait. *II. 559. no. 1.
— crocatus Bertol. II. 575. no. 140.
—? Curtisii Torr. et Gr. II. 560. no. 11.
— *cyaneus* Hffm. II. 562. no. 24. *β.*
— *cyaneus* N. ab. E. II. 562. no. 24.
— deflexus Tausch. II. 575. no. 142.
— *denudatus* Nutt. II. 561. no. 15. *β.*
β. *ciliatifolius* Nutt. II. 561. no. 15. *γ.*
— *diffusus* Ait. II. 566. no. 50.
— *diffusus* Mühlbrg. II. 566. no. 50. *β.*
— *diffusus* (ex. p.?) N. ab E. II. 566. no. 50. *β.*
— *discoideus* Ell. II. 960. no. 1.
— *divaricatus* Linn. II. 559. no. 1.
— divaricatus Torr. et Gr. II. 573. no. 125.
— *divergens* Ait. II. 566. no. 50.
— *divergens* Lindl. II. 567. no. 52. *β.*
— *divergens* N. ab E. II. 566. no. 50. *γ.*
— *diversifolius* Michx. II. 563. no. 31.
— Douglasii Lindl. *II. 568. no. 61.
— *dracunculoides* Willd. II. 567. no. 53. *γ.*
— Drummondii Lindl. *II. 563. no. 35.
— *dumosus* DC. II. 564. no. 41.
— dumosus Linn. II. 565. no. 48.
— *dumosus* Linn. II. 565. no. 48. *α.*
— dumosus Linn. II. 565. no. 48.
β. cordifolius } Torr. et Gr.
δ. gracilentus } Torr. et Gr.
ε. strictior } Torr. et Gr.
ζ. subracemosus } Torr. et Gr.
γ. subulaefolius } Torr. et Gr.
α. verus } Torr. et Gr.
— *dumosus* N. ab E. II. 566. no. 48. *ζ.*
— elegans Torr. et Gr. II. 572. no. 117.
— Elliottii Torr. et Gr. II. 569. no. 64.
— Elodes Torr. et Gr. II. 568. no. 58.
— *elongifolius* A. Cunn. II. 577. no. 1.
— *eminens* Willd. II. 569. no. 63.
— *ericoides* Hook. II. 565. no. 41.
— ericoides Linnn. II. 564. no. 40.
— *ericoides Meliloti agrariae umbone* Dill. II. 570 no. 90.
— ericoides Linn. II. 564. no. 40.
γ. platyphyllus Torr. et Gr.
β. villosus Torr. et Gr.
— *ericoides var.* Lind. II. 564. no. 41.
— *eryngiifolius* Torr. et Gr. II. 967. no. 2.
— *Espenbergensis* N. ab E. II. 559. no. 5. *γ.*

Aster exilis Ell. *II. 574. no. 127.
—? *exscapus* Richards. II. 957. no. 1.
— exsul Lindl. II. 575. no. 141.
— falcatus Lindl. *II. 564. no. 42.
— ferrugineus Edgwrth. VI. 716.
— *filaginifolius* Hook et Arn. II. 558. no. 3.
— *firmus* N. ab E. II. 569. no. 65. *β.*
— flaccidus Bnge. *II. 575. no. 139.
— flexuosus Nutt. *II. 573. no. 122.
— foliaceus Lindl. *II. 571. no. 111.
— *foliolosus* Ait. II. 565. no. 48. *β.*
— *foliolosus* Ait. II. 566. no. 48. *ζ.*
— foliolosus Ait. II. 570. no. 90.
— *foliolosus β. cordifolius* Nutt. II. 565. no. 48. *β.*
— *fragilis* Lindl. (ex p.) II. 565. no. 48. *a.* II. 566. no. 48. *ε.*
— *fragilis* Willd. II. 566. no. 49. *β.*
— frondosus Torr. et Gr. II. 574. no. 130.
— glacialis Nutt. II. 571. no. 108.
— *glabellus* Lindl. II. 564. no. 40. *β.*
— *glabellus* N. ab E. II. 564. no. 40.
— glabriusculus Torr. et Gr. II. 572. no. 116.
— *glaucus* N. ab E. II. 562. no. 24. *β.*
— glaucus Torr. et Gr. II. 572. no. 118.
— Gmelini Ldb. VI. 261. no. 22.
— *gracilentus* Bnks. et Soland. VI. 117. no. 4.
— gracilentus Torr. et Gr. II. 562. no. 28.
— *gracilis* Nutt. II. 560. no. 8.
— graminifolius Prsh. *II. 571. no. 112.
— grandiflorus Linn. *II. 569. no. 68.
— *grandiflorus* Nutt. II. 560. no. 10.
— *grandiflorus* Walt. *II. 560. no. 7.
— *Greenei* N. ab E. II. 572. no. 114.
— Greenei Torr. et Gr. II. 567. no. 55.
— hebecladus DC. *II. 570. no. 78.
— *heteromallus* Wendrth. II. 563. no. 31.
— *heterophyllus* Willd. II. 563. no. 33.
— *hiemalis* N. ab E. II. 570. no. 90.
— *hirsuticaulis* Lindl. II. 566. no. 50. *δ.* a.
— hirtellus Lindl. *II. 563. no. 37.
— *holosericeus* Forst. VI. 117. no. 7.
— horizontalis Dsf. II. 566. no. 50. *γ.*
— ignoratus Kth. et Bouché. VI. 120. no. 6.
— imbricatus Wlprs. II. 574. no. 131.
— inconspicuus Lssg. *II. 575. no. 137.
— integrifolius Nutt. II. 560. no. 13.
— intybaceus Kth. et Bouché. VI. 120. no. 7.
— *junceus* Ait. II. 569. no. 63.
— *junceus* Prsh. II. 567. no. 53.
— *laevigatus* N. ab E. II. 562. no. 24.
— *laevigatus* Prsh. II. 568. no. 59.
— *laevigatus* Willd. II. 562. no. 21. *γ.*
— laevis Linn. *II. 562. no. 24.
β. glaucior Torr. et Gr.
— *laevis* N. ab E. II. 562. no. 21.
Aster Lamarckianus N. ab E. *II. 567. no. 51.
— *lanceolatus* Willd. II. 567. no. 52.
— *laxifolius γ. carneus* Lindl. II. 567. no. 54.
— laxifolius N. ab E. *II. 568. no. 62.
β. borealis Torr. et Gr. II. 568. no. 62.
γ. laetiflorus Torr. et Gr. II. 568. no. 62.
— laxus Willd. II. 568. no. 56.
— *ledifolius* Prsh. II. 572. no. 114.
— *leucanthemos* Desf. II. 567. no. 53. *γ.* b.
— *linarifolius* Burm. I. 609. no. 8.
— Lindleyanus Torr. et Gr. II. 563. no. 38. c. varr. *β.* et *γ.* II. 564.
— linifolius Linn. *II. 573. no. 124.
— longifolius Lam. *II. 569. no. 63. c. var. *β.* ibid.
— lutescens Torr. et Gr. *II. 573. no. 120.
— luxurians N. ab E. *II. 570. no. 95.
— macrophyllus Linn. *II. 559. no. 2. (varr. *β* et *γ.* ibid.)
— Magellanicus Lam. VI. 324. no. 5.
— Menziesii Lindl. *II. 561. no. 20.
— *microphyllus* Torr. II. 562. no. 22.
— mirabilis Torr. et Gr. II. 560. no. 12.
— *miser* Ait. II. 566. no. 50.
— miser Linn. *II. 566. no. 50.
γ. diffusus Torr. et Gr.
β. glomerulus Torr. et Gr.
δ. hirsuticaulis Torr. et Gr.
a. miserrimus Torr. et Gr.
— *miser* (excl. *β.*) N. ab E. II. 566. no. 50. *a.*
— *miser* Nutt. II. 566. no. 50. *β.* a.
— modestus Lindl. *II. 570. no. 73.
— *montanus* Nutt. II. 561. no. 17. *β.*
— montanus Richards. *II. 559. no. 5.
γ. arcticus Torr. et Gr.
β. giganteus Torr. et Gr.
— multiceps Lindl. *II. 570. no. 75.
— multiflorus Ait. *II. 564. no. 41.
γ. commutatus Torr. et Gr.
β. stricticaulis Torr. et Gr.
— *multiflorus* Nutt. II. 566. no. 49. *β.*
— mutabilis Linn. *II. 571. no. 98.
— *mutabilis* N. ab. E. II. 562. no. 24.
— mutatus Torr. et Gr. II. 569. no. 67.
— *myrtifolius* Willd. II. 566. no. 50. *a.*
— nemoralis Ait. *II. 572. no. 114.
— Novae Angliae Linn. *II. 570. no. 72.
— Novi Belgii Linn. *II. 568. no. 59. c. varr. *a.*, *β.* et *γ.* ibid.
— *Novi Belgii* var. Boot. II. 567. no. 52. *β.*
— *nudiflorus* Nutt. II. 559. no. 3. *β.*
— Nuttallii Torr. et Gr. II. 564. no. 43.
— *obliquus* DC. II. 567. no. 54.
— *obliquus* Lindl. II. 567. no. 52. *β.*
— obliquus N. ab E. *II. 570. no. 88.
— oblongifolius Nutt. *II. 570. no. 70.

Aster occidentalis Torr. et Gr. II. 574. no. 129.
— onustus N. ab E. *II. 571. no. 102.
— *Oolentagiensis* Riddel. II. 563. no. 29.
— Oreganus Torr. et Gr. II. 574. no. 126.
— paludosus Ait. *II. 560. no. 10.
— *paludosus* Nutt. II. 568. no. 58.
— panduratus N. ab E. VI. 119. no. 4.
— *paniculatus* Ait. II. 563. no. 33.
— *paniculatus δ.* Hook. II. 563. no. 38.
— *paniculatus* Mühlbrg. II. 563. no. 34.
— *paniculatus* Nutt. II. 563. no. 31.
— *parviflorus* Hook. II. 567. no. 51.
— *parviflorus* N. ab E. II. 566. no. 50. γ.
— patens Ait. II. 562. no. 23.
β. gracilis Torr. et Gr.
δ. phlogifolius Torr. et Gr.
γ. patentissimus Torr. et Gr.
— *patens* Bartl. II. 563. no. 31.
— *patentissimus* Lindl. II. 562. no. 23. γ.
— patulus Lam. *II. 570. no. 86.
— pauciflorus Martens. II. 574. no. 134.
— pauciflorus Nutt. *II. 574. no. 128.
— *pendulus* Ait. II. 566. no. 50.
— *pendulus* N. ab Es. II. 566. no. 50. γ.
— peregrinus Prsh. *II. 571. no. 110.
— phyllolepis Torr. et Gr. II. 561. no. 18.
— *phlogifolius* Mühlbrg. II. 562. no. 2. δ.
— *pilosus* Willd. II. 564. no. 40. β.
— praealtus Poir. *II. 568. no. 57.
— *praecox* Lindl. II. 564. no. 38. γ.
— praecox Willd. *II. 570. no. 84.
— prenanthoides Mühlbrg. II. 569. no. 66.
β. glaber.
— ptarmicoides Torr. et Gr. *II. 573. no. 119.
— *pubescens* Hornem. II. 563. no. 33.
— *politus* N. ab E. II. 562. no. 21. β.
— *puniceus* Ell. II. 569. no. 64.
— puniceus Linn. *II. 569. no. 65.
β. firmus Torr. et Gr.
γ. vimineus Torr. et Gr.
— purpuratus N. ab E. *II. 571. no. 103.
— pygmaeus Lindl. *II. 571. no. 106.
— *quercifolius* Lss. VI. 123. no. 13.
— racemosus Ell. *II. 565. no. 46.
— Radula Ait. *II. 559. no. 3.
— *Radula* Less. II. 561. no. 16.
— *ramulosus α.* Lindl. II. 564. no. 42.
— *ramulosus* Nutt. II. 564. no. 43.
— *ramulosus β. incano-pilosus* Lindl. II. 564. no. 41. γ.
— *recurvatus* N. ab E. II. 567. no. 52. β.
— *recurvatus* Prsh. II. 566. no. 49.
— reticulatus Prsh. *II. 570. no. 81.
— retroflexus Lindl. *II. 571. no. 104.
— *Richardsonii* Spr. II. 559. no. 5.
β. *giganteus* Hook. l. c. β.
Aster rigidulus N. ab E. II. 567. no. 53. γ.
— rivularis Lssng. *II. 575. no. 138.
— *rivularis* Lssng. II. 580. no. 14.
— *rubricaulis* N. ab E. II. 562. no. 24.
— *sagittifolius* Ell. II. 563. no. 31.
— sagittifolius Willd. *II. 563. no. 34. (cum var β. ibid.)
— *salicifolius* Darl. II. 567. no. 52.
— *salicifolius* N. ab E. II. 570. no. 90.
— *salicifolius* Richards. II. 568. no. 62. β.
— *salsuginosus α.* Hook. II. 571. no. 109. β.
— *salsuginosus* Less. II. 559. no. 5. γ.
— salsuginosus Richards. *II. 571. no. 109. et var. β. ibid.
— *Sayianus* Nutt. II. 570. no. 73. β.
— scaberrimus Lssng. II. 574. no. 135.
— scapigerus Ldb. VI. 119. no. 1.
— *Schreberi* N. ab E. II. 559. no. 2. β.
— scoparius DC. *II. 570. no. 79.
— *secundiflorus* Dsf. II. 566. no. 50. γ.
— *secundirameus* Zeyher. VI. 207. no. 1.
— sericeus Vent. *II. 561. no. 17. (c. var. β. ibid.)
— *sericeus β. microphyllus* DC. II. 561. no. 18.
— Shortii Hook. II. 563. no. 30.
— *Sibiricus* Turcz. II. 559. no. 5.
— simplex Willd. *II. 567. no. 52. (c. varr. β. γ. δ. et ε. ibid.)
— *sparsiflorus* Nutt. II. 565. no. 48. α.
— *sparsiflorus* Prsh. *II. 573. no. 122.
— *sparsiflorus* Willd. II. 565. no. 48. β.
— spathulatus Lindl. *II. 560. no. 14.
— spectabilis Ait. *II. 560. no. 7. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— *spectabilis* Hook. et Arn. II. 561. no. 16.
β. *bellidifolius* Nutt. II. 560. no. 7. γ.
— spinosus Bth. II. 574. no. 132.
— squarrosus Walt. *II. 561. no. 21.
— squarrulosus N. ab E. *II. 570. no. 92.
— stenophyllus Lindl. *II. 570. no. 87.
— strictus Poir. *II. 571. no. 101.
— *strictus* Prsh. II. 559. no. 4.
— *subasper* Lindl. II. 567. no. 54. β.
— subspicatus N. ab E. *II. 570. no. 76.
— *subulatus* Michx. II. 573. no. 124.
— *subulatus* Michx. II. 574. no. 125.
— *surculosus* Ell. II. 560. no. 7. γ.
— surculosus Michx. *II. 560. no. 9.
— tardiflorus Linn. *II. 571. no. 97.
— *tenuifolius* Ell. II. 566. no. 49. β.
— tenuifolius Linn. *II. 567. no. 53.
γ. bellidiflorus Torr. et Gr.
β. ramosissimus Torr. et Gr.
— *tenuifolius γ.* N. ab E. II. 567. no. 53. β
— thyrsiflorus Hffm. *II. 570. no. 91.

Aster? tomentellus Hook. et Arn. II. 558. no. 4.
— Tradescanti Linn. *II. 566. no. 49.
β. fragilis Torr. et Gr.
— *Tradescanti* Lindl. II. 567. no. 53.
— *trifurcatus* Bnks. et Soland. VI. 269. no. 73.
— turbinellus Lindl. *II. 562. no. 27.
— *Unalaschkensis* Lssng. II. 571. no. 109.
β.? major Hook. II. 569. no. 67.
— undulatus Linn. *II. 563. no. 31. c. var. *β.* ibid.
— *uniflorus* Michx. II. 572. no. 114.
— *urophyllus* Lindl. II. 563. no. 34.
— urophyllus Lindl. *II. 563. no. 36.
— versicolor Willd. *II. 571. no. 99.
— *villosus* Michx. II. 564. no. 40. *β.*
— *vimineus* Lindl. II. 569. no. 65. *β.*
— *vimineus* Willd. II. 569. no. 65. *γ.*
— virgatus Ell. II. 562. no. 25. (c. varr. *β.* et *γ.* ibid.
— Walpersianus N. ab E. VI. 119. no. 5.
— xylorhiza Torr. et Gr. II. 572. no. 115.
Asteranemia Rchb. I. 19.
Asteranthus Dsf. *II. 722.
Astereae DC. II. 559. II. 951. II. 955. VI. 119.
Asteridea Lindl. II. 601. *II. 953. no. 7. VI. 142.
— pulverulenta Lindl. *II. 601. no. 1. VI. 142. no. 1.
— *pulverulenta* Lindl. VI. 250. no. 1.
Asteridium ramosissimum Engelm. II. 958. no. 1.
Asterineae N. ab E. II. 558. II. 955. VI. 118.
Asterineae C. H. Schultz. II. 951.
Asteriscium Cham. et Schlchtd. II. 387. V. 843.
— Chilense Cham. et Schlchtd. *II. 387. no. 1. *V. 843. no. 1.
— isatidicarpum Hook. et Arn. *II. 387. no. 3.
— *Poeppigii* DC. II. 387. no. 1.
— polycephalum Hook. et Arn. *II. 387. no. 2.
— *verrucosum* Meyen. V. 843. no. 1.
Asteriscus Moench. II. 955. no. 3.
Asteriscus Mnch. *II. 602.
Asteriscus Tournef. *II. 955. no. 2.
Asterocarpus arboreus Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 5.
— *Burmanni* Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 3.
— *littoralis* Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 2.
— *nervosus* Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 4.
— *rostratus* Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 8.
— *stenopterus* Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 6.
— *tetrapterus* Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 7.
— *tricuspidatus* Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 9.
Asterocarpus typicus Eckl. et Zeyh. I. 535. no. 1.
Asterocephalus Coult. II. 535.
— *arenarius* Vis. II. 536. no. 12.
Asterocytisus radiatus Koch. V. 462. no. 1.
Asteroideae DC. II. 951. (ex p.) VI. 118.
Asteroideae Less. II. 558. II. 951.
Asterolinon Lnk. et Hffmsgg. *VI. 447.
Asteromaea Blume. *II. 584. *II. 951. no. 2.
Asteromyrtus Schauer. II. 927. °V. 745.
— Gaertneri Schauer. *II. 927. no. 1. *V. 745. no. 1.
Asteropeia Thouars. *I. 548.
Asteropsis Less. *II. 576. *II. 951. no. 9.
Asterospartum (Genista) Spach. °V. 462.
Asterosperma Lssng. *II. 578.
Asterostemma Dcne. VI. 492.
— repandum Dcne. *VI. 492. no. 1.
Asterothrix Cassini. *VI. 351.
Asterotrichion Kltzsch. I. 331. V. 96.
— sidoides Kltzsch. *I. 331. no. 1. V. 96. no. 1.
Astianthus D. Don. *VI. 511.
Astilbe Hamilt. *II. 372.
— *decandra* Don. II. 372. no. 2.
Astiria Lindl. °V. 113.
— rosea Lindl. V. 113. no. 1.
Astoma DC. II. 427.
Astomaea Rchb. *II. 427.
Astraea Schauer. II. 921. (V. 732.)
— saxicola Schauer. *II. 921. no. 1.
— *saxicola* Schauer. V. 732. no. 1.
Astragaleae DC. I. 684. II. 860. V. 517.
Astragalus DC. °I. 694. II. 863. V. 517.
— abbreviatus Kar. et Kir. I. 708. no. 128.
— *aboriginorum* Richards. I. 686. no. 23.
— acmotrichus Fzl. I. 695. no. 7. II. 882. †
— aduncifòrmis Boiss. II. 863. no. 5.
— agrestis Dougl. II. 866. no. 24.
— Alatavicus Kar. et Kir. I. 709. no. 129.
— albicans Bongrd. II. 880. no. 107.
— Aleppicus Boiss. II. 870. no. 46.
— Alindanus Boiss. II. 879. no. 101.
— alopecuroides L. I. 710. †
— Amherstianus Bth. I. 702. no. 67.
— ammodytes Pall. *I. 707. no. 110.
β. albiflorus Ldb.
α. violascens Ldb.
— ammophilus Kar. et Kir. I. 701. no. 56.
— amoenus Fzl. I. 710. no. 140. II. 883. †
— amygdaliger Less. I. 707. no. 113.
— Anatolicus Boiss. II. 876. no. 86.
— andrachnefolius Fzl. I. 706. no. 104. II. 883. †
— angustiflorus C. Koch. I. 708. no. 124.
β. bracteatus Griseb. II. 871. no. 52.
— ankilotus Fisch. et Mey. I. 702. no. 64.

Astragalus anserinaefolius Boiss. II. 876. no. 83.
— arcuatus Kar. et Kir. I. 699. no. 41.
— Arequipensis Vogel. I. 696. no. 14.
— argophyllus Nutt. I. 700. no. 49.
— *aristatus var. australis* Boiss. II. 872. no. 57.
— Armeniacus Boiss. II. 879. no. 102.
— arpilobus Kar. et Kir. I. 702. no. 66.
— assurgens Pall. I. 710. †
— *assurgens β. robustior* Hook. I. 699. no. 46.
— Aucheri Boiss. II. 865. no. 13.
— *barbatus* Sibthrp. II. 879. no. 100.
— Behen Bertoloni. *II. 882. no. 128.
— Benthamianus Gill. I. 696. no. 12.
— Berteri Colla. I. 709 no. 139.
— bifidus Turcz. II. 879. no. 104.
— *biflorus* L. I. 587. no. 41.
— bombycinus Boiss. II. 968. no. 33.
— brachybotrys Bnge. I. 697. no. 21.
— brachyceras Ldb. I. 710. †.
— brachyodontus Boiss. II. 865. no. 14.
— brachypodus Boiss. II. 874. no. 69.
— brachypus Schrenk. I. 697. no. 22.
— *breviflorus var. glaber* DC. II. 872. no. 56.
— brevifolius Ldb. I. 708. no. 122.
— Cadmicus Boiss. II. 864. no. 9.
— *campestris* Linn. II. 862. no. 9.
— campylorhynchus Fisch. et Mey. I. 702. no. 63.
— campylosema Boiss. II. 878. no. 95.
— candidissimus Ldb. I. 701. no. 60.
— Candolleanus Boiss. II. 877. no. 92.
— canescens Sol. I. 702. no. 69.
— Cappadocicus Boiss. II. 875. no. 80.
— Caraganae Fisch. et Mey. I. 705. no. 94.
— *caryocarpus* Torr. I. 700 no. 51.
— ceratoides M. Bieb. I. 698. no. 37.
— *ceratoides* Bnge. II. 881. no. 116.
— *ceratoides* Ldb. I. 699. no. 39.
— *ceratoides α. campestris* Ldb. I. 699. no. 37. II. 881. no. 116.
— *ceratoides β. montanus* Ldb. I. 699. no. 38.
— chaetolobus Bnge. I. 698. no. 35.
— Chardini Boiss. II. 875. no. 79.
— chartaceus Ldb. II. 881. no. 117.
— chlorocarpus Griseb. II. 863. no. 2.
— chlorostachys Lindl. I. 710. no. 142.
— *Christianus* Sibthrp. II. 870. no. 45.
— chrysostachys Boiss. II. 873. no. 68.
— chrysotrichus Boiss. II. 876. no. 82.
— Cilicius Boiss. II. 870. no. 47.
— Clausii C. A. Mey. II. 881. no. 112.
— cognatus Schrenk. I. 697. no. 23.
— collinus Dougl. II. 866. no. 21.
Astragalus complicatus Gill. I. 696. no. 13.
— compressus Ldb. I. 698. no. 33.
— concretus Bth. I. 704. no. 89.
— condensatus Ldb. II. 882. no. 119.
— conduplicatus Bertoloni. *II. 882. no. 126.
— consanguineus Bongrd. II. 880. no. 111.
— crinitus Boiss. II. 869. no. 40.
— curviflorus Boiss. II. 873. no. 65.
— cysticalyx Ldb. II. 882. no. 120.
— dactylocarpus Boiss. II. 870. no. 49.
— Dahuricus DC. I. 710. †
— *dasyglottis* Fisch. I. 695. no. 1. *α.*
— *dasyglottis* Nutt. I. 695. no. 1. *β.*
— *Davuricus* Patrin. II. 863. no. 14.
— debilis Dougl. I. 710. no. 147.
— dendroides Kar. et Kir. I. 707. no. 116.
— densiflorus Kar. et Kir. I. 695. no. 6.
— depauperatus Ldb. I. 703. no. 73.
— *depressus* Linn. *β. ioleucus* Griseb. II. 876. no. 84.
— diaphanus Dougl. I. 700. no. 56.
— didymocarpus Hook. et Arn. I. 701. no. 59.
— distortus Torr. et Gr. I. 700. no. 54.
— dilutus Bge. I. 707. no. 112.
— diphtherites Fnzl. V. 518. no. 5.
— dorycnioides Dougl. II. 866. no. 25.
— Drummondii Dougl. I. 705. no. 92.
— dyctiocarpus Boiss. II. 878. no. 98.
— ebenoides Boiss. II. 874. no. 72.
— Echinops Boiss. II. 869. no. 44.
— ellipsoideus Ldb. I. 706. no. 105.
γ. abbreviatus.
α. elongatus.
β. intermedius.
— eremophilus Boiss. II. 867. no. 29.
— eremothamnus Kar. et Kir. I. 699. no. 42.
— erioceras Fisch. et Mey. II. 881. no. 113.
— eriolobus Bnge. I. 698. no. 34.
— eriopodus Boiss. II. 866. no. 18.
— ervoides Hook. et Arn. I. 704. no. 84.
— erythrolepis Boiss. II. 872. no. 61.
— eucephalus Boiss. II. 869. no. 42.
— fasciculatus Bertoloni. *II. 882. no. 129.
— fasciculifolius Boiss. II. 875. no. 77.
— filicaulis Fisch. et Mey. I. 701. no. 55. II. 881. no. 118.
— flavescens Boiss. II. 872. no. 59.
— flavus Nutt. I. 703. no. 79.
— flexuosus Dougl. II. 866. no. 19.
— floccosus Boiss. II. 871. no. 53.
— Fresenii Dene. I. 710. no. 144.
— Frivaldskyanus Boiss. II. 875. no. 78.
— Gebleri Fisch. II. 880. no. 108.
— Genargenteus Moris. I. 705. no. 98.
— *Gerardianus* Grah. I. 681. no. 4.
— gibberosus Bertoloni. *II. 882. no. 127.

Astragalus gladiatus Boiss. II. 865. no. 12.
— glareosus Dougl. I. 701. no. 54. II. 879. no. 99.
— glomeratus Ldb. I. 707. no. 111.
— glumaceus Boiss. II. 874. no. 70.
— *goniatus* Nutt. I. 695. no. 1.
— goniatus Nutt. I. 699. no. 47.
— Graecus Boiss. II. 870. no. 45.
— Grahaminanus Royle. I. 706. no. 102.
— graveolens Hamilt. I. 704. no. 87.
— Harbachii Spruner. II. 868. no. 32
— hamosus Linn. β. multiflorus Griseb. II. 867. no. 27.
— Hartwegi Bth. I. 704. no. 85.
— hemiphaca Kar. et Kir. I. 697. no. 28.
— hirtellus Ldb. II. 880. no. 105.
— Hohenaekeri Boiss. II. 874. no. 71.
— horizontalis Kar. et Kir. I. 699. no. 40.
— horridus Boiss. II. 873. no. 63.
— hymenocalyx Boiss. II. 869. no. 41.
— *hypogaeus* C. A. Meyer. I. 694. no. 1.
— hypoglottis L. *I. 695. no. 1. (III. Emend. p. 3.)
α. dasyglottis Torr. et Gr.
β. polyspermus Torr. et Gr.
— *incanus* Sievers. II. 862. no. 10. α.
— incertus Ldb. II. 882. no. 123.
— inflexus Dougl. I. 701. no. 53. II. 866. no. 20.
— intermedius Boiss. II. 867. no. 28.
— intermedius Kar. et Kir. I. 707. no. 117.
— Ispahanicus Boiss. II. 868. no. 37.
— Kotschyanus Boiss. II. 864. no. 8.
— lactiflorus Ldb. I. 708. no. 121.
— lagocephalus Schrenk. V. 518. no. 3.
— lanuginosus Kar. et Kir. I. 708. no. 126.
— lasiopetalus Bge. I. 708. no. 125.
— lasiophyllus Ldb. II. 881. no. 115.
— *latifolius* DC. II. 877. no. 92.
— *Laxmanni* Nutt. I. 699. no. 46.
— Laxmanni Pall. I. 710. †
— leiocarpus Boiss. II. 871. no. 55.
— leiocladus Shuttleworth. I. 710. no. 143.
— lentiginosus Dougl. I. 700. no. 57. II. 866. no. 22.
— leptocarpus Torr. et Gr. I. 701. no. 57.
— leptocaulis Ldb. I. 696. no. 18.
— *leptophyllus* Nutt. I. 698. no. 32.
— leucocephalus Grah. I. 696. no. 9.
— leucocyaneus Griseb. II. 863. no. 3.
— *leucophyllus* Torr. et Gr. I. 687. no. 25.
— *linearifolius* Sm. II. 863. no. 2.
— lithophilus Kar. et Kir. I. 709. no. 130.
— longipes Kar. et Kir. I. 697. no. 25.
—? *lotiflorus* Hook. I. 689. no. 43.
— lycioides Boiss. II. 872. no. 62.
Astragalus Lydius Boiss. II. 864. no 6.
— macroceras C. A. Mey. II. 880. no. 109.
— macrolobus M. Bieb. I. 698. no. 36.
— *macrolobus* Bnge. II. 880. no. 109.
— *macrolobus* Ldb. I. 698. no. 34.
— macrourus Fisch. et Mey. I. 707. no. 115.
— maritimus Moris. I. 695. no. 3.
— Maxwellii Royle. I. 699. no. 43.
— medius Schrenk. V. 518. no. 2.
— *melanocarpus* Richards. I. 700. no. 48.
— melanotrichos Ldb. I. 706. no. 117.
— Melitenensis Boiss II. 864. no. 7.
— Mesogitanus Boiss. II. 863 no. 4.
— Mesopotamicus Boiss. II. 873. no. 67.
— mesopterus Griseb. II. 863. no. 1.
— Mexicanus DC. I. 710. †
— Michauxianus Boiss. II. 871. no. 56.
— *micranthus* Nutt. I. 702. no. 68.
— microphysa Boiss. II. 874. no. 74.
— minimus Vogel. I. 696. no. 16.
— Mispoureanus Cambess. I. 710. no. 146.
— Missouriensis Nutt. *I. 700. no. 48.
— mollissimus Torr. I. 709. no. 134.
— monanthemus Boiss. II. 877. no. 89.
— *montanus* Pallas. II. 862. no. 11.
— Mortonii Nutt. I. 699. no. 45. (III. Emend. p. 3.)
— mucronifolius Boiss. II. 873. no. 66.
— multicaulis Ldb. I. 695. no. 4.
— *multicaulis* Nutt. I. 702. no. 70.
— *multicaulis* Turcz. II. 880. no. 104.
— multiceps Wall. I. 706. no. 103.
— murinus Boiss. II. 874. no. 75.
— Nevadensis Boiss. II. 872. no. 57.
— neurocarpus Boiss. II. 870. no. 48.
— nigrostriatus C. Koch. I. 703. no. 76.
— nivalis Kar. et Kir. I. 707. no. 118.
— Nortonii Nutt. cf. A. Mortonii Nutt.
— nucleiferus Boiss. II. 878. no. 96.
— Nuttalianus DC. *I. 702. no. 68. (et var. β. ibid.)
— oliganthus Kar. et Kir. I. 702. no. 65.
— oligophyllus Boiss. II. 865. no. 16.
— oligophyllus Schrenk. V. 518. no. 4.
— Onobrychis β. tenuifolius Hook. I. 710. †
— orbicularis Ldb. I. 702. no. 62.
— oreades C. A. Mey. I. 703. no. 75.
— Oreganus Nutt. I. 703. no. 78.
— oxigerus Boiss. II. 873. no. 64.
— ovinus Boiss. II. 876. no. 85.
— pachycarpus Torr. et Gr. I. 700. no. 53.
— paucijugus Schrenk. V. 517. no. 1.
— pauciflorus Hook. I. 696. no. 10.
— pectinatus Boiss. II. 869. no. 39.
— pectinatus Dougl. *II. 866. no. 23.
— peduncularis Royle. I. 703. no. 77.

Astragalus pelliger Fnzl. I. 703. no. 71. II. 883. †
— perpusillus Bertoloni. *II. 882. no. 125.
— Peruvianus Vogel. I. 696. no. 15.
— petraeus Kar. et Kir. I. 698. no. 29.
— phacaeformis Bge. I. 697. no. 27.
— phlomoides Boiss. II. 869. no. 43.
— physocalyx Kar. et Kir. I. 707. no. 114.
— *physocalyx* Kar. et Kiril. II. 882. no. 120.
— physocarpus Ldb. I. 707. no. 123.
— *physodes* var. *Altaicus* Pall. I. 708. no. 123.
— pinetorum Boiss. II. 876. no. 87.
— Plattensis Nutt. I. 700. no. 51.
— platyphyllus Kar. et Kir. I. 709. no. 138.
— podocarpus Hamilt. I. 704. no. 88.
— podocarpus A. C. Mey. I. 705. no. 93.
— polyceras Kar. et Kir. I. 698. no. 30.
— polyacanthus Royle. I. 705. no. 101.
— *polyacanthus* Wall. I. 681. no. 5.
— procumbens Hook. et Arn. I. 696. no. 11.
— prostratus Hook. et Arn. I. 698. no. 31.
— *Pseudotragacantha* d'Urv. II. 871. no. 51.
— pubentissimus Torr. et Gr. I. 702. no 70.
— puberulus Ldb. I. 696. no. 19.
— pulchellus Boiss. II. 879. no. 103.
— *Pumilio* Pall. II. 861. no. 8.
— *pungens* Friv. II. 871. no. 52.
— Purshii Dougl. I. 704. no. 83. (III. Emend. p. 4.)
— pusillus Vogel. I. 696. no. 17.
— pycnolobus Bge. I. 699. no. 39.
— pycnorhizos Royle. I. 699. no. 44.
— *pygmaeus* Pall. I. 694. no. 44.
— radicatus Dcne. I. 705. no. 99.
— rariflorus Ldb. I. 703. no. 72.
— reflexus Torr. et Gr. I. 701. no. 58. (III. Emend. p. 3.)
— refractus C. A. Mey. I. 709. no. 136.
— remotiflorus Boiss. II. 875. no. 76.
— Reuterianus Boiss. II. 874. no. 73.
— rhizanthus Boiss. II. 878. no. 97.
— rhizanthus Royle. I. 709. no. 133.
— roseus Ldb. I. 708. no. 120.
— Rostani Boiss. II. 864. no. 10.
— rostratus C. A. Mey. I. 709. no. 135.
— rotundifolius Royle. I. 704. no. 86.
— Rousseanus Boiss. II. 871. no. 54.
— ruscifolius Boiss. II. 865. no. 15.
— ryditocarpus Ldb. I. 703. no. 80.
— sabuletorum Ldb. I. 706. no. 106.
— saccocalyx Schrenk. I. 701. no. 61.
— salsugineus Kar. et Kir. I. 707. no. 119.
— scaberrimus Bge. I. 701. no. 141.
— scabrifolius Boiss. II. 878. no. 93.
— scabrisetus Bongrd. II. 882. no. 124.
Astragalus Schelichowii Turcz. I. 703. no. 74.
— Schimperi Boiss. II. 866. no. 26.
— schizopterus Boiss. II. 878. no. 94.
— Schrenkianus Fisch. et Mey. V. 518. no. 5.
— scleropodius Ldb. I. 706. no. 109.
— scopaeformis Ldb. II. 880. no. 110.
— scoparius Schrenk. I. 697. no. 24.
— sericophyllus Griseb. II. 864. no. 11.
— sesbanioides Royle. I. 704. no. 90.
— Shortianus Nutt. I. 700. no. 50.
— Sibthorpianus Boiss. II. 879. no. 100.
— *Sieversianus* Steph. II. 862. no. 10. *α.*
— siliquosus Boiss. II. 868. no. 35.
— Sirinicus Ten. I. 705. no. 97.
— Somcheticus C. Koch. I. 709. no. 137.
— *sordidus* Willd. II. 862. no. 9. *β.*
— sparsus Delile. I. 710. no. 145.
— spartioides Kar. et Kir. I. 697. no. 26.
— sphaerocalyx Ldb. II. 882. no. 122.
— sphaerophysa Kar. et Kir. I. 705. no. 95.
— spicatus Nutt. I. 704. no. 81.
— *spinosissimus* Wall. I. 681. no. 6.
— Spruneri Boiss. II. 877. no. 90.
— stenoceras C. A. Mey. II. 881. no. 116.
— stenolobus Bge. I. 699. no. 38.
— stenophyllus Torr. et Gr. I. 698. no. 32. (III. Emend. p. 3.)
— striatus Nutt. I. 699. no. 46.
— strictus Grah. I. 695. no. 8.
— strobiliferus Lindl. I. 705. no. 96.
— strobiliferus Royle. I. 705. no. 100.
— subbijugus Ldb. II. 881. no. 114.
— subcaulescens Ldb. II. 882. no. 121.
— subcaulescens Royle. I. 709. no. 132.
— *subulatus β. Altaicus* Pall. I. 699. no. 37.
— succumbens Dougl. I. 700. no. 55. II. 869. no. 38.
— Susianus Boiss. II. 872. no. 60.
— *Tauricus* Claus. II. 880. no. 110.
— Taverniери Boiss. II. 877. no. 88.
— *tenellus* Prsh. I. 711. no. 2.
— *tenuifolius* Sm. II. 863. no. 3.
— tetragonocarpus Boiss. II. 868. no. 36.
— Thessalus Boiss. II. 877. no. 91.
— Thracicus Griseb. II. 871. no. 51.
— trichocalyx Nutt. I. 700. no. 52. (III. Emend. p. 3.)
— trichocarpus Grah. I. 704. no. 91.
— trifoliatus Boiss. II. 866. no. 17.
— trigonelloïdes Boiss. II. 867. no. 30.
— tristis Nutt. I. 704. no. 82. (III. Emend. p. 4.)
— Turczaniowii Kar. et Kir. I. 708. no. 127.
— Tymphresteus Boiss. et Sprun. II. 872. no. 58.

Astragalus unilateralis Kar. et Kir. I. 795. no. 5.
— *Uralensis* Linn. II. 862. no. 9. β.
— *utriger* Friv. II. 875. no. 78.
— vanillae Boiss. II. 870. no. 50.
— venulosus Boiss. II. 875. no. 81.
— verrucosus Moris. I. 695. no. 2.
— *verus* DC. II. 871. no. 54.
— vesicarius L. I. 710. †
— vexillaris Boiss. II. 867. no. 31.
— *vicioides* Grab. I. 704. no. 89.
— vicioides Ldb. I. 697. no. 20.
— virgatus DC. I. 710. †
— *vulpinus* Ldb. V. 518. no. 3.
— Webbianus Grab. I. 709. no. 131.
— xanthotrichos Ldb. I. 706. no. 108.
— xerophilus Ldb. II. 880. no. 106.
— Zerdanus Boiss. II. 868. no. 34.
Astranthium integrifolium Nutt. II. 958. no. 1.
Astrantia Tournef. II. 388.
— Biebersteinii Fisch. et Mey. II. 388. no. 3.
— elatior Friv. II. 388. no. 1.
— gracilis Bartl. II. 388. no. 2.
— *major* M. B. II. 388. no. 3.
Astrapaea Lindl. I. 350.
— *penduliflora* DC. I. 350. no. 1.
— *viscosa* Sweet. I. 349. no. 2.
— Wallichii Lindl. *I. 350. no. 2.
Astrephia DC. II. 528.
— laxa Hook. et Arn. II. 528. no. 1.
— lobata Hook. et Arn. (c. varr. β. et γ.) II. 528. no. 2.
—? pratensis Bth. II. 528. no. 3.
Astrocalymna Schauer. V. 737.
Astrocarpus Neck. II. 754.
— purpurascens DC. II. 754. no. 2.
— sesamoides DC. II. 754. no. 1.
Astrodon Bth. III. 873.
Astrolobium DC. I. 724. V. 519.
Astroloma R. Br. *II. 731. VI. 424.
— Candolleanum Sonder. VI. 425. no. 15. *VI. 741. (no. 15.)
— cuneifolium Sonder. VI. 424. no. 11.
— dilatatum Sonder. VI. 424. no. 4.
— discolor Sonder. VI. 424. no. 3.
— divaricatum Sonder. VI. 424. no. 7.
— Drummondii Sonder. VI. 424. no. 8.
— foliosum Sonder. VI. 424. no. 2.
— glaucescens Sonder. VI. 424. no. 5.
— latifolium Sonder. VI. 425. no. 16.
— longiflorum Sonder. VI. 424. no. 1.
— macrocalyx Sonder. VI. 425. no. 14.
— marginatum Sonder. VI. 424. no. 6.
— microcalyx Sonder. VI. 424. no. 6.
— pallidum R. Br. VI. 424. no. 10.
β. suberectum Sonder.
Astroloma Stomarrhena Sonder. VI. 425. no. 12.
— xerophyllum Sonder. VI. 425. no. 13.
Astronia Blume. II. 148.
— papetaria Blume. II. 148. no 2.
— spectabilis Blume. *II. 148. no. 4.
Astronium Jcq. *I. 455.
Astrophia littoralis Nutt. I. 722. no. 33.
Astrophytum Lem. II. 323. °V. 817.
— myriostigma Lem. II. 323. no. 1. *V. 817. no. 1.
Astropolium divaricatum Nutt. II. 574. no. 125.
— *frondosum* Nutt. II. 574. no. 130.
— *imbricatum* Nutt. 574. no. 131.
— *occidentale* Nutt. II. 574. no. 129.
Astrotricha DC. II. 385.
— hoveoides A. Cunn. II. 385. no. 3.
— latifolia Bth. II. 385. no. 1.
— linearis A. Cunn. II. 385. no. 4.
— longifolia Bth. II. 385. no. 2.
Astydamia DC. II. 414.
— Canariensis DC. *II. 414. no. 1.
Ataenia Hook. et Arn. V. 862.
— *Gairdneri* Hook. et Arn. V. 862. no. 1.
Atalanta serrulata Nutt. I. 194. no. 9.
Atalantia Correa I. 379.
—? *bilocularis* Wall. I. 380. no. 6.
— monophylla DC. *I. 379. no. 1.
— *racemosa* Wght. et Arn. I. 381. no. 9.
— *racemosa* Wght. I. 381. no. 10.
— platystigma Wght. I. 379. no. 2.
Atamisquea Miers. I. 196.
— emarginata Miers. *I. 196. no. 1.
Ataxacanthae (Acacia) Bth. I. 915.
Atelandra Lindl. III. 770. °III. 985.
— incana Lindl. III. 770. no. 1.
— polystachya Lindl. III. 770. no. 2.
Ateleia Moc. et Sess. *I. 798.
Atenia Hook. et Arn. II. 398.
— Gardneri Hook. et Arn. *II. 398. no. 1.
Athamantha Koch. II. 404.
— *Cervaria?* Pall. V. 850. no. 1.
— *cervariaefoliae* DC. V. 867. no. 1.
— compacta Ldb. II. 404. no. 2.
— *compacta* Ldb. V. 850. no. 1.
— *condensata* Linn. V. 866. no. 3.
— *Cretensis* Linn. II. 425. no. 1.
— crinita Ldb. *II. 404. no. 1.
— *Golaka* Hacquet. II. 425. no. 1.
— *incana* Stephan. V. 866. no. 2.
— lateriflora Eckl. et Zeyh. II. 404. no. 3.
— *Libanotis γ. Sibirica* R. et Schult. II. 403. no. 1.
— *Matthioli* Wulf. II. 404. no. 1.
— *maxima* Choisy. V. 868. no. 1.

Athamantha monstrosa Steph. V. 850. no. 1.
— *Roxburghiana* Wall. II. 395. no. 3.
— *Sibirica* Linn. II. 403. no. 1.
— *tenuifolia* Willd. V. 882. no. 3.
Athamanthoidea DC. V. 380. no. 1.
Athanasia Cass. *II. 638.
— *paniculata* Wall. II. 982. no. 2.
Athanasieae Lssng. II. 638. VI. 210.
Athenaea Sendtner. °VI. 580.
— anonaeea Sendtner. VI. 581. no. 8.
— hirsuta Sendtner. VI. 581. no. 7.
— Martiana Sendtner. VI. 681. no. 6.
— micrantha Sendtner. VI. 580. no. 3.
— picta Sendtner. VI. 580. no. 1. (c. varr. β. et γ.)
— pogogena Sendtner. VI. 580. no. 2.
α. genuina.
β. glabra.
— Pohliana Sendtner. VI. 581. no. 5.
— Schottiana Sendtner. VI. 581. no. 4.
Atherandra Dcne. *VI. 480.
Atherocephala DC. *II. 732. VI. 741.
Atherocephala DC. VI. 433.
— *Drummondii* DC. VI. 433. no. 11.
— Drummondii DC. *VI. 741. no. 1.
Atherocephala Sonder. VI. 433.
Athrixia Ker. *II. 650. VI. 250.
— australis Steetz. VI. 250. no. 1.
Athroisma DC. *II. 594. *II. 955. no. 2.
Athrostemma DC. V. 701. (ex p.)
Atocion Otth. II. 784. V. 81. no. 2.
Atractylis Linn. *II. 669. VI. 284.
— Persica Boiss. VI. 284. no. 2.
— Preauxiana C. H. Schultz. VI. 284. no. 3.
— scabra Boiss. VI. 284. no. 1.
Atractylodes DC. *VI. 320.
Atragene DC. I. 9.
— Alpina L. *I. 9. no. 4.
— *Capensis* L. I. 20. no. 16.
— Columbiana Nutt. I. 9. no. 1.
— *Japonica* Thunb. I. 28. no. 57.
— macropetala Ldb. I. 9. no. 2.
— *tenuifolia* L. fil. I. 20. no. 17.
— Wenderothii Schlchtd. I. 9. no. 3.
Atraxyle DC. VI. 302. no. 1.
Atrema DC. *II. 428.
Atropa Gouan. III. 112. VI. 549. no. 1.
Atropa Linn. III. 102. °III. 954. VI. 610.
Atropa Linn. III. 104.
— *arborea* Willd. III. 112. no. 1.
— *arborescens* Linn. III. 112. no. 1.
— *arenaria* Willd. III. 14. no. 1.
— *aristata* Poir. III. 104. no. 2.
— aspera Rz. et Pav. III. 102. no. 2.
— *aspera* Rz. et Pav. VI. 612. no. 5.
— Belladonna Linn. III. 103. no. 10.
Atropa bicolor Rz. et Pav. III. 103. no. 9.
— *bicolor* Rz. et Pav. VI. 612. no. 4.
— biflora Rz. et Pav. III. 103. no. 8.
— *biflora* Rz. et Pav. VI. 612. no. 3.
— *biflora* Spr. III. 29. no. 9.
— *contorta* Spr. III. 28. no. 3.
— *dentata* Spr. III. 29. no. 8.
— dependens Hook. III. 103. no. 6.
— *dependens* Hook. VI. 613. no. 2.
— *erecta* Zuccagn. III. 29. no. 6.
— *flexuosa* Willd. III. 102. no. 1.
— frutescens Linn. III. 104. no. 1.
— glandulosa Hook. III. 102. no. 4.
— *glandulosa* Hook. VI. 613. no. 1.
— herbacea Mill. III. 103. no. 12.
— hirsuta Meyen. III. 102. no. 5.
— *hirsuta* Meyen. VI. 613. no. 3.
— hirtella Spr. III. 102. no. 3.
— *Mandragora α.* Willd. III. 105. no. 2.
— *Mandragora β.* Lam. III. 105. no. 3.
— *Mandragora β.* Willd. III. 105. no. 1.
— *Mandragora foemina* Bull. Herb. III. 105. no. 3.
— *Mandragora mas* Bull. Herb. III. 105. no. 2.
— *physaloides* Georgi. III. 21. no. 14.
— *plicata* Rth. III. 28. no. 1.
— *procumbens* Cav. III. 28. no. 1.
— *punctata* Spr. III. 28. no. 5.
— *reflexa* Dietr. III. 103. no. 7.
— rhomboidea Gill. III. 103. no. 11.
— *rhomboidea* Hook. VI. 613. no. 5.
— *Rothii* Poir. III. 28. no. 2.
— *sideroxyloides* Willd. III. 113. no. 5.
— *solanacea* All. III. 112. no. 1.
— *solanacea* Linn. III. 58. no. 157.
— *spinosa* Meyen. III. 113. no. 3. VI. 618. no. 6.
— umbellata Rth. III. 28. no. 2.
— umbellata Rz. et Pav. III. 103. no. 7.
— *umbellata* Rz. et Pav. VI. 611. no. 2.
— *villosa* Zuccagn. III. 29. no. 7.
— viridiflora H. B. Kth. III. 102. no. 1.
— *viridiflora* H. B. Kth. VI. 611. no. 1.
Atrorubentes (Helianthus) Torr. et Gr. II. 983.
Attae Mart. I. 88.
Atylosia Wght. et Arn. I. 783.
— Candollii Wght. et Arn. *I. 783. no. 1.
— Lawii Wght. I. 783. no. 5.
— lineata Wght. et Arn. I. 783. no. 4. (III. Emend. p. 4.)
— major Wght. et Arn. I. 783. no. 2. (III. Emend. p. 4.)
— rugosa Wght. et Arn. I. 783. no. 3.
Aubertia varians Bth. II. 825. no. 1.
Aubletia Wlprs. IV. 29.
Aubrietia Adans. I. 140. II. 757.

Aubrietia Spr. I. 191.
— columnae Guss. I. 140. no. 1.
— deltoidea DC. I. 140. †
— gracilis Spruner. II. 757. no. 1.
— purpurea DC. I. 140. †
Auchera DC. *II. 670.
Aucklandia Falkoner. II. 669. VI. 282.
— Costus Falkoner. *II. 669. no. 1. VI. 282. no. 1.
Aucuba Thnbrg. *II. 436.
Audibertia Bth. III. 594. no. 21.
Audibertia Bth. III. 679. °III. 980.
— grandiflora Bth. III. 679. no. 1.
— humilis Bth. III. 679. no. 2.
— incana Bth. III. 680. no. 5.
— nivea Bth. III. 680. no. 4.
— polystachya Bth. III. 680. no. 6.
— stachyoides Bth. III. 679. no. 3.
Audouinia Brogn. I. 545.
— capitata Brogn. *I. 545. no. 1.
Augia Lour. I. 557.
— Sinensis Lour. *I. 557. no. 1.
Augusta Leandro. *II. 679.
Augustea DC. II. 506.
Augustinea St. Hil. et Naudin. °V. 698.
— speciosa St. Hil. et Naudin. V. 698. no. 1.
Aulacinthus (Lotononis) E. Mey. V. 455.
— *gracilis* E. Mey. V. 455. no. 1.
— *rigidus* E. Mey. V. 455. no. 2.
Aulacospermum Nutt. II. 426.
— anomalum Ldb. II. 426. no. 1.
— cuneatum Ldb. II. 426. no. 2.
Aulaya Harvey. III. 390. °III. 970. *VI. 650.
— Capensis Harvey. III. 390. no. 2.
— squamosa Harvey. III. 390. no. 1.
Aulosema Wlprs. °I. 694.
— eximium Wlprs. *I. 694. no. 1.
AURANTIACEAE Correa. I. 379. II. 804. V. 140.
Aureliana C. A. Mey. V. 924.
— *Canadensis* Lafit. V. 925. no. 4.
Aureliana Sendtner. °VI. 582.
— fasciculata Sendtner. VI. 583. no. 3.
— glomuliflora Sendtner. VI. 582. no. 1.
β. longifolia Sendtner.
— lucida Sendtner. VI. 583. no. 2.
β. tomentella Sendtner.
— tomentosa Sendtner. VI. 583. no. 4.
— velutina Sendtner. VI. 583. no. 5.
β. obtusifolia Sendtner.
Auricula Duby. VI. 410. no. 5.
— *Ursi Myconi* Dalech. III. 438. no. 1.
Aurinia Desv. *I. 142.
Averrhoa L. I. 492.
— Bilimbi L. *I. 492. no. 1.
Avicennia Linn. IV. 131. VI. 693.
Avicennia Africana Palis. IV. 132. no. 1. et 133. no. 1. ξ.
— *alba* Blume. IV. 132. no. 1.
— *elliptica* Thnbrg.? IV. 132. no. 1.
— *Lamarkiana* Prsl. VI. 693. no. 1.
— *Meyeri* Miquel. VI. 693. no. 1.
— nitida Jcq. IV. 133. no. 2.
— Oëpata Hamilt. IV. 132. no. 1.
— *resinifera* Forst. IV. 133. no. 1.
— tomentosa Linn. IV. 131. no. 1. *VI. 693. no. 1.
ε. Arabica Wlprs. IV. 133. no. 1.
δ. Asiatica Wlprs.
η. Australasica Wlprs.
β. Campechiensis H. B. Kth.
α. Cumanensis H. B. Kth. IV. 132. no. 1.
γ. Guayaquilensis H. B. Kth. IV. 133. no. 1. VI. 693. no. 1.
ξ. Owarensis Wlprs. IV. 133. no. 1.
Avicennieae Meisn. IV. 131. VI. 693.
Axanthes Blume. *II. 490.
Axia Lour. II. 531.
— Cochinchinensis Lour. *II. 531. no. 1.
Axillares Bth. (Crotalaria) V. 451. no. 188.
Axillares Bth. (Pithecolobium) V. 617.
Axilliflorae Bth. (Salvia) III. 645.
Axilliflori Sonder (Leucopogon) VI. 428.
Axinaea Rz. et Pav. *II. 117. V. 676.
— *bracteata* Zipp. II. 143. no. 21.
— radula Bth. V. 676. no. 1.
Axolopha DC. I. 290.
Axonotechium trianthemoides Fnzl. II. 239. no. 1. V. 788. no. 1.
Ayenia L. *I. 339. II. 796.
— angustifolia St. Hil. et Naud. II. 796. no. 2.
— hirta St. Hil. et Naud. II. 796. no. 1.
Aylmeria Mart. *I. 264.
Azadirachta Adr. Juss. I. 427.
— Indica Adr. Juss. *I. 427. no. 1.
Azafran III. 377. no. 12.
Azalea Desv. *II. 729. VI. 420.
— *bullata* Bnks. et Soland. VI. 432. no. 1.
— Danielsiana Paxton. VI. 420. †
— emarginata Paxton. VI. 420. †
— Indica var. Smithii Paxton. VI. 420. †
var. variegata Paxton. VI. 420. †
— marginata Paxton. VI. 420. †
— obtusa Lindl. VI. 420. no. 1.
— pulchra Paxton. VI. 420. †
— Sinensis var. coccinea Paxton. VI. 420. †
— Rawsonii Paxton. VI. 420. †
Azaltea Rz. et Pav. *I. 539.
Azamaza trifoliolata Hochstett. II. 815. no. 5. V. 361. no. 1.
Azanza Wrayae Lindl. I. 311. no. 10.
Azaola Blanco. *VI. 456.

Azara Rz. et Pav. I. 204.
— alpina Poepp. et Endl. I. 205. no. 4.
—? celastrina D. Don. I. 204. no. 1.
— dentata Rz. et Pav. I. 205. †
— Gilliesii Hook. et Arn. I. 205. no. 3.
— umbellata Prsl. I. 201. no. 2.
Azorella Lam. II. 386. II. 937.
— filamentosa Lam. *II. 937. no. 2.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 386. no. 1.
— *spinosa* Pers. II. 386. no. 1.
— trifurcata Gaertn. *II. 937. no. I.

B

Babactes A. P. DC. *VI. 520.
Babingtonia Lindl. °V. 735. II. 170. *II. 922.
— Camphorosmae Lindl. II. 170. no. 1. V. 735.
Baccharideae Lssng. II. 594. II. 952. II. 970. VI. 131.
Baccharis Linn. II. 595. (*II. 952.) II. 955. (ex p.) VI. 135.
— alnifolia Meyen et Wlprs. VI. 136. no. 8. β. integrifolia Wlprs.
— alpestris Gardn. VI. 136. no. 12.
— artemisioides Hook. et Arn. II. 597. no. 24.
— asperifolia Bth. II. 598. no. 26.
— attenuata Don. II. 597. no. 19.
— Bairdii Hook. et Arn. II. 596. no. 14.
— Baldwinii Hook. et Arn. II. 596. no. 9.
— balsamifera Bth. VI. 136. no. 13.
— berberidifolia Wlprs. II. 596. no. 8.
— bracteata Hook. et Arn. II. 597. no. 22.
— callistemoides Meyen et Wlprs. VI. 137. no. 20.
— ciliata Gardn. VI. 136. no. 11.
— concava DC. *VI. 137. no. 16.
— *corymbosa* Meyen. VI. 135. no. 1.
— daphnoides Hook. et Arn. II. 597. no. 21.
— Darwinii Hook. et Arn. II. 598. no. 31.
— depauperata Gardn. VI. 135. no. 5.
— *diversifolia* Spr. II. 958. no. 1.
— Doniana Hook. et Arn. II. 596. no. 6.
— erioptera Bth. II. 598. no. 32.
— eupatorioides Hook. et Arn. II. 595. no. 2. (c. varr. α. β. et γ. ibid.)
— ferruginea Pers. VI. 138. †
— flabellata Hook. et Arn. II. 596. no. 11.
— foliosa Gill. II. 596. no. 15.
— glauca Meyen et Wlprs. VI. 135. no. 2.
— Ilinissae Bth. VI. 138. no. 21.
— incisa Hook. et Arn. II. 596. no. 13.
Baccharis laxa Gardn. VI. 136. no. 7.
—? *lepidophylla* DC. VI. 725. no. 3.
— *ligularis* Don. II. 558. no. 1.
— *linifolia* Meyen. VI. 137. no. 17.
— longipes Knze. *VI. 135. no. 1.
— Loxensis Bth. VI. 137. no. 14.
— *lucida* Meyen. VI. 89. no. 1. β.
— Macraei Hook. et Arn. II. 597. no. 17.
— marcetiaefolia Bth. VI. 135. no. 3.
— melastomaefolia Hook. et Arn. II. 595. no. 5.
— Meyeniana Wlprs. VI. 136. no. 9.
— myrsinoides Hook. et Arn. II. 597. no. 16.
— ovata Hook. et Arn. II. 595. no. 3.
— Patagonica Hook. et Arn. II. 596. no. 12.
— *phylicaeformis* Meyen. VI. 89. no. 1.
— platypoda DC. II. 598. †
— pyramidalis Gardn. VI. 137. no. 19.
— quadrangularis Meyen. VI. 138. no. 22.
— racemosa DC. *II. 590. no. 1.
— rhetinodes Meyen et Wlprs. VI. 137. no. 15.
— *rigida* Hook. et Arn. II. 595. no. 1. β.
— *riparia* Poepp. II. 595. no. 1. β.
— rosmarinifolia Hook. et Arn. *VI. 137. no. 17.
— salicifolia Nutt. II. 596. no. 7.
— *salicifolia* Nutt. II. 972. no. 1.
— salicina Torr. et Gr. *II. 972. no. 1.
— *sessilifolia* Lssng. II. 595. no. 1. β.
— *sparsiflora* Knze. VI. 137. no. 16.
— spartea Bth. VI. 135. no. 4.
— sphaerocephala Hook. et Arn. II. 595. no. 4.
— stylosa Gardn. VI. 135. no. 6.
— subulata Don. II. 598. no. 30.
— tenella Hook. et Arn. II. 598. no. 25.
— thymifolia Hook. et Arn. II. 598. no. 28.

Baccharis trinervis Pers. II. 558. no. 2.
— Tucumanensis Hook. et Arn. II. 597. no. 20. (c. varr. α. et β. ibid.)
— Tweediei Hook. et Arn. II. 597. no. 18.
— ulicina Hook. et Arn. II. 598. no 29.
— ustulata Bth. VI. 137. no. 18.
— vaccinioides Gardn. VI. 136. no. 10.
—? *venela* H. B. Kth. II. 593. no. 2.
— vernicosa Hook. et Arn. II. 596. no. 10.
— xerophila Mart. II. 598. no. 27.
Backhousia Hook. et Harv. °V. 755.
— myrtifolia Hook. et Harv. V. 755. no. 1.
— riparia Hook. et Harv. V. 755. no. 2.
Baconia DC. *II. 483.
Bacopa Aubl. III. 283. °III. 964. *VI. 643
— aquatica Aubl III. 283. no. 1.
— grandiflora Mart. III. 284. no. 2.
Bactyrilobium Fistula Willd. I. 812. no. 3.
— *ferrugineum* Schrad. I. 812. no. 1. β.
Baderoa bryoniaefolia Bert. Herb. II. 204. no. 3.
Badiera DC. *I. 242. V. 64.
—? pulchra Hsskrl. V. 64. no. 2.
—? venenosa Hsskrl. V. 64. no. 1.
Badula Juss. VI. 451.
— Borbonica Alph. DC. VI. 451. †
— iteoides Bth. VI. 451. no. 1.
— Peruviana Alph. DC. VI. 451. †
Baea Commers. VI. 522. (*VI. 655.)
— *alata* Pers. III. 161. no. 63.
— hygrometrica R. Br. *VI. 522. no. 1.
— *plantaginea* Pers. III. 151. no. 1.
— *punctata* Pers. III. 151. no. 2.
— *triandra* Pers. III. 152. no. 4.
— *violacea* Pers. III. 151. no. 3.
Baeckea Linn. II. 169. II. 920. °V. 734.
— affinis Endl. II. 170. no. 7. V. 739. no. 7.
— *affinis* Endl. II. 922. no. 2.
— affinis Hook. II. 169. no. 3.
— *affinis* Hook. II. 921. no. 2.
— *alpina* Lindl. II. 921. no. 1.
— *calycina* Lindl. V. 728. no. 1.
— *camphorata* R. Br. V. 736. no. 1.
— *camphorosmae* Endl. II. 170. no. 1.
— camphorosmae Endl. V. 735. no. 1.
— crassifolia Lindl. II. 920. no 1.
— *crenulata* DC. II. 920. no. 1. V. 734. no. 1.
— Cumingeana Schauer. II. 920. no. 3.
— *densifolia* Sm. V. 735. no. 1.
— *diffusa* Sieb. II. 921. no. 2.
— *diosmifolia* Rdge. V. 734. no. 3.
— *diosmifolia* Schauer. II. 920. no. 3.
— *diosmoides* Sieb. II. 920. no. 2. V. 731. no. 2.
— *frutescens* Otto et Dietr. II. 922. no. 2. V. 739. no. 7.
Baeckea gracilis Cunn. II. 920. no. 4.
— Gunniana Schauer. II. 920. no. 2.
— involucrata Endl. II. 170. no. 6.
— *involucrata* Endl. II. 922. no. 1. V. 736. no. 1.
— leptocaulis Hook. II. 170. no. 4.
— linifolia Rudge. II. 921. no. 4.
— micrantha DC. II. 170. †
— *micrantha* DC. II. 920. no. 5. V. 734. no. 5.
— *microphylla* A. Cunn. II. 921. no. 2.
— *microphylla* Rdge. V. 734. no. 4.
— *microphylla* Sieb. II. 920. no. 4.
— *obovata* DC. II. 922. no. 1. V. 736. no. 1.
— phylicoides A. Cunn. II. 921. no. 5.
— *pinifolia* Schauer. V. 735. no. 3.
— *prostrata* Hook. II. 922. no. 2.
— prostrata Hook. II. 169. no. 2.
— pulchella DC. II. 170. †
— *ramosissima* A. Cunn. II. 922. no. 2.
— saxicola Cunningh. II. 170. no. 5.
— *saxicola* A. Cunn. II. 921. no. 1. V. 732. no. 1.
— *speciosa* A. Cunn. II. 922. no. 1. V. 737. no. 2.
— thymifolia Hook. II. 169. no. 1.
— *thymifolia* Hook. II. 922. no. 3.
— *trichophylla* Sieb. II. 921. no. 4.
— *virgata* Andrws. V. 735. no. 2.
Baeckeeae Schauer. II. 920. V. 734.
Baeobotrys rufescens E. Mey. VI. 448. no. 2.
Baeria Fisch. et Mey. *II. 629.
— *chrysostoma* Fisch. et Mey. II. 989. no. 1.
Bahel Tsjulli Rheede. III. 296. no. 3.
Bahia DC. II. 626. 989. VI. 175.
— absynthiifolia Bth. II. 626. no. 1.
— *ambrosioides* Lag. II. 627. no. 1.
— arachnoidea Fisch. et Lallem. II. 989. no. 1.
— gracilis Hook. et Arn. II. 989. no. 2.
— *integrifolia* DC. VI. 175. no. 2.
— latifolia Bth. VI. 175. no. 1.
— leucophylla DC. *VI. 175. no. 2.
— multiflora Nutt. *II. 626. no. 3.
— *multiflora* Nutt. VI. 175. no. 2.
— trifida Nutt. II. 626. no. 2.
Baissea Alph. DC. *VI. 473.
Balangue Grtnr. *VI. 464.
Balanopteris minor Grtnr. V. 106. no. 1.
— *Tothila* Grtnr. V. 106. no. 1.
Balardia Platensis Cambess. I. 265. no. 4.
Balanites Del. I. 379.
— Aegyptiaca Del. *I. 379. no. 1.
Balbisia DC. *II. 665.
— *Meyeniana* Klotzsch. I. 460. no. 3.
— *peduncularis* Don. I. 460. no. 2.

Balbisia verticillata Cav. I. 460. no. 1.
Balbisieae DC. II. 665.
Balduina Nutt. *II. 625. II. 988.
— multiflora Nutt. *II. 988. no. 1.
Balfouria R. Br. *VI. 471.
Ballota Linn. III. 862. °III. 989. VI. 683.
Ballota Bth. III. 865.
— acetabulosa Bth. III. 863. no. 4.
— Africana Bth. III. 862. no. 1.
— *alba* Linn. III. 865. no. 14.
— Aucheri Boiss. III. 864. no. 5.
— *borealis* Schweigg. III. 865. no. 14.
— *cinerea* Don. III. 867. no. 1.
— discolor Desf. *III. 867. no. 23.
— *disticha* Linn. III. 815. no. 5.
— *disticha* Rodsch. III. 560. no. 167.
— *foetida* Lam. III. 865. no. 14.
— *foliis cordatis* Plum. III. 557. no. 159.
— Forskålii Bth. III. 866. no. 20.
— hirsuta Bth. III. 864. no. 7.
β. hispida Bth.
— Hispanica Bth. III. 865. no. 13.
— integrifolia Bth. III. 866. no. 19.
— *lanata* Linn. III. 812. no. 8.
— limbata Bth. III. 866. no. 17.
— *Mauritiana* Pers. III. 815. no. 5.
— microphylla Bth. III. 864. no. 8.
— mollissima Bth. III. 864. no. 6.
— nigra Linn. III. 865. no. 14.
— obliqua Bth. III. 864. no. 10.
— orientalis Prsl. III. 866. no. 21.
— parvifolia Desf. *III. 867. no. 24.
— Persica Bth. III. 865. no. 16.
— pilosa Lour. III. 866. no. 22.
— *pilosa* Lour. III. 872. no. 22.
— pseudodictamnus Bth. III. 863. no. 2.
— *rubra* Schrad. III. 865. no. 14.
— ruderalis Spr. III. 865. no. 14.
— rugosa Bth. III. 864. no. 9.
— Russelliana Bth. III. 865. no. 12.
— saxatilis Sieb. III. 865. no. 11.
— *sepium* Paulet. III. 865. no. 14.
— spinosa Lnk. III. 866. no. 18.
— stachydiformis Hochstett. *VI. 685. no. 1.
— *suaveolens* Linn. III. 557. no. 159.
— *suaveolens* Rodsch. III. 560. no. 167.
— undulata Bth. III. 863. no. 3.
— urticaefolia Ortm. III. 865. no. 15.
— *vulgaris* Lnk. III. 865. no. 14.
Balloteae Endl. III. 862. III. 989. VI. 683.
Balneda corylifolia Skanagad. I. 362. no. 30.
Balsamina Riv. I. 467. V. 382.
— *angustifolia* Blume. I. 469. no. 20.
— *coccinea* DC. I. 467. no. 1. *α*.
— *cornuta* DC. I. 467. no. 1. *α*.
— *heterophylla* G. Don. I. 474. no. 64.
Balsamina hortensis DC. I. 467. no. 1. *α*.
— *Lechenaultii* DC. I. 467. no. 4.
— *Madagascariensis* DC. I. 476. no. 3.
— *minor* DC. I. 475. no. 69.
— *minutiflora* Spanoghe. I. 475. no. 71.
— *mollis* Don. I. 468. no. 7.
— *odorata* Ham. I. 472. no. 44.
— *racemosa* Ham. I. 472. no. 43.
— *scabriuscula* Bot. Reg. I. 468. no. 5.
— *setacea* Colebr. I. 475. no. 73.
— *Tilo* DC. I. 474. no. 62.
BALSAMINEAE A. Rich. I. 467. II. 821. V. 382.
Balsamita C. H. Schultz. VI. 219.
— *major* Dodon. VI. 219. no. 1.
— *mas* Blackw. VI. 219. no. 1.
— *suaveolens* Pers. VI. 219. no. 1.
— *vulgaris* Willd. VI. 219. no. 1.
Balsamodendron Kth. I. 558. II. 830.
— Africanum Arn. I. 558. no. 3.
— Berryi Arn. I. 558. no. 1.
— *Gileadense* DC. I. 558. no. 1.
— Gileadense Kth. *II. 830. no. 1.
— *Opobalsamum* Kth. II. 830. no. 1.
— Roxburghii Arn. *I. 558. no. 2.
— Wightii Arn. I. 558. no. 4.
— Zeylanicum Kth. I. 558. no. 1.
Balsamona Pinto Vellozo. II. 107. no. 17.
Balsamorhiza DC. II. 610.
— deltoidea Nutt. II. 610. no. 8.
— helianthoides Nutt. II. 610. no. 7.
— hirsuta Nutt. II. 610. no. 3.
— Hookeri Nutt. *II. 610. no. 1.
— incana Nutt. II. 610. no. 4.
— macrophylla Nutt. II. 610. no. 5.
— sagittata Nutt. II. 610. no. 6.
— terebinthacea Nutt. *II. 610. no. 2.
Baltimora Linn. *II. 604.
Banara Aubl. *I. 204. II. 765.
— *fagifolia* Vahl. I. 204. no. 1.
— Vellozii Gardn. II. 765. no. 1.
Bancroftia Macf. I. 363. *V. 120.
— diffusa Macf. *I. 363. no. 1.
— *diffusa* Mcfd. V. 55. no. 1.
Banisteria H. B. Kth. °V. 222.
— acanthocarpa Adr. Juss. V. 226. no. 10.
— Adamantium Adr. Juss. V. 236. no. 30.
— adenopoda Adr. Juss. V. 233. no. 25.
— *allophila* Sieb. V. 202. no. 2.
— *amoena* Martius. V. 336. no. 45.
— *angulata* Arrabida. V. 210. no. 20.
— *angulosa* Aubl. V. 206. no. 10.
— *angulosa* Linn. V. 206. no. 12.
— angustifolia Adr. Juss. V. 228. no. 16.
— *anisandra* Griseb. V. 245. no. 54.
— anisandra Adr. Juss. V. 245. no. 55.

Banisteria appendiculata Adr. Juss. V. 239. no. 40.
— argentea Spr. V. 225. no. 7.
— argyrophylla Adr. Juss. V. 227. no. 13.
— atrosanguinea Adr. Juss. V. 223. no. 1.
— *auriculata* Cav. V. 205. no. 5.
— *Benghalensis* Linn. V. 294. no. 1.
— Benthamiana Adr. Juss. V. 223. no. 2.
— *bicolor* Poepp. V. 22 . no. 7.
— Blanchetiana Adr. Juss. V. 244. no. 52.
— *Bonariensis* Hook. et Arn. V. 213. no. 26.
— *brachiata* Linn. V. 280. no. 70.
— *brachiata* Spr. V. 266. no. 31.
— *brachiata* Willd. V. 202. no. 2.
— *bracteata* DC. V. ‹03. no. 7.
— *brachyptera* DC. V. 202. no. 3.
— *brevipes* DC. V. 348. no. 15.
— *caerulea* Lam. V. 267. no. 37.
— *Calcitrapa* Dsvx. V. 202. no. 3.
— calocarpa Miquel. V. 225. no. 9.
— campestris Adr. Juss. V. 230. no. 19.
— *chrysophylla* Lam. V. 264. no. 24.
— Clausseniana Adr. Juss. V. 245. no. 54.
— *ciliata* Lam. V. 206. no. 7.
— comans Adr. Juss. V. 2.6. no. 31.
γ. latifolia Adr. Juss.
δ. pubifolia Adr. Juss.
β. stellaris Adr. Juss.
— *convolvulifolia* Cavan. V. 216. no. 37. V. 217. no. 40.
— *cordata* Arrabida. V. 307. no. 18.
— *cordata* Leandro de Sacramento. V. 204. no. 3.
— *cordistipula* Mart. V. 251. no. 6.
— *cornifolia* Spr. V. 284. no. 81.
— crotonifolia Adr. Juss. V. 231. no. 21.
— *Cujabensis* Griseb. V. 337. no. 49
— *deformis* Dsvx. V. 206. no. 12.
— *dichotoma* DC. V. 216. no. 37.
— divaricata Adr. Juss. V. 239. no. 39.
— *diversifolia* Bertero. V. 211. no. 22.
— *diversifolia* H. B. Kth. V. 219. no. 46.
—? *eglandulosa* DC. V. 270. no. 45.
— eglandulosa Adr. Juss. V. 237. no. 34.
— *elliptica* H. B. Kth. V. 217. no. 41.
— *emarginata* DC. V. 219. no. 46.
— *emarginata* Cavan. V. 220. no. 49.
— erianthera Adr. Juss. V. 238. no. 36.
—? *fagifolia* DC. V. 333. no. 38.
— ferruginea Cavan. V. 242. no. 48.
— *fimbriata* Griseb. V. 238. no. 35.
— *foliis ovatis oppositis* Burm. V. 303. no. 7.
— *foliis ovatis, ramis brachiatis* Plum. V. 216. no. 37.
— *foliis ovato-oblongis acuminatis* Plum. V. 267. no. 37.
Banisteria foliis pinnatis, foliolis ovatis quadrijugis Plum. V. 279. no. 67.
— *fruticosa* Arrabida. V. 276. no. 61.
— *fulgens* DC. V. 217. no. 40.
— *fulgens* Lam. V. 214. no. 30.
— *fulgens* Linn. V. 219. no. 46.
— Gardneriana Adr. Juss. V. 244. no. 53.
— *glandulosa* Pavon. V. 281. no. 73.
— *glaucophylla* Mart. V. 182. no. 1.
— *heterophylla* Willd. 214. no. 30.
— heterostyla Adr. Juss. V. 237. no. 32.
— *Humboldtiana* DC. V. 211. no. 22.
— hypericifolia Adr. Juss. V. 241. no. 45.
— Jasminellum Adr. Juss. V. 237. no. 33.
— intermedia Adr. Juss. V. 235. no. 29.
— laevifolia Adr. Juss. V. 228. no. 14.
— *lancifolia* West. V. 267. no. 36.
— latifolia Adr. Juss. V. 233. no. 26.
— *laurifolia* Linn. V. 267. no 36.
— *laurifolia* Rich. V. 219. no. 45.
— *laurifolia* Sieb. V. 168. no. 39.
— *ledifolia* H. B. Kth. V. 219. no. 46.
— leiocarpa Adr. Juss. V. 226. no. 11.
— *Leona* Cav. V. 267. no. 32. et 286. no. 2.
— lobulata E. Mey. V. 239. no. 38.
— *longifolia* Swrtz. V. 266. no. 31.
— lucida A. Rich. V. 239. no. 37.
— *macrocarpa* Pers. V. 266. no. 31.
— *macrodena β. Guadelapensis* DC. V. 267. no. 37.
— macrophylla Adr. Juss. V. 243. no. 49.
— *macrostachya* Arrabida. V. 245. no. 54.
— *magnoliaefolia* Dsvx. V. 266. no. 31.
— Maracaybensis Adr. Juss. V. 243. no. 50.
—? *maritima* Rich. V. 202. no 2.
— Martiniana Adr. Juss. V. 240. no. 42.
— megaphylla Adr. Juss. V. 230. no. 20.
— membranifolia Adr. Juss. V. 232. no. 24.
— metallicolor Adr. Juss. V. 223. no. 3.
— *microphylla* Dsvx. V. 219. no. 45.
— Minarum Martius. V. 234. no. 27.
— *monoptera* Arrabida. V. 264. no. 24.
— montana Adr. Juss. V. 229. no. 18.
— *mucronata* DC. V. 218. no. 42.
— *multiflora* DC. V. 266. no. 31.
— multifoliolata Adr. Juss. V. 232. no. 23.
— muricata Cavan. V. 225. no. 8.
— nigrescens Adr. Juss. V. 238. no. 35.
— *nitens* Griseb. V. 228. no. 13.
— *nitida* Lam. V. 261. no. 23.
— nummifera Adr. Juss. V. 224. no. 5.
— *ochnaefolia* Martius. V. 271. no. 48.
— *Orinocensis* H. B. Kth. V. 270. no. 43.
— *ovata* Cav. V. 202. no. 2.
— oxyclada Adr. Juss. V. 227. no. 12.
— *palmata* Cavan. V. 206. no. 11.

Banisteria paniculata DC. V. 279. no. 69.
— parviflora Adr. Juss. V. 242. no. 47.
— *parvifolia* Venten. V. 279. no. 67.
— *patens* Griseb. V. 255. no. 3.
— pauciflora H. B. Kth. V. 224. no. 4.
— *periplocaefolia* Dsf. V. 219. no. 45.
— *picta* H. B. Kth. V. 202. no. 2.
— *polymorpha var. glabra* Slzm. V. 210. no. 18.
— *Pragua* Vell. V. 278. no. 64.
— pruinosa Mart. V. 225. no. 6.
— *pubera* Rich. V. 217. no. 40.
—? *pubiflora* DC. V. 267. no. 36.
— pubipetala Adr. Juss. V. 239. no. 41.
— *purpurea* Linn. V. 279. no. 67.
— *Quapara* Aubl. V. 338. no. 53.
β. mucronulata DC. V. 280. no. 71.
— rigida Adr. Juss. V. 242. no. 46.
— *sagittata* Cavan. V. 206. no. 9. (V. 210. no. 20. obs.)
— salicifolia DC. V. 228. no. 15.
— schizoptera Adr. Juss. V. 234. no. 28.
— Sellowiana Adr. Juss. V. 244. no. 51.
— sepium Adr. Juss. V. 240. no. 43.
— *sericea* Cavan. V. 263. no. 21.
— *sericea* Dombey. V. 226. no. 10.
— *Sinemariensis* Aubl. V. 217. no. 40. V. 328. no. 23.
— *sinuata* DC. V. 206. no. 10.
— *Spixiana* Mart. V. 270. no. 45.
— *splendens* DC. V. 214. no. 30.
— *suberosa* Willd. V. 270. no. 45.
— *tenuis* Lindl. V. 276. no. 62.
— *ternata* Moç. et Sess. V. 217. no. 39.
— *tetraptera* Sonnerat. V. 294. no. 1.
— *thyrsoidea* Griseb. V. 255. no. 2.
— *tiliaefolia* H. B. Kth. V. 211. no. 22.
— *tiliaefolia* Venten. V. 221. no. 1.
— *Timorensis* DC. V. 222. no. 6.
— *tomentosa* Juss. V. 220. no. 49.
— *tomentosa* Pav. V. 211. no. 22.
— *tomentosa* Slzm. V. 216. no. 35.
— *tomentosa* Schlchtd. V. 279. no. 69.
— *tristellocarpa* Bojer. V. 293. no. 6.
— *umbellata* Sieb. V. 169. no. 42.
— *umbellulata* DC. V. 219. no. 45.
— *umbellulata* Sieb. V. 202. no. 2.
— *unialata* Arrabida. V. 243. no. 48.
— *unicapsularis* Lam. V. 294. no. 1.
— *variifolia* DC. V. 211. no. 22.
— velutina Adr. Juss. V. 231. no. 22.
— vernoniaefolia Adr. Juss. V. 229. no. 17.
— virgultosa Adr. Juss. V. 241. no. 44.
— *vitifolia* Moç. et Sess. V. 211. no. 22.
— *Zanzibarica* Bojer. V. 287. no. 5.
Banisterieae Adr. Juss. V. 200.
Baphia Afz. *I. 932.
Baphorhiza DC. VI. 561. no. 1.
Baptisia Vent. I. 563.
— *alba* Hook. I. 563. no. 7.
— australis R. Br. *I. 563. no. 6.
β. minor Lehm. I. 563. oo. 6.
— *australis* Hortor. I. 563. no. 6.
— *bracteata* Mühlbg. I. 563. no. 5.
— confusa Sweet. I. 564. no. 10.
— exaltata Sweet. I. 564. no. 11.
— lanceolata Ell. I. 563. no. 3. (c. var. *α* et *β*.)
— Lecontii Torr. et Gr. I. 563. no. 9. (c. var. *β*.)
— leucantha Torr. et Gr. I. 563. no. 7.
— leucophaea Nutt. *I. 563. no. 5.
— megacarpa Chapm. I. 563. no. 8.
— microphylla Nutt. I. 563. no. 1.
— *Napalensis* Hook. V. 422. no. 1.
— *Nepalensis* Hook. II. 831. no. 1.
— perfoliata R. Br. I. 564. †
— simplicifolia Croome I. 563. no. 2.
— sphaerocarpa Nutt. I. 563. no. 4. (III. Emend. p. 3.)
— *uniflora* Hook. I. 563. no. 3. *γ*.
Barbaraea cf. Barbarea.
Barbarea R. Br. I. 128. II. 755. V. 34.
— Augustana Boiss. II. 755. no. 1.
— brachycarpa Boiss. V. 34. no. 1.
— *arcuata* Bongd. I. 128. no. 1.
— arcuata Rchb. I. 128. †
— humilis Prsh. I. 128. no. 3.
— orthoceras Ledeb. I. 128. no. 4.
— praecox R. Br. I. 128. †
— rupicola Moris. I. 128. no. 2.
— stricta Andrz. I. 128. †
— vulgaris R. Br. I. 128. no. 1.
Barbieria DC. *I. 762. V. 532.
— Maynensis Poepp. et Endl. V. 532. no. 1.
Barbula Sinensis Loureiro. IV. 3.
Barbylus P. Br. *I. 560.
Barcleya Wall. I. 108.
— longifolia Wall. *I. 108. no. 1.
Barcleyeae Endl. I. 108.
Bargemontia Gaudich. °VI. 551.
— Peruviana Gaudich. *VI. 551. no. 1.
Barjonia Dcne. *VI. 482.
Barkhausia Mnch. II. 697. VI. 357.
— *elegans* Nutt. II. 698. no. 9.
— *flexuosa* DC. VI. 361. no. 5.
β. lyrata Schrenk.
— flexuosa DC. II. 697. no. 3.
β. lyrata Schrenk.
— Fraasii C. H. Schultz. II. 993. no. 1.
— Kotschyana Boiss. VI. 357. no. 1.
— *nana* DC. II. 698. no. 8. VI. 361. no. 6. *α*.

Barkhausia nana β. lyratifolia Turcz. VI. 361. no. 6. δ.
— prostrata Dumort. II. 697. no. 1.
— tenella Bth. II. 697. no. 2.
— *tenuifolia* DC. 361. no. 4.
Barnadesia DC. II. 678. ex p. VI. 312. ex p.
Barnadesia Linn. II. 678. * VI. 312.
— *flavescens* Meyen. VI. 314. no. 3.
— *lanata* Meyen. VI. 314. no. 1.
— rosea Lindl. II. 678. no. 1. VI. 732.
Barnadesieae DC. II. 678. VI. 312.
Barosma Willd. I. 510. V. 391.
— alpina Eckl. et Zeyh. I. 510. no. 1.
— Eckloniana Bartl. V. 392. no. 3.
— *foetidissima* Eckl. et Zeyh. V. 391. no. 1.
— *gnidioides* Eckl. et Zeyh. I. 513. no. 51.
— Kraussiana Meisn. V. 392. no. 2.
— mucronata Meisn. V. 391. no. 1.
— *oblonga* Eckl. et Zeyh. V. 392. no. 3.
— pauciflora Eckl. et Zeyh. I. 510 no. 5.
— pulchra Cham. I. 510. no. 6.
— scoparia Eckl. et Zeyh. I. 510. no. 3.
— ternata Eckl. et Zeyh. I. 510. no. 4.
— venusta Eckl. et Zeyh. I. 510. no. 2.
Barringtonia DC. II. 192. V. 756.
Barringtonia Forst. II. 192. V. 756.
— acutangula Gaertn. *II. 192. no. 1.
— racemosa Gaudich. II. 192. no. 2.
— speciosa L. *II. 192. no. 3. * V. 756. no. 1.
BARRINGTONIEAE DC. II. 192. V. 756.
Barrowia Dcne. VI. 493.
— jasminiflora Dcne. * VI. 493. no. 1.
Bartlingia Ad. Brogn. II. 152. ° V. 726.
— obovata Ad. Brogn. *II. 152. no. 1. V. 726. no. 1.
Bartlingieae Schauer. II. 152. V. 726.
Bartonia Sims. II. 224.
— albescens Gill. et Arn. II. 224. no. 3.
— *albicaulis* Dougl. II. 224. no. 6.
— *aurea* Lindl. II. 224. no. 4. V. 776. no. 1.
— *decapitata* Sims. II. 224. no. 1.
— laevicaulis Dougl. 224. no. 4.
— micrantha Hook. et Arn. II. 225. no. 6.
— nuda Nutt. *II. 224. no. 2.
— ornata Nutt. *II. 224. no. 1.
— pumila Nutt. II. 225. no. 5.
— *sinuata* Prsl. II. 224. no. 3.
Bartramea DC. I. 355. 356.
Bartschia Endl. III. 407.
Bartsia Linn. III. 407. °III. 972. * VI. 653.
Bartsia L. VI. 653. (ex p.)
— *acuminata* Prsh. III 396. no. 26.
— alpina Linn. III. 407. no. 1.
— carnea Griseb. III. 409. no. 8.
— *coccinea* Linn. III. 395. no. 15.
— *Fagonii* Lapeyr. III. 407. no. 2.
Bartsia gymnandra Linn. fil. III. 372. no. 6.
— *gymnandra* Prsh. III. 372. no. 4.
— *latifolia* Sm. III. 408. no. 4.
— maxima Pers. III. 409. no. 7.
— *Odontites* Huds. III. 399. no. 1.
— pallida Zinn. III. 393. no. 1.
— Peruviana Wlprs. III. 408. no. 3.
— purpurea Duby. III. 408. no. 4.
— *scabra* Spr. III. 391. no. 3.
— scordifolia Steud. III. 409. no. 9.
— *serotina* Bertol. III. 399. no. 2.
— spicata Pers. III. 407. no. 2.
— *tenuifolia* Prsh. III. 392. no. 5.
— *trifida* Spr. III. 409. no. 1.
— Trixago Linn. III. 408. no. 6.
β. versicolor Rchb.
— *versicolor* Pers. III. 408. no. 6. β.
— viscosa Linn. III. 408. no. 5.
β. bicolor Rchb.
— *viscosa* var. Bnks. III. 406. no. 20.
Bartsieae Bth. VI. 652.
Baryxylum Lour. *I. 855.
Baseophyllum (Cassia) DC. I. 830.
Basibracteatae Bth. (Acacia) I. 912.
Basilicum agreste Rumph. III. 488. no. 18.
— *citratum* Rumph. III. 484. no. 2. β.
— *Indicum* Rumph. III. 484. no. 2. α.
Bassia Koen. * VI. 456.
Bassovia sylvatica Aubl. III. 57. no. 148.
Bastardia Kth. I. 327.
— angulata Guill. et Perr. I. 327. no. 1.
— hirsutissima Prsl. I. 327. no. 2.
— nemoralis St. Hil. I. 327. no. 3.
Batatas Rmph. VI. 530.
— .... sp. nov? Bth. VI. 530. no. 4.
— Bonariensis Lindl. VI. 530. †
— crassicaulis Bth. VI. 530. no. 2.
— glabra Bth. *VI. 530. no. 3.
— Wallii Morren. VI. 530. no. 1.
Batheogyne Bth. II. 5.
Bathrys Canadensis Spach. I. 387. no. 44.
— *gentianoides* Spach. I. 387. no. 45.
— *quinquenervia* Spach. I. 387. no. 43.
Bathysa Prsl. ° VI. 59.
— stipulata Prsl. VI. 60. no. 1.
Batrachium DC. I. 34. 39. 42. 44.
Bauera Kenned. II. 375. V. 835.
— Billardieri D. Don. V. 935. no. 2.
— juncea Sm. * II. 375. no. 2.
— microphylla Sieb. V. 835. no. 3.
— rubiaefolia Salisb. V. 835. no. 1.
— rubioides Andr. * II. 375. no. 1.
— *rubioides* Andrws. V. 835. no. 1.
— *rubioides* Labillard. V. 835. no. 2.
Bauhinia L. I. 817. II. 901. V. 572.

Bauhinia DC. I. 947. ex p. 853. ex p. 855. ex p. V. 571.
— acuminata L. *I. 847. no. 4.
— Açuruana Moric. V. 572. no. 2.
— Adansoniana Guill. et Perr. I. 852. no. 74.
— affinis Vogel. I. 849. no. 28.
— albicans Vogel. I. 850. no. 40.
— ampla Spanoghe. I. 847. no. 2.
— anguina Rxb. *I. 851. no. 52.
— angulosa Vogel. I. 852. no. 66.
— aurantiaca Bojer. I. 847. no. 7.
— Bahiensis Bngd. I. 851. no. 59.
— bicolor Bongd. I. 848. no. 10.
— bidentata W. Jack. I. 850. no. 41.
— Brasiliensis Vogel. 850. no. 39.
— brachystachya Wlprs. I. 852. no. 71.
— Bredemeyeri Vogel. I. 850. no. 38.
— brevipes Vogel. I. 848. no. 22.
— Buchanani Desv. I. 851. no. 53.
— *candida* Ait. I. 847. no. 4.
— *candida* Rxb. I. 847. no. 6.
— castrata Hasskarl. II. 904. no. 1.
— *castrata* Hskrl. V. 571. no. 1.
— cheilantha Bongd. I. 848. no. 12.
— Chinensis Vogel. I. 853. no. 78.
— choriphylla Vogel. I. 849. no. 23.
— chrysophylla Vogel. I. 852. no. 67.
— Columbiensis Vogel. I. 852. no. 68.
— cordata Vogel. I. 849. no. 24.
— *Coromandeliana* DC. I. 850. no. 44.
— corymbosa Rxb. I. 853. †
— Cumanensis H. B. Kth. I. 853. †
— Cuyabensis Bongd. I. 848. no. 16.
— debilis Hsskrl. V. 572. no. 1.
— *diphylla* Buchan. I. 851. no. 53.
— *divaricata* Dennstaedt. V. 572. no. 1.
— dodecandra Bngd. I. 849. no. 32.
— dubia Vogel. I. 852. no. 69.
— elongata Krthls. I. 850. no. 48.
— eriophora Ten. II. 904. no. 2.
— ferruginea Bongd. I. 848. no. 11.
— ferruginea Rxb. I. 850. no. 49.
— *flexuosa* Moric. V. 572. no. 2.
— floribunda Desv. I. 851. no. 54.
— forficata Lk. et Otto. I. 853. †
— fulva Blume. I. 850. no. 50.
— fusconervis Bongd. I. 848. no. 9.
— Garipensis E. Mey. I. 852. no. 73.
— geminata Vogel. I. 848. no. 18.
— grandifolia Bngd. I. 849. no. 33.
— grandiflora Juss. I. 853. †
— hirsuta Bngd. I. 849. no. 36.
— hirsuta Krthls. I. 852. no. 75.
— holophylla Bongd. I. 848. no. 13.
— *inermis* Billbg. I. 852. no. 68.
— *inermis* Forsk. I. 848. no. 8.
Bauhinia intermedia Vogel. I. 849. no. 25.
— Kockiana Krthls. I. 850. no. 46.
— Kunthiana Vogel. I. 852. no. 65.
— Langsdorffiana Bngd. I. 851. no. 55.
— longiflora Bngd. I. 849. no. 31.
— longifolia Bongd. I. 848. no. 14.
— longipetala Wlprs. I. 852. no. 72.
— macrostachya Bth. I. 849. no. 26.
— Malabarica Rxb. I. 847. no. 3. (III. Emendand. p. 4.)
— marginata Bngd. I. 849. no. 30.
— microphylla Vogel. I. 849. no. 37.
— mollis Bngd. I. 849. no. 35.
— obtusata Vogel I. 848. no. 19.
— odoratissima Moric. V. 572. no. 3.
— Olfersiana Vogel. I. 848. no. 21.
— ovata Bngd. I. 849. no. 34.
— *parviflora* Vahl. I. 847. no. 5.
— pentandra Bongd. I. 848. no. 17.
— phoenicea Heyne I. 850 no. 43.
— *piperifolia* Rxb. I. 851. no. 52.
— Poiteauana Vogel. I. 851. no. 60.
— polyantha Vogel. I. 851. no. 61.
— pruinosa Vogel. I. 849. no. 20.
— purpurea Linn. *I. 850. no. 44.
— *purpurea* Wall. I. 847. no. 4. I. 847. no. 6.
— pyrrhaneura Krthls. I. 850. no. 47.
— racemosa Lam. *I. 847. no. 5.
— *racemosa* Vahl. I. 850. no. 45.
— Raddiana Bngd. I. 851. no. 56.
— reticulata DC. *I. 848. no. 8.
— rhodacantha Desv. I. 849. no. 27.
— Riedeliana Bngd. I. 851. no. 58.
— *rosea* Miquel. V. 572. no. 3.
— rubiginosa Bngd. I. 851. no. 57.
— rufa Bongd. I. 848. no. 15.
— ruficarpa Desv. I. 850. no. 42.
— *scandens* Rxb. I. 850. no. 45.
— scandens Rxb. I. 853. †
— Schlechtendaliana Mart. et Galeotti. V. 572. no. 4.
— Sellowiana Vogel. I. 848. no. 20.
— semibifida Rxb. I. 853. no. 77. et †
— speciosa Vogel. I. 852. no. 70.
— *spicata* Koen. I. 847. no. 5.
— spicata Vogel. I. 851. no. 62.
— splendens H. B. Kth. *I. 851. no. 64.
— stipularis Krthls. I. 851. no. 51.
— *tamarindifolia* Delile I. 848. no. 8.
— *Thonningii* Schum. I. 848. no. 8.
— Timoriana Dcne. I. 852. no. 76.
— Vahlii Wght. et Arn. *I. 850. no. 45.
— variegata Linn. *I. 847. no. 6.
— verrucosa Vogel. I. 851. no. 63.
— versicolor Bertol. I. 833. no. 79.
— viridescens Desv. I. 847. no. 1.

Bauhinieae Bth. I. 847. II. 904. V. 571.
Baumannia DC. II. 486. VI. 48.
— *Douglasiana* Spach. II. 80. no. 4.
— geminiflora DC. *II. 486. no. 1. VI. 48. no. 1.
— *Nuttalliana* Spach. II. 80. no. 5.
Baxtera Rchb. *VI. 495.
Bayberry-tree Hugh. V. 756. no. 2.
Beaufortia Lindl. II. 162. (ex p.)
Beaufortia R. Br. II. 161. II. 928. °V. 749.
— anisandra Schauer. II. 929. no. 5.
— *Dampieri* Cunn. II. 162. no. 1.
— Dampieri Cunn. II. 929. no. 8.
— decussata R. Br. II. 928. no. 1.
— elegans Schauer. II. 930. no. 9.
— empetrifolia Schauer. II. 930. no. 10.
— inops Schauer. II. 930. no. 11.
— *macrostemon* Lindl. II. 162. no. 2.
— macrostemon Lindl. II. 929. no. 4.
— micrantha Schauer. II. 930. no. 12.
— *purpurea* Lindl. II. 162. no. 3.
— purpurea Lindl. II. 929. no. 6.
— Schaueri Preiss. II. 929. no. 7.
— sparsa R. Br. II. 929. no. 2.
— splendens Baxter. II. 161. no. 1.
— *splendens* Baxter. II. 929. no. 2.
— squarrosa Schauer. II. 929. no. 3.
Beaumontia Wall. *V. 471.
— grandiflora Wall. VI. 742.
Beautempsia Gaudich. V. 55.
— avicenniaefolia Gaudich. *V. 55. no. 1.
Beccabunga Riv. III. 350. no. 78.
— *alpina* etc. Bocc. III. 350. no. 78. β.
— *minor* Riv. III. 350. no. 78. β.
Bechium DC. *II. 541.
Becium Lindl. III. 522. °III. 978. VI. 658.
— bicolor Lindl. *III. 522. no. 1. VI. 658. no. 1. †
Beckea Afrikana Burm. I. 543. no. 3.
— *cordata* Burm. I. 543. no. 2.
— *cordata* Eckl. et Zeyh. I. 544. no. 9.
— *lancifolia* Eckl. et Zeyh. I. 544. no. 8.
— *racemosa* Eckl. et Zeyh. I. 543. no. 2.
— *thyrsophora* Eckl. et Zeyh. I. 544. no. 7.
Bedegian Rauw. III. 82. no. 319. *a*.b.
Bedfordia DC. II. 665.
— salicina DC. *II. 665. no. 1.
Befaria Mut. II. 730. VI. 420.
— discolor Bth. II. 730. no. 2.
— floribunda Mart. et Galeotti. II. 730. no. 4.
— glabra Mart. et Galeotti. II. 730. no. 3.
— glauca Humb. et Bonpl. VI. 421. †
— laevis Bth. II. 730. no. 1.
— parviflora Bth. VI. 420. no. 1.
— phyllireaefolia Bth. VI. 420. no. 3.
— sedifolia H. B. Kth. VI. 741.
Befaria subsessilis Bth. VI. 420. no. 2.
Begonia Linn. II. 206. II. 934. V. 766.
— acerifolia H. B. Kth. II. 210. no. 48.
— acetosa Vellozo. II. 216. no. 131.
— acida Vellozo. II. 216. no. 132.
— aculeata Wlprs. V. 767. no. 6.
— acuminata Dryand. II. 213. no. 100. *II. 934. no. 1.
— acutifolia Jcq. II. 211. no. 69.
— albo-coccinea Hook. V. 766. no. 3.
— amoena Wall. *II. 217. no. 152.
— angularis Raddi. II. 211. no. 59.
— angustifolia Blume. II. 212. no. 76.
— aptera Blume. II. 211. no. 74.
— arborescens Raddi. II 211. no. 68.
— *argyrostigma* Fisch. II. 213. no. 96.
— barbata Wall. *II. 217. no. 150.
— Barkeri Knowl. et Westc. II. 207. no. 13.
— bessleriaefolia Schott. II. 215. no. 118.
— bidentata Raddi. II. 212. no. 80.
— bombycina Blume. II. 212. no. 75.
— bracteata W. Jack. II. 212. no. 85.
— Brasila Alph. DC. II. 214. no. 106.
— bulbillifera Lk. et Otto. II. 207. no. 11.
— caespitosa W. Jack. II. 208. no. 29.
— Caffra Meissn. II. 210. no. 54.
— castaneaefolia Otto et Dietr. II. 212. no. 83.
— ciliata H. B. Kth. II. 214. no. 104.
— coccinea Hook. II. 214. no. 113. V. 770. †
— columnaris Bth. V. 767. no. 7.
— concinna Schott. II. 207. no. 19.
— confertiflora Gardn. V. 769. no. 12.
— cordata Vellozo. II. 216. no. 127.
— crassicaulis Lindl. II. 208. no. 34.
— crenata Dryand. II. 213. no. 92.
— *crenata* Fisch. II. 217. no. 154.
— cucullata Willd. II. 211. no. 67.
— cuneata Willd. II. 214. no. 114.
— cyathophora Poepp. et Endl. II. 211. no. 61.
— declinata Vellozo. II. 216. no. 135.
— *denticulata* H. B. Kth. II. 207. no. 18.
— depauperata Schott. II. 207. no. 15.
— dichotoma Jcq. II. 213. no. 97.
— digitata Raddi. II. 209. no. 40.
— dimidiata Vellozo. II. 217. no. 137.
— dipetala Grah. II. 213. no. 89.
— diptera Dryand. II. 207. no. 16.
— dioica Hamilt. II. 211. no. 64.
— discolor R. Br. II. 206. no. 7.
— disticha Lk. II. 214. no. 108.
— diversifolia Grah. II. 206. no. 9. *V. 766. β. nana Wlprs. V. 766. no. 1.
— Drègei Otto. et Dietr. II. 211. no. 60.
— *dubia* Vellozo. II. 216. no. 136.
— echinata Wall. II. 206. no. 6.
— elegans H. B. Kth. II. 214. no. 111.

Begonia elliptica H. B. Kth. II. 212. no. 81.
— elongata Wall. *II. 217. no. 156.
— erecta Vellozo. II. 216. no. 131.
— eriocaulis Vis. II. 217. no. 140.
— *eriocaulis* Visiani. V. 769. no. 15.
— Erminea Hérit. II. 211. no 65.
— erosa Blume. II. 212. no. 86.
— *Evansiana* Andrs. II. 206. no. 7.
— fagifolia Fisch. II. 215. no. 116.
— fasciculata W. Jack. II. 211. no. 73.
— ferruginea Dryand. II. 214. no. 103.
— filipes Bth. V. 769. no. 18.
— Finlaysoniana Wall. *II. 217. no. 154.
— Fischeri Otto. et Dietr. II. 213. no. 95.
— foliosa H. B. Kth. II. 215. no. 117.
— *fruticosa* Linn. II. 214. no. 103.
— Gaudichaudii Wlprs. *V. 769. no. 19.
— geniculata W. Jack. II. 211. no. 72.
— geniculata Vellozo. II. 217. no. 141.
— geraniifolia Hook. II. 208. no. 31.
— gigantea Wall. *II. 217. no. 148.
— *glabra* Aubl. II. 207. no. 18.
— gracilis H. B. Kth. II. 207. no. 14.
— *grandiflora* Knowl. et Westsc. II. 207. no. 12.
— *grandifolia* Jcq. II. 208. no. 26.
— grandis Dryand. II. 212. no. 87.
— *grandis* Otto. II. 210. no. 47.
— *Guaduensis* H. B. Kth. II. 212. no. 80.
— guttata Wall. *II. 217. no. 143.
— hastata Vellozo. II. 217. no. 138.
— Hatacoa Hamilt. II. 213. no. 90.
— heracleifolia Cham. et Schlchtd. II. 208. no. 33.
— herbacea Vellozo. II. 216. no. 130.
— hirsuta Aubl. II. 209. no. 45.
— *hirta* Wall. II. 206. no. 8.
— hirtella Lk. II. 215. no. 124.
— hispida Schott. II. 213. no. 98.
— Hookeriana Gardn. V. 769. no. 14.
— *humilis* Bonpl. II. 209. no. 45.
— *humilis* Bot. Reg. II. 214. no. 110.
— humilis Dryand. II. 215. no. 122.
— hydrocotylifolia Hook. II. 209. no. 38.
— incana Lindl. II. 210. no. 56.
— incarnata Lk. et Otto. II. 213. no. 101.
— *insignis* Grah. II. 213. no. 101.
— integerrima Spr. II. 211. no. 70.
— *isoptera* Auct. II. 217. no. 146.
— isoptera Dryand. II. 213. no. 93.
— laciniata Rxb. *II. 217. no. 146.
— lanceolata Vellozo. II. 216. no. 126.
— lepida Blume. II. 208. no. 24.
— Lindleyana Wlprs. II. 209. no. 42.
— lobata Schott. II. 210. no. 52.
— longifolia Blume. II. 213. no. 91.
Begonia longipes Hook. II. 210. no. 53.
— longirostris Bth. V. 768. no. 10.
— macrophylla Dryand. II. 208. no. 26.
— maculata Raddi. II. 213. no. 96.
— Malabarica Ham. *II. 217. no. 147.
— manicata Cels. II. 214. no. 115.
— Martiana Lk. et Otto. II. 207. no. 17. V. 770. †
— Meisneri Wall. *II. 217. no. 159.
— Meyeniana Wlprs. V. 769. no. 17.
— Meyeri Otto. V. 769. no. 15.
— micrantha Steud. II. 210. no. 51.
— *minor* Jcq. II. 214. no. 109.
— *minor* Jcq. V. 769. no. 16.
— monoptera Lk. et Otto. II. 207. no. 10.
— multangula Blume. II. 209. no. 41.
— multiflora Bth. V. 768. no. 11.
— muricata Blume. II. 207. no. 23.
— *muricata* Scheidw. II. 209. no. 39.
— nana Hérit. II. 206. no. 3.
— nelumbiifolia Schlchtd. et Cham. II. 209. no. 36.
— nitida Ait. II. 214. no. 109.
β. discolor Spr.
— nitida Dryand. *II. 934. no. 2. *V. 769. no. 16.
— *obliqua* Hérit. II. 214. no. 109. V. 769. no. 16.
— *obliqua* Linn. II. 207. no. 16.
— *obliqua* δ. Linn. II. 209. no. 37.
— *obliqua* Thbg. II. 212. no. 87.
— octopetala Hérit. II. 207. no. 12.
— *odorata* Willd. II. 214. no. 110.
— orbiculata W. Jack. II. 209. no. 35.
— Ottonis Wlprs. II. 212. no. 82.
— palmata Don. II. 209. no. 43.
— palustris Hartw. V. 768. no. 8.
— papillosa Lindl. II. 214. no. 105.
— parviflora Ham. *II. 217. no. 145.
— *parviflora* Poepp. et Endl. II. 210. no. 51.
— *parvifolia* E. Mey. II. 211. no. 60.
— parvifolia Schott. II. 209. no. 44.
— patula Haw. II. 215. no. 119.
— *pauciflora* Lindl. II. 215. no. 119.
— pedunculosa Wall. II. 206. no. 5.
— peltata Hsskrl. V. 766. no. 2.
— peltata Otto et Dietr. II. 210. no. 55.
— peltifolia Schott. II. 207. no. 20.
— pentaphylla Wlprs. II. 209. no. 39.
— peponifolia Hort. Gallic. *II. 934.
— petalodes Lindl. II. 215. no. 125.
— picta Sm. II. 206. no. 8.
— pilosa W. Jack. II. 212. no. 84.
— platanifolia Schott. II. 210. no. 50. V 770. †
— populifolia H. B. Kth. II. 211. no. 62.

Begonia populifolia Schott. II. 207. no. 18.
— Porteriana Fisch. Mey. et Lallem. II. 215. no. 123.
— procridifolia Wall. *II. 217. no. 157.
— procumbens Vellozo. II. 216. no. 128.
— pulchella Raddi. II. 213. no. 99.
— punctata Kltzch. II. 208. no. 32.
— *purpurea* Swrtz. II. 211. no. 69. V. 769. no. 16.
— *purpureo maxima, folio aurito* Plum. II. 208. no. 26.
— racemosa W. Jack. II. 211. no. 71.
— *radiata* Grab. II. 208. no. 33. β.
— radicans Vellozo. II. 216. no. 136.
— ramentacea Paxton. V. 770. †
— reniformis Dryand. II. 210. no. 58.
— *reniformis* Hook. II. 210. no. 47.
— repanda Blume. II. 212. no. 77.
— repens Blume. II. 208. no. 27.
— *repens* Vellozo. II. 216. no. 129.
— reptans Benth. II. 207. no. 21.
— reticulata Gardn. V. 769. no. 13.
— rhizocarpa Fisch. *II. 217. no. 142.
— robusta Blume. II. 211. no. 63.
— rotunda Vellozo. II. 216. no. 133.
— rotundifolia Dryand. II. 209. no. 37.
— rubella Hamilt. II. 211. no. 66.
— rubra Blume. II. 208. no. 25.
— *rubra* Blume? V. 766. no. 2.
— rubricaulis Hook. V. 766. no. 4.
— sanguinea Raddi. II. 213. no. 94.
— saxatilis Blume. II. 208. no. 28.
— scandens Swrtz. II. 207. no. 18.
— scutata Wall. *II. 217. no. 155.
— semperflorens Lk. et Otto. II. 215. no. 120.
— setulosa Bertol. II. 214. no. 102.
— sinuata Grab. II. 209. no. 46.
— *sinuata* E. Mey. II. 210. no. 54.
— sinuata Wall. *II. 217. no. 151.
— spathulata Haw. II. 215. no 121.
— stigmosa Lindl. V. 767. no. 5.
— *stipulacea* Willd. II. 211. no. 59.
— suaveolens Haw. II. 214. no. 110. V. 770. †
— sublobata W. Jack. II. 208. no. 30.
— subovata Wall. *II. 217. no. 153.
— subrotunda Wall. *II. 217. no. 158.
— suffruticosa Meisner. II. 210. no. 49.
— tenella Don. II. 206. no. 4.
— tenera Dryand. II. 206. no. 2.
— tenuifolia Dryand. II. 213. no. 88.
— tomentosa Schott. II. 210. no. 57.
— trachyptera Rth. V. 768. no. 9.
— *truncata* Vellozo. II. 210. no. 47.
— tuberosa Dryand. II. 206. no. 1.
— tuberosa Wall. *II. 217. no. 146.
Begonia ulmifolia H. B. Kth. II. 212. no. 79.
— umbellata H. B. Kth. II. 214. no. 112.
— undulata Schott. II. 212. no. 78.
— Urticae Spr. II. 207. no. 22.
— vaginans Vellozo. II. 217. no. 139.
— Velloziana Wlprs. II. 216. no. 129.
— *verticillata* Vellozo. II. 209. no. 40.
— villosa Lindl. II. 214. no. 107.
— *vitifolia* Lindl. II. 209. no. 42.
— vitifolia Schott. II. 210. no. 47.
— Wigthiana Wall. *II. 217. no. 141.
— zebrina Hort. Anglic. *II. 934.
BEGONIACEAE R. Br. II. 206. II. 934. V. 766.
Behenantha Bth. I. 275. no. 37. I. 278. no. 65. II. 776.
Behuria Cham. II. 118.
— insignis Cham. II. 118. no. 1.
Bejaria vid. Befaria.
Belangera Cambess. II. 375. V. 834.
— cuneata Cambess. *II. 375. no. 2.
— glabra Cambess. *II. 375. no. 1.
— speciosa Cambess. *II. 375. no. 4. V. 834. no. 2.
— tomentosa Cambess. *II. 375. no. 3. *V. 834. no. 1.
Belenia praealta Dene. III. 21. no. 16.
Belenidium Candolleanum Arn. VI. 172. no. 1.
Belilla DC. II. 521.
Belladonna baccifera Lam. III. 103. no. 10.
— *frutescens flore albo, Nicotianae foliis* Plum. III. 112. no. 1. VI. 620. no. 5.
— *frutescens Hispanica* Tournef. III. 104. no. 1.
— *majoribus floribus et foliis* Tournef. III. 103. no. 10.
— *trichotoma* Scop. III. 103. no. 10.
Bellardia Trixago All. III. 408. no. 6.
Bellideae DC. II. 584. II. 951. II. 958. VI. 125.
Bellideae C. H. Schultz. II. 951.
Bellidiastrum Michel. *II. 559. II. 951. no. 5.
Bellidioides Balsamitae majoris folio, facie et odore Vaill. VI. 219. no. 2.
Bellieae DC. II. 584. II. 951. VI. 125.
Bellieae C. H. Schultz. II. 951.
Bellinia biflora Roem. et Schult. III. 29. no. 9.
— *contorta* Roem. et Schult. III. 28. no. 3.
— *dentata* Roem. et Schult. III. 29. no. 8.
— *procumbens* Roem. et Schult. III. 28. no. 1.
— *pubescens* Roem. et Schult. III. 29. no. 11.
— *punctata* Roem. et Schult. III. 28. no. 5.
— *umbellata* Roem. et Schult. III. 28. no. 2.
Bellis Linn. II. 584. *II. 951. no. 1. II. 958. VI. 125.

Bellis alpina major folio acuto C. Bauh. VI. 191. no. 1. β.
— *alpina major rigido folio* C. Bauh. VI. 191. no. 1. β.
— Azorica Hochstett. VI. 125. no. 1.
— integrifolia Michx. *II. 958. no. 1.
— *montana folio obtuso crenato* C. Bauh. VI. 191. no. 1. β.
— *montana gramineis foliis* Magnol. VI. 192. no. 1. B.
— *montana minor* J. Bauh. VI. 191. no. 1. β.
— *montana minor Tanaceti folio* VI. 222. no. 35.
— pappulosa Boiss. *II. 584. no. 1.
Bellium Linn. *II. 584. *II. 951. no. 3. VI. 718.
— cordifolium Knze. VI. 718. no. 1.
Belmontia E. Mey. *VI. 501.
Beloanthera Hsskrl. V. 790.
— oppositifolia Hsskrl. V. 790. no. 1.
Belotia A. Rich. II. 800.
— grewiaefolia A. Rich. *II. 800. no. 1.
Bembix Loureiro. °V. 357.
— tectoria Loureiro. *V. 357. no. 1.
Bembycodium Knze. II. 638. VI. 211.
— Athanasiae Knze. *II. 638. no. 1. VI. 211. no. 1.
Benincasa Savi. II. 201.
— cerifera Savi. *II. 201. no. 1.
Ben Kadali Rheede. II. 135. no. 3.
Benthamia Lindl. II. 435.
— fragifera Lindl. II. 435. no. 2.
— Japonica Siebld. et Zucc. II. 435. no. 1.
Benzonia Schum. *II. 525.
Berardia Brogn. I. 544.
— affinis Brogn. I. 545. no. 2.
— fragarioides Schlchtd. *I. 545. no. 3.
— paleacea Brogn. I. 544. no. 1.
— phylicoides Brogn. I. 545. no. 4.
Berbena III. 550. no. 124.
BERBERIDEAE Vent. I. 100. II. 749. V. 18.
Berberis L. I. 101. II. 749. V. 19.
Berberis Nutt. I. 101. V. 19.
— acanthifolia Wall. I. 103. no. 27.
— *Aetnensis* Prsl. I. 101. no. 1.
— affinis Don. I. 101. no. 6.
— *angulosa* Wall. V. 19. no. 1.
— *angustifolia* Rxb. I. 102. no. 11. I. 102. no. 12. (?)
— angustifolia Hartw. I. 104. no. 37.
— Aquifolium Prsh. *I. 103. no. 29. et varr. α. β. V. 19. †
γ. Nutkana Torr. et Gr. I. 103. no. 29.
— aristata DC. *I. 102. no. 11.
— atrovirens Wall. I. 102. no. 14.
— aurea Tausch. I. 104. no. 40.
Berberis ceratophylla Don. I. 102. no. 7.
— Chilensis Gill. I. 102. no. 15.
— *chitria* Don. I. 102. no. 11.
— coriacea St. Hil. I. 103. no. 24.
— coriaria Royle. II. 749. no. 1.
— corymbosa Hook. et Arn. I. 102. no. 16.
— *Cretica* L. I. 101. no. 1.
— Darwinii Hook. V. 19. no. 4.
— dealbata Lindl. I. 103. no. 21.
— dentata Tausch. II. 749. no. 3.
γ. capitata Tausch.
β. latifolia Tausch.
— diversifolia Sweet. I. 104. no. 32.
— dulcis Sweet. I. 103. no. 22. V. 19. †
— empetrifolia Lam. I. 104. †
— floribunda Wall. I. 101. no. 5.
— *floribunda* Wall. I. 102. no. 7. et no. 12. I. 106. no. 6.
— fraxinifolia Hook. I. 104. no. 33.
— *fraxinifolia* Hook. V. 19. no. 5.
— *fructu arbor maximae etc.* Sloane. IV. 78. no. 33.
— glaucescens St. Hil. I. 103. no. 25.
— glomerata Hook. I. 102. no. 18.
— *glumacea* Lindl. I. 103. no. 31.
— glumacea Spr. V. 19. †
— gracilis Hartw. I. 104. no. 38.
— Grevilleana Gill. I. 102. no. 17.
— Hartwegi Bth. I. 104. no. 39.
— heteropoda Schrenk. I. 101. no. 4.
— ilicina Schlchtd. I. 104. no. 34.
— integerrima Bnge. V. 19. no. 2.
— Kunawurensis Royle. I. 102. no. 13.
— lanceolata Bth. I. 104. no. 36.
— Leschenaultii Wall. I. 103. no. 26. (III. Emend. p. 1.)
— Lycium Royle. I. 102. no. 12.
— Miccia Hamilt. *I. 103. no. 28.
— mitis Schrad. I. 104. no. 41.
— nervosa Prsh. *I. 103. no. 31.
— nummularia Bnge. V. 19. no. 3.
— pallida Hartw. I. 104. no. 35. V. 19. †
— petiolaris Wall. I. 102. no. 10.
— pinnata Lag. *I. 103. no. 30.
— *pinnata* Mühlbg. I. 103. no. 29. α.
— *repens* Lindl. I. 103. no. 29. α.
— rotundifolia Poepp. et Endl. I. 103. no. 20.
— sphaerocarpa Kar. et Kir. I. 101. no. 3.
— spinulosa St. Hil. I. 103. no. 23.
— tenuifolia Lindl. V. 19. no. 5.
— tinctoria Lesch. I. 102. no. 8. (III. Emend. p. 1.)
— trifoliata Hartw. II. 749. no. 2. V. 19. †
— trigona Knze. I. 109. no. 19.
— Turcomannica Karelin. I. 101. no. 2.
— umbellata Wall. I. 102. no. 9. *V. 19. no. 1.

Berberis vulgaris L. *I. 101. no. 1.
— Wallichiana DC. I. 104. †
Bergenia Mnch. II. 365. no. 23.
Bergera Koen. I. 381.
— Koenigii L. *I. 381. no. 1.
Bergeretia DC. I. 146.
Bergia Linn. I. 284. II. 786.
— aestivosa Wght. et Arnott. I. 285. no. 3.
— ammanioides Roth. I. 285. no. 9.
— *ammanioides β. floribus triandris* Wght. I. 285. no. 10.
— anagalloides E. Meyer. *I. 286. no. 13. II. 786. no. 1.
— aquatica Roxb. I. 285. no. 11.
— arenarioidea Fzl. I. 284. no. 1.
— *Capensis* Linn. I. 286. no. 11.
— erecta Guillem. et Perrott. I. 285. no. 8.
— glomerata Linn. fil. I. 286. no. 12.
— odorata Edgeworth. I. 285. no. 5.
— *pentandra* Guillem. et Perrottet. I. 285. no. 9.
— peploides Guillem. et Perrottet. I. 285. no. 7.
— serrata Blanco. I. 285. no. 2.
— suffruticosa Fnzl. I. 285. no. 6.
— Texana Seubert. I. 285. no. 4.
— trimera Fisch. et Mey. I. 285. no. 10.
— *verticillata* Willd. I. 286. no. 11.
Bergiotypus Seubert. I. 285.
Beringeria Bth. III. 862.
— *acetabulosa* Necker. III. 863. no. 4.
— *frutescens* Reichb. III. 866. no. 18.
— *Pseudodictamnus* Necker. III. 863. no. 2.
Berkheya Ehrh. *II. 666. VI. 278.
— *carduiformis* DC. VI. 278. no. 1.
— cynaroides Willd. *VI. 278. no. 1.
  β. Kraussii C. H. Schultz.
— grandiflora Willd. *VI. 278. no. 2.
— *incana* Spr. VI. 279. no. 1.
— *Kraussii* C. H. Schultz. VI. 278. no. 1.
Berlandiera DC. II. 605. II. 975.
— incisa Torr. et Gr. II. 975. no. 3.
— longifolia Nutt. II. 605. no. 2.
— *longifolia* Nutt. II. 975. no. 1.
— lyrata Bth. II. 605. no. 1.
— pumila Nutt. II. 605. no. 3.
— *pumila* Nutt. II. 975. no. 2.
— subacaulis Nutt. II. 605. no. 5. *II. 975. no. 4.
— Texana DC. *II. 975. no. 1.
  β. betonicaefolia Torr. et Gr.
— tomentosa Nutt. II. 605. no. 4. *II. 975. no. 2.
  β. dealbata Torr. et Gr. II. 975. no. 2.
Berniera DC. *II. 679. II. 680.
Berniera DC. VI. 315.
Berniera Nepalensis DC. VI. 315. no. 9.
Berrebera Hochstett. *V. 645.
— Caffra Hochstett. *V. 645. no. 2.
— ferruginea Hochstett. *V. 645. no. 1.
Berrya Rxb. I. 363.
— Ammonilla Rxb. *I. 363. no. 1.
Bersama Fresen. I. 445. V. 378.
— Abyssinica Fresen. *I. 445. no. 1. V. 378. no. 1.
Berteroa DC. I. 140.
— ascendens C. Koch. I. 140. no. 3.
— incana DC. I. 140. †
— procumbens Prtsblg. I. 140. †
— spathulata C. A. Mey. *I. 140. no. 1.
— viridis Tausch. I. 140. no. 2.
Berthelotia DC. *II. 595. *II. 952. no. 57.
Bertholletia H. B. Ktb. II. 193.
— excelsa H. B. Kth. *II. 193. no. 1.
Bertiera Aubl. II. 517. VI. 73.
— angustifolia Bth. VI. 73. no. 1.
— coccinea G. Don. II. 517. no. 1.
— *nutans* Ham. II. 525. no. 1.
Bertolonia Radd. II. 121. II. 917. V. 683.
— acaulis Cham. II. 121. no. 1.
— acuminata Gardn. II. 917. no. 1.
— *glandulosa* Spinola. IV. 137. no. 16.
— hirsuta Bth. V. 683. no. 1.
— longifolia Cham. II. 121. no. 2.
— maculata DC. *II. 121. no. 3.
Berula Koch. *II. 396.
— *major* Tabern. III. 349. no. 77. β.
Berzelia Brogn. I. 542.
— abrotanoides Brogn. I. 542. no. 1.
— arachnoidea Eckl. et Zeyh. *I. 543. no. 9.
— brevifolia Eckl. et Zeyh. I. 543. no. 10.
— comosa Eckl. et Zeyh. *I. 542. no. 6.
— cordifolia Schlchtd. I. 542. no. 5.
— ericoides Eckl. et Zeyh. *I. 543. no. 8.
— formosa Eckl. et Zeyh. I. 543. no. 11.
— intermedia Schlchtd. I. 542. no. 3.
— lanuginosa Brogn. I. 542. no. 2.
— rubra Schlchtd. I. 542. no. 4.
— *superba* Eckl. et Zeyh. I. 545. no. 1.
— Wendlandiana Eckl. et Zeyh *I. 543. no. 7.
Besleria Mart. II. 715. VI. 403.
— acutifolia Bth. VI. 403. no. 1.
— *bicolor* Schott. VI. 406. no. 1.
— *Bonodora* Arrabida. III. 452. no. 4.
— capitata Poepp. et Endl. II. 715. no. 4.
— *dichrous* Spr. VI. 406. no. 1.
— divaricata Poepp. et Endl. II. 715. no. 2.
— insignis Mart. et Galeotti. II. 715. no. 1.
— laxiflora Bth. VI. 738.
— lucida Poepp. et Endl. II. 715. no. 3.
— *scandens* Moç. et Sessé. III. 230. no. 1.
Beslereae Endl. II. 714.

Beslerieae Bartl. II. 714. VI. no. 403.
Betencourtia St. Hil. I. 760.
— rhynchosioides A. St. Hil. *I. 760. no. 1.
Betkea DC. II. 531.
—? Gilliesii Hook. et Arn. II. 531. no. 3.
— major Fisch. et Mey. II. 531. no. 2.
— samolifolia DC. *II. 531. no. 1.
— *samolifolia* Gill. II. 531. no. 3.
Betonica Bth. III. 816.
— *affinis* Wndrth. III. 817. no. 3.
— *Alopecuros* Linn. III. 816. no. 1.
— *alpina* Mill. III. 817. no. 3.
— *annua* Linn. III. 834. no. 77.
— *aquatica* Dalech. III. 171. no. 33.
— *aquatica septemtrionalium* Lobel. III. 171. no. 33.
— *aquatilis* Dodon. III. 171. no. 33.
— *Danica* Mill. III. 816. no. 2.
— *decumbens* Moench. III. 836. no. 86.
— *divulsa* Ten. III. 817. no. 3.
— *foliosa* Prsl. III. 817. no. 3.
— *Graeca* Boiss. III. 951. no. 2*.
— *grandiflora* Willd. III. 818. no. 6.
— *heraclea* Linn. III. 840. no. 114.
— *hirsuta* Linn. III. 816. no. 2.
— *hirta* Gou. III. 836. no. 86.
— *hirta* Leyss. III. 817. no. 3.
— *incana* Ait. III. 916. no. 2.
— *laevigata* D. Don. III. 776. no. 10.
— *legitima* Link. III. 817. no. 3.
— *lutea* Mill. III 816. no. 1.
— *macrostachys* Wndrth. III. 817. no. 2.
— *Monnieri* Gou. III. 816. no. 2.
— *nivea* Stev. III. 818. no. 7.
— *officinalis* Linn. III. 817. no. 3.
— *orientalis* Linn. III. 817. no. 5.
— *orientalis* Thuill. III. 818. no. 6.
— *rubicunda* Wndth. III. 817. no. 2.
— *Scardica* Griseb. III. 817. no. 4.
— *serotina* Host. III. 817. no. 3.
— *stricta* Ait. III. 817. no. 3.
Bettlerlaus Fuchs. VI. 151. no. 8.
Beuthea Endl. I. 365. V. 121.
— bifida Endl. *I. 365. no. 1. V. 121. no. 1.
Beyrichia Cham. III. 284. °III. 964. *VI. 642.
Beyrichia Chamisso. VI. 642.
— ajugoides Bth. III. 284. no. 2.
— ocymoides Chamisso. III. 284. no. 1.
— scutellarioides Bth. III. 284. no. 3.
— villosa Bth. III. 284. no. 4.
Biasolettia Prsl. I. 351.
— nymphaeaefolia Prsl. *I. 351. no. 1.
— *tuberosa* Koch. II. 423. no. 1.
Bibracteatae (Michelia) Blume. I. 71.
Bibracteolatae (Malva) DC. I. 292.
Bickia cf. Bikkia.
Bicorona Alph. DC. *VI. 466.
Bicuspidatae (Pedicularis) Steven. III. 421.
Bidaria Endl. *VI. 492.
Bidens Linn. II. 618. II. 986. VI. 167.
— Abyssinica C. H. Schultz. VI. 167. no. 1.
— *angustifolia* Nutt. II. 618. no. 3.
— artemisiaefoliae Poepp. et Endl. II. 619. no. 5.
— canescens Bertol. II. 618. no. 3.
— carnea Heer. II. 987. no. 2.
— chrysanthemoides Michx. *II. 986. no. 1. (c. varr. β. γ. δ. ibid.)
— fruticulosa Meyen et Wlprs. VI. 168. no. 4.
— *gracilis* Nutt. II. 618. no. 2.
— *gracilis* Torr. II. 615. no. 2. VI. 164. no. 2.
— hirsuta Nutt. II. 618., no. 2.
— Kotschyi C. H. Schultz. VI. 168. no. 2.
— *leucantha* Willd. II. 614. no. 1.
— Meyeniana Wlprs. VI. 168. no. 5.
— mollis Poepp. et Endl. II. 619. no. 4.
— monticola Poepp. et Endl. II. 619. no. 6.
— *mutica* Nutt. II. 618. no. 1.
— paleacea Vis. II. 618. no. 1.
— *quadriaristata* DC. II. 987. no. 1. γ.
— Schimperi C. S. Schultz. VI. 168. no. 3.
— speciosa Gardn. VI. 168. no. 6.
Bidentideae Lssg. II. 618. II. 986. VI. 167.
Biebersteinia Steph. I. 498.
— odora Steph. *I. 498. no. 1.
Biebersteinieae Endl. I. 498.
Bifora Hfim. *II. 427.
Bigamea Koenig. II. 68.
— .... Koenig. *II. 68. no. 1.
Bigelowia DC. *II. 589. *II. 952. no. 27.
Bigelowia dracunculoides DC. II. 589. no. 3.
— *eryngioides* Hook. et Arn. II 464. no. 5.
— *Kleinii* Wght. et Arn. II. 464. no. 3.
— *lasiocarpa* Wght. et Arn. II. 464. no. 1.
— *Missouriensis* DC. II. 969. no. 5.
— *Roxburghiana* Wght. et Arn. II. 464. no. 2.
— *uniligulata* DC. II. 589. no. 3. II. 964. no. 45.
— *viscidiflora* DC. II. 589. no. 4. II. 970. no. 7.
Bignonia Tournef. VI. 510.
— *aequinoctialis* Linn. VI. 743. no. 1.
— *albida* Blume VI. 521. no. 5.
— capreolata Linn. VI. 511. †
— Carolinae Lindl. VI. 510. no. 1.
— Chamberlaynii Paxton. VI. 743. no. 1.
— chondrogona Miquel. VI. 511. no. 5.
— decomposita Miquel. VI. 510. no. 3.
— Fockeana Miquel. VI. 510. no. 4.
— *igenea* Arrab. VI. 512. no. 1.
— *latifolia* A. Rich. VI. 514. no. 1.
— *obovata* Hook. et Arn. VI. 469. no. 2.

Bignonia picta H. B. Kth. VI. 511. †
— Sinclairii Bth. VI. 510. no. 2.
— *tomentosa* Thnbrg. III. 262. no. 1.
— venusta Ker. VI. 511. †
BIGNONIACEAE R. Br. VI. 510.
BIGNONIACEAE Endl. 518. (ex p.)
Bignoniaceae anomalae DC. VI. 416.
Bignonieae Bojer. VI. 510.
Bikkia Reinw. *II. 506.
Billardiera Sm. I. 257.
— angustifolia DC. I. 257. no. 1.
— *Canariensis* Wendl. I. 257. no. 3.
— *explanata* Mnch. IV. 31. no. 79.
— *fusiformis* Labill. I. 257. no. 1.
— grandiflora Putterl. I. 257. no. 2.
— *Hambruchiana* Seemann et Schmidt. V. 73. no. 1.
— latifolia Putterl. I. 258. no. 5.
— longiflora Labill. I. 258. no. 6.
— mutabilis Salib. I. 257. no. 4.
— *ovalis* Lindl. I. 258. no. 6.
— parviflora DC. I. 258. no. 7.
— *rosmarinifolia* DC. I. 257. no. 2.
— scandens Sm. I. 257. no. 3.
— *variifolia* DC. I. 256. no. 4.
Billiotia R. Br. *II. 166.
Billiotia R. Br. V. 739.
— *acerosa* Colla. II. 931. no. 7.
Bionia Mart. I. 763. V. 532.
— acuminata Bth. I. 764. no. 6.
— bella Mart. I. 764. no. 7.
— coccinea Mart. I. 763. no. 1.
— coriacea Bth. *I. 763. no. 4. V. 532. no. 1.
— marginata Bth. I. 763. no. 3.
— nitens Bth. I. 763. no. 2.
— rigida Bth. I. 764. no. 5.
Biophytum DC. I. 476. 491. V. 383. 384.
— *Candolleanum* Wght. I. 491. no. 180.
— *dendroides* DC. I. 491. no. 179.
— *fruticosum* Blume. I. 476. no. 4.
— *sensitivum* DC. I. 491. no. 180.
Biotia DC. *II. 576. *II. 952. no. 9.
Biotia DC. II. 559.
— *corymbosa* DC. II. 559. no. 1.
— *glomerata* DC. II. 559. no. 2. β.
— *macrophylla* DC. II. 559. no. 2.
— *Schreberi* DC. II. 559. no. 2. β.
Bipinnatae (Acacia) Bth. II. 906.
Bipontina (Matricaria) C. H. Schultz. VI. 194.
Biriba Marcgrav. I. 86. no. 9.
Birolia paludosa Bellardi. V. 86. no. 9.
Bischofia Bl. I. 524.
— Javanica Blume. *I. 521. no. 1.
Biscutella L. I. 157.
— ambigua DC. I. 157. †
Biscutella Apula L. *I. 157. no. 3.
α. megacarpaea Boiss.
β. microcarpa Boiss.
— auriculata L. *I. 157. no. 2. I. 158. †
— cichoriifolia Lois. I. 157. †
— ciliata DC. I. 157. no. 3. α. †
— *Columnae* Ten. I. 157. no. 3. α.
— coronopifolia All. I. 158. †
— *coronopifolia* Lag. I. 157. no. 4.
— depressa W. I. 157. †
— dilatata Vis. I. 157. no. 1.
— erigerifolia DC. I. 157. †
— *erigerifolia* DC. I. 157. no. 2.
— *eriocarpa* DC. I. 157. no. 3. β.
— erucifolia Rchb. I. 157. †
— hispida DC. I. 158. †
— incana Ten. I. 157. no. 5.
— *laevigata* Desf. I. 157. no. 4.
— *laevigata* Lej. I. 157. no. 6.
— laevigata L. I. 157. †
— *laevigata* L. I. 157. no. 4.
— *leiocarpa* DC. I. 157. no. 3. β.
— *Lima* Rchb. I. 157. no. 4.
— lyrata L. I. 157. †
— maritima Ten. I. 157. †
— *microcarpa* DC. I. 157. no. 3. β.
— obcordata Rchb. I. 157. †
— obovata Desf. I. 157. †
— *perennis* Spach. I. 157. no. 4.
— raphanifolia Poir. I. 157. †
— saxatilis Schleich. *I. 157. no. 4.
β. alpina.
γ. angustifolia.
α. elatior.
— *stenophylla* Desf. I. 157. no. 4.
— varia Dumort. I. 157. no. 6.
α. foliosa.
β. scaposa.
Biserula L. *I. 711.
Bismalvae DC. I. 293.
Bivonea DC. *I. 175.
Bixa L. I. 202.
— odorata Rz. et Pav. I. 202. no. 3.
— Orellana L. *I. 202. no. 1.
— platycarpa Rz. et Pav. I. 202. no. 2.
— purpurea Hort. I. 202. no. 4.
BIXACEAE Endl. 202. II. 765. V. 55.
Bixineae Kth. I. 202. V. 55.
Bixineae Kth. I. 202. V. 55.
Blaberopus Alph. DC. *VI. 471.
Blackea L. II. 147. V. 723.
— glabrescens Kth. V. 723. no. 1.
— trinervia L. *II. 147. no. 1.
Blackburnia Forst. *I. 522.
Blackwellia Commers. I. 518.
— Nepalensis *I. 518. no. 1.

Blackwellia pubiflora Lindl. I. 548. no. 2.
Blaeria Linn. II. 728. VI. 419.
— Kraussiana Kltzsch. II. 728. no. 1. VI. 419. no. 1.
Blainvillea Cass. *II. 601. VI. 722.
— alba Edgwrth. VI. 721. no. 2.
— hispida Edgwrth. VI. 721. no. 1.
Blairia Houst. IV. 34. no. 1.
— *Mexicana* Linn. IV. 35. no. 4.
— *nodiflora* Grtnr. IV. 49. no. 30.
Blanchetia DC. *II. 541.
Blattaria Matth. III. 140. no. 60.
— *alba* Segu. III. 140. no. 60.
— *annua flore majore luteo, capsula item majore* Moris. III. 146. no. 94.
— *Cretica spinosa, foliis Leucoji incanis* Moris. III. 144. no. 78.
— *Hispanica maximo flore* Dodart. III. 148. no. 3.
— *lutea folio longo laciniato* Micheli. III. 140. no. 60.
— *magno flore* Lobel. III. 133. no. 23.
— *orientalis* Buxb. III. 148. no. 5.
— *orientalis Bugulae folio, flore maximo virescente* Tournef. III. 141. no. 64.
— *Plinii* Lob. III. 140. no. 60.
— *purpurea* C. Bauh. III. 140. no. 59.
Blennoderma Spach. II. 85.
— *Drumondii* Spach. II. 85. no. 61.
Blennosperma Lssng. *II. 604. II. 974.
— Californicum Torr. et Gr. II. 974. no. 1.
Blepharanthemum sidoides Kltzsch. I. 331. no. 1.
Blepharanthes Wght. II. 222. no. 2.
Blepharicarpae (Cineraria) DC. VI. 251. no. 1.
Blepharidium DC. I. 234. no. 32.
Blepharipappus Hook. II. 630.
— *glandulosus* DC. II. 632. no. 3.
— scaber Hook. *II. 630 no. 1.
Blepharispermum Wght. *II. 594. *II. 955. no. 3. °VI. 131.
— petiolare DC. *VI. 132. no. 1.
— *subsessile* DC. II. 970. no. 1. VI. 132. no. 1.
Blepharodon DC. II. 967. VI. 130. no. 1.
Blepharodon Dcne. VI. 490.
— grandiflorum Bth. VI. 490. no. 1.
— lineare Dcne. VI. 490. †
— *salicinum* Dcne. VI. 487. no. 2.
Blepharolepis N. ab E. II. 249. no. 1. V. 789. no. 1.
Blephilia Rafin. III. 683. °III. 981.
— ciliata Rafin. III. 683. no. 1.
— hirsuta Bth. III. 684. no. 2.
Blinkworthia Choisy. *VI. 529.
Blitum Africanum Pluk. II. 100. no. 2.
Blondia Neck. II. 372.
Blumea DC. *II. 599. VI. 138.
Blumea DC. (ex p.) II. 953. no. 1.
— Chinensis Wlprs. VI. 138. no. 1.
— *Natalensis* C. H. Schultz. II. 971. no. 2.
— *purpurascens* C. H. Schultz. VI. 133. no. 1.
Blumenbachia Schrad. II. 227. V. 781.
— insignis Schrad. *II. 227. no. 1. V. 781. no. 1.
— latifolia Cambess. II. 227. no. 4.
— multifida Hook. II. 227. no. 2.
— palmata Cambess. II. 227. nó. 3.
— *parviflora* Gill. II. 227. no. 1. V. 781. no. 1.
— sylvestris Poepp. II. 227. no. 5.
Blyttia Arabica Arn. VI. 483. no. 1. adn.
Boaria A. P. DC. *VI. 462.
Bobua DC. *II. 68.
Bocagea St. Hil. I. 73.
— alba St. Hil. I. 73. no. 7.
— Celebica Blume. I. 73. no. 4.
— corymbosa Blume. I. 73. no. 2.
— enneandra Spr. *I. 73. no. 3.
— hexandra Bl. *I. 73. no. 1.
— *Javanensis* Spr. I. 73. no. 1.
— latifolia Blume. I. 73. no. 5.
— longepedunculata Mart. I. 73. no. 9.
— multiflora Mart. I. 73. no. 10.
— *pisocarpa* Blume. I. 74. no. 1.
— polyandra Prsh. I. 73. no. 6.
— viridis St. Hil. I. 73. no. 8.
Bocageae Endl. I. 73.
Bocconia Plum. *I. 109.
— *cordata* Willd. I. 109. no. 1.
Bocconieae Endl. I. 109. V. 20.
Bocheme III. 97. no. 437.
Bodwichia H. B. Kth. I. 808.
— brevipes Bth. I. 808. no. 5.
— densiflora Bth. I. 808. no. 6.
— ferruginea Vogel. I. 808. no. 1.
— floribunda Bth. I. 808. no. 3.
— major Mart. I. 808. no. 2.
— pubescens Bth. I. 808. no. 4.
Boenninghausenia Rchb. I. 517.
— albiflora Rchb. *I. 517. no. 1.
Bohadschia humifusa Prsl. II. 230. no. 28.
Bojeria DC. II. 543.
— speciosa DC. *II. 543.
Bojerieae DC. II. 543.
Bois de Savane IV. 90. no. 41.
Boisduvalia Spach. II. 89.
— concinna Spach. II. 89. no. 1. (et III. 6. adn.)
— Douglasii Spach. II. 89. no. 2. (c. var. β. ibid.)
— glabella Wlprs. II. 89. no. 3.
Bokom III. 97. no. 437.

Bolax Commers. II. 386.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 386. no. 1.
— glebaria Comm. *II. 386. no. 1.
Boleum Desv. *I. 188.
Bolivaria Cham. et Schlchtd. VI. 463.
— robusta Bth. VI. 463. no. 1.
Bolophyta Nutt. II. 607.
Bolophyta Nutt. II. 976. VI. 156.
— alpina Nutt. *II. 607. no. 1.
— *alpina* Nutt. VI. 156. no. 1.
Boltonia Hérit. *II. 583. *II. 952. no. 15.
BOMBACEAE DC. I. 329. (ex p.) V. 95. (ex p.)
Bombaceae Schott. et Endl. I. 329. III. 793. V. 95.
Bombax L. I. 329.
Bombax DC. I. 329. (ex p.)
— *Carolinum* Vell. II. 794. no. 4.
— *Ceiba* Burm. I. 330. no. 1.
— *glabrescens* St. Hil. *II. 794. no. 3.
— Guineensis Schum. et Thonn. I. 330. no. 3.
— *heptaphyllum* Cav. I. 330. no. 1.
— *insigne* Wall. I. 330. no. 2.
— *Malabaricum* DC. I. 330. no. 1.
— Munguba Mart. I. 330. no. 2.
— *parviflora* Mart. I. 330. no. 1.
— *pentaphyllum* Vell. II. 794. no. 2.
— *pubescens* Mart. I. 330. no. 2. II. 794. no. 2.
— *tomentosa* St. Hil. et Naud. II. 794. no. 1.
— tomentosum St. Hil. I. 329. no. 1.
Bombicella DC. I. 303. no. 9. 10. 11. I. 306. no. 43. V. 91.
Bonafousia Alph. DC. *VI. 468.
Bonamina Pet. Thouars. *VI. 542.
Bonannia cf. *Bonnania*.
Bonarato chamaedryfolia Scopol. III. 369. no. 2.
— *montana Italica, Chaemaedryos folio* etc. Micheli. III. 369. no. 1.
— *montana Italica, Chamaedryos folio minus crenato* Micheli. III. 369. no. 2. *β*.
— *montana Italica Chamaedryos folio rotundiore* etc. Micheli. III. 369. no. 1. *β*.
Bonaveria Scop. *I. 725.
Bongardia C. A. Mey. I. 100.
— Olivieri C. A. Mey. I. 100. no. 2.
— Rauwolfii C. A. Mey. *I. 100. no. 1.
Bonjeania Rchb. I. 648.
— hirsuta Rchb. *I. 648. no. 1.
Bonnania dissecta Prsl. I. 186. no. 4.
— *officinalis* Prsl. I. 186. no. 3.
Bonnaya Lnk. et Otto. III. 288. °III. 965. *VI. 644.
— *alata* Spr. III. 294. no. 3.
— brachiata Lnk. et Otto. III. 288. no. 1.
— *ciliata* Spr. III. 288. no. 2. III. 289. no. 4.
Bonnaya cordifolia Spr. III. 294. no. 19.
— grandiflora Spr. III. 289. no. 6.
— hispidula G. Don. III. 290. no. 17.
— hyssopoides Bth. III. 287. no. 10.
— *marginata* Spr. III. 288. no. 3.
— minima G. Don. III. 290. no. 14.
— ocymifolia G. Don. III. 290. no. 18.
— oppositifolia Spr. III. 289. no. 8.
— *origanifolia* Spr. III. 293. no. 15.
— parviflora Bth. III. 290. no. 11.
— peduncularis Bth. III. 289. no. 7.
— *procumbens* Bth. III. 288. no. 3.
— pulegiifolia Spr. III. 289. adn.
— punctata G. Don. III. 290. no. 15.
— pusilla Bth. III. 289. no. 5.
— reptans Spr. III. 288. no. 2.
— *rigida* Bth. III. 288. no. 3.
— *Rothii* Lnk. III. 289. no. 3.
— rotundifolia Bth. III. 290. no. 12.
— *Roxburghiana* Lnk. III. 289. no. 4.
— *ruellioides* Spr. III. 288. no. 2.
— tenuifolia Spr. III. 289. no. 9.
— Vahlii G. Don. III. 290. no. 16.
— verbenaefolia Spr. III. 289. no. 4.
— veronicaefolia Spr. III. 288. no. 3.
— *Wightii* Bth. III. 289. no. 6.
Bonnetia Mart. et Zucc. I. 373. II. 801.
— anceps Mart. et Zucc. I 373. no. 1.
— sessilis Bth. II. 801. no. 1.
— stricta Nees et Mart. I. 373. no. 3.
— venulosa Mart. et Zucc. I. 373. no. 2.
— *trifoliata* Auctor. I. 499. no. 1.
Bontia Plum. IV. 141.
— *arborescens Thymeleae facie* Plúm. IV. 142. no. 1.
— daphnoides Linn. IV. 141. no. 1.
— *foliis integris oblongis* etc. P. Br. IV. 132. no. 1.
— *germinans* Linn. IV. 132. no. 1.
— *Laureolae facie* Dill. IV. 142. no. 1.
— *minor* Grtnr. IV. 142. no. 1.
Boopis Juss. *II. 537.
Boottia sylvestris Bigel. II. 35. no. 87.
Bopusia Prsl. VI. 650.
— scabra Prsl. *VI. 650. no. 1.
Boquila Dcne. I. 99.
— discolor Dcne. I. 99. no. 2.
— trifoliata Dcne. *I. 99. no. 1.
Bora serrata Vell. II. 765. no. 1.
Borava Jaub. et Spach. I. 180.
— orientalis Jaub. et Spach. *I. 180. no. 1.
Borbonia L. I. 580. II. 833.
— *alata* Willd. I. 580. no. 2.
— alpestris Bth. 833. no. 2.
— *angustifolia* Lam. I. 580. no. 3. *β*.
— *axillaris* DC. II. 835. no. 2.

Borbonia Candolleana Eckl. et Zeyh. I. 580. no. 1. β.
— *ciliata* Willd. I. 580. no. 1.
— complicata Bth. II. 833. no. 4.
— decipiens E. Mey. I. 580. no. 4.
— *laevigata* Linn. II. 834. no. 1.
— lanceolata L. *I. 580. no. 3.
β. angustifolia Wlprs.
— latifolia Bth. II. 833. no. 3.
— *monosperma* E. Mey. II. 833. no. 1.
— *ovata* Andrws.. I. 579. no. 5.
— *parviflora* E. Mey. II. 833. no. 4.
— *perfoliata* Thbg. I. 579. no. 3.
— perforata Thbg. *I. 580. no. 1.
β. breviflora Wlprs.
— pungens Mundt. II. 833. no. 1.
— ruscifolia Sims. *I. 580. no. 2.
— *sericea* DC. II. 835. no. 2.
— *tomentosa* Linn. II. 835. no. 2.
Borgniartia vid. Brogniartia.
Borkhausenia lucida Kth. III. 263. no. 1.
Borkhausia Lessingii Hook. et Arn. II. 696. no. 4.
Boromannia cf. Bowmannia.
Boronia Sm. I. 502. V. 388.
— alata Sm. I. 503. †
— *anemonifolia* Paxton. V. 389. no. 12.
— anethifolia A. Cunn. I. 503. no. 14.
— chironiifolia Bartl. V. 388. no. 5.
— crassifolia Bartl. V. 388. no. 9.
— crassipes Bartl. V. 388. no. 7.
— crenulata Sm. I. 503. † V. 389. †
— cymosa Endl. I. 502. no. 6.
— dichotoma Lindl. I. 503. no. 19.
— elatior Bartl. V. 389. no. 11.
— falcifolia A. Cunn. I. 503. no. 18.
— fastigiata Bartl. V. 388. no. 6.
— floribunda Sieb. I. 503. †
— Fraseri Hook. V. 389. no. 12.
— juncea Bartl. V. 388. no. 3.
— laniflora Bartl. V. 388. no. 2.
β. macrantha Bartl.
α. micrantha Bartl.
— lanuginosa Endl. I. 503. no. 12.
— ledifolia Gay. I. 503. † V. 389. †
— macra Bartl. V. 388. no. 4.
— microphylla Sieb. I. 503. †
— mollis A. Cunn. I. 503. no. 17.
— nana Hook. I. 502. no. 10.
— ovata Lindl. I. 502. no. 7.
— paleifolia A. Cunn. I. 503. no. 13.
— *pilosa* Lab. I. 502. no. 9. ε.
— pinnata Sm. I. 503. †
— rhomboidea Hook. V. 388. no. 1.
— rosmarinifolia A. Cunn. I. 502. no. 5.
— rubiginosa A. Cunn. I. 503. no. 11.
Boronia scabra Lindl. I. 502. no. 4.
— serrulata Sm. I. 503. † V. 389. †
— spathulata Lindl. I. 502. no. 1.
— stricta Bartl. V. 389. no. 10.
— tenuifolia Bartl. V. 388. no. 8.
— teretifolia Lindl. I. 502. no. 3.
— ternata Endl. I. 503. no. 15.
— tetrandra Lab. *I. 502. no. 9.
α. floribunda Hook.
γ. grandiflora Hook.
δ. laricifolia Hook.
ε. pilosa Hook.
β. terminiflora Hook. } l. c.
— triphylla Sieb. I. 503. no. 16. (c. var. α. et β.)
— variabilis Hook. I. 502. no. 8.
— viminea Lindl. I. 502. no. 2.
Boronieae Bartl. I. 502. V. 388.
Borrageae DC. VI. 557.
BORRAGINEAE Juss. VI. 553.
BORRAGINEAE Meisn. VI. 553.
Borrago Tournef. *VI. 558.
— *orientalis* Linn. VI. 558. no. 1.
Borreria Mey. II. 464. II. 941. VI. 27.
— advena Fisch. et Mey. II. 465. no. 10.
—? argentea Cham. II. 464. no. 7.
— aspera Mart. et Galeotti. VI. 28. no. 12.
— coriacea Scheele. VI. 27. no. 3.
— dubia Cham. II. 464. no. 8.
— eryngioides Cham. et Schlchtd. *II. 464. no. 5.
— Fockeana Miquel. VI. 27. no. 2.
— gracilis Scheele. VI. 27. no. 4.
— graminifolia Mart. et Galeotti. VI. 28. no. 8.
— humifusa Mart. II. 464. no. 9.
— Kleinii Wght. et Arn. II. 464. no. 3.
— laevigata Mart. et Galeotti. VI. 28. no. 10.
— lasiocarpa Wght. et Arn. *II. 464. no. 1.
— longiseta Mart. et Galeotti. VI. 28. no. 7.
— micrantha Torr. et Gr. II. 464. no. 4.
— Oaxacana Mart. et Galeotti. VI. 28. no. 11.
— *ocymoides* DC. II. 464. no. 3.
— Organensis Gardn. VI. 28. no. 5.
— ovalifolia Mart. et Galeotti. VI. 28. no. 9.
— patula Mart. et Galeotti. VI. 28. no. 6.
— procera Cham. II. 464. no. 6.
— pterophora Prsl. VI. 27. no. 1.
— Roxburghiana Wght. et Arn. II. 464. no. 2.
— setosa Martens et Galeotti. VI. 28. no. 13.
— tetraptera Miquel. II. 941. no. 1.
— *umbellata* Sieb. VI. 36. no. 1.
Borrhichia Adans. *II. 602.
Boschia Krthls. °V. 96.
— excelsa Krthls. V. 96. no. 1.
Boschniakia C. A. Meyer. III. 478. °III. 974.

Boschniakia glabra C. A. Meyer. III. 478. no. 1.
— Hookeri Wlprs. III. 479. no. 2.
Boscia Lam. I. 196.
— angustifolia A. Rich. I. 196. no. 1.
Bossiaea Vent. I. 578. II. 833. V. 434.
— biloba Bth. I. 578. no. 3.
— buxifolia Cunn. II. 833. no. 3.
— cordifolia Sweet. I. 578. no. 1.
— disticha Lindl. I. 578. no. 6.
— Endlicheri Meisn. V. 435. no. 4.
β. angustifolia.
γ. minor.
α. ovalifolia.
— ensata Sieb. I. 578. †
— eriocarpa Bth. I. 578. no. 4.
— foliosa Cunn. II. 833. no. 1.
— humilis Meisn. V. 435. no. 6.
— linnaeoides G. Don. II. 833. no. 4.
— linophylla R. Br. I. 578. †
— nummularia Endl. I. 578. no. 8.
— ovalifolia Endl. I. 578. no. 7.
— *ovalifolia* Endl. V. 435. no. 4.
— ovata G. Don. II. 833. no. 2.
— paucifolia Bth. I. 578. no. 5. *V. 435. no. 7.
— *paucifolia* Lindl. V. 434. no. 2.
— Preissii Meisn. V. 434. no 3.
— pulchella Meisn. V. 435. no. 5.
— rhombifolia Sieb. I. 578. †
— rosmarinifolia Lindl. II. 833. no. 5.
— rufa DC. I. 578. †
— spinescens Meisn. V. 434. no. 2.
— sulcata Meisn. V. 434. no. 1.
— tenuicaulis Grah. I. 578. no. 2.
— virgata Hook. II. 833. no. 6.
— *virgata* Hook. V. 435. no. 7.
Boswellia Rxbg. I. 557. II. 830. V. 419.
— papyrifera Hochstett. V. 419. no. 1.
— serrata Rxb. *II. 830. no. 1.
— thurifera Colebr. I. 557. no. 1.
Bothmannia? VI. 74. no. 3. (Gardenia.)
Bothriospermum Bnge. *VI. 562.
Botrophis Raf. *I. 60.
— *actaeoides* Fisch. et Mey. I. 60. no. 1.
— *serpentaria* Raf. I. 60. no. 1.
Botryadenia? gracilis Edgwrth. VI. 719. no. 2.
Botrycephalae Bth. (Acacia) I. 906.
Botryceras Willd. I. 555.
— laurifolium Willd. *I. 555. no. 1.
Botryodendron Endl. II. 433.
— angustifolium Endl. II. 433. no. 2.
— latifolium Endl. II. 433. no. 1.
— Taïtense Guill. II. 434. no. 3.
Botryolotus Jaub. et Spach. II. 905. °V. 512.
Botryolotus Cachemiricus Jaub. et Spach. II. 905. no. 2. *V. 512. no. 2.
— Persicus Jaub. et Spach. II. 905. no. 1. *V. 512. no. 1.
Botryosicyos Hochstett. °V. 774.
— pentaphyllus Hochstett. V. 775. no. 1.
Boucerosia Wght. et Arn. VI. 494.
— Decaisneana Lemaire. *VI. 495. no. 1.
Bouchéa Chamisso. IV. 11.
— Ehrenbergii Chamisso. IV. 12. no. 2.
—? Hyderobadensis Wlprs. IV. 12. no. 3.
— Pseudogervão Chamisso. VI. 11. no. 1.
Bouea Meissn. I. 556.
— oppositifolia Meisn. *I. 556. no. 1.
Bougueria Dcne. IV. 178. VI. 695.
— nubicola Dcne. IV. 178. no. 1. VI. 695. no. 1.
Bouvardia Salisb. II. 507. VI. 62.
—? discolor Hook. et Arn. II. 507. no. 3.
— flava Dcne. VI. 62. no. 3.
— laevis Martens et Galeotti. VI. 62. no. 1.
— leiantha Bth. II. 507. no. 4.
— longiflora H. B. Kth. VI. 62. †
— quinqueflora Dehnhardt. II. 507. no. 6.
— scabrida Martens et Galeotti. VI. 62. no. 2.
— splendens Hook. II. 507. no. 5.
— strigosa Bth. VI. 62. no. 4.
— Tolucana Hook. et Arn. II. 507. no. 1.
— xylosteoides Hook. et Arn. II. 507. no. 2.
Bovea Sinaïca Dcne. III. 265. no. 1.
Bowlesia Rz. et Pav. II. 386. V. 842.
— acutangula Bth. V. 842. no. 1.
— *diversifolia* Meyen. V. 842. no. 2.
— *flexilis* Meyen. V. 842. no. 2.
— *geraniifolia* Cham. et Schlchtdl. II. 386. no. 4.
— *incana* Hort. Paris. II. 386. no. 4.
— lobata Rz. et Pav. *V. 842. no. 2.
— multiradiata Colla. II. 386. no. 2.
— *nodiflora* Prsl. II. 386. no. 4.
— *tenella* Meyen. V. 842. no. 3.
— tenera Spr. *II. 386 no. 4. *V. 842. no. 3.
— tropaeolifolia Gill. II. 386. no. 3.
β. tripartita Hook.
— uncinata Colla. II. 386. no. 1.
Bowmannia Gardn. *II. 682. °VI. 323.
— verbascifolia Gardm. *VI. 323. no. 1.
Boymia Adr. Juss. I. 522.
— rutaecarpa Adr. Juss. *I. 522. no. 1.
Boykinia Nutt. II. 362.
— aconitifolia Nutt. II. 362. no. 1.
— occidentalis Torr. et Gr. II. 362. no. 2.
Brachanthemum DC. *II. 636.
Bracheilema R. Br. *II. 702. no. 2.
Brachyachyris Euthamiae Spr. II. 989. no. 2.

Brachyactis Ldb. °VI. 129.
— ciliata Ldb. *VI. 129. no. 1.
Brachyandra Naudin. °V. 700.
— perpusilla Naudin. *V. 701. no. 1.
Brachyanthae Bth. (Salvia) III. 631. VI. 662.
Brachyanthemum DC. II. 508.
Brachybotryae Bth. (Acacia) I. 899. V. 590.
Brachycalymna Endl. II 552. II. 590. VI. 109.
Brachycarpa Nutt. II. 684. no. 1.
Brachycarpae Bth. (Bonnaya) III. 289.
Brachycarpae Bth. (Diascia) III. 180.
Brachycarpae Wght. et Arn. (Indigofera) I. 667.
Brachycarpae Bth. (Vandellia) III. 291.
Brachycarpaea DC. I. 190.
— linifolia Eckl. et Zeyh. I. 190. no. 3.
— polygaloides Eckl. et Zeyh. I. 190. no. 1.
— varians DC. I. 190. no. 2.
Brachycentrum Meisn. II. 119.
— excelsum Meisn. *II. 119. no. 1.
Brachychaeta Torr. et Gr. *II. 589. II. 960. *II. 951. no. 1. °VI. 128.
— cordata Torr. et Gr. *II. 960. no. 1. VI. 129. no. 1.
Brachychiton Endl. V. 103.
Brachychiton Horsf. et Bennet. °V. 103.
— diversifolium Horsf. et Bennet. V. 103. no. 5.
— incanum Horsf. et Bennet. V. 103 no. 2.
— platanoides Horsf. et Bennet. V. 103. no. 3.
— populneum Horsf. et Bennet. V. 103. no. 4.
— ramiflorum Horsf. et Bennet. V. 103. no. 1.
Brachyclados Don. *II. 670. *VI. 318.
Brachycome Cass. II. 584. VI. 126. *II. 951. no. 2.
— bellidioides Steetz. VI. 126. no. 2.
— capillacea Wlprs. II. 584. no. 5.
— *capillacea* Wlprs. VI. 126. no. 1.
— decipiens Hook. fil. VI. 718. no. 2.
— Drummondii Wlprs. II. 584. no. 3.
— glauca Wlprs. II. 584. no. 2.
— iberidifolia Bth. II. 584. † *VI. 126. no. 1.
γ. alba Steetz. VI. 126. no. 1.
δ. divergens Steetz. VI. 126. no. 1.
α. Hügeliana Steetz. VI. 126. no. 1.
β. major Steetz. VI. 126. no. 1.
— lanuginosa Steetz. VI. 126. no. 4.
— pumila Wlprs. II. 584. no. 4.
— *pumila* Wlprs. VI. 126. no. 1.
— pusilla Steetz. IV. 126. no. 3.
— radicans Steetz. VI. 126. no. 5.
— squalida Hook. fil. VI. 718. no. 3.
— strongylospermoides Wlprs. II. 584. no. 1.
Brachycome tenuiscapa Hook. fil. VI. 718. no. 1.
Brachycoris parviflora Schrad. III. 266. no. 4.
Brachyglossa DC. (Eurybia) VI. 120. no. 1.
Brachyglottis Forst. *II. 558.
Brachylaena R. Br. *II. 599. *II. 953. no. 1. II. 972.
— Natalensis C. H. Schultz. II. 972. no. 1.
Brachylaeneae C. H. Schultz. II. 953.
Brachylepis Wght. et Arn. VI. 480.
— nervosa Wght. et Arn. *VI. 480. no. 1.
Brachylobos DC. I. 125.
Brachyloma Sonder. °VI. 425.
— Preissii Sonder. *VI. 425. no. 1.
Brachymeris DC. *II. 637.
Brachyodontes Bth. (Hyptis) III. 545.
Brachyphylli Torr. et Gr. (Aster) II. 561.
Brachypodae E. Mey. (Teline) I. 624.
Brachypteris borealis Willd. V. 280. no. 70.
Brachypterum Bth. I. 798.
— scandens Bth. *I. 798. no. 1. (c. varr. *α.* et *β.*)
Brachypterys Adr. Juss. °V. 201.
— australis Adr. Juss. V. 201. no. 1.
— borealis Adr. Juss. V. 202. no. 2.
Brachypus Ledeb. II. 757.
— asper Ledeb. *II. 757. no. 1.
Brachyrhamphus DC. II. 693. *VI. 358.
— ramosissimus Bth. II. 693. no. 1.
Brachyrhynchus Lssng. *II. 664.
Brachyris Nutt. II. 585.
Brachyris DC. (ex p.) II. 954. no. 4. II. 989.
— divaricata Nutt. II. 585. no. 1.
— *Californica* DC. II. 989. no. 1.
— *Euthamiae* Nutt. II. 989. no. 2.
— *microcephala* Hook. II. 989. no. 3.
— *ovalifolia* DC. II. 960. no. 1. VI. 129. no. 1.
Brachysema R. Br. *I. 566. V. 422.
— Celsianum Lemaire. V. 422. no. 3.
— lanceolatum Meisn. V. 422. no. 1.
β. glabrescens.
α. hypargyreum.
γ. planifolium.
— praemorsum Meisn. V. 423. no. 2.
Brachystachyae Wght. et Arn. (Indigofera) I. 668.
Brachystachyi Sonder. (Leucopogon) VI. 426.
Brachystelma R. Br. *VI. 494.
Brachystemum linifolium Willd. III. 691. no. 12.
— *muticum* Michx. III. 690. no. 10.
— *verticillatum* Michx. III. 689. no. 1.
Brachystephium Lssng. *II. 651.
Brachystylis DC. II. 422.

Braclearia DC. I. 751.
Bracteatae DC. (Psychotria) II. 474. no. 26.
Bracteatae Bth. (Salvia) III. 646.
Bracteogama DC. V. 773.
Bracteolaria Hochstett. V. 565.
Bracteolaria? II. 368. no. 45.
— racemosa Hochstett. V. 565. no. 1.
Bradburia Torr. et Gr. II. 587. *II. 952. no. 18. II. 959. °VI. 128.
— hirtella Torr. et Gr. *II. 959. no. 1. VI. 128. no. 1.
Bradypiptum DC. I. 176. V. 42. no. 5.
Bramia Bth. III. 281.
— *Indica* Lam. III. 282. no. 29.
— *semiserrata* Mart. III. 281. no. 18.
Brasenia Schreb. I. 105.
— peltata Prsh. *I. 105. no. 1.
Brassica L. I. 184. II. 763.
Brassica Boiss. I. 184. (adn.) I. 187. ex p.
— adpressa Boiss. *I. 185. no. 11. adn.
— alba Boiss. *I. 185. no. 14. adn.
— *arvensis* L. I. 184. no. 4. adn.
— Aucheri Boiss. I. 186. no. 15.
— Baetica Boiss. *I. 185. no. 12.
— Balearica Pers. I. 186. †
— bracteolata Fisch. et Mey. *I. 185. no. 9.
— campestris L. α. annua. β. biennis. I. 186. †
— carinata Alex. Braun. *II. 763. no. 2.
— Cheiranthus Vill. I. 186. †
— *Cretica* Moris. I. 185. no. 4.
— deflexa Boiss. I. 186. no. 12.
— dissecta Boiss. *I. 185. no. 16. adn.
— ensifera Dumort. I. 184. no. 1.
— *Erucastrum* Gaud. I. 185. no. 5.
β. ochroleucum Gaud. I. 185. no. 7.
— Erucastrum L. *I. 185. no. 6.
— erucoides Boiss. *I. 184. no. 3. adn.
— *frutescens* Sol. I. 184. no. 2.
— *fruticulosa* Cyr. I. 187. no. 1.
— hispida Boiss. *I. 185. no. 15. adn.
— hispida Ten. I. 185. no. 2.
— humilis DC. *I. 184. no. 8. adn.
— insularis Moris. I. 183. no. 4.
— longirostrata Boiss. I. 185. no. 17. adn.
— Macloviana d'Urv. I. 186. no. 16.
— macrocarpa Juss. I. 185. no. 3.
— Moricandia Boiss. *I. 184. no. 4. adn.
— moricandioides Boiss. I. 184. no. 5. adn.
— Napus L. α. annua. β. biennis. γ. rapifera. I. 186. †
— nivea Boiss. et Sprun. II. 763. no. 1.
— obtusangula Shuttlew. *I. 185. no. 8.
— ochroleuca Soyer-Willemet. I. 185. no. 5.
— *ochroleuca* Soyer. I. 185. no. 7.
— oleracea L. I. 186. †
Brassica papillaris Boiss. I. 184. no. 9. adn.
— pendula Boiss. *I. 184. no. 7. adn.
— Pollichii Shuttleworth. *I. 185. no. 7.
— praecox W. et K. I. 186. †
— Prolongi Boiss. *I. 184. no. 2. adn.
— Rapa L. I. 186. †
α. annua L. I. 186. †
β. biennis L. I. 186. †
— Richerii Vill. I. 186. †
— sabularia var. papillaris Boiss. I. 184. no. 9. adn.
— Schimperi Boiss. I. 186. no. 11.
— Sinaïca Boiss. I. 185. no. 10.
— *Sinapis* Noulet. I. 186. no. 1.
— Sinapistrum Boiss. *I. 185. no. 13. adn.
— taraxacifolia Boiss. I. 184. no. 10. adn.
— *taraxacifolia* Boiss. II. 760. no. 3.
— Tigridis Boiss. I. 186. no. 13.
— viminea Boiss. *I. 184. no. 1. adn.
— virgata Boiss. *I. 184. no. 6. adn.
— *Washitana* Mühlb. I. 128. no. 1.
— Willdenowii Boiss. *I. 186. no. 14.
Brassiceae DC. I. 184. V. 49.
Brassaia Endl. II. 430. V. 925.
— actinophylla Endl. *II. 430. no. 1. V. 925. no. 1.
Brathydium Chamamerion Spach. I. 387. no. 40.
— *hyssopifolium* Spach. I. 387 no. 41.
— *sphaerocarpum* Spach. I. 387. no. 40.
Braunea menispermoides Willd. I. 94. no. 13. I. 96. no. 1. β.
Bravaisia A. P. DC. *VI. 516.
Braya Hoppe et Sternberg. I. 171. II. 761.
— aenea Bnge. I. 171. no. 2.
— alpina Hoppe. I. 171. no. 1.
— *arctica* Hook. I. 174. no. 1.
— glabella Richards. I. 172. no. 5.
— limosella Bnge. I. 172. no. 4.
— *limoselloides* Bnge. I. 172. no. 4.
— *Meyeri* Bnge. II. 755. no. 1.
— nana Bnge. *I. 172. no. 8.
—? pilosa Hook. I. 172. no. 7.
— *pilosa* Hook. I. 172. no. 3.
— rosea Bnge. I. 172. no. 3.
— siliquosa Bnge. I. 172. no. 6.
— versicolor Turcz. II. 761. no. 1.
Brayera Kth *II. 51.
Brebissonia Spach. II. 94.
Bredemeyera Willd. *I. 247.
Brehmia Harvey. *VI. 497.
Bremontiera DC. *I. 750.
— *ammoxylon β. Burmanni* DC. I. 669. no. 99.
Breonia A. Rich. *II. 513.
— *palmata* Hort. Belg. VI. 264. no. 43.

Breweria R. Br. *VI. 542.
Brexia Thouars.*II. 380.
— spinosa Lindl. *II. 380. no. 1.
Brexiaceae Endl. II. 380. V. 838.
Brickellia Elliott. II. 556. VI. 117.
— cordifolia Ell. II. 556. no. 1.
— grandiflora Nutt. II. 557. no. 2.
— hastata Bth. VI. 117. no. 1.
— oblongifolia Nutt. II. 557. no. 3.
Bridelia spinosa Baum. II. 486. no. 1. VI. 48. no. 1.
Bridgesia Bert. I. 413. V. 360.
— incisifolia Bert. I. 413. no. 1. V. 360. no. 1.
Brignolia DC. II. 490.
— pubigera Bth. II. 490. no. 1.
Brissonia Neck. I. 676. V. 515. no. 45.
Brogniartia H. B. Kth. I. 678. II. 858.
— galegoides Prsl. I. 678. no. 1.
— glabrata Hook. et Arn. I. 678. no. 5.
— intermedia Moric. I. 678. no. 2.
— magnibracteata Schlchtd. I. 678. no. 4.
— sericea Schlchtd. I. 678. no. 3.
— vicioides Mart. et Galeotti. II. 858. no. 1.
Brocchia DC. VI. 225.
— *cinerea* Vis. VI. 209. no. 5.
Bronnia H. B. Kth. *I. 259.
Brotera Cav. I. 349.
— bracteosa Guill. et Perr. I. 349. no. 2.
— *corymbosa* Willd. VI. 731. no. 1.
— Leprieurii Guill. et Perr. I. 349. no. 1.
— *Persica* Spr. III. 560. no. 167.
Broteroa DC. *II. 623.
Broussaisia Gaudich. *II. 377. V. 837.
— arguta Gaudich. V. 837. no. 1.
— pellucida Gaudich. V. 837. no. 2.
Browallia L. III. 236. °III. 960. *VI. 633.
— abbreviata Bth. *VI. 633. adn.
— cordata G. Don. III. 237. no. 6.
— demissa Linn. III. 236. no. 2.
— elata Linn. III. 236. no. 3.
— elongata H. B. Kth. III. 237. no. 4.
— grandiflora Grah. III. 237. no. 5.
— *grandiflora* Lindl. III. 237. no. 6.
— *humifusa* Forsk. III. 299. no. 2.
— Jamesoni Bth. *VI. 633. adn.
— *lactea* Hortor. III. 237. no. 4.
— peduncularis Bth. *VI. 633. adn.
— viscosa H. B. Kth. III. 236. no. 1.
Brown Figwort Petiv. III. 168. no. 19.
Brownea Jcq. I. 843. V. 565.
— Ariza Bth. V. 566. no. 2.
— cauliflora Poepp. et Endl. V. 565. no. 1.
— coccinea Jcq. *I. 843. no. 2.
— grandiceps Jcq. *I. 843. no. 1.
Brownlowia Rxb. I. 360. V. 119.
Brownlowia elata Rxb. *I. 360. no. 1. V. 119. no. 1.
Brucea Mill. I. 519.
—? *arbor* Wall. V. 396. no. 3.
— glabrata Dcne. I. 519. no. 2.
— Guineensis G. Don. I. 519. no. 1. (III. Emend. p. 2.)
Bruckenthalia Rchb. *II. 728.
Brugmansia Bernhardi. III. 15. VI. 573. no. 1.
Brugmansia Pers. III. 15.
— *aurantiaca* Hortor. III. 934.
— *bicolor* Pers. III. 15. no. 3.
— *candida* Pers. III. 15. no. 1.
— *floribunda* Paxton. III. 934.
— *Knightii* Hortor. VI. 573. no. 1.
— *parviflora* Hortor. III. 934.
— *sanguinea* D. Don. III. 15. no. 3.
— *suaveolens* G. Don. III. 15. no. 2.
— *Wagmanni* Paxt. *III. 18.
— *Wagmanni* Steudel. III. 933.
— *Waymanni* Paxton. III. 933.
Bruguiera Lam. II. 70.
Bruguiera Pet. Th. II. 63.
— *Arnottiana* Wght. II. 70. no. 1.
— australis A. Cunn. II. 71. no. 4.
— caryophylloides Blume. II. 71. no. 6.
— cylindrica Blume. *II. 70. no. 2.
— *decandra* Griff. II. 70. no. 2.
— eriopetala Arn. II. 71. no. 5.
— gymnorhiza Blume. *II. 70. no. 1.
— *gymnorhiza* Lam. II. 70. no. 3.
— *Madagascariensis* DC. II. 63. no. 4.
— Malabarica Arn. II. 71. no. 7.
—? Rheedei Blume. II. 70. no. 3.
— sexangula Lour. II. 71. no. 8.
Bruinsmania Miq. II. 943. °VI. 52.
— isertioides Miq. *II. 943. no. 1. VI. 52. no. 1.
Brunella aequinoctialis H. B. Kth. III. 746. no. 3. β.
— *Australasica* Moric. III. 746. no. 3. γ.
— *Canadensis* Mill. III. 746. no. 1.
— *Fischeriana* Hamilt. III. 746. no. 3. β.
— *officinalis* Crantz. III. 746. no. 3. β.
— *parviflora* Poir. III. 747. no. 3. δ.
— *Pennsylvanica* Willd. III. 746. no. 3. β. γ.
— *sulfurea* Mill. III. 747. no. 3. ζ.
— *verbenae foliis* Vaill. III. 747. no. 3. ζ.
Brunellia Rz. et Pav. I. 519.
—? quadrilocularis Hook. et Arn. I. 519. no. 1.
— Sandwicensis Hook. I. 519. no. 2.
Brunfelsia Plum. III. 239. °III. 961. VI. 633.
— acuminata Bth. *VI. 745. no. 1.
— Americana Linn. III. 239. no. 1.
— *flore albo, fructu croceo molli* Plum. III. 239. no. 1.

Brunfelsia grandiflora D. Don. III. 239. no. 3.
— hydrangeaeformis Bth. *VI. 633. no. 1. VI. 745 no. 2.
— nitida Bth. β. Jamaicensis Bth. *VI. 745. †
— undulata Swrtz. III. 239. no. 2.
— violacea Loddiges. III. 239. no. 4.
Brunia Brogn. I. 543.
— *abrotanoides* Burm. I. 542. no. 1. (c. varr. α. et β.)
— alopecuroides Thbg. I. 543. no. 4.
— *arachnoidea* Wendl. I. 543. no. 9.
— *ciliata* L. I. 544. no. 4.
— *comosa* Thunb. I. 543. no. 6.
— cordata Burm. *I. 544. no. 9.
— *ericoides* Wendl. I. 543. no. 8.
— *fragarioides* Willd. I. 545. no. 3.
— *glutinosa* L. I. 544. no. 2.
— lancifolia Wlprs. I. 544. no. 8.
— *lanuginosa* L. I. 542. no. 2.
— *microphylla* Thbg. I. 544. no. 1.
— nodiflora L. I. 543. no. 1.
— *paleacea* Thbg. I. 544. no. 1.
— *paleacea* Wendl. I. 543. no. 7.
— passerinoides Schlchtd. I. 544. no. 6.
— *phylicoides* Thbg. I. 545. no. 4.
— pinifolia Brogn. I. 543. no. 3.
— racemosa Brogn. I. 543. no. 2.
— *radiata* L. I. 544. no. 1.
— *rubra* Willd. I. 542. no. 4.
— *superba* Rchb. I. 545. no. 1.
— thyrsophora Wlprs. I. 544. no. 7.
— *verticillata* Thbg. I. 544. no. 5.
— virgata A. Brogn. I. 543. no. 5.
BRUNIACEAE R. Br. I. 542.
Brunioideae DC. (Acacia) I. 893.
Brya P. Browne. *I. 725.
Bryanthus Gmelin. *II. 729.
Bryodes Bth. *VI. 645.
Bryonia Linn. II. 197. *V. 760.
— affinis Endl. II. 199. no. 16.
— *althaeoides* Ser. II. 198. no. 3. β.
— *amplexicaulis* Lam. II. 199. no. 2.
— Boykinii Torr. et Gr. II. 198. no. 12.
— capillacea Schum. et Thonn. II. 198. no. 11.
— *cordifolia* Godoy. II. 199. no. 15.
— *deltoidea* Arn. II. 196. no. 3.
— deltoidea Arn. II. 197. no. 1.
— digitata Thbg. II. 195. no. 2.
— *dissecta* Thbg. II. 195. no. 4.
— *epigaea* Rottl. II. 196. no. 2.
— epigaea Rottl. *II. 198. no. 7.
— foetidissima Schum. et Thonn. II. 198. no. 10.
— *glabra* Rxb. II. 198. no. 7.
— glandulosa Gill. II. 199. no. 13.
Bryonia grandis Linn. II. 202. no. 1. α.
— Hookeriana Wght. et Arn. II. 198. no. 5.
— leiosperma Wght. et Arn. II. 197. no. 2.
— *Maderaspatana* Brg. II. 198. no. 3. α.
— *Moimoi* Ser. II. 202. no. 1. α.
— Mysorensis Wght. II. 198. no. 4.
— *palmata* L. II. 202. no. 1. β.
— *palmata* Wall. II. 198. no. 7.
— *pilosa* Rxb. II. 198. no. 2.
— *quinquefolia* Norh. V. 760. no. 2.
— *quinqueloba* Thbg. II. 203. no. 1.
— *Rheedei* Blume. II. 198. no. 6.
— *rostrata* Rottl. II. 196. no. 1.
— rostrata Rottl. *II. 198. no. 8.
— *Rottleri* Spr. II. 198. no. 3. γ.
— *scabra* Rottl. II. 198. no. 3. γ.
— *scabra* Thbg. II. 196. no. 1.
— scrabella Linn. *II. 198. no. 3.
α. Plukenetii Wght. et Arn.
β. Rheedei Wght. et Arn.
γ. Rottleri Wght. et Arn.
— *scabrella* Linn. II. 198. no. 3. α. II. 199. no. 1.
— *scabrella* Rxb. II. 198. no. 3. β.
— *sinuosa* Wall. II. 198. no. 6.
— Tajuja Vellozo. II. 199. no. 15.
— tenuifolia Poepp. et Endl. II. 199. no. 14.
— *triloba* Thbg. II. 195. no. 1.
— tubiflora Wght. et Arn. II. 198. no. 9.
— *tubiflora* Wght. et Arn. II. 203. no. 1.
— umbellata Willd. *II. 198. no. 6.
— *umbellata* Willd. II. 199. no. 1.
Bryonieae Endl. II. 197.
Bryonopsis Arn. II. 196. V. 759.
— Courtallensis Arn. *II. 196. no. 1. *V. 759. no. 1.
— pedata Hsskrl. V. 760. no. 2.
Bryophyllum Salisb. II. 257.
— calycinum Salisb. *II. 257. no. 1.
Bubon Linn. II. 413. II. 939.
— *eriocephalus* Pall. II. 402. no. 2.
— Galbanum Linn. *II. 413. no. 1.
β. Tulbaghicum Eckl. et Zeyh.
— hypoleucum Meisn. II. 939. no. 1.
— pimpinellifolium Eckl. et Zeyh. II. 413. no. 2.
Bubonium DC. II. 600. no. 3.
Bubroma grandiflorum Willd. I. 340. no. 2.
— *Invira* Willd. I. 340. no. 3.
Bucco brevifolia Roem. et Schult. I. 510. no. 4.
— *erecta* Wendl. I. 512. no. 32.
— *hispida* Roem. et Schult. I. 510. no. 2.
— *Lamarckiana* Roem. et Schult. I. 510. no. 8.
— *obtusa* Roem. et Schult. I. 512. no. 29.

Bucco obtusata Wendl. I. 512. no. 46.
— *spicata* Roem. et Schult. I. 512. no. 33.
— *villosa* Wendl. I. 512. no. 24.
Buceras Ser. I. 637. II. 848.
Bucerates DC. I. 702. II. 867.
Buchanania Rxbg. I. 556. V. 416.
— angustifolia Rxb. V. 416. †
— florida Schauer. V. 416. no. 1.
— lanceolata Wght. V. 416. no. 2.
— longifolia Spanoghe. I. 556. no. 1.
Buchenrödera alpina Eckl. et Zeyh. I. 610. no. 20.
— *gracilis* Eckl. et Zeyh. I. 610. no. 20. β.
— *multiflora* Eckl. et Zeyh. I. 611. no. 22
— *tenuifolia* Eckl. et Zeyh. I. 610. no. 21.
— *teretifolia* Eckl. et Zeyh. I. 614. no. 77.
Buchia H. B. Kth. IV. 57.
— plantaginea H. B. Kth. IV. 57. no. 1.
Buchnera Linn. III. 301. III. 452. °III. 966. *VI. 648.
— *Aethiopica* Linn. III. 312. no. 14.
— Americana Linn. III. 303. no. 14.
— amethystina Cham. et Schlchtd. III. 303. no. 25.
— arguta Dcne. III. 303. no. 18.
— *Asiatica* Bth. III. 301. no. 13.
— *Asiatica* Linn. III. 300. no. 8. III. 300. no. 12. III. 301. no. 14. III. 300. no. 10.
— *Asiatica* Vahl. III. 300. no. 7.
— *aspera* Schum. et Thonn. III. 292. no. 4.
— asperata R. Br. III. 302. no. 11. (c. var. β. ibid.)
— *aurea* Bnks. III. 309. no. 3.
— *bilabiata* Thnbrg. III. 300. no. 8.
— *Canadensis* Linn. IV. 31. no. 79.
— *Capensis* Linn. III. 309. no. 1.
— *Capensis β.* Bnks. III. 309. no. 2.
— capillaris Dsvx. III. 304. no. 30.
— *cernua* Houytt. IV. 38. no. 12.
— *coccinea* Bth. III. 300. no. 12.
— cruciata Hamilt. III. 305. no. 33.
— *cuneifolia* Thnbrg. IV. 38. no. 2.
— *curviflora* R. Br. III. 292. no. 5.
— *densiflora* Bth. III. 300. no. 7.
—? densiflora Hook. et Arn. III. 304. no. 32.
— disticha H. B. Kth. III. 303. no. 17.
— *divaricata* Linn. III. 308. no. 14.
— dura Bth. III. 302. no. 8.
— elongata Swrtz. III. 301. no. 3.
β. pilosa Cham. et Schlchtd.
— *euphrasioides* Vahl. III. 301. no. 14.
— *foetida* Andrws. III. 314. no. 24.
— *gesnerioides* Willd. III. 292. no. 1.
— glabrata Bth. III. 302. no. 9.
— gracilis R. Br. III. 302. no. 10.
— *grandiflora* Linn. fil. III. 377. no. 1.
Buchnera Hermontica Delile. III. 301. no. 1.
— *hirsuta* Wall. III. 300. no. 10.
— hispida Hamilt. III. 302. no. 13.
— *humifusa* Vahl. III. 299. no. 2.
— *Hydrobadensis* Rth. III. 299. no. 1.
— juncea Cham. et Schlchtd. III. 301. no. 1.
— lavandulacea Cham. et Schlchtd. III. 304. no. 27.
— linearis R. Br. III. 302. no. 5.
— *linearifolia* Schum. et Thonn. III. 300. no. 8.
— lithospermifolia H. B. Kth. III. 303. no. 20.
— lobelioides Cham. et Schlchtd. III. 304. no. 26.
— *longiflora* Wght. III. 305. no. 1.
— longifolia H. B. Kth. III. 303. no. 19.
— macrantha Bth. III. 303. no. 15.
— macrocarpa H. B. Kth. III. 303. no. 24.
— *Masuria* Hamilt. III. 301. no. 15.
— *Montevidensis* Spr. IV. 27. no. 63.
— *orobanchoides* R. Br. III. 299. no. 1.
— palustris Spr. III. 301. no. 2.
— *parviflora* R. Br. III. 292. no. 3.
— *pedunculata* Andrws. III. 315. no. 14.
— *phoenicea* Wall. III. 300. no. 11.
— *pinnatifida* Thnbrg. IV. 39. no. 6.
— pubescens Bth. III. 302. no. 6.
— pusilla H. B. Kth. III. 303. no. 16.
— ramosissima R. Br. III. 302. no. 7.
— rosea H. B. Kth. III. 303. no. 23.
— stricta Bth. III. 304. no. 31.
— tenella R. Br. III. 302. no. 4.
— ternifolia H. B. Kth. III. 303. no. 21.
— tetragona R. Br. III. 305. no. 35.
— tetrasticha Wall. III. 305. no. 34.
— tinctoria Bertoloni. III. 304. no. 28.
— tomentosa Blume. III. 304. no. 29.
— urticaefolia R. Br. III. 302. no. 12. *III. 452. no. 1.
— virgata H. B. Kth. III. 303. no. 22.
— *viscosa* Ait. III. 310. no. 1.
— *Wallichii* Bth. III. 301. no. 15.
Buchnereae Bth. III. 299. III. 966. VI. 648.
Bucida Linn. *II. 60. V. 661.
— nitida Hsskrl. V. 661. no. 1.
Bucklandia R. Br. II. 435. V. 928.
— populnea R. Br. II. 435. no. 1. V. 928. no. 1.
Bucklandieae Endl. II. 435.
Bucquetia DC. *II. 120.
Buddlea glaberrima Hort. Taurin. III. 263. no. 1.
Buddleia Linn. III. 321. °III. 967. VI. 645.
— abbreviata H. B. Kth. III. 326. no. 34.
— *acuminata* H. B. Kth. III. 324. no. 22.
— *acuminata* R. Br. III. 326. no. 35.
— acuminata Poir. III. 327. no. 43.

Buddleia acuminatissima Blume. III. 326. no. 39.
— Americana Linn. III. 325. no. 27.
— *arborea* Meyen. III. 323. no. 12.
— Asiatica Lour. III. 330. no. 57.
— auriculata Bth. III. 326. no. 37.
— australis Arrabida III. 321. no. 4.
— betonicaefolia Lam. III. 323. no. 17.
— brachiata Cham. et Schlchtd. III. 328. no 48.
— Brasiliensis Jcq. fil. III. 321. no. 4.
— *brevifolia* Willd. III. 326. no. 34.
— bullata H. B. Kth. III. 323. no. 18.
— callicarpoides H. B. Kth. III. 325. no. 26.
— campestris Wlprs. III. 330. no. 66.
— *capitata* Jcq. III. 322. no. 6.
— cestriflora Cham. III. 329. no. 52.
— connata Rz. et Pav. III. 322. no. 8.
— cordata H. B. Kth. III. 324. no. 19.
— crispa Bth. III. 330. no. 56.
— cuneata Cham. III. 328. no. 50.
— curviflora Hook. et Arn. III. 326. no. 41.
— decurrens Cham. et Schlchtd. III. 324. no. 23.
— densiflora Blume. III. 330. no. 59.
— dentata H. B. Kth. III. 325. no. 30.
— diffusa Rz. et Pav. III. 323. no. 13.
— discolor Bth. III. 329. no. 53.
— diversifolia Vahl. III. 321. no. 5.
— elegans Cham. et Schlchtd. III. 323. no. 15.
— elliptica Martens et Galeotti. VI. 645. no. I.
— floribunda H. B. Kth. III. 325. no. 29.
— globosa Lam. III. 322. no. 6.
— grandiflora Cham. et Schlchtd. III. 327. no. 46.
— heterophylla Lindl. III. 325. no. 32.
— Humboldtiana Roem. et Schult. III. 224. no. 22.
— incompta Linn. III. 330. no. 63.
— *Indica* Lam. III. 321. no. 5.
— *integrifolia* Willd. III. 323. no. 12.
— intermedia H. B. Kth. III. 324. no. 24.
— interrupta H. B. Kth. III. 323. no. 16.
— lanata Bth. VI. 645. adn.
— lanceolata Bth. III. 222. no. 9.
— Lindleyana Fortune. III. 330. no. 58. VI. 646. † VI. 746. †
— longifolia H. B. Kth. III. 324. no. 20.
— macrostachya Bth. III. 328. no. 49.
— Madagascariensis Vahl. III. 329. no. 55.
— melliodora Kth. et Bouché. VI. 646. no. 3.
— microphylla H. B. Kth. III. 326. no. 33.
— missionis Wall. III. 326. no. 40.
— mollis H. B. Kth. III. 324. no. 21.
— Neemda Hamilt. III. 329. no. 54.
β. Philippensis Cham. et Schlchtd.
— *Neemda β*. Bth. III. 329. no. 53.
Buddleia Neemia Lnk. III. 321. no. 4.
— Nepalensis Colla. III. 330. no. 60.
— obtusifolia Martens et Galeotti. VI. 646. no. 5.
— occidentalis Linn. III. 324. no. 25.
— paniculata Wall. III. 326. no. 42.
— parviflora H. B. Kth. III. 325. no. 31.
— *parvifolia* Willd. III. 326. no. 33.
— perfoliata H. B. Kth. III. 322. no. 7.
— Pichinchensis H. B. Kth. III. 322. no. 12.
— *Poiretii* Spr. III. 324. no. 22.
— polycephala H. B. Kth. III. 322. no. 11.
— polystachya Fresen. III. 326. no. 35.
— pseudo-verticillata Martens et Galeotti. VI. 646. no. 2.
— rufa Fresen. III. 326. no. 36.
— rugosa H. B. Kth. III. 323. no. 14.
— *salicifolia* Jcq. III. 331. no. 3.
— *salicifolia* Vahl. III. 327. no. 44
— *salicina* Lam. III. 329. no. 53.
— saligna Willd. III. 331. no. 3.
— salvifolia Ait. III. 330. no. 61.
— scordioides H. B. Kth. III. 321. no. 2.
— sessiliflora H. B. Kth. III. 321. no. I.
— *serrulata* Bth. III. 329. no. 54.
— spectabilis Kth. et Bouché. VI. 646. no. 4.
— sphaerantha Cham. et Schlchtd. III. 322. no. 10.
— spicata Rz. et Pav. III. 327. no. 45.
— stachyoides Cham. et Schlchtd. III. 327. no. 47.
— suaveolens Kth. et Bouché. VI. 646. no. 6.
— *subserrata* D. Don. III. 329. no. 54.
— Sundaica Blume. III. 326. no. 38.
— ternata Lour. III. 330. no. 64.
— thyrsoidea Lam. III. 327. no. 44.
— verbascifolia H. B. Kth. III. 325. no. 28.
— verticillata H. B. Kth. III. 321. no. 3.
— vetula Cham. III. 328. no. 51.
— virgata Thnbrg. III. 330. no. 62.
— volubilis Lam. III. 330. no. 65.
Buddleieae Bth. III. 321. III. 967. VI. 645.
Buddleioides Bth. III. 563.
Büchnera cernua Linn. IV. 38. no. 1.
Buěna Pohl. VI. 67. VI. 69.
— *acuminata* DC. VI. 69. no. 3.
— *hexandra* Pohl. II. 510. no. 8. VI. 67. no. 3.
— *latifolia* Bth. VI. 69. no. 5.
— *macrocarpa* Bth. VI. 69. no. 6.
— *obtusifolia* DC. VI. 69. no. 1.
— *triflora* Bth. VI. 69. no. 2.
— *undulata* Kltzsch. VI. 67. no. 1.
Bülowia illustris Schum. et Thonn. II. 216. no. 3. V. 770.

Buettneria Loefl. I. 338. II. 796. V. 111.
— abutiloides St. Hil. et Naud. II. 796. no. 2.
— affinis Pohl. I. 338. no. 9.
— angulata Hsskrl. V. 111. no. 1.
— dentata Pohl. I. 339. no. 14.
— divaricata Bth. I. 339. no. 18.
— elliptica Pohl. I. 338. no. 8.
— flaccida Spanoghe. I. 338. no. 1.
— fulva Poepp. et Endl. V. 112. no. 2.
— *Gayana* Spr. I. 338. no. 7.
— glabrescens Bth. V. 112. no. 3.
— *grandifolia* DC. II. 795. no. 1.
— *herbacea* Rxb. II. 795. no. 3.
— herbacea Rxb. V. 112. †
— heterophylla Hook. I. 338. no. 2.
— jaculifolia Pohl. I. 339. no. 12.
— laevigata Schott. *I. 338. no. 7.
— lancifolia St. Hil. et Naud. II. 796. no. 1.
— lateralis Prsl. I. 338. no. 6.
— obliqua Bth. I. 339. no. 17.
— oblongata Pohl. I. 338. no. 10.
— *pannosa* DC. I. 337. no. 1.
— ramosissima Pohl. I. 338. no. 11.
— rivularis Gardn. II. 796. no. 3.
— rubricaulis Prsl. I. 338. no. 5.
— salicifolia Prsl. I. 338. no. 3.
— scalpellata Pohl. I. 339. no. 13. (c. varr. *α.* et *β.*)
— scabra Pohl. I. 339. no. 16.
— tiliaefolia Prsl. I. 338. no. 4.
— virgata Pohl. I. 339. no. 15.
BUETTNERIACEAE R. Br. I. 336. II. 795. V. 107.
BUETTNERIACEAE DC. (ex p.) I. 329. V. 95.
Buettnerieae DC. I. 337. V. 110.
Bugueria cf. Bougueria.
Bugula Bth. III. 924.
— *alpina* All. III. 926. no. 6.
— *Chamaepithys* Scop. III. 930. no. 25.
— *decumbens* Mill. III. 926. no. 6.
— *Genevensis* Mill. III. 926. no. 6.
— *obliqua* Mnch. III. 925. no. 3.
— *orientalis* Mill. III. 925. no. 3.
— *pyramidalis* Mill. III. 926. no. 4.
— *reptans* Mnch. III. 925. no. 2.
Bujacia anonychia E. Mey. I. 760. no. 11.
— *gampsonychia* E. Mey. I. 760. no. 12.
Bulbocastanum DC. II. 393. V. 851.
— *Creticum radice napiformi* Tournef. V. 923. no. 1.
Bulbostylis DC. II. 552. VI. 707.
— Californica Torr. et Gr. II. 552. no. 2.
— Cassiniana Gardn. VI. 708. no. 8.
— *Cavanillesii* DC. II. 552. no. 2.
— elegans Gardn. VI. 707. no. 1.
Bulbostylis glandulosa Gardn. VI. 708. no. 4.
—? *hastata* Bth. VI. 117. no. 1.
— microcephala Gardn. VI. 708. no. 3.
— microphylla Nutt. II. 552. no. 3.
— oblongifolia Gardn. VI. 708. no. 5.
— pumila Gardn. VI. 708. no. 7.
— ramosissima Gardn. VI. 709. no. 9.
— rigida Hook. et Arn. II. 552. no. 1.
— scandens Gardn. VI. 708. no. 6.
— scorodoniaefolia Kth. VI. 709. no. 10.
— tomentosa Gardn. VI. 707. no. 2.
Bulliarda DC. II. 151. V. 791. no. 3.
— *brevifolia* Eckl. et Zeyh. II. 251. no. 10.
— *elatinoides* Eckl. et Zeyh. II. 251. no. 7.
— *filiformis* Eckl. et Zeyh. II. 251. no. 8.
— *moschata* d'Urville. II. 251. no. 4.
— *trichotoma* Eckl. et Zeyh. II. 251. no. 9.
Bumelia Swrtz. * VI. 456.
—? *argentea* Roem. et Schult. II. 830. no. 5.
Bunburya Meisn. ° VI. 38.
— Capensis Meisn. VI. 39. nó. 1.
Bunchosia Rich. ° V. 189.
— acutifolia Adr. Juss. V. 191. no. 8.
— angustifolia Adr. Juss. V. 189. no. 1.
— argentea DC. V. 193. no. 15.
— Armeniaca DC. V. 189. no. 2.
— biocellata Schlchtd. V. 193. no. 18.
— Bonplandiana Adr. Juss. V. 190. no. 3.
— *bracteosa* Adr. Juss. V. 196. no. 2.
— Cumanensis Don. V. 194. no. 22.
— canescens DC. V. 193. no. 17.
— cornifolia H. B. Kth. V. 193. no. 14.
— glandulifera H. B. Kth. V. 192. no. 13.
— Gaudichaudiana Adr. Juss. V. 190. no. 4.
— glandulosa DC. V. 192. no. 10.
— *eglandulosa* Adr. Juss. V. 195. no. 1.
— glauca H. B. Kth. V. 193. no. 16.
— grandifolia Adr. Juss. V. 194. no. 23
— Lindeniana Adr. Juss. V. 191. no. 7.
— *holosericea* Mart. V. 195. no. 1.
— Hookeriana Adr. Juss. V. 192. no. 12.
—? laxiflora Gardn. V. 194. no. 24.
— Martiana Adr. Juss. V. 190. no. 5.
— *media* DC. V. 192. no. 9.
— montana Adr. Juss. V. 193. no. 19.
— *multiflora* Hook. V. 197. no. 1.
— nitida DC. V. 192. no. 9.
  α. grandifolia Adr. Juss.
  γ. latifolia Adr. Juss.
  β. parvifolia Adr. Juss.
— odorata H. B. Kth. V. 184. no. 20.
— *palustris* Poepp. V. 178. no. 1.
— pilosa H. B. Kth. V. 194. no. 21.
— *polystachya* DC. V. 192. no. 9.
— sphaerocarpa Adr. Juss. V. 178. no. 2.
— strigosa Schlchtd. V. 192. no. 11.

Bunchosia tuberculata DC. V. 191. no. 6.
Bungea C. E. Mey. III. 409. °III. 972. *VI. 653.
— trifida C. A. Mey. III. 409. no. 1.
Buniadeae DC. I. 189.
Bunias R. Br. I. 189.
— aspera Retz. I. 190. †
— *edentula* Bigel. I. 159. no. 1.
— Erucago L. I. 189. †
— Laelia orientalis Desv. I. 190. †
— macroptera Rchb. I. 190. †.
Bunium Koch. II. 393. V. 853.
— *acaule* Hffm. II. 394. no. 1.
— capillifolium Kar. et Kir. II. 394. no. 7.
— *Creticum* d'Urv. V. 923. no. 1.
— divaricatum Cesati. II. 394. no. 4.
— *ferulaefolium* Dsf. II. 393. no. 1. V. 852. no. 6.
— *glaucescens* DC. V. 906. no. 1.
— *junceum* Margot et Reuter. V. 923. no. 1. β.
— junceum Reuter. II. 394. no. 6.
— *luteum* M. Bieb. V. 853. no. 1.
— Macura Boiss. II. 393. no. 1.
— *napiforme* Willd. V. 923. no. 1.
— *Nepalense* Jacquem. II. 422. no. 2.
— nivale Boiss. II. 393. no. 2.
— *peucedanoides* DC. II. 405. no. 2.
— strictum Griseb. V. 853. no. 1.
— subcarneum Boiss. et Reut. II. 394. no. 3.
— thalictrifolium Boiss. II. 394. no. 5.
— *thalictrifolium* Boiss. II. 423. no. 1. V. 910. no. 1.
— *virescens* DC. V. 869. no. 1.
Bunnosi Rheede. IV. 89. no. 37.
Buphthalmeae Lssng. II. 601. II. 974. VI. 145.
Buphthalmeae C. H. Schultz. II. 955.
Buphtalmeae legitimae C. H. Schultz. II. 955.
Buphthalmum Neck. *II. 601. *II. 955. no. 1.
— *angustifolium* Bnks. II. 988. no. 1.
— *sagittatum* Prsh. II. 610. no. 6.
Bupleurum Tournef. II. 396. II. 937. V. 859.
— aciphyllum B. Webb et Berthelot. V. 860. no. 13.
— acutifolium Boiss. II. 397. no. 3.
— Aleppicum Boiss. V. 860. no. 8.
— angustifolium Ldb. V. 860. no. 11.
— *apiculatum* Friv. II. 396. no. 2. β.
— apiculatum Friv. II. 397. no. 4.
— *aristatum* Brtlng. II. 396. no. 2. δ.
— Aucheri Boiss. V. 860. no. 9.
— brevicaule Schlchtd. II. 937. no. 1.
— *brevicaule* Schlchtd. V. 860. no. 9.
— Cappadocicum Boiss. V. 859. no. 4.
— citrinum Hochstett. V. 859. no. 6.
Bupleurum croceum Fzl. II. 397. no. 5.
— Dahuricum Fisch. et Mey. V. 862. no. 18.
— difforme Linn. *II. 398. no. 15.
β. Burmannianum Eckl. et Zeyh.
— distichophyllum Wght. et Arn. II. 397. no. 10.
— flexuosum Ldb. V. 860. no. 12.
— *Fontanesii* Guss. II. 397. no. 2. ε.
— *gracile* DC. II. 397. no. 8.
— Koechelii Fzl. II. 397. no. 6.
— Kurdicum Boiss. V. 859. no. 5.
— leucocladum Boiss. V. 859. no. 1.
— longeradiatum Turczan. V. 862. no. 17.
— Marschallianum C. A. Mey. *II. 397. no. 8.
— mucronatum Wght. et Arn. II. 398. no. 12.
— neglectum Cesati. II. 396. no. 1.
— Nordmannianum Ldb. V. 860. no. 10.
— octoradiatum Bnge. II. 397. no. 9.
— Odontites Cesati. II. 396. no. 2.
α. glumaceum Sibthrp. et Sm.
γ. intermedium Cesati.
β. Kochianum Cesati.
ε. Linnaeanum Cesati. II. 397. no. 2.
δ. opacum Cesati. II. 396. no. 2.
— *Odontites* Guss. II. 397. no. 2. ε.
— Olympicum Boiss. V. 861. no. 14.
— Persicum Boiss. V. 861. no. 15.
— plantaginifolium Wght. II. 398. no. 14.
— ramosissimum Wght. et Arn. II. 398. no. 13.
— scabrum Griseb. V. 859. no. 3.
— Schimperi Boiss. V. 861. no. 16.
— semiperfoliatum Griseb. V. 860. no. 7.
— subpinnatum Ledeb. II. 397. no. 7.
— *subpinnatum* Ldb. V. 849. no. 4.
— trichopodum Boiss. et Spruner. V. 859. no. 2.
— trifoliatum Bartl. et Wendl. II. 398. no. 1.
— virgatum Wght. et Arn. II. 397. no. 11.
Burasaia Thbg. I. 98.
— congesta Desne. I. 98. no. 3.
— gracilis Desne. I. 98. no. 2.
— Madagascariensis Pet. Th. I. 98. no. 1.
Burchardia Duham. IV. 127. no. 8.
Burchellia R. Br. *II. 523. II. 944.
— Kraussii Hochstett. II. 944. no. 1.
Burdachia Adr. Juss. °V. 177.
Burdachia Martius. V. 177.
— prismatocarpa Adr. Juss. V. 177. no. 1.
Burgonia Bth. V. 626.
Burgsdorffia rigida Moench. III. 854. no. 38.
— *Romana* Hoffm. et Link. III. 854. no. 38.
Burkea Hook. °V. 558. (II. 904.)
— Africana. *V. 58 no. 1. *II. 904. no. 1.
Burrielia DC. II. 627. II. 989.
— chrysostoma Torr. et Gr. *II. 989. no. 1.

Burrielia gracilis DC. *II. 628. no. 4.
— hirsuta Nutt. II. 627. no. 3.
— *hirsuta* Nutt. II. 989. no. I.
— longifolia Nutt. II. 627. no. I.
— parviflora Nutt. II. 627. no. 2.
Bursaria Cav. I. 255.
— *diosmoides* Putterl. I. 255. no. 37.
— diosmoides Putterl. I. 256. no. 2.
— procumbens Putterl. I. 255. no. 3.
— spinosa Cav. I. 255. no. I.
β. inermis Putterl.
β. macrophylla Hook.
Bursera Jcq. *I. 558. II. 830.
— *acutifolia* Sieb. I. 550. no. 1.
— *paniculata* Lam. I. 558. no. 1.
— *serrata* Wall. I. 558. no. 1.
— serrata Wall. *II. 830. no. 1.
BURSERACEAE Kth. I. 557. II. 830. V. 419.
Burtonia R. Br. I. 569. V. 426.
— conferta DC. *I. 569. no. 1.
— diosmaefolia Bth. I. 569. no. 2.
— pulchella Meisn. V. 426. no. 1.
—? tenella Meisn. V. 326. no. 3.
— villosa Meisn. V. 426. no. 2.
Busbekea Endl. I. 201.
— nobilis Endl. *I. 201. no. 1.
Busbekia radicans Martius. VI. 613. no. 5.
Busseria Löffl. IV. 34. no. 1.
Butea Koen. I. 769. V. 536.
— frondosa Rxb. *I. 769.
— parviflora Rxb. *V. 536. no. 1.
Butinia Boiss. II. 422. V. 906.
— bunioides Boiss. II. 422. no. 1.
— capnoides Dcne. II. 422. no. 2.
— glaucescens Boiss. V. 906. no. I.
— Libanotica Boiss. V. 907. no. 3.
— macrocarpa Boiss. V. 907. no. 4.
— nodosa Boiss. V. 907. no. 2.
— stylosa Boiss. V. 907. no. 5.
Butonica Lam. II. 192.
Byblis Salisb. I. 230.
— gigantea Lindl. I. 230. no. 1.
Byronia Endl. I. 541. V. 403.
— Sandwicensis Endl. *I. 541. no. 1. V. 403. no. 1.
Byrsanthes Prsl. *II. 708. *VI. 380.
Byrsanthus Guillem. I. 548.
Byrsonima Rich. °V. 156.
— altissima H. B. Kth. V. 167. no. 36.
— angustifolia H. B. Kth. V. 177. no. 71.
— arthropoda Adr. Juss. V. 175. no. 67.
— basiloba Adr. Juss. V. 159. no. 9.
— Berteroana Adr. Juss. V. 167. no. 38.
— bicorniculata Adr. Juss. V. 162. no. 23.
— brachystachya DC. V. 175. no. 65.
— *brachystachya* Poepp. V. 175. no. 66.
Byrsonima Brasiliensis Grisebach. V. 157. no. 3.
— bumeliaefolia Adr. Iuss. V. 165. no. 31.
— chrysophylla H. B. Kth. V. 156. no. I.
— *chrysophylla* Adr. Juss. V. 157. no. 2.
— *chrysophylla* Mart. V. 157. no. 3.
— Clausseniana Adr. Juss. V. 161. no. 19.
— cinerea DC. V. 160. no. 16.
— coccolobaefolia H. B. Kth. V. 172. no. 54.
— coniophylla Adr. Juss. V. 176. no. 70.
— *coriacea* DC. V. 168. no. 39.
— correaefolia Adr. Juss. V. 163. no. 25.
— *cotinifolia* Bth. V. 162. no. 21.
— cotinifolia H. B. Kth. V. 169. no. 46.
— crassifolia H. B. Kth. V. 166. no. 35.
— crispa Adr. Juss. V. 175. no. 66.
— *Cubajensis* Mart. V. 173. no. 56.
— Cubensis Adr. Juss. V. 167. no. 37.
— Cumingiana Adr. Juss. V. 161. no. 20.
— cydoniaefolia Adr. Juss. V. 161. no. 18.
β. Chiquitensis Adr. Juss.
— dealbata Griseb. V. 158. no. 6.
— densa DC. V. 173. no. 58.
— diphylla DC. V. 173. no. 60.
— eglandulosa Adr. Juss. V. 157. no. 2.
— *elegans* DC. V. 187. no. 1.
— *elegans* DC. V. 187. no. I.
— eriopoda DC. V. 160. no. 14.
— *fastigiata* Mart. V. 173. no. 57.
— ferruginea H. B. Kth. V. 166. no. 34.
— frondosa Martius. V. 173. no. 59.
— Gardneriana Adr. Juss. V. 169. no. 43.
— Guilleminiana Adr. Juss. V. 158. no. 7.
— gymnocalycina Adr. Juss. V. 174. no. 61.
— Japurensis Adr. Juss. V. 174. no. 62.
— intermedia Adr. Juss. V. 173. no. 56.
— Karwinskiana Adr. Juss. V. 165. no. 29.
— laevigata DC. V. 173. no. 57.
— *lanceolata* DC. V. 167. no. 35.
— *lanceolata* Poir. V. 167. no. 35.
— lancifolia Adr. Juss. V. 157. no. 5.
— laurifolia H. B. Kth. V. 160. no. 17.
— laxiflora Griseb. V. 175. no. 64.
— ligustrifolia Adr. Juss. V. 171. no. 52.
— *ligustrifolia* Mart. V. 173. no. 56.
— linearifolia Adr. Juss. V. 159. no. 11.
— longibracteata Martius. V. 165. no. 28.
— lucida DC. V. 168. no. 40.
— Martiana Adr. Juss. V. 164. no. 26.
— microphylla Adr. Juss. V. 170. no. 47.
— *montana* H. B. Kth. V. 167. no. 35.
— *Moureila* Aubl. V. 167. no. 35.
— nervosa DC. V. 164. no. 27.
— nitidifolia Adr. Juss. V. 168. no. 41.
— nitidissima H. B. Kth. V. 169. no. 45.
— Oaxacana Adr. Juss. V. 162. no. 21.

Byrsonima oblongifolia Adr. Juss. V. 171. no. 50.
— Orbignyana Adr. Juss. V. 162. no. 22.
— oxyphylla Adr. Juss. V. 171. no. 51.
— pachyphylla Adr. Juss. V. 160. no. 13.
— Paulista Adr. Juss. V. 172. no. 55.
— Peruviana Adr. Juss. V. 166. no. 32.
— perseaefolia Griseb. V. 174. no. 63.
— Piauhiensis Adr. Juss. V. 157. no. 4.
— Poeppigiana Adr. Juss. V. 176. no. 68.
— psilandra Griseb. V. 160. no. 12.
— pulchra DC. V. 165. no. 30.
— punctulata Adr. Juss. V. 176. no. 69.
— *rhopalaefolia* H. B. Kth. V. 167. no. 35.
— rhombifolia Adr. Juss. V. 166. no. 33.
— *rufa* Poir. V. 167. no. 35.
— *reticulata* DC. V. 266. no. 31.
— rigida Adr. Juss. V. 170. no. 49.
— Salzmanniana Adr. Juss. V. 158. no. 8.
— sericea DC. V. 157. no. 3.
— spicata DC. V. 168. no. 39.
— stipulacea Adr. Juss. V. 164. no. 28.
— *stigmatophora* Schlchdl. V. 267. no. 33.
— Trinitensis Adr. Juss. V. 168. no. 42.
— triopterifolia Adr. Juss. V. 170. no. 48.
— umbellata Martius V. 172. no. 53.
— vaccinifolia Adr. Juss. V. 169. no. 44.
— variabilis Adr. Juss. V. 163. no. 24.
— *variabilis γ. lancifolia* Adr. Jussieu. V. 153. no. 5.
Byrsonima verbascifolia A. Rich. V. 160. no. 15.
— *volubilis* DC. V. 328. no. 23.
— viminifolia Adr. Juss. V. 159. no. 10.
Bysteropogon cf. Bystropogon.
Bystropogon Bth. III. 687.
Bystropogon Hérit. III. 687. °III. 981. VI. 670.
— *bipinnatus* Bth. III. 576. no. 14.
— Canariensis Hérit. III. 687. no. 2.
— canus Bth. III. 688. no. 7.
— *coarctatum* Schum. et Thonn. III. 560.
— dentatus Pohr. III. 688. no. 8.
— *erianthus* Bth. III. 846. no. 1.
— erianthus Bth. III. 946.
— glabrescens Bth. VI. 670. no. 1.
— *graveolens* Blume. III. 558. no. 159. et ibid. in adn.
— *marifolius* Juss. III. 726. no. 41.
— *molle* H. B. Kth. III. 594. no. 19.
— origanifolius Hérit. III. 687. no. 4.
— origanifolius B. Webb. *III. 946. †
— plumosus Hérit. III. 687. no. 3.
— *pectinatum* Hérit. III. 560. no. 167.
— punctatus Hérit. III. 687. no. 1.
— *sidaefolium* Hérit. III. 558. no. 162.
— spicatus Bth. III. 687. no. 5.
— *suaveolens* Hérit. III. 558. no. 159.
— tomentosus Bth. III. 688. no. 6.

C

Caanthe DC. II. 522.
Cabicinho et *Taynia de Abobrinha* V. 764. no. 1.
Cabomba Aubl. I. 105. V. 19.
— *Aubletii* Michx. I. 105. no. 1.
— Caroliniana Gray. I. 105. no. 1. * V. 19. no. 2.
— Piauhiensis Gardn. V. 19. no. 1.
CABOMBEAE Rich. I. 105. V. 19.
Cabralia L. Juss. I. 431. V. 374.
— affinis A. Juss. I. 431. no. 2.
— glaberrima A. Juss. I. 431. no. 4.
— inaequilatera Casaretto. V. 374. no. 1.
— oligotricha A. Juss. I. 431. no. 3.
Cabralia polytricha A. Juss. I. 431. no. 1.
— tomentosa Casaretto. V. 374. no. 2.
Cacabus prostratus Bernh. III. 26. no. 17.
Cacalia DC. II. 652. VI. 257.
— *aconitifolia* Bnge. II. 654. no. 9.
— *appendiculata* Linn. VI. 266. no. 56. *a.*
— *appendiculata* var. Linn. fil. VI. 266. no. 55.
— *atriplicifolia* Hort. Herrenhus. VI. 257. no. 1.
— cirsiifolia Hook. et Arn. II. 653. no. 4.
— cuspidata Bertol. II. 652. no. 1.
— dichroa Bngrd. II. 653. no. 5.
— diversifolia Torr. et Gr. VI. 653. no. 6.

Cacalia echinata Linn. fil. VI. 253. no. 4.
— gigantea N. ab. E. II. 652. no. 2.
— *glabrata* H. B. Kth. VI. 325. no. 4.
— *Kleinia* Linn. VI. 266. no. 54.
— *lanuginosa* Bnks. et Soland. VI. 266. no. 57.
— *multiflora* Auct. VI. 266. no. 55.
— oligocephala Scheele. VI. 257. no. 1.
— pulchella H. B. Kth. VI. 325. no. 5.
— *seseloides* M. Bieb. II. 392. no. 1.
— sessilifolia Hook. et Arn. II. 653. no. 3.
— *teretifolia* H. B. Kth. VI. 325. no. 1.
— *vaccinioides* H. B. Kth. VI. 325. no. 3.
Cacalianthemum folio Nerii glauco Dill. VI. 266. no. 54.
Cacao montaras o Symarron V. 111. no. 1.
— *quadrado* V. 111. no. 2.
— *sylvestris* Aubl. I. 339. no. 2.
— *Theobroma* Tussac. I. 339. no. 1.
Caccinia Savi. °VI. 563.
— Kotschyi Boiss. VI. 563. no. 1.
Cachrys Tournef. II. 424. V. 914.
— ....? Boiss. *V. 914. no. 4.
— amplifolia Wlprs. II. 424. no. 4.
— *athamanthoides* M. Bieb. V. 871. no. 3.
— *crispa* Pers. V. 915. no. 1.
— crispa Sieb. *II. 424. no. 3.
— *cristata* DC. V. 915. no. 4.
— eriantha DC. *V. 914. no. 2.
— hirta Bertoloni. II. 424. no. 2.
— *Libanotis* DC. V. 915. no. 3.
— *longiloba* DC. II. 424. no. 3.
— macrocarpa Ldb. II. 424. no. 1.
— *microcarpa* Steven. V. 915. no. 1.
— *nudicaulis* Godet. V. 915. no 1.
— papillaris Boiss. V. 914. no. 1.
— prangoides Boiss. V. 914. no. 3.
— *pterochlaena* DC. V. 915. no. 2.
— *Sibirica* Stephan. V. 872. no. 1.
— *Sibirica* Turczan. V. 872. no. 2.
— *Sicula* Fl. Graec. V. 915. no. 3.
— *Sicula* Linn. V. 915. no. 2.
— *Sicula* d'Urville. V. 915. no. 4.
— *Taurica* Willd. V. 848. no. 2.
— *vaginata* Ldb. II. 427. no. 1.
Caconobea Bth. III. 281.
— *gratioloides* Cham. III. 281. no. 18.
Cacosmia H. B. Kth. *II. 544.
Cacoucia Aubl. II. 68. V. 662.
— cordifolia Wlprs II. 68. no. 1.
— lucida Hsskrl. V. 662. no. 1.
—? *trifoliata* DC. V. 663. no. 1.
Cacoucia efr. Cacoucia.
CACTEAE DC. II. 269. II. 936. V. 809.
Cacteae rotatae Miq. II. 342. V. 821.
Cacteae tubulosae Miq. II. 283. V. 809.
[Cactus Linn. II. 183. II. 936.]
— *abnormis* Willd. II. 329. no. 41. β.
— *alatus* Bot. Mag. II. 343. no. 6.
— *alatus* Swartz. II. 342. no. 5.
— *alatus* Willd. II. 341. no. 2.
— *ambiguus* Bonpl. II. 334. no. 88.
— *arboreus* Vell. II. 352. no. 69.
— *aureus* Meyen. II. 315. no. 54.
— *Bleo* H. B. Kth. II. 356. no. 4.
— *Bonplandii* H. B. Kth. II. 350. no. 51.
— *Brasiliensis* Willd. II. 352. no. 69.
— *canescens* Fl. Mex. II. 292. no. 88.
— *chlorocarpus* H. B. Kth. II. 331. no. 63.
— *cochenillifer* Flor. Mex. II. 348. no. 29.
— *cochenillifer* L. II. 348. no. 20.
— *columnaris* Fl. Mex. II. 289. no. 54.
— *Coquimbanus* Molina. II. 330. no. 49.
— *coronatus* W. II. 291. no. 74.
— *cruciformis* Vellozo. II. 345. no. 5.
— *Curassavicus* Linn. II. 347. no. 16.
— *cylindricus* Lam. II. 352. no. 70.
— *cylindricus* Ort. II. 291. no. 74.
— *cylindricus* Vellozo. II. 343. no. 12.
— *decumanus* Willd. II. 348. no. 24.
— *depressus* Haw. II. 315. no. 52.
— *Dillenii* Bot. Reg. II. 351. no. 55.
— *divaricatus* Lam. II. 331. no. 61.
— *eburneus* Lnk. II. 330. no. 49.
— *elegans* Lnk. II. 341. no. 2.
— *elongatus* W. II. 348. no. 24.
— *erinaceus* Haw. II. 311. no. 12.
— *fasciculatus* Willd. II. 344. no. 13.
— *ferox* Nutt. II. 350. no. 41.
— *ferox* Willd. II. 352. no. 66.
— *Ficus Indica* L. II. 348. no. 26.
— *fimbriatus* Fl. Mex. II. 356. no. 7.
— *fimbriatus* Hort. II. 331. no. 61.
— *fimbriatus* Lam. II. 330. no. 55.
— *flagelliformis* Linn. II. 335. no. 105.
— *flavescens* DC. II. 284. no. 12.
— *flavescens* Spr. II. 284. no. 12.
— *foliosus* Willd. II. 347. no. 15.
— *fragilis* Nutt. II. 347. no. 12.
— *frutescens* Fl. Mex. II. 356. no. 9.
— *funalis* Spr. II. 343. no. 12.
— *Garipensis* H. B. Kth. II. 336. no. 114.
— *gibbosus* Haw. II. 325. no. 5.
— *glomeratus* Lam. II. 293. no. 90.
— *grandiflorus* L. II. 336. no. 112.
— *grandifolius* Lk. II. 356. no. 5.
— *Haworthii* Spr. II. 327. no. 26.
— *Helicteres* Moçino. II. 292. no. 89.
— *heptagonus* Linn. II. 329. no. 41.
— *heptagonus* Vell. II. 329. no. 41.
— *hexagonus* Lam. II. 329. no. 42.
— *hexagonus* Linn. II. 329. no. 41.

Cactus hexagonus Vell. II. 329. no. 41.
— *hexagonus* Willd. II. 329. no. 41.
— *horridus* H. B. Kth. II. 356. no. 11.
— *Humboldtii* H. B. Kth. II. 336. no. 109.
— *humilis* Haw. II. 351. no. 54.
— *icosigonus* H. B. Kth. II. 336. no. 110.
— *intortus* Mill. II. 315. no. 51.
— *laetus* H. B. Kth. II. 334. no. 94.
— *lanatus* H. B. et Kth. II. 326. no. 13.
— *lanceolatus* Haw. II. 348. no. 23.
— *lanuginosus* Linn. II. 327. no. 17.
— *latispinus* Haw. II. 312. no. 24.
— *lyratus* Vellozo. II. 345. no. 1.
— *macracanthus* S. Dyck. II. 308. no. 26.
— *mammillaris* L. II. 284. no. 11.
— *mammillaris* var. *prolifer* Ait. II. 285. no. 13.
— *Melocactus* Linn. II. 306. no. 9.
— *Melocactus* Wendl. II. 306. no. 13.
— *micranthus* Kunth. II. 343. no. 9.
— *microthele* Spr. II. 284. no. 10.
— *monacanthos* Willd. II. 351. no. 59.
— *moniliformis* Linn. II. 333. no. 81.
— *multangularis* Voigt. II. 312. no. 25.
— *multangularis* Willd. II. 326. no. 10.
— *nanus* H. B. Kth. II. 333. no. 86.
— *neglectus* Denh. II. 357. no. 1.
— *niger* Spr. II. 327. no. 28.
— *nigricans* Haw. II. 351. no. 60.
— *nobilis* Lam. II. 315. no. 51. β.
— *nobilis* Willd. II. 312. no. 25.
— *nudus* Fl. Mexic. II. 293. no. 91.
— *Opuntia* Gussone. II. 348. no. 26.
— *Opuntia* Linn. II. 347. no. 18.
— *Opuntia var. nana* DC. II. 347. no. 18.
— *Opuntia var. Tuna* DC. II. 351. no. 59.
— *Opuntia var. vulgaris* DC. II. 347. no. 18.
— *opuntiaeflorus* Fl. Mex. II. 356. no. 8.
— *oxypetalus* Moç. et Sess. II. 341. no. 3.
— *paniculatus* Lam. II. 334. no. 95.
— *paradoxus* Hornem. II. 352. no. 69.
— *parasiticus* Linn. II. 344. no. 13.
— *parvispinus* Haw. II. 311. no. 13.
— *pendulinus* Sieb. II. 343. no. 10. ε.
— *pendulus* H. B. Kth. II. 343. no. 10. δ.
— *pendulus* Swrtz. II. 343. no. 10.
— *pentagonus* Linn. II. 335. no. 102.
— *pentagonus* Linn. II. 329. no. 41.
— *pentagonus* Vell. II. 335. no. 102.
— *pentagonus* Willd. II. 332. no. 74. β.
— *Pereskia* Linn. II. 355. no. 1.
— *Peruvianus* Linn. II. 329. no. 41.
— *Peruvianus* Tabern. II. 329. no. 41.
— *Peruvianus* Willd. II. 330. no. 49.
— *phyllanthoides* DC. II. 341. no. 2.
— *phyllanthus* Linn. II. 342. no. 6.
Cactus phyllanthus Vellozo. II. 344. no. 17
— *Pitajaya* Jacq. II. 334. no. 91.
— *Pitaya* Jcq. V. 820. no. 11.
— *placentiformis* Lehm. II. 323. no. 2.
— *polyanthos* Bot. Mag. II. 351. no. 56.
— *polygonus* Lam. II. 334. no. 89.
— *portulacifolius* Linn. II. 356. no. 10.
— *prismaticus* Desf. II. 337. no. 123.
— *prismaticus* Haw. II. 335. no. 102.
— *prismaticus* Willd. II. 335. no. 102.
— *prolifer* W. II. 284. no. 10.
— *pseudo-coccinellifer* Bert. II. 351. no. 60.
— *pseudomammillaris* S. Dyck. II. 289. no. 58.
— *pusillus* DC. II. 292. no. 82.
— *pusillus* Haw. II. 347. no. 15.
— *pyramidalis* S. Dyck. II. 307. no. 23.
— *recurvus* Haw. II. 312. no. 25.
— *reductus* Link. II. 326. no. 6.
— *repandus* Linn. II. 330. no. 56.
— *repandus* Mill. II. 327. no. 19.
— *reptans* Haw. II. 335. no. 102
— *reptans* Willd. II. 335. no. 102.
— *Rosa* Vellozo. II. 357. no. 14.
— *Royeni* DC. II. 330. no. 56.
— *Royeni* Mill. II. 327. no. 21.
— *Royeni* Willd. II. 328. no. 32.
— *Scopa* Lk. II. 314. no. 43.
— *senilis* Haw. II. 325. no. 1.
— *sepium* H. B. Kth. II. 336. no. 111.
— *serpens* H. B. Kth. II. 333. no. 85.
— *speciosus* Bonpl. II. 341. no. 2.
— *speciosus* Willd. II. 338. no. 129.
— *speciosissimus* DC. II. 338. no. 129. β. *lateritius* Bot. Reg.
— *speciosissimus* Desf. II. 338. no. 129.
— *Spinii* Colla. II. 289. no. 58.
— *spinosissimus* Lam. II. 352. no. 65.
— *stellaris* L. II. 292. no. 82.
— *stellatus* Lodd. II. 292. no. 82.
— *stramineus* Spr. II. 284. no. 12.
— *strictus* Haw. II. 348. no. 22.
— *strictus* Willd. II. 327. no. 27.
— *subquadriflorus* Fl. Mex. II. 353. no. 74.
— *tenuis* Schott. II. 345. no. 2.
— *teres* Vellozo. II. 344. no. 13.
— *tetragonus* Vell. II. 332. no. 74.
— *tomentosus* Lk. II. 350. no. 49.
— *torquatus* H. Lugd. II. 342. no. 2.
— *triacanthos* Willd. II. 351. no. 57.
— *triangularis* Linn. II. 337. no. 121.
— *triangularis* Linn. var. *aphyllus* Jcq. II. 337. no. 121.
— *triangularis* Linn. var. *foliosus* Jacq. II. 337. no. 124.
— *triangularis* Vell. II. 337. no. 121.

Cactus triqueter Haw. II. 337. no. 123.
— *triqueter β.* Haw. II. 337. no. 124.
— *truncatus* Lk. II. 342. no. 1.
— *tuberculatus* Willd. II. 348. no. 21.
— *Tuna* Linn. II. 350. no. 51.
— *Tuna α.* Hort. Kew. II. 350. no. 51.
— *Tuna β.* Willd. II. 351. no. 61.
— *Tuna β. nigricans* Bot. Mag. II. 351. no. 60.
— *Urumbeba* Vell. II. 351. no. 57.
— *viviparus* Nutt. II. 291. no. 72.
— *zinniaeflorus* Fl. Mex. II. 356. no. 6.
Cadaba Forsk. I. 196. V. 53.
— trifoliata Wght. et Arn. I. 196. no. 1. (III. Emend. p. 1.)
— *triphylla* Wght. I. 196. no. 1.
— virgata Bojer. V. 53. no. 1.
Cadiscus E. Mey. *II. 683. *II. 700.
Caenotus Nutt. II. 579.
Caesalpinia Plum. I. 810. II. 904. V. 554.
Caesalpinia Vogel. I. 811. ex p.
— *Bonduccella* Flum. I. 809. no. 1.
— bracteosa Tulasne. V. 555. no. 7.
β. desertorum Tulasne.
— Chinensis? Rxb. I. 810. no. 5.
— corymbosa Bth. V. 554. no. 3.
— *cucullata* Rxb. I. 811. no. 1.
— *desertorum* Martius. V. 555. no. 7. β.
— *dubia* Spr. I. 811. no. 1. V. 557. no. 1.
— eriostachys Bth. V. 554. no. 2.
— ferox Hasskarl. I. 810. no. 2.
— ferrea Martius. V. 554. no. 4.
β. petiolulata Martius.
— ferruginea Dcne. I. 810. no. 3.
— fimbriata Tulasne. V. 555. no. 10.
— floribunda Tulasne. V. 555. no. 6.
— *Gilliesii* Wall. I. 809. no. 1.
— *lacerans* Rxb. I. 811. no. 1.
— laxa Bth. I. 810. no. 7.
— laxiflora Tulasne. V. 555. no. 8.
— *ligulata* Madr. Herb. I. 811. no. 1.
— macrantha Delile. I. 810. no. 6.
— *macrantha* Delile. II. 903. no. 1.
— marginata Tulasne. V. 555. no. 11.
— microphylla Martius. V. 555. no. 9.
— Millettii Hook. et Arn. I. 810. no. 4.
— mimosoides Lam. *II. 904. no. 1.
— monosperma Tulasne. V. 555. no. 12.
— nitida Hsskrl. V. 554. no. 1.
— obliqua Vogel. I. 810. no. 8.
— paniculata Rxb. *II. 904. no. 2.
— pellucida Vogel. I. 810. no. 9.
— *procera* Poepp. V. 552. no. 1.
— pyramidalis Tulasne. V. 555. no. 5.
β. Alagoënsis Tulasne.
— sepiaria Rxb. I. 810. no. 1. *II. 904. no. 3. (III. Emend. p. 4.)
Caesalpiniaefolia Bth. (Mimosa) I. 876.
Caesalpinieae DC. I. 808. II. 903. V. 550.
Caesarea Cambess. I. 460.
— albiflora Cambess. I. 460. no. 1.
β. ramosa ibid.
— lanceolata Kltzsch. I. 461. no. 6.
— Montevidensis Kltzsch. I. 460. no. 3.
— ovata Kltzsch. I. 460. no. 4.
— petiolata Kltzsch. I. 461. no. 5.
— rubriflora Cambess. I. 460. no. 2.
Caesulia Rxb. *II. 601. *II. 955. no. 1.
Caesulieae DC. II. 601.
Cajaneae Bth. I. 782. V. 539.
Cajanus DC. I. 782. V. 539.
— *bicolor* Wall. I. 782. no. 1.
— *flavus* DC. I. 782. no. 1.
— Indicus Spr. *I. 782. no. 1. *V. 539. no. 1. (c. varr. α. et β.)
β. bicolor Wght. et Arn. V. 539. no. 1.
— *lineatus* Grah. I. 783. no. 4.
— *niveus* Grah. I. 783. no. 2.
— scarabaeoides Pet. Thouars. I. 783. no. 1.
— ? *suaveolens* Grah. I. 790. no. 40.
— ? *Wightii* Grah. I. 783. no. 2.
Cajaputi Schauer. V. 747.
Caillica Guill. et Perr. *I. 925.
— *dichrostachys* Guill. et Per. I. 863. no. 3.
— *macrostachya* Steudel. V. 583. no. 2.
Caiophora Prsl. II. 227. V. 781.
— absynthiifolia Prsl. II. 227. no. 4. *V. 781. no. 3.
— carduifolia Prsl. II. 227. no. 3.
— cirsiifolia Prsl. II. 227. no. 2.
— cissifolia, err. typogr. pro Caiophora cirsiifolia.
— contorta Prsl. *II. 227. no. 1. V. 781. no. 2.
— *coronata* Hook. et Arn. II. 227. no. 4.
— lateritia Bth. V. 781. no. 1.
— scandens Meyen et Kltzsch. V. 781. no. 4.
Cakile Tournef. I. 159.
— *Aegyptiaca* Tussac. I. 159. no. 1.
— *aequalis* L'Herit. I. 159. no. 1.
— *Americana* Nutt. I. 159. no. 1.
— *Cubensis* H. B. Kth. I. 159. no. 1.
— Domingensis Tussac. I. 159. no. 2.
— *edentula* Hook. I. 159. no. 1.
— maritima Scop. *I. 159. no. 1. (c. var. β.)
Cakilineae DC. I. 159.
Calaïs DC. II. 684. *VI. 328.
— Douglasii DC. *II. 684. no. 1.
— *Lindleyi* DC. II. 684. no. 2.
— linearifolia DC. *II. 684. no. 2.
Calamiformes Bth. (Acacia) I. 892. V. 589.
Calamintha Mnch. III. 727.
— *arvensis* Lam. III. 729. no. 8.
— *Athonica* Rchb. III. 728. no. 5. β.

Calamintha canescens Prsl. III. 728. no. 5.
— *Caroliniana* Sweet. III. 729. no. 7.
— *Cretica* Lam. III. 726. no. 41.
— *Croatica* Host. III. 724. no. 29.
— *grandiflora* Moench. III. 733. no. 25.
— *grandiflora* Pursh. III. 729. no. 7.
— *hederacea* Scop. III. 787. no. 62.
— *menthaefolia* Host. III. 728. no. 6.
— *montana α.* Lam. III. 728. no. 6.
— *Nepeta* Hoffm. et Link. III. 728. no. 5.
— *obliqua* Host. III. 728. no. 5.
— *officinalis* Moench. III. 728. no. 6.
— *origanifolia* Host. III. 726. no. 40.
— *parviflora* Lam. III. 728. no. 5.
— *Patavina* Host. III. 729. no. 9.
— *rotundifolia* Host. III. 728. no. 5.
— *rupestris* Host. III. 707. no. 2.
— *subnuda* Host. III. 726. no. 40.
— *thymifolia* Host. III. 727. no. 3.
— *trichotoma* Moench. III. 728. no. 5.
— *umbrosa* Rchb. III. 728. no. 6.
Calandrinia H. B. Kth. II. 235. V. 786.
— *acuta* Meyen. V. 786. no. 4. *β.*
— amoena Visiani. V. 786. no. 3.
— andicola Gill. II. 235. no. 10.
— arenaria Cham. II. 236. no. 18.
— biflora Meyen. V. 786. no. 4.
— calyptrata Hook. II. 236. no. 23.
— capitata Hook. et Arn. II. 236. no. 15.
— corymbosa Wlprs. V. 787. no. 7.
— Cumingii Hook. et Arn. II. 236. no. 17.
— denticulata Gill. II. 235. no. 11.
— *discolor* Lindl. II. 235. no. 9.
— discolor Schrad. II. 235. no. 7.
— *fruticulosa* Knze. V. 786. no. 1.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 236. no. 13.
— grandiflora Lindl. II. 235. no. 8.
— Lindleyana Wlprs. II. 235. no. 9.
— linifolia Fnzl. II. 236. no. 22.
— maritima Nutt. II. 235. no. 2.
— Menziesii Hook. II. 235. no. 1. *V. 786. no. 2.
— Meyeniana Wlprs. V. 787. no. 6.
— micrantha Schlchtd. II. 236. no. 19.
— *monandra* DC. II. 238. no. 1. V. 787. no. 1.
— mucronulata Meyen. V. 787. no. 8.
— Poeppigiana Wlprs. V. 787. no. 5.
— polypetala Fzl. II. 236. no. 21.
— procumbens Moris. II. 235. no. 5.
— ramosissima Hook. et Arn. II. 236. no. 16.
— sericea Hook. et Arn. II. 236. no. 14.
β. aequipes Hook. et Arn.
γ. longipes Hook. et Arn.
— *sericea* Poepp. V. 787. no. 5.
— speciosa Lehm. II. 235. no. 3.
— *speciosa* Lindl. II. 235. no. 1. V. 786. no. 2.
Calandrinia spectabilis Otto et Dietr. II. 235. no. 6.
— tenella Hook. II. 235. no. 4.
— trifida Hook. et Arn. II. 235. no. 12. *V. 786. no. 1.
β. gracilis Meyen. V. 786. no. 1.
— tuberosa Bth. II. 236. no. 20.
— *umbellata* Gill. II. 236. no. 13.
— *vinulosa* Hook. et Arn. II. 236. no. 18.
Calandrinieae Fzl. II. 234. V. 785.
Calanthea DC. I. 197.
Calceolaria Linn. III. 152. °III. 958. VI. 634.
Calceolaria Wlprs. VI. 634.
— alba Rz. et Pav. III. 164. no. 87.
— alternifolia Cav. III. 164. no. 88.
— amplexicaulis H. B. Kth. III. 162. no. 75.
— angustiflora Rz. et Pav. III. 159. no. 53.
— *anomala* Pers. III. 154. no. 15.
— arachnoidea Grah. III. 161. no. 66.
β. lanata Wlprs.
γ. refugens Sweet.
— argentea H. B. Kth. III. 163. no. 85.
— ascendens Lindl. III. 161. no. 68.
— Berteri Moris. III. 156. no. 35.
— *bicolor* Grah. III. 158. no. 49.
— bicolor Rz. et Pav. III. 158. no. 48. III. 935.
— bicrenata Rz. et Pav. III. 156. no. 28.
— *biflora* Lam. III. 153. no. 7.
— *biflora* Rz. et Pav. III. 156. no. 27.
— cana Cav. III. 154. no. 14.
— *canescens* Bonpl. III. 163. no. 81.
— chelidonioides H. B. Kth. III. 152. no. 2.
— Chiloënsis Lindl. III. 162. no. 69.
— *concinna* Willd. III. 152. no. 2.
— *connata* Hook. III. 160. no. 63.
— corymbosa Rz. et Pav. III. 154. no. 17.
var. Hopeana Paxton. III. 935.
var. Jupiter Paxton.
var. Talisman Paxton.
— crenata Lam. III. 162. no. 74.
— crenatiflora Cav. III. 154. no. 15.
— cuneiformis Rz. et Pav. III. 158. no. 46.
β. canescens Wlprs.
— Darwinii Bth. VI. 634. †
— deflexa Rz. et Pav. III. 157. no. 36.
— *deflexa* Willd. III. 156. no. 33.
— dentata Rz. et Pav. III. 159. no. 51.
— dichotoma Lam. III. 156. no. 27.
— diffusa Lindl. III. 158. no. 49.
— divaricata H. B. Kth. III. 155. no. 22.
— ericoides Juss. III. 163. no. 83.
— *fasciculata* Willd. III. 157. no. 39.
— *ferruginea* Cav. III. 163. no. 78.
— ferruginea Moris. III. 156. no. 34.
— *ferruginosa* Knze. III. 161. no. 67. *γ.*
— flexuosa Rz. et Pav. III. 157. no. 38.

Calceolaria floribunda H. B. Kth. III. 162. no. 76.
— *floribunda* Lindl. III. 160. no. 63.
— *foliis Scabiosae vulgaris* Feuill. III. 152. no. 5.
— *foliosa* Meyen. III. 158. no. 46.
— Fothergillii Ait. III. 153. no. 9.
— Fothergillii Soland. VI. 634. †
— gemelliflora Cav. III. 159. no. 56.
— glauca Rz. et Pav. III. 160. no. 58.
— gracilis H. B. Kth. III. 152. no. 3.
— graminifolia H. B. Kth. III. 163. no. 79.
— helianthemoides H. B. Kth. III. 163. no. 82.
— Herbertiana Lindl. III. 157. no. 41.
β. parviflora Lindl.
— heterophylla Rz. et Pav. III. 156. no. 29.
— *heterophylla* Willd. III. 152. no. 5.
— hypoleuca Knze. *III. 164.
— hyssopifolia H. B. Kth. III. 163. no. 81.
— inflexa Rz. et Pav. III. 155. adn.
— *inflexa* Rz. et Pav. III. 155. no. 21.
— *integrifolia* Lindl. III. 161. no. 67. *β.*
— *integrifolia* Linn. III. 155. no. 27. III. 161. no. 64.
— integrifolia Linn. III. 161. no. 67.
γ. angustifolia Lindl. III. 161. no. 67.
δ. incisa Wlprs.
β. integrifolia Hook. et Arn.
α. latifolia Wlprs. III. 934.
ε. viscosissima Hook. III. 161. no. 67.
— involuta Rz. et Pav. III. 158. no. 47.
— lanata H. B. Kth. III. 156. no. 31.
— lanceolata Cav. III. 164. no. 86.
— lancifolia H. B. Kth. III. 155. no. 26.
— lavandulaefolia H. B. Kth. III. 163. no. 80.
— linearis Rz. et Pav. III. 163. no. 84.
— lobata Cav. III. 156. no. 30.
— Mexicana Bth. III. 153. no. 6.
— mirabilis Knwls. et Wstsctt. *III. 164.
— mollissima Wlprs. III. 157. no. 43.
— montana Cav. III. 153. no. 11.
— Morisii Wlprs. III. 157. no. 42.
— multiflora Cav. III. 159. no. 57.
— nana Sm. III. 153. no. 8.
— *Neeana* Spr. III. 153. no. 9.
— nitida Moris. III. 162. no. 72.
— nivalis H. B. Kth. III. 157. no. 39.
— *nudicaulis* Meyen. III. 153. no. 7.
— oblonga Rz. et Pav. III. 154. no. 19.
— *obtusifolia* Knze. III. 153. no. 7.
— ovata Sm. III. 155. no. 27.
— padifolia H. B. Kth. III. 156. no. 33.
— *paniculata* Herbert. III. 161. no. 63.
— *Paralensis* Spr. III. 154. no. 16.
— Paralia Cav. III. 154. no. 16.
— *pendula* Sweet. III. 154. no. 15.
Calceolaria perfoliata Linn. III. 160. no. 61
— petiolaris Cav. III. 160. no. 63.
— pinifolia Cav. III. 153. no. 12.
— pinnata Linn. III. 152. no. 1.
— *pinnata* Rz. et Pav. III. 152. no. 5.
— Pisacomensis Meyen. III. 162. no. 70.
— *plantaginea* Sm. III. 151. no. 1.
— plantaginea Sm. III. 153. no. 7.
— plectranthifolia Wlprs. III. 160. no. 60.
— polifolia Hook. III. 162. no. 71.
— polyrhiza Cav. III. 153. no. 10.
— pulverulenta Rz. et Pav. III. 158. no. 44.
— *punctata* Vahl. III. 151. no. 2.
— puniceа Rz. et Pav. III. 154. no. 20.
— purpurea Grah. III. 154. no. 18.
β. picta Sweet. ibid.
— racemosa Cav. III. 153. no. 13.
— robusta Alb. Dietr. III. 161. no. 65.
— rosmarinifolia Lam. III. 163. no. 78.
— rotundifolia H. B. Kth. III. 155. no. 23.
— *rugosa* Hook. III. 161. no. 67. *β.*
β. *angustifolia* Wlprs. III. 161. no. 67. *γ.*
γ. *incisa* Wlprs. III. 161. no. 67. *δ.*
var. *macrophylla* Hortor. III. 161. no. 67. *ε.*
— rugosa Rz. et Pav. III. 161. no. 64.
— *salicifolia* Moris. III. 157. no. 42.
— salicifolia Rz. et Pav. III. 158. no. 45.
— *Salviae folio* Feuill. III. 161. no. 64.
— *salviaefolia* Pers. III. 161. no. 67. *β.*
— saxatilis H. B. Kth. III. 155. no. 25.
— *scabiosaefolia* Nee. III. 161. no. 64.
— scabiosaefolia Sims. III. 152. no. 5.
— seabra Rz. et Pav. III. 157. no. 40.
— serrata Lam. III. 155. no. 21.
— sessilis Rz. et Pav. III. 162. no. 73.
— sibthorpioides H. B. Kth. III. 155. no. 24.
— Sinclairii Hook. III. 164. no. 89.
— *spectabilis* Knze. III. 162. no. 69.
— stricta H. B. Kth. III. 156. no. 32.
— tenuiflora Cav. III. 159. no. 55.
— thyrsiflora Grah. III. 162. no. 77.
— *tinctoria* Gillies. III. 161. no. 66. *γ.*
— tomentosa Rz. et Pav. III. 160. no. 62.
— tracheliifolia Martens et Galeotti. VI. 634. no. 1.
— trifida Rz. et Pav. III. 160. no. 59.
— tripartita Rz. et Pav. III. 152. no. 4.
— *uniflora* Lam. III. 153. no. 8.
— uniflora Rz. et Pav. III. 158. no. 50.
— verticillata Rz. et Pav. III. 159. no. 54.
— *violacea* Cav. III. 151. no. 3.
— virgata Rz. et Pav. III. 159. no. 52.
— viscosa Rz. et Pav. III. 157. no. 37.
— *viscosissima* Hook. III. 935.
— *viscosissima* Lindl. III. 161. no. 67. *ε.*
Calceolarieae Bth. VI. 634.

Calceolus Bth. III. 513. VI. 634. no. 1.
Calcitrapa DC. *(Centaurea)* VI. 301.
Calcitrapeae DC. *(Centaurea)* VI. 301.
Caldasia Lag. II. 422.
Caldasia Willd. VI. 527.
— heterophylla Willd. * VI. 527. no. 1.
Caldcluvia D. Don. II. 375.
— paniculata D. Don. * II. 375. no. 1.
Calea R. Br. II. 629.
— divaricata Bth. II. 629. no. 1.
Calendula Neck. II. 665. VI. 273.
— aurantiaca Boiss. VI. 273. no. 1.
— chrysanthemifolia Vent. * II. 665. no. 1.
— suffruticosa Vahl. * II. 665. no. 2.
Calendulaceae DC. II. 665. VI. 273.
Calenduleae Lssng. II. 665. VI. 273.
Calepina Adans. I. 189.
— Corvini Desv. * I. 189. no. 1.
Calibrachoa Llaw. et Lexarza. III. 178. ° III. 958. * VI. 546. * VI. 655.
— procumbens Llaw. et Lexarza. * III. 178. no. 1.
Calimerideï (Aster) DC. II. 578.
Calimeris Cass. * II. 576. * II. 951. no. 7.
Callerya Endl. ° V. 556.
— tomentosa Endl. V. 557. no. 1.
Calliandra Bth. I. 925. ° V. 598.
— abbreviata Bth. V. 606. no. 48.
— alba Bth. I. 927. no. 25.
— Amazonica Bth. V. 599. no. 1.
— angelica Bth. V. 602. no. 20.
— asplenioides Bth. * I. 927. no. 29.
— bella Bth. V. 607. no. 54.
— bicolor Bth. I. 926. no. 10. V. 605. no. 43.
— Blancheti Bth. V. 603. no. 28.
— brevipes Bth. I. 927. no. 16. V. 604. no. 34.
— Californica Bth. V. 605. no. 39.
— Callistemon Bth. I. 927. no. 30.
— *Callistemon* Bth. V. 608. no. 58.
— canescens Bth. V. 600. no. 9.
— capillata Bth. V. 604. no. 13.
— Caracasana Bth. * I. 927. no. 26.
— *Caracasana* Bth. V. 602. no. 19.
— carbonaria Bth. V. 599. no. 3.
— Chilensis Bth. V. 603. no. 30.
—? coriacea Bth. V. 600. no. 6.
— Cumingii Bth. I. 926. no. 12. V. 605. no. 40.
β. Galeottii Bth. V. 605. no. 40.
— cylindrocarpa Bth. V. 600. no. 8.
— dasyantha Bth. I. 926. no. 2. V. 606. no. 50.
— emarginata Bth. V. 599. no. 4.
— eriophylla Bth. V. 604. no. 38.
— falcata Bth. V. 600. no. 11.
—? fasciculata Bth. I. 926. no. 15. V. 606. no. 46.
— fasciculata Bth. V. 608. no. 61. (Species a praecedente diversa.)
Calliandra filipes Bth. I. 926. no. 8. V. 601. no. 17.
— foliolosa Bth. V. 607. no. 53.
— formosa Bth. * I. 927. no. 21. V. 601. no. 14.
— Gardneri Bth. V. 606. no. 47.
— grandiflora Bth. * I. 926. no. 4. V. 608. no. 58.
— Guildingii Bth. V. 600. no. 10.
— haematomma Bth. * I. 927. no. 28. V. 603. no. 29.
— Harrisii Bth. V. 599. no. 5.
— Houstoni Bth. I. 926. no. 3. V. 607. no. 57.
— humilis Bth. I. 927. no. 32.
— Kunthii Bth. * I. 926. no. 5. V. 608. no. 59.
— Lambertiana Bth. * I. 927. no. 27. V. 602. no. 22.
— laxa Bth. * I. 927. no. 22.
— leptopoda Bth. V. 602. no. 25.
— macrocephala Bth. I. 926. no. 13. V. 606. no. 49.
β. foliolosa Bth. V. 606. no. 49.
— Magdalenae Bth. * I. 927. no. 19.
— malacophylla Bth. V. 602. no. 21.
— mertensioides Bth. V. 705. no. 42.
— metrosideriflora Bth. I. 927. no. 31.
— *metrosideriflora* Bth. V. 608. no. 57.
— microphylla Bth. I. 928. no. 6. V. 607. no. 55.
— mollissima Bth. V. 600. no. 12.
— myriophylla Bth. V. 607. no. 56.
— obovata Bth. V. 602. no. 23.
— parviflora Bth. V. 608. no. 60.
— pedicellata Bth. V. 603. no. 26.
— Portoricensis Bth. * I. 927. no. 24. V. 601. no. 19.
— purpurea Bth. V. 604. no. 35.
— quadrangularis Bth. * I. 927. no. 28.
— scutellifera Bth. I. 926. no. 9. V. 601. no. 16.
— sessilis Bth. I. 927. no. 17. V. 603. no. 31.
— squarrosa Bth. V. 604. no. 32.
—? stipulacea Bth. I. 925. no. 1. V. 606. no. 45.
— Surinamensis Bth. V. 604. no. 36.
— taxifolia Bth. V. 601. no. 33.
— tergemina Bth. V. 600. no 7.
— tetragona Bth. * I. 926. no. 7. V. 601. no. 18.
— trinervia Bth. V. 599. no. 2.
— tubulosa Bth. V. 602. no. 24.
— turbinata Bth. V. 607. no. 52.
— Twedei Bth. I. 926. no. 11. V. 605. no. 44.
— umbellifera Bth. I. 927. no. 18. V. 603. no. 27.
— ungulata Bth. * I. 927. no. 23.

Calliandra vespertina Bth. I. 927. no. 33.
— *vespertina* Bth. V. 602. no. 19.
— virgata Bth. I. 926. no. 14. V. 604. no. 37.
— viridiflora Bth. V. 601. no. 15.
— viscidula Bth. V. 606. no. 51.
— Xalapensis Bth. V. 605. no. 41.
Callianthemum C. A. Mey. I. 33.
— Caschemirianum Cambess. I. 33. no. 2.
— coriandrifolium Rchb. I. 33. †
Endlicheri Wlprs. I. 33. no. 3.
— rutaefolium Rchb. *I. 33. no. 1. †
Calliastrum Torr. et Gr. II. 559.
Callibrachoa cf. Calibrachoa.
Callicarpa Linn. IV. 125. VI. 692.
— adenanthera R. Br. IV. 129. no. 22.
— acuminata H. B. Kth. IV. 126. no. 7
— acuminata Rxb. IV. 128. no. 18.
— albida Blume. IV. 128. no. 14.
— Americana Linn. IV. 126. no. 8.
— *Americana* Lour. IV. 127. no. 9. IV. 127. no. 11.
— arborea Rxb. IV. 125. no. 1.
— attenuata Wall. IV. 129. no. 25.
— bicolor Juss. IV. 128. no 29.
— cana Linn. IV. 127. no. 9.
— cordifolia Rz. et Pav. IV. 130. no. 33.
— cuspidata Rxb. IV. 128. no. 19.
— *dentata* Bth. VI. 127. no. 10.
— ferruginea Swrtz. VI. 131. no. 35.
— globiflora Rz. et Pav. IV. 130. no. 32.
— Heynei Rth. IV. 128. no. 17.
— Japonica Thnbrg. IV. 129. no. 27.
— *incana* Rxb. IV. 127. no. 13.
— *integrifolia* Jcq. IV. 122. no. 20.
— integrifolia Jcq. IV. 126. no. 5.
— lanata Vahl. IV. 127. no. 10.
— lanceolaria Rxb. IV. 129. no. 24.
— longifolia Lam. IV. 128. no. 15.
— *longifolia* Rxb. IV. 128. no. 16.
— macrophylla Vahl. IV. 127. no. 12.
— *mollis* Willd. IV. 126. no. 6.
— *nudiflora* Hook. et Arn. IV. 128. no. 18. (c. diagnos. in adnot.)
— *paniculata* Lam. III. 331. no. 3.
— parviflora Hook. et Arn. IV. 129. no. 21.
— *pedunculata* R. Br. IV. 127. no. 10.
— pentandra Rxb. IV. 131. no. 36.
— purpurea Juss. IV. 129. no. 23.
— Reevesii Wall. IV. 125. no. 3.
— *reticulata* Poepp. IV. 72. no. 2.
— reticulata Swrtz. IV. 131. no. 34.
— Roxburghiana Schult. IV. 128. no. 16.
— Roxburghii Wall. IV. 127. no. 13.
— rubella Lindl. IV. 130. no. 29.
— sessilifolia Wall. IV. 130. no. 28.
— subintegerima H. B. Kth. IV. 126. no. 6.
Callicarpa subpubescens Hook. et Arn. IV. 129. no. 26.
— *tomentosa* Koenig. IV. 127. no. 13.
— *tomentosa* Lam. IV. 127. no. 9.
— *tomentosa* Murr. IV. 127. no. 10.
— tomentosa Willd. IV. 127. no. 11.
— triloba Loureiro. IV. 130. no. 31.
— umbellata Loureiro. IV. 130. no. 30.
— velutina Prsl. VI. 692. no. 1.
— villosa Vahl. IV. 126. no. 4.
— Wallichiana Wlprs. IV. 125. no. 2.
Callichlamys Miquel. °VI. 514.
— riparia Miquel. *VI. 514. no. 1.
Callichroa Fisch. et Mey. *II. 629. II. 632. II. 990.
— angustifolia Nutt. II. 632. no. 2.
— *angustifolia* Nutt. II. 396. no. 23. II. 990. no. 1.
— *Bradburii* Nutt. II. 396. no. 24.
— Douglasii Torr. et Gr. II. 990. no. 2.
— hirsuta Nutt. II. 632. no. 1.
— *hirsuta* Nutt. II 990. no. 1.
— platyglossa Fisch. et Mey. *II. 990. no. 1.
Callicocca DC. II. 470. II. 941. no. 1.
Callicoma Adr. *II. 373. V. 828
— Billardieri D. Don. V. 828. no. 3.
— ferruginea D. Don. V. 828. no. 2.
— serratifolia Andrws. V. 828. no. 1.
Callicystus volubilis Endl. *I. 779. adn. ad no. 9.
Calligeum Fisch. et Mey. II. 47.
Calliglossa Douglasii Hook. et Arn. II. 990. no. 2.
Callilepis DC. *II. 629.
Calliopsidium Torr. et Gr. II. 982.
Calliopsis Rchb. II. 613.
Calliopsis Rchb. II. 973. II. 981.
Calliopsis Sweet. I. 458.
— *Atkinsoniana* Hook. II. 981. no. 19.
— basalis Otto et Dietr. II. 613. no. 1.
— *cardaminefolia* DC. II. 981. no. 20.
— *Drummondii* Don. II. 981. no. 17.
— *tinctoria* DC. II. 981. no. 18.
Callipeltis Stev. *II. 454.
Callirhoë digitata Nutt. I. 292. no. 7.
Callisace Fisch. *II. 413.
Callisemaea Bth. I. 802. V. 546.
— elegans Wlprs. I. 802. no. 4.
— grandiflora Bth. I. 802. no. 3.
— pubescens Bth. I. 802. no. 1. *V. 546. no. 1.
— sericea Bth. I. 802. no. 2.
— viridis Wlprs. I. 802. no. 5.
— *viridis* Wlprs. V. 546. no. 1.
Callistachya cuneifolia Sm. I. 567. no. 1.
— *Sibirica* Raf. III. 369. no. 4.
— *Virginica* Raf. III. 369. no. 3.

Callistachys Vent. I. 566. V. 423.
— carinata Meisn. V. 423. no. 1.
— linearis Bth. I. 566. no. 2.
— longifolia Paxton. *V. 423. no. 3.
— oxylobioides Meisn. V. 423. no. 2.
— parviflora Bth. I. 566. no. 3.
— sparsa A. Cunn. I. 566. no. 1.
Callistemon R. Br. II. 165. II. 923. *V. 741.
— acerosum Tausch. II. 165. no. 1.
— *capitatum* Rchb. V. 742. no. 4.
— lophanthum Sweet. *II. 165. no. 4.
— *microstachyum* Lindl. V. 741. no. 1.
— microstachyum Lindl. II. 165. no. 5.
— phoeniceum Lindl. II. 165. no. 3.
— pinifolium DC. II. 165. † *II. 923. no. 1.
Callistemoneae Schauer. II. 923. V. 741.
Callistephus Cass. *II. 577. *II. 952. no. 3.
Callisthene Mart. *II. 68.
Callistroma Fnzl. °V. 850.
— erubescens Fnzl. V. 850. no. 1.
Callithamnus Schauer. II. 930.
Callotropis tricolor G. Don. I. 672. no. 1.
Calluna Sallsb. *II. 728.
Calobota Eckl. et Zeyh. I. 607. V. 453. no. 1.
— *cytisoides* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 6.
— *pulchella* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 7.
Calobotrya sanguinea Spach. II. 360. no 32.
Calocalais DC. II. 684.
Calocephalae (Inga) Bth. V. 637.
Calocephalus R. Br. *II. 644.
Calochlamys Prsl. °VI. 691.
— capitata Prsl. VI. 691. no. 1.
Calodendron Thunb. *I. 506.
Calodonta Nutt. II. 684. VI. 327.
— Azorica Nutt. *II. 684. no. 1. VI. 327. no. 1.
Calodracon Bth. III. 792.
Calodryum Desv. I. 426.
— tubiflorum Desox. *I. 426. no. 1.
Calogyne R. Br. *VI. 394.
Calomelissa Bth. III. 729.
Calomorphe Ehrenbergiana Knze. I. 680. no. 1.
Calonyction Choisy. VI. 531.
— chenopodiifolium Martens et Galeotti. VI. 531. no. 4.
— diversifolium Hsskrl. VI. 531. no. 6.
— dubium Martens et Galleotti. VI. 531. no. 2.
— Gallottii Martens. VI. 531. no. 1.
— muricatum Martius. VI. 743.
— proximum Martens et Galeotti. VI. 531. no. 3.
— *speciosum β. muricatum* Choisy. VI. 743.
— venustum Martens et Galeotti. VI. 531. no. 5.
Calopappus Meyen. *II. 679. *II. 683. *VI. 318.
Calophaca Fisch. I. 682. II. 860.
— Hovenii Schrenk. I. 682. no. 2. *II. 860. no. 1.
— Soongarica Kar. et Kir. I. 682. no. 3. II. 860. no. 1.
— Wolgensis Fisch. I. 682. no. 1.
Calophylleae Endl. I. 396.
Calophyllum L. I. 396. II. 811.
— *Akara* Burm. V. 294. no. 1.
— *apetalum* Willd. I. 397. no. 2.
— *Augia* Steud. I. 557. no. 1.
— *Bintagor* Rxb. I. 396. no. 1.
— Blumei Wght. I. 397. no. 4.
— Brasiliense Cambess. I. 397. no. 9.
— Burmanni Wght. I. 397. no. 6.
γ bracteatum.
β. parvifolium.
— *Calaba* L. I. 397. no. 2. et 6.
— *calaboides* G. Don. I. 397. no. 2.
— *inophyllum* Blume. I. 397. no. 4.
— inophyllum L. *I. 396. no. 1.
— *longifolium* Moon. I. 397. no. 7.
— *longifolium* Wall. V. 145. no. 1.
— lucidum Bth. II. 811. no. 1.
— Moonii Wght. I. 397. no. 7.
— spurium Chois. *I. 397. no. 2.
— thuriferum Poepp. et Endl. I. 397. no. 8.
— tomentosum Wght. I. 397. no. 3.
— Walkerii Wght. I. 397. no. 5.
— *Wightianum* Wall. I. 397. no. 2.
Calophysa DC. *II. 142.
Calopogonium Desv. I. 792.
— mucunoides Desv. *I. 792. no. 1.
Caloptilium Lag. *II. 682. *VI. 321.
Calorhabdos Bth. III. 370. °III. 968. *VI. 647.
— Brunoniana Bth. III. 370. no. 1.
Calorhexia Torr. et Gr. II. 126.
Calosanthes Blume *VI. 511.
Caloseris Bth. II. 683. VI. 326.
— rupestris Bth. *II. 683. no. 1. VI. 326. no. 1.
Calosphace Bth. III. 628. VI. 662.
Calostachys Bth. III. 822. VI. 679. no. 3.
Calostelma Don. II. 519.
Calostigma Dcne. VI. 488.
— insigne Dcne. *VI. 488. no. 1.
Calothamneae Schauer. II. 928. V. 748.
Calothamnus Labill. II. 169. 930. °V. 749.
— *Baxteri* Hort. Angl. II. 165. no. 5. V. 741. no. 1.
— clavata Mackay. II. 931. no. 6.
— criocarpa Lindl. II. 161. no. 3.
— *eriocarpa* Lindl. II. 930. no. 1.

Calothamnus gracilis R. Br. II. 932. no. 13.
— Hügelii Schauer. II. 932. no. 14.
— *Knightii* Hortor. II. 931. no. 4.
— laevigata Schauer. II. 931. no. 8.
— lateralis Lindl. II. 161. no. 2. II. 932. no. 15.
— longifolia Lehm. II. 161. no. 4.
— *longifolia* Lehm. II. 932. no. 15.
— Lehmanni Schauer. II. 931. no. 9.
— planifolia Schauer. II. 161. no. 5. II. 932. no. 16.
α. angustifolia Schauer. II. 932. no. 16.
β. latifolia Schauer. II. 932. no. 16.
— Preissii Schauer. II. 931. no. 10.
— purpurea Endl. II. 161. no. 1.
— *purpurea* Endl. II. 931. no. 7.
— quadrifida R. Br. II. 161. † II. 931. no. 7.
— *quadrifida* Endl. II. 932. no. 14.
— robusta Schauer. II. 931. no. 4.
— rupestris Schauer. II. 930. no. 3.
— sanguinea Labill. II. 930. no. 1.
— Schaueri Lehm. II. 161. no. 6. II. 931. no. 11.
— schoenophylla Schauer. II. 932. no. 12.
— torulosa Schauer. II. 930. no. 2.
— villosa R. Br. II. 161. † II. 931. no. 5.
Calothyrsus Californica Spach. I. 424. no. 5.
Calotis R. Br. *II. 584. *II. 951. no. 1. VI. 125.
— erinacea Steetz. VI. 125. no. 1.
Calotropis R. Br. VI. 485.
— gigantea R. Br. *VI. 485. no. 1.
Calpurnia E. Mey. I. 806.
— intrusa E. Mey. I. 806. no. 1.
— lasiogyne E. Mey. I. 807. no. 3.
— robinioides E. Mey. I. 807. no. 4.
— sylvatica E. Mey. I. 807. no. 2.
Caltha L. I. 46. V. 6.
Caltha Ham. I. 59.
— alba Jacquem. I. 46. no. 1.
— arctica R. Br. I. 47. no. 5.
— *Bisma* Hamilt. I. 59. no. 1.
— *Codua* Hamilt. I. 59. no. 2.
— *dentata* Mühlbrg. I. 47. no. 4. δ.
— *flabellifolia* Prsh. I. 47. no. 4. δ.
— Govaniana Wall. I. 46. no. 2.
— Himalensis Don. I. 47. no. 3.
— *integerrima* Prsh. I. 47. no. 4. β.
— leptosepala DC. *I. 47. no. 6.
— *Nirbisia* Hamilt. I. 59. no. 3.
— *palustris β.* DC. I. 47. no. 4. γ.
— palustris L. *I. 47. no. 4.
δ. flabellifolia Torr. et Gr.
β. integerrima Torr. et Gr.
γ. parnassifolia Torr. et Gr.
— *parnassifolia* Raf. I. 47. no. 4. γ.
Caltha polypetala Hochstett. V. 6. no. 2.
— sagittata Cav. *V. 6. no. 1.
— *sagittata* Torr. I. 47. no. 6.
Calycadenia DC. *II. 632. II. 990. VI. 184.
— cephalotes DC. *VI. 184. no. 4.
— multiglandulosa DC. *VI. 184. no. 3.
— tenella Torr. et Gr. II. 990. no. 1. *VI. 184. no. 5.
— truncata DC. *VI. 184. no. 1.
— villosa DC. *VI. 184. no. 2.
Calycandra pinnata A. Rich. I. 855. no. 1.
CALYCANTHEAE Lindl. II. 60.
Calycanthus Lindl. II. 60.
— *ferox* Michx. II. 60. no. 1. γ.
— *fertilis* Walt. II. 60. no. 1. γ.
— *floridus* Linn. II. 60. no. 1. α.
— floridus Linn. *II. 60. no. 1.
δ. glaucus Torr. et Gr.
β. inodorus Torr. et Gr.
γ. laevigatus Torr. et Gr.
— *glaucus* Willd. II. 601. no. 1. δ.
— *inodorus* Ell. II. 60. no. 1. β.
— *laevigatus* Willd. II. 60. no. 1. γ.
— occidentalis Hook. et Arn. II. 60. no. 2.
— *sterilis* Walt. II. 60. no. 1. α.
Calycera Cav. *II. 537. VI. 87.
— ventosa Meyen. VI. 87. no. 1.
CALYCEREAE R. Br. II. 537. VI. 87.
CALYCIFLORAE DC. I. 529.
Calycinae (Crotalaria) V. 441.
Calycinae Bth. (Inga) V. 639.
Calycogonium DC. *II. 143.
Calycomis R. Br. II. 373. V. 828.
— verticillata R. Br. *II. 373. no. 1. V. 828. no. 1.
Calycomorphe Prsl. II. 853.
Calycophyllum DC. *II. 507. VI. 61.
— grandiflorum Meyen. VI. 61. no. 1.
— Stanleyanum Schmbrgk. VI. 61. no. 2.
Calycopteris floribunda Lam. II. 62. no. 1.
Calycothrix Labill. II. 157. °V. 733.
— angulata Lindl. II. 159. no. 17.
— asperula Schauer. V. 733. no. 2.
— aurea Lindl. II. 159. no. 19.
— Baueri Schauer. II. 160. no. 22.
— Billardieri Schauer. II. 158. no. 7.
— breviseta Lindl. II. 159. no. 12.
— Brownii Schauer. II. 160. no. 21.
— brunioides A. Cunn. II. 158. no. 10.
— Candolleana Schauer. II. 158. no. 6.
— conferta All. Cunn. II. 157. no. 1.
— cupressoides A. Rich. II. 158. no. 3.
— curtophylla A. Cunn. II. 158. no. 4.
— *decandra* DC. II. 158. no. 6.
— empetroides Schauer. II. 159. no. 15.
— *ericoides* A. Cunn. II. 158. no. 8.

Calycothrix exstipulata DC. II. 158. no. 2.
— flavescens A. Cunn. II. 159. no. 18.
— flavescens Schauer. *V. 733. no. 4.
— Fraseri A. Cunn. II. 159. no. 11.
— *glabra* R. Br. II. 158. no. 7.
— *glabra* Sieb. II. 158. no. 9.
— glutinosa Lindl. II. 158. no. 5.
— Lechenaultii Schauer. V. 733. no. 1.
— luteola Schauer. V. 733. no. 3.
— microphylla A. Cunn. II. 157. no. 2.
— *propinqua* A. Cunn. II. 158. no. 8
— sapphirina Lindl. II. 159. no. 16.
— scabra DC. II. 158. no. 9.
— simplex Lindl. II. 159. no. 14.
— strigosa A. Cunn. II. 160. no. 20.
— *sparsa* A. Cunn. II. 160. no. 20.
— tetragona Endl. II. 159. no. 11.
— *tetragona* Labill. II. 158. no. 7.
— *tetraptera* DC. II. 158. no. 7.
— variabilis Lindl. II. 159. no. 13.
— virgata All. Cunn. II. 158. no. 8.
Calycotome pusilla E. Mey. I. 651. no. 1. V. 454. no. 1.
Calydermos Lag. *II. 629.
Calydermos Rz. et Pav. III. 22.
— *erosus* Rz. et Pav. III. 22. no. 1.
Calylophis Berlandieri Spach. II. 79. no. 1. et no. 2.
— *Drummondiana* Spach. II. 79. no. 1. γ.
— *Nuttallii* Spach. II. 79. no. 1.
Calymnandra Torr. et Gr. *II. 600. *II. 952. no. 2. II. 973. °VI. 140.
— candida Torr. et Gr. *II. 973. no. 1. VI. 140. no. 1.
Calyplectus Endl. II. 113.
Calypso campestris Cambess. I. 402. no. 17.
— *debilis* G. Don. I. 402. no. 15.
— *erecta* G. Don. I. 402. no. 16.
— *pyriformis* G. Don. I. 402. no. 14.
— *salacioides* St. Hil. I. 402. no. 19.
— *sylvestris* Mart. I. 402. no. 18.
Calyptocarpus Lssng. *II. 622
Calyptranthes Swrtz. II. 178. V. 752.
— aromatica St. Hil. II. 178. no. 2.
— *calyptrata* Pers. II. 178. no. 6.
— caryophyllifolia Willd. II. 179. no. 10.
— caudata Gardn. V. 752. no. 2.
— *cordifolia* Moon. II. 179. no. 9.
— dichotoma Casaretto. V. 752. no. 1.
— eugenioides Cambess. II. 178. no. 1.
— glomerata Cambess. II. 178. no. 4.
— *Jambolana* Willd. II. 179. no. 10.
— obtusa Bth. II. 178. no. 6.
— ovalifolia Cambess. II. 178. no. 3.
— rigida Sm. *II. 178. no. 7.
— uniflora Spring. II. 178. no. 5.
Calyptridium Nutt. II. 239. V. 787.
— monandrum Nutt. *II. 239. no. 1. V. 787. no. 1.
Calyptrion DC. I. 223.
Calysaccion Wght. V. 145.
— longifolium Wght. V. 145. no. 1.
Calysphyrum Bnge. II. 450.
— *floridum* Bnge. II. 447. no. 4.
— floridum Bnge. II. 450. no. 2.
— pauciflorum Bnge. II. 450. no. 1.
Calystegia R. Br. VI. 541.
— pubescens Lindl. VI. 541. no. 1. VI. 744. no. 1. †
Calythrix cf. *Calycothrix*.
Calytriplex obovata Rz. et Pav. III. 282. no. 29.
Camara alia flore variegato non spinosa Plum. IV. 61. no. 12.
— *Lamii albi folio, flore misto* Dill. IV. 60. no. 4.
— *Melissae folio, flore flavo* Dill. IV. 61. no. 10.
— *trifolia purpurascente flore* Plum. IV. 62 no. 14.
Camarea Adr. Juss. V. 351.
Camarea St. Hil. °V. 349.
— affinis St. Hil. V. 349. no. 1.
— axillaris St. Hil. V. 350. no. 4.
— ericoides St. Hil. V. 351. no. 7.
— hirsuta St. Hil. V. 350. no. 2.
— linearifolia St. Hil. V. 351. no. 6.
— *phylicoides* Martius. V. 351. no. 4.
— sericea St. Hil. V. 350. no. 3.
— triphylla Adr. Juss. V. 351. no. 5.
Cambessedea Wght. et Arn. I. 556.
— *oppositifolia* Wght. et Arn. *I. 556. no. 1.
Cambessedesia crenulata DC. V. 697. no. 49.
Cambessedia DC. II. 120.
— latevenosa DC. *II. 120. no. 1.
— purpurata DC. *II. 120. no. 2
Cambodia Gutta Burm. I. 396. no. 4.
Cambogia Gutta Linn. I. 396. no. 1.
Camelina Crntz. I. 173. V. 40.
— *barbareaefolia* DC. I. 154. no. 1.
— dentata Pers. I. 173. †
— grandiflora Boiss. V. 40. no. 1.
— hispida Boiss. I. 173. no. 2.
— laxa C. A. Mey. I. 173. no. 1.
— macrocarpa Henff. I. 173. †
— microcarpa Andrz. I. 173. †
sativa Crtz. I. 173. †
Camelineae DC. I. 173. V. 40.
Camellia L. I. 375. V. 135.
— *axillaris* Rxb. II. 802. no. 2.
— caudata Wall. I. 375. no. 1.
— Japonica L. I. 375. †
β. striata Maund et Henslow. I. 375. †

Camellia Kissi Wall. I. 375. †
— reticulata Lindl. (?) I. 375. †
— Salangua Thbrg. I. 375. †
Camellieae Endl. I. 375. V. 135.
Cameraria Plum. *VI. 470.
Caminotropis E. Mey. I. 580.
Campanaria Endl. I. 14. (ex p.)
Campanula Fuchs. II. 710. VI. 383.
— Aizoon Boiss. et Sprunner. VI. 385. no. 12.
— Biebersteiniana Roem. et Schult. *VI. 383. no. 1.
β. macrantha Ldb.
— biserrata C. Koch. VI. 386. no. 17.
— cordata Tausch. VI. 387. no. 22.
— cordifolia C. Koch. VI. 387. no. 18.
— Erinus Linn. *II. 711. no. 5.
— *foliis lineari-lanceolatis serratis, caule ramosissima* Gmel. VI. 387. no. 1. *β.*
— glacialis Shuttleworth. II. 711. no. 2.
— grandis Fisch. et Mey. II. 711. no. 3.
— hispidissima Hochstett. VI. 383. no. 5.
— Hohenackeri Fisch. Mey. et Lallem. VI. 383. no. 4.
— Huminii Boiss. II. 711. †
— incanescens Boiss. VI. 383. no. 2.
— latifolia L. var. Natolica Fisch. II. 711. no. 4.
— Loefflingii Brot. II. 711. †
— michauxioides Boiss. VI. 386. no. 14.
— multicaulis Boiss. VI. 384. no. 9.
— nobilis Lindl. VI. 734.
— Olympica Boiss. VI. 386. no. 13.
— Parnassica Boiss. VI. 384. no. 6.
— Persepolitana Kotschy. VI. 384. no. 8.
— plicatula Dumort. II. 710. no. 1.
— Raveyi Boiss. VI. 385. no. 10.
— rupicola Boiss. et Sprunner. VI. 383. no. 3.
— scabrida Hochstett. VI. 387. no. 21.
— scutellata Griseb. VI. 386. no. 16.
— sessiliflora C. Koch. VI. 387. no. 19.
— sphaerothrix Griseb. VI. 386. no. 15.
— stenosiphon Boiss. VI. 384. no. 7.
— *sylvestris v. digitalis* Trag. III. 254. no. 1.
— teucrioides Boiss. VI. 385. no. 11.
— Vidalii Watson. VI. 387. no. 20.
CAMPANULACEAE DC. II. 709. VI. 381.
Campanuleae Endl. II. 710. VI. 382.
Campanumaea Blume. II. 710. *VI. 381.
— lanceolata Sieb. et Zucc. II. 710. no. 1.
Campelepis Falconer. °VI. 481.
— viminea Falconer. *VI. 481. no. 1.
Camphorata Africana umbellata frutescens Commel. IV. 158. no. 30.
Camphoromyrtus Schauer. II. 922. °V. 736.
— Brownii Schauer. *II. 922. no. 1. *V. 736. no. 1.
Camphorosma Pteranthus Sibthrp. I. 262. no. 1.
Campomanesia Rz. et Pav. II. 170. II. 932. V. 750.
— crassifolia Bth. V. 750. no. 1.
— glabra Bth. II. 170. no. 1.
— hirsuta Gardn. II. 932. no. 1.
— laurifolia Gardn. II. 932. no. 2.
Campsiandra Bth. I. 815. V. 568.
— comosa Bth. *I. 845. no. 1. V. 568. no. 1.
— laurifolia Bth. V. 568. no. 2.
— rosea Poepp. et Endl. V. 568. no. 3.
Campsoplacuntia Blume. II. 142.
Camptocarpus Dcne. *VI. 480.
Camptolobium (Genista) Spach. V. 480.
Camptoloma Bth. *VI. 645.
Camptosema Hook. et Arn. I. 764. V. 532.
— pedicellatum Bth. I. 764. no. 2.
— rubicundum Hook. et Arn. *I. 764. no. 1. V. 532. no. 1.
Campuleja Endl. III. 301.
— *coccinea* Hook. III. 300. no. 12.
Campylanthera Schott et Endl. I. 330.
— *ericoides* Lindl. II. 770. no. 1.
— *Fraseri* Hook. I. 257. no. 1.
Campylanthus Rth. III. 371. °III. 969. *VI. 649.
— salsoloides Rth. III. 371. no. 1.
Campylia DC. I. 456.
Campylia Lindl. I. 456.
— capillaris Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 97.
— cartilaginea Eckl. et Zeyh. I. 456. no. 95.
— elata Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 99.
— eriostemon Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 93.
— staticephylla Eckl. et Zeyh. I. 456. no 96.
— tricolor Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 98.
— veronicaefolia Eckl. et Zeyh. I. 456. no. 94.
Campyloclinium DC. *II. 552. II. 950. VI. 707.
— arenarium Gardn. VI. 707. no. 1.
— Surinamense Miq. II. 950. no. 1.
Campyloptera Boiss. I. 180.
— Syriaca Boiss. *I. 180. no. 1.
Campylopus E. Spach. II. 809.
— cerastioides Spach. *II. 809. no. 1.
Campylorrhyncha Wllrth. VI. 151.
Campylorutis Ser. I. 638. no. 3.
Campylosepalae Wllrth. II. 39.
Campylospermeae DC. II. 420. V. 900.
Campylostachys Kth. IV. 173.
— abbreviata E. Mey. IV. 173. no. 2.
— cernua Kth. IV. 173. no. 1.
Campylotheca Cass. II. 618.
— angustifolia Nutt. II. 618. no. 3.
— gracilis Nutt. II. 618. no. 2.
— mutica Nutt. II. 618. no. 1.

Campylotropis Bnge. I. 747. V. 527.
— Chinensis Bnge. *I. 747. no. 1. V. 527. no. 1.
Canarina Juss. *II. 710. *VI. 381.
Canarium Linn. I. 558. II. 830.
— altissimum Blume. I. 559. no. 6.
— asperum Bth. II. 830. no. 1.
— commune L. *I. 558. no. 1.
— denticulatum Blume. I. 559. no. 4.
— hispidum Blume. I. 559. no. 5.
β. scabrum Blume.
— laxiflorum Dcne. I. 559. no. 3.
— littorale Blume. I. 559. no. 7.
— *Mehenbetne* Gaertn. I. 558. no. 1.
— strictum Rxb. I. 558. no. 2. (III. Emend. p. 3.)
Canavalia DC. I. 765. II. 900. V. 534.
— *Baueriana* Endl. I. 766. no. 8.
— *Bonariensis* Lindl. I. 766. no. 6.
— Brasiliensis Mart. I. 766. no. 9.
— cryptodon Meisn. V. 534. no. 1.
— *emarginata* Don. I. 766. no. 8.
— emarginata G. Don. II. 900. no. 1.
— ensiformis DC. *II. 900. no. 3.
— galeata Gaudich. I. 766. no. 13.
— *gladiata β.* DC. I. 766. no. 10.
— grandiflora Bth. I. 765. no. 1.
— lenta Bth. I. 766. no. 3.
— Loureirii G. Don. II. 900. no. 2.
— *miniata* DC. I. 766. no. 8.
— mollis Wall. I. 766. no. 11.
— monodon E. Mey. I. 766. no. 7.
— multiflora Hook. et Arn. I. 766. no. 14.
— obtusifolia DC. *I. 766. no. 8.
— Paranensis Hook. et Arn. I. 766. no. 6.
— picta Mart. I. 766. no. 2.
— pubescens Hook. et Arn. I. 766. no. 12.
— *rosea* DC. I. 766. no. 8.
— rostrata Bth. I. 766. no. 5.
— *rutilans* DC. I. 766. no. 8.
— villosa Bth. I. 766. no. 4.
— virosa Wght. et Arn. I. 766. no. 10.
Cancrinia Karel. et Kiril. II. 627. °VI. 178.
— chrysocephala Karel. et Kiril. *II. 627. no. 1. *VI. 178. no. 1.
Candelabria Hochstett. II. 828. °V. 407. (V. 771. observ.)
— micrantha Hochstett. *II. 828. no. 1. *V. 407. no. 1.
Candollea Labill. I. 64. V. 11.
— assimilis Steudel. V. 11. no. 1.
— calycina Steudel. V. 12. no. 4.
— cuneiformis Lab. I. 35. †
— Cunninghami Bth. I. 64. no. 1.
— cygnorum Steudel. V. 12. no. 9.
— exasperata Steudel. V. 13. no. 11.
Candollea glaberrima Steudel. V. 12. no. 5.
— Hügelii Endl. I. 65. no. 2.
— latifolia Steudel. V. 11. no. 2.
— parviflora Steudel. V. 12. no. 10.
— Preissiana Steudel. V. 12. no. 3.
— racemosa Endl. I. 65. no. 3.
— rupestris Steudel. V. 12. no. 7.
— striata Steudel. V. 12. no. 8.
— subvaginata Steudel. V. 12. no. 6.
— tetrandra Lindl. I. 65. no. 4. V. 13. †
Canella P. Br. *I. 398.
— *axillaris* Nees et Mart. I. 398. no. 1.
Canellaceae Endl. I. 398.
Canephora Juss. *II. 513.
Canina G. Don. (Scrophularia) III. 174.
Canscora Lam. *VI. 502.
— *pusilla* Roem. et Schult. VI. 502. no. 1.
Cansjera Lam. II. 803. V. 137.
— lanceolata Bth. V. 137. no. 2.
— leptostachya Bth. V. 137. no. 3.
— *Malabarica* Lam. II. 803. no. 1. V. 137. no. 1.
— *Martabanica* Wall. V. 137. no. 1.
— *Rheedei* Gmel. II. 803. no. 1. V. 137. no. 1.
— scandens Rxb. *II. 803. no. 1. V. 137. no. 1.
Cantharospermum Wght. et Arn. I. 783.
— albicans Wght. et Arn. I. 783. no. 2.
— pauciflorum Wght. et Arn. *I. 783. no. 1.
Canthium DC. II. 484. VI. 47.
Canthium Linn. II. 484. VI. 47.
— *corymbosum* Pers. II. 517. no. 4.
— *cymosum* Pers. II. 484. no. 1.
— didymum Gaertn. *II. 484. no. 1. (c. varr. α. et β. ibid.)
— lanceolatum Arn. VI. 47. no. 1.
— Lechenaultii Wght. et Arn. II. 484. no. 3.
— lucidum Hook. et Arn. II. 485. no. 6.
— obovatum Kltzsch. II. 485. no. 4.
— pyrifolium Kltzsch. II. 485. no. 5.
— Rheedei DC. *II. 484. no. 2. (c. varr. α. β. γ. ibid.)
— *thyrsoideum* Roem. et Schult. II. 504. no. 1.
— violaceum Zolling. et Moritzi. VI. 700.
Cantua Juss. *VI. 527.
— *foetida* Pers. III. 123. no. 1.
— *ligustrifolia* Juss. III. 123. no. 1.
Capellia Blume. I. 63.
— multiflora Blume. I. 63. no. 1.
Capenses DC. (Malva) I. 294.
Capitão do mato V. 765. no. 2.
Capitellatae (Psychotria) DC. II. 474. no. 32.
Capnites DC. I. 118. I. 119. I. 121.
Capnitis E. Mey. II. 837. V. 458.
— *clandestina* E. Mey. I. 623. no. 5. V. 458. no. 34.

Capnitis porrecta E. Mey. I. 623. no. 4. V. 458. no. 33.
Capnogorium nobile Bernhardi. I. 123. no. 8.
Capnoides DC. I. 119. II. 750. no. 1.
Capnophyllum Gaertn. *II. 414.
Capnos tenuifolia Clus. V. 26. no. 1.
Capo Molago Rheede. III. 34. adn. no. 1.
Cappareae DC. I. 196. V. 53.
CAPPARIDEAE Juss. I. 193. II. 764. V. 52.
Capparis L. I. 197. II. 765. V. 54.
Capparis L. I. 197. (ex p.)
— ......? I. 201. †
— acuminata Lindl. I. 198. no. 11.
— *acuminata* Willd. I. 198. no. 15.
— *Aguba* Rxb. I. 199. no. 24.
— asperifolia Prsl. I. 200. no. 31.
— aurantioides Prsl. I. 198. no. 13.
— brevipes Bth. V. 54. no. 4.
— brevispina DC. *I. 198. no. 7. (c. varr. α. β. γ.)
— *Breynia* L. I. 201. no. 7.
— callosa Blume. I. 199. no. 19.
— calophylla Blume. I. 199. no. 20.
— cartilaginea Dcne. I. 198. no. 6.
— chrysomeja Bojer. V. 54. no. 3.
— *comosa* Jcq. I. 201. no. 5.
— *Cynophallophora* Jcq. I. 201. no. 2.
— Cynophallophora L. I. 201. †
— *Cynophallophora* Vellozo. I. 200. no. 39.
— declinata Vellozo. I. 200. no. 35.
— disperma Rxb. I. 199. no. 23. (III. Emend. p. 1.)
— diversifolia Wght. et Arn. I. 199. no. 28.
— elegans Mart. I. 201. no. 41.
— emarginata Prsl. I. 198. no. 12.
— emarginata A. Rich. I. 201. no. 43.
— *Eustachiana* Jcq. I. 201. no. 4.
— *flexuosa* Auct. I. 201. no. 2.
— flexuosa Vellozo. I. 200. no. 40.
— *floribunda* Lepr. I. 197. no. 1.
— floribunda Wght. I. 199. no. 29.
— foetida Blume. I. 199. no. 18.
— *frondosa* L. I. 201. no. 1.
— galeata Fres. I. 198. no. 5.
— *grandis* Klein. I. 199. no. 23.
— grandis L. *I. 199. no. 27.
— *grandis* Moon. I. 200. no. 30.
— herbacea W. I. 201. †
— *heteroclita* Rxb. I. 197. no. 2. β.
— Heyneana Wall. I. 198. no. 9. (III. Emend. p. 1.)
— *horrida* Bnks. I. 198. no. 10. α.
— *horrida* L. I. 198. no. 15.
— horrida Linn. *II. 765. no. 5.
— hypericoides Hochstett. V. 54. no. 1.
— hypoleuca Prsl. I. 200. no. 33.
— incanescens DC. *I. 199. no. 25.
— Karwinskiana Schlchtd. I. 200. no. 34.
— lactevirens Mart. I. 200. no. 38.
— laevigata Mart. I. 200. no. 36.
— *linearis* L. I. 201. no. 6.
— lineata Domb. *I. 201. no. 42.
— *linifolia* Rxb. I. 196. no. 1.
— *maxima* Rth. I. 199. no. 27.
— *maxima* Rxb. I. 199. no. 23.
— Mitchellii Lindl. II. 765. no. 4.
— Moonii Wght. I. 199. no. 30.
— mucronifolia Boiss. II. 765. no. 2.
— Murrayana Grah. II. 765. no. 1.
— nigricans Spanoghe. I. 199. no. 22.
— *obovata* Hamilt. I. 199. no. 27.
— obovata Royle. I. 198. no. 14.
— parviflora Boiss. II. 765. no. 3.
— pauciflora Prsl. I. 200. no. 32.
— pedunculosa Wall. I. 199. no. 26.
— pluvialis Mart. I. 200. no. 37.
— polymorpha A. Rich. I. 197. no. 1.
— pyracantha Bojer. V. 54. no. 2.
— *pyrifolia* β. Lam. I. 198. no. 15.
— *quadriflora* DC. I. 198. no. 15.
— *racemifera* DC. I. 199. no. 27.
— reflexa Thonn. et Schum. I. 197. no. 3.
— *rotundifolia* Rottl. I. 198. no. 7. γ.
— Roxburghii DC. *I. 199. no. 24.
— rupestris Sibthrp. et Sm. I. 201. †
— Salaccensis Blume. I. 199. no. 21.
— Sandwicensis DC. V. 54. †
— *scandens* Vellozo. I. 201. no. 42.
— sepiaria L. I. 201. †
— Sinclairii Bth. V. 54. no. 5.
— *solanoides* Bojer. V. 54. no. 3.
— spinosa L. I. 201. †
— stylosa DC. *I. 198. no. 10. (c. varr. α. et β.)
— *stylosa β. velutina* DC. I. 199. no. 25.
— subcordata Spanoghe. I. 199. no. 17.
— *tenuisiliqua* Jcq. I. 201. no. 8.
— *terniflora* DC. I. 198. no. 15.
— Thonningii Schum. I. 197. no. 2.
— trapeziflora Spanoghe. I. 198. no. 16.
— undulata Zeyh. I. 197. no. 4.
— Velloziana Mart. I. 200. no. 39.
— *verrucosa* Jcq. I. 201. no. 3.
— Wallichiana Wght. et Arn. I. 198. no. 8.
— *Wightiana* Wall. I. 198. no. 7. γ.
— *Yco* Mart. I. 197. no. 1.
— Zeylanica L. *I. 198. no. 15.
Capraria Linn. III. 263. °III. 962. VI. 645.
— *Arabica* Steudel et Hochstett. III. 284. no. 1.
— biflora Linn. III. 263. no. 2.
— *crustacea* Linn. III. 292. no. 4.
— *Curassavica* Herm. III. 263. no. 2.

Capraria diffusa Rxb. III. 273. no. 12.
— *dissecta* Delile. III. 271. no. 3.
— *durantifolia* Linn. III. 269. no. 26.
— *gratioloides* Linn. III. 297. no. 1.
— *gratissima* Rxb. III. 273. no. 9.
— hirsuta H. B. Kth. III. 263. no. 1.
— humilis Ait. III. 264. no 4.
— integrifolia Martens et Galeotti. VI. 645. no. 1.
— *lanceolata* Linn. III. 263. no. 1.
— *lucida* Ait. III. 263. no. 1.
— *Monnieria* Rxb. III. 282. no. 29.
— *multifida* Michx. III. 271. no. 2.
— *Peruviana* Feuill. III. 264. no. 1.
— *rigida* Thnbrg. III. 263. no. 5.
— *salicifolia* Lnk. et Otto. III. 263. no. 1.
— *saxifragaefolia* Schlchtd. et Cham. III. 264. no. 1.
— semiserrata Vahl. III. 264. no. 3.
— *undulata* Linn. III. 263. no. 4.
CAPRIFOLIACEAE A. Rich. II. 446. VI. 3.
Caprifolium Juss. II. 447.
— *bracteosum* Michx. II. 447. no. 4.
— *ciliosum* Dougl. II. 448. no. 10.
— *dioicum* Roem. et Schult. II. 447. no. 4.
— *Douglasii* Lindl. II. 448. no. 4.
— *glaucum* Mnch. II. 447. no. 4.
— *hispidulum* Lindl. II. 448. no. 6.
— *occidentale* Lindl. II. 448. no. 10.
— *parviflorum* Prsh. II. 447. no. 4.
— *parviflorum* Richards. II. 448. no. 4.
— *pubescens* Goldie. II. 447. no. 3.
Caprinae DC. (Oxalis) I. 477.
Caprini DC. (Astralagus) I. 708. II. 876.
Caproxylon Hedwigii Tussac. I. 559. no. 1.
Capsella Vent. I. 174. II. 761.
— bursa pastoris Vent. I. 175. †
— divaricata Wlprs. I. 175. no. 2.
— elliptica C. A. Meyer. * I. 174. no. 1.
— erecta Wlprs. I. 175. no. 3.
— grandiflora Boiss. II. 761. no. 1.
— pauciflora Koch. I. 175. †
— procumbens C. A. Mey. I. 175. †
Capsicum Tournef. III. 32. °III. 954. VI. 581.
— *Africanum* Mill. III. 36. no. 21. *β.*
— *aggregatum* Willd. III. 37. no. 5.
— *Americanum latifolium* Miller. III. 37. no. 3.
— angulosum Miller. III. 36. no. 21.
β. conicum Fngrht.
γ. ovale Fngrht.
— *annuum* Guimpel et Schlchtd. III. 36. no. 17. *β.*
— annuum Linn. III. 32. no. 1.
ζ. abbreviatum Fnghrt. III. 33. no. 1.
γ. acuminatum Fngrht. III. 33. no. 1.
η. olivaeforme Fngrht. } III. 33. no. 1.
ε. ovoideum Fngrht. } III. 33. no. 1.
β. rugulosum Fngrht. } III. 33. no. 1.
δ. subangulosum Fngrht. } III. 33. no. 1.
Capsicum annuum Roem. et Schult. III. 33. no. 1. *η.*
— *annuum* Willd. III. 36. no. 17.
— *baccatum* Hb. Hamilt. III. 34. adn. no. 2.
— *baccatum* Kth. III. 34. no. 7.
— baccatum Linn. III. 34. no. 8.
— *baccatum* Rodsch. III. 35. no. 10.
— bicolor Jcq. III. 33. no. 4.
β. purpureum Fngrht.
— *brevioribus siliquis* Lobel. III. 34. no. 8.
— campylopodium Sendtner. VI. 581. no. 3.
— *cerasi* Poir. III. 34. adn. no. 3.
— *cerasiforme* Mill. III. 35. no. 12.
— cerasiforme Willd. III. 35. no. 11.
β. minus Fngrht.
— *cerasiforme β. macrocarpum* Besser. III. 33. no. 2.
— ceratocarpum Fngrht. III. 35. no. 15.
— cereolum Bertoloni. III. 38. no. 8.
— Chamaecerasus N. ab E. III. 34. adn. no. 3.
— *ciliare* Willd. III. 34. no. 9.
— *coerulescens* Besser. III. 37. no. 6.
— *conicum* Lam. III. 33. no. 2.
— conicum Meyer. III. 34. no. 5.
— conoides Miller. III. 33. no. 2.
γ. chordale Fngrht.
β. sulcatum Fngrht.
— *cordatum* Camerar. III. 37. no. 24.
— cordiforme Miller. III. 37. no. 24.
ζ. globosum Fngrht.
γ. majus Fngrht.
δ. minus Fngrht.
ε. olivaeforme Fngrht.
β. subangulosum Fngrht.
— Cumanense Fngrht. III. 34. no. 7.
— *erectum var. annui* Mart. 333. no. 2.
— fastigiatum Blume. III. 34. adn. no. 2.
— flexuosum Sendtner. VI. 581. no. 1.
— *fructu conico oblongo majori* P. Brwn. III. 33. no. 1.
— *fructu non acri rugoso longo pendente rubro* Miller. III. 37. no. 2.
— *fructu surrecto oblongo* Tournef. III. 33. no. 1.
— frutescens Linn. III. 34. adn. no. 1.
— *frutescens* Linn. III. 34. adn. no. 2. III. 34. no. 6.
— frutescens Willd. III. 34. no. 6.
β. minus Fngrht.
— globiferum Meyer. III. 35. no. 10.
— grossum Willd. III. 35. no. 14.
δ. angulosum Fngrht.

γ. cordatum Fngrht.
α. ovatum Fngrht.
α. pomiforme Fngrht.
Capsicum grossum β. Schult. III. 36. no. 18.
α. *globosum* Bess. III. 35. no. 14. α.
β. *luteum* Bess. III. 35. no. 14. β.
— Hamiltonii G. Don. III. 38. no. 9.
— *Havanense* H. B. Kth. III. 36. no. 18. β.
— *Indicum cordatum oblongum* Bessl. III. 37. no. 24. γ.
— *latum* Fchs. III. 37. no. 24.
— longum DC. III. 35. no. 17.
β. incrassatum | Fngrht. III. 36. no. 17.
γ. latum |
δ. rectum |
— luteum Lam. III. 36. no. 19.
— *majus rubrum* Rmph. III. 34. no. 6.
— microcarpum DC. III. 34. no. 9.
— Milleri Roem. et Schult. III. 35. no. 12.
— *minimis siliquis* Dodon. III. 34. no. 8.
— *minimum* Rxb. III. 34. adn. no. 2.
— *minus flavum* Rmph. III. 33. no. 3.
— *minus fructu parvo pyramidali erecto* Sloane. III. 33. no. 2.
— *minus rubrum et flavum* Rmph. III. 34. adn. no. 1.
— mirabile Martius. VI. 582. no. 4.
β. grandiflorum Sendtner.
— *nigrum* Willd. III. 34. no. 4.
— *olivaeforme* Roem. et Schult? III. 33. no. 1. η.
— ovatum DC. III. 36. no. 22.
— parvifolium Sendtner. VI. 582. no. 6.
— pendulum Willd. III. 36. no. 18.
β. minus Fngrht.
γ. torulosum Fngrht.
— *purpureum* Wall. III. 34. adn. no. 3.
— pyramidale Miller. III. 33. no. 3.
β. torulosum Fngrht.
— *Quitense* Willd. III. 37. no. 4.
— Rabenii Sendtner. VI. 682. no. 7.
— *recurvis siliquis* Dodon. III. 36. no. 17.
— *rubrum minimum* Rmph. III. 34. no. 6. β.
— *rubrum minus* Rmph. III. 36. no. 18. γ.
— Schottianum Sendtner. VI. 581. no. 2. c. var. β. ibid.
— *siliqua olivaeformi* Tournef. III. 37. no. 24. ε.
— *siliquis longis propendentibus* Tournef. III. 36. no. 17. β.
— Sinense Jcq. III. 36. no. 20. (nec 21.)
— sphaericum Willd. III. 37. no. 23.
— strictum Fngrht. III. 35. no. 13.
— tetragonum Miller. III. 37. no. 25.
— *torulosum* Hort. III. 33. no. 3. β.
— *Tournefortii* Bess. III. 36. no. 21.
Capsicum toxicarium Poepp. III. 37. no. 7.
— villosum Sendtner. VI. 582. no. 5.
β. latifolium.
γ. muticum.
— *violaceum* Dsf. III. 38. no. 9.
— *violaceum* Hort. Madrit. III. 34. no. 4.
— violaceum H. B. Kth. III. 35. no. 16.
Caragana Lam. I. 681. II. 858.
— *Altagana* Poir. II. 858. no. 1.
— arborescens Lam. *II. 858. no. 2.
— brevispina Royle. I. 681. no. 3.
— Bungei Ledeb. I. 681. no. 1.
— *digitata* Lam. II. 858. no. 3.
— frutescens DC. I. 681. † *II. 858. no. 3.
β. mollis DC. II. 858. no. 3.
— *frutescens γ. mollis* DC. II. 858. no. 3.
— *fruticosa* Bess. II. 858. no. 2. β.
— Gerardiana Royle. I. 681. no. 4.
— *mollis* Bess. II. 858. no. 3. β.
— Moorkroftiana Bth. I. 681. no. 2.
— microphylla Lam. *II. 858. no. 1.
— parvifolia Hffmsgg. I. 681. no. 8.
— polyacantha Royle. I. 681. no. 5.
— Redowskii DC. II. 859. no. 5.
— spinosissima Bth. I. 681. no. 6.
— tenuis Hffmsgg. I. 681. no. 9.
— *tragacanthoides* Ldb. II. 858. no. 4. β.
— tragacanthoides Poir. *II. 858. no. 4.
β. Bongardiana Fisch. et Mey.
γ. leucophylla Fisch. et Mey.
α. Pallasiana Fisch. et Mey.
— versicolor Bth. I. 681. no. 7.
Caraipa Aubl. I. 374. II. 802.
— densifolia Mart. et Zucc. I. 374. no. 3.
— glabrata Mart. et Zucc. I. 374. no. 2.
— grandifolia Mart. et Zucc. I. 374. no. 4.
— laxiflora Bth. II. 802. no. 1.
— leiantha Bth. II. 802. no. 2.
— paniculata Mart. et Zucc. I. 374. no. 1.
Carallia Rxb. II. 71.
— corymbosa Wght. II. 71. no. 2.
— *obcordata* Wght. II. 71. no. 1.
— Sinensis Arn. *II. 71. no. 3.
— Zeylanica Arn. II. 71. no. 1
Caralluma R. Br. *VI. 494.
Caranga amara Vahl. III. 284. no. 1.
Caranosi Rheede. IV. 83. no. 5.
Carapa Aubl. I. 435. II. 817.
— cauliflora Poepp. et Endl. II. 817. no. 2.
— Guianensis Aubl. *I. 435. no. 1.
— *Moluccensis* Lam. I. 435. no. 1.
— *obovata* Blume. I. 435. no. 2.
— sericea Poepp. et Endl. II. 817. no. 1.
— Touloucouma Guill. et Perr. I. 435. no. 2.
Carapichea Aubl. *II. 470.
Cardamine L. I. 135. II. 757. V. 35.

Cardamine affinis Hook. et Arn. I. 137. no. 24.
— alpina L. I. 137. †
— amara L. I. 137. †
β. Opizii Prsl. I. 137. †
— angulata Hook. I. 136. no. 18.
β. alba.
— *articulata* Prsh. I. 134. no. 1.
— asarifolia L. I. 137. †
— *bellidifolia* Cham. et Schlchtd. II. 757. no. 1.
— bellidifolia L. *I. 135. no. 2.
— Bocconi Viv. I. 135. no. 1.
— Borbonica Pers. *I. 135. no. 4.
— *Boryi* Boiss. I. 130. no. 5.
— *Burchtormensis* W. I. 135. no. 8.
— caldeirarum Guthnik. V. 35. no. 1.
— carnosa W. K. I. 137. †
— chelidonia L. I. 137. †
— chenopodiifolia Pers. I. 137. †
— corymbosa Hook. fil. V. 35. no. 2.
— debilis Bnks. I. 136. no. 15.
— *debilis* Don. I. 135. no. 6.
— dentata Schult. *I. 135. no. 8.
— depressa Hook. fil. V. 35. no. 3.
β. acaulis.
— dictyosperma Hook. I. 135. no. 10.
— flaccida Cham. et Schlchtd. I. 137. no. 22.
— granulosa All. I. 137. †
— Hamiltonii Don. I. 135. no. 6.
— *heterophylla* Bory. I. 130. no. 5.
— heterophylla Hook. I. 136. no. 13.
— Hilariana Wlprs. I. 137. no. 26.
— hirsuta L. *I. 136. no. 19. I. 137. †
α. acuminata } Nutt. I. 136. no. 19.
β. parviflora } Nutt. I. 136. no. 19.
γ. Virginica } Nutt. I. 136. no. 19.
— Impatiens L. I. 137. †
— intermedia Hook. I. 136. no. 14.
— *Lenensis* Andrz. I. 135. no. 2.
— Lenensis Andrz. II. 757. no. 1.
— Ludowiciana Hook. I. 136. no. 21.
— *Ludowiciana* Hook. V. 34. no. 1.
— lyrata Bnge. I. 135. no. 9.
— *macrophylla* W. I. 138. no. 2.
— macrophylla Willd. I. 137. †
— maritima Prtnschlg. I. 137. †
—? *Menziesii* DC. I. 166. no. 27. *a*.
— *nasturtioides* Cambess. I. 137. no. 26.
— nasturtioides D. Don. I. 135. no. 3.
— nivalis Gill. I. 137. no. 23.
— nivea Hook. I. 136. no. 20.
— oligosperma Nutt. I. 136. no. 20.
— oxycarpa Boiss. I. 135. no. 7.
— parviflora L. 137. †
— *Pennsylvanica* Mühlb. I. 136. no. 19.
— *polyphylla* D. Don. I. 138. no. 5.
Cardamine pratensis β. DC. I. 135. no. 8.
— pratensis L. I. 137. † c. var. *β*. et *γ*.
— purpurea Cham. et Schlchtd. I. 136. no. 17.
— *resedaefolia* Durieu. I. 130. no. 5.
— resedaefolia L. I. 137. †
— *rhomboidea* DC. I. 136. no. 16. *a*.
— rotundifolia Michx. I. 136. no. 16.
— setigera Tausch. I. 137. no. 27.
— stellata Hook. fil. V. 36. no. 4.
— *sylvatica* Bess. I. 135. no. 8.
— sylvatica L. I. 137. †
— tenera Gmelin. I. 135. no. 5.
— tenuifolia Hook. I. 136. no. 11.
— tenuifolia Turcz. II. 757. no. 2.
— tenuirostris Hook. I. 137. no. 25.
— thalictroides All. I. 137. †
— trifolia L. I. 137. †
— *uliginosa* M. B. I. 135. no. 8.
— *uniflora* Leavenw. I. 139. no. 1.
— *uniflora* Michx. I. 139. no. 2.
— *Virginica* L. I. 136. no. 19. *γ*.
— *Virginica* Mühlb. I. 137. no. 21.
— *Wightiana* Wall. I. 135. no. 4.
Cardamon DC. I. 177. V. 43. no. 6.
Cardaria DC. I. 176.
Cardaria Draba Rchb. I. 178. †
Cardiaca Moench. III. 810.
— *arvensis* Lam. III. 831. no. 65.
— *crispa* Moench. III. 811. no. 3. *γ*.
— *Marrubiastrum* Schreb. III. 811. no. 6.
— *sylvatica* Lam. III. 807. no. 25.
— *trilobata* Lam. III. 811. no. 3.
— *vulgaris* Moench. III. 811. no. 3.
Cardiandra Sieb. et Zucc. II. 377. V. 835.
— alternifolia Sieb. et Zucc. *II. 377. no. 1. V. 835. no. 1.
Cardiolophus Griff. *III. 437. *VI. 655.
Cardiomyrtus Schauer. V. 737.
Cardionema DC. I. 261.
Cardiopetalum Schlchtd. *I. 91.
— *calophyllum* Schlchtd. I. 86. no. 8.
Cardiophora Bth. II. 830. °V. 417.
— Hindsii Bth. II. 830. no. 1. V. 418. no. 1.
Cardiophylli (Leucopogon) VI. 427.
Cardiospermum L. I. 411. II. 843. V. 358.
— acuminatum Miquel. V. 358. no. 2.
— altissimum Poepp. et Endl. II. 843. no. 1.
— anomalum Cambess. I. 411. no. 6.
— canescens Wall. I. 411. no. 1.
— corycodes Knze. V. 358. no. 1.
— Douarteanum Cambess. I. 411. no. 4.
— ferrugineum A. Rich. II. 843. no. 2.
— Halicacabum L. V. 359. †
— parviflorum Cambess. I. 411. no. 5.
— tortuosum Bth. V. 359. no. 3.
— velutinum Hook. et Arn. I. 411. no. 3.

Cardiospermum villosum Macfd. I. 411. no. 2.
Cardiotheca pubescens Ehrnbrg. III. 187. no. 6.
Cardopateae Lssng. II. 667. VI. 729.
Cardopatium Juss. *II. 667. °VI. 729.
— amethystinum Spach. VI. 731. no. 3.
— Apulum Spach. VI. 731. no. 2.
— Billardieri Spach. VI. 731. no. 6.
— Boryi Spach. VI. 731. no. 5.
— *corymbosum* DC. VI. 731. no. 1. VI. 731. no. 5.
— *corymbosum* Pers. VI. 731. no. 1.
— *corymbosum* Tenore. VI. 731. no. 2.
— Fontanesii Spach. VI. 731. no. 4.
— orientale Spach. VI. 731. no. 1.
Carduineae DC. II. 673. VI. 303.
Carduncellus Adans II. 672.
— araneosus Boiss. et Reut. II. 672. no. 2.
— Dianius B. Webb. II. 672. no. 1.
— Hispanicus Boiss. *II. 672. no. 3.
Carduus Grtnr. II. 673. VI. 304.
— ....? Shuttleworth. II. 674. no. 5.
— armatus Boiss. VI. 304. no. 4.
— cernuus Bertol. II. 673. no. 4.
— Cronius Boiss. VI. 305. no. 5.
— *discolor* Hook. II. 675. no. 9.
— *glaber* Nutt. II. 675. no. 11. *β.*
— laciniatus Ldb. VI. 304. no. 3.
— leptacanthus Fresen. II. 673. no. 2.
— nervosus C. Koch. II. 673. no. 1. *β.* humilis.
— occidentalis Nutt. II. 673. no. 3.
— onopordoides Fisch. *VI. 304. no. 1. *β.* Scardicus Griseb.
— *pumilus* Hook. II. 675. no. 13.
— Tmoleus Boiss. VI. 304. no. 2.
— *undulatus* Nutt. II. 675. no. 8.
Carelia Less. *II. 548.
Careya Rxb. II. 192.
— arborea Rxb. II. 192. †
— herbacea Rxb. II. 192. †
— sphaerica Rxb. II. 192. no. 1.
Cargillia R. Br. *VI. 457.
Carica Linn. II. 205.
— citriformis Jcq. II. 205. †
— heterophylla Poepp. et Endl. II. 205. no. 2.
— Papaya Linn. *II. 205. no. 1.
— peltata Hook. et Arn. II. 205. no. 3.
Carinaria Miquel. V. 386. no. 2.
Cariniana Casaretto. °V. 757.
— Brasiliensis Casaretto. V. 757. no. 1.
— excelsa Casaretto. V. 757. no. 2.
Carissa Linn. VI. 466.
— oblongifolia Hochstett. VI. 466. no. 1.
Carisseae Alph. DC. VI. 465.
Carlina Tournef. *II. 669. VI. 283.
Carlina frigida Boiss. et Heldreich. VI. 283. no. 1.
— salicifolia Cav. VI. 284. †
— xeranthemoides Linn. fil. VI. 284. †
Carlineae Cass. II. 668. VI. 282.
Carmelia DC. *II. 416.
Carmelita Gay. *II. 680. *VI. 314.
Carmichaelia R. Br. I. 684.
— australis R. Br. *I. 684. no. 1.
Carminatia Moç. *II. 549.
Caroides DC. II. 394. V. 853. no. 1.
Carolinea L. I. 329. V. 95.
— *alba* Lodd. I. 929. no. 7.
— *insignis* Hortor. II. 431. no. 2.
— *macrocarpa* Cham. et Schlchtd. I. 329. no. 1.
— *tomentosa* Mart. I. 329. no. 2.
Caroselinum Griseb. °V. 880.
— Chabraei Griseb. V. 880. no. 2.
— distans Griseb. V. 880. no. 1.
Carola DC. II. 419. II. 939.
Carpesium Linn. *II. 650.
Carphalea Juss. *II. 504.
Carphephorus Cass. II. 551. VI. 107.
— bellidifolius Torr. et Gr. *II. 551. no. 3.
— corymbosus Torr. et Gr. II. 551. no. 4.
— junceus Bth. VI. 107. no. 1.
— Pseudo-liatris Cass. *II. 551. no. 1. (c. var. *β.* ibid.)
— tomentosus Torr. et Gr. *II. 551. no. 2.
Carphopappus C. H. Schultz. *II. 954. °II. 973.
— baccharidifolius C. H. Schultz. *II. 974. no. 1.
Carpoceras DC. I. 155. no. 3. (?)
Carpodetus Forst. I. 538. II. 380. II. 828. V. 837.
— serratus Forst. *I. 538. no. 1. *II. 380. no. 1. *II. 828. no. 1. V. 837. no. 1.
Carpodinus R. Br. *VI. 466.
Carpodontos Labill. I. 366.
Carpolobia G. Don. I. 247.
— alba G. Don. I. 247. no. 4.
— dubia G. Don. I. 247. no. 2.
— lutea G. Don. I. 247. no. 3.
— versicolor G. Don. I. 247. no. 1.
Carponema DC. I. 190.
— aggregatum Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 2.
— filiforme Eckl. et Zeyh. *I. 190. no. 1.
Carpopodium DC. I. 192.
Carpopodium DC. II. 761. no. 2.
— carnosum Eckl. et Zeyh. *I. 192. no. 25.
— cleomoides Eckl. et Zeyh. *I. 192. no. 26.
— Thunbergii Eckl. et Zeyh. *I. 192. no. 27.
Carpopogon Rxb. I. 767.
— *atropurpureum* Rxb. I. 767. no. 2.
— *giganteum* Rxb. I. 767. no. 4.

Carpopogon monospermum Rxb. I. 767. no. 1.
— *pruriens* Rxb. I. 767. no. 7.
Carporhalis lanceolata E. Mey. VI. 47. no. 1.
Carpotroche Endl. I. 203. V. 55.
— denticulata Bth. I. 203. no. 3.
— laxiflora Bth. I. 203. no. 2.
— longifolia Poepp. et Endl. V. 55. no. 1.
— paludosa Bth. I. 203. no. 1.
Carrichtera DC. *I. 188.
Carthameae DC. II. 672. VI. 302.
Carthamus Tournef. *II. 672.
— *aculeatus Carlinae folio etc.* Tournef. VI. 731. no. 1.
— *corymbosus* Bory et Chaub. VI. 731. no. 5.
— *corymbosus* Dsf. VI. 731. no. 4.
— *corymbosus* Linn. VI. 731. no. 1.
— *corymbosus* d'Urv. VI. 731. no. 1.
Carum Koch. II. 393. V. 850.
— Armenum Boiss. V. 850.
—? apiculatum Karel. et Kiril. II. 393. no. 4.
— atrosanguineum Karel. et Kiril. II. 393. no. 2.
— Buriaticum Turczan. V. 851. no. 2.
—? daucoides Boiss. V. 851. no. 5.
— divaricatum Koch. V. 852. no. 6.
— elegans Fzl. II. 393. no. 3.
— gracile Lindl. II. 393. no. 7.
— incrassatum Boiss. II. 393. no. 1.
— *lutescens* Turczan. V. 866. no. 2.
— microcarpum Boiss. V. 851. no. 3.
— Persicum Boiss. V. 851. no. 4.
— setaceum Schrenk. II 393. no. 5.
— trichophyllum Schrenk. II. 393. no. 6.
Carusia Martius. V. 178.
— *sphaerocarpa* Martius. V. 178. no. 2.
Carvi DC. II. 393. V. 850.
Caryocar L. I. 410. V. 358.
— amygdaliforme Rz. et Pav. I. 410. no. 2.
— Brasiliense Cambess. I. 410. no. 1.
— edule Casaretto. V. 358. no. 2.
— nuciferum L. *I. 410. no. 3. *V. 358. no. 1.
Caryolobis Indica Grtnr. V. 121. no. 2.
Caryolopha Fisch. et Mey. *VI. 559.
Caryophyllastrum Ser. II. 46. V. 657.
Caryophyllata Ser. II. 47.
— *foliis olatis* Feuillée. II. 47. no. 6.
CARYOPHYLLEAE DC. I. 260. V. 74.
CARYOPHYLLEAE Fnzl. I. 260. II. 770. V. 74.
CARYOPHYLLEAE Juss. et DC. (ex p.) I. 283.
Caryophyllum DC. (Dianthus) I. 268. no. 23. 24. 25. 26. II. 772.
Caryophyllus Tournef. *II. 181.
— *racemosa* Mill. V. 756. no. 1.
Caryopteris Bnge. IV. 3.
— Mongholica Bnge. IV. 3. no. 1.
Casalea St. Hil. I. 33. V. 4.
— ascendens St. Hil. I. 33. no. 4.
— ficariaefolia St. Hil. I. 33. no. 3. *V. 4. no. 1.
β. minor St. Hil. I. 33. no. 3.
γ. pusilla Wlprs. V. 4. no. 1.
— flagelliformis St. Hil. I. 33. no. 5.
— phyteumaefolia St. Hil. I. 33. no. 2.
β. Bonariensis.
— sessiliflora St. Hil. I. 33. no. 1.
Casarettoa Wlprs. °IV. 91.
— diversifolia Wlprs. IV. 92. no. 2.
— mollissima Wlprs. IV. 91. no. 1.
Cascarilla Endl. VI. 67.
— *Moritziana* Kltzsch. VI. 67. no. 5.
— *noja de Oliva* VI. 65. no. 16.
— *Schomburgkii* Kltzsch. VI. 67. no. 6.
Casearia Jcq. I. 546. II. 828. V. 406.
— Adamantium Cambess. I. 546. no. 4.
— affinis Gardn. II. 828. no. 2.
— Benthamiana Miquel. V. 406. no. 2.
— brevipes Bth. I. 547. no. 16.
— carpinifolia Bth. I. 547. no. 17.
— Commersonii Cambess. I. 547. no. 10.
— densiflora Bth. I. 547. no. 14.
— Fockeana Miquel. V. 406. no. 3.
— grandiflora Cambess. I. 546. no. 7.
— Guineensis G. Don. I. 546. no. 3.
— hexagona Dcne. I. 546. no. 2.
— hypoleuca Mart. II. 828. no. 3.
— montana Gardn. II. 828. no. 1.
— inaequilatera Cambess. I. 547. no. 12.
— impunctata Hook. I. 547. no. 20.
— laurifolia Bth. I. 547. no. 15.
— lingua Cambess. I. 547. no. 11.
— *micrantha* G. Don. I. 547. no. 13.
— oblongifolia Cambess. I. 546. no. 8.
— obovata Schlchtd. I. 547. no. 19.
— odorata Mcfd. I. 548. no. 22.
— parviflora Cambess. *I. 547. no. 13.
— pauciflora Cambess. I. 547. no. 9.
— petraea Bth. I. 547. no. 18.
— pubiflora Bth. V. 406. no. 1.
— rufescens Cambess. I. 546. no. 5.
— serrata Mcfd. I. 548. no. 21.
— sessiliflora Cambess. I. 546. no. 6.
— uniflora Dcne. I. 546. no. 1.
Casparia Kth. I. 847. V. 571.
— castrata Hsskrl. V. 571. no. 1.
— furcata Desv. I. 847. no. 1.
Cassandra D. Don. *II. 728.
Casselia Nees et Martius. IV. 39.

Casselia chamaedryfolia Cham. IV. 40. no. 2.
— integrifolia Nees et Mart. IV. 40. no. 4.
— serrata Nees et Mart. IV. 40. no. 3.
— veronicaefolia Cham. IV. 39. no. 1.
Cassia L. I. 812. II. 901. V. 559.
— *Absus* Aubl. I. 829. no. 183.
— Absus L. I. 829. no. 182.
— acisperma Schrnk. I. 838. no. 279.
— *acuminata* Moench. I. 821. no. 87. I. 835. no. 247.
— *acuminata* W. I. 824. no. 131.
— acuta Meyen. I. 825. no. 137.
— acutifolia Delile. I. 822. no. 109.
— *Aegyptiaca* Willd. I. 821. no. 86.
— Aeschynomene DC. I. 836. no. 257.
— Afzeliana Vogel. I. 822. no. 105.
— alata Linn. I. 816. no. 38.
— *Alcaparillo* H. B. Kth. I. 815. no. 31.
— *amoena* Ham. I. 838. no. 270. β.
— ampliflora Steudel. V. 561. no. 13.
— angulata Vogel. I. 814. no. 23.
β. miscadena Vogel.
— angustifolia Vahl. I. 821. no. 98.
— angustisiliqua Lam. I. 820. no. 78.
— *angustissima* Lam. I. 838. no. 270. β.
— aphylla Cav. I. 818. no. 53.
— apiculata Mart. et Galeotti. V. 560. no. 5.
— appendiculata Vogel. I. 818. no. 52.
— Apoucouita Aubl. I. 824. no. 131.
— arachnoides Burch. I. 839. no. 284.
— arborescens Mill. I. 838. no. 272.
— *arborescens* Vahl. I. 818. no. 60.
— *arenaria* H. B. Kth. I. 837. no. 269.
— Arequipensis Meyen. I. 825. no. 142.
— Arereh Delile. I. 812. no. 5.
— argentea H. B. Kth. I. 818. no. 57.
— *aristata* DC. I. 815. no. 31. β.
— aristata Hrb. W. I. 836. no. 258.
— Arnottiana Gill. I. 818. no. 61.
— artemisioides Gaudich. I. 827. no. 163.
— Aschrek Forsk. I. 839. no. 285.
— aspera Mühlenbrg. I. 837. no. 262.
— astroites Willd. I. 825. no. 133.
— atomaria L. I. 826. no. 152.
— atroviridis Spanoghe. I. 839. no. 294. (I. 840. no. 298.)
— aurantia Rz. et Pav. I. 825. no. 140.
— aurata Vogel. I. 815. no. 30.
— auriculata L. I. 820. no. 79.
— aurita Collad. I. 838. no. 273.
— australis Sims. I. 828. no. 177.
— aversiflora Hook. I. 825. no. 143.
— baccillaris L. fil. I. 813. no. 15. (c. var. β. ibid.)
— *baccillaris* Willd. I. 813. no. 16.
— *Baccillus* Gaertn. I. 813. no. 11.
Cassia Bahamensis Mill. I. 821. no. 86.
— barbata Nees et Mart. I. 829. no. 181.
— Barclayana Sweet. I. 826. no. 148.
— Barrenfieldii Colla. I. 828. no. 176.
— basifolia Vogel. I. 832. no. 217.
— bauhiniaefolia Kth. I. 832. no. 215.
— *Berteri* Colla. I. 815. no. 31. β.
— *Berteriana* DC. I. 820. no. 78.
— bicaspsularis Linn. I. 815. no. 31.
— biflora L. I. 819. no. 71.
— *biflora* Mill. I. 839. no. 281.
— *bifoliata* DC. I. 832. no. 218.
— bijuga Vogel. I. 814. no. 26.
— birostris Dombey. I. 895. no. 144.
— Blancheti Bth. I. 830. no. 199.
— *Bonarjensis* Hortul. I. 815. no. 34.
— Bonplandiana DC. I. 812. no. 4.
— borbonioides Vogel. I. 831. no. 209.
— brachystachya Bth. I. 830. no. 200.
— *brachystachya* Fl. Mexic. I. 829. no. 187.
— *bracteata* Linn. fil. I. 816. no. 38.
— bracteolata Vogel. I. 830. no. 194.
— Brasiliana Lam. I. 812. no. 1.
β.? ferruginea Schrad.
— brevifolia Lam. I. 834. no. 242.
— brevipes DC. I. 832. no. 219.
— Brogniartii Gaudich. V. 561. †
— Browniana Kth. I. 823. no. 114.
— Burmanni DC. I. 834. no. 239.
— calliantha W. Mey. I. 820. adn. ad no. 80. I. 823. no. 117. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— calycioides DC. I. 835. no. 249.
— camporum Bth. I. 828. no. 174.
— cana N. ab E. I. 817. no. 42.
— *Cauca* Cav. I. 816. no. 40.
— *Candolleana* Vogel. I. 825. no. 136.
— canescens H. B. Kth. I. 821. no. 92.
— Capensis Thbg. I. 835. no. 250.
β. flavescens E. Mey.
— *Caracasana* Jcq. I. 821. no. 85.
— *Caroliniana* Walt. I. 816. no. 39.
— *Castiglionea* Coll. I. 835. obs. ad. no. 246.
— Chamaecrista L. I. 835. no. 246.
β. Brasiliensis Vogel.
γ. stricta Schrnk.
— *Chamaecrista* Mill. I. 839. no. 290.
— *Chamaecrista* Poepp. I. 836. no. 258.
— chamaecristoides Collad. I. 839. no. 290.
— Chatelainiana Gaudich. I. 827. no. 164.
— *Chinensis* Jcq. I. 816. no. 39. a.
— choriophylla Vogel. I. 832. no. 216.
— *chrysocarpa* Desv. I. 818. no. 54.
— chrysogyne Miquel. V. 560. no. 10.
— chrysoloma Notaris. I. 840. no. 304.
— chrysotricha Collad. I. 818. no. 54.
— *ciliaris* Collad. I. 833. no. 221.

Cassia ciliata Raf. I. 816. no. 39.
— cinerascens Vogel. I. 833. no. 232.
— cinerera Cham. et Schlchtd. I. 835. no. 248.
— *cinerea* Cham. et Schlchtd. I. 839. no. 290.
— Clausseni Bth. I. 828. no. 168.
— *Collae* G. Don. I. 815. no. 31. β.
— coluteoides Collad. I. 825. no. 136.
— comosa Vogel. I. 836. no. 252.
— conspicua Vogel. I. 827. no. 159.
— contorta Vogel. I. 816. no. 37.
— Coquimbensis Vogel. I. 819. no. 62.
— cordistipula Mart. I. 834. no. 236.
— coriacea Bongd. I. 830. no. 201.
— *Coromandelica* Jcq. I. 816. no. 39. α.
— corymbosa Lam. I. 815. no. 34.
— *corymbosa* Orteg. I. 815. no. 35.
— cotinifolia G. Don. I. 828. no. 179.
— *crassifolia* Ortega. I. 815. no. 34.
— crenulata Bth. I. 828. no. 170.
— crotalarioides Kth. I. 815. no. 32.
— Crucksbanksii Hook. et Arn. I. 825. no. 134.
— Cubensis Hffmsgg. I. 838. no. 274.
— cultrifolia H. B. Kth. I. 831. no. 204.
— Cumingii Hook. et Arn. I. 825. no. 141. (c. varr. α. et β. ibid.)
— cuneata DC. I. 833. no. 229.
— cuneifolia Vogel. I. 829. no. 188.
— curvifolia Vogel. I. 831. no. 210.
— *cuspidata* Willd. I. 823. no. 113.
— cytisoides DC. I. 830. no. 202.
— debilis Vogel. I. 830. no. 197.
— decipiens Desv. I. 823. no. 112.
— decrescens Bth. I. 828. no. 172.
— decumbens Bth. I. 828. no. 175.
— densillora Mart. et Galeotti. V. 553. no. 4.
— densifolia Bth. I. 828. no. 171.
— dentata Vogel. I. 829. no. 180.
— *Desvauxii* Collad. I. 831. no. 205.
— didymobotrya Fresen. I. 839. no. 295.
— diffusa DC. I. 836. no. 254.
— *dimidiata* Kl. I. 837. no. 264.
— diphylla Lam. I. 831. no. 203.
— disadena Steudel. V. 560. no. 12.
— discolor Desv. I. 819. no. 64.
— dispar Willd. I. 825. no. 135.
— divaricata N. ab E. et Blume. I. 820. no. 77.
— Dombeyana Vogel. I. 819. no. 66.
— Domingensis Spr. I. 821. no. 96.
— *dumetorum* Bert. I. 822. no. 102.
— eglandulosa Dum. I. 839. no. 289.
— *elegans* H. B. Kth. I. 815. no. 35.
— elegans Voigt. I. 839. no. 293.
— elliptica H. B. Kth. I. 821. no. 91.
— *elongata* Lemciy. I. 823. no. 109.
— emarginata L. I. 821. no. 94.
— *emarginata* Mill. I. 838. no. 277.
Cassia enneaphylla Koen. I. 818. no. 60.
— *esculenta* Rxb. I. 816. no. 39. α.
— *excelsa* H. B. Kth. I. 812. no. 4.
— excelsa Schrad. I. 826. no. 157.
— exsudans Bth. I. 828. no. 169.
— *fabaginaefolia* H. B. Kth. I. 832. no. 218. β.
— fagifolia Bertol. I. 840. no. 301.
— fagonioides Vogel. I. 829. no. 185.
— *falcata* Dum. I. 815. no. 34.
— *fasciculata* Mnch. I. 835. no. 246. obs.
— *fastigiata* Nees. I. 826. no. 157.
— fastigiata Vahl. I. 820. no. 76.
— filipes Bth. I. 815. no. 28.
— Fistula L. I. 812. no. 3.
— fistuloides Collad. I. 812. no. 6.
— *flexuosa* Bert. I. 825. no. 136.
— *flexuosa* Burm. I. 834. no. 239.
— flexuosa L. I. 837. no. 269.
— floribunda Cav. I. 815. no. 35.
β. elegans H. B. Kth.
γ. Herbertiana Lindl.
— florida Vahl. I. 822. no. 100.
— Fluminensis Arrabida. V. 561. no. 1.
— Fockeana Miquel. V. 559. no. 3.
— foetida Rz. et Pav. I. 825. no. 139.
— *foetida* Salisb. I. 817. no. 48.
— foetidissima Rz. et Pav. I. 825. no. 138.
— foliosa G. Don. I. 833. no. 224.
— *Fraseri* Cunn. I. 828. no. 177.
— fraxinifolia H. B. Kth. I. 823. no. 113.
— frutescens Mill. I. 839. no. 287.
— *frutescens* Mill. I. 819. no. 64.
— fruticosa Mill. I. 813. no. 17.
— *fulgens* Wall. I. 823. no. 117.
— *galegaefolia* L. I. 819. no. 71.
— Galeottiana Martens. V. 560. no. 6.
— *Gallinaria* Collad. I. 817. no. 48.
— Gaudichaudii Hook. et Arn. I. 818. no. 59.
— *geminiflora* Schrnk. I 816. no. 39. β.
— *geniculata* Don. I. 825. no. 133.
— *gigantea* Bert. I. 822. no. 100.
— *glabra* DC. I. 831. no. 202.
— glandulosa L. I. 835. no. 247.
ε. Felipensis H. B. Kth.
β. flavicoma H. B. Kth.
γ. propinqua H. B. Kth.
δ. ramosissima H. B. Kth.
— glauca Lam. I. 818. no. 60.
— glutinosa DC. I. 827. no. 182.
— Goratensis Fresen. I. 840. no. 296.
— gracilis Kth. I. 831. no. 206.
— graminica Spr. I. 833. no. 233.
— *grandis* L. fil. I. 812. no. 1.
— *grandiflora* Dsf. I. 816. no. 36.
— grandistipula Vogel. I. 833. no. 226.
— graveolens Colla. I. 838. no. 276.

Cassia Hartwegi Bth. V. 559. no. 2.
— hedysaroides Vogel. I. 830. no. 192.
— *herpetica* Jcq. I. 816. no. 38.
— *heteroloba* Lindl. II. 904. no. 5.
— *heterophylla* DC. I. 838. no. 270. β. 2.
— hirsuta Linn. fil. I. 820. no. 85.
— hirta Willd. I. 839. no. 288.
— hispida Collad. I. 829. no. 183.
— *hispida* Collad. I. 838. no. 271.
— holosericea Fresen. I. 840. no. 297.
— homophylla Hffmnzg. I. 839. no. 280.
— Hookeriana Gill. I. 823. no. 115.
— Hornemanni DC. I. 839. no. 291.
— Houstoniana Collad. I. 839. no. 281.
— Humboldtiana DC. I. 813. no. 14.
— Javanica L. I. 813. no. 11.
— *Javanica* Lunac. I. 812. no. 1.
— *Javanica* Vellozo. I. 813. no. 8.
— inaequilatera Balb. I. 814. no. 19.
— incana Vogel. I. 830. no. 195.
— indecora H. B. Kth. I. 815. no. 33.
β. advena Willd.
δ. glabrata Vogel.
γ. pendula Willd.
— *Indica* Poir. I. 816. no. 39. *a*.
— *inflata* Spr. I. 815. no. 31.
— Kleinii Wght. et Arn. I. 837. no. 264.
— Kunthiana Cham. et Schlchtd. I. 832. no. 220.
— laevigata Willd. I. 816. no. 36.
— laeta H. B. Kth. I. 826. no. 151.
— lanceolata Forsk. I. 822. no. 108.
— *lanceolata* Nect. I. 822. no. 108.
— *lanceolata* Pers. I. 832. no. 214.
— *lanceolata* Wght. et Arn. I. 822. no. 109.
— Langsdorfii Kth. I. 831. no. 208. (c. var. β. ibid.)
— latifolia W. Meyer. I. 824. no. 130.
— latepetiolata Dombey. I. 820. no. 74.
— Lechenaultiana DC. I. 837. no. 265.
— *Lechenaultii* Wall. I. 838. no. 270. *a*.
— leiantha Bth. I. 827. no. 166.
— leiophylla Vogel. I. 818. no. 55.
— leptophylla Vogel. I. 813. no. 8.
— ligustrina L. I. 821. no. 86.
— *ligustrinoides* Schrnk. I. 823. no. 109.
— *Limensis* Lam. I. 815. no. 31.
— Lindleyana Gardn. II. 904. no. 3.
— linearifolia G. Don. I. 828. no. 178.
— *linearis* Michx. I. 816. no. 39.
— linearis Michx. I. 826. no. 146.
— lineata Swrtz. I. 833. no. 228.
— longisiliqua L. fil. I. 820. no. 82.
— lotoides H. B. Kth. I. 829. no. 184.
— lucens Vogel. I. 826. no. 154.
— *lutescens* G. Don. I. 817. no. 41.
Cassia macradenia Collad. I. 839. no. 282.
— macranthera DC. I. 824. no. 124.
— macrophylla Kth. I. 814. no. 18.
— *Madagascariensis* Poir. I. 841. no. 6.
— *magnifica* Mart. I. 823. no. 117.
— malacophylla Vogel. I. 831. no. 212.
— marginata Rxb. I. 813. no. 12.
— *marginata* Willd. I. 820. no. 80.
— maritima Willd. I. 817. no. 46.
— Marylandica L. I. 821. no. 87.
— medica Vellozo. I. 814. no. 21.
— megalantha Denc. I. 813. no. 10.
— *melanocarpa* Bert. I. 814. no. 24. β. I. 821. no. 90.
— Mexicana Jcq. I. 819. no. 67.
— *Mexicana* Rchb. I. 819. no. 72.
— *micans* N. ab E. I. 824. no. 121.
— micrantha Guill. et Perr. I. 834. no. 244.
— *microphylla* Willd. I. 838. no. 270. β. 2.
— Milleri Collad. I. 838. no. 277.
— *mimosoides* DC. I. 837. no. 261.
— mimosoides L. I. 837. no. 270.
— *mollis* Vahl. I. 812. no. 1.
— mollissima H. B. Kth. I. 824. no. 132.
— *mon'aden* Vellozo. I. 814. no. 25.
— monantha DC. I. 838. no. 275.
— montana Heyne. I. 822. no. 101.
— moschata H. B. Kth. I. 812. no. 2.
— mucronata Spr. I. 833. no. 223.
— *multiglandulosa* Jcq. I. 817. no. 41.
— multiflora Mart. et Galeotti. V. 560. no. 8.
— multiflora Scheele. V. 561. no. 15.
— multiflora Vogel. I. 824. no. 122.
— *multijuga* Rich. I. 823. no. 117.
— Mutisiana Kth. I. 820. no. 81.
— *myriophylla* Wall. I. 838. no. 270. *a*.
— neglecta Vogel. I. 820. no. 84.
— nemophila Cunn. I. 827. no. 161.
— nemorosa H. B. Kth. I. 819. no. 65.
— nervosa Vogel. I. 824. no. 120.
— nictitans L. I. 834. no. 245.
— *nictitans* L. I. 836. no. 257.
— nigricans Vahl. I. 834. no. 243.
— *nitida* Rich. I. 824. no. 131.
— nodosa Buchan. I. 813. no. 9. V. 561. †
— *nummularia* Vahl. I. 832. no. 218.
— nutans Moç. et Sess. I. 821. no. 93.
— obcordata Swrtz. I. 819. no. 68.
— obliqua Rz. et Pav. I. 824. no. 127.
— oblongifolia Vogel. I. 817. no. 43.
— obovata Collad. I. 822. no. 106.
β. obtusata Hayne.
— *obtusa* Rxb. I. 822. no. 106. β.
— *obtusifolia* Burm. I. 817. no. 48.
— obtusifolia L. I. 817. no. 49.
β. humilis Collad.

Cassia occidentalis L. I. 816. no. 39.
β. glabra Vogel.
— ochracea Vogel. I. 829. no. 190.
— olesiphylla Vogel. I. 837. no. 268.
— *opaca* Grah. I. 819. no. 72.
— orbiculata Bth. I. 827. no. 167.
— *ornithopoides* Lam. I. 817. no. 50.
— *orientalis* Pers. I. 822. no. 8.
— Otterbeynii F. W. Mey. I. 837. no. 261.
— ovalifolia Mart. et Galeotti. V. 560. no. 7.
— *oxyadena* DC. I. 819. no. 64.
— oxyphylla Kth. I. 823. no. 119.
— pachycalyx Vogel. I. 830. no. 195.
— palmata Wall. I. 827. no. 158.
— paradyction Vogel. I. 826. no. 153.
— Paramariboënsis Miq. II. 904. no. 2.
— Parkeriana DC. I. 836. no. 260.
— *parvifolia* Wndrth. I. 835. no. 247.
— patellaria DC. I. 836. no. 158.
γ. glabrata Vogel.
β. ramosa Vogel.
— *patula* Ait. I. 839. no. 287.
— pauciflora H. B. Kth. I. 829. no. 187.
— *Pavoniana* Don. I. 835. obs. ad no. 246.
— pedicellaris DC. I. 836. no. 255.
— pentagona Nutt. I. 817. no. 45.
— *pentandra* Raddi. I. 832. no. 218.
— Peralteana H. B. Kth. I. 826. no. 150.
— Persoonii Collad. I. 832. no. 214.
— Peruviana Vogel. I. 824. no. 128.
— picta G. Don. I. 821. no. 95.
— pilifera Vogel. I. 817. no. 47.
— pilosa L. I. 833. no. 227.
— *pilosa* L. I. 838. no. 277.
— *pinnata* Hortul. I. 839. no. 293.
— pistaciaefolia H. B. Kth. I. 823. no. 110.
— *planisiliqua* Burm. I. 818. no. 60.
— *planisiliqua* Lam. I. 839. no. 286.
— *planisiliqua* Linn. I. 816. no. 39.
— Plumieri DC. I. 839. no. 286.
— plumosa Vogel. I. 836. no. 251. (cum var. *β.*)
— podocarpa Guill. et Perr. I. 821. no. 90.
— Pohliana Bth. I. 828. no. 173.
— polyadena DC. I. 834. no. 238.
— polyantha Moç. et Sess. I. 821. no. 88.
— polyphylla Jcq. I. 820. no. 80.
— polystachya Bth. I. 830. no. 198.
— praetexta Vogel. I. 837. no. 266.
— *procumbens* L. I. 836. no. 253.
— *procumbens* Mill. I. 838. no. 271.
— *procumbens* Willd. I. 834. no. 245.
— prostrata H. B. Kth. I. 833. no. 231.
— *prostrata* Rxb. I. 836. no. 253.
— *propinqua* Cham. et Schlchtd. I. 837. no. 263.
Cassia pubescens R. Br. I. 822. no. 107.
— pubescens Jcq. I. 826. no. 145.
— *pubescens* Rz. et Pav. I. 817. no. 41.
— puberula H. B. Kth. I. 814. no. 20.
— pubigera Lag. I. 839. no. 283.
— *pulchella* Salisb. I. 835. no. 246.
— pulcherrima Dehnhardt. I. 840. no. 299.
— pulchra H. B. Kth. I. 831. no. 205.
— pumila Lam. I. 836. no. 253.
— punctata Vogel. I. 829. no. 191.
— punctata Scheele. V. 561. no. 14.
— punctulata Hook. et Arn. I. 840. no. 300.
— *purpurea* Rxb. I. 816. no. 39. *α.*
— pygmaea DC. I. 833. no. 230.
— *quadriflora* Vogel. I. 827. no. 162. *β.*
— quinquangulata Rich. I. 824. no. 125.
— racemosa Mill. I. 821. no. 89.
— *ramiflora* Vogel. I. 824. no. 131.
— ramosa Vogel. I. 831. no. 211.
— *reflexa* Salisb. I. 821. no. 87.
— Reinwardtii Hsskrl. V. 559. no. 1.
— *Reinwardtii* Hort. I. 815. no. 33. *γ.*
— reniformis G. Don. I. 818. no. 56.
β. glabrata Vogel.
— repens Vogel. I. 834. no. 237.
— reticulata Willd. I. 822. no. 102.
— retusa Mus. Brit. I. 827. no. 160.
— *rhombifolia* Rxb. I. 812. no. 3.
— Richardiana Kth. I. 823. no. 116.
— riparia H. B. Kth. I. 836. no. 256.
— *robinioides* Willd. I. 821. no. 86.
— rostrata Mart. I. 819. no. 69.
— *rostrata* Voigt. I. 819. no. 69.
— rotundata Vogel. I. 833. no. 225.
— rotundifolia Pers. I. 832. no. 218. (c. varr. *β.* et *γ.* ibid.)
— *Roxburghii* DC. I. 813. no. 12.
— *Roxburghii* Grah. I. 838. no. 270. *β.*
— rufa Mart. et Galeotti. V. 560. no. 9.
— *rugosa* Brit. Mus. I. 822. no. 105.
— rugosa G. Don. I. 814. no. 27.
— Ruiziana Vogel. I. 824. no. 126.
— ruscifolia Jcq. I. 816. no. 40.
— Sabak Del. I. 839. no. 292.
— sapindifolia Vogel. I. 821. no. 97.
— Savannensis Miq. II. 904. no. 1.
— scandens Rz. et Pav. I. 824. no. 129.
— *schinifolia* Alph. DC. I. 826. no. 148.
— Schultesii Colla. I. 827. no. 165.
— sclerocarpa Vogel. I. 813. no. 16.
— *Selloi* G. Don. I. 823. no. 117.
— *Selloi* Spr. I. 824. no. 120.
— *semifalcata* Vellozo. I. 823. no. 117.
— *Senegalensis* DC. I. 838. no. 270. *β.* 2.
— *Senna* Auct. I. 822. no. 106.
— *Senna* Nect. I. 822. no. 106.

Cassia Senna β. Italica L. I. 822. no. 106.
— *sennoides* Jcq. I. 815. no. 31.
— *sensitiva* Jcq. I. 817. no. 50.
— *sensitiva* Rxb. I. 838. no. 270. β.
— *septentrionalis* Zucc. I. 816. no. 36.
— sericea Swrtz. I. 817. no. 50.
β. ciliata Vogel. I. 818. no. 50.
— serpens L. I. 833. no. 234.
— *setigera* DC. I. 822. no. 101.
— setosa Vogel. I. 829. no. 189.
— Siamea Lam. I. 822. no. 99.
— Sieberiana DC. I. 812. no. 7.
— Sigueana Delile. I. 819. no. 70.
— smaragdina Mefd. I. 840. no. 303.
— *Sopherae* Linn. I. 816. no. 39. *a.*
— *sopheroides* Collad. I. 816 no. 39. *a.*
— *speciosa* H. B. Kth. I. 813. no. 14.
— *speciosa* Rxb. I. 820. no. 75.
— speciosa Schrad. I. 824. no. 121.
— spectabilis DC. I. 826. no. 156.
— splendida Vogel. I. 814. no. 25. (c. var. β.)
— spinescens Hffmnsgg. I. 819. no. 63.
— staminea Vogel. I. 813. no. 13. (c. var. β. ibid.)
— stenocarpa Vogel. I. 837. no. 267.
— stipulacea Ait. I. 819. no. 72.
β. tenuistipulacea Bert. Herb.
— stipulata Don. I. 836. no. 259.
— striata Vogel. I. 821. no. 123.
— *strobilacea* H. B. Kth. I. 822. no. 102.
— *succedanea* Bell. I. 821. no. 87.
— suffruticosa Koen. I. 820. no. 75.
— sulcata DC. I. 826. no. 147.
— *sulphurea* DC. I. 818. no. 60.
— *Sumatrana* Rxb. I. 822. no. 100.
— *Sunsub* Forsk. I. 817. no. 49. β.
— *Surattensis* Burm. I. 818. no. 60.
— Swartzii Wikstr. I. 834. no. 241.
— sylvestris Vellozo. I. 823. no. 111.
— *Tagera* Lam. I. 817. no. 48.
— Tagera L. I. 832. no. 221.
— *Tala* Desv. I. 817. no 49. β.
— Tarantan H. B. Kth. I. 822. no. 103.
— tecta Vogel. I. 832. no. 213. (c. var. β. ibid.)
— *Telfairiana* Wall. I. 838. no. 270. *a.*
— tenella H. B. Kth. I. 833. no. 222.
— *tenella* Rxb. I. 838. no. 270. β.
— tenuifolia Vogel. I. 814. no. 22.
— teretifolia Cunningh. II. 904. no. 4.
— *tetrafoliata* Desv.? I. 831. no. 208.
— tetraphylla Collad. I. 838. no. 271.
— *tetraphylla* Desv. I. 831. no. 205.
— *Thonningii* DC. I. 829. no. 182.
— Timoriensis DC. I. 822. no. 104.
— tomentosa Linn. fil. I. 817. no. 41.
β. albida Ort.
Cassia Tora Desv. I. 817. no. 49.
— *Tora β.* Linn. I. 817. no. 49. β.
— Tora Linn. I. 817. no. 48.
β. Tagera Lam.
— *toroides* Rxb. I. 817. no. 48. β.
— *torosa* Cav. I. 816. no. 39. *a.*
— *torulosa* Poir. I. 816. no. 39. *a.*
— trachycarpa Vogel. I. 830. no. 193.
— *triflora* Jcq. I. 835. no. 246. obs.
— triflora Vahl. I. 826. no. 149.
— Trinitatis Rchb. I. 826. no. 155.
— tristicula H. B. Kth. I. 837. no. 263. (c. var. β. ibid.)
— *tropica* Vellozo. I. 816. no. 36.
— *tuberculata* Collad. I. 823. no. 111.
— *umbellata* Rchb. I. 828. no. 177.
— undulata Bth. I. 815. no. 29.
— *uniflora* Mill. I. 838. no. 275.
— uniflora Spr. I. 831. no. 207.
γ.? glaucescens Vogel.
δ.? macradena Vogel.
β.? minor Vogel.
— velutina Vogel. I. 818. no. 51.
— venenifera Rodsch. I. 820. no. 83.
— *venosa* Cast. I. 835. no. 246. obs.
— *venosa* Desv. I. 831. no. 202.
— *venosa* Horn. I. 839. no. 291.
— venustula H. B. Kth. I. 818. no. 58.
— verrucosa Vogel. I. 823. no. 118.
— versicolor Meyen. I. 819. no. 73.
— vestita Vogel. I. 834. no. 235.
— *villosa* Mill. I. 825. no. 133.
— villosa Mill. I. 838. no. 278.
— viminea L. I. 814. no. 24.
— *virgata* L. I. 835. no. 247.
— *virgata* Rich. I. 818. no. 54.
— virgata Swrtz. I. 834. no. 240.
— viscosa H. B. Kth. I. 829. no. 186.
— *viscosa* Rxb. I. 829. no. 182.
— *viscosa* Vahl. I. 829. no. 182.
— viscoso-pilosa Steudel. V. 560. no. 11.
— Vogeliana Schlchtd. I. 817. no. 44.
— *Wallichiana* DC. I. 838. no. 270. *a.*
— Wightiana Grah. I. 817. no. 41.
— xiphoidea Bertol. I. 840. no. 302.
Cassida etc. Amman. III. 757. no. 46.
— *galericulata* Mnch. III. 757. no. 47.
— *hastifolia* Scop. III. 758. no. 48.
— *lateriflora* Mnch. III. 762. no. 69.
— *racemosa* Moench. III. 753. no. 27.
Cassieae Bth. I. 812. II. 904. V. 559.
Cassine L. I. 539. II. 828. V. 403.
— discolor Wall. I. 539. no. 1.
— *discolor* Wall. I. 534. no. 1.
— excelsa Wall. I. 539. no. 2.
— Gongonba Mart. et Spix. I. 539. no. 5.

Cassine ilicifolia Hochstett. V. 402. no. 1.
—? Kraussiana Hochstett. V. 403. no. 1.
— latifolia Eckl. et Zeyh. I. 539. no. 4.
— Maurocenia Willd. *II. 828. no. 1.
— scandens Eckl. et Zeyh. I. 539. no. 3.
Cassinia R. Br. *II. 644.
Cassinieae Lssng. II. 644. VI. 231.
Cassiope D. Don. *II. 728.
Cassipourea Aubl. II. 71.
— serrata Bth. II. 71. no. 1.
Castae Bth. (Mimosa) I. 866.
Castalia DC. I. 106. I. 107.
Castanospermum A. Cunn. I. 807.
— australe A. Cunn. *I. 807. no. 1.
Castela Turp. I. 525.
— Nicholsonii Hook. I. 525. no. 1.
β. Texana Torr. et Gr.
Casteleae Bartl. I. 525.
Castelia cuneato-ovata Cavanilles. IV. 36. no. 7.
Castilleja Linn. fil. VI. 651.
Castilleja Mutis. III. 393. °III. 971.
— acuminata Spr. III. 396. no. 26.
— affinis Hook. et Arn. III. 393. no. 2.
— *ambigua* Hook. et Arn. III. 392. no. 6.
— angustifolia G. Don. III. 396. no. 23.
— angustifolia Martens et Galeotti. VI. 651. no. 2.
— arvensis Cham. et Schlchtd. III. 394. no. 8.
— Bradburii G. Don. III. 396. no. 24.
— *coccinea* Dougl. III. 395. no. 16.
— coccinea Kth. III. 395. no. 15.
— coronopifolia Vent. III. 396. no. 25.
— fissifolia Linn. fil. III. 394. no. 6.
— foliolosa Hook. et Arn. III. 395. no. 18.
— grandiflora Spr. III. 395. no. 19.
— hirsuta Martens et Galeotti. VI. 651. no. 3.
— hispida Bth. III. 395. no. 16.
— *hyssopifolia* Willd. III. 394. no. 10.
— integrifolia Linn. III. 394. no. 9.
— laciniata Hook. et Arn. III. 394. no. 7.
— *latifolia* Hook. et Arn. III. 395. no. 17.
— lithospermoides H. B. Kth. III. 394. no. 10.
— longebracteata Martens et Galeotti. VI. 651. no. 6.
— longiflora Knze. III. 394. no. 12.
— macrocarpa Bth. III. 395. no. 17.
— miniata Dougl. III. 396. no. 20.
— Moranensis H. B. Kth. III. 394. no. 4.
— nubigena H. B. Kth. III. 394. no. 5.
— occidentalis Torr. III. 395. no. 14.
— pallida Kth. III. 393. no. 1.
β. Unalaschkensis Schlchtd. et Cham.
— parviflora Bngrd. III. 396. no. 22.
— pectinata Martens et Galeotti. VI. 651. no. 5.
Castilleja purpurea G. Don. III. 396. no. 21.
— scorzoneraefolia H. B. Kth. III. 395. no. 13.
— *septentrionalis* Lindl. III. 393. no. 1.
— sessiliflora Prsh. III. 396. no. 19.
— serrata Hortor. *III. 396. no. 27.
— *Sibirica* Lindl. III. 393. no. 1.
— speciosa Martens et Galeotti. VI. 651. no. 1.
— tenuiflora Bth. III. 394. no. 11.
— tenuifolia Martens et Galeotti VI. 651. no. 4.
— *Toluccensis* Cham. et Schlchtd. III. 395. no. 17.
— Toluccensis H. B. Kth. III. 393. no. 3.
— *trifida* Willd. III. 394. no. 5.
Castillejeae Bth. VI. 651.
Castorea racemosa flore coeruleo, fructu croceo Plum. IV. 79. no. 5.
— *repens spinosa* Plum. IV. 79. no. 5.
Cassupa H. B. Kth. *II. 521.
Cassytha baccifera Mill. II. 343. no. 10.
Catacoma vid. Catocoma.
Catalpa Scopoli. *VI. 515.
Catalpeae A. P. DC. VI. 513.
Catananche Vaill. *II. 684. *VI. 328.
Catappa Gaertn. II. 60.
Cataria Bth. III. 781. VI. 676. no. 2.
— *canescens* Moench. III. 780. no. 28.
— *Nepetella* Moench. III. 782. no. 40. *a.*
— *nuda* Moench. III. 788. no. 67. *a.*
— *paniculata* Moench. III. 788. no. 67. *β.*
— *violacea* Moench. III. 788. no. 67. *a.*
— *vulgaris* Moench. III. 782. no. 39.
Catesbaea Linn. *II. 514.
Catha Forsk. I. 532. V. 401.
— emarginata G. Don. *I. 532. no. 7.
— Heyneana Wlprs. *I. 532. no. 3.
— montana G. Don. *I. 532. no. 6.
— montana Hsskrl. *V. 401. no. 1.
— ovata Wlprs. I. 532. no. 5.
— Rothiana Wlprs. I. 532. no. 4.
— rufa Wall. I. 532. no. 2.
— *serrulata* Rth. I. 532. no. 4.
— *Wallichiana* Wall. I. 532. no. 4.
— Wallichii G. Don. I. 532. no. 1.
Cathartocarpus Attelch G. Don. I. 812. no. 5.
— *baccillaris* G. Don. I. 813. no. 15.
— *Baccillus* Lindl. I. 813. no. 15.
— *Brasilianus* Jacq. I. 812. no. 1.
— *excelsus* G. Don. I. 812. no. 4.
— *ferrugineus* G. Don. I. 812. no. I. *β.*
— *Fistula* Pers. I. 812. no. 3.
— *fistuloides* G. Don. I. 812. no. 6.
— *grandis* Pers. I. 812. no. 1.
— *Javanicus* Pers. I. 813. no. 11.
— *laetus* Don. I. 826. no. 151.

Cathartocarpus marginatus G. Don. I. 813. no. 12.
— *moschatus* G. Don. I. 812. no. 2.
— *rhombifolius* G. Don. I. 812. no. 3.
— *speciosus* G. Don. I. 813. no. 14.
— *Trinitatis* Don. I. 826. no. 155.
Cathormion Bth. V. 615.
Catinga Aubl. *II. 193.
Catoclypta Schauer. II. 155. V. 731.
Catocoma Bth. I. 243. V. 64.
— altissima Poepp. et Endl. V. 64. no. 1.
— brevifolia Bth. I. 243. no. 5.
— floribunda Bth. I. 243. no. 1.
— Kunthiana Bth. I. 243. no. 4.
— laurifolia Bth. I. 243. no. 2.
— lucida Bth. I. 243. no. 3.
Catolobus DC. I. 132. no. 20.
Catomenia Torr. et Gr. (?) II. 987. no. 1.
Catophractes D. Don. *VI. 515.
Catostemma Bth. II. 802. °V. 133.
— fragrans Bth. *II. 802. no. 1. V. 133. no. 1.
Cattu-Tirtava Rheede. III. 486. no. 7.
Caucalineae Koch. II. 420. V. 901.
Caucalis Linn. II. 420.
— *Abyssinica* Hochstett. V. 900. no. 2.
— coerulescens Boiss. II. 420. no. 1.
— *Hispanica* Lam. II. 421. no. 1.
— *lappulacea* Poepp. II. 421. no. 2.
— microcarpa Hook. et Arn. II. 421. no. 2.
— muricata Bischof. II. 421. no. 3.
— *strigosa* Russell. V. 903. no. 2.
Caucanthus Forsk. °V. 357.
— *Arabica* Lam. V. 357. no. 1.
— edulis Forsk. *V. 357. no. 1.
— *Forskâlii* Raeusch. V. 357. no. 1.
Caulanthon Bth. V. 616.
Caulophyllum gracile Dougl. I. 101. no. 1.
Caulopterae DC. (Baccharis) II. 498. VI. 137.
Caulotretus DC. I. 851.
— *eriophorus* Ten. II. 904. no. 2.
Cavalam Rheede. V. 100. no. 31.
Cavallium urens Schott et Endl. V. 98. no. 5.
Cavanillesia Rz. et Pav. *I. 330.
Cavendishia Lindl. *II. 723.
Cayaponia Silva Manso. °V. 765.
— diffusa Silva Manso. V. 765. no. 1.
— globosa Silva Manso. V. 765. no. 2.
Caylusea St. Hil. II. 754.
— Abyssinica Fisch. et Mey. II. 754. no. 2.
— canescens St. Hil. II. 754. no. 1.
Cedrela L. I. 436.
— angustifolia DC. *I. 437. no. 4.
— Brasiliensis A. Juss. I. 437. no. 5.
— febrifuga Blume. I. 436. no. 3.
— Guianensis A. Juss. I. 437. no. 6.
Cedrela odorata L. *I. 437. no. 7.
— *odorata* Rz. et Pav. I. 437. no. 4.
— Paraguariensis Mart. I. 437. no. 8.
— serrata Royle. I. 437. no. 10.
— Sinensis A. Juss. I. 436. no. 1.
— Toona Rxb. *I. 436. no. 2.
— velutina DC. *I. 437. no. 11.
— villosa Rxb. *I. 437. no. 9.
CEDRELACEAE R. Br. I. 436. V. 376.
Cedreleae Adr. Juss. I. 436.
Cedron IV. 13. no. 2.
Cedronella Bth. III. 798. °III. 986. VI. 678.
— *Canariensis* Comm. III. 799. no. 3.
— cordata Bth. III. 798. no. 1.
— Mexicana Bth. III. 798. no. 2. *VI. 678. no. 1.
— pallida Lindl. VI. 678. no. 2.
— triphylla Mnch. III. 799. no. 3.
Ceiba Plum. I. 330.
CELASTRINEAE DC. (ex p.) I. 529. I. 539.
CELASTRINEAE R. Br. I. 529. II. 827. V. 401.
Celastrus Kth. I. 533. II. 827. V. 401.
Celastrus .....? Drège. I. 252. no. 13.
— *alata* Thbg. I. 530. no. 8.
— alpestris Blume. I. 533. no. 2.
—? bivalvis Jack. I. 533. no. 4.
— campestris Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 11.
— collinus Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 10.
— coriaceus Gill. et Perr. I. 533. no. 6.
— *crenata* Rth. I. 532. no. 6.
— *decolor* Delile. I. 533. no. 7.
— *emarginata* Willd. I. 532. no. 7.
— empleurifolius Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 21.
— *filiformis* Thunb. I. 537. no. 9.
— Europaeus Boiss. I. 533. no. 1.
— *glomeratus* E. Mey. V. 401. no. 1.
— goniocaulis Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 14.
— heterophylla Savi. I. 534. no. 24.
— heterophyllus Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 16.
— *Heyneana* Rth. I. 532. no. 3.
— humilis Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 17.
— *laurinus* Thunb. I. 537. no. 5.
—? *leptopus* Bernhardi. V. 401. no. 1.
— luteolus Delile. V. 401. no. 2.
— Magellanicus DC. *II. 827. no. 1.
— *montana* Rth. *V. 401. no. 1.
— *montana* Rxb. I. 532. no. 6.
— mucronatus Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 9.
— nemorosus Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 12.
— *obtusus* Thnbg. I. 537. no. 4.
— *oleoides* Lam. I. 537. no. 6.
— *opposita* Wall. I. 536. no. 2.
— *ovata* Wall. I. 532. no. 5.
— paniculata Willd. I. 534. † V. 401. †
— parvifolius Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 18.

Celastrus patens Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 13. V. 401. no. 1.
— *pauciflora* Wall. I. 254. no. 36.
— *phyllacanthus* L'Herit. I. 533. no. 7.
— polyanthemos Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 22.
— *pterocarpus* DC. I. 535. no. 1.
— *pyracanthus* L. I. 529. no. 1.
— repanda Blume. I. 533. no. 3.
— rhombifolius Eckl. et Zeyh. I. 533. no. 15.
— rhombifolius Hook. et Arn. *I. 533. no. 5.
— *rostratus* Thunbg. I. 535. no. 8.
— *Rothiana* Wght. et Arn. I. 532. no. 4.
— rupestris Eckl. et Zeyb. I. 533. no. 8.
— Senegalensis Lam. *I. 533. no. 7.
— *serrulata* Rth. I. 532. no. 3.
— *sinuato-dentatus* Hochstett. V. 401. no. 2.
— spathephyllus Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 19.
— stenophyllus Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 23.
— *tricuspidatus* Lam. I. 535. no. 9.
— *uncinatus* Rz. et Pav. I. 534. no. 1.
— *undulatus* Lam. I. 250. no. 3.
— venenatus Eckl. et Zeyh. I. 534. no. 20.
— *verticillata* Rxb. I. 251. no. 10.
— *Wallichiana* Wall. I. 532. no. 3.
—? *Wightiana* Wall. I. 536. no. 1.
Celmisia Cass. *II. 557. VI. 117.
Celmisia DC. VI 117.
— asteliaefolia Hook. fil. VI. 117. no. 3.
— coriacea Hook. fil. VI. 117. no. 8.
— *coriacea* Raoul. VI. 118. no. 9.
— gracilenta Hook. fil. VI. 117. no. 4.
— graminifolia Hook. fil. VI. 117. no. 5.
— holosericea Hook. fil. VI. 117. no. 7.
— longifolia Cass. VI. 117. no. 1. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— Mackaui Roaul. VI. 117. no. 9.
— spathulata A. Cunningh. VI. 117. no. 2.
— spectabilis Hook. fil. VI. 117. no. 6.
— vernicosa Hook. fil. VI. 118. no. 10.
Celsia Linn. III. 147. III. 446. °III. 957. VI. 636.
— acaulis Bory et Chaub. III. 149. no. 14.
— Arcturus Linn. III. 148. no. 7.
α. alternifolia Fisch. et Mey.
β. oppositifolia Fisch. et Mey.
— australis Hort. *III. 150.
— Bernadesii G. Don. III. 150. no. 19.
— betonicaefolia Dsf. III. 148. no. 3.
— brachysepala Fisch. *III. 150.
— Cavanillesii Knze. VI. 636. no. 1.
— Coromandeliana Vahl. III. 149. no. 9.
β. heterophylla Pers.
— *Coromandeliana* Vahl. III. 149. no. 10.
— Cretica Linn. III. 147. no. 1.
— Daenzeri Fouché et Chaub. III. 149. no. 15.
— Doniana Wlprs. III. 150. no. 18.
— erecta Fisch. *III. 150.
Celsia glabrata Bth. *III. 150.
— glandulosa Bouché. III. 148. no. 8.
— grandiflora Hortor. *III. 150.
— heterophylla Pers. III. 133. adn.
— interrupta Fresen. III. 149. no. 17.
— laciniata Poir. III. 148. no. 4.
— lanceolata Vent. III. 149. no. 12.
— *linearis* Jcq. III. 150. no. 1.
— Luciliae Boiss. III. 446. no. 21.
— lyrata G. Don. III. 150. no. 20.
— orientalis Linn. III. 148. no. 5.
— parviflora Dene. III. 149. no. 11.
— *parviflora* G. Don. III. 150. no. 18.
— Persica C. A. Meyer. III. 148. no. 6.
— pinnatifida Boiss. et Reut. III. 148. no. 2.
— sinuata Cavan. VI. 636. no. 1.
— sinuata Ten. *III. 150.
— speciosa Fenzl et Fridrichsthal. III. 149. no. 16.
— striatiflora Hort. *III. 150.
— sublanata Jcq. III. 149. no. 13.
— Suwarowiana C. Koch. III. 446. no. 22.
— viscosa Rth. III. 149. no. 10.
Cenia Commers. *II. 638. °VI. 723.
— geminata Knze. VI. 723.
Cenocline C. Koch. °VI. 209.
— acutiloba C. Koch. *VI. 209. no. 4.
— albida C. Koch. *VI. 209. no. 6.
— aurea C. Koch. *VI. 209. no. 1.
— chamaemelifolia C. Koch. VI. 210. no. 7.
— cinerea C. Koch. *VI. 209. no. 5.
— grandiflora C. Koch. *VI. 209. no. 3.
— globifera C. Koch. *VI. 209. no. 2.
— *pauciflora* C. Koch. VI. 191. no. 4.
Cenolophium Koch. *II. 403.
Cenostigma Tulasne. °V. 556.
— angustifolium Tulasne. V. 556. no. 2.
— Gardnerianum Tulasne. V. 556. no. 3.
— macrophyllum Tulasne. V. 556. no. 1.
Centaurea Lssng. II. 670. VI. 292.
Centaurea Pall. II. 676. no. 1.
— acaulis Linn. *β.* Haenseleri Boiss. II. 670. no. 1.
— amblyolepis Ldb. VI. 296. no. 31.
— Anatolica Griseb. VI. 295. no. 11.
— Aphrodisea Boiss. VI. 294. no. 8.
— *Balsamita* Don. VI. 291. no. 2.
— *Biebersteinii* DC. VI. 296. no. 19. *γ.*
— biflora Kaleniczenko. VI. 294. no. 9.
— Boissieri DC. II. 672. †
— Boissieri Wlprs. VI. 298. no. 32.
— bombycina Boiss. II. 672. †
— Cadmea Boiss. VI. 274. no. 7.
— calolepis Boiss. VI. 297. no. 25.
— *cana β. mathiolifolia* Griseb. VI. 296. no. 15.
— Candolleana Boiss. VI. 293. no. 5.

Centaurea Carduncelus Boiss. VI. 300. no. 37.
— Cariensis Boiss. VI. 297. no. 23.
— Castellana Boiss. VI. 297. no. 21.
— Chilensis Meyen et Wlprs. VI. 302. no. 45.
— ciliata Frivaldsky. VI. 296. no. 20.
— *Cineraria* d'Urville. VI. 296. no. 17.
— Clementei Boiss. II. 672. †
— crupinastrum Moris. VI. 292. no. 1.
— cyanoides Wahlbg. II. 671. no. 7.
— cyrtolepis Ldb. VI. 298. no. 29.
— *depressa* Pinard. VI. 295. no. 11
— *eryngioides* Sbthrp. VI. 298. no. 28.
— Euphratica Boiss VI. 293. no. 3.
— *Graeca* Boiss. VI. 298. no. 32.
— Graeca Griseb. VI. 298. no. 28.
— Granatensis Boiss. II. 672. †
— gymnocarpa Moris etNotar. II. 672. no. 8.
— Hellenica Boiss. VI. 301. no. 41.
— Hierapolitana Boiss. VI. 293. no. 6.
— hyalolepis Boiss. VI. 301. no. 42.
— intacta Ldb. VI. 297. no. 22.
— intricata Boiss. VI. 297. no. 26.
— Ispahanica Boiss. VI. 299. no. 36.
— Kolczygini Kaleniczenko. VI. 294. no. 10.
— *latisquama* DC. VI. 298. no. 27.
— Lydia Boiss. VI. 300. no. 40.
— lyrophylla Griseb. VI. 296. no. 18.
— Macedonica Boiss. VI. 299. no. 33.
— *macrocephala* Muss. VI. 291. no. 4.
— mathiolifolia Boiss. VI. 295. no. 15.
— *membranacea* Jacquem. II. 669. no. 4.
— microlonchoides Boiss. VI. 298. no. 31.
— *mixta* DC. VI. 301. no. 41.
— monticola Boiss. II. 672. †
— napulifera Rochel. VI. 295. no. 12.
— orientalis Linn. *II. 671. no. 2.
β. brachylepis Fisch. et Mey.
γ. macrolepis Fisch. et Mey.
— Ossica C. Koch. II. 671. no. 5.
— paniculata Linn. *VI. 296. no. 19.
ϑ. Macedonica Griseb.
η. micranthos Gmel.
ι. punctata Visiani.
— *pannosa* DC. VI. 296. no. 17.
— Parlatorii Heldreich. VI. 296. no. 16.
— Persica Boiss. VI. 299. no. 34.
— Phrygia Auct. *II. 671. no. 3.
α. ascendens Moritzi.
— phyllocephala Boiss. VI. 301. no. 43.
β. Persica Boiss. VI. 302. no. 43.
— Pinardi Boiss. VI. 295. no. 13.
— polyacantha Willd. II. 672. †
— polypodiifolia Boiss. VI. 293. no. 4.
— *Preauxiana* B. Webb. VI. 284. no. 3.
— Prolongi Boiss. II. 672. †
— Pseudobehen Boiss. VI. 302. no. 44.
Centaurea pulchra DC. II. 672. †
— regia Boiss. VI. 300. no. 38.
— *repens* Willd. II. 677. no. 1.
— Reuteriana Boiss. VI. 295. no. 14.
— Rhaetica Moritzi. II. 672. no. 9.
— rutaefolia Smith. VI. 296. no. 17.
— salicifolia Linn. *II. 671. no. 4.
β. abbreviata C. Koch.
α. elongata C. Koch.
γ. intermedia C. Koch.
— Salonitana Visiani. *VI. 298. no. 27.
— sclerolepis Boiss. VI. 300. no. 39.
— Spruneri Boiss. VI. 299. no. 35.
— subacaulis Ldb. VI. 298. no. 30.
— Sumensis Kaleniczenko. VI. 292. no. 2.
— *Tatarica* Rchb. II. 671. no. 2. γ.
— Toletana Boiss. et Reut. II. 671. no. 6.
Centaureae DC. II. 670. VI. 291.
Centauridium Torr. et Gr. II. 586. *II. 952. no. 51. II. 959. °VI. 127.
— Drummondii *II. 959. no. 1. VI. 127. no. 1.
Centaurium DC. VI. 292.
Centauropsis Boj. *II. 543.
Centradenia G. Don. II. 118. II. 917. V. 682.
— grandifolia Endl. II. 319. no. 2.
— inaequilateralis G. Don. II. 118. no. 1.
— rosea Lindl. II. 917. no. 1. *V. 682. no. 1.
Centranthera R. Br. III. 391. °III. 971. *VI. 650.
— Brunoniana Wall. III. 391. no. 2.
— grandiflora Bth. III. 391. no. 1.
— hispida R. Br. III. 391. no. 3.
— humifusa Wall. III. 391. no. 4.
— *Nepalensis* D. Don. III. 391. no. 3.
Centranthus DC. *II. 528. VI. 80.
— macrosiphon Boiss. VI. 80. no. 1.
Centratherum Cass. *II. 541.
Centridium Lindl. II. 705. no. 15. VI. 370.
Centrocarpha aristata D. Don. VI. 159. no. 1.
— *triloba* D. Don. VI. 159. no. 1.
Centroclinium Don. II. 679.
Centroclinium Endl. VI. 318.
— altissimum Poepp. et Endl. II. 679. no. 1.
Centrolobium Bth. I. 793. V. 541.
— Paraënse Tulasne. V. 541. no. 1.
— robustum Mart. I. 793. no. 1.
— tomentosum Guillem. I. 793. no. 2. V. 542. no. 2.
Centronia Don. *II. 120.
Centronota A. P. DC. *VI. 523.
Centropappus Hook. fil. °VI. 728.
— Brunonis Hook. fil. *VI. 728. no. 1.
Centropogon Prsl. II. 709. VI. 373.
— affinis Mart. et Galeotti. II. 709. no. 3.
— calycinus Bth. VI. 373. no. 2.
— cordatus Mart. et Galeotti. II. 709. no. 2.

Centropogon cordifolius Bth. VI. 374. no. 6.
— densiflorus Bth. VI. 374. no. 4.
— *fastuosus* Hort. Belg. VI. 733.
— fastuosus Scheidw. II. 709. no. 1.
— oblongus Bth. VI. 373. no. 1.
— prostratus Bth. VI. 374. no. 3.
— solanifolius Bth. VI. 374. no. 5.
— Surinamensis Prsl. *VI. 733.
Centrosema DC. I. 753. V. 529.
— acutifolium Bth. I. 754. no. 7.
— angustifolium Bth. *I. 754. no. 6.
— arenarium Bth. I. 754. no. 10.
— biflorum Mart. I. 755. no. 21.
— bifidum Bth. I. 753. no. 1.
— bracteosum Bth. I. 755. no. 17.
— brachypodum Bth. I. 754. no. 12.
— Brasilianum Bth. *I. 753. no. 4.
— coriaceum Bth. I. 753. no. 2.
— dasyanthum Bth. I. 755. no. 26.
— decumbens Mart. I. 755. no. 22. (cum var. β. ibid.)
— fasciculatum Bth. I. 756. no. 29.
— glabrum Bth. I. 754. no. 9.
— grandiflorum Bth. I. 755. no. 18.
— grandiflorum Wlprs. V. 529. no. 2.
— hastatum Bth. *I. 756. no. 30.
— heptaphyllum Moric. V. 529. no. 1.
— longifolium Bth. I. 754. no. 5.
— macrocarpum Bth. I. 756. no. 28.
— molle Mart. I. 755. no. 19.
— oblongum Bth. I. 754. no. 8.
— pascuorum Mart. I. 755. no. 23.
— Plumieri Bth. *I. 753. no. 3.
— pubescens Bth. I. 754. no. 15.
— rigidulum Bth. I. 755. no. 27.
— rotundifolium Mart. I. 754. no. 14.
— Salzmanni Bth. I. 755. no. 25.
— sinuatum Bth. I. 755. no. 24.
— verticillatum Bth. I. 754. no. 13.
— vetula Mart. I. 754. no. 16.
— vexillatum Bth. I. 754. no. 11.
— Virginianum Bth. I. 755. no. 20.
Centrosolenia Bth. °VI. 739.
— hirsuta Bth. VI. 740. no. 1.
Centrostemma Dcne. VI. 494.
— multiflorum Dcne. *VI. 494. no. 1.
Centunculus Linn. *VI. 447.
Cephaëlideae DC. II. 469. II. 941. VI. 36.
Cephaëlis Swtz. II. 470. VI. 36.
— Brasiliensis Cham. II. 470. no. 4.
— coriacea G. Don. II. 470. no. 3.
— ferruginea G. Don. II. 470. no. 2.
— fragrans Hook. et Arn. II. 470. no. 6.
— hirsuta Mart. et Galeotti. VI. 36. no. 1.
— hirta Miq. II. 941. no. 1.
— Ipecacuanha Rich. VI. 36. †
Cephaëlis Maranhaënsis G. Don. II. 470. no. 1.
— rosea Bth. II. 470. no. 5.
Cephalandra Schrad. II. 203.
— quinqueloba Schrad. *II. 203. no. 1.
Cephalanthae Choisy. (Ipomaea) VI. 533.
Cephalantheae DC. II. 469. VI. 700.
Cephalanthus Linn. II. 469. VI. 700.
— aralioides Zolling. et Moritzi. VI. 700. no. 1.
— *Chinensis* Lam. II. 491. no. 1.
— occidentalis Linn. *II. 469. no. 1. (c. var. β. ibid.)
— *pilulifer* Lam. II. 513. no. 2. VI. 71. no. 2.
— *stellatus* Lour. II. 511. no. 8.
Cephalaria Schrad. II. 532. VI. 84.
— ambrosioides Boiss. II. 533. no. 2.
— Cachemirica Dcne. II. 533. no. 5.
— *centauroides var.* DC. II. 533. no. 2.
— dichaetophora Boiss. VI. 84. no. 2.
— dipsacoides Kar. et Kir. II. 533. no. 4.
— juncea Boiss. VI. 84. no. 3.
— macrophylla Griseb. VI. 84. no. 1.
— procera Fisch. et Lallem. II. 533. no. 3.
— setosa Boiss. II. 532. no. 1.
Cephalohyptis Bth. III. 539. VI. 659. no. 2.
Cephalopappus Nees et Mart. *II. 682. *VI. 326.
Cephalophora Cav. II. 627.
Cephalophora DC. VI. 179. (ex p.)
— Douiana Hook. et Arn. II. 627. no. 1.
— *elongata* Don. II. 627. no. 1.
— *scaposa* DC. VI. 180. no. 6.
— *suffruticosa* Don. II. 627. no. 1.
Cephalophorus Miq. II. 325. V. 818.
Cephalorhynchus Boiss. °VI. 353.
— Aucheri Boiss. VI. 354. no. 2.
— glandulosus Boiss. VI. 354. no. 1.
Cephalospartum Spach. (Genista) V. 469.
Cephalostigma Alph. DC. *II. 710. VI. 381.
— hirsutum Edgwrth. VI. 381. no. 1.
— Perrottetii Alph. DC. *VI. 734.
Cephaloteae Endl. II. 265.
Cephalotus Labill. II. 265.
— follicularis Labill. *II. 265. no. 1.
Ceradia Lindl. °VI. 727.
— furcata Lindl. VI. 727. no. 1.
Ceramanthe Rchb. III. 164.
Ceranthera linearifolia Elliot. III. 745. no. 1.
Cerasa amoris racemosa rubra Bauh. III. 301. no. 8. *α.*
Ceraseidos Siebold. et Zucc. °V. 648.
— apetala Sieb. et Zucc. *V. 648. no. 1.
Cerasophora Neck. II. 9.
Cerasus Juss. II. 8. II. 9. II. 910. V. 618.
— *acuminata* Wall. II. 10. no. 23.

Cerasus Brasiliensis Cham. et Schlchtd. II. 10. no. 27.
— *Bungei* Wlprs. II. 9. no. 12.
— *cornuta* Wall. II. 9. no. 14.
— *demissa* Nutt. II. 10. no. 21.
— *densiflora* Spach. II. 10. no. 18.
— *Duerinckii* Martens. II. 10. no. 19.
— *emarginata* Dougl. II. 9. no. 16.
— *fimbriata* Spach. II. 10. no. 18.
— *humilis* Moris. II. 9. no. 15.
— *Japonica* DC. II. 9. no. 10.
— *ilicifolia* Nutt. II. 10. no. 25.
— *incana* Spach. II. 911. no. 2.
— *micrantha* Spach. II. 10. no. 18. β.
— *mollis* Dougl. II. 9. no. 17.
— *Virginiana* DC. II. 10. no. 18.
— *obovata* Beck. II. 10. no. 18.
— *opaca* Bth. V. 648. no. 1.
— *orientalis* Spach. II. 911. no. 5.
— *pectinata* Spach. II. 911. no. 4.
— *prostrata* Lois. II. 911. no. 3.
— *Puddum* DC. II. 9. no. 11.
— *reflexa* Gardn. II. 910. no. 1.
— *samydoides* Schlchtd. II. 10. no. 26.
— *serotina* DC. II. 10. no. 20.
Ceratella Hook. fil. °VI. 227.
— rosulata Hook. fil. VI. 227. no. 1.
Ceratiosycios N. ab E. II. 222. V. 775.
— Ecklonis N. ab E. *II. 222. no. 1. V. 775. no. 1.
Ceratocaulis Bernhardi. (Datura) III. 18.
Ceratocephalus Mnch. I. 46.
— falcatus Poir. I. 46. †
— orthoceras DC. I. 46. †
Ceratonia L. *I. 855.
Ceratopetalum Sm. *II. 373. V. 829.
— apetalum Caley. V. 829. no. 2.
— gummiferum Smith. V. 829. no. 1.
— montanum D. Don. V. 829. no. 3.
— *ovatum* Caley. II. 373. no. 1. V. 829. no. 1.
Ceratophyllum demersum Blume. V. 671. no. 1.
Ceratosanthes Schrad. II. 202.
— *tuberosa* Schrad. II. 202. no. 1.
Ceratostachys Blume. *II. 68.
Ceratostemma Juss. *II. 723. VI. 408.
— buxifolium Gardn. VI. 408. no. 1.
— lanceolatum Bth. VI. 409. no. 3.
— loranthiflorum Bth. VI. 409. no. 2.
— parvifolium Bth. VI. 409. no. 5.
— rigidum Bth. VI. 409. no. 6.
— Salapa Bth. VI. 409. no. 4.
Ceratotheca Endl. *VI. 518.
Cerbera Linn. VI. 468.
— lactaria Hamilt. *VI. 468. no. 2.
— Odollam Grtnr. *VI. 468. no. 1.
Cercidium Tulasne. °V. 552.
— spinosum Tulasne. V. 553. no. 1.
Cercis Linn. I. 808. *I. 853.
— Chinensis Bnge. I. 808. no. 1.
Cercocarpeae Torr. et Gr. II. 45. V. 656.
Cercocarpus H. B. Kth. II. 45.
— betulaefolius Nutt. II. 46. no. 2.
— *betuloides* Nutt. II. 46. no. 2.
— *fothergilloides* Torr. II. 46. no. 1.
— ledifolius Nutt. II. 46. no. 3.
— parvifolius Nutt. II. 45. no. 1.
Cercocoma Wall. *VI. 474.
Cercodia Murr. II. 99. V. 672.
— *alternifolia* All. Cunn. II. 99. no 8.
— *incana* All. Cunn. II. 99. no. 9.
Cercostylos Lssng. *II. 627.
Cereastri Pfeiff. (Cereus) II. 325.
Cerei alati Pfeiff. II. 341.
Cerei serpentini globosi S. Dyck. II. 333.
Cereus Haw. II. 325. V. 818.
Cereus Haw. (ex p.) V. 818.
— *aciniformis* H. Berol. II. 332. no. 78. β.
— *Ackermanni* Otto. II. 341. no. 1.
— *acromelas* Hort. Berol. II. 328. no. 32.
— acutangulus Otto. II. 334. no. 96.
— *Aethiops* Haw. II. 328. no. 34.
— *affinis* Hort. II. 334. no. 91.
— *affinis* H. Berol. II. 332. no. 75.
— Alacripontanus Mart. II. 329. no. 40.
— *alatus* DC. II. 342. no. 5.
— alatus Lk. et Otto. II. 343. no. 6.
— albisetosus Haw. II. 336. no. 117.
— albispinus S. Dyck. II. 328. no. 33.
— ambiguus DC. II. 334. no. 88.
— anisacanthus DC. II. 331. no. 65
β. ortholophus Pfeiff.
γ. subspiralis Pfeiff.
— *Antoini* H. Vindob. II. 336. no. 113.
— *Aquicaulensis* Hort. II. 329. no. 48.
— Arequipensis Meyen. II. 329. no. 45.
— armatus Otto. II. 327. no. 22.
— articulatus Otto et Dietr. II. 333. no. 83.
— aureus S. Dyck. II. 328. no. 29.
— *aureus β. pallidior* Hort. Dyck. II. 328. no. 30.
— azureus Parm. II. 328. no. 35.
— Baxaniensis Karw. II. 335. no. 101.
— Beneckei C. Ehrnbrg. V. 819. no. 8.
— *biformis* Hort. II. 336. no. 115.
— *biformis* Lindl. V. 817. no. 1. [ubi deleatur] cf. VI. 773. adn.
— bifrons Haw. II. 338. no. 131.
— Bonplandii Parm. II. 335. no. 99.
— bradypus Lehm. II. 325. no. 1.
— *brevispinulus* S. Dyck. II. 336. no. 113.
— caerulescens S. Dyck. II. 328. no. 34.

Cereus caesius S. Dyck. II. 329. no. 47.
— calvescens DC. II. 329. no. 43.
— callicoche Scheidw. II. 338. no. 132.
— *candelabrius* Hort. II. 335. no. 103.
— candelaris Meyen. II. 329. no. 44.
— candicans Gill. II. 330. no. 51.
β. tenuispinus Pfeiff.
— *chalybaeus* Otto. II. 340. no. 150.
— Chilensis Colla. II. 328. no. 37.
— *Chilensis* Hort. II. 339. no. 144.
— chlorocarpus DC. II. 331. no. 63.
— cinerascens DC. II. 332. no. 78.
β. crassior DC.
γ. tenuior DC. II. 333. no. 78.
— *clavarioides* Hort. Berol. II. 353. no. 82.
— *coccineus* DC. II. 338. no. 128. β.
— coccineus S. Dyck. II. 338. no. 131.
— *cognatus* Hort. II. 334. no. 91.
— *Columna* Karwinski. V. 818. no. 2.
— Columna Trajani Karw. II. 325. no. 2.
— Cometes Scheidweil. II. 341. no. 151.
— *Cometes* Scheidweil. V. 818. no. 5.
— *compressus* Mill. II. 337. no. 121.
— conicus Otto. II. 331. no. 68.
— *Coquimbanus* Hort. II. 328. no. 37.
— *crenatus* Lindl. V. 820. no. 1.
— crenulatus S. Dyck. II. 328. no. 32.
β. griseus S. Dyck.
— *crimson creeping* Bot. Regist. II. 335. no. 106.
— *crispatus* Hort. Berol. II. 342. no. 1.
— *crispatus crenulatus* H. Berol. II. 342. no. 2.
— *Cubensis* Zucc. II. 331. no. 58.
— *cupulatus* Hort. II. 331. no. 66.
— Curtisi Otto. II. 327. no. 23.
— *Curtisii* Otto. V. 818. no. 4.
— curvispinus Bertero. II. 329. no. 46.
— *curvispinus* Hort. Darmst. II. 325. no. 11.
— *cylindricus* Haw. II. 352. no. 70.
— *decagonus* Hortor. II. 328. no. 33.
— deficiens Otto et Dietr. II. 339. no. 145.
— denudatus Otto. II. 325. no. 3.
— *Deppei* Hort. Berol. II. 332. no. 78.
— dichroacanthus Mart. II. 326. no. 7.
— divaricatus DC. II. 331. no. 61.
— divergens Otto. II. 331. no. 60.
— Donkelaarii S. Dyck. V. 820. no. 10.
— Dumortieri Scheidw. II. 338. no. 133.
— Dyckii Mart. II. 329. no. 39.
— eburneus S. Dyck. II. 329. no. 49.
γ. monstrosus S. Dyck. II. 330. no. 49.
δ. monstrosus ramosus II. 330. no. 49.
β. polygonus II. 330. no. 49.
— Ehrenbergii Pfeiff. II. 341. no. 158.
— *elegans* Hort. II. 344. no. 1.
Cereus erectus Karw. II. 331. no. 62.
— eriocomus Rchb. II. 340. no. 147.
— eriophorus Otto. II. 330. no. 58.
β. laetevirens S. Dyck. II. 331. no. 58.
— euphorbioides Haw. II. 330. no. 53.
— *exerens* Lk. II. 332. no. 75.
— extensus S. Dyck. II. 337. no. 127. V. 820. †
— *Eyriesii* Otto. II. 324. no. 8.
— farinosus Haage. V. 820. no. 9.
— Fernambucensis Lam. II. 339. no. 137.
— ferox Haw. II. 326. no. 14.
— *fimbriatus* DC. II. 330. no. 54. et no. 55.
— flavispinus S. Dyck. II. 327. no. 25.
— flagelliformis Mill. II. 335. no. 105.
β. minor S. Dyck.
— flagriformis Zucc. II. 335. no. 107.
— flavescens Otto. II. 326. no. 17.
— floccosus Otto. II. 327. no. 21.
— Fluminensis Miq. II. 340. no. 156.
— *formosus* Hort. II. 334. no. 93.
— *formosus* Hort. Monac. II. 338. no. 130.
— foveolatus Haage. II. 326. no. 9.
— fulvibarbis Otto et Dietr. II. 339. no. 144.
— fulvispinosus Haw. II. 327. no. 24.
— Garipensis DC. II. 336. no. 114.
— geminisetus Rchb. II. 340. no. 148.
— gemmatus Zucc. II. 331. no. 64.
— geometrizans Mart. II. 329. no. 48.
— gibbosus S. Dyck. II. 325. no. 5.
— gilvus S. Dyck. V. 819. no. 7.
— gladiator Otto et Dietr. II. 340. no. 153.
— *gladiatus* Lam. II. 330. no. 51.
— *glaucus* Hort. II. 329. no. 47. II. 332. no. 91. II. 334. no. 69.
— glaucus S. Dyck. II. 332. no. 70.
— *gloriosus* Hort. II. 327. no. 20.
— *gracilis* S. Dyck. II. 336. no. 118.
— *gracilis* Mill. II. 330. no. 56.
— grandis Haw. II. 332. no. 73.
— grandiflorus Mill. II. 336. no. 112.
β. speciosissimus Pfeiff.
— grandispinus Haw. II. 330. no. 55.
— *griseus* Haw. II. 330. no. 49. β.
— *hamatus* Scheidw.? II. 339. no. 142.
— hamatus Scheidw. II. 339. no. 141.
— Haworthii DC. II. 327. no. 26.
— *heptagonus* Hort. II. 329. no. 41.
— *hexangularis* Hort. II. 334. no. 91.
— *hexagonus* Hort. II. 329. no. 41.
— *Hookeri* Otto. II. 341. no. 5.
— *horridus* Hort. II. 337. no. 127.
— horridus Otto. II. 339. no. 140.
— horridus Otto et Dietr. II. 340. no. 151.
— Humboldtii DC. II. 336. no. 109.

Cereus humilis DC. II. 336. no. 118.
β. minor Pfeiff.
— *hybridus* H. Berol. II. 338. no. 129. *β.*
— Hystrix S. Dyck. II. 330. no. 50.
— Jamacaru S. Dyck. II. 332. no. 69.
— *janthothele* H. Monv. V. 821. no. 1.
— icosigonus DC. II. 336. no. 110.
— *imbricatus* Haw. II. 352. no. 71.
— *imbricatus* Hortor. II. 330. no. 57.
— *incrustatus* H. Berol. II. 331. no. 66.
— *incurvispinus* H. Darmst. II. 324. no. 4.
— inermis Otto. II. 337. no. 120.
— *inermis* Scheidw. II. 338. no. 132.
— *Kageneckii* Gmel. II. 326. no. 10.
— *Knightii* Parment. II. 345. no. 3.
— laetevirens Otto. II. 332. no. 72.
— *laetevirens* S. Dyck. II. 334. no. 91.
— laetus DC. II. 334. no. 94.
— laetus S. Dyck. II. 334. no. 93.
— lamprochlorus Lem. II. 340. no. 155.
— lanatus DC. II. 326. no. 13.
— *lanuginosus* Mill. II. 327. no. 20.
— lanuginosus Haw. II. 327. no. 19.
— *lanuginosus* var. *aureus* Hort. Mediol. II. 326. no. 12.
β. glaucescens Pfeiff. II. 327. no. 19.
— *latifrons* Pfeiff. II. 341. no. 4.
— Lecchii Colla. II. 326. no. 12.
— *leptacanthus* DC. II. 333. no. 79. *β.*
— leptophis DC. II. 336. no. 108.
— *leucanthus* Pfeiff. II. 324. no. 4. II. 325. no. 11.
— Limensis Salm-Dyck. V. 818. no. 1.
— *Linkii* Lehm. II. 310. no. 2.
— lividus Pfeiff. II. 332. no. 71.
— longispinus Salm-Dyck. V. 819. no. 3.
— lumbricoides Lem. II. 341. no. 161.
— lutescens S.-Dyck. II. 328. no. 30.
— Maclenii Pfeiff. II. 339. no. 143.
— magnus Haw. II. 326. no. 15.
— *Mallisoni* Hort. II. 335. no. 106.
— marginatus DC. II. 331. no. 66.
— *marginatus* S.-Dyck. II. 342. no. 5.
— *Mariculi* Hort. II. 336. no. 118.
— Martianus Zucc. II. 335. no. 104.
— *Melocactus* Vell. II. 340. no. 156.
— *Mendory* Hort. II. 328. no. 34.
—? micracanthus DC. II. 326. no. 18.
— *Mirbelii* H. Belg. II. 331. no. 66.
— *mollis* Hort. II. 327. no. 27.
— moniliformis DC. II. 333. no. 81.
— monoclonos DC. II. 329. no. 42.
— *monstrosus* Hortor. II. 329. no. 41. *β.*
— *Montevidensis* Hort. II. 314. no. 45.
— *Montezumae* Hort. II. 330. no. 51.
— Moritzianus Otto. II. 328. no. 31.
Cereus multangularis Haw. II. 326. no. 10.
β. pallidior Pfeiff.
— *multangularis spinis albis* Hort. II. 326. no. 10.
— *multiplex* Pfeiff. II. 324. no. 1.
— *Myosurus* S.-Dyck. II. 345. no. 2.
— *myriacaulon* Mart. II. 336. no. 118. *β.*
—? nanus DC. II. 333. no. 86.
— Napoleonis Graham. II. 337. no. 122.
— niger S.-Dyck. II. 327. no. 28.
β. gracilior S.-Dyck. II. 328. no. 28.
— *nigricans* Hort. II. 327. no. 27.
— nigricans Lem. II. 338. no. 135.
— nitens Salm-Dyck. V. 818. no. 2.
— *nobilis* Haw. II. 327. no. 26.
— nycticalus Lk. II. 336. no. 113.
— obtusus Haw. II. 334. no. 90.
— *obtusus* Hort. II. 336. no. 113.
— *ochracanthus* Hortor. II. 326. no. 10.
— *octogonus* Hort. Angl. II. 327. no. 23. II. 328. no. 33.
— Olfersii Otto. II. 331. no. 67.
— *Ottonis* Lehm. II. 309. no. 1.
— ovatus Pfeiff. II. 333. no. 82.
— *oxygonus* Lk. et Otto. II. 325. no. 10.
— *oxypetalus* DC. II. 341. no. 3.
— paniculatus DC. II. 334. no. 95.
— parvisetus Otto. II. 326. no. 16.
— pellucidus Otto. II. 334. no. 97.
— pentagonus Haw. II. 335. no. 102.
— pentalophus DC. II. 333. no. 79.
α. simplex Pfeiff.
β. subarticulatus Pfeiff.
— Pepinianus Lemaire. V. 819. no. 5.
— *Perotettii* Hort. II. 332. no. 71.
— Peruvianus Tabern. II. 329. no. 41.
β. monstrosus DC.
— Pfeifferi Parm. II. 339. no. 139.
— *phyllanthoides* DC. II. 341. no. 2.
— *Phyllanthus* DC. II. 342. no. 6.
— *Phyllanthus* Hook. II. 342. no. 5.
— *Phyllanthus flore majore* DC. II. 341. no. 5.
— *Pitajaya* DC. II. 334. no. 91.
— Pitaya DC. * V. 820. no. 11.
— polychaetus Rchb. II. 340. no. 150.
— *polygonatus* Hort. II. 330. no. 49. *β.*
— polygonus DC. II. 334. no. 89.
— *polygonus* DC. V. 818. no. 6.
— polylophus DC. II. 326. no. 8.
— *polylophus* DC. V. 818. no. 3.
— polyptychus Lem. II. 338. no. 134.
— princeps H. Würzb. II. 334. no. 98.
— prismaticus S.-Dyck. II. 337. no. 126.
— *prismatiformis* Hort. II. 334. no. 91.
— *propinquus* DC. II. 333. no. 79. *α.*
— *pteranthus* Lk. II. 336. no. 113.

Cereus pterocaulis Hort. II. 345. no. 4.
— pterogonus Lem. II. 341. no. 160.
— *pugioniformis* Lem. II. 340. no. 153.
— pulchellus Pfeiff. II. 325. no. 4.
— pycnacanthus Salm-Dyck. V. 819. no. 6.
— *quadrangularis* Haw. II. 336. no. 114.
— *quadrangularis* Hort. II. 334. no. 91.
— *Quintero* H. Götting. II. 328. no. 37.
— radicans DC. II. 336. no. 115.
— ramosus Karw. II. 335. no. 100.
— *ramulosus* S.-Dyck. II. 342. no. 3.
— reductus DC. II. 325. no. 6.
— regalis Haw. II. 330. no. 52.
— repandus Haw. II. 330. no. 56.
— *repandusspinisaureis* Hort. II. 327. no. 27
— *reptans* S.-Dyck. II. 336. no. 115.
— resispinatus S.-Dyck. II. 339. no. 146.
— *retroflexus* Hortor. II. 332. no. 77.
— *rhombeus* S.-Dyck. II. 342. no. 2.
— *roridus* Hort. Berol. II. 311. no. 19.
— *rosaceus* Hort. II. 336. no. 113.
— rostratus Lem. II. 339. no. 142.
— *rostratus* Lem. II. 339. no. 141.
— *Royeni* Bot. Mag. II. 327. no. 23.
— Royeni Haw. II. 327. no. 20.
— *Royeni* Hort. Goett. II. 327. no. 19.
— *Royeni* Linn. II. 327. no. 20.
— *Russelianus* Gardn. II. 936. no. 1.
— *Scopa* DC. II. 314. no. 43.
— *Schelhasii* Pfeiff. II. 324. no. 9.
— Schrankii Zucc. II. 338. no. 130.
— *Scolopendrii folio brachiato* Dill. II. 342. no. 6.
— senilis DC. II. 325. no. 1.
— *senilis* DC. V. 818. no. 1.
— sepium DC. II. 336. no. 111.
— *sericeus* Hort. II. 353. no. 82.
—? serpens DC. II. 333. no. 85.
— serpentinus Lagasca. II. 333. no. 87.
— serruliflorus Haw. II. 330. no. 54.
— setaceus S.-Dyck. II. 337. no. 128.
  β. viridior S.-Dyck. II. 338. no. 128.
— setiger Haw. II. 337. no. 119.
— Smithii H. Angl II. 335. no. 106.
— *speciosissimus* DC. ξ. II. 338. no. 129.
— speciosissimus DC. II. 338. no. 129.
  σ. albiflorus DC.
  ρ. aurantiacus DC.
  μ. coccineus grandiflorus DC.
  η. Curtisii DC.
  ι. Devauxii DC.
  ξ. Eugenia Hort.
  τ. grandiflorus DC.
  ζ. Guillardieri DC.
  γ. Jenkinsonii H. Angl.
  ε. ignescens H. Dresd.
  λ. Kiardi DC.
  β. lateritius B. Reg.
  κ. Lothii DC.
  π. Makoyi DC.
  ο. Mayfly DC.
  ϑ. Roydii DC.
  ν. unduliflorus DC.
  δ. Vandesii H. Angl.
— *speciosus* Hort. II. 334. no 91.
— spinibarbis Otto. II. 328. no. 36.
— spinulosus DC. II. 336. no. 116.
— *squamulosus* S.-Dyck. II. 344. no. 1.
— stellatus Pfeiff. II. 328. no. 38.
— strictus DC. II. 327. no. 27.
— strigosus S.-Dyck. II. 326. no. 11.
— sublanatus S.-Dyck. II. 332. no. 76.
— subrepandus Haw. II. 330. no. 57.
— *subrepandus* Hort. II. 328. no. 37. II. 331. no. 58.
— *subsquamatus* Pfeiff. II. 337. no. 127.
— subuliferus Salm-Dyck. V. 819. no. 4.
— *Surinamensis* Ephem. nat. II. 329. no. 42.
— syringacanthus Pfeiff. II. 333. no. 84.
— tenellus S.-Dyck. II. 335. no. 103.
— tenuis Pfeiff. II. 340. no. 157.
— *tenuispinus* Haw. II. 345. no. 2.
— Terscheckii Parm. II. 339. no. 138.
— tetragonus Haw. II. 332. no. 74.
  β. minor S.-Dyck.
— thalassinus Otto et Dietr. II. 340. no. 152.
— tilophorus Pfeiff. II. 332. no. 77.
— tortuosus Forbes. II. 340. no. 154.
— triangularis Haw. II. 337. no. 121.
  β. major Pfeiff.
  γ. pictus Pfeiff.
— *triangularis major* Salm-Dyck. II. 337. no. 122.
— trigonus Haw. II. 337. no. 124.
  β. quadrangularis Pfeiff.
— *trigonus* Hort. II. 334. no. 91.
— tripteris S.-Dyck. II. 337. no. 125.
— triqueter Haw. II. 337. no. 123.
— *truncatus* DC. II. 342. no. 1.
— *truncatus* var. *Altensteinii* H. Berol. II. 342. no. 2.
— tuberosus Pfeiff. II. 333. no. 80.
— *tubiflorus* Pfeiff. II. 324. no. 2.
— *tunicatus* Lehm. II. 353. no. 73.
— *turbinatus* Pfeiff. II. 324. no. 6.
— *undatus* Haw. II. 337. no. 121. β.
— undatus Otto. II. 331. no. 59.
— *undulatus* Hort. Dresd. II. 331. no. 96.
— *undulosus* DC. II. 334. no. 91.
— validus Haw. II. 334. no. 92.
— variabilis Pfeiff. II. 334. no. 91.
— *variabilis* Pffr. V. 820. no. 11.

Cereus violaceus Lem. II. 338. no. 136.
— virens DC. II. 332. no. 75.
— xanthochaetus Rchb. II. 310. no. 149.
Cerinthe Linn. *VI. 557.
Cerintheae DC. VI. 557.
Ceriops Arn. II. 70.
— Candolleana Arn. *II. 70. no. 1.
— Roxburghiana Arn. II. 70. no. 2.
Cerocarpus Hsskrl. °V. 756.
— aquea Hsskrl. *V. 756. no. 1.
Ceropegia Linn. VI. 494.
— oculata Hook. VI. 494. no. 1.
— stapeliaeformis Haw. VI. 491. †
Ceropegiae Dcne. VI. 493.
Cervana Forsk. *II. 602. *II. 955. no. 1.
Cervaneae C. H. Schultz. II. 955.
Cervaria DC. II. 410.
Cervia Rodigr. *VI. 516.
Cerviana Minuart. II. 241. no. 4. *a.*
Cervillea DC. *II. 955. no. 2.
Cesatia Endl. II. 384. V. 839.
— ornata Endl. *II. 384. no. 1. V. 839. no. 1.
Cestrineae Endl. III. 114. III. 955. VI. 620.
Cestrineae Miers. VI. 566.
Cestrum Linn. III. 114. °III. 955. °VI. 620.
Cestrum L. (ex p.) III. 122.
Cestrum ......? Schlchtd. VI. 628. no. 42.
— ......? Schlchtd. VI. 628. no. 43.
— acuminatum Sweet. *III. 121.
— affine H. B. Kth. III. 116. no. 14.
— alaternoides Desf. III. 120. no. 43.
— amictum Schlchtd. III. 117. no. 23.
— *amictum* Schlchtd. VI. 624. no. 18. *β.*
— angustifolium Lodd. III. 121. no. 60.
— arvense Arrabida. *III. 121.
— arvense Vellozo. *VI. 627. no. 35.
— auriculatum L'Hérit. III. 118. no. 35.
— *auriculatum* L'Hérit. III. 119. no. 38.
— aurantiacum Lindl. III. 934. VI. 628. †
— axillare Arrabida. *III. 121.
— *axillare* Vellozo. VI. 623. no. 15.
— *Bogotense* Willd. III. 114. no. 2.
— bracteatum Lnk. et Otto. III. 117. no. 24. VI. 624. no. 18.
  β. amictum Sendtner. } VI. 624. no. 18.
  γ. longiflorum Sendtn. } VI. 624. no. 18.
  δ. longifolium Sendtn. } VI. 624. no. 18.
  ε. parviflorum Sendtn. } VI. 624. no. 18.
— buxifolium H. B. Kth. III. 114. no. 1.
— calycinum Willd. III. 115. no. 11. *VI. 622. no. 8.
— *campanulatum* Lam. III. 112. no. 1.
— candidum Seem. et J. Schmidt. III. 952 b.
— *cauliflorum* Jcq. III. 112. no. 1.
— *citrifolium* Retz. III. 120. no. 43. III. 122. no. 1.
Cestrum collinum Miers. VI. 627. no. 37.
— confertiflorum Schlchtd. VI. 625. no. 26.
— *confertum* Mill. III. 114. no. 6.
— conglomeratum Rz. et Pav. III. 115. no. 13.
— Corcovadense Miers. VI. 628. no. 40.
— cordatum Schott. VI. 627. no. 34.
— coriaceum Miers. VI. 628. no. 41.
— corymbosum Schlchtd. III. 114. no. 5.
— cuspidatum Sendtner. VI. 627. no. 32.
— diurnum Linn. III. 116. no. 15.
— dubium Steud. III. 115. no. 8.
— dumetorum Schlchtd. III. 121. no. 52.
— *elongatum* Hort. III. 952 b.
— elongatum Hortor. *III. 121.
— eriochiton Sendtner. VI. 623. no. 17.
— euanthes Schlchtd. III. 119. no. 41.
— exstipulatum Ledeb. III. 120. no. 44.
— *fasciculare* Otto. III. 122. no. 1.
— fastigiatum Jcq. III. 116. no. 17.
— *floribundum* Willd. III. 116. no. 19.
— foetidissimum Jcq. III. 116. no. 18.
— foetidum Medic. III. 121. no. 54.
— Gardneri Sendtner. VI. 621. no. 3.
— glaucescens Sendtner. VI. 625. no. 25.
— glomeratum Schott. VI. 622. no. 9.
— *Granadense* Willd. III. 119. no. 37.
— grandistipulum Sendtner. VI. 622. no. 12.
  β. extipulatum Sendtner. VI. 623. no. 12.
— *Hediunda* Lam. III. 118. no. 35.
— hirsutum Jcq. III. 119. no. 42.
— hirtellum Schlchtd. III. 121. no. 51.
— *hirtum* Sieb. VI. 622. no. 6.
— hirtum Swrtz. III. 120. no. 47.
— *Jamaicense* Lam. III. 115. no. 6.
— *Jamaicense β.* Lam. III. 119. no. 38.
— intermedium Sendtner. VI. 625. no. 23.
— laevigatum Schlchtd. III. 117. no. 22. *VI. 623. no. 15.
  α. evolutum Schlchtd. } III. 117. no. 22.
  β. pauperculum Schlchtd. } III. 117. no. 22.
  γ. puberulum Sendtn. VI. 623. no. 15.
— *laevigatum β. pauperculum* Schlchtd. III. 118. no. 29.
— lanatum Martens et Galeotti VI. 626. no. 31.
— lanceolatum Miers. VI. 627. no. 36.
— lanceolatum Schott. VI. 623. no. 13.
  β. rugulosum Sendtn.
— lancifolium Schlchtd. VI. 626. no. 30.
— latifolium Lam. III. 116. no. 21.
— laurifolium L'Hérit. III. 121. no. 53.
— laxum Bth. III. 118. no. 32.
— longiflorum Rz. et Pav. III. 118. no. 30.
— *lycioides* Lichtenst. III. 123. no. 3.
— lycioides Sendtner. VI. 621. no. 4.
— macrophyllum Venten. III. 120. no. 49.
— Maraquitense H. B. Kth. III. 114. no. 2.

Cestrum Martii Sendtner. VI. 625. no. 24.
— montanum Miers. VI. 627. no. 39.
— mucronatum Miers. VI. 627. no. 38.
— multiflorum Roem. et Schult. III. 118. no. 36.
— *multiflorum* Schlchtd. III. 117. no. 25.
— *multiflorum* Schott. VI. 623. no. 15.
— Mutisii Willd. III. 121. no. 57.
— nervosum Mill. III. 121. no. 55.
— nitidum Martens et Galeotti VI. 626. no. 28.
— nocturnum L'Hérit. III. 120. no. 48.
— oblongifolium Schlchtd. VI. 626. no. 29.
— obovatum Sendtner. VI. 621. no. 5. (cum var. β.)
— odontospermum Jcq. III. 116. no. 16.
— *oppositifolium* Lam. III. 123. no. 2.
— *Organense* Miers. VI. 621. no. 18. β.
— *ovatum* Willd. III. 116. no. 19.
— pallidum Lam. III. 117. no. 26.
— paniculatum Willd. III. 117. no. 27.
— Parqui L'Hérit. III. 119. no. 38.
— parvifolium Willd. III. 121. no. 58.
— pauciflorum N. ab E. III. 114. no. 4.
— pauciflorum Willd. III. 121. no. 59.
— pedicellatum Sendtner. VI. 627. no. 33.
— pendulinum Jcq. III. 114. no. 3.
— *Peruvianum* Willd. III. 116. no. 14.
— petiolare H. B. Kth. III. 115. no. 12.
— Plukenetii Tausch. III. 119. no. 39.
— Poeppigii Sendtner. VI. 622. no. 6.
— polyanthum Sendtner. VI. 623. no. 16.
— *polyanthum* Steud. III. 117. no. 25.
— propinquum Martens et Galeotti. VI. 624. no. 19.
— pseudoquina Mart. III. 115. no. 9
— psychotriaefolium Schlchtd. VI. 626. no. 27.
— *pubescens* Lichtenst. III. 123. no. 4.
— *racemosum* Rz. et Pav. III. 117. no. 22. β. VI. 623. no. 15.
— racemosum Rz. et Pav. III. 118. no. 29.
— *racemosum* Tausch. III. 115. no. 8.
— *ramosissimum* Hort. Patav. III. 115. no. 6.
— ramosissimum Nocca. *III. 121.
— reflexum Sendtner. VI. 624. no. 20.
— *reticulatum* Willd. III. 115. no. 13.
— roseum H. B. Kth. III. 115. no. 7. III. 934.
— salicifolium Jcq. III. 119. no. 40.
— scandens Vahl. III. 117. no. 28.
— Schlechtendalii G. Don. III. 117. no. 25.
— *Schottii* Pohl. VI. 624. no. 18. ε.
— Schottii Sendtner. VI. 622. no. 10.
— Sellowianum Sendtner. VI. 624. no. 21.
— Sendtnerianum Martius. VI. 623. no. 14.
— sessiliflorum Schott. VI. 622. no. 11.
— spicatum Mill. III. 121. no. 56.
— stipulatum Arrabida. *III. 122.
Cestrum strictum Schott. VI. 621. no. 2.
— strigillatum Rz. et Pav. III. 118. no. 31.
— suberosum Jcq. III. 120. no. 46.
— subpulverulentum Mart. III. 115. no. 10. β. ovale Sendtner. VI. 622. no. 7.
— subsessile Arrabida. *III. 122.
— *subsessile* Vellozo. VI. 622. no. 10.
— tenuiflorum H. B. Kth. III. 116. no. 19.
— thyrsoideum H. B. Kth. III. 118. no. 34.
— tinctorium Jcq. III. 116. no. 20.
— tomentosum Linn. III. 119. no. 37.
— tubulosum Sendtner. VI. 621. no. 1.
— undulatum Rz. et Pav. III. 120. no. 45.
— *venenatum* Lam. III. 121. no. 53.
— *venenatum* Mill. III. 117. no. 26.
— *venenatum* Thbg. III. 122. no. 1.
— *venosum* Willd. III. 115. no. 12.
— *venulatum* Hort. II. 830. no. 5.
— *vespertinum* Hort. III. 123. no. 1.
— vespertinum Linn. III. 114. no. 6.
— *vespertinum* Poepp. VI. 622. no. 6.
— vestioides Schlchtd. III. 120. no. 50.
— vestitum Hook. III. 118. no. 33.
— *vestitum* Hook. VI. 631. no. 2.
— viminale Sendtner. VI. 625. no. 22.
— *virgatum* Rz. et Pav. III. 119. no. 38.
— *viridiflorum* Hook. VI. 622. no. 8.
— *Willdenowii* Steud. III. 121. no. 59.
Cevallia Lag. II. 227.
— sinuata Lag. II. 227. no. 1.
Chabraea DC. VI. 322.
Chabraea DC. II. 682. (ex p.)
— purpurea DC. *VI. 322. no. 1.
— *rosea* DC. VI. 322. no. 2.
— runcinata Hook. *VI. 322. no. 2.
— suaveolens DC. *VI. 322. no. 3.
Chacaul Feuill. III. 161. no. 67. β.
Chadara tenax Forsk. I. 362. no. 24.
Chadsia Bojer. °V. 545.
— flammea Bojer. V. 545. no. 1.
— versicolor Bojer. V. 545. no. 2.
Chaenactis DC. II. 626. II. 989. VI. 177.
Chaenactis DC. II. 989.
— *achilleaefolia* Hook. et Arn. II. 626. no. 1.
— achilleaefolia Hook. et Arn. * VI. 177. no 5.
— Douglasii Torr. et Gr. *VI. 177. no. 6.
— glabriuscula DC. *VI. 177. no. 1.
— lanosa DC. *VI. 177. no. 3.
— stevioides Hook et Arn. II. 626. no. 1. *VI. 177. no. 4.
— tenuifolia Nutt. II. 626. no. 2. *VI. 177. no. 2.
Chaenesthes Miers. °VI. 618.
— cornifolia Miers. VI. 619. no. 5.
— gesnerioides Miers. VI. 618. no. 3.
— fuchsioides Miers. VI. 618. no. 1.

Chaenesthes lanceolata Miers. VI. 619. no. 6.
— Loxensis Miers. VI. 619. no. 4.
— umbrosa Miers. VI. 618. no. 2.
Chaenopleura Rich. *II. 148. II. 919.
— densiflora Gardn. II. 919. no. 3.
— lanceolata Gardn. II. 919. no. 2.
— parviflora Gardn. II. 919. no. 1.
Chaenorrhinum DC. III. 188. III. 450. VI. 637. no. 4.
Chaenostoma Bth. III. 311. °III. 967. * VI. 642.
— Aethiopicum Bth. III. 312. no. 14.
— calycinum Bth. III. 311. no. 4.
β. laxiflorum Bth.
— campanulatum Bth. III. 311. no. 3.
— cordatum Bth. III. 313. no. 22.
β. hirsutius Bth.
— cuneatum Bth. III. 313. no. 19.
— denudatum Bth. III. 312. no. 10.
— fastigiatum Bth. III. 312. no. 15. (c. varr. α et β ibid.)
— floribundum Bth. III. 313. no. 21.
— foetidum Bth. III. 313. no. 24.
— glabratum Bth. III. 312. no. 12.
— halimifolium Bth. III. 311. no. 7.
— hispidum Bth. III. 313. no. 20.
— integrifolium Bth. III. 313. no. 18.
β. parvifolium Bth.
— laxiflorum Bth. III. 311. no. 6.
— linifolium Bth. III. 312. no. 13.
— marifolium Bth. III. 313. no. 17.
— pauciflorum Bth. III. 311. no. 2.
— pedunculosum Bth. III. 314. no. 25.
— polyanthum Bth. III. 311. no. 8. *VI. 746.
— procumbens Bth. III. 311. no. 5.
— pumilum Bth. III. 312. no. 9.
— racemosum Bth. III. 313. no. 23.
— revolutum Bth. III. 312. no. 11.
β. pubescens Bth.
α. glabriusculum Bth.
— rotundifolium Bth. III. 311. no. 1.
— subspicatum Bth. III. 312. no. 16.
Chaerimoliae Mart. (Anona) I. 88.
Chaerophyllum Linn. II. 422. V. 905.
— acuminatum Lindl. II. 422. no. 5.
— *angelicaefolium* DC. V. 906. no. 4.
— Byzantinum Boiss. V. 906. no. 4.
— Claytoni Pers. II. 423. no. 2.
— crinitum Boiss. V. 905. no. 1
— *dasycarpum* Nutt. II. 422. no. 2. β.
— *daucophyllum* Nutt. II. 422. no. 2. α.
— *Friedrichsthalii* Cesati. III. 421. no. 1.
— macropodum Boiss. V. 905. no. 2.
— procumbens Lam. *II. 422. no. 1.
β. Shortii Torr. et Gr.
— reflexum Lindl. II. 422. no. 4.
— Sphallerocarpus Kar. et Kir. II. 422. no. 3.
Chaerophyllum Tainturieri Hook. et Arn. II. 422. no. 2. (c. varr. α et β ibid.)
— temuloides Boiss. V. 906. no. 3.
Chaetachlaena Don. *II. 679.
Chaetanthera Rz. et Pav. *II. 680. VI. 318.
— *asteroides* Nutt. II. 958. no. 1.
— debilis Meyen et Wlprs. VI. 318. no. 1.
Chaethymenia Hook. et Arn. II. 624. II. 988. VI. 174.
— .... Hook. et Arn. *II. 624. no. 1.
— peduncularis Hook. et Arn. *II. 988. no. 1. VI. 174. no. 1.
Chaetocalyx DC. *I. 673.
Chaetocrater Rz. et Pav. I. 546. V. 406.
Chaetogastra DC. II. 130. V. 700.
— alpestris DC. II. 131. †
— callichaeta Bth. II. 130. no. 4.
— cataphracta Cham. II. 131. no. 7.
— debilis Cham. II. 131. no. 6.
—? ferruginea Hook. et Arn. II. 130. no. 3.
— gracilis DC. II. 131. †
— lasiophylla Bth. II. 131. no. 5.
— Lhotskyana Steudel. V. 700. no. 2.
— repanda DC. II. 131. †
— rhynchanthera Bth. V. 700. no. 1.
— rufipilis Schlchtd. II. 130. no. 2.
— Schiedeana Schlchtd. et Cham. II. 130. no. 1.
— strigillosa DC. II. 131. †
Chaetolepis DC. *II. 137.
Chaetonychia Fzl. I. 261. no. 5. 7. 8. 9 10.
Chaetopappa DC. *II. 583. II. 958.
— asteroides DC. *II. 958. no. 1.
Chaetopappus DC. *II. 952. no. 14.
Chaetophora asteroides Nutt. II. 958. no. 1.
Chaetostachys Bth. III. 576.
— *multifida* Bth. III. 576. no. 14.
Chaetostevia Endl. II. 557. (nec *Chaetostephia*)
Chaetostoma DC. II. 121. V. 682.
— diosmoides Mart. II. 121. no. 1.
— fastigiatum Naudin. V. 682. no. 1.
— inerme Naudin. V. 682. no. 2.
— microlicioides Cham. II. 121. no. 2.
— tetrastichum DC. II. 121. †
Chaetosus Bth. *VI. 467.
CHAILLETIACEAE R. Br. I. 549. II. 829. V. 408.
Chailletia DC. *I. 549. II. 829.
— Cubensis Poepp. et Endl. II. 829. no. 1.
— cymosa Hook. II. 829. no. 2.
Chaiturus Moench. III. 811.
— *leonuroides* Willd. III. 811. no. 6.
— *Marrubiastrum* Ehrh. III. 811. no. 6.
— *Myconi* Lapeyr. III. 438. no. 1.
Chalarium (Desmodium) Bth. V. 525.
Chamaebuxus DC. I. 234. no. 30.
Chamaecerasus Tournef. VI. 4.

Chamaecerasus Cappadocica Lauri folio, fructu nigro Tournef. VI. 5. no. 3.
— *orientalis Lauri folio* Tournef. VI. 5. no 3.
Chamaecrista Breyn. I. 831.
— *Capensis* E. Mey. I. 835. no. 250.
— *comosa* E. Mey. I. 836. no. 252.
— §. *mimosoideae* (Cassia) Vogel. V. 569. no. 9.
— *plumosa* E. Mey. I. 836. no. 251. β.
— *stricta* E. Mey. I. 838. no. 270. β. 3.
Chamaedryon Ser. II. 49. V. 657. no. 1.
Chamaedrys Bth. III. 915.
— *Botrys* Moench. III. 915. no. 49.
— *flava* Moench. III. 917. no. 60.
— *lucida* Moench. III. 915. no. 50.
— *Marum* Moench. III. 917. no. 58.
— *officinalis* Moench. III. 916. no. 54.
— *Scordium* Moench. III. 914. no. 47.
— *supina facie Teucrii pratensis* Lob. III. 351. no. 83. α.
Chamaefistula DC. I. 813. V. 559.
— *astroites* G. Don. I. 825. no. 133.
— *contorta* G. Don. I. 816. no. 37.
— *Coromandeliana* G. Don. I. 816. no. 39. α.
— *corymbosa* G. Don. I. 815. no. 34.
— *crotalarioides* G. Don. I. 815. no. 32.
— *elegans* Don. I. 824. no. 128.
— *excelsa* Don. I. 826. no. 157.
— *floribunda* G. Don. I. 815. no. 35.
— *gigantea* G. Don. I. 822. no. 100.
— *Herbertiana* G. Don. I. 816. no. 35.
— *inaequilatera* G. Don. I. 814. no. 19.
— *inflata* G. Don. I. 815. no. 31.
— *laevigata* G. Don. I. 816. no. 36.
— *macrophylla* G. Don. I. 814. no. 18.
— *macrophylla* Rz. et Pav. I. 824. no. 126.
— *melanocarpa* G. Don. I. 814. no. 24. β.
— *obliqua* Don. I. 824. no. 127.
— *oxyphylla* G. Don. I. 823. no. 119.
— *pendula* G. Don. I. 815. no. 33. γ.
— *pendula* Willd. I. 815. no. 33. γ.
— *puberula* G. Don. I. 814. no. 20.
— *Ruiziana* Don. I. 824. no. 126.
— *Sophera* G. Don. I. 816. no. 39. α.
— *speciosa* G. Don. I. 824. no. 121.
— *torosa* G. Don. I. 816. no. 39.
Chamaejasme inodora Pluk. II. 495. no. 32.
Chamaelaucieae DC. II. 152. II. 920. V. 726.
Chamaelaucium Dsf. II. 154. °V. 729.
— *Brownii* Dsf. II. 154. no. 4.
— ciliatum Desf. II. 154. no. 1.
— *plumosum* Dsf. II. 154. no. 1.
— uncinatum Schauer. V. 730. no. 1.
— virgatum Endl. II. 154. no. 2.
Chamaeleon DC. VI. 307. no. 13.
Chamaelinaria hederacea Barrel. III. 212. no. 79.
Chamaemelanium Ging. I. 218.
Chamaemeles Lin. *II. 57.
Chamaemelum DC. II. 633.
— *alpinum* C. Bauh. VI. 233. no. 48.
— *inodorum* C. Bauh. VI. 196. no. 1.
— *Leucanthemum* Fuchs. VI. 194. no. 1.
— *orientale incanum Millefolii folio* Tourn. VI. 223. no. 42.
— *vulgare* Dodon. VI. 194. no. 1.
Chamaemygdalus Spach. II. 907.
Chamaenerion Tausch. II. 90.
Chamaepeuce Alpin. II. 676.
— Hispanica DC. *II. 676. no. 1.
Chamaepithys Bth. III. 928. VI. 684. no. 1.
— *trifida* Dumort. III. 930. no. 25.
— *vulgaris* Link. III. 930. no. 25.
Chamaeplium officinale Wallr. I. 163. no. 1.
Chamerhodeae Torr. et Gr. II. 36. V. 655.
Chamaerhodiola gelida Schrenk. II. 262. no. 21.
Chamaerhodos Bge. II. 37. II. 913.
— Altaica Bge. *II. 37. no. 1. II. 913. no. 3.
  α. acaulis Bnge. } II. 913. no. 3.
  γ. alpestris Bnge. } II. 913. no. 3.
  β. orientalis Bnge. } II. 913. no. 3.
— erecta Bge. *II. 37. no. 2. II. 913. no. 4.
  β. ascendens Bnge. } II. 37. no. 2.
  α. stricta Bnge. } II. 37. no. 2.
— grandiflora Ldb. *II. 37. no. 3. II. 913. no. 1.
— Mongholica Bnge. II. 913. no. 2.
— sabulosa Bnge. II. 37. no. 4. II. 913. no. 5.
Chamaesciadium C. A. Mey. II. 394.
— acaule C. A. Mey. *II. 394. no. 1.
— albiflorum Kar. et Kir. II. 394. no. 2.
Chamaesenna DC. I. 818.
Chamaesideritis Rchb. III. 835.
Chamaespartum (Genista) Spach. V. 497.
Chamaesphacos Schrenk. III. 791. °III. 986.
— ilicifolius Schrenk. III. 791. no. 1.
Χαμαικίσσον Dioscorid. III. 222. no. 1.
Chamarea Eckl. et Zeyh. II. 400.
— Caffra Eckl. et Zeyh. *II. 400. no. 2.
— Capensis Eckl. et Zeyh. *II. 400. no. 1.
Chamira Thbg. *I. 192.
Chamoeclema hederaceum Moench. III. 787. no. 62.
— *vulgare* Vaill. III. 787. no. 62.
Chamomilla Hall. °II. 636. adn.
Chamomilla C. H. Schultz. °VI. 207.
— glabrata C. H. Schultz. *VI. 208. no. 1.
— inodora C. Koch. *II. 636. no. 3. adn.
— *inodora* C. Koch. VI. 197. no. 1.

Chamomilla meridionalis C. Koch. II. 636. adn. no. 2. VI. 194. no. 3.
— officinalis C. Koch. *II. 636. adn. no. 1. V. 194. no. 1.
— praecox C. Koch. *II. 636. adn. no. 4.
— *praecox* C. Koch. VI. 195. no. 1.
— *vulgaris* Tragus. VI. 194. no. 1.
Chapelieria A. Rich. *II. 517.
Chapmannia Torr. et Gr. I. 728.
— Floridana Torr. et Gr. *I. 728. no. 1.
Chaptalia Vent. *II. 981. VI. 320.
— araneosa Casaretto. VI. 320. no. 1.
Chardinia Dsf. *II. 668.
Charachera viburnoides Forsk. IV. 67. no. 41.
Charianthеae Ser. II. 148. V. 723.
Charianthus Don. *II. 148.
Charieïs Cass. *II. 583. *II. 952. no. 22.
Chartolepis DC. VI. 293.
Chartoloma Bnge. °V. 49.
— platycarpum Bnge. *V. 49. no. 1.
Chasalia Commers. *II. 470.
Chascanum E. Mey. IV. 38.
— cernuum E. Mey. IV. 38. no. 1.
— cuneifolium E. Mey. IV. 38. no. 2.
— Garipense E. Mey. IV. 38. no. 3.
— laetum Fnzl. IV. 39. no. 7.
— marrubiifolium Fnzl. IV. 38. no. 5.
— pinnatifidum E. Mey. IV. 39. no. 6.
— pumilum E. Mey. IV. 38. no. 4.
Chasmalobus Nutt. I. 646.
Chasmanthera Hochstett. °V. 18.
— dependens Hochstett. V. 18. no. 1.
Chasmone E. Mey. I. 630.
Chasmone Prsl. III. 893.
— *Andrewsiana* E. Mey. I. 630. no. 1. V. 510. no. 4.
— *angustissima* E. Mey. I. 632. no. 20.
— *apiculata* E. Mey. I. 631. no. 9.
— *argentea* E. Mey. I. 632. no. 17.
— *ascendens* E. Mey. I. 631. no. 14. I. 632. no. 19.
— *baptisioides* E. Mey. I. 630. no. 3.
— *barbata* Meisn. II. 845. no. 16.
— *calycina* E. Mey. I. 630. no. 2.
— *crassifolia* E. Mey. I. 631. no. 6.
— *crinita* E. Mey. I. 630. no. 1.
— *cuneifolia* E. Mey. I. 631. no. 5.
— *diversifolia* E. Mey. I. 630. no. 2.
— *goodioides* Meisn. II. 845. no. 15.
— *holosericea* E. Mey. I. 630. no. 2.
β. incana Meisn. II. 842. no. 1. *β.*
— *lanceolata* E. Mey. I. 632. no. 19.
— *longifolia* Meisn. II. 845. no. 14.
— *obcordata* E. Mey. I. 630. no. 3.
— *petiolaris* E. Mey. I. 632. no. 21.
— *rupestris* E. Mey. I. 632. no. 18.
Chasmone sessiliflora E. Mey. I. 631. no. 10.
— *splendens* Meisn. II. 845. no. 17.
— *stricta* E. Mey. V. 509. no. 2.
— *tenuis* E. Mey. I. 632. no. 24.
— *tuberosa* Meisn. II. 844. no. 13.
— *venosa* E. Mey. I. 631. no. 13.
— *verticillata* E. Mey. I. 631. no. 7.
Chasmoneae E. Mey. I. 624.
Chasmonia incisa Prsl. III. 893. no. 2.
Chastenaea DC. *II. 117. V. 677.
— coriacea Naudin. V. 677. no. 3.
— lepidota Bth. V. 677. no. 4.
— longifolia Naudin. V. 677. no. 2.
— macrophylla Naudin. V. 677. no. 1.
Chaulmoogra odorata Rab. V. 58 b. no. 1.
Chavannesia Alph. DC. *VI. 475.
Cheilyctis Rafin. III. 682.
Cheiranthera A. Cunn. I. 257. V. 73.
— *cyanea* Brogn. I. 257. no. 1. V. 73. no. 1.
— linearis A. Cunn. *I. 257. no. 1. V. 73. no. 1.
— Preissiana Putterl. V. 73. no. 2.
Cheiranthus R. Br. I. 124. II. 755.
— asper Cham. et Schlchtd. I. 125. no. 10.
— *asper* Cham. et Schlchtd. I. 170. no. 29.
— *axillaris* Brusson. I. 125. no. 5.
— capitatus Dougl. I. 125. no. 10.
— *capitatus* Dougl. I. 170. no. 29.
— *carnosus* Thunb. I. 192. no. 25.
— Cheiri L. I. 125. †
— crassicaulis Boiss. I. 125. no. 7.
— *Cumbrae* Lnk. I. 125. no. 6.
— flexuosus Sibthrp. *I. 124. no. 2.
— *Farsetia* Ham. I. 139. no. 6.
— hesperioides Torr. et Gr. *I. 125. no. 12. (et var. *β.*) ibid.
— Himalayensis Cambess. I. 125. no. 9.
— Knowlesii Wlprs. I. 125. no. 8.
— linariaefolius Vis. II. 755. no. 1.
— *lividus* Spr. et Sieb. I. 160. no. 2.
— *lyratus* Sm. I. 124. no. 1.
— maritimus L. *I. 124. no. 1.
β. lyratus.
— mutabilis L'Hérit. *I. 125. no. 4.
δ. albescens.
γ. brevifolius.
α. latifolius.
β. longifolius.
— *ochroleucus* Knowl. et Westc. I. 125. no. 8.
— Pallasii Prsh. *I. 125. no. 11.
— *pygmaeus* Adams. I. 162. no. 14. 18.
— *quadrangulus* Schult. I. 170. no. 32.
— ramosissimus Bory et Chaub. *I. 124. no. 3.
— scaber Webb. I. 125. no. 6.

Cheiranthus scoparius Brouss. I. 125. no. 6.
— scoparius DC. *I. 125. no. 5.
Cheiropsis C. A. Meyer. I. 167. 168. 170. no. 32. 33.
Cheirostemon H. B. Kth. *I. 331.
Chelidonium Tournef. I. 109.
— *diphyllum* Michx. I. 110. no. 6.
— laciniatum Mill. *I. 109. no. 2.
— majus L. *I. 109. no. 1.
Chelinsia C. H. Schultz. II. 948.
— *Abyssinica* C. H. Schultz. II. 948. no. 1.
Chelonanthus Griseb. VI. 503. no. 2.
Chelone Linn. III. 240. °III. 961. *VI. 639.
— *albida* Spr. III. 242. no. 3.
— *alpina* Spr. III. 251. no. 59.
— *angustifolia* Fraser. III. 241. no. 2.
— *angustifolia* H. B. Kth. III. 247. no. 32.
— *atropurpurea* Sweet. III. 247. no. 34.
— *barbata* Cav. III. 248. no. 41. *a.*
— *Bradburii* Spr. III. 246. no. 25.
— *campanulata* Cavan. III. 247. no. 33.
— *campanuloides* Andrws. III. 247. no. 33.
— *centranthifolia* Bth. III. 249. no. 42.
— *coerulea* Spr. III. 241. no. 2.
— *cristata* Spr. III. 241. no. 1.
— *elegans* H. B. Kth. III. 245. no. 23.
— erianthera Prsh. III. 241. no. 1.
— *foliis inferioribus ovato-acuminatis petiolatis integerrimis etc.* Arduin. III. 245. no. 21.
— *gentianoides* Lindl. III. 247. no. 35.
— glabra Linn. III. 240. no. 1.
β. lanceolata Nutt.
— *glabra β.* Linn. III. 240. no. 2.
— *glabra β. alba* Prsh. III. 240. no. 1.
— *hirsuta* Linn. III. 245. no. 22.
— *imberbis* H. B. Kth. III. 248. no. 40.
— latifolia Mühlbrg. III. 240. no. 4.
— Lyoni Prsh. III. 240. no. 3. III. 936.
— *major* Sims. III. 240. no. 3.
— nemorosa Dougl. III. 240. no. 5.
— obliqua Linn. III. 240. no. 2. III. 936.
— *Pentstemon* Linn. III. 244. no. 19.
— *Pentstemon* Mill. III. 245. no. 21.
— *Pentstemon* Walt. III. 240. no. 4.
— *purpurea* Mill. III. 240. no. 2.
— *rosea* Cervantes. III. 245. no. 24.
— *ruellioides* Andrws. III. 248. no. 41. *a.*
— *ruellioides* Linn. fil. III. 373. no. 1.
— teretiflora Fraser. III. 242. no. 3.
Cheloneae Bth. VI. 638.
Cheru-Chunda Rheede. III. 83. no. 324. *a.*
Chesneya Bertoloni. V. 900.
— *daucoides* Bertoloni. V. 900. no. 1.
Chesneya Lindl. *I. 682. II. 859.
— astragalina Jaub. et Spach. II. 859. no. 6.
Chesneya microphylla Jaub. et Spach. II. 859. no. 4.
— Oliverii Jaub. et Spach. II. 859. no. 3.
— parviflora Jaub. et Spach. II. 859. no. 7.
— ryditosperma Jaub. et Spach. II. 859. no. 1.
— vaginalis Jaub. et Spach. II. 859. no. 5.
— velutina Jaub. et Spach. II. 859. no. 2.
Chevreulia Cass *II. 681. *VI. 320.
Chiastandra Bth. III. 773.
Chiazospermum Bernh. I. 117. II. 750.
— erectum Bernh. *I. 117. no. 1.
— lactiflorum Kar. et Kir. II. 750. no. 1.
Chichaea asarifolia Prsl. V. 98. no. 10.
Chickrassia Adr. Juss. I. 436.
— tabularis Adr. Juss. *I. 436. no. 1.
Chicocca spicata Blume. II. 504. no. 1.
Chilca VI. 111. no. 18.
Chiliadenus DC. II. 954. no. 1.
Chilianthus Burch. *VI. 645.
— *oleaceus* Burch. III. 331. no. 3.
Chiliotrichum Cass. II. 558. *II. 954. no. 3.
— amelloides Cass. *II. 558. no. 1.
Chilmoria dodecandra Hamilt. V. 58b. no. 1.
Chilocarpus Blume. VI. 465.
— denudatus Blume. *VI. 465. no. 1.
— suaveolens Blume. *VI. 465. no. 2.
Chilodia R. Br. III. 764. °III. 985.
— scutellarioides R. Br. III. 764. no. 1.
Chilophyllum DC. *II. 611.
Chiloporus Naudin. V. 721.
— Andinus Naudin. V. 721. no. 1.
Chilopsis D. Don. *VI. 515.
Chimaphila Prsh. *II. 734.
Chimarrhis Jcq. *II. 506.
Chimonanthus Lindl. *II. 60.
Chiococca P. Browne. II. 483. VI. 45.
— barbata Forst. *II. 483. no. 1.
— coriacea Mart. et Galeotti. VI. 46. no. 2.
— macrocarpa Mart. et Galeotti. VI. 45. no. 1.
— nitida Bth. II. 483. no. 4.
— *odorata* Hook. et Arn. II. 481. no. 10.
— phaenostemon Schlchtd. II. 483. no. 3.
— racemosa Jcq. *II. 483. no. 2.
— *spicata* Blume. VI. 58. no. 1.
— staminea Mart. et Galeotti. VI. 46. no. 3.
Chionantheae A. P. DC. VI. 462.
Chionanthus Linn. *VI. 462.
Chione glabra DC. II. 487. no. 1.
Chionolaena DC. *II. 595. *II. 952. no. 58.
Chionophila Bth. *VI. 640.
Chionoptera DC. *II. 680. *VI. 314.
Chionotria Jack. I. 382. V. 141.
— monogyna Jack. *I. 382. no. 1.
— rigida Jack. V. 141. no. 1.

Chirita Hamilt. VI. 522.
— Sinensis Lindl. VI. 522. no. 1. VI. 743. no. 1.
— Zeylanica Hook. VI. 522. no. 2. VI. 743. no. 2.
Chironieae Griseb. VI. 499.
Chironia Linn. VI. 499.
— *Fischeri* Hort. VI. 499. no. 1.
— floribunda Paxton. VI. 499. no. 1.
— *trinervis* Linn. VI. 500. no. 2.
Chirocalyx Meisn. °V. 535.
— mollissimus Meisn. V. 536. no. 1.
Chisocheton divergens Blume. I. 429. no. 2.
— *patens* Blume. I. 429. no. 1.
Chitonia Moç. et Sess. I. 493.
— Mexicana DC. *I. 493. no. 1.
Chizostigma asperatum Arn. II. 202. no. 1.
CHLAENACEAE Thouars. I. 366.
Chlamydocarpus Jaub. et Spach. VI. 6.
Chlamydophora Ehrnbrg. *II. 642.
Chlamysperma Lssng. II. 637.
— arenarioides Hook. et Arn. II. 637. no. 1.
Chloanthes R. Br. IV. 57. VI. 689.
—? (Cloanthes) Bartlingii Lehm. IV. 134. no. 5.
— coccinea Bartl. VI. 689. no. 1.
— glandulosa R. Br. IV. 58. no. 4.
— lavandulaefolia Sieber. IV. 58. no. 2.
— parviflora Wlprs. IV. 58. no. 3.
— stoechadis R. Br. IV. 57. no. 1.
Chlora Renealm. *VI. 502.
Chloreae Griseb. VI. 500.
Chlorocodon Bth. VI. 419. no. 2.
Chloroleucon Bth. V. 620.
Chloromyron Pers. I. 392.
Chlorosia Bnge. V. 841.
Chloroxyllon cf. Chloroxylon.
Chloroxylon DC. I. 436.
— Swietenia DC. *I. 436. no. 1.
Chloryllis E. Mey. I. 767.
— pratensis E. Mey. *I. 767. no. 1.
Choisya Kth. I. 501.
— ternata Kth. *I. 501. no. 1.
Chomelia Jcq. *II. 483. II. 942. VI. 45.
— angustifolia Bth. II. 942. no. 2.
— hirsuta Gardn. VI. 45. no. 1.
— tenuiflora Bth. II. 942. no. 1.
Chondodendron convolvulaceum Poepp. I. 95. no. 30.
Chondrilla Linn. II. 694. VI. 355.
— ambigua Fisch. II. 694. no. 3. VI. 356. no. 2.
— canescens Kar. et Kir. II. 694. no. 2.
— *graminea* Ldb. II. 694. no. 1.
— *hastata* Wall. VI. 355. no. 5.
— intybacea Frivaldsky. VI. 356. no. 3.
Chondrilla leiosperma Kar. et Kir. II. 694. no. 4.
— piptocoma C. A. Mey. II. 694. no. 1.
— pusilla Boiss. VI. 355. no. 1.
— Rauillieri Kar. et Kir. II. 694. no. 5.
— *repens* Lam. VI. 365. no. 1.
Chondrophyllum Griseb. VI. 506. no. 11.
Chondrospermum Wall. *VI. 463.
Chondsilla alba Lond. II. 691. no. 1.
Chonemorpha G. Don. *VI. 474.
Chorilaena Endl. I. 505.
— quercifolia Endl. *I. 505. no. 1.
Choriophyllum Griseb. VI. 503. no. 4.
Choripetalum Alph. DC. VI. 448.
— obovatum Bth. VI. 448. no. 1.
Chorisia H. B. Kth. I. 329.
— speciosa Cambess. I. 329. no. 1.
Chorisis DC. *II. 693.
— *repens* DC. VI. 365. no. 1.
Chorisma Don. II. 693.
Chorisma Lindl. I. 455.
— flavescens Eckl. et Zeyh. I. 455. no. 69.
— *repens* Don. VI. 365. no. 1.
Chorispora DC. I. 159. II. 759.
— Bungeana Fisch. et Mey. I. 160. no. 3.
— *Bungeana* Fisch. et Mey. II. 760. no. 4.
— compressa Boiss. II. 759. no. 3.
— elegans Cambess. I. 159. no. 1.
— exscapa Bnge. *II. 760. no. 4.
— Persica Boiss. II. 759. no. 2.
— sabulosa Cambess. I. 160. no. 2.
— Syriaca Boiss. II. 759. no. 1.
Choristes Bth. II. 506.
— cornifolia Bth. II. 506. no. 2.
—? excelsa Bth. *II. 506. no. 3.
— obtusiflora Bth. II. 506. no. 1.
Choristylis Harw. II. 380. V. 837.
— rhamnoides Harw. *II. 380. no. 1. V. 837. no. 1.
Chorozema Labill. I. 567. II. 832. V. 421.
— angustifolium Bth. I. 568. no. 10.
— Baueri Bth. I. 568. no. 9.
— *Baxteri* Graham. I. 566. no. 3.
— Baxteri Grah. *II. 832. no. 1.
— cordatum Lindl. I. 567. no. 5. V. 425. †
— costatum Meisn. V. 424. no. 1.
γ. brevifolium Meisn.
α. lanceolatum Meisn.
β. lineare Meisn.
— daviesioides Meisn. V. 425. no. 3.
α. Preissianum Meisn.
β. Drummondianum Meisn.
— Dicksonii Henslow. I. 567. no. 2. V. 425. †
— diversifolium DC. j. I. 567. no. 1.
— Henchmanni R. Br. I. 568. † V. 425. †
— nanum Sims. I. 568. †

Chorozema ovatum Lindl. I. 567. no. 4.
— parviflorum Bth. I. 568. no. 8.
— rhombeum R. Br. I. 568. †
— reticulatum Meisn. V. 424. no. 2.
— *scandens* Sm. I. 566. no. 3.
— *sericeum* Sm. I. 566. no. 2.
— spartioides Paxton. V. 425. †
— spectabile Lindl. I. 568. no. 7.
— triangulare Lindl. I. 567. no. 3.
— varians Bth. V. 425. †
— varium Bth. I. 567. no. 6.
Chotekia sericea Opitz et Corda. III. 580. no. 5.
Chresta Arrabida. II. 542. °VI. 102.
Chresta DC. II. 542. VI. 102.
— alpestris Gardn. II. 542. no. 4.
— angustifolia Gardn. II. 543. no. 5.
— exsucca DC. *II. 542. no. 3.
— intermedia Gardn. VI. 102. no. 1.
— plantaginifolia Gardn. *II. 543. no. 9.
— pycnocephala DC. *II. 542. no. 2.
— scapigera Gardn. *II. 543. no. 8.
— spathulaefolia Gardn. *II. 543. no. 7.
— sphaerocephala DC. *II. 542. no. 1.
— speciosa Gardn. II. 543. no. 6.
Christiani DC. (Astragalus) I. 705. II. 870.
Christolea Cambess. I. 172.
— crassifolia Cambess. *I. 172. no. 1.
Christannia DC. *I. 360.
Christannia Prsl. I. 205.
— salicifolia Prsl. *I. 205. no. 1.
Christya Ward et Harvey. *VI. 472.
Chroilema Brnhrdi. II. 594. VI. 131.
Chroilema DC. *II. 952. no. 24.
— subcanescens Bernhardi. II. 594. no. 1. VI. 131. no. 1.
Chromolaena DC. II. 551. VI. 706.
— alternifolia Gardn. VI. 706. no. 4.
— Candolleana Gardn. VI. 706. no. 2.
— decumbens Gardn. VI. 707. no. 5.
— horminoides Bth. VI. 706. no. 1.
— leucocephala Gardn. VI. 706. no. 3.
— pratensis Gardn. II. 551. no. 1.
Chromolepis Bth. II. 622. VI. 171.
— heterophylla Bth. *II. 622. no. 1. VI. 171. no. 1.
Chronopappus DC. *II. 542.
Chrosonemium Ser. I. 642. no. 33. II. 852.
Chrysanthae DC. (Malva) I. 292.
Chrysanthellum Rich. *II. 623. VI. 171.
— Abyssinicum C. H. Schultz. VI. 171. no. 1.
Chrysanthemeae DC. II. 635. VI. 191.
Chrysanthemum DC. II. 637.
Chrysanthemum Dioscorid. °VI. 206.
— *alpinum* Linn. VI. 223. no. 48.
— *Americanum* etc. Catesb. VI. 159. no. 1.
Chrysanthemum anethifolium Brouss. VI. 201. no. 5.
— *argenteum* Willd. VI. 223. no. 42.
— *atratum* Jcq. VI. 224. no. 49.
— *Balsamita* Linn. VI. 219. no. 2.
— *Broussonettii* Balbis. VI. 202. no. 3.
— *Broussonettii* Pers. VI. 199. no. 2.
— *carinatum* Schousb. VI. 202. no. 1.
— *ceratophylloides* Koch. VI. 224. no. 49.
— coronarium Linn. *VI. 207. no. 1.
— *coronopifolium* Steudel. VI. 202. no. 2.
— *coronopifolium* Vill. VI. 224. no. 49.
— *corymbiferum* Linn. VI. 222. no. 35.
— *corymbosum* Linn. VI. 222. no. 35.
— *crithmifolium* Brousson. VI. 201. no. 4.
— *daucifolium* Pers. VI. 202. no. 2.
— *dissectum* Lowe. VI. 199. no. 2.
— *foeniculaceum* DC. VI. 200. no. 2.
— *foliosum* Brouss. VI. 201. no. 4. β.
— *frutescens* Linn. VI. 200. no. 4.
— *glabratum* Thnbrg. VI. 208. no. 1.
— *glaucum* Pers. VI. 222. no. 38.
— *gracilicaule* Duf. VI. 192. no. 1. B.
— *graminifolium* Linn. VI. 192. no. 1. β.
— *grandiflorum* Brousson. VI. 201. no. 4. β.
α. *adauctum* DC. VI. 199. no. 2.
δ. *cuneiforme* DC. VI. 202. no. 2.
— *Halleri* Suter. VI. 224. no. 49.
— *heterophyllum* Willd. VI. 191. no. 1. β.
— *inodorum* Frivaldsky. VI. 195. no. 8.
— *inodorum* Linn. VI. 196. no. 1.
— *intermedium* Broussonet. VI. 201. no. 4. β.
— *lacerum* Auctor. VI. 199. no. 2.
— *lanceolatum* Pers. VI. 191. no. 1. β.
— *lanuginosum* Geners. VI. 222. no. 35.
— *macrophyllum* Waldst. et Kitaib. VI. 221. no. 30.
— *montanum* Linn. VI. 191. no. 1. β.
— *multifidum* Dsf. VI. 222. no. 38.
— *Myconis* Linn. VI. 206. no. 1.
— *Parthenium* Pers. VI. 222. no. 31.
— *pectinatum* Linn. VI. 193. no. 1.
— *pinnatifidum* Brousson. VI. 202. no. 3.
— *pinnatifidum* Linn. fil. VI. 199. no. 1.
— *praecox* C. H. Schultz. VI. 195. no. 1.
— Roxburghii Dsf. *VI. 207. no. 2.
— *segetum* Lobel. VI. 207. no. 1.
— *sericeum* Weber et Mohr. VI. 222. no. 41.
— *serotinum* Linn. VI. 192. no. 1.
— *tanacetifolium* Dsf. VI. 199. no. 2.
— *trichophyllum* Boiss. VI. 195. no. 8.
— *uliginosum* Pers. VI. 192. no. 1.
— Zawadskii Herbich. II. 637. no. 1.
Chrysastrum Torr. et Gr. II. 960.
Chryseis caespitosa Lindl. I. 116. no. 3.
— *Californica* Lindl. I. 116. no. 2.

Chryseis compacta Lindl. I. 116. no. 6.
— *crocea* Lindl. I. 116. no. 1.
— *Douglasii* Torr. et Gr. I. 116. no. 2.
— *hypecooides* Lindl. I. 116. no. 5.
— *tenuifolia* Lindl. I. 116. no. 4.
Chryseum DC. II. 393.
CHRYSOBALANEAE R. Br. II. 3. II. 907. V. 646.
Chrysobalanus L. II. 3. II. 907.
— ellipticus Smeathm. II. 3. no. 2.
— Icaco L. *II. 3. no. 1.
— orbicularis Schum. et Thonning. *II. 3. no. 1.
— *orbicularis* Schum. II. 907. no. 1.
Chrysobotrya intermedia Spach. II. 361. no.50.
— *Lindleyana* Spach. II. 361. no. 51.
— *revoluta* Spach. II. 361. no. 50. α.
Chrysocalycinae Bth. (Crotalaria) V. 443.
Chrysocalyx Guill. et Perr. V. 443.
— *ebenoides* Guill. et Perr. I. 590. no. 69. V. 443. no. 115.
— *gracilis* Guill. et Perr. I. 591. no. 71. V. 443. no. 114.
— *Perrottetii* DC. I. 595. † V. 443. no. 113.
— *rubiginosa* Guill. et Perr. I. 590. no. 70. V. 443. no. 116.
Chrysocephalum Wlprs. II. 646. VI. 237.
— apiculatum Steetz. *VI. 237. no. 6.
— asperum Steetz. VI. 237. no. 4.
— brevicilium Steetz. *VI. 238. no. 8.
— ciliatum Steetz. *VI. 238. no. 7.
— flavispinum Steetz. VI. 237. no. 3.
— helichrysoides Wlprs. *II. 646. no. 1. VI. 237. no. 1.
— odorum Steetz. *VI. 238. no. 9.
— semipapposum Steetz. *VI. 237. no. 5.
— squarrulosum Steetz. VI. 237. no. 2.
Chrysochamaela Fnzl. (?) II. 761. no. 1.
Chrysochlamys Poepp. et Endl. I. 392.
— multiflora Poepp. et Endl. *I. 392. no. 1.
Chrysocoma Cass. *II. 593. *II. 952. no. 36.
— *capillacea* Michx. II. 555. no. 16.
— *gigantea* Walt.? II. 540. no. 11.
— *graminifolia* Walt. II. 540. no. 13. α.
— *graveolens* Nutt. II. 969. no. 5.
— *graveolens* Torr. II. 969. no. 3.
— *nauseosa* Prsh. II. 969. no. 5.
— *pumila* Nutt. II. 963. no. 33.
— *spicata* Forsk. II. 648. no. 2.
— *tenuifolia* Berg. VI. 122. no. 7.
— *tomentosa* Walt. II. 539. no. 9. γ.
Chrysocomeae DC. II. 585. II. 958. VI. 127.
Chrysocoptis occidentalis Nutt. I. 49. no. 3.
Chrysocoryne Endl. II. 644. °VI. 229.
Chrysocoryne pusilla Endl. *II. 644. no. 1. *VI. 229. no. 1.
Chrysodiscus Steetz. °VI. 235.
— niveus Steetz. *VI. 235. no. 1.
Chrysodraba DC. I. 149.
Chrysogonum Linn. *II. 604.
Chrysolepidea (Helichrysum) DC. VI. 240.
Chrysoma Nutt. II. 589. *II. 952. no. 42. II. 966.
Chrysoma Schauer. II. 156. V. 731.
— pumila Nutt. II. 589. no. 2.
— solidaginoides Nutt. II. 589. no. 1.
— *solidaginoides* Nutt. II. 966. no. 68.
— uniligulata Nutt. *II. 589. no. 3.
— *uniligulata* Nutt. II. 964. no. 45.
Chrysomelea Nutt. II. 613.
Chrysonerion Torr. et Gr. II. 90.
Chrysophania Kth. *II. 611.
Chrysophtalmeae C. H. Schultz. II. 955.
Chrysophtalmum C. H. Schultz. *II. 955.
— sternutatorium C. H. Schultz. *II. 955. no. 1.
Chrysophyllum Linn. VI. 454.
— psilophyllum Alph. DC. *VI. 454. no. 1.
Chrysopia Noronh. *I. 394.
Chrysoplenium cf. Chrysosplenium.
Chrysopsideae DC. II. 588. II. 959. VI. 128.
Chrysopsis Nutt. II. 588. *II. 952. no. 18. II. 959. VI. 128.
— *acaulis* Nutt. II. 591. no. 1.
— *alba* Nutt. II. 5 3. no. 119.
— *alpina* Nutt. II. 577. no. 3.
— *amygdalina* Nutt. II. 578. no. 5.
— *argentea* Ell. II. 588. no. 4.
— *caespitosa* Nutt. II. 591. no. 2.
— *canescens* DC. II. 582. no. 31. β.
— canescens Torr. *II. 960. no. 10.
— *coronopifolia* Nutt. II. 587. no. 8.
— *divaricata* Hook. II. 967. no. 1.
— *divaricata* Nutt. II. 967. no. 1.
— echioides Bth. VI. 128. no. 1.
— *ericoides* Eat. II. 577. no. 2.
— *falcata* Ell. II. 588. no. 2.
— foliosa Nutt. II. 588. no. 4. *II. 960. no. 9.
— gossypina Nutt. *II. 959. no. 4.
— *graminifolia* Ell. II. 588. no. 3.
— *hirtella* DC. II. 582. no. 35.
— hispida Hook. *II. 959. no. 7.
— hispida Nutt. II. 588. no. 3.
— *hyssopifolia* Nutt. II. 959. no. 3.
— Lamarckii Nutt. *II. 588 no. 2.
— *Lamarckii* Nutt. II. 967. no. 1.
— *linifolia* Nutt. II. 575. no. 2.
— Mariana Nutt. *II. 959. no. 2.
— mollis Nutt. II. 588. no. 5. *II. 960. no. 8.
— oligantha Chapm. II. 959. no. 1.

Chrysopsis pilosa Nutt. II. 588. no. 6. *II. 960. no. 12.
— *pinifolia* Ell. II. 588. no. 1.
—? scabra Hook. et Arn. II. 588. no. 1.
—? *scabra* Hook. et Arn. VI. 178. no. 1.
— scabrella Torr. et Gr. II. 959. no. 5.
— sessiliflora Nutt. II. 588. no. 7. *II. 960. no. 11.
— trichophylla Nutt. II. 959. no. 3.
β. hyssopifolia Nutt.
— villosa Nutt. *II. 959. no. 6.
Chrysorhiza DC. II. 485.
Chrysorrhoë nitens Lindl. II. 156. no. 16.
— *serrata* Lindl. II. 156. no. 15.
Chrysoscias E. Mey. I. 790.
— calycina E. Mey. I. 790. no. 4.
— grandiflora E. Mey. I. 790. no. 1.
— media E. Mey. I. 790. no. 2.
— parviflora E. Mey. I. 790. no. 3.
Chrysosplenii foliis planta aquatica flore flavo pentapetalo Shaw. III. 334. no. 5.
Chrysosplenium Tournef. II. 368. V. 828.
Chrysosplenium Cornubiense Petiv. III. 334. no. 1.
— glechomaefolium Nutt. II. 369. no. 5.
— macranthum Hook. II. 369. no. 6.
— macrocarpum Cham. II. 369. no. 4.
— nudicaule Bnge. II. 368. no. 2.
— nudicaule Cham. II. 368. no. 3.
— *oppositifolium* β. Hook. II. 369. no. 5.
— *orientale Gei facie, magno fructu* Tourn. II. 369. no. 4.
— ovalifolium M. Bieb. II. 368. no. 1.
— peltatum Turczan. V. 828. no. 1.
— Sedakowii Turczan. V. 828. no. 2.
— Valdivicum Hook. II. 369. no. 7.
Chrysostachys Pohl. II. 68.
— *glabra* Poepp. V. 569. no. 7.
— ovatifolia Pohl. II. 68. no. 1.
—? *sericea* Poepp. V. 552. no. 2.
Chrysostemma Lssng. *II. 613.
Chrysostemma Lssng. II. 979. 980.
— *tripteris* Lssng. II. 614. no. 15. II. 980. no. 8.
Chrysostoma aurea Lilja. V. 776. no. 1.
Chrysothamnus Nutt. II. 589. *II. 952. no. 43.
— dracunculoides Nutt. *II. 589. no. 3.
— lanceolatus Nutt. *II. 589. no. 5.
— *lanceolatus* Nutt. II. 969. no. 4.
— pumilus Nutt. II. 589. no. 1.
β. cuthamioides Nutt.
— speciosus Nutt. II. 589. no. 2.
— *speciosus* Nutt. II. 969. no. 5.
β. *albicaulis* Nutt. II. 970. no. 6.
— *pumilus* Nutt. II. 970. no. 7.
— viscidiflorus Nutt. *II. 589. no. 4.
Chrysovitex Prsl. VI. 690. no. 1.
Chrysoxylon Casaretto. °V. 561.
— Vinhatico Casaretto. *V. 561. no. 1.
Chtamalia Dcne. *VI. 490.
Chthonocephalus Steetz. °VI. 231.
— pseudevax Steetz. *VI. 231. no. 1.
Chuncoa Rz. et Pav. II. 63.
— Brasiliensis Cambess. II. 63. no. 1.
Chunda Rheede. III. 81. no. 381. *α*.
Chuquiraga Juss. *II. 679. VI. 313.
— chrysantha Gardn. VI. 313. no. 1.
— oppositifolia Gill. et Don. *VI. 314. no. 3.
— revoluta Gardn. VI. 314. no. 2.
— ruscifolia Gill. VI. 314. †
Chylismia Nutt. II. 86.
— *scapoidea* Nutt. II. 86. no. 67.
Chymocarpicae (Myrtaceae) Schauer. II. 932. V. 750.
Chymocarpicae (Vaccinieae) DC. VI. 408.
Chymocarpus Don. I. 465.
— pentaphyllus Don. *I. 465. no. 1.
Chymocormus Harvey. °VI. 492.
— edulis Harvey. *VI. 492. no. 1.
Cicendia Griseb. VI. 501.
— microphylla Edgwrth. VI. 502. no. 2.
— Roxburghii Griseb. VI. 501. no. 1.
Cicer Tournef. I. 712. II. 883.
— arietinum Linn. I. 712. † II. 883. no. 1.
γ. macrocarpum Spach. II. 883. no. 1.
β. ryditospermum Spach. II. 883. no. 1.
α. vulgare Spach. II. 883. no. 1.
— *arietinum* Rchb. II. 883. no. 1. *α*.
— floribundum Fnzl. I. 712. no. 1. II. 884. †
— Jacquemontii Jaub. et Spach. II. 884. no. 6.
— *Lens* Rxb. I. 712. no. 1.
— *nummulariaefolium* Lam. I. 587. no. 41.
— microphyllum Bth. I. 712. no. 2.
— Montbretii Jaub. et Spach. II. 883. no. 4.
— *physodes* Rchb. II. 883. no. 1. *α*.
— pimpinellifolium Jaub. et Spach. II. 883. no. 3.
— pinnatifidum Jaub. et Spach. II. 883. no. 2.
— *sativum* Schkhr. II. 883. no. 1. *γ*.
— spiroceras Jaub. et Spach. II. 884. no. 7.
— Soongaricum Steph. II. 884. no. 5.
— tragacanthoides Jaub. et Spach. II. 884. no. 8.
Ciceroidēi (Astragalus) DC. I. 703. II. 867.
Cichoraceae Juss. II. 683. II. 993. VI. 326.
Cichorium DC. II. 684. (ex p.)
Cichorium Tournef. *II. 684. *VI. 328.
Ciconium DC. I. 457.
— acetosum Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 108.
— densiflorum Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 105.
— inquinans Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 103.
— lavateraefolium Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 107.

Ciconium scandens Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 109.
— urenaefolium Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 104.
— zonale Eckl. et Zeyh. *I. 457 no. 106.
Cicuta Linn. *II. 391.
Cicca DC. II. 218. II. 934. V. 771.
Cimicifuga L. I. 60.
— Americana Michx. *I. 61. no. 4.
— *Americana* Mühlbrg. I. 61. no. 2.
— cordifolia Prsh. I. 60. no. 2.
— elata Nutt. I. 61. no 3.
— *frigida* Royle. I. 60. no. 2.
— foetida L. I. 61. †
— *palmata* Hook. I. 60. no. 2.
— *podocarpa* Ell. I. 61. no. 4.
— racemosa Ell. *I. 60. no. 1.
— *serpentaria* Prsh. I. 60. adn. no. 1. et 2. (ex p.)
Cinchona Linn. II. 509. °VI. 64.
— *acuminata* Poir. VI. 69. no. 3.
— *acutifolia* Rz. et Pav. VI. 68. no. 18.
— *angustifolia* Cav. VI. 65. no. 7.
— Bergeniana Mart. II. 509. no. 2.
— *Bergeniana* Martius. VI. 67. no. 11.
— Bonplandiana Kltzsch. *II. 64. no. 2.
— *cava* Pavon. VI. 68. no. 19.
— *China* Lopez. VI. 69. no. 1.
— Condaminea H. B. Kth. *VI. 64. no. 1.
— *Condaminea* H. B. Kth. VI. 64. no. 2.
— *Condaminea* var. *Cahuarguera* DC. II. 64. no. 2.
— cordifolia Mutis. VI. 65. no. 13.
— *Cujabensis* Manso. VI. 67. no. 8.
— *dichotoma* Rz. et Pav. VI. 67. no. 14.
— discolor Kltzsch. VI. 65. no. 16.
— *dissimiliflora* Mutis. VI. 67. no. 7.
— *firmula* Martius. VI. 67. no. 9.
— glandulifera Rz. et Pav. *VI. 65. no. 5.
— *grandiflora* Rz. et Pav. VI. 67. no. 1.
— *gratissima* Wall. VI. 63. no. 1.
— hexandra G. Don. II. 510. no. 8.
— hirsuta Rz. et Pav. *VI. 65. no. 6.
— *Humboldtiana* Roem. et Schult. VI. 68. no. 20.
— Lambertiana Bart. II. 509. no. 3.
— *Lambertiana* Martius. VI. 67. no. 10.
— lanceolata Rz. et Pav. *VI. 65. no. 10.
— lancifolia Mutis. *VI. 65. no. 7.
— *lancifolia β. lanceolata* DC. VI. 65. no. 10.
  a. nitida DC. VI. 64. no. 3.
  a. nitida Prsl. VI. 65. no. 16.
— lucumaefolia Pav. VI. 65. no. 9.
— *macrocarpa* Vahl. VI. 67. no. 4.
— *macrocnema* Martius. VI. 67. no. 12.
— *macrocnemia* Mart. II. 508. no. 4.
— macrocnemia Mart. II. 509. no. 4.
Cinchona magnifolia Rz. et Pav. VI. 67. no. 13.
— micrantha Rz. et Pav. *VI. 64. no. 4.
— *Mutisii* Kltzsch. VI. 65. no. 5.
— *nitida* Bth. VI. 68. no. 22.
— nitida Rz. et Pav. *VI. 64. no. 3.
— *ovalifolia* Humb. et Bonpl. VI. 68. no. 20.
— ovata Rz. et Pav. *VI. 65. no. 8.
— Pavonii Lamb. II. 510. no. 7.
— *Pavonii* G. Don. VI. 68. no. 19.
— *pubescens* Hort. Mack. II. 943. no. 1. VI. 53. no. 1.
— *pubescens* DC. VI. 65. no. 6.
  γ. hirsuta DC.
  β. ovata DC. VI. 65. no. 8.
— pubescens Vahl. *VI. 65. no. 15.
— purpurea Rz. et Pav. *VI. 65. no. 11.
— *Riedeliana* Casaretto. VI. 68. no. 21.
— Roraimae Bth. II. 509. no. 5.
— *Roraimae* Bth. VI. 67. no. 2.
— *rosea* Rz. et Pav. II. 509. no. 1. VI. 64. no. 3.
— rotundifolia Pav. VI. 65. no. 12.
— *scrobiculata* Humb. et Bonpl. VI. 64. no. 4.
— stenocarpa Lamb. II. 509. no. 6.
— *stenocarpa* Lambert. VI. 68. no. 17.
— *stupea* Pavon. VI. 65. no. 9.
— Timorensis Spanoghe. II. 509. no. 1.
— *Timoriana* Spanoghe. VI. 63. no. 1.
— *triflora* Wright. II. 508. no. 3.
— villosa Pavon. VI. 65. no. 14.
Cinchonaceae DC. VI. 61.
Cinchonaceae Endl. II. 489. II. 943. VI. 50.
Cinchoneae Endl. II. 507. II. 943.
Cinchonia fusa Pav. VI. 64. no. 3.
Cineraria Lssng. II. 651. VI. 251.
— acutangula Bertol. II. 651. no. 1.
— *appendiculata* Poir. VI. 266. no. 56. *a.*
— *Canadensis* Linn. VI. 261. no. 23. *γ.*
— *Cima* B. Webb. VI. 253. no. 6.
— *crispa* Koch. VI. 261. no. 20.
— distans Knze. VI. 251. no. 1.
— *Hualtata* Gill. II. 658. no. 44.
— *integrifolia* Richards. II. 661. no. 72.
— *lactea* Willd. VI. 266. no. 56. *β.*
— *leucanthema* Bnks. et Soland. VI. 268. no. 68. VI. 269. no. 74.
— *Lewisii* Richards. II. 579. no. 3.
— *longifolia* Eichwld. VI. 261. no. 21.
— *Montevidensis* Spr. II. 655. no. 16.
— *palustris* Linn. II. 661. no. 71. VI. 261. no. 23.
— *populifolia* Lam. VI. 266. no. 56. *a.*
  var. *alba* Hortor.
  var. *leucantha* Vent. *β.*

Cineraria procera Griseb. VI. 251. no. 2.
— *purpurascens* Bnks. et Soland. VI. 269. no. 74.
— *ramentacea* L'Hérit VI. 253. no. 4.
— *Schkuhrii* Rchb. VI. 261. no. 20. β.
— *sessilifolia* Jacquem. II. 651. no. 3. VI. 252. no. 2.
— *tussilaginis* L'Hérit. VI. 253. no. 2.
— *unctuosa* Gilib. VI. 261. no. 23.
Cinnamodendron Endl. I. 398.
— axillare Endl. *I. 398. no. 1.
Cinnamomea Ser. V. 649. no. 1. 2.
Cipadessa Blume. I. 428.
— fruticosa Bl. *I. 428. no. 1.
Circaea Tournef. II. 96.
— cordata Royle. II. 96. no. 1.
Circaeaceae Endl. II. 96.
Cirsioides DC. VI. 282. no. 1.
Cirsium Tournef. II. 674. II. 992. VI. 305.
— aggregatum Ldb. VI. 306. no. 8.
— appendiculatum Griseb. VI. 307. no. 13.
— brevifolium Nutt. II. 676. no. 16.
— Candelabrum Griseb. VI. 307. no. 14.
— canescens Nutt. II. 676. no. 17.
— carminans Dumort. II. 674. no. 1.
— cephalotes Boiss. VI. 306. no. 5.
— Cosmelii Fisch. VI. 305. no. 2.
— crinitum Boiss. II. 676. †
— *Douglasii* DC. II. 675. no. 8.
— Drummondii Torr. et Gr. II. 675. no. 13.
— edule Nutt. II. 676. no. 15.
— elatum Sauter. VI. 306. no. 9.
— erythrolepis C. Koch. II. 674. no. 5.
— fallax Fisch. et Mey. VI. 305. no. 1.
— *filipendulum* Engelm. II. 675. no. 10. δ.
— flavispinum Boiss. var. β. longispinosum Knze. VI. 732.
— fulvispina Boiss. II. 676. †
— heterolepis Bth. II. 675. no. 14.
— Hookerianum Nutt. II. 675. no. 9.
— hypopsilum Boiss. VI. 305. no. 4.
— Kochianum Löhr. VI. 307. no. 11.
— Kotschyanum Boiss. VI. 307. no. 12.
— Lecontei Torr. et Gr. II. 675. no. 12.
— Mielichoferi Sauter. VI. 307. no. 10.
— muticum Michx. *II. 675. no. 11.
— *Nuttallii* DC. II. 675. no. 11. β.
— oblongifolium C. Koch. II. 674. no. 6.
— odontolepis Boiss. II. 676. †
— penicillatum C. Koch. II. 674. no. 4.
— Persicum Boiss. VI. 306. no. 6.
— Pitcheri Torr. et Gr. II. 675. no. 7.
— polyacanthum Kar. et Kir. II. 674. no. 3.
— Ponticum C. A. Mey. II. 992. no. 1.
— radians Bth. VI. 306. no. 7.
— succinctum Ldb. VI. 305. no. 3.
Cirsium tuberosum Dill. II. 549. no. 2.
— undulatum Spr. *II. 675. no. 8.
— Virginianum Michx. *II. 675. no. 10. (c. varr. β. γ. δ. ibid.)
— Wiedemannii Fisch. et Mey. II. 674. no. 2.
Cirulea Jos. Juss. V. 189. no. 1.
Cissampelos L. I. 96. II. 749. V. 17.
— acuminata Bth. I. 97. no. 13.
— apiculata Hochstett. V. 17. no. 3.
— australis St. Hil I. 97. no. 9.
— canescens Miquel. V. 17. no. 4.
— *Cocculus* Ham. I. 96. no. 1. γ.
— communis St. Hil. I. 97. no. 4.
— convolvulacea Willd. *I. 96. no. 1 (et varr. α. β. γ. et δ.)
— cordifolia Bojer. V. 17. no. 1.
— *discolor* Wall. I. 96. no. 10.
— ebracteata St. Hil. I. 97. no. 7.
— *glabra* Ham. I. 96. no. 9.
— *glabra* Rxb. I. 96. no. 1. β.
— glaberrima St. Hil. I. 97. no. 12.
— gracilis St. Hil. I. 97. no. 11
— Haenkeana Prsl. I. 97. no. 15.
— *hernandifolia* Wall. I. 96 no. 1. β.
— *hernandifolia* Willd. I. 96. no. 9.
— *hexandra* Rxb. I. 96. no. 9.
— *hirsuta* DC. I. 96. no. 1. δ.
— hirsutissima Prsl. I. 98. no. 16.
— Kohautiana Prsl. I. 98. no. 17.
— littoralis St. Hil. I. 97. no. 8.
β. minutiflora St. Hil. et Tul.
— *Mauritiana* Ham. I. 96. no. 1. δ.
— monoica St. Hil. I. 97. no. 10.
— *mucronata* A. Rich. I. 97. no. 8.
— nephrophylla Bojer. V. 17. no. 2.
— *orbiculata* DC. 96. no. 1. γ.
— ovalifolia DC. *I. 97. no. 3.
δ. cinerascens St. Hil.
β. cinereo-viridis St. Hil.
γ. rufescens St. Hil.
— *ovata* Poir. I. 94. no. 17.
— *Pata* Rxb. I. 96. no. 1. β.
— *pauciflora* Nutt. I. 104. no. 1.
— psilophylla Prsl. I. 97. no. 14.
— suborbicularis St. Hil. I. 97. no. 6.
β. sublanata St. Hil.
— *subtriangularis* St. Hil. I. 97. no. 2.
— *tomentosa* Vellozo. I. 95. no. 28.
— tomentosa Vellozo. II. 749. no. 1.
— velutina St. Hil. I. 97. no. 5.
Cissarobryon Poepp. I. 461.
— elegans Poepp. *I. 461. no. 1.
Cissus DC. I. 437. V. 377. no. 1. 2
Cissus L. I. 437. II. 817. V. 377.
— *acida* Rxb. I. 442. no. 13. α.
— aconitifolia Bge. I. 441. no. 50.

Cissus aculeata Spanoghe. I. 439. no. 23.
— adenantha Fresen. I. 439. no. 30.
— *adnata* Rxb. I. 443. no. 8.
— adnata Rxb. V. 377. †
— albida Cambess. I. 440. no. 43.
— (Vitis?) angustifolia Rxb. V. 377. †
— *angulata* Lam. I. 442. no. 9.
— aristata Blume. I. 438. no. 6.
— *auriculata* Rxb. I. 443. no. 20.
— auriculata Rxb. V. 377. †
— bifida Schum. I. 439. no. 28.
— Bonariensis Hook. et Arn. I. 440. no. 41.
— Cantoniensis Hook. et Arn. I. 439. no. 24.
— *capreolata* Don. I. 439. no. 21.
— capreolata Royle. I. 439. no. 21.
— (Vitis?) carnosa Lam. V. 377. †
— *carnosa* Rxb. I. 442. no. 13.
— *carnosa* Wall. I. 442. no. 13. *α.*
— *cinerea* Lam. I. 442. no. 13. *α.*
— cirrhiflora Eckl. et Zeyh. I. 440. no. 34.
— *clematifolia* Spanoghe. I. 439. no. 23.
— compressa Blume. I. 437. no. 5. (et var. *β.*)
— *crenata* Vahl. I. 442. no. 13. *γ.*
— cuneifolia Eckl. et Zeyh. I. 440. no. 33.
— cymosa Schum. I. 439. no. 31.
— cyphopetala Fresen. I. 433. no. 25.
— deficiens Hook. et Arn. I. 440. no. 42.
— dichotoma Blume. I. 438. no. 13.
— dimidiata Eckl. et Zeyh. *I. 440. no. 36.
— discolor Blume. I. 437. no. 3.
— diversifolia Wlprs. V. 377. no. 3.
— Drégeana Bernhardi. V. 377. no. 2.
— Duarteana Cambess. I. 440. no. 40.
— elliptica Schlchtd. I. 440. no. 38.
— *elongata* Rxb. I. 442. no. 15.
— *foeminea* Rxb. I. 442. no. 14.
— geniculata Blume. I. 438. no. 9.
α. inaequalis.
β. mollis.
— glabrata Blume. I. 438. no. 16.
— *glauca* Rxb. I. 442. no. 7.
— *glauca* Wall. I. 442. no. 6.
— gracilis Guill. et Perr. I. 439. no. 32.
— *hederacea* Royle. I. 439. no. 21.
— *heptaphylla* Retz. I. 443. no. 19.
— heterophylla Blume. I. 441. no. 47.
— *heterophylla* Hb. Madr. I. 442. no. 11.
— Himalayana Royle. I. 341. no. 48.
— hirtella Blume. I. 438. no. 12.
— humulifolia Bge. I. 441. no. 49.
— hydrophora Gaudich. V. 377. †
— *inaequalis* Heyne. I. 441. no. 1.
— Indica Blume. I. 441. no. 46.
— *Indica* Rottl. I. 442. no. 3.
— intermedia A. Rich. II. 817. no. 1.
— *involucrata* Spr. V. 378. no. 1.
Cissus laevigata Blume. I. 438. no. 20.
— *lanceolaria* Rxb. I. 443 no. 17.
— [Vitis?] lanceolaria Rxb. V. 377. †
— latifolia Tausch. I. 441. no. 53.
— *latifolia* Vahl. I. 442. no. 8.
— leucocarpa Blume. I. 438. no. 15.
— macrophylla Jungh. I. 437. no. 2.
— mutabilis Blume. I. 438. no. 18.
— *Natalensis* Brnhrdi. V. 414. no. 2.
— nodosa Blume. I. 437. no. 4.
— obtusata Bth. V. 377. no. 1.
— *obtusifolia* Lam. I. 442. no. 13. *δ.*
— [Vitis?] pallida Wght. V. 377. †
— palmata Poir. I. 441. †
— papillosa Blume. I. 438. no. 8.
— *pedata* Lam. I. 443. no. 19.
— pergamacea Blume. I. 438. no. 7.
— populnea Guill. et Perr. I. 439. no. 27.
— pubescens Schlchtd. I. 441. no. 52.
— pubinervis Blume. I. 438. no. 11.
— *purpurea* Rxb. I. 442. no. 7.
— *quadrangularis* L. I. 441. no. 2.
— [Vitis?] quadrangularis Linn. V. 377. †
— quinquefolia Schult. I 441. †
— *repanda* Vahl. I. 442. no. 3.
— *repens* Lam. I. 442. no. 6.
— rhodocarpa Blume. I. 438. no. 10.
— rosea Royle. I. 437. no. 1.
— rufescens Guill. et Perr. I. 439. no. 26.
— scabiosa Blume. I. 438. no. 19. (III. Emend. p. 2.)
— scariosa Blume. I. 438. no. 19.
— serjaniaefolia Bnge. I. 441. no. 51.
— sericea Eckl. et Zeyh. I. 440. no. 37.
— *serratifolia* Rottl. I. 443. no. 18.
— serratifolia Wght. I. 439. no. 22.
— *setosa* Rxb. I. 442. no. 12.
— [Vitis?] setosa Rxb. V. 377. †
— spinosa Cambess. I. 440. no. 44.
— sylvatica Cambess. I. 441. no. 45.
— tamoides Cambess. I. 440. no. 39.
— thyrsiflora Blume. I. 438. no. 14.
— triandra Schum. I. 439. no. 29.
— tridentata Eckl. et Zeyh. I. 440. no. 35.
β. robusta.
— *trilobata* Lam. I. 442. no. 11.
— tuberculata Blume. I. 438. no. 17.
— *vitignea* Rxb. I. 442. no. 4.
Cistanche Lnk. et Hffmsgg. III. 461.
Cisthanthe speciosa Lilja. V. 786. no. 2.
CISTINEAE I. 206. II. 765. V. 58[b].
Cistropicae Bth. I. 562.
Cistus Tournef. I. 206. II. 765.
— acutifolius Sweet. I. 207. † cum diagn.
— albidus L. I. 207. † I. 208. †
— asperifolius Sweet. I. 207. †

Cistus calvifolius β. DC. I. 207.
— candidissimus Dun. I. 207. †
— canescens Sweet. I. 207. † (cum diagn.)
— Clusii Dun. I. 207. †
— Corbariensis Pourr. I. 207. †
— Creticus Sibthp. et Sm. I. 207. † I. 208. †
— crispus L. I. 207. † I. 208. †
— Cupanianus Prsl. I. 206. no. 3.
α. canescens.
γ. peduncularis.
β. viridescens.
— cymosus Dun. I. 207. †
— Cyprius Lam. I. 207. †
— Florentinus Lam. I. 207. †
— floribundus Tausch. II. 765. no. 1.
— Garganicus Ten. I. 206. no. 1.
— grandiflorus Tausch. II. 765. no. 2.
— *guttatus* Huds. V. 58 b. no. 2.
— heterophyllus Dsf. I. 207. †
— hirsutus Lapeyr. I. 207.
— incanus L. I. 207. † 208. †
— ladaniferus Sweet. I. 207. †
α. albiflorus.
β. maculatus.
— latifolius Sweet. I. 207. †
— laurifolius Sweet. I. 207. †
— laxus Ait. I. 207. †
— *longifolius* Lam. I. 207.
— Monspeliensis L. I. 207. †
— oblongifolius Sweet. I. 207. † (c. diagn.)
— obtusifolius Sweet. I. 207. † (c. diagn.)
— parviflorus Lam. I. 207. †
— platysepalus Sweet. I. 207. † (cum diagn.)
— *populifolius α.* DC. I. 207.
— populifolius L. I. 207. †
— psilosepalus Sweet. I. 207. † (cum diagn.)
— purpureus Lam. I. 207. †
— rotundifolius Sweet. I. 207. †
— salvifolius L. I. 207. †
— sideritis Prsl. I. 206. no. 2.
— vaginatus Jsq. I. 207. †
— undulatus Dun. I. 207. † 208. †
— *villosus β.* DC. I. 207.
— villosus Lam. I. 207. † 208. †
— viscosissimus Tausch. II. 765. no. 3.
— vulgaris L. I. 207. †
Cithareloma Bnge. ° V. 39.
— Lehmanni Bnge. V. 39. no. 2.
— vernum Bnge. V. 39. no. 1.
Citharexylon Linn. IV. 72. VI. 690.
— affine D. Don. IV. 75. no. 16.
— affine Martens et Galeotti. VI. 690. no. 1.
—? *alpinum* Poepp. IV. 16. no. 18.
— *arbor laurifolia* Pluk. IV. 75. no. 22.
— barbinerve Cham. IV. 72. no. 3.
— Berterii Spr. IV. 78. no. 34.
Citharexylon caudatum Hort. VI. 646. no. 3.
— caudatum Linn. IV. 77. no. 33.
— *caudatum* Swrtz. IV. 77. no. 32.
— Chamissonis Wlprs. IV. 75. no. 23.
— cinereum Linn. IV. 75. no. 22.
— cinereum Moç. et Sess. IV. 75. no. 14.
— coriaceum Dsf. IV. 75. no. 21.
— cyanocarpum Hook. et Arn. IV. 73. no. 5.
— dentatum G. Don. IV. 73. no. 6.
— dentatum Loddig. *IV. 78.
— ellipticum Moç et Sess. IV. 75. no. 19.
— *erectum* Jcq. IV. 78. no. 33.
— flexuosum D. Don. IV. 72. no. 1.
— *fruticosum cortice cinereo etc.* P. Br. IV. 75. no. 22.
— *fruticosum foliis subellipticis etc.* P. Br. IV. 78. no. 33.
— ilicifolium H. B. Kth. IV. 74. no. 10.
— incanum Sessé et Moçinno. IV. 73. no. 7.
— *lucidum* Cham. IV. 75. no. 23.
— lucidum D. Don. IV. 74. no. 14.
— lycioides D. Don. IV. 77. no. 31.
— macrophyllum Poir. *IV. 78.
— *melanocardium* Swrtz. IV. 95. no. 19.
— Moçinni D. Don. IV. 75. no. 17.
— *molle* H. B. Kth. IV. 77. no. 30.
— molle Jcq. IV. 74. no. 13.
— myrianthum Cham. IV. 77. no. 29.
— *paniculatum* Grtnr. IV. 95. no. 19.
— pentandrum Venten. IV. 74. no. 11.
— *perforatum* Forst. IV. 138. no. 22.
— Poeppigii Wlprs. IV. 76. no. 26.
— pulverulentum Pers. IV. 74. no. 12.
— quadrangulare Jcq. IV. 77. no. 32.
— *quadrangulare* Moç. et Sess. IV. 75. no. 15.
— Quitense Spr. IV. 77. no. 30.
— reticulatum H. B. Kth. IV. 75. no. 20.
— retusum D. Don. IV. 72. no. 2.
— Rugendasii Cham. IV. 76. no. 28.
— scabrum Moçinno et Sessé. IV. 74. no. 8.
— *scabrum* Willd. IV. 77. no. 29.
— scariosum Moç. et Sess. IV. 75. no. 18.
— sericeum Loddig. *IV. 78.
— Sessei D. Don. IV. 75. no. 15.
— spinosum H. B. Kth. IV. 73. no. 4.
— subserratum Swrtz. IV. 74. no. 9.
— solanaceum Cham. IV. 76. no. 27. (et var. *β.*)
— *tenuifolium* Forst. IV. 136. no. 10.
— *teres* Jcq. IV. 75. no. 22.
— tomentosum H. B. Kth. IV. 76. no. 25.
— *verticillatum* Kltzsch. IV. 73. no. 5.
— villosum Jcq. IV. 76. no. 24.
Citreae Meisn. I. 382.
Citriobatus A. Cunn. I. 250.

Citriobatus multiflora C. Cunn. *I. 250. no. 1.
— pauciflora A. Cunn. *I. 250. no. 2.
Citronella mucronata Don. I. 541. no. 1.
Citrullus Neck. II. 199.
— amarus Schrad. II. 199. no. 3.
— Caffer Schrad. *II. 199. no. 2.
— colocynthis Arn. *II. 199. no. 4.
— vulgaris Schrad. *II. 199. no. 1.
Citrus L. I. 382. II. 804. V. 140.
— amara Haskarl. II. 804. no. 3.
— Aurantium L. I. 382. †
— bigaradia Tussac. I. 382. no. 4.
— *buxifolia* Hortor. II. 805. no. 1.
— crassa Hsskrl. V. 140. no. 1.
— decumana L. I. 382. †
— deliciosa Tenore. II. 804. no. 1.
— grandis Haskarl. II. 805. no. 7.
β. oblonga.
— Javanica Blume. I. 382. no. 2a.
— Javanica Blume. I. 382. no. 2b.
— Japonica Thbg. I. 382. †
— Limonellus Hsskrl. II. 804. no. 4.
β. amblycarpus.
— macracantha Hsskrl. V. 140. no. 2.
— microcarpa Bge. I. 382. no. 1.
— nobilis Lour. II. 804. no. 5.
α. chrysocarpa Hsskrl.
β. melanocarpa Hsskrl.
γ. microcarpa Hsskrl.
— obversa Hsskrl. V. 140. no. 3.
— ovata Hsskrl. II. 804. no. 2.
— paniculata Schum. et Thon. I. 382. no. 3.
— Papaya Hsskrl. V. 141. no. 4.
— paradisi Macf. I. 382. no. 5.
— Peretta Tussac. I. 382. †
β. Domingensis Tussac. I. 382. †
— pyriformis Hsskrl. II. 805. no. 6.
Citta Lour. (Mucuna) I. 767.
Cladanthus Cass. *II. 634.
Cladochaeta DC. *II. 647.
Cladothamnus Bongrd. *II. 730.
Cladotrichium Vogel. I. 811.
— epunctatum Vogel. I. 811. no. 3.
— pilosum Vogel. I. 811. no. 4.
— rubicundum Vogel. I. 811. no. 1.
— stipulare Vogel. I. 811. no. 2.
Cladrastis Raf. I. 807.
— tinctoria Raf. *I. 807. no. 1.
Clairvillea DC. *II. 623.
Clandestina Tournef. III. 479. °III. 975.
— *flore subcoeruleo* Tournef. III. 479. no. 1.
— *penduliflora* Lam. III. 479. no. 1.
— rectiflora Lam. III. 479. no. 1.
Clappertonia Meisn. *I. 354.
Clarionea Lag. VI. 323.
— carthamoides Don. *VI. 323. no. 3.
Clarionea ciliaris Don. *VI. 323. no. 2.
— *lactucoides* Don. VI. 324. no. 5.
— Magellanica DC. *VI. 323. no. 1.
Clarionella Magellanica Hombron et Jacquinot. VI. 323. no. 1.
Clarkia Prsh. II. 89.
— elegans Dougl. II. 89. no. 2.
— *gauroides* Dougl. II. 89. no. 3.
— pulchella Prsh. II. 89. no. 1. (c. var. β. ibid.)
— rhomboidea Dougl. II. 89. no. 3.
— unguiculata Lindl. II. 89. no. 4.
Clausena Burm. I. 381.
— excavata Blume. I. 381. no. 1.
— pubescens Wght. et Arn. I. 381. no. 3. (III. Emend. p. 2.)
— Willdenowii Wght. et Arn. I. 381. no. 2. et var. β. ibid. (III. Emend. p. 2.)
Clauseneae Wght. et Arn. I. 381.
Clausia Trotzky. II. 755.
— aprica Trotzky. *II. 755. no. 1.
Clavena DC. *II. 674.
Clavija Rz. et Pav. *VI. 453.
Clavigeae Alph. DC. VI. 453.
Clavigera DC. II. 549. VI. 705.
— pinifolia Gardn. VI. 705. no. 1.
— Riddellii Torr. et Gr. II. 549. no. 1.
— scabra Bth. II. 549. no. 2.
Clavulium Desv. I. 589.
— *pedunculosum* Desv. I. 589. no. 53.
Claytonia Linn. II. 237.
— alsinoides Sims. *II. 237. no. 4.
γ. heterophylla Torr. et Gr.
β. rosea Torr. et Gr.
— aquatica Nutt. II. 238. no. 14.
— asarifolia Bongd. II. 237. no. 7.
— Australasica Hook. II. 238. no. 20.
— Caroliniana Michx. II. 237. no. 2.
— Chamissonis Eschschltz. II. 237. no. 6.
— dichotoma Nutt. II. 238. no. 18.
— diffusa Nutt. II. 238. no. 19.
— Eschscholtzii Cham. II. 237. no. 5.
— exigua Torr. et Gr. II. 237. no. 11.
— *filicaulis* Hook. II. 238. no. 16.
— flagellaris Bongd. II. 238. no. 15.
— *grandiflora* Sweet. II. 237. no. 1.
— gypsophiloides Fisch. et Mey. II. 238. no. 12.
— lanceolata Prsh. *II. 237. no. 3.
— linearis Dougl. II. 238. no. 17.
— parviflora Dougl. II. 237. no. 9.
β. glauca Torr. et Gr.
— parvifolia Moç. II. 238. no. 16.
— perfoliata Donn. *II. 237. no. 8.
— *raphanoides* DC. II. 230. no. 1.
— *Sibirica* Bot. Mag. II. 237. no. 4. β.
— Sibirica Pers. II. 238. †

Claytonia spathulaefolia Salisb. II. 237. no. 2.
— spathulata Dougl. II. 237. no. 10.
— tenuifolia Torr. et Gr. II. 238. no. 13.
— *Unalaschkensis* Fisch. II. 237. no. 4.
β. heterophylla Nutt. II. 237. no. 4. *γ.*
— Virginica Linn. II. 237. no. 1.
— *Virginica β. latifolia* et *γ. spathulaefolia* DC. II. 237. no. 2.
Cleisocratera Krthls. °VI. 47.
— elegans Krthls. VI. 47. no. 1.
Clelia Casaretto. °V. 644.
— ornata Casaretto. *V. 644. no. 1.
Clematideae DC. I. 3. II. 737. V. 3.
Clematis L. I. 3. II. 737. V. 3.
Clematis DC. I. 9.
— Acapulcensis Hook. et Arn. I. 7. no. 50.
— aethusaefolia Turcz. I. 5. no. 18.
— affinis St. Hil. I. 8. no. 59.
— *anemonaeflora* Don. I. 9. no. 71. V. 4. no. 8.
— anethifolia Hook. I. 4. no. 5.
— angustifolia Jcq. I. 9. †
— Balduini Torr. et Gr. I. 7. no. 39.
— *Balearica* Pers. I. 3. no. 2.
— blanda Hook. I. 6. no. 36.
— Bojeri Hook. I. 4. no. 4.
— *calycina* Ait. I. 3. no. 1. *γ.*
— calycina Dryand. *I. 9. no. 67. †
— campaniflora Brot. *I. 9. no. 68. †
— campestris St. Hil. I. 8. no. 61.
— *Capensis* Poiret. I. 20. no. 16.
— *Catesbyana* Prsh. I. 7. no. 42.
— chlorantha Lindl. I. 8. no. 62.
— cirrhosa Linn. *V. 4. no. 7.
— *cirrhosa* Sims. I. 3. no. 2.
β. pedicellata DC. I. 3. no. 2.
— cocculifolia A. Cunn. I. 6. no. 38.
— coerulea Lindl. I. 5. no. 22.
β. grandiflora Hook. *II. 737. no. 6.
— cognata Steudel. V. 3. no. 5.
— *Columbiana* Torr. et Gr. I. 9. no. 1.
— *cordata* Prsh. I. 7. no. 42.
— cordata Royle. I. 6. no. 28.
— *cordata* Sims. I. 7. no. 49.
— cylindrica Sims. *I. 7. no. 47.
β. Waltheri Torr. et Gr.
— *denticulata* Vell. I. 8. no. 60. *a.*
— discolor Gardn. II. 737. no. 2.
— discolor Steudel. V. 3. no. 4.
— Douglasii Hook. I. 7. no. 40.
— Drummondii Torr. et Gr. I. 7. no. 44.
— elliptica Endl. I. 6. no. 35.
— erecta L. I. 9. †
β. umbellata Rchb. I. 9. †
— Gauriana Rchb. *I. 6. no. 27.
β. subovata Rchb.
Clematis Gebleriana Bongd. *I. 4. no. 13.
β. integrifolia Schrenk.
— *Gebleriana* Bongd. II. 737. no. 3.
— glandulosa Blume. I. 5. no. 19.
— *glauca* Claus. I. 4. no. 12.
— glaucescens Fresen. I. 4. no. 10.
— globosa Royle. I. 6. no. 31.
— Grahami Bth. I. 8. no. 53.
— grata Wall. I. 5. no. 24.
— grossa Bth. I. 8. no. 55.
— Haenkeana Prsl. I. 8. no. 57.
— Havanensis H. B. Kth. *I. 9. no. 70. †
— Hilarii Spr. *I. 8. no. 60.
a. triloba St. Hil.
β. Guaranitica St. Hil.
— hirsuta Guill. et Perr. I. 3. no. 3.
— *hirsutissima* Prsh. I. 16. no. 4.
— integrifolia L. I. 9. †
— intricata Bnge. I. 5. no. 15.
— Flammula L. I. 9. †
— florida Thnbg. *I. 9. no. 69. †
— *folio anguloso, Aceris fructu* Plum. V. 206. no. 12.
— fruticosa Turczan. I. 5. no. 17.
β. canescens Turczan.
a. viridis Turczan.
— fusca Turczan. I. 4. no. 11.
— Kamtschatica Bongd. II. 737. no. 1.
— lasiantha Nutt. I. 7. no. 46. (III. Emend. p. 1.)
— lathyrifolia Bess. I. 9. no. 65.
— ligusticifolia Nutt. I. 7. no. 43.
β. brevifolia Torr. et Gr.
— linearifolia Steudel. V. 3. no. 3.
— longecaudata Ldb. I. 4. no. 12.
— Meyeniana Wlprs. V. 3. no. 1.
— Moçiniana Don. I. 8. no. 56.
— montana Hamilt. *I. 9. no. 71. † *V. 4. no. 8.
β. grandiflora Hook. V. 4. no. 8.
— *Montevidensis* Spr. I. 8. no. 60. *a.*
— Munroiana Wght. I. 6. no. 26.
— nervata Bth. I. 7. no. 51.
— nutans Royle. I. 6. no. 29.
— oligophylla Hook. I. 4. no. 7.
— *orientalis* Lep. I. 4. no. 12.
— pallida Richard. I. 9. no. 63.
— parviflora A. Cunn. I. 6. no. 37.
— parviflora Nutt. I. 7. no. 45.
— patens Morren et Dcne. I. 5. no. 21.
— pedicellata Lond. V. 3. no. 2.
— pimpinellifolia Hook. I. 4. no. 6.
— Pitcheri Torr. et Gr. I. 7. no. 48.
— *Plukenetii* DC. (?) I. 7. no. 42.
— polycephala Bertoloni. I. 8. no. 54.
— polymorpha Viv. I. 3. no. 1.

Clematis polymorpha Viv. V. 4. no. 7.
—? *polypetala* DC. I. 28. no. 57.
— pubescens Bth. I. 8. no. 52.
— pubescens Hügel. I. 6. no. 34.
— *semitriloba* Lag. I. 3. no. 1. *a*.
— Simensis Fresen. I. 4. no. 9.
— Simsii London. I. 7. no. 49.
— smilacifolia Wall. I. 6. no. 33.
— smilacina Blume. I. 5. no. 20.
— Soongarica Bge. I. 4. no. 14. *II. 737. no. 3.
— Stanleyi Hook. V. 3. no. 2.
— stricta Wenderoth. I. 9. no. 64. *II. 737. no. 5.
— subpeltata Wall. I. 5. no. 25.
— subtriflora N. ab E. I. 8. no. 58.
— *tenuifolia* Poiret. I. 20. no. 17.
— tenuifolia Royle. I. 6. no. 32.
— trifida Hook. I. 4. no. 8.
—? tubulosa Turczan. I. 5. no. 16.
— venosa Royle. I. 6. no. 30.
— Virginiana L. *I. 7. no. 42.
— Vitalba L. I. 9. †
β. Bannatica Wierzb. II. 737. no. 4.
— Viticella L. I. 9. †
— *Waltheri* Prsh. I. 7. no. 47. *β*.
— Wightiana Wall. I. 5. no. 23. (III. Emend. p. 1.)
— Wyethii Nutt. I. 7. no. 41.
— Zanzibariensis Loudon. V. 3. no. 6.
Clematopsis suaveolens Boj. I. 4. no. 4.
Clemenocoma vid. Clomenocoma.
Cleobulia Mart. I. 764.
— multiflora Mart. *I. 764. no. 1.
Cleome DC. I. 193. II. 764. V. 52.
— aculeata Dsvx. I. 194. no. 15.
— acuta Schum. et Thonn. I. 193. no. 6.
— *aphylla* Thbg. I. 196. no. 1.
— aspera Koen. I. 195. †
— aurea Torr. et Gr. I. 194. no. 11.
— bicolor Gardn. II. 765. no. 3.
— Burmanni Wght. et Arn. I. 193. no. 5.
— candelabrum Sims. I. 195. no. 20.
— *chelidonii* Boj. V. 52. no. 1.
— chrysantha Dcne. I. 193. no. 1.
— ciliata Schum. et Thonn. I. 194. no. 7.
— coluteoides Boiss. II. 764. no. 1.
— Cubensis A. Rich. I. 194. no. 14.
— *cuneifolia* Mühlbg. I. 173. no. 2.
— dendroides Schult. I. 195. †
— *dodecandra* Bks. I. 193. no. 5.
— *dodecandra* Michx. I. 195. no. 5.
— Eckloniana Schrad. I. 194. no. 8.
— fugax Schrad. I. 195. no. 19.
— gigantea L. I. 195. †
— *Guianensis* Aubl. I. 195. no. 1.
Cleome icosandra L. I. 195. no. 2.
— integrifolia Torr. et Gr. I. 194. no. 10. (III. Emend. p. 1.)
— longifolia Prsl. I. 194. no. 13.
— *longifolia* Vahl. V. 782. no. 2.
— lutea Hook. I. 194. no. 12. (III. Emend. p. 1.)
— micrantha Dsvx. I. 194. no. 16.
— pilosa Bth. V. 52. no. 2.
— Poiteauna Pacquet. *V. 52. no. 3.
— *raphanoides* DC. II. 230. no. 1. V. 782. no. 2.
— recta Jacquem. I. 193. no. 4.
— serrulata Dsvx. I. 194. no. 9.
— spinosa L. I. 195. †
— spinosissima Deppe. I. 195. no. 18.
— Surinamensis Miquel. V. 52. no. 1.
— *tenuifolia* Le Conte. I. 196. no. 7.
— trinervia Fresen. I. 193. no. 2.
— Vahliana Fresen. I. 193. no. 3.
— villosa Gardn. I. 194. no. 17. II. 764. no. 2.
— viminea Schrad. I. 195. no. 21.
— *violacea* Gaertn. I. 195. no. 5.
— *viscosa* Spr. I. 195. no. 5.
Cleomeae DC. I. 193. V. 52.
Cleomella DC. I. 193.
— Mexicana DC. *I. 193. no. 1.
Cleonia Linn. III. 747. °III. 984.
— Lusitanica Linn. III. 747. no. 1.
Clermontia Gaudich. II. 708. VI. 373.
— Kakeana Meyen. II. 708. no. 1.
— macrocarpa Gaudich. *VI. 373. no. 1.
Clerodendron R. Br. IV. 102. VI. 691.
— acuminatum Wall. IV. 113. no. 65.
— angustifolium Spr. IV. 111. no. 57.
— attenuatum R. Br. IV. 105. no. 17.
— bracteatum Wall. IV. 106. no. 28.
— Buchanani Wlprs. IV. 108. no. 44.
— *Bungei* Steudel. IV. 108. no. 40.
— buxifolium Spr. IV. 112. no. 59.
— calamitosum Linn. IV. 109. no. 46.
— canescens Wall. IV. 105. no. 26.
— Capense D. Don. *IV. 114.
— *Capense* Eckl. et Zeyh. IV. 110. no. 53. *β*.
— capitatum Schum. et Thonn. IV. 109. no. 49.
— capsulare M. Blanco. IV. 114. no. 75.
— castaneifolium Hook. et Arn. IV. 105. no. 24.
— *coccineum* D. Dietr. IV. 108. no. 38.
— Colebrokianum Wlprs. IV. 114. no. 70.
— Commersonii Spr. IV. 112. no. 62.
— cordatum D. Don. IV. 108. no. 42.
— coriaceum R. Br. IV. 105. no. 22.
— *coriaceum* Poir. IV. 103. no. 9.
— Coromandelianum Spr. IV. 112. no. 63.

Clerodendron costatum R. Br. IV. 105. no. 23.
— deflexum Wall. IV. 104. no. 13.
— dentatum Wall. IV. 114. no. 73.
— *depauperatum* Wall. IV. 107. no. 37.
— disparifolium Blume. IV. 109. no. 47.
— divaricatum W. Jack. IV. 113. no. 66.
— diversifolium Vahl. IV. 102. no. 1.
— Emirnense Bojer. IV. 111. no. 54.
— fallax Lindl. IV. 108. no. 39.
— farinosum Wlprs. IV. 107. no. 32.
— floribundum R. Br. IV. 105. no. 18.
— *floribundum* Hort. Angl. IV. 111. no. 54.
— foetidum Bnge. IV. 108. no. 40.
— *foetidum* D. Don. IV. 109. no. 44.
— fortunatum Linn. IV. 103. no. 8.
— fragrans Ait. IV. 109. no. 50.
— *fruticosum* etc. P. Br. IV. 100. no. 1.
— glabrum E. Mey. IV. 110. no. 53.
β. angustifolium E. Mey.
— glandulosum Lindl. IV. 108. no. 41.
— *glandulosum* Colebr. IV. 114. no. 70.
— gratum Wall. IV. 113. no. 69.
— hastatum Wall. IV. 102. no. 4.
— helianthemifolium Wall. *IV. 114.
— herbaceum Wall. *IV. 114.
— *heterophyllum* R. Br. IV. 111. no. 57.
— Jackianum Hook. IV. 104. no. 16.
— Javanicum Spr. IV. 103. no. 9.
— Javanicum Wlprs. IV. 113. no. 67. (Appellandum erit: Clerodendron Javanense Wlprs.)
— inerme R. Br. IV. 112. no. 58. (c. var. β.)
— infortunatum Linn. IV. 107. no. 37.
— intermedium Cham. IV. 114. no. 72.
— *Kaempferi* Fisch. VI. 691. no. 1.
— laevifolium Blume. IV. 103. no. 10.
— lanuginosum Blume. IV. 109. no. 48.
— *Leucosceptrum* D. Don. III. 903. no. 1.
— ligustrinum R. Br. IV. 111. no. 55.
— lividum Lindl. IV. 107. no. 36.
— longicolle F. W. Meyer. IV. 103. no. 6.
— longifolium Dcne. IV. 114. no. 71.
— *macrophyllum* Blume. IV. 104. no. 12.
— macrophyllum Sims. IV. 114. no. 74.
— medium R. Br. IV. 105. no. 21.
— molle H. B. Kth. IV. 105. no. 20.
— *molle* Jack. IV. 106. no. 27.
— myricoides R. Br. *IV. 114.
— neriifolium Wall. IV. 110. no. 52.
— *nutans* Jack. IV. 105. no. 16.
— nutans Sack. *IV. 114.
— nutans Wall. IV. 104. no. 14.
— obovatum Wlprs. IV. 112. no. 60.
— odoratum D. Don. IV. 109. no. 45.
— odoratum Rxb. IV. 113. no. 68.
— ornatum Wall. *IV. 114.
Clerodendron ovatum R. Br. IV. 105. no. 19.
— *ovatum* Poir. IV. 112. no. 63.
— paniculatum Vahl. IV. 102. no. 3.
— penduliflorum Wall. IV. 104. no. 15.
— phlomoides Linn. IV. 107. no. 35.
— phyllomega Steudel. IV. 104. no. 12.
— pumilum Spr. IV. 105. no. 25.
— *pyramidale* Andrws. IV. 102. no. 3.
— Sackeanum Wall. *IV. 114.
— *sagittatum* Wall. IV. 102. no. 4.
— scandens Palis. Beauv. IV. 111. no. 56.
— semiserratum Wall. *IV. 115.
— serratum Spr. IV. 106. no. 31.
— siphonanthus R. Br. IV. 103. no. 5.
— *speciosissimum* Paxton. IV. 108. no. 39.
— spinosum Spr. IV. 110. no. 51.
— splendens C. Don. IV. 112. no. 61.
— splendidum Wall. *IV. 115.
— squamatum Vahl. IV. 107. no. 38. VI. 691. no. 1.
— ternifolium H. B. Kth. IV. 103. no. 11.
— ternifolium D. Don. IV. 107. no. 33.
— tomentosum R. Br. IV. 106. no. 30.
— trichotomum Thnbrg. IV. 102. no. 2.
— triflorum Vis. IV. 107. no. 34.
— *umbellatum* Poir. IV. 111. no. 56.
— velutinum Wall. IV. 106. no. 27.
— venosum Wall. *IV. 115.
— verticillatum D. Don. IV. 103. no. 7.
— villosum Blume. IV. 106. no. 29.
— viscosum Venten. IV. 108. no. 43.
— volubile Palis. IV. 112. no. 64.
Clethra Grtnr. II. 726. VI. 417.
— brevifolia Bth. VI. 417. no. 1.
— lanata Mart. et Galeotti. II. 726. no. 2.
— macrophylla Mart. et Galeotti. II. 726. no. 3.
— quercifolia Schlchtd. II. 726. no. 1.
Cleyera Thbg. I. 370. II. 801.
— gymnanthera Wght. et Arn. I. 370. no. 4. *II. 801. no. 1.
— Japonica Sieb. et Zucc. I. 370. no. 2.
— *Japonica* Thbrg. I. 368. no. 8.
— Mertensiana Sieb. et Zucc. I. 370. no. 3.
— Millettii Hook. et Arn. I. 370. no. 1.
— *ochnacea* DC. I. 370. no. 2.
— *ochnacea β.* DC. I. 368. no. 1.
— ochnoides Wall. II. 801. no. 2.
Clianthus Soland. I. 684. II. 860. V. 517.
— *carneus* Lindl. I. 684. no. 2.
— Dampieri A. Cunn. II. 860. no. 2.
— Oxleyi A. Cunn. II. 860. no. 1.
— pictus Endl. I. 684. no. 2.
— puniceus Soland. I. 684. no. 1. *V. 517. no. 1.
Clibadium Linn. II. 604. VI. 148.
— acuminatum Bth. VI. 148. no. 2.

Clibadium Peruvianum Poepp. *II. 604. no. 1.
— villosum Bth. VI. 148. no. 1.
Clidemia Don. II. 138. II. 918. V. 709.
— alpestris Gardn. V. 710. no. 11.
— *anisotrichon* Schlchtd. II. 131. no. 14.
— atrata Spring. II. 140. no. 20.
— aurea Cham. II. 138. no. 5.
β. angustifolia Cham. II. 139. no. 5.
— australis Cham. II. 138. no. 3. (c. varr. β. et γ.)
— barbinervis Bth. V. 710. no. 9.
— Benthamiana Miquel. V. 709. no. 1.
— campestris Bth. II. 139. no. 8.
— capitata Bth. II. 139. no. 6.
— cyanocarpa Bth. V. 709. no. 4.
— desmantha Bth. II. 139. no. 10.
— dispar Gardn. II. 918. no. 1.
— elegans Don. *II. 139. no. 13.
β. anguste crenata Miquel.
— fallax Cham. II. 138. no. 1.
— fenestrata Bth. V. 710. no. 8.
— glabrata Steudel. V. 709. no. 6.
— heterophila Steudel. V. 709. no. 3.
— inopogon Mart. II. 140. no. 19.
—? *laxiflora* Schlchtd. II. 135. no. 20.
— leptostachya Gardn. II. 140. no. 16.
—? maculata Bth. II. 139. no. 12.
—? miconioides Bth. II. 139. no. 11.
— oligochaeta Cham. II. 138. no. 4.
— Paraguayensis Steudel. V. 709. no. 2.
—? *petiolaris* Schlchtd. II. 134. no. 12.
— polyandra Bth. V. 710. no. 10.
— radulaefolia Bth. II. 139. no. 9.
— rariflora Bth. II. 139. no. 7.
— Renggeri Steudel. V. 710. no. 7.
— rhodopogon DC. *II. 140. no. 18.
— ribesiiflora Cham. II. 140. no. 15.
— rubra Mart. *II. 140. no. 17.
β. cordifolia Mart.
— scandens Gardn. II. 918. no. 2.
— Surinamensis Miquel. II. 140. no. 14.
— tetraquetra Cham. II. 138. no. 2.
— triflora Scheele. V. 709. no. 5.
Cliffortia Linn. II. 44.
— concavifolia Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 11.
— drepanoides Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 13.
— eriocephalina Cham. II. 45. no. 3.
— *falcata* Spr. II. 45. no. 13.
— filicaulis Cham. et Schlchtd. II. 44. no. 1.
— grandiflora Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 6.
— hirsuta Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 8.
— intermedia Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 5.
— lèptophylla Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 17.
— linearifolia Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 16.
— marginata Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 12.
— octandra Cham. II. 45. no. 4.
Cliffortia phylicoides Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 14.
— polyphylla Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 10.
— propinqua Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 9.
— reticulata Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 7.
— sericea Eckl. et Zeyh. II. 45. no. 15.
— serpyllifolia Cham. et Schlchtd. II. 44. no. 2.
Cliftonia Bnks. °VI. 421.
— ligustrina Grtnr. *VI. 422. no. 1.
Clinopodium Linn. III. 730. VI. 672. no. 1.
— *Aegyptiacum* Lam. III. 732. no. 20.
— *alpinum* Pon. III. 407. no. 1.
— *alpinum hirsutum* C. Båuh. III. 407. no. 1.
— Asiaticum Lour. III. 734. no. 30.
— *atropurpureum* Hortul. III. 732. no. 20.
— *capitatum* Sw. III. 543. no. 92.
— Carolinianum Mill. III. 734. no. 32.
— *Chamaedrys* Vahl. III. 524. no. 1.
— *fruticosum* Forsk. III. 868. no. 4.
— humile Mill. III. 734. no. 31.
— *incanum* Linn. III. 689. no. 4.
— *longicaule* Bth. III. 734. no. 27.
— *Martinicense* Jacq. III. 877. no. 44.
— *origanifolium* Labill. III. 732. no. 19.
— *plumosum* Sieb. III. 732. no. 20.
— *repens α.* Bth. III. 731. no. 18.
— *repens β.* Bth. III. 731. no. 17.
— *rugosum* Linn. III. 543. no. 92. III. 546. no. 102.
— *variegatum* Hortul III. 732. no. 20.
— *vulgare* Linn. III. 732. no. 20.
Clintonia Dougl. *II. 706. VI. 374.
— pulchella Lindl. *VI. 374. no. 1.
Clintonieae Prsl. II. 706. VI. 374.
Cliococca Babingt. II. 788.
— tenuifolia Babingt. *II. 788. no. 1.
Clitoria L. 751. V. 528.
Clitoria DC. I. 753. (ex p.) I. 756. (ex p.) V. 529.
— acuminata Bth. I. 752. no. 8.
— Amazonum Mart. I. 751. no. 7.
— *angustifolia* H. B. Kth. I. 754. no. 6.
— arborea Bth. I. 752. no. 10.
— arborescens Ait. I. 752. †
— *Berteriana* DC. I. 756. no. 8.
— brachystegia Bth. V. 528. no. 1.
— *Brasiliana* Linn. I. 753. no. 4.
— *Brasiliensis* Vell. I. 766. no. 9.
— *coccinea* Schrad. I. 756. no. 7.
— *falcata* N. ab E. I. 756. no. 7.
— *Fluminensis* Vellozo. I. 753. no. 3.
— *formosa* H. B. Kth. I. 753. no. 4.
— *gemina* Vellozo. I. 755. no. 21. β.
— *glycinoides* DC. I. 753. no. 3.
— *grandiflora* Mart. et Galeotti. V. 529. no. 2.

Clitoria lasciva Boj. I. 751. no. 1.
— laurifolia Desv. I. 752. no. 11.
— *Mariana* Schlchtd. I. 751. no. 3.
— Mexicana Lk. *I. 751. no. 3.
—? micrantha Guill. et Perr. I. 751. no. 4.
— mucronulata Bth. I. 752. no. 12.
— multiflora Mart. et Galeotti V. 529. no. 2.
— pedunculata Boj. I. 751. no. 2.
— *Plumieri* Turp. I. 753. no. 3.
— polystachya Bth. I. 751. no. 6.
— racemosa Bth. I. 752. no. 9.
— Schiedeana Schlchtd. I. 752. no. 13.
— *sinuata* Desv. I. 755. no. 24.
— Ternatea Linn. *V. 529. no. 3.
— *Virginiana* L. I. 755. no. 20.
— viridiflora Bouton. I. 751. no. 5.
Clitorieae Bth. I. 750. II. 900. V. 528.
Cloanthes Bartlingii Lehm. IV. 134. no. 5. (cf. Chloanthes).
Clompanum majus Rmph. V. 98. no. 2.
Clomenocoma Cass. II. 623. VI. 172.
— montana Bth II. 623. no. 1. VI. 172. no. 1.
Closachima Krthls. V. 134.
— *marginata* Krthls. V. 134. no. 2.
— *ovalis* Krthls. V. 134. no. 1.
Closterandra Belang. I. 115.
— minor Belang. I. 115. no. 1.
Closterostyles Torr. et Gr. II. 35.
Closteranthera (errore typogr.) cf. Closterandra.
Clusia L. I. 393. II. 811. V. 144.
Clusia DC. I. 393. (ex p.)
— *acuminata* Spr. I. 393. no. 1.
— bicolor Mart. I. 393. no. 6.
— criuva Cambess. I. 393. no. 2.
— cuneata Bth. II. 811. no. 4.
— Fockeana Miquel. II. 811. no. 2.
— fragrans Gardn. II. 811. no. 3.
— Ganabarica Casaretto. V. 144. no. 2.
— Gaudichaudii Cambess. I. 393. no. 3.
— grandiflora Splitgerber. II. 811. no. 1.
— Hoffmannseggiana Schlchtd. I. 394. no. 10.
— insignis Mart. I. 393. no. 5.
— lanceolata Cambess. I. 393. no. 4.
— leprantha Mart. I. 393. no. 7.
— leucantha Schlchtd. I. 394. no. 11.
— Lhotskyana Schlchtd. I. 394. no. 9.
— mammosa Casaretto. V. 144. no. 1.
— pseudochina Poepp. et Endl. I. 393. no. 1.
— rosea L. I. 394. †
— rupicola Casaretto. V. 144. no. 3.
— Sellowiana Schlchtd. I. 394. no. 8.
— subsessilis Bth. V. 144. no. 4.
— *tetrandra* Willd. I. 393. no. 2.
CLUSIACEAE Lindl. I. 392. II. 810. V. 144.
Clusieae Endl. I. 392.
Clypea Blume. I. 96.
— *Abyssinica* A. Rich. I. 96. no. 11.
— *acuminatissima* Blume. I. 96. no. 6.
— *Burmanni* Wght. et Arn. I. 96. no. 10.
— *capitata* Blume. I. 96. no. 5.
— *discolor* Blume. I. 96. no. 1.
— *corymbosa* Blume. I. 96. no. 4.
— *glaucescens* Dcne. I. 96. no. 8.
— *hernandifolia* Wght. et Arn. I. 96. no. 9.
— *longa* Don. I. 96. no. 7.
— *tomentosa* Blume. I. 96. no. 3.
— *venosa* Blume. I. 96. no. 2.
Clypearia Bth. V. 613.
— *rubra* Rmph. I. 930. no. 29.
Clypeola L. I. 146.
— cyclodontea Delile. I. 146. no. 1.
— dichotoma Boiss. I. 146. no. 4.
— glabra Boiss. I. 146. no. 2.
— Jonthlaspi L. I. 146. †.
— lappacea Boiss. I. 146. no. 3.
— *maritima* Georgi. I. 146. no. 2.
Cneorum L. *I. 562.
Cnestis Juss. I. 561.
— emarginata W. Jack. I. 561. no. 1.
— florida W. Jack. I. 561. no. 2.
— mimosoides W. Jack. *I. 561. no. 3.
— pentaphylla Spanoghe. I. 561. no. 4.
Cnicus Vaill. *II. 672.
— *arvensis* Hook. II. 675. no. 10. γ.
— *Pitcheri* Torr. II. 675. no. 7.
— *spinosissimus* Siev. II. 676 no. 1.
— *Virginianus* Hook. II. 675. no. 12.
Cnidium Cuss. II. 403. V. 866.
— *anomalum* Ledeb. II. 426. no. 1.
— argenteum Cesati. II. 403. no. 1.
— *argenteum* Cesati. V. 866. no. 1.
— Athoum Griseb. V. 867. no. 6.
— *atropurpureum* Spr. II. 403. no. 1.
— *Canadense* Spr. II. 405. no. 3.
— coniifolium Boiss. V. 867. no. 5.
— *cuneatum* Ldb. II. 426. no. 2.
— Dahuricum Fisch. et Mey. *II. 403. no. 2. *V. 866. no. 1.
β. lanatum Fisch et Mey. V. 866. no. 1.
— diffusum DC. V. 867. †
— *Fischeri* Spr. II. 405. no. 1.
— multicaule Ldb. V. 866. no. 2.
— *multicaule* Ldb. V. 865. no. 1.
— orientale Boiss. V. 866. no. 4.
— salinum Turczan. V. 866. no. 3.
— *striatum* Turcz. II. 403. no. 2. V. 866. no. 1.
— *venosum* Koch. II. 393. no. 1.
Cnidome mentzelioides E. Mey. II. 228. no. 1.
Cobaea Cav. VI. 527.
— minor Martens et Galeotti. VI. 527. no. 1.

Cobamba M. Blanco. III. 437. °III. 973. (*IV. 134.) *VI. 655.
— dichotoma Blanco. III. 437. no. 1.
Coccinia Wght. et Arn. II. 202.
— Indica Wght. et Arn. *II 202. no. 1. (cum varr. *α* et *β*. ibid.)
Coccocypselum Swrtz. II. 516. VI. 72.
— dichroolasium Mart. II. 516. no. 1.
— montanum Mart. II. 516. no. 2.
— veronicoides Prsl. VI. 72. no. 1.
Coccogalium DC. II. 457.
Cocculus DC. I. 93. II. 748. V. 17.
— acuminatus DC. *I. 94. no. 13.
— angustifolius Hsskrl. V. 17. no. 1.
— *Aristolochiae* DC. I. 94. no. 14.
— Bakis A. Rich. I. 93. no. 1.
— banisteriaefolius A. Rich. I. 95. no. 29.
— Bantamensis Blume. I. 93. no. 9.
— *Burmanni* DC. I. 96. no. 10.
— Carolinianus DC. *I. 94. no. 24.
— cinerascens St. Hil. I. 95. no. 25.
— *convolvulaceus* DC. I. 94. no. 12.
— convolvulaceus Endl. I. 95. no. 30.
— cordifolius DC. *I. 94. no. 12. II. 749. †
— coriaceus Blume. I. 93. no. 7.
— corymbosus Blume. I. 93. no. 3.
— cynanchoides Prsl. I. 94. no. 22.
—? diantherus Hook. et Arn. I. 93. no. 10.
— dichrous Mart. II. 749. no. 10.
— *ellipticus* DC. I. 93. no. 2.
— fasciculatus Bth. II. 749. no. 2.
— Ferrandianus Gaudich. I. 94. no. 23.
— filipendula Mart. II. 748. no. 2.
— glaber Wght. I. 94. no. 16.
— glaucescens Blume. I. 93. no. 6.
— hexagynus Colebr. I. 94. no. 11.
— *Japonicus β.* DC. I. 96. no. 8.
— Japurensis Mart. II. 748. no. 4.
— Imene Mart. II. 748. no. 6.
— incanus Colebr. I. 94. no. 18.
— laevigatus Mart. II. 748. no. 7.
— lanuginosus Bsume. I. 93. no. 4.
— Leaeba DC. *I. 93. no. 2.
— macrocarpus W. et Arn. I. 94. no. 15.
—? macrophyllus St. Hil. et Tulasn. I. 95. no. 27.
— Martii St. Hil. et Tulasn. I. 92. no. 28.
— oblongifolius Mart. II. 748. no. 1.
— ovalifolius Blume. I. 93. no. 8.
— Palmi Mart. II. 749. no. 9.
— palmatus DC. I. 95. †
— paniculiger Mart. II. 748. no. 3.
— *peltatus* DC. I. 96. no. 10.
—? platyphyllus St. Hil. I. 95. no. 26.
β. Ildefonsianus St. Hil. et Tulasne.
— Plukenetii DC. *I. 94. no. 17.
Cocculus polycarpus Wall. I. 94. no. 13.
— *radiatus* DC. I. 94. no. 13.
— reticulatus Mart. II. 748. no. 5.
— rimosus Blume. I. 93. no. 5.
— *Roxburghianus* Wall. I. 96. no. 9.
— *sepium* Colebr. I. 94. no. 14.
— sepium Colebr. I. 94. no. 19.
— *suberosus* Wght. et Arn. I. 95. no. 1.
— tomentosus Colebr. I. 94. no. 20.
— *tomentosus* Mart. I. 95. no. 28. II. 749. no. 1.
— triandrus Colebr. I. 94. no. 21.
— urophyllus Mart. II. 749. no. 8.
— villosus DC. *I. 94. no. 14.
— *Wightianus* Wall. I. 94. no. 17.
Cochlearia L. I. 153.
Cochlearia DC. II. I. 175.. (ex p.)
— *acaulis* Dsf. I. 175. no. 1.
—? *alyssoides* DC. 154. no. 10.
— Anglica L. I. 154. †
— aquatica C. A. Meyer. *I. 154. no. 11.
— Armoracia L. I. 154. †
— Aucheri Boiss. I. 153. no. 3.
— Batava Dumort. I. 153. no. 1.
— *Caisir* Wall. I. 143. no. 10.
— campylocarpa Boiss. I. 154. no. 8.
— comelinae Boiss. I. 154. no. 9.
— *cordifolia* Turcz. I. 171. no. 1.
— Danica L. I. 154. †
— drabaecarpa Boiss. I. 153. no. 4.
— flava Buchan. *I. 154. no. 10.
— glaucophylla Boiss. I. 153. no. 6.
— Groenlandica L. I. 154. †
— *integrifolia* DC. I. 171. no. 1.
— macrocarpa W. K. 154. †
— natans C. A. Meyer. *I. 154. no. 12.
β. indivisa C. A. Meyer.
α. variifolia C. A. Meyer.
— *Nilotica* Delile. II. 764. no. 2.
— officinalis L. I. 154. †
— planisiliqua Boiss. I. 153. no. 5.
—? rhizobotrya Wlprs. I. 153. no. 2.
— *saxifragaefolia* DC. 154. no. 1.
— *septentrionalis* DC. I. 154. no. 13.
— spathulatha Schlchtd. *I. 154. no. 13.
— *velutina* DC. I. 126. no. 2.
— violacea Boiss. I. 154. no. 7.
Cochlidiospermum Rchb. III. 335. 453.
Cochlitropis Bth. I. 765.
Cochlospermae Endl. I. 367.
Cochlospermum Rth. I. 367.
— gossypium DC. I. 367. †
— insigne St. Hil. Juss. et Cambess. I. 367. no. 2.
— tinctorium Perr. I. 367. no. 1.
Cochranea Miers. *IV. 134.

Cordarium Sol. I. 854.
— *acutifolium* Afz. I. 854. no. 2.
— *nitidum* Vahl. I. 854. no. 2.
— *obtusifolium* Afz. I. 854. no. 2.
Codia Forst. *II. 373.
— *montana* Labillard. V. 828. no. 3.
Codon Royen. *VI. 566.
Codonanthe Mart. II. 715.
Codonanthemum Bth. *II. 729.
Codonanthus G. Don. *VI. 499.
Codonocephalum Fnzl. °VI. 141.
— *inuloides* Fnzl. II. 954. no. 1.
— inuloides Fnzl. VI. 141. no. 1.
Codonopsis Wall. *II. 710. *VI. 381.
Codonostigma Kltzsch. *II. 729.
Codoriocalyx Hsskrl. I. 744. II. 791.
— conicus Hsskrl. *I. 744. no. 1. II. 891. no. 2.
— gyrans Hsskrl. *II. 891. no. 1.
Coelanthum E. Mey. II. 248.
— grandiflorum Fzl. II. 248. no. 1.
— parviflorum Fzl. II. 248. no. 2.
Coelestinia Cass. II. 545.
— *coerulea* Lessing. II. 545. no. 1.
— Hartwegi Wlprs. II. 545. no. 4.
— Lessingiana Kltzsch. II. 545. no. 1.
— maritima Torr. et Gr. II. 545. no. 3.
— petiolata Hook. et Arn. II. 545. no. 2.
Coelidium Vogel. I. 582. II. 834.
— Boviei Bth. II. 834. no. 2.
— bullatum Bth. II. 834. no. 1.
— ciliare Vogel. I. 582. no. 1.
— muraltioides Bth. II. 834. no. 3.
— Vogelii Wlprs. I. 582. no. 2.
Coelocline DC. fil. I. 76.
— acutiflora DC. fil. *I. 76. no. 1.
—? lucida DC. fil. *I. 76. no. 5.
—? oxypetala DC. fil. *I. 76. no. 3.
—? parviflora DC. fil. I. 76. no. 2.
—? polycarpa DC. fil. *I. 76. no. 4.
Coelopleurum Ldb. °V. 920.
— Gmelini Ldb. V. 920. no. 1.
Coelurutis Ser. I. 638. no. 1. et 2.
Coelospermeae DC. II. 427. V. 923.
Coelospermum Blume. *II. 488. II. 942.
— barbatum Spanoghe. II. 942. no. 1.
Coffe DC. II. 475.
Coffea Linn. II. 475. II. 942. VI. 42.
— Arabica Linn. II. 478. †
— *australis* Vell. II. 479. no. 11.
— Brasiliensis Wlprs. II. 477. no. 22.
— calycina Bth. II. 476. no. 14.
— Chamissonis Hook. et Arn. II. 477. no. 21.
— corymbulosa Bertoloni. II. 476. no. 7.
— crassiloba Bth. II. 476. no. 15.
— eriantha Gardn. II. 476. no. 8.
— floribunda Mart. II. 476. no. 16.
Coffea gardenioides Cham. II. 477. no. 20.
— hirsuta G. Don. II. 475. no. 4.
— jasminoides Cham. II. 476. no. 11.
— Kraussiana Hochstett. II. 942. no. 1.
— *Kraussiana* Hochstett. VI. 47. no. 1.
— lanceolata Cham. et Schlchtd. II. 476. no. 6.
— *lanceolata* Cham. II. 477. no. 22.
— magnoliaefolia Cham. II. 476. no. 13.
— major Cham. II. 477. no. 17.
— marginata Bth. VI. 42. no. 1.
— minor Cham. II. 477. no. 18.
— nodosa Cham. II. 477. no. 23.
— obovata Cham. et Schlchtd. II. 476. no. 5.
— *odorata* Forst. II. 490. no. 10.
— parquioides Cham. II. 476. no. 12.
— parvifolia Cham. II. 477. no. 21.
— stenophylla G. Don. II. 475. no. 3.
— *stipulata* Arrabida. VI. 60. no. 1.
— subsessilis Bth. II. 476. no. 9.
— tenuiflora Bth. II. 476. no. 10.
— Travancorensis Wall. II. 475. no. 1.
— *truncata* Vellozo. II. 479. no. 10.
— viburnoides Cham. II. 477. no. 19.
— Wightiana Wall. II. 475. no. 2.
Coffeaceae Endl. II. 454. II. 941. V. 8.
Coffeeae DC. II. 470. VI. 37.
Coilostigma Bth. *II. 729.
Coinogyne Lssng *II. 635.
Cola DC. (?) I. 334.
Cola Schott. et Endl. °V. 106.
— acuminata Horsf. et Bennet. V. 106. no. 1.
— cordifolia Horsf. et Bennet. V. 106. no. 2.
Colbertia Salisb. I. 63.
— augusta Wall. I. 63. no. 3.
— obovata Blume. I. 63. no. 1.
— scabrella Don. I. 63. no. 2.
Coldenia Linn. *VI. 557.
Colea Bojer. *VI. 516.
Colebrookia Sm. III. 584. °III. 979.
— oppositifolia Sm. III. 584. no. 1.
— ternifolia Rxb. III. 585. no. 2.
Coleoides Bth. III. 501.
Coleonema Bartl. et Wendl. I. 507.
— album Bartl. *I. 507. no. 2.
  γ. gracile Schlchtd.
  β. virgatum Schlchtd.
— aspalathoides Adr. Juss. I. 507. no. 1.
— *gracile* Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 2. γ.
— pulchrum Hook. I. 507. no. 3.
— *virgatum* Eckl. et Zeyh. I. 507. no. 2. β.
Coleostachys Adr. Juss. °V. 178.
— genipaefolia Adr. Juss. V. 178. no. 1.
Coleostephus Myconis Cassini. VI. 206. no. 1.
Coleostylis Sonder. °VI. 370.
— Preissii Sonder. VI. 370. no. 2.

Coleostylis umbellulata Sonder. VI. 370. no. 1.
Colephonia Commers. I. 558.
Coleus Lour. III. 513. °III. 977. VI. 658.
— acuminatus Benth. III. 515. no. 8.
— Africanus Bth. III. 516. no. 11.
— *Amboinicus* Lour. III. 515. no. 5.
— aromaticus Bth. III. 514. no. 5.
— *aromaticus* Lindl. III. 515. no. 5.
— atropurpureus Bth. III. 516. no. 12.
β. densiflorus.
— barbatus Benth. III. 513. no. 2. III. 940.
— bicolor Bth. III. 517. no. 16.
— Blumei Bth. III. 517. no. 18.
— Bojeri Bth. III. 515. no. 6.
— *crassifolius* Bth. III. 515. no. 5.
— galeatus Bth. III. 518. no. 20.
— glabratus Bth. III. 519. no. 26.
— grandifolius Bth. III. 516. no. 10.
— Heynei Bth. III. 514. no. 3.
— inflatus Bth. III. 519. no. 24.
— ingratus Bth. III. 516. no. 9.
— laciniatus Bth. III. 517. no. 19.
— Macraei Bth. III. 519. no. 25.
— macrophyllus Bth. III. 517. no. 15.
— macrostachys Bth. III. 518. no. 21.
— Malabaricus Bth. III. 518. no. 23.
— multiflorus Bth. III. 517. no. 14.
— ovatus Bth. III. 518. no. 22.
— paniculatus Benth. III. 519. no. 28.
— Persoonii Bth. III. 516. no. 13.
— *rugosus* Bth. III. 503. no. 9.
— scutellarioides Benth. III. 515. no. 7.
— secundiflorus Bth. III. 517. no. 17.
— spicatus Benth. III. 513. no. 1.
— suborbicularis Zollinger et Moritzi. VI. 658. no. 2.
— subspicatus Hochstett. VI. 658. no. 1.
— tuberosus Bth. III. 520. no. 29.
— Wightii Bth. III. 519. no. 27.
— Zatarhendi Bth. III. 514. no. 4.
Colicodendron Mart. I. 197.
— longifolium Mart. I. 197. no. 2.
— Yco Mart. I. 197. no. 1.
Colladonia DC. *II. 424. V. 919.
— Syriaca Boiss. V. 919. no. 1.
Collaea DC. I. 762.
—? angustifolia Bth. *I. 763. no. 16.
— crassifolia Bth. I. 763. no. 11.
— *gibba* Grah. I. 782. no. 1.
— *gibba* Wall. I. 782. no. 3.
— glaucescens Bth. *I. 763. no. 8.
— grewiaefolia Bth. I. 762. no. 3.
— latisiliqua Bth. *I. 763. no. 14.
— longiflora Bth. *I. 763. no. 7.
— macrophylla Bth. I. 762. no. 2.
— Martii Bth. *I. 763. no. 15.
Collaea Neesii Bth. *I. 763. no. 13.
* α. floribunda.
β. latifolia.
— obtusa Bth. I. 763. no. 4.
— pascuorum Mart. I. 763. no. 9.
— peduncularis Bth. I. 762. no. 1.
— pendula Bth. *I. 763. no. 6.
— rugosa Bth. I. 763. no. 5.
— scarlatina Mart. I. 763. no. 12.
δ. calycina Bth.
α. latifolia Bth.
β. oblongifolia Bth.
γ. Pohliana Bth.
— *trinervia* DC. I. 783. no. 1.
— velutina Bth. I. 763. no. 10.
— *venosa* Grah. I. 782. no. 2.
Collinsia Nutt. III. 231. °III. 960. *VI. 639.
— bicolor Bth. III. 231. no. 4. III. 935.
— grandiflora Lindl. III. 231. no. 2.
— heterophylla Hook. III. 232. no. 8.
— minima Nutt. III. 232. no. 5.
— *parviflora* Hook. III. 232. no. 6.
— parviflora Lindl. III. 232. ho. 6.
— sparsiflora Fisch. et Mey. III. 232. no. 7.
— verna Nutt. III. 231. no. 1.
— *violacea* Nutt. III. 231. no. 2.
— violacea Nutt. III. 231. no. 3.
Collinsonia Linn. III. 711. °III. 982.
— anisata Pursh. III. 712. no. 6.
— Canadensis Linn. III. 711. no. 1.
— *cuneata* Wndrth. III. 712. no. 1.
— *decussata* Mnch. III. 712. no. 1.
— *ovalis* Pursh. III. 712. no. 1.
— *praecox* Walt. III. 712. no. 3.
— punctata Elliott. III. 712. no. 4.
— *scabra* Pers. III. 712. no. 3.
— scabriuscula Ait. III. 712. no. 3.
— *serotina* Walt. III. 712. no. 2.
— tuberosa Michx. III. 712. no. 2.
— verticillata Baldw. III. 712. no. 5.
Collomia Nutt. *VI. 526.
Collophora Martius. *VI. 465.
Colobandra Bartl. °VI. 674.
— canescens Bartl. VI. 675. no. 3.
—? lanata Bartl. VI. 675. no. 6.
— mollis Bartl. VI. 675. no. 2.
— platyphylla Bth. VI. 675. no. 4.
— robusta Bartl. VI. 675. no. 1.
— subvillosa Bartl. VI. 675. no. 5.
Colobanthus Bartl. II. 249. V. 789.
— *aretioides* Gill. II. 249. no. 1.
— Benthamianus Fzl. II. 249. no. 4. *V. 789. no. 2.
— Billardieri Fzl. II. 249. no. 3.
— muscoides Hook. fil. V. 789. no. 1.
— Quitensis Bartl. II. 249. no. 1.

Colobanthus saginoides Bartl. II. 249. no. 2.
— *subulatus* Hook. fil. V. 789. no. 2.
Colobotropis E. Mey. I. 579.
Colobotus E. Mey. I. 608.
— ochreatus E. Mey. *I. 608. no. 1.
Cologania H. B. Kth. I. 751. V. 528.
—? affinis Mart. et Galeotti. V. 528. no. 1.
— heterophylla Gill. I. 751. no. 1.
— obovata Schlchtd. I. 751. no. 2.
— pulchella DC. I. 751. †
Colophonia Mauritiana DC. I. 558. no. 1.
Colpias E. Mey. III. 254. °III. 961. *VI. 637.
— mollis E. Mey. III. 254. no. 1.
Colquhounia Wall. III. 895. °III. 991.
— coccinea Wall. III. 895. no. 1.
β. parviflora Bth.
— elegans Wall. III. 896. no. 3.
— vestita Wall. III. 896. no. 2.
Colsmannia Lehm. * VI. 560.
Columbia Pers. I. 362.
— Celebica Blume. I. 362. no. 2.
— Javanica Blume. I. 362. no. 1.
Columellia Rz. et Pav. *II. 722.
COLUMELLIACEAE Lindl. II. 722.
Columnea Plum. II. 714. VI. 404.
— acuminata Bth. VI. 404. no. 1.
— *anisophylla* DC. II. 716. no. 1.
— *balsamica* Rxb. III. 273. no. 6.
— campanulata Bth. VI. 405. no. 6.
— capitata Poepp. et Endl. *VI. 405. no. 3.
— divaricata Poepp. et Endl. *VI. 405. no. 2.
— flava Martens et Galeotti. II. 714. no. 5.
— guttata Poepp. et Endl. II. 714. no. 2.
— *heterophylla* Rxb. III. 272. no. 2.
— inaequilatera Poepp. et Endl. II. 714. no. 3.
— *longifolia* Linn. III. 296 no. 3.
— lucida Poepp. et Endl. *VI. 405. no. 4.
— macrantha Bth. VI. 405. no. 7.
— *minuta* Rxb. III. 270. no. 29.
— moesta Poepp. et Endl. II. 714. no. 1.
— *scandens* Mart. VI. 738.
— Schiedeana Schlchtd. VI. 405. †
— speciosa Prsl. VI. 738.
— splendens Paxton. VI. 405. †
— strigosa Bth. VI. 405. no. 5.
— *tomentosa* Rxb. III. 270. no. 30.
— *trifoliata* Lnk. III. 269. no. 20.
— umbellata Bertol. II. 714. no. 4.
Coluria R. Br. II. 49.
— geoides R. Br. *II. 49. no. 1.
Colus Jovis Besl. III. 609. no. 42.
Colutea L. I. 682.
— *herbacea* Willd. I. 683. no. 8.
— Nepalensis Sims. I. 682. no. 1.
— *rigida* Thnbrg. I. 682. no. 2. β.
Coluteocarpus Boiss. I 141.
Coluteocarpus reticulatus Boiss. I. 141. no. 1.
Coluteoideae (Cassia) Vogel. V. 560. no. 5.
Colvillea Boj. I. 811. V. 558.
— racemosa Boj. *I. 811. no. 1. V. 558. no. 1.
Comaropsis L. C. Rich. *II. 46.
— *Doniana* DC. II. no. 2.
— *fragarioides* Trattin. II. 46. no. 2.
— *pedata* DC. II. 23. no. 57.
Comarum Linn. II. 26.
— Salesowii Bnge. *II. 26. no. 1.
COMBRETACEAE R. Br. II. 60. II. 915. V. 661.
Combreteae DC. II. 65.
Combretum Loefl. II. 65. II. 915. V. 662.
— adenophyllum Mart. II. 65. no. 9.
— *Afzelianum* G. Don. II. 64. no. 12.
— *Afzelii* Hort. Anglic. V. 338. no. 51.
— *albidum* G. Don. II. 67. no. 29.
— *alternifolium* Jcq. II. 64. no. 8.
— *alternifolium* Madr. Herb. II. 63. no. 4.
— anfractuosum Mart. II. 66. no. 14.
— argenteum Bertol. II. 65. no. 2.
— aurantiacum Bth. II. 66. no. 18.
— *barbatum* Newm. II. 64. no. 6.
— Bugi Cambess. II. 65. no. 4.
— chrysophyllum Guill. et Perr. II. 67. no. 27.
— collinum Fresen. II. 67. no. 20.
— *comosum* G. Don. II. 64. no. 3.
— comosum Don. *II. 67. no. 25.
— *corymbosum* Schum. et Thonn. II. 67. no. 24.
— *decandrum* Jcq. II. 64. no. 8.
— *decandrum* Rxb. II. 64. no. 2.
— *decandrum* Rz. et Pav. II. 64. no. 9.
— Duarteanum Cambess. II. 65. no. 5.
— elegans Cambess. II. 65. no. 3.
— erianthum Bth. V 662. no. 1.
— *eriopetalum* G. Don. II. 64. no. 10.
— *ferrugineum* Hffmsgg. II. 65. no. 8.
— glaucocarpum Mart. II. 66. no. 15.
— glutinosum Perr. II. 67. †
— *grandiflorum* G. Don. II. 64. no. 12.
— grandiflorum G. Don. V. 662. †
— Guianense Miq. II. 66. no. 19.
— *Heyneanum* Wall. II. 67. no. 29.
— *intermedium* G. Don. II. 64. no. 4. II. 67. no. 23.
— Kraussii Hochstett. V. 662. no. 4.
— latifolium Paxton. V. 662. †
— laurifolium Mart. II. 65. no. 7.
— *laxum* Madr. Herb. II. 67. no. 29.
— *laxum* Rxb. II. 67. no. 30.
— leprosum Mart. II. 66. no. 11.
— leptostachyum Mart. II. 66. no. 12.
— *lucidum* Blume. V. 663. no. 1.
— magnificum Mart. II. 66. no. 17.

Combretum micranthum Don. *II. 67. no. 26.
— monetaria Mart. II. 66. no. 13.
— mucronatum Thonn. *II. 67. no. 23.
— nigricans Lepr. II. 67. no. 28.
— obtusum Perr. II. 67. †
— *ovale* R. Br. II. 64. no. 7.
— ovalifolium Rxb. II. 67. no. 29.
— *paniculatum* Vent. II. 67. no. 25.
— *parviflorum* Rchb. II. 67. no. 26.
— *Pavonii* G. Don. II. 64. no. 9.
— phaeocarpum Mart. II. 65. no. 10.
— *pilosum* Rxb. II. 64. no. 5.
— *polyandrum* Hffmsgg. II. 6. no. 4.
— pulchellum Mart. II. 65. no. 8.
— punctatum Steudel. V. 662. no. 2.
— *purpureum* Vahl. II. 64. no. 11.
— racemosum Palis *II. 67. no. 24.
— reticulatum Fresen. II. 67. no. 21.
— reticulatum Prsl. II. 65. no. 1.
— *Roxburghii* G. Don. II. 67. no. 29.
— salicifolium E. Mey. II. 915. no. 1.
— *sericeum* G. Don. II. 64. no. 14.
— *spinosum* H. B. Kth. II. 64. no. 8.
— *squamosum* Rxb. II. 64. no. 13.
— stigmarium Mart. II. 66. no. 16.
— terminalioides Steudel. V. 662. no. 3.
— trichanthum Fres. II. 67. no. 22.
— *trigonioides* Perr. II. 67. no. 24.
— variabile Mart. II. 65. no. 6.
— Wightianum Wall. II. 67. no. 30.
Comesperma Labill. I. 242. V. 65.
Comesperma St. Hil. I. 243. (ex p.)
— aemula Steudel. V. 65. no. 6.
— anthocarpa Steudel. V. 66. no. 11.
— contracta Steudel. V. 65. no. 7.
— corniculata Steudel. V. 65. no. 2.
— *floribunda* St. Hil. I. 243. no. 1.
— herbacea Steudel. V. 66. no. 15.
— hirtella Steudel. V. 66. no. 9.
— integerrima Endl. *I. 242. no. 3.
— *Kunthiana* St. Hil. I. 243. no. 4.
— *laurifolia* St. Hil. I. 243. no. 2.
— laxiuscula Steudel. V. 66. no. 12.
— longebracteata Steudel. V. 65. no. 3.
— longifolia Steudel. V. 65. no. 1.
— megapterygia Steudel. V. 65. no. 5.
— parviflora Steudel. V. 66. no. 14.
— ramosissima Steudel. V. 66. no. 10.
— rosea Steudel. V. 65. no. 4.
— scandens Steudel. V. 66. no. 16.
— simplex Endl. I. 242. no. 2.
— stricta Endl. I. 242. no. 1.
— tenuis Steudel. V. 65. no. 8.
— varians Steudel. V. 66. no. 13.
Cometes Burm. I. 262.
— Abyssinica R. Br. I. 262. no. 2.
Cometes alterniflora L. I. 262. no. 1.
— Surattensis Burm. *I. 262. no. 1.
Commersonia Forst. *I. 337. II. 795. V. 110.
— aspera Colebr. *II. 795. no. 1.
— cinerea Steudel. V. 111. no. 3.
— cygnica Steudel. V. 111. no. 2.
— *echinata* Blume. II. 795. no. 2.
— herbacea G. Don. II. 795. no. 3.
— Javanensis G. Don. II. 795. no. 2.
Commianthus Bth. II. 489. VI. 50.
— Schomburgkii Bth. *II. 489. no. 1. VI. 50. no. 1.
Commidendrum Burch. *II. 592. *II. 952. no. 30.
Commilobium Bth. I. 805. V. 547.
— abruptum Moric. V. 547. no. 1.
— polygalaeflorum Bth. I. 805. no. 1.
— pubescens Bth. I. 805. no. 2.
Commiphora Madagascariensis Jcq. I. 558. no. 2.
Comocarpa Torr. et Gr. II. 35.
Comocladia P. Br. *I. 550.
Comolia DC. V. 688.
— microphylla Bth. V. 688. no. 1.
— purpurea Miquel. V. 699. no. 3.
— veronicaefolia Bth. V. 688. no. 2.
COMPOSITAE Vaill. II. 538. II. 944. VI. 88.
Compresso-articulatae Pfeiff. (Opuntia) II. 347.
Conandron Siebld. et Zucc. III. 437. °III. 973. *VI. 522. (*VI. 655.)
— ......? Siebld. et Zucc. *III. 437. no. 1.
Conchophyllum Blume. *VI. 493.
Concinnae Bth. (Acacia) I. 916.
Concinni (Aster) N. ab E. II. 562.
Concolores (Aster) Torr. et Gr. II. 561.
Concordia Bth. V. 611.
Condaminea DC. II. 507 VI. 701.
— macrophylla Poepp. et Endl. II. 507. no. 1.
— utilis Goudot. VI. 701. no. 1.
Condylocarpon Dsf. *VI. 470.
Congea Rxb. IV. 116.
— azurea Wall. IV. 116. no. 1.
— barbata Wall. IV. 117. no. 3.
— ferruginea Wall. *IV. 118.
— Jackiana Wall. IV. 117. no. 6.
— paniculata Wall. *IV. 118.
— pentandra Wall. IV. 117. no. 5.
— tomentosa Rxb. IV. 117. no. 2.
— unguiculata Wall IV. 117. no. 4.
Coniandra Schrad. II. 195.
— dissecta Schrad. *II. 195. no. 4.
— glauca Schrad. II. 195. no. 1.
— pinnatisecta Schrad. II. 195. no. 3.
— Zeyheri Schrad. II. 195. no. 2.
Coniandreae Endl. II. 195. V. 759.
Coniogeton Blume. I. 556.

Coniogeton arborescens Blume. *I. 556. no. 1.
Conioselinum Fisch. II. 405. V. 870.
—? Canadense Torr. et Gr. II. 405. no. 3.
— cenolophioides Turczan. V. 870. no. 3.
— Czernaevia Fisch. et Mey. II. 405. no. 2.
— *Czernaevia* Fisch. et Mey. V. 870. no. 1.
— Fischeri Wimm. et Grabowsk. V. 870. no. 1.
—? gayoides Lssng. II. 405. no. 1.
— *Ingricum* Fisch. V. 870. no. 1.
— longifolium Turczan. V. 870. no. 2.
— *Tataricum* Fisch. V. 870. no. 1.
— *univittatum* Turczan. V. 870. no. 1.
Coniothele DC. *II. 607.
— *Californica* DC. II. 975. no. 1.
Conium Linn. *II. 425.
CONNARACEAE R. Br. I. 561. V. 420.
Connarus L. I. 561. V. 420.
— *decumbens* Thnbrg. I. 592. no. 92. V. 457. no. 26.
— ferrugineus W. Jack. I. 561. no. 4.
— floribundus Schum. et Thonn. I. 561. no. 9.
— grandis W. Jack. I. 561. no. 7.
— Javanicus Blume. V. 421. no. 3.
—? juglandifolius Hook. et Arn. I. 561. no. 3.
— lucidus Hsskrl. V. 420 no. 2.
— lucidus W. Jack. I. 561. no. 8.
— macrophyllus Poepp. et Endl. V. 421. no. 4.
— *mimosoides* Vahl et Willd. I. 561. no. 3.
—? nitidus Hsskrl. V. 420. no. 1.
— pinnatus Lam. *I. 561. no. 1.
— santaloides Vahl. *I. 561. no. 2.
— *santaloides* Vahl? I. 561. no. 2. (Gen. no. 5950.)
— semidecandrus W. Jack. I. 561. no. 6.
— villosus W. Jack. I. 561. no. 5.
Conobea Aubl. III. 298. °III. 966. *VI. 642.
— *alata* Grah. III. 277. no. 1.
— aquatica Aublet. III. 298. no. 1.
— *borealis* Spr. III. 286. no. 7.
— *ovata* Hortor. III. 268. no. 18.
— *pumila* Spr. III. 268. no. 18.
— punctata Nees et Mart. III. 298. no. 2.
— *verticillaris* Spr. III. 268. no. 15.
— viscosa Spr. III. 298. no. 3.
Conocarpus DC. II. 63. (ex p.)
— *acuminata* Rxb. II. 63. no. 3.
— *latifolia* Rxb. II. 63. no. 2.
— *leiocarpa* DC. II. 63. no. 1.
Conocarpus Grtnr. *II. 63.
Conoclinium DC. *II. 552. II. 950. VI. 108.
— affine Gardn. VI. 707.
— humile Bth. VI. 108. no. 1.
— oligolepis Knze. II. 950. no. 1.
Conodiscus Hook fil. VI. 241.
Conoharia DC. I. 224. V. 60.
— *castaneaefolia* St. Hil. I. 224. no. 1.
— *Lobolobo* St. Hil. I. 224. no. 2.
— *Rinorea* St. Hil. I. 224. no. 3.
Conomorpha Alph. DC. *VI. 451.
Conomorphe Otth. II. 778.
Conopharyngia G. Don. *VI. 470.
Conopholis Wllrth. III. 464. °III. 974.
— Americana Wllrth. III. 464. no. 1.
Conophora DC. II. 653.
Conosiphon Poepp. II. 520. VI. 75.
— aureus Poepp. et Endl. II. 520. no. 1. VI. 75. no. 2.
— striiflorus Poepp. et Endl. *II. 520. no. 2. VI. 75. no. 1.
Conostegia Don. *II. 145. V. 715.
— acuminata Steudel. V. 715. no. 1.
—? *arborea* Schlchtd. II. 134. no. 18.
— lasiopoda Bth. V. 715. no. 2.
— polyandra Bth. V. 715. no. 3.
Conostephium Bth. II. 731. VI. 425.
— minus Lindl. II. 731. no. 1.
— nitens Lindl. VI. 425. no. 2.
— pendulum Bth. VI. 425. no. 1. VI. 741. no. 1. †
— Preissii Sonder. VI. 425. no. 3.
Conothamnus Lindl. II. 162. *II. 930. V. 748.
— trinervis Lindl. II. 162. no. 1.
Conothelae Pfeiff. II. 289.
Conradia Mart. *II. 721. VI. 395.
— calycosa Hook. VI. 395. no. 1.
— *calycosa* Hook. VI. 735. no. 1.
— *Craniolaria* Mart. VI. 735. no. 2.
— *exserta* Mart. VI. 736. no. 9.
— *fuchsiaides* Nutt. III. 380. no. 1.
— hispida Bth. VI. 395. no. 2.
— *pedunculosa* DC. VI. 736. no. 15.
— *ventricosa* Martius. VI. 735. no. 8.
β. angustior DC. VI. 736. no. 11.
Conringia DC. I. 169.
— Austriaca Pers. I. 171. †
— *clavata* Boiss. I. 169. no. 23.
— orientalis P. I. 171. †
— *planisiliqua* Fisch. et Mey. I. 169. no. 22.
— *Thaliana* Rchb. I. 171. †
Consolida DC. II. 743. no. 2—6.
— *aurea* Tabernaem. VI. 258. no. 8.
— *palustris* Tabern. VI. 258. no. 7.
Contracoutevra IV. 123. no. 23.
CONVOLVULACEAE Endl. VI. 552. (ex p.)
CONVOLVULACEAE Ventenat. VI. 528.
Convolvuleae Choisy. VI. 529.
Convolvulus Linn. VI. 536.
— ......? Mart. et Galeotti. VI. 541. no. 31.
— acanthocladus Boiss. VI. 539. no. 13.

Convolvulus althaeoides Linn. VI. 743.
— amoenus C. Koch. VI. 540. no. 19.
— ascendens Vriese. VI. 540. no. 17.
— attenuatus Martens et Galeotti. VI. 541. no. 29.
— bidentatus Bernhardi. VI. 540. no. 21.
— cephalophorus Boiss. VI. 536. no. 1.
— cephalopodus Boiss. VI. 537. no. 5.
— cladotrichus Martius. VI. 744.
— coeruleus Martens et Galeotti. VI. 540. no. 25.
— evolvuloides Boiss. VI. 538. no. 9.
— *glaber* Aubl. VI. 530. no. 3.
— gonocladus Boiss. VI. 537. no. 2.
— Hügelii Vriese. VI. 540. no. 24.
— Italicus Roem. et Schultes. VI. 743. †
— Kotschyanus Boiss. VI. 537. no. 3.
— leiocalycinus Boiss. VI. 539. no. 14.
— *leiocalycinus β. glabrescens* Boiss. VI. 539. no. 15.
— leptocladus Boiss. VI. 538. no. 8.
— luteus Mart. et Galeotti VI. 540. no. 27.
— lycioides Boiss. VI. 539. no. 15.
— Mascatensis Boiss. VI. 538. no. 7.
— minutiflorus Martens et Galeotti. VI. 541. no. 30.
— Natalensis Bernhardi. VI. 540. no. 22.
— ocellatus Hook. VI. 539. no. 16.
— oxyphyllus Boiss. VI. 538. no. 11.
— oxysepalus Boiss. VI. 537. no. 4.
— Preissii Vriese. VI. 540. no. 23.
— quadriflorus Hochstett. VI. 540. no. 20.
— spinosus Burmann. VI. 538. no. 12.
— suaveolens Martens et Galeotti. VI. 541. no. 28.
— subpinnatifidus Vriese. VI. 540. no. 18.
— tenuifolius Martens et Galeotti. VI. 540. no. 26.
— ulicinus Boiss. VI. 538. no. 10.
— virgatus Boiss. VI. 537. no. 6.
Conyza DC. II. 951. no. 17.
Conyza Lssng. *II. 595. II. 971. VI. 133.
[Conyza Linn. ex p. *II. 953. no. 1.]
Conyza IV. Matthiol. VI. 258. no. 6.
— *Altaica* DC. VI. 129. no. 1.
— *ambigua* DC. VI. 125. no. 20.
— *amorphoglossa* Boiss. VI. 122. no. 8.
— *angustifolia* Nutt. II. 972. no. 1.
— *aquatica foliis serratis* C. Gesn. VI. 258. no. 6.
— artemisiaefolia Mey. et Wlprs. VI. 133. no. 5.
— ctenoptera Kth. VI. 133. no. 1.
— *incisa* DC. VI. 122. no. 2.
— *ivaefolia* DC. VI. 122. no. 3.
— *Kotschyi* Boiss. VI. 123. no. 10.
Conyza Kraussii C. H. Schultz. II. 971. no. 1.
— Kraussii C. H. Schultz. II. 972. no. 3.
— longissima Zolling. et Moritzi. VI. 720. no. 3.
— marginata Edgwrth. VI. 720. no. 2.
— *maxima serratifolia* Thal. VI. 258. no. 6.
— modesta Kth. VI. 133. no. 3.
— Natalensis C. H. Schultz. II. 971. no. 2.
— *nivalis* Boiss. VI. 123. no. 12.
— *palustris* Parkins. VI. 258. no. 8.
— *palustris serratifolia* C. Bauh. VI. 258. no. 6.
— *Persica* Boiss. VI. 123. no. 9.
— polycephala Edgwrth. VI. 720. no. 1.
— rivularis Gardn. VI. 133. no. 4.
— *solidaginoides* Wall. VI. 120. no. 6.
— *Sprengelii* C. H. Schultz. II. 958. no. 1.
— syringaefolia Meyen et Wlprs. VI. 133. no. 2.
— umbrosa Kar. et Kir. II. 971. no. 1.
Conyzeae Lssng. II. 594. II. 970. VI. 131.
Conyzeae C. H. Schultz. II. 952.
Conyzeae legitimae C. H. Schultz. II. 953.
Conyzopsis Torr. et Gr. II. 573.
Cookia Soner. I. 381.
— chlorosperma Blume. I. 381. no. 1.
— cyanocarpa Blume. I. 381. no. 2.
Copaïfera L. I. 854.
— bracteata Bth. I. 854. no. 5.
— elliptica Mart. I. 854. no. 3.
— glabra Vogel. I. 854. no. 2.
— hymenaeaefolia Moric. I. 854. no. 1.
— pubiflora Bth. I. 854. no. 4.
Copisma E. Mey. I. 785.
— *diversifolium* E. Mey. I. 787. no. 13.
— *effusum* E. Mey. I. 786. no. 11.
— *falcatum* E. Mey. I. 787. no. 15.
— *gibbum* E. Mey. I. 787. no. 17.
— *glabrum* E. Mey. I. 786. no. 9.
— *glandulosum* E. Mey. I. 786. no. 5.
— *grandifolium* E. Mey. I. 787. no. 19.
— *nitidum* E. Mey. I. 787. no. 16.
— *paniculatum* E. Mey. I. 786. no. 7.
— *pictum* E. Mey. I. 786. no. 12.
— *pilosum* E. Mey. I. 786. no. 6. β.
— *rotundifolium* E. Mey. I. 787. no. 18.
— *simplicifolium* E. Mey. I. 787. no. 20.
— *tenue* E. Mey. I. 787. no. 14.
— *Tottum* E. Mey. I. 786. no. 4.
— *trichodes* E. Mey. I. 786. no. 8.
— *viscidulum* E. Mey. I. 786. no. 10.
Coprosma Forst. II. 462. VI. 25.
— acerosa A. Cunn. II. 463. no. 8.
— affinis Hook. fil. VI. 25. no. 1.

Coprosma ciliata Hook. fil. VI. 26. no. 4.
 β. virgata.
— *conferta* A. Cunn. II. 463. no. 2.
— cuneata Hook. fil. VI. 25. no. 2. (cum var. β.)
— divaricata A. Cunn. II. 463. no. 7.
— foetidissima Forst. *II. 463. no. 2.
— gracilis A. Cunn. II. 463. no. 6.
— ligustrinum Kth. VI. 700.
— myrtillifolia Hook. fil. VI. 26. no. 3.
— propinqua A. Cunn. II. 463. no. 3.
— *pusilla* Forst. II. 463. no. 1.
— repens Hook. fil. VI. 26. no. 5.
— repens A. Rich. II. 462. no. 1.
— rhamnoides A. Cunn. II. 463. no. 5.
— robusta Raoul. VI. 26. no. 6.
— rotundifolia L. Cunn. II. 463. no. 4.
— spathulata A. Cunn. II. 463. no. 9.
Coptis Salisb. I. 49.
— aspleniifolia Salisb. *I. 49. no. 4.
— occidentalis Torr. et Gr. I. 49. no. 3.
— tecta Wall. I. 49. no. 1.
— trifolia Salisb. *I. 49. no. 2.
Coquebertia ilicifolia Brogn. I. 841. no. 4. V. 563. no. 3.
Corallophyllum H. B. Kth. III. 482.
— *coeruleum* H. B. Kth. III. 482. no. 1.
Corbichonia Scop. II. 239. no. 1. V. 788. no. 1.
Corchoropsis Siebold et Zucc. °V. 118.
— crenata Sieb. et Zucc. *V. 118. no. 1.
Corchorus Linn I. 354. II. 798. V. 117.
— alatus G. Don. II. 798. no. 1.
— angustifolius Schum. I. 354. no. 7.
— asplenifolius Burch. II. 799. no. 5.
— brachycarpus Guill. et Perr. I. 354. no. 10.
— *Burmanni* DC. I. 354. no. 5. β.
— capsularis L. I. 355. †
— fruticulosus Vis. I. 354. no. 1. et no. 6.
— grandiflorus Spring. I. 355. no. 16.
— humilis St. Hil. I. 354. no. 13.
— lanceolatus G. Don. II. 799. no. 4.
— lanuginosus Macfd. I. 354. no. 11.
— *linearis* Wall. I. 354. no. 3.
— longicarpus G. Don. II. 798. no. 2.
— microphyllus Fresen. I. 354. no. 2.
— muricatus Schum. I. 354. no. 9.
— patens Lehm. I. 355. no. 18.
— polygonus Schum. I. 354. no. 8.
— prismatocarpus St. Hil. I. 355. no. 15.
— procumbens Bojer. V. 117. no. 2.
— serraefolius Burch. II. 799. no. 3.
— tetrangulus Langsdrff. I. 355. no. 17.
— tortipes St. Hil. I. 354. no. 14.
— tridens L. *I. 354. no. 5. (var. α. et β.)
— triflorus Bojer. V. 117. no. 1.
— trilocularis L. *I. 354. no. 3.
— urticaefolius Wght. et Arn. I. 354. no. 4.
— villosissimus St. Hil. I. 354. no. 12.
Cordia Plum. VI. 553.
— ....? Martens et Galeotti. VI. 554. no. 7.
— Bogotensis Bth VI. 553. no. 1.
— brevispicata Martens et Galeotti. VI. 553. no. 2.
— cana Martens et Galeotti. VI. 554. no. 5.
— foliosa Martens et Galeotti. VI. 554. no. 4.
— hispida Bth. VI. 553. no. 3.
— microcephala? Willd. VI. 554. no. 6.
CORDIACEAE R. Br. VI. 553.
CORDIACEAE Meisn. VI. 553.
Cordieae A. P. DC. VI. 553.
Cordiera A. Rich. II. 489.
— acuminata Bth. II. 489. no. 1.
—? latifolia Bth. II. 489. no. 2.
Cordiereae A. Rich. II. 489. VI. 50.
Cordifoliae Bth. (Salvia) III. 640.
Cordiformes DC. (Mikania) VI. 714. no. 18.
Cordyla Lour. I. 855.
— Africana Lour. *I. 855. no. 1.
Cordylanthus Nutt. *VI. 651.
Cordylocarpum Desf. *I. 160.
Cordylocarpus pubescens Sibthrp. I. 185. no. 11. I. 186. no. 5.
Cordylogyne E. Mey. VI. 483.
— globosa E. Mey. *VI. 483. no. 1.
Cordylophorum Nutt. II. 90.
Coreocarpus Bth. °VI. 156.
— parthenioides Bth. *VI. 157. no. 1.
Coreoloma Torr. et Gr. II. 982.
Coreopsideae Lssng. II. 613. II. 979. VI. 161.
Coreopsis Linn. II. 613. II. 979. VI. 162.
— Abyssinica C. H. Schultz VI. 163. no. 4.
— *alternifolia* Linn. II. 982. no. 1.
— *ambigua* Nutt. II. 614. no. 2. II. 980. no. 3.
— angustifolia Ait. *II. 614. no. 17. *II. 982. no. 23.
— *arguta* Prsh. II. 980. no. 3.
— aristosa Michx. *II. 980. no. 5.
— Atkinsoniana Dougl. *II. 981. no. 19.
— aurea Ait. *II. 980. no. 3.
 γ. incisa Torr. et Gr.
 β. leptophylla Torr. et Gr.
— *aurea* Lindl. II. 980. no. 4.
— auriculata Linn. *II. 613. no. 6. *II. 981. no. 13. (c. varr. β γ. δ.)
— *auriculata* Schkhr. II. 861. no. 13. γ.
— bidentoides Torr. et Gr. II. 980. no. 2.
— Boykiniana Nutt. II. 613. no. 10.
— *Boykiniana* Nutt. II. 981. no. 15.

Coreopsis cardaminefolia Torr. et Gr. *II. 981. no. 20.
β. angustiloba.
— coronata Hook. II. 981. no. 16.
— *coronata* Linn. II. 614. no. 1. II. 980. no. 3.
— delphinifolia Lam. II. 613. no. 1. *II. 980. no. 10.
β. rigida Torr. et Gr.
— dichotoma Michx.? II. 982. no. 22.
— discoidea Torr. et Gr. II. 979. no. 1.
— diversifolia DC. *II. 613. no. 7.
— *diversifolia* DC. II. 981. no. 13.
— *diversifolia* Hook. II. 981. no. 17.
— Drummondii Torr. et Gr. II. 981. no. 17.
— *filifolia* Hook. II. 615. no. 1. VI. 164. no. 1.
— gladiata Walt. *II. 614. no. 16. *II. 982. no. 22.
— grandiflora Hogg. *II. 613. no. 8. *II. 981. no. 15.
β. longipes Torr. et Gr. II. 981. no. 15.
γ. subintegrifolia Torr. et Gr. II. 981. no. 15.
— heterophylla Nutt. II. 613. no. 9.
— integrifolia Poir. *II. 613. no. 5. *II. 982. no. 24.
— *involucrata* Nutt. II. 615. no. 6.
— involucrata Nutt. II. 980. no. 6.
— involucrata C. H. Schultz. VI. 163. no. 3.
— lanceolata Linn. *II. 613. no. 4. *II. 981. no. 14.
— latifolia Michx. *II. 980. no. 7.
— Leavenworthii Torr. et Gr. II. 982. no. 21.
— linifolia Nutt. II. 614. no. 18.
— *linifolia* Nutt. II. 982. no. 23.
— *longipes* Hook. II. 981. no. 15. β.
— macrantha C. H. Schultz. VI. 163. no. 2.
— *mitis* Michx. II. 614. no. 2. II. 980. no. 3.
— nudata Nutt. *II. 614. no. 19. *II. 982. no. 25.
— *Oemleri* Ell. II. 613. no. 5. II. 982. no. 24.
— palmata Nutt. *II. 614. no. 14. *II. 980. no. 12.
— praecox Fresenius. II. 614. no. 20.
— Prestinaria C. H. Schultz. VI. 163. no. 1. (c. var. β. ibid.)
— rigida Nutt. II. 614. no. 11.
— *rigida* Nutt. II. 980. no. 10.
— rosea Nutt. *II. 982. no. 26.
— Rüppellii C. H. Schultz. VI. 163. no. 5.
— senifolia Michx. *II. 614. no. 12. *II. 980. no. 9.
β. stellata Tor. et Gr. II. 980. no. 9.
— setigera A. H. Schultz. VI. 163. no. 6.
— stellata Nutt. *II. 614. no. 13.
Coreopsis stellata Nutt. II. 980. no. 9.
— tenuifolia Ehrh. *II. 613. no. 2.
— tinctoria Nutt. *II. 981. no. 18.
— *trichosperma* Michx. II. 614. no. 1.
— trichosperma Michx. *II. 880. no. 4.
— trifoliata Bertol. II. 614. no. 19. b.
— Tripteris Linn. *II. 980. no. 8. *II. 614. no. 15.
— verticillata Linn. *II. 980. no. 11.
— Wrayi Nutt. *II. 613. no. 3.
Corcosma affinis Spach. II. 360. no. 38.
— *Dombeyana* Spach. II. 360. no. 39.
— *florida* Spach. II. 359. no. 26.
— *multiflora* Spach. II. 360. no. 37.
— *viscosissima* Spach. II. 360. no. 30.
Coreta P. Br. (Corchorus) II. 798.
Corethrogyne DC. II. 558. *II. 954. no. 2. VI. 118.
— Californica DC. II. 558. no. 1.
— filaginifolia Nutt. II. 558. no. 3.
— incana Nutt. II. 558. no. 2.
— obovata Bth. VI. 118. no. 1.
— tomentella Torr. et Gr. II. 558. no. 4.
— virgata Bth. VI. 119. no. 2.
Corethrostylis Endl. I. 337. V. 110.
— bracteata Endl. *I. 337. no. 1. V. 110. no. 3.
— coriacea Steudel. V. 110. no. 2.
— membranacea Steudel. V. 110. no. 1.
Coretoides DC. (Corchorus) II. 798.
Coriandreae Koch. II. 427. V. 923.
Coriandrum Linn. II. 428.
— Melphitense Ten. et Guss. II. 428. no. 1.
Coriaria Niss. I. 528.
— myrtifolia L. *I. 528. no. 2.
— Nepalensis Wall. 528. no. 1.
CORIARIEAE DC. I. 528.
Coris Linn. *VI. 445.
CORNEAE DC. II. 435. V. 932.
Cornelia Endl. II. 102.
Cornicina DC. I. 634.
— *hamosa* Boiss. I. 634. no. 7.
— *pseudocytisus* Boiss. II. 846. no. 1.
Cornidia Rz. et Pav. II. 377.
— integerrima Hook. et Arn. II. 377. no. 1.
— serratifolia Hook. et Arn. II. 377. no. 2.
Cornus Tournef. II. 435. V. 932.
Cornus no. 277. Amm. V. 933. no. 3.
— alba Linn. V. 932. no. 2.
— *alba* Thnbrg. V. 934. no. 9.
— *alba* Torr. et Gr. V. 933. no. 3.
— *alba β.* Hook. 935. no. 14.
β. angustifolia C. A. Mey.
— alternifolia Linn. fil. V. 932. no. 1.
— *asperifolia* Beyrich. V. 934. no. 12. γ.
— australis C. A. Meyer. V. 933. no. 8.
— brachypoda C. A. Mey. V. 934. no. 9.

Cornus Californica C. A. Mey. V. 935. no. 14.
— *capitata* Wall. II. 435. no. 2.
— circinnalis Hffmsgg. II. 436. no. 6.
— circinnata L'Hérit. V. 935. no. 13.
— *circinnata* Schlchtd. V. 935. no. 14.
— *citrifolia* Wahlenbrg. V. 933. no. 8.
— Drummondii C. A. Mey. V. 933. no. 7.
— *excelsa* Bth. V. 934. no. 12. β.
— excelsa H. B. Kth. V. 934. no. 12.
γ. Beyrichiana C. A. Meyer.
β. Hartwegiana C. A Meyer.
α. Schiedeana C. A. Meyer.
— *florida* Hook. II. 435. no. 3.
— glabrata Bth. V. 933. no. 6.
— grandis Cham. et Sbhlchtd. II. 436. no. 4.
— Nuttallii Audubon. II. 435. no. 3.
— officinalis Sieb. et Zucc. II. 435. no. 2.
— paniculata L'Hérit. V. 933. no. 4.
— plicata Tausch. II. 436. no. 5.
— *pubescens* Nutt. V. 935. no. 14.
— purpurea Tausch. II. 435. no. 1.
— *purpurea* Tausch. V. 933. no. 3.
— *sanguinea* Güldenst. V. 933. no. 8.
— *sanguinea* Ldb. V. 933. no. 3.
— sanguinea Linn. V. 934. no. 11.
α. communis C. A. Mey.
β. latifolia C. A. Mey.
— sericea Linn. V. 934. no. 10.
α. ovatifolia C. A. Mey.
β. oblongifolia C. A. Mey.
γ. Schüzeana C. A. Mey.
— *sericea β.* Torr. et Gr. V. 935. no. 14.
— Sibirica Loddig. V. 933. no. 3.
— *Sibirica* Spach. V. 933. no. 3.
— *stolonifera* Michx. V. 932. no. 2.
— stricta L'Hérit. V. 933. no. 5.
— *sylvestris fructu albo* Amm. II. 435. no. 1.
— *Tolucensis* H. B. Kth. V. 935. no. 12. γ.
— *Tolucensis* Schlchtd. V. 934. no. 12. α.
Cornutia Linn. IV. 125. no. 1.
Cornutia Plum. IV. 125.
— *corymbosa* Burm. IV. 93. no. 4.
— *corymbosa* Lam. IV. 94. no. 11.
— *flore pyramidato, foliis incanis* Plum. IV. 125. no. 1.
— *longifolia* Spr. IV. 81. no. 4.
— *odorata* Poep. IV. 81. no. 3.
— *punctata* Willd. IV. 80. no. 1.
— *pyramidata* Ait. IV. 80. no. 1.
— *pyramidata* Spr. IV. 81. no. 5.
— pyramidata Willd. IV. 125. no. 1.
— *quinata* Lour. IV. 98. no. 36.
Cornutioides Linn. IV. 94. no. 8. IV. 96. no. 24.
COROLLIFLORAE DC. VI. 438.
Corona solis (Helianthus) Torr. et Gr. II. 984.
Coronilla L. I. 724. II. 887. V. 519.
Coronilla Tournef. I. 724. II. 888.
— emeroides Boiss. et Sprun. II. 887. no. 1.
— eriocarpa Boiss. I. 724. no. 2. (III. Emend. p. 4.)
— grandiflora Boiss. V. 519. no. 1.
— Iberica M. Bieb. I. 724. †
— pubescens Schum. et Thonn. I. 724. no. 1.
— rostrata Boiss. et Sprun. II. 888. no. 2.
Coronilleae DC. I. 724. II. 887. V. 519.
Coronopus brachystachys Knze. IV. 192. no. 117.
— *firma* Knze. IV. 192. no. 116.
— *Nilotica* Raddi. II. 764. no. 2.
— *Raddii* Savi. II. 764. no. 1.
Corosinam Rheede. III. 295. no. 5.
Correa Sm. I. 505. II. 821. V. 390.
— Backhousiana Hook. I. 506. no. 5.
— *bicolor* Paxton. V. 390. no. 1.
— cordifolia Lindl. II. 824. no. 2.
— ferruginea Hook. I. 506. no. 2.
— glabra Lindl. II. 824. no. 3.
— glabra Seemann et Schmidt. V. 390. no. 1.
— Lawrenciana Hook. I. 506. no. 3.
— leucoclada Lindl. II. 824. no. 1.
— pulchella Mackay. I. 505. no. 1. *II. 824. no. 5.
— rotundifolia Lindl. II. 824. no. 4.
— speciosa Andr. I. 506. no. 6. (c. varr. β. γ. et δ). *V. 390. no. 1.
— virens Hook. I. 506. no. 4.
Corrigiola L. I. 260.
— deltoidea Hook. I. 260. no. 2.
— *deltoidea* Poepp. II. 238. no. 1. V. 787. no. 1.
— squamosa Hook. et Arn. I. 260. no. 1.
Corrigioleae Fzl. I. 260.
Cortesia Cav. *VI. 555.
Cortia DC. *II. 413.
Cortusa Linn. VI. 445.
— *foliis ovatis sessilibus* Linn. III. 438. no. 1.
— Matthioli Linn. *VI. 445. no. 1.
Cortusina DC. I. 458.
— odoratissima Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 117.
— reniformis Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 121.
— rubro-purpurea Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 120.
— sidaefolia Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 118.
— velutina Eckl. et Zeyh. I. 458. no. 119.
Coryanthus Nutt. III. 682.
Corydalideae Endl. I. 118. V. 23.
Corydalis DC. I. 118. II. 750. V. 23.
— acaulis Wulf. I. 122. †
β. ochroleuca Koch. I. 122. †
— alpestris C. A. Meyer. I. 119. no. 3.
— alpina Gay. I. 118. no. 1.
— ambigua Cham. et Schlchtd. I. 120. no. 16.

Corydalis aurea Willd. *I. 121. no. 34.
  β. crystallina Torr. et Gr.
— *bicalcarata* Harv.? V. 23. no. 1.
— bracteata Pers. I. 122. †
— bulbosa L. I. 122. †
— Bungeana Turcz. I. 119. no. 11.
— *Canadensis* Goldie. I. 118. no. 5.
— Cashmeriana Royle. I. 121. no. 26.
— chaerophylla DC. I. 122. †
— claviculata Pers. I. 122. †
— conorhiza Ldb. 120. no. 13.
— cornuta Royle. I. 125. no. 25.
— *Cracca* Cham. et Schlchtd. I. 118. no. 1.
— crassifolia Royle. I. 120. no. 20.
— crassissima Jacquemont I. 121. no. 28.
— *crystallina* Engelm. I. 121. no. 34. β.
— digitata Pers. I. 122. †
— diphylla Wall. I. 121. no. 33.
— Emanueli C. A. Meyer. I. 119. no. 2.
— *enneaphylla* DC. V. 24. no. 1.
— epithymifolia Royle. I. 120. no. 21.
— Erdelii Zucc. I. 120. no. 19.
— *fabacea* DC. I. 119. no. 1.
— fabacea Pers. I. 122. †
— filiformis Royle. I. 120. no. 24.
— *flavula* Raf. I. 121. no. 34.
— *fungosa* Vent. I. 118. no. 1.
— Gebleri Ldb. I. 119. no. 7.
— glauca Prsh. *I. 121. no. 35.
— Gotschakovii Schrenk. I. 119. no. 10.
— Goviana Wall. I. 121. no. 27.
— gracilis Ldb. I. 120. no. 15.
— Hamiltonii Don. I. 119. no. 12.
— inconspicua Bnge. I. 119. no. 9.
— *intermedia* Lois. I. 119. no. 1.
— juncea Wall. I. 121. no. 32.
— Kareliniana Pritzel. II. 750. no. 1.
— Ledebouriana Kar. et Kir. I. 121. no. 31.
— Libanotica Hochstett. V. 23. no. 1.
— longiflora Pers. *I. 119. no. 5.
— longipes DC. I. 122. †
— *longipes* Don. I. 119. no. 12.
— lutea Pers. I. 122. †
— macrophylla Nutt. I. 121. no. 37.
— meifolia Wall. I. 121. no. 30.
— nana Royle. I. 120. no. 22.
— Ochotensis Turcz. I. 119. no. 8.
— pauciflora Pers. *I. 119. no. 4. *I. 121. no. 38.
— Persica Willd. I. 120. no. 17.
— physocarpa Cambess. I. 121. no. 29.
— pumila Host. I. 122. †.
— *racemosa* Bnge. I. 119. no. 11.
— Scouleri Hook. I. 121. no. 36.
— *spectabilis* Pers. V. 23. no. 1.
— stricta Steph. *I. 119. no. 6.
Corydalis tenella Kar. et Kir. II. 750. no. 1.
— tenella Ldb. I. 120. no. 14.
— triternata Zucc. 120. no. 18.
— vaginans Royle. I. 120. no. 23.
Corylopsis Siebld. et Zucc. II. 434.
— pauciflora Siebld. et Zucc. II. 434. no. 2.
— spicata Siebld. et Zucc. II. 434. no. 1.
Corymbiflorae DC. I. 200. (Capparis)
Corymbium Linn. *II. 543.
Corymbosae Bth. V. 620. (Pithecolobium)
Corynandra pulchella Schrad. I. 195. no. 1.
Corynella DC. *I. 681.
Corynostylis Mart. et Zucc. I. 223.
— Benthamii Wlprs. I. 223. no. 1.
Corytholobium Bth. I. 792.
— macrophyllum Bth. *I. 792. no. 1.
Corytholoma Bth. (Gesneria) VI. 399. VI. 737.
Coscinium Colebr. I. 95.
— fenestratum Colebr. *I. 95. no. 1.
Cosmanthus Nutt. *VI. 525.
— nemophiloides Kth. VI. 743.
Cosmelia R. Br. *II. 733.
Cosmelia Torr. et Gr. II. 982.
Cosmibuena Rz. et Pav. *II. 510. °VI. 69.
— acuminata Rz. et Pav. VI. 69. no. 3.
— latifolia Kltzsch. VI. 69. no. 5.
— macrocarpa Kltzsch. VI. 69. no. 6.
— obtusifolia Rz. et Pav. VI. 69. no. 1.
— quinqueflora Kltzsch. VI. 69. no. 4.
— triflora Kltzsch. VI. 69. no. 2.
Cosmidium Nutt. II. 615. °VI. 164.
— filifolium Nutt. *II. 615. no. 1.
— filifolium Torr. et Gr. VI. 164. no. 1.
— gracile Nutt. II. 615. no. 2.
— gracile Torr. et Gr. VI. 164. no. 2.
Cosmos Cav. II. 619. VI. 168.
— carvifolius Bth. VI. 168. no. 1.
— diversifolius Fr. Otto. II. 619. no. 2.
— reptans Bth. II. 619. no. 1.
— Uhdeanus Kth. VI. 721.
Cosmostemon Schauer. V. 745.
Cosmostigma Wght. VI. 492.
— racemosum Wght. *VI. 492. no. 1.
Cossignia Commers. *I. 421.
Costus hortensis Dalech. VI. 219. no. 1.
Cosymbe Tulasne. (Tachigalia) V. 569.
Cotinus Tournef. I. 553. no. 21. et 22.
Cotoneaster Medic. II. 56. V. 661.
— acutifolia Turcz. II. 56. no. 6.
— frigida Wall. II. 56. no. 7.
— Granatensis Boiss. II. 56. no. 2.
— laxiflora Jcq. fil. II. 56. no. 8.
— multiflora Bnge. II. 56. no. 5.
— nummularia Fisch. et Mey. II. 56. no. 3.
— peduncularis Boiss. V. 661. no. 1.
— *tomentosa* C. A. Meyer. II. 56. no. 3.

Cotoneaster uniflora Bnge. II. 56. no. 4.
— vulgaris Lindl. *II. 56. no. 1.
β. melanocarpa Ldb.
Cottam Rheede. III. 578. no. 7.
Cotula Gaertn. II. 638. II. 991. °VI. 209.
— *anthemoides* Linn. II. 992. no. 3.
— *anthemoides γ.* DC. VI. 723.
— *aurea* Linn. VI. 209. no. 1.
— barbata DC. *II. 991. no. 13.
— ceniaefolia DC. *II. 991. no. 6.
— *chamaemelifolia* Ehrnbrg. VI. 210. no. 7.
— *cinerea* Delile. VI. 209. no. 5.
— *coronopifolia* C. Koch. II. 991. no. 1.
— coronopifolia Linn. *II. 991. no. 1.
— ebracteata E. Mey. *II. 991. no. 4.
— filifolia Thnbrg. *II. 991. no. 5.
— *globifera* Thnbrg. VI. 209. no. 2.
— laxa DC. *II. 991. no. 8.
— leptalea DC. *II. 991. no. 10.
— *matricarioides* Bong. II. 642. no. 1. VI. 194. no. 4.
— *microcephala* DC. II. 992. no. 4.
— myriophylloides Hook. II. 638. no. 1.
— *nudicaulis* Thnbrg. II. 992. no. 5.
— oxyodonta DC. *II. 991. no. 12.
— poekilophylla C. Koch. II. 991. no. 7.
— pusilla Thnbrg. *II. 991. no. 3.
— sororia DC. *II. 991. no. 11.
— stenophylla C. Koch. II. 991. no. 14.
— *Teesdaliae* DC. VI. 196. no. 4.
— tenella E. Mey. *II. 991. no. 9.
— *tripinnata* Thnbrg. VI. 209. no. 3.
— *villosa* DC. II. 992. no. 6.
Cotuleae Lssng. II. 638. VI. 209.
Cotulodes C. Koch. II. 991.
Cotylanthera Blume. III. 124. °III. 956.
— tenuis Blume. *III. 124. no. 1.
Cotyle DC. II. 259. V. 793. no. 2—6.
Cotyledon DC. II. 257.
— *Africana* Commel. II. 257. no. 8.
— aristata DC. II. 258. †
— coccinea W. II. 258. †
— coruscans Haw. II. 257. no. 8.
— *corymbosa* Rottl. II. 257. no. 4.
— filicaulis Eckl. et Zeyh. II. 258. no. 9.
— *fimbriata* Turcz. V. 794. no. 7.
— *heterophylla* Rxb. II. 257. no. 5.
— horizontalis Guss. II. 257. no. 1.
— leucantha Ledeb. II. 257. no. 3.
— Lievenii Ledeb. II. 257. no. 4.
— *Lusitanica* Lam. II. 259. no. 8. V. 794. no. 6.
— *lutea* Huds. II. 259. no. 8. V. 794. no. 6.
— *lutea, radice tuberosa* Dodart. V. 794. no. 6.
— oppositifolia Ldb. II. 257. no. 2.
Cotyledon paniculata Rottl. II. 257. no. 4.
— pubescens C. A. Mey. II. 257. no. 6.
— rosea Lssng. II. 257. no. 5.
— subulata C. A. Mey. II. 257. no. 7.
— *tuberosa* Hort. Paris. II. 259. no. 8.
— *Umbilicus a.* Linn. V. 794. no. 6.
— *Umbilicus var. praealta* Brot. V. 794. no. 6.
Couëpia Aubl. II. 6.
— *bracteosa* Bth. II. 7. no. 8.
— *comosa* Bth. II. 6. no. 7.
— *multiflora* Bth. II. 7. no. 9.
Coulteria H. B. Kth. I. 810.
—? Africana Guill. et Perr. I. 810. no. 1.
Couma Aublet. *VI. 465.
Coupoui Aubl. *II. 193.
Couratori Aubl. II. 193.
— glabra Cambess. II. 193. no. 1.
— legalis Mart. II. 193. no. 3.
— rufescens Cambess. II. 193. no. 2.
Couroupita Aubl. II. 193.
— Guianensis Aubl. *II. 193. no. 1.
Courrantia C. H. Schultz. VI. 194.
— *chamomilloides* C. H. Schultz. VI. 194. no. 3.
Coursetia DC. *I. 680.
Courtenia Horsf. et Bennet. °V. 105.
— Afzelii Horsf. et Bennet. V. 106. no. 1.
—? heterophylla Horsf. et Bennet. V. 106. no. 3.
— triloba Horsf. et Bennet. V. 106. no. 2.
Cousinia Cass. II. 669. VI. 284.
— affinis Schrenk. II. 670. no. 3
— alata Schrenk. II. 670. no. 2.
— alpina Bnge. VI. 285. no. 3.
— arctioides Schrenk. VI. 289. no. 19.
— brachyptera DC. VI. 289. †
— calcitrapaeformis Jaub. et Spach. *VI. 289.
— calolepis Boiss. VI. 287. no. 14.
— Candolleana Jaub. et Spach. *VI. 289.
— Chamaepeuce Boiss. VI. 288. no. 15.
— chrysacantha Jaub. et Spach. *VI. 289.
— cylindracea Boiss. VI. 285. no. 4.
— cymbolepis Boiss. VI. 286. no. 9.
— dichotoma Bnge. VI. 284. no. 1.
— dissecta Kar. et Kir. II. 669. no. 1.
— gracilis Boiss. VI 286. no. 7.
— involucrata Boiss. VI. 287. no. 12.
— Kotschyi Boiss. VI. 289. no. 21.
— lappacea Schrenk. II. 670. no. 4.
— lasiolepis Boiss. VI. 286. no. 10.
— minuta Boiss. VI. 285. no. 6.
— oligocephala Boiss. VI. 285. no. 5.
— pinarocephala Boiss. VI. 288. no. 16.
— platylepis Fisch. VI. 289. no. 20.
— prolifera Jaub. et Spach. *VI. 289.

Cousinia pulchella Bnge. VI. 288. no. 18.
— radians Bnge. VI. 285. no. 2.
— serratuloides Boiss. VI. 286. no. 8.
— stenocephala Boiss. VI. 287. no. 13.
— sylvicola Bnge. VI. 287. no. 11.
— xiphiolepis Boiss. VI. 288. no. 17.
Coussarea Aubl. II. 480. VI. 44.
— flava Poepp. et Endl. II. 480. no. 1.
— uniflora Gardn. VI. 44. no. 1.
Coutarea Aubl. II. 510.
— mollis Cham. II. 510. no. 2.
— pubescens Pohl. II. 510. no. 1.
Coutoubea Aubl. *VI. 502.
Cowania Don. II. 48. V. 657.
— Mexicana G. Don V. 657. no. 1.
— plicata Don. *II. 48. no. 1.
Crabowskya cf. *Grabowskya*.
Craccoides DC. I. 676. V. 514. no. 1. 2.
Craepalobrumnon Endl. I. 205.
Crafordia Raf. *I. 678.
Crambe Tournef. *I. 189. II. 763.
— aspera M. B. I. 189. †
— Aucheri Boiss. II. 763. no. 2.
— maritima L. I. 189. †
— Persica Boiss. II. 763. no. 3.
— pinnatifida R. Br. I. 189. †
— quadricostata Boiss. II. 763. no. 1.
— Tatarica Jcq. I. 189. †
Craniolaria Linn. *VI. 519.
— *fruticosa* Linn. VI. 735. no. 2.
Craniospermum Lehm. VI. 564.
— hirsutum A. P. DC. *VI. 564. no. 1.
Craniotome Rchb. III. 847. °III. 988.
— versicolor Rchb. III. 847. no. 1.
Crantzia Nutt. II. 384.
— attenuata Hook. et Arn. II. 384. no. 2.
— lineata Nutt. II. 384. no. 1.
Craspedia Frstr. *II. 644. VI. 725.
— alpina Hook. fil. VI. 725. no. 2.
— gracilis Hook. fil. VI. 725. no. 1.
— Richea Cassini. VI. 725. no. 3.
  γ. glabrata Hook. fil.
  β. linearis Hook. fil.
Craspidospermeae Alph. DC. VI. 465.
Craspidospermum Bojer. VI. 465.
— verticillatum Bojer. *VI. 465. no. 1.
Crassula DC. II. 256. ex p.
Crassula Eckl. et Zeyh. II. 254.
Crassula Haw. II. 252. V. 791.
— alpina Endl. II. 253. no. 6.
— campestris Endl. II. 253. no. 19.
— corallina Linn. fil. *II. 253. no. 11.
— corymbosa Lk. et Otto. *II. 255. no. 31.
— *decumbens* Thbg. II. 256. no. 5.
— dentata Thbg. *II. 253. no. 5.
— divaricata Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 26.
Crassula foliis teretibus, floribus in summo ramorum luteis Burm. II. 256. no. 3.
— furcata Endl. II. 253. no. 12.
— *glabra* Haw. II. 256. no. 3. V. 792. no. 2.
— *glomerata* Linn. II. 256. no. 1.
— *imbricata* Ait. II. 253. no. 16.
— *inanis* Thbg. II. 252. no. 18.
— Indica Dcne. II. 254. no. 23.
— lanceolata Endl. II. 254. no. 20.
— littoralis Endl. II. 253. no. 13.
— lycopodioides L. II. 253. no. 16.
— *muricata* Thbg. II. 255. no. 3.
— muscosa Linn. *II. 253. no. 18.
— *muscosa* Thbg. II. 253. no. 16.
— *natans* Thbg. II. 252. no. 14.
— nemorosa Endl. II. 253. no. 7.
— nivalis Endl. II. 253. no. 8.
— parvula Endl. II. 253. no. 17.
— patens Endl. II. 253. no. 3.
— petrogeton Wlprs. II. 252. no. 2.
  β. minor Wlprs.
— pharnaceoides C. A. Mey. II. 254. no. 22.
— polpodacea Endl. II. 253. no. 15.
— propinqua Endl. II. 253. no. 14.
— pubescens Endl. II. 252. no. 1.
— *pulchella* Hortor. V. 792. no. 1.
— pyramidalis L. *II. 253. no. 9.
— quadrangula Endl. II. 253. no. 10.
— *retroflexa β. γ.* Thbg. II. 256. no. 1.
— rubricaulis Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 27.
— sarcocaulis Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 24.
— Schimperi C. A. Mey. II. 254. no. 21.
— sediflora Endl. II. 254. no. 30.
— semiorbicularis Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 25.
— stachyera Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 28.
— *strigosa* Linn. II. 256. no. 4.
— sulphurea Knze. V. 791. no. 1.
— *tomentosa* Linn. II. 255. no. 11.
— *Turrita* Thbg. II. 254. no. 22.
— umbella Jcq. *II. 253. no. 4.
— vaginata Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 29.
CRASSULACEAE DC. II 251. II. 935. V. 791.
CRASSULACEAE Endl. II. 734. (ex p.)
Crassuleae DC. II. 251. V. 791.
Crassuleae diplostemones Endl. II. 256. V. 792.
Crassuleae isostemones Endl. II 251. V. 791.
Crataegus Linn. II. 57. II. 915. V. 661.
— aestivalis Torr. et Gr. II. 58. no. 13.
— arborescens Ell. II. 58. no. 11.
— Aronica DC. II. 59. †
— Azarella Griseb. II. 915. no. 1.
— berberifolia Torr. et Gr. II. 59. no. 17.
— *Caroliniana* Pers. II. 59. no. 14.

Crataegus coccinea Linn. *II. 58. no. 8.
ε.? mollis Torr. et Gr.
δ. oligandra Torr. et Gr.
γ. populifolia Torr. et Gr.
β. viridis Torr. et Gr.
— cordata Ait. *II. 58. no. 12.
— crenulata Rxb. *V. 661. no. 1.
— crus galli L. *II. 58. no. 5.
δ. linearis Ser.
γ. ovalifolia Loud.
ε. prunifolia Torr. et Gr.
— *crus galli* Trew. II. 55. no. 11.
— *Douglasii* Lindl. II. 58. no. 7. β.
— elliptica Ait. *II. 59. no. 15.
β. minor Torr. et Gr.
— *flabellata* Bosc. II. 58. no. 8.
— flava Ait. *II. 59. no. 14.
— *flava* Hook. II. 58. no. 9.
— *flava β. lobata* Lindl. II. 59. no. 14.
— *glandulosa* Willd. II. 58. no. 8.
— *glandulosa β. brevispina* Nutt. II. 58. no. 7. β.
— *glauca* Wall. II. 59. no. 1.
— Granatensis Boiss. II. 57. no. 1.
— heterophylla DC. II. 59. †
— Indica Colla. II. 59. †
— *lotifolia* DC. II. 58. no. 10.
— *latifolia* Pers. II. 58. no. 9.
— *lobata* Bosc. II. 54. no. 1. II. 59. no. 9.
— Maroccana DC. II. 59. †
— Mexicana DC. II. 59. †
— Mexicana Sweet. II. 59. no. 18.
— *Michauxii* Pers. II. 59. no. 15.
— *nudiflora* Nutt. II. 59. no. 13.
— *odoratissima* G. Don. II. 58. no. 3.
— Oliveriana DC. II. 59. †
— *opaca* Hook. et Arn. II. 58. no. 13.
— orientalis Lindl. II. 58. no. 2.
— *ovatifolia* Horn. II. 58. no. 5. γ.
— oxyacantha var. rosea Paxton. *V. 661. no. 2.
— parvifolia Ait. *II. 59. no. 16.
— *parvifolia* Willd. II. 59. no. 15. β.
— pinnatifida Bnge. II. 58. no. 4.
— platyphyllos Lindl. II. 59. †
— *populifolia* Ell. II. 58 no. 8. γ.
— *prunellaefolia* Bosc. II. 58. no. 5. ε.
— punctata Jcq. *II. 58. no. 10.
— *punctata β. brevispina* Dougl. II. 58. no. 7. β.
— *pyrifolia* Ait. II. 58. no. 9.
— Quitensis Bth. V. 661. no. 3.
— *racemosa* Lam. II. 55. no. 2. α.
— rivularis Nutt. II. 58. no. 6.
— sanguinea Pall. *II. 58. no. 7.
β. Douglasii Torr. et Gr.
Crataegus sanguinea Pall. II. 54. no. 5.
— *spathulata* Prsh. II. 59. no. 15. β.
— *stipulacea* Loddig. II. 54. no. 2.
— subfusa Ldb. II. 58. no. 3.
— subserrata Bth. II. 59. no. 19.
— *subvillosa* Schrad. II. 58. no. 8. ε.
— tanacetifolia Pers. II. 59. †
— tomentosa L. *II. 58. no. 9. (c. var. β.)
— *turbinata* Prsh. II. 59. no. 14.
— *uniflora* Dum. II. 59. no. 16.
— *Virginica* Lodd. II. 59. no. 15. β.
— *viridis* Linn. II. 58. no. 8.
Crataeogonum Euphrasine Ger. III. 399. no. 1.
Crataeva L. I. 201. V. 54.
— *opetala* Spr. I. 196. no. 1.
— excelsa Bojer. V. 54. no. 1.
— *fragrans* Sims. I. 201. no. 1.
— Guineensis Schum. I. 201. no. 3.
— *oblongifolia* Spr. I. 197. no. 2. β.
— Roxburghii R. Br. I. 201. no. 1.
— unilocularis Hamilt. I. 201. no. 2.
— *Valanga* Koen. I. 382. no. 1.
Crateranthi Lem. II. 317.
Crateria DC. I. 547. no. 17.
Cratericarpum Spach. II. 89. V. 665.
— argyrophyllum Spach. *II. 89. no. 1. V. 665. no. 1.
Craterotecoma Martius. *VI. 514.
Cratoxylon Bth. I. 391.
— Hornschuchii Bl. I. 391. no. 1.
Cratylia Mart. I. 764. V. 533.
— Desvauxii Tulasne. V. 533. no. 1.
— floribunda Bth. I. 764. no. 3.
— hypargyrea Mart. I. 764. no. 1.
— mollis Mart. I. 764. no. 4.
— nitens Bth. I. 764 no. 2.
— nuda Tulasne. V. 533. no. 2.
— spectabilis Tulasne. V. 533. no. 3.
Crawfurdia Wall. *VI. 507.
Cremanium Don. II. 147. II. 919. V. 722.
— chaenopleuroides Gardn. II. 919. no. 2.
— compressum Bth. V. 722. no. 1.
— milleflorum DC. *II. 147. no. 1.
— *milleflorum* DC. V. 723. no. 4.
— *minutiflorum* DC. V. 723. no. 3.
— paludosum Gardn. II. 919. no. 1.
Cremocephalum Cass. *II. 651.
Cremolobeae R. Br. I. 158.
Cremolobus DC. I. 158.
—? linearifolius Hook. et Arn. I. 158. no. 1.
— Peruvianus DC. I. 159. †
— pinnatifidus Hook. I. 158. no. 5.
— pubescens Hook. I. 158. no. 2.
— rhomboideus Hook. I. 158. no. 3.
— sinuatus Hook. I. 158. no. 4.

Cremontia DC. I. 301. no. 23. 24. 25. 38. 49.
Cremosperma Bth. °VI. 404.
— hirsutissimum Bth. VI. 404. no. 1.
Crenea Aubl. *II. 112.
Creochiton Blume. II. 145.
— bibracteata Blume. *II. 145. no. 2.
— pudibunda Blume. *II. 145. no. 1.
Crepidium Nutt. *II. 698.
Crepidium Nutt. II. 697.
— *caulescens* Nutt. II. 698. no. 6. β.
— *glaucum* Nutt. II. 698. no. 6.
— *runcinatum* Nutt. II. 697. no. 5.
Crepidotropis Wlprs. I. 804.
— Brasiliensis Wlprs. *I. 804. no. 1.
Crepis Linn. II. 697. II. 993. VI. 357.
Crepis DC. II. 700. (ex p.)
— Abyssinica C. H. Schultz. II. 697. no. 3.
— acuminata Nutt. II. 698. no. 10.
— *albida* Lam. VI. 358. no. 6. α.
— *Baikalensis* Ldb. VI. 361. no. 4.
— *biennis* β. Hook. II. 697. no. 5.
— *biennis* β. *Americana* DC. II. 697. no. 5.
— Bithynica Boiss. VI. 357. no. 3.
— *borealis* C. H. Schultz. II. 698. no. 1. VI. 362. no. 1.
— carbonaria C. H. Schultz. II. 697. no. 2.
— ciliata C. Koch. VI. 358. no. 7.
— crocifolia Boiss. et Hldrch. VI. 357. no. 2.
— divaricata Boiss. et Hldrch. VI. 357. no. 1.
— *diversifolia* Ldb. VI. 361. no. 4.
— *elegans* Fisch. VI. 361. no. 4.
— elegans Hook. *II. 698. no 9.
— Fraasii C. H. Schultz. II. 993. no. 1.
— glauca Torr. et Gr. II. 698. no. 6.
β. caulescens Torr. et Gr.
— laevigata Dumort. II. 697. no. 1.
— nana Richards. *II. 698. no. 8.
— *nana* Richards. VI. 361. no. 6. α.
— *nana* Turcz. VI. 361. no. 6. δ.
— occidentalis Nutt. II. 698. no. 7.
— oporinoides Boiss. II. 698. †
— oreades Schrenk. VI. 358. no. 5.
α. cinerascens Schrenk.
β. simplex Schrenk.
— Pallasii Turcz. VI. 358. no. 4.
β. pumila Turcz.
— polytricha Turcz. VI. 358. no. 6.
α. legitima Ldb.
β. runcinata Ldb.
— *prostrata* Dumort. II. 697. no. 1.
— *pulcherrima* Fisch. VI. 361. no. 4.
— *rhagadioloides* Georgi. VI. 352. no. 2.
— Rüppellii C. H. Schultz. II. 697. no. 4.
— runcinata Torr. et Gr. II. 697. no. 5.
— *stenoma* Turcz. VI. 360. no. 2.
— *tectorum* Pall. VI. 361. no. 4.
Crepis tenuifolia Willd. VI. 361. no. 4.
— *youngiaeformis* C. Koch. VI. 360. no. 3.
Crescentia Linn. VI. 517.
— Cujete Linn. VI. 517. †
— lethifera Tussac. VI. 517. no. 2.
— obovata Bth. VI. 517. no. 1.
Crescenticae Bojer. VI. 517.
Crescentieae A. P. DC. VI. 516.
Cressa Linn. *VI. 512.
Crinitaria viscidiflora Hook. II. 589. no. 4.
Crinodendron Molina. I. 366.
— Palagua Mol. *I. 366. no. 1.
Cristagalli γ. Linn. III. 434. no. 3.
— *mas* Bauh. III. 434. no. 3.
Cristaria Cav. I. 313.
— *coccinea* Sonn. II. 64. no. 11.
— dissecta Hook. et Arn. I. 313. no. 2.
— eriantha Hook. et Arn. I. 313. no. 1.
— geraniifolia Prsl. I. 313. no. 5.
— Haenkeana Prsl. I. 313. no. 6.
— heterophylla Hook. et Arn. *I. 313. no. 3.
β. hispida Hook. et Arn.
— hirsuta Prsl. I. 313. no. 4.
— *hispida* Gill. I. 313. no. 3.
Cristatae DC. (Polygala) I. 235. no. 37.
Cristatella erosa Nutt. I. 196. no. 1.
— *Jamesii* Torr. et Gr. I. 196. no. 2.
Critamus Bess. *II. 392.
Crithmum Tournef. *II. 405.
Critonia P. Browne. *II. 553.
— *elliptica* Raf. II. 555. no. 21.
— *Kuhnia* Gaertn. II. 548. no. 1.
Crocidium Hook. *II. 664.
Crociseris (Senecio) DC. VI. 259. no. 15. no. 1.
Crocodylium DC. VI. 300.
Crocyllis Lichtensteinii E. Mey. VI. 25. no. 1.
Croix de Lorraine II. 352. no. 65.
Croomia Torr. I. 104.
— pauciflora Torr. *I. 104. no. 1.
Crossocephalum flavum Dcne. VI. 266. no. 53. β.
Crossolepis Lssng. *II. 644.
— *pusilla* Bth. II. 644. no. 1. VI. 229. no. 1.
Crossophyllum DC. II. 805. et 806. no. 3—6.
Crossopteryx Fnzl. II. 510. VI. 70.
— Kotschyana Fnzl. *II. 510. no. 1. VI. 70. no. 1.
Crossostephium Lssng. *II. 642.
Croossstigma Lindleyi E. Spach. II. 9. no. 19.
Crossostylis Forst. *II. 193.
Crotalaria L. I. 583. II. 835. V. 435.
— Acapulcensis Hook. et Arn. I. 594. no. 120.
— *Acapulcensis* Hook. et Arn. *V. 447. no. 160.
— acicularis Hamilt. V. 436. no. 11.

---

*) I. p. 585. § 6. cf. III. Emend. p. 3.

Crotalaria acuminata DC. *V. 443. no. 92.
— acutiflora Benth. V. 439. no. 47.
— Aegyptiaca Bth. V. 435. no. 1.
— *affinis* DC. V. 449. no. 176.
— alata Rxb. V. 437. no. 19.
— *albida* Heyne. I. 586. no. 33.
— albida Heyne. *I. 587. no. 38. V. 442. no. 84.
— anagyroides H. B. Kth. *V. 451. no. 191.
— angulata Mill. *V. 451. no. 202.
— angustissima E. Mey. I. 592. no. 87. V. 445. no. 129.
— *anthylloides* D. Don. V. 441. no. 78.
— anthylloides Lam. *I. 583. no. 5.
— *anthylloides* Lam. V. 441. no. 80.
— *arborescens* Lam. I. 591. no. 75. V. 450. no. 183.
— arenaria Bth. V. 435. no. 3.
— *argentea* Jcq. I. 632. no. 25.
— Arnottiana Bth. *V. 439. no. 55.
— aspalathoides Lam. V. 450. no. 186.
— Assamica Bth. V. 438. no. 39.
— atrorubens Hochstett. V. 444. no. 119.
— azurea Eckl. et Zeyh. I. 591. no. 82.
— *azurea* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 10.
— barbata Grah. I. 583. no. 6. *V. 439. no. 51.
— *Benghalensis* Lam. I. 585. no. 20.
— *Berteriana* DC. V. 440. no. 72.
— bifaria L. *I. 587. no. 35. *V. 437. no. 15.
— *bifaria* Wall. V. 437. no. 14.
— *bifaria var. multiflora* Arn. V. 437. no. 16.
— biflora L. *I. 587. no. 41. *V. 436. no. 5.
— *biflora* Madr. Herb. V. 443. no. 91.
— *biflora* Willd.? I. 588. no. 43.
— bracteata Rxb. V. 449. no. 172.
— bracteata Schlchtd. et Cham. I. 593. no. 96.
— *bracteata* Schlchtd. V. 439. no. 43.
— *bracteolata* Perrott. I. 661. no. 5.
— bracteosa Bth. I. 593. no. 102. *V. 443. no. 93.
— Brasila Zucc. I. 594. no. 116. *V. 451. no. 203.
— brevidens Bth. V. 448. no. 168.
— *breviflora* Bth. V. 439. no. 47.
— *breviflora* DC. V. 439. no. 43.
— *Brownei* Rchb. V. 449. no. 171.
— bupleurifolia Schlchtd. et Cham. I. 592. no. 95. *V. 438. no. 25.
— Burhia Hamilt. V. 436. no. 4.
— Burkeana Bth. V. 451. no. 201.
— Burmanni DC. *V. 443. no. 91.
— *caespitosa* Rxb. I. 587. no. 40. V. 442. no. 88.
— cajanifolia H. B. Kth. V. 451. no. 193.
— *calycina* Schrank. I. 583. no. 5.
Crotalaria calycina Schrank. V. 441. no. 78.
— candicans Wght. et Arn. I. 585. no. 18. *V. 440. no. 73.
— *canescens* Wall. V. 437. no. 12.
— Capensis Jcq. *I. 591. no. 75. V. 450. no. 183.
— *capitata* Lam. I. 581. no. 8.
—? capitata Lam. *V. 443. no. 95.
— *cephalotes* Hb. Madr. I. 584. no. 11. V. 441. no. 77.
— *Chinensis* Linn. V. 441. no. 82.
— *Chinensis* Rxb. I. 583. no. 9. V. 442. no. 83.
— *clavata* Rxb. I. 587. no. 34.
— clavata Wght. et Arn. I. 589. no. 56. *V. 449. no. 173.
— *coluteoides* Lam. V. 450. no. 185.
— *crassifolia* Hamilt. V. 437. no. 12.
— *crenata* Wall. I. 583. no. 5.
— *crinita* Grab. V. 441. no. 78.
— Cubensis DC. *V. 447. no. 155.
— cuneilolia Zucc. I. 586. no. 28.
— *cuneifolia* Zucc. V. 438. no. 38.
— curtata Lnk. *V. 451. no. 204.
— cylindrocarpa DC. *V. 450. no. 182.
— cytisoides Hels. et Bojer. V. 450. no. 188.
— *cytisoides* Wght. I. 589. no. 56.
— dichotoma Grah. I. 594. no. 118. *II. 836. no. 8.
— *dichotoma* Rth. I. 587. no. 35. V. 437. no. 14. V. 447. no. 153.
— dichotoma Rth. *V. 443. no. 96.
— *diffusa* E. Mey. I. 619. no. 6. V. 444. no. 124.
— *diffusa* Lnk. V. 442. no. 83.
— *diffusa* Rxb. I. 587. no. 40.
— digitata Hook. I. 589. no. 58. *V. 451. no. 199.
— *digitata* Wght. I. 590. no. 59.
— diosmaefolia Bth. V. 450. no. 187.
— distans Bth. V. 447. no. 150.
— divaricata Bth. I. 594. no. 111. *V. 439. no. 46. *V. 443. no. 97.
— *divaricata* Grah. I. 588. no. 51.
— divergens Bth. I. 593. no. 105. *V. 438. no. 31.
— diversifolia E. Mey. I. 592. no. 90.
— *diversifolia* E. Mey. V. 459. no. 48.
— Dombeyana DC. *V. 451. no. 192.
— dubia Grah. V. 442. no. 85.
— ebenoides Guill. et Perr. I. 590. no. 69.
— ebenoides Wlprs. *V. 443. no. 115.
— *effusa* E. Meyer. I. 591. no. 83. V. 444. no. 124.
— effusa E. Mey. V. 444. no. 125.
— elliptica Mart. et Galeotti. II. 836. no. 7. *V. 451. no. 205.
β. multiflora Mart. et Galeotti. II. 836. no. 7.
— elliptica Rxb. V. 446. no. 144.

Crotalaria emarginata Bojer. V. 448. no. 165.
— Emirnensis Bth. V. 447. no. 148.
— eriocarpa Bth. V. 449. no. 175.
— *Espadilla* H. B. Kth. V. 438. no. 26.
— evolvuloides Wght. I. 587. no. 36. V. 437. no. 13.
— exstipulata Mart. I. 593. no. 98. * V. 443. no. 98.
— falcata Schum. et Thonn. I. 591. no. 72.
— *falcata* Schum. et Thonn. V. 450. no. 181.
— falcata Vahl. V. 449. no. 170.
— *farcta* R. Br. V. 448. no. 161.
— *fastigiata* E. Mey. I. 621. no. 11. V. 456. no. 20.
— *fenestrata* Sims. I. 585. no. 20.
— ferruginea Grah. V. 436. no. 12.
β. major V. 437. no. 12.
— filiformis Bth. V. 436. no. 9.
— filipes Bth. V. 436. no. 7.
— flavicoma Bth. I. 593. no. 108. * V. 439. no. 45.
— foliosa Bth. I. 593. no. 107. * V. 439. no. 44.
— *foliosa* Willd. I. 588. no. 51. V. 446. no. 134.
— formosa Grah. I. 585. no. 22. * V. 439. no. 41. (Ill. Emend. p. 3.)
— fruticosa Mill. * V. 451. no. 206.
— fulva Rxb. I. 584. no. 12. * V. 440. no. 71.
— furfuracea Boiss. II. 835. no. 1. * V. 451. no. 207.
— Galeottii Bth. V. 447. no. 152.
— *genistella* H. B. Kth. V. 438. no. 28.
— genistifolia Schum. et Thonn. I. 590. no. 65. V. 438. no. 34.
— *genistoides* Willd. V. 446. no. 137.
— glabrescens Bth. V. 440. no. 68.
— glauca Willd. V. 438. no. 35.
— globifera E. Mey. I. 591. no. 79. V. 447. no. 147.
β? brachycarpa Bth. V. 447. no. 147.
α. glabra E. Mey. I. 591. no. 79.
β. pubescens E. Mey. I. 591. no. 79.
— globosa Wght. I. 587. no. 42. * V. 436. no. 6.
— Gorensis Guill. et Perr. I. 490 no. 64. V. 450. no. 181.
— gracilis Guill. et Perr. I. 591. no. 71.
— gracilis Wlprs. V. 443. no. 114.
— Grahamiana Wght. et Arn. I. 589. no. 59. * V. 451. no. 198.
— grandiflora Bth. I. 594. no. 110. * V. 443. no. 99.
— *Guianensis* Aubl. I. 753. no. 9.
— Havanensis Guss. I. 592. no. 94.
— *Heldiana* Alph. DC. V. 438. no. 30.
— heptaphylla Lour. * V 451. no. 208.
— herbacea Schweigg. I. 594. no. 115.
Crotalaria herbacea Schweigg. V. 449. no. 176.
— herniarioides Wght. et Arn. I. 588. no. 52. * V. 446. no 133.
— *heterophylla* Linn. fil. I. 589. no. 57. V. 451. no. 197.
— *hexaptera* Schrank. V. 438. no. 28.
— hexaptera Zucc. I. 593. no. 100.
— Heyneana Grah. I. 586. no. 33. * V. 439. no. 57.
— *hirsuta* Rxb. I. 583. no. 7.
— *hirsuta* Wall. I. 587. no. 36. V. 437. no. 13. V. 437. no. 13.
— hirsuta Willd. * I. 587. no. 34. V. 437. no. 14.
— *hirta* Rth. I. 587. no. 41.
— hirta Willd. * I. 583. no. 9. * V. 442. no. 83.
— holosericea Nees et Mart. * V. 451. no. 209.
— Hookeri W. Arnott. I. 594. no. 117.
— *Hookerii* Arn.? V. 449. no. 171.
— Hookeriaua Alph. DC. * V. 437. no. 22.
— Hostmanni Steudel. V. 443. no. 100.
— humifusa Grah. V. 436. no. 10.
— humilis Eckl. et Zeyh. I. 591. no. 83. V. 444. no. 124.
α. major Eckl. et Zeyh. I. 591. no. 83.
β. media Eckl. et Zeyh. I. 592. no. 83.
γ. minima Eckl. et Zeyh. I. 592. no. 83.
— Javanica Jungh. I. 589. no. 55. * V. 449. no. 174.
— *imbricata* Linn. II. 835. no. 2.
— *imbricata* Willd. I. 609. no. 1.
— impressa N. ab E. I. 590. no. 67. * V. 444. no. 123.
— *incana* Hook. et Arn. V. 449. no. 175.
— incana Linn. * V. 449. no. 176.
— *incanescens* Willd. I. 591. no. 75.
— *involucrata* E. Mey. I. 621. no. 9. V. 456. no. 18.
— jodina Bth. * V. 443. no. 116.
— juncea L. * I. 585. no. 20. * V. 440. no. 65.
— *juncea* Willd. I. 586. no. 24.
— laburnifolia L. * I. 589. no. 53. * V. 447. no. 151.
— laevigata Lam. V. 445. no. 131.
β. villosior Bth.
— lanceolata E. Mey. I. 591. no. 80. V. 448. no. 167.
— *latifolia* Hort. Calcutt. V. 449. no. 171.
— lathyroides Guill. et Perr. I. 590. no. 63. * V. 448. no. 162.
— leiocarpos Vogel. I. 586. no. 31.
— *leiocarpos* Vogel. V. 442. no. 84.
— leioloba Bartl. I. 595. no. 122. * V. 443. no. 101.
— lenticula E. Mey. I. 592. no. 89. V. 459. no. 47.

Crotalaria Leprieurii Guill. et Perr. I. 590. no. 61. V. 440. no. 59.
— leptophylla Bth. I. 594. no. 113. *V. 451. no. 196.
— leptostachya Bth. V. 440. no. 64.
— Lechenaultii DC. *I. 586. no. 23. *V. 439. no. 40.
— *linearis* Madr. Herb. V. 441. no. 78.
— *linearis* Wall. I. 583. no. 5.
— linifolia L. *I. 587. no. 40. *V. 442. no. 88.
— *linifolia* Willd. I. 587. no. 38.
— littoralis H. B. Kth. *V. 447. no. 154.
— *longifolia* Lam. I. 753. no. 9.
— longipes Wght. et Arn. I. 384. no. 13. (III. Emend. p. 3.) *V. 439. no. 52.
— longirostrata Hook. et Arn. I. 594. no. 121. *V. 447. no. 159.
— lotifolia Linn. *V. 451. no. 189.
— lotoides Bth. V. 445. no. 127.
— lunulata Heyne. I. 584. no. 15. (III. Emend. p. 3.) *V. 440. no. 74.
— *lupiniflora* Grah. I. 586. no. 23.
— lupinoides Hochstt. V. 447. no. 161.
— lupulina H. B. Kth. *V. 447. no. 153.
— luxurians Bth. V. 446. no. 136.
— macilenta Delile. I. 590. no. 68.
— *macilenta* Delile. V. 447. no. 149.
— macrocalyx Bth. V. 443. no. 117.
— macrocarpa E. Mey. I. 591. no. 77. V. 451. no. 190.
— *macrophylla* Herb. Madr. I. 791. no. 1.
— macrophylla Weinm. I. 583. no. 5.
— *macrophylla* Weinm. V. 438. no. 38.
— *macrophylla* Willd. I. 791. no. 2.
— *macrostyla* D. Don. I. 672. no. 1.
— Madurensis Wght. I. 585. no. 17. (III. Emend. p. 3.) *V. 440. no. 69.
— Martiana Bth. V. 439. no. 48.
— Matthewsiana Bth. V. 438. no. 27.
— Maypurensis H. B. Kth. *V. 447. no. 160.
— *medicaginea* DC. I. 588. no. 46.
— *medicaginea* Hamilt. V. 446. no. 136.
— medicaginea Lam. *I. 588. no. 51. *V. 446. no. 134.
— *melanocarpa* Wall. I. 588. no. 43.
— melanocarpa Wall. V. 442. no. 90.
— micans Lnk. *V. 451. no. 210.
— micrantha E. Mey. I. 592. no. 84.
— *micrantha* E. Mey. V. 457. no. 23.
— micrantha Lnk. *V. 446. no. 141.
— microcarpa Hochstett. V. 444. no. 120.
— microphylla Vahl. V. 444. no. 122.
— mollicula H. B. Kth. *V. 451. no. 212.
— mollis E. Mey. I. 591. no. 76. (c. var. β.) V. 445. no. 126.
— mollis Weinm. I. 586. no. 27.
Crotalaria mollis Weinm. V. 439. no. 53.
— *montana* Heyne. I. 587. no. 40. V. 442. no. 88.
— montana Rxb. I. 584. no. 10. (III. Emend. p. 3.)
— *montana* Rxb. V. 442. no. 84.
— mucronata Dsvx. *V. 451. no. 211.
— multiflora Bth. V. 437. no. 16.
— Mysorensis Rth. *I. 583. no. 7. V. 441. no. 81.
— nana Burm. *I. 588. no. 43. *V. 443. no. 91.
— Natalitia Meisn. II. 836. no. 2. *V. 450. no. 184.
— *Napalensis* Lk. I. 583. no. 5.
— neglecta Wght. et Arn. I. 588. no. 50. (III. Emend. p. 3.) *V. 446. no. 135.
— *Nepalensis* Lnk. V. 441. no. 80.
— neriifolia Wall. V. 439. no. 88.
—? *nervosa* Grah. I. 660. no. 1.
— nitens H. B. Kth. *V. 439. no. 43.
— nitidula Mart. I. 593. no. 99.
— *nitidula* Martius. V. 439. no. 43.
— Notonii Wght. et Arn. I. 588. no. 49. (III. Emend. p. 3.) *V. 446. no. 138.
— Novae Hollandiae DC. *V. 443. no. 102.
— Nubica Bth. V. 446. no. 146.
— *nummularia* Willd. I. 587. no. 41. I. 588. no. 43.
— nummularia Willd. *V. 443. no. 103.
— *obliqua* Ham. I. 587. no. 37.
— *obliqua* Wall V. 437. no. 12.
— obovata G. Don. II. 836. no. 3. *V. 451. no. 213.
— obscura DC. V. 445. no. 128.
β. collina Eckl. et Zeyh.
— *obscura β. argyrotricha* E. Mey. I. 591. no. 81.
— obtecta Grah. I. 585. no. 12. *V. 440. no. 67.
— occulta Grah. V. 441. no. 79.
— ochroleuca G. Don. II. 836. no. 4. *V. 451. no. 214.
— ononoides Bth. V. 444. no. 118.
— *orbicularis* E. Mey. I. 565. no. 2.
— Orixensis Rottl. *V. 449. no. 178.
— otoptera Bth. I. 593. no. 103. *V. 438. no. 33.
— *ovalifolia* Wall. I. 583. no. 1. γ.
— ovalis Prsh. I. 595. † *V. 437. no. 21.
— oxyptera E. Mey. I. 592. no. 92.
— *oxyptera* E. Mey. V. 457. no. 26.
— pallida Ait. *V. 448. no. 169.
— paniculata Willd. *V. 440. no. 76.
— Paramariboënsis Miq. II. 836. no. 5. *V. 451. no. 215.

Crotalaria parva Grah. I. 587. no. 38. V. 442. no. 84.
— parviflora Rth. * V. 443. no. 104.
var. glabella Mart. et Galeotti. II. 836. no. 6.
— patula Grah. V. 442. no. 86.
— *Paulina* Schrank. V. 438. no. 37.
— peduncularis Grah. I. 585. no. 25. (III. Emend. p. 3.) * V. 438. no. 36.
— *pedunculosa* Desv. I. 589. no. 53.
— *pellita* Bert. I. 584. no. 14.
— *pellita* DC. V. 440. no. 75.
— *pendula* Bert. I. 589. no 53.
— perplexa E. Mey. I. 592. no. 86.
— *perplexa* E. Mey. I. 619. no. 7. V. 457. no. 22.
— Perrottetii DC. I. 595. † * V. 443. no. 113.
— petiolata Vgl. I. 591. no. 78.
— pilosa Mill. * V. 451. no. 216.
— *pilosa* Rxb. I. 583. no. 9. V. 442. no. 83.
— pilosa Thbg. * I. 591. no. 81.
β. bifaria Eckl. et Zeyh.
δ. chrysotricha E. Mey.
γ. collina Eckl. et Zeyh.
— *pilosa* Thnbrg. V. 445. no. 128.
— pisiformis Guill. et Perr. I. 590. no. 62.
— *pisiformis* Guill. et Perr.? V. 449. no. 171.
— podocarpa DC. V. 450. no. 180.
— Pohliana Bth. I. 593. no. 101. * V. 438. no. 30.
— polycarpa Bth. V. 446. no. 145.
— *porrecta* Wall. I. 585. no. 20.
— procumbens DC. * V. 443. no. 105.
— *procumbens* Rxb. I. 588. no. 51.
— *procumbens* Wall. V. 446. no. 133.
— *prolifera* Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 2.
— *prolifera* E. Mey. V. 458. no. 33.
— *prolifera β. glabrescens* E. Mey. I. 619. no. 1.
— prostrata Rxb. * I. 587. no. 37. * V. 436. no. 8.
— pterocaula Dsvx. * V. 438. no. 28.
— pubera Vahl. * V. 451. no. 194.
— *pulchella* Andr. I. 607. no. 7.
— pulchella Andrws. * V. 451. no. 217.
— pulcherrima Rxb. * I. 585. no. 19. * V. 440. no. 72.
— *pulchra* Andr. I. 585. no. 19.
— pulchra Andrws. * V. 443. no. 106.
— *pumila* Hochstett. et Steudel. V. 444. no. 122.
— pumila Ortega. * V. 447. no. 157.
— pumila Schrank. * V. 443. no. 107.
— *punctata* Grah. I. 587. no. 38. V. 442. no. 84. et 89.
Crotalaria purpurascens Lam. V. 449. no. 176.
— purpurea Vent. V. 450. no. 185.
— Purshii DC. * V. 537. no. 23.
— pusilla Heyne. * V. 440. no. 63.
— *pusilla* Rxb. I. 587. no. 36.
— pycnostachya Bth. V. 448. no. 163.
— quinata E. Mey. I. 592. no. 91.
— *quinata* E. Mey. V. 457. no. 25.
— quinquefolia L. * I. 589. no. 57. * V. 451. no. 197.
— *racemosa* Arrabida. V. 438. no. 32.
— ramosissima Rxb. * I. 584. no. 14. * V. 440. no. 75.
—? reflexa Thnbrg. * V. 443. no. 108.
— retusa L. * I. 586. no. 26. * V. 438. no. 37.
— *retusa β.* Willd. I. 586. no. 28.
— *rhizophylla* Grah. V. 441. no. 79.
— rigida Heyne. * V. 446. no. 132.
— rostrata Wght. et Arn. I. 588. no. 47. * V. 446. no. 140.
— *Rothiana* DC. I. 587. no. 41.
— Rothiana DC. * V. 443. no. 109.
— *Rothii* Spr. I. 587. no. 41.
— *Roxburghiana* DC. I. 583. no. 5. V. 441. no. 78.
— rubiginosa Guill. et Perr. I. 590. no. 70.
— *rubiginosa* Rxb. I. 587. no. 36. V. 437. no. 14.
— rubiginosa Willd. * I. 583. no. 1. (c. varr. *α. β. γ.*) * V. 437. no. 17.
— *sagittalis* Arrabida. V. 438. no. 26.
— sagittalis Linn. * V. 438. no. 24.
— *sagitticaulis* Wall. V. 437. no. 19.
— salicifolia Heyne. I. 583. no. 8. (III. Emend. p. 3.) * V. 439. no. 50.
— *salicifolia* var. Wall. V. 441. no. 78.
— scabrella Wght. et Arn. I. 583. no. 2. (III. Emend. p. 3.) * V. 437. no. 18.
— scandens Lour. * V. 443. no. 110.
— *scoparia* Wall. V. 442. no. 84.
— semperflorens Vent. * V. 439. no. 56.
— *semperflorens* Wall. V. 439. no. 55.
— Senegalensis Bacle. V. 447. no. 149.
— sericea Retz. * I. 586. no. 24. V. 438. no. 38.
— *sericea* Willd. I. 585. no. 20.
— sessiliflora Linn. V. 441. no. 80.
— setifera DC. * V. 447. no. 156.
— *sobolifera* Grah. I. 587. no. 40. V. 442. no. 88.
— *sobolifera* var. Wall. V. 443. no. 91.
— sparsiflora E. Mey. I. 592. no. 88. V. 444. no. 121.
— spartioides DC. V. 440. no. 62.
— *spartioides* E. Mey. V. 440. no. 61.
— *spartioides* Spr. I. 588. no. 46.

Crotalaria speciosa Heyne. *I. 584. no. 11. *V. 441. no. 77.
— *spectabilis* Rth. I. 586. no. 24.
— sphaerocarpa Perrott. *V. 446. no. 142.
— *sphaerocarpa var. angustifolia* Hochstett. V. 447. no. 146.
— spinosa Hochstett. V. 445. no. 130.
β. pubescens.
— splendens Vogel. I. 590. no. 60.
— *splendens* Vogel. V. 446. no. 144.
— *stenophylla* Bojer. V. 450. no. 187.
— *stenophylla* Eckl. et Zeyh. V. 444. no. 124.
— stenophylla Vogel. I. 586. no. 30. V. 442. no. 87.
— stipitata Grah. I. 589. no. 54. (III. Emend. p. 3.)
— *stipitata* Grah. V. 445. no. 131.
— *stipulacea* Rxb. I. 383. no. 7. V. 441. no. 81.
— stipularis Dsvx. *V. 438. no. 26.
— striata A. Braun. I. 590. no. 66.
— *striata* A. Braun. V. 444. no. 123.
— striata DC. V. 449. no. 171.
— *striata* Rxb. I. 583. no. 5.
— striata Schum. et Thonn. I. 591. no. 73.
— *striata* Schum. et Thonn. V. 449. no. 170.
— striata Zucc. I. 594. no. 114. *V. 451. no. 218.
— stricta DC. I. 595. †
— *stricta* Rth. I. 588. no. 48. *V. 452. no. 219.
— *stricta* Rxb. V. 441. no. 78.
— subperfoliata Wght. I. 584. no. 16. (III. Emend. p. 3.) *V. 440. no. 70.
— *tecta* Heyne. I. 587. no. 40.
— tecta Rth. *V. 443. no. 89.
— *tenella* E. Mey. I. 620. no. 14. V. 459. no. 45.
— *tenuifolia* Rxb. I. 585. no. 20.
— *tenuis* Wall. V. 442. no. 84.
— Tepicana Hook. et Arn. *V. 447. no. 158.
— tetragona Rxb. *V. 440. no. 66.
— Thebaica DC. V. 435. no. 2.
— *Thebaica* Guill. et Perr. V. 436. no. 3.
— Thunbergiana Vogel. I. 592. no. 85.
— *Thunbergiana* Vogel. V. 456. no. 11. β.
— *tomentosa* Rottl. I. 384. no. 14. V. 440. no. 75.
— Topicauca Hook. et Arn. I. 594. no. 119.
— triantha DC. *V. 452. no. 220.
— trichopoda E. Mey. I. 592. no. 93.
— *trichopoda* E. Mey. V. 457. no. 21.
— trichotoma Dcne. I. 591. no. 74. *V. 451. no. 200.
— *triflora* Heyne. I. 587. no. 36. V. 437. no. 14.
Crotalaria trifoliastrum Willd. *I. 588. no. 48. *V. 446. no. 139.
— *truncata* E. Mey. I. 621. no. 5. V. 456. no. 17.
— tuberosa Hamilt. *V. 443. no. 111.
— turgida DC. *V. 452. no. 221.
— Tweediana Bth. V. 439. no. 49.
— *umbellata* Wall. I. 588. no. 43.
— umbellata Wght. I. 588. no. 44. (III Emend. p. 3.)
— *umbellata* Wght. V. 443. no. 91.
— uncinella Lam. *V. 446. no. 143.
— undulata Knowls. et Westsc. I. 593. no. 97. *V. 443. no. 12.
— *uniflora* Koen. I. 582. no. 1.
— unifoliolata Bth. I. 494. no. 112. *V. 451. no. 195.
— Vachellii Hook. et Arn. I. 588. no. 45.
— *Vachelii* Hook. V. 446. no. 144.
— vasculosa Wall. V. 448. no. 166.
— velutina Bth. I. 593. no. 106. *V. 438. no. 29.
— *venusta* Wall. V. 441. no. 80.
— verrucosa Linn. *V. 439. no. 53.
— *versicolor* E. Mey. I. 619. no. 4. V. 459. no. 44.
— vespertilio Bth. I. 593. no. 104. *V. 438. no. 32.
— *vexillata* E. Mey. I. 619. no. 2. V. 456. no. 11.
— villosa Thnbrg. *V. 452. no. 222.
— viminea Grah. I. 587. no. 39. (III. Emend. p. 3.)
— *viminea* Grah. V. 442. no. 89.
— *viminea* Wall. I. 585. no. 20.
— virgata Bth. I. 593. no. 109. *V. 439. no. 42.
— *virgata* Mart.? I. 588. no. 50. V. 446. no. 133.
— *virgata* Rxb. I. 588. no. 48.
— virgata Rxb. *V. 452. no. 223.
— virgultalis Burch. V. 440. no. 61.
— vitellina Ker. *V. 449. no. 177.
— Vogelii Bth. V. 440. no. 60.
— Walkerii Arn. I. 586. no. 29.
— *Walkerii* Arn. V. 439. no. 56.
— Wallichiana Wght. et Arn. I. 586. no. 32. *V. 439. no. 51.
— Wightiana Grah. I. 583. no. 3. (III. Emendand. p. 3.) *V. 437. no. 20.
— *Wightiana* Wall. I. 583. no. 1. α. V. 437. no. 18.
— Willdenowiana DC. *I. 588. no. 46. *V 446. no. 137.
— xanthoclada Bojer. V. 449. no. 179.
— Zanzibarica Bth. V. 448. no. 164.

Crotalarioides Spach. II. 842.
Croton eriospermum Lam. I. 249. no. 4.
Crowea Sm. I. 504.
— saligna Sm. *I. 504. no. 1.
Cruciana Griseb. VI. 23.
Crucianella Linn. II. 460. VI. 19.
— bracteata Boiss. VI. 21. no. 9.
— disticha Boiss. et Spruner. VI. 20. no. 3.
— galioides Boiss. VI. 21. no. 8.
— Graeca Boiss. et Spruner. VI. 20. no. 2.
— hispidula Fisch. et Mey. II. 460. no. 1. et adn.
— Kotschyana Boiss. et Hohenack. VI. 21. no. 7.
— macrostachya Boiss. et Spruner. VI. 20. no. 5.
— membranacea Boiss. VI. 20. no. 6.
— penicillata Boiss. et Spruner. VI. 20. no. 4.
— sherardioides Boiss. VI. 19. no. 1.
— stylosa Trin. *II. 460. no. 3.
— *stylosa* Trinius. VI. 25. no. 15.
— suaveolens C. A. Mey. II. 460. no. 2.
Crucietta Lasch. II. 385.
Cruciata Tournef. II. 456.
Cruciatae Pfeiff. II. 351.
CRUCIFERAE Adans. I. 123. II. 755. V. 34.
Cruckshanksia Hook. et Arn. II. 469.
— *cistiflora* Hook. I. 460. no. 2.
— glacialis Poepp. et Endl. II. 469. no. 1.
— hymenodon Hook. et Arn. II. 469. no. 2.
Crudya Willd. I. 854. V. 573.
— acuminata Bth. V. 573. no. 2.
— bracteata Bth. I. 854. no. 1.
— oblonga Bth. V. 574. no. 3.
— orientalis Hsskrl. V. 573. no. 1.
Cruminium Desvx. I. 792.
— giganteum Desvx. *I. 792. no. 1.
Crupina Cass. II. 670. VI. 292.
— pauciflora Kar. et Kir. II. 670. no. 1.
— *pauciflora* Kar. et Kir. VI. 292. no. 1.
— vulgaris Cassini. *VI. 292. no. 1.
Crusea Cham. et Schlchtd. II. 466. VI. 31.
— aspera Bartl. II. 466. no. 1.
— brachyphylla Cham. et Schlchtd. II. 466. no. 3.
— *glabra* A. Rich. II. 487. no. 1.
— *glaucescens* E. Mey. II. 941. no. 2.
— *lanceolata* E. Mey. II. 941. no. 1. VI. 35. no. 1.
— lucida Bth. VI. 31. no. 1.
— parviflora Hook. et Arn. II. 467. no. 4.
— rubra Bartl. II. 466. no. 2.
— *rubra* Cham. et Schlchtd. II. 466. no. 1.
— subulata Hook. et Arn. II. 467. no. 5.
— *variabilis* E. Mey. II. 941. no. 1. VI. 35. no. 1.
Crusta ollae major Rmph. III. 289. no. 3.
— *ollae minor Caranasci* Rmph. III. 292. no. 4.
Crymatea rigida Bnks. et Soland. VI. 321. no. 3.
Cryphia R. Br. III. 764. °III. 985.
— microphylla R. Br. III. 764. no. 2.
— serpyllifolia R. Br. III. 764. no. 1.
Cryphiospermum Palis. *II. 603.
— *Abyssinicum* C. H. Schultz. VI. 147. no. 1.
Crypta Seubert. I. 283. V. 83.
— *minima* Nutt. I. 283. no. 1. V. 83. no. 1.
— *triandra* Al. Braun. V. 83. no. 2.
Cryptadia Linn. *II. 602.
Cryptandra obovata Sieb. II. 152. no. 1. V. 726. no. 1.
Cryptanthera DC. VI. 558. no. 1.
Crypteronia Paxton (?) V. 675. no. 1. 2. 3. 4. 5.
Cryptocalyx Bth. IV. 57.
— nepetaefolia Bth. IV. 57. no. 1.
Cryptocarpum Dunal. III. 90.
Cryptochaete Bth. VI. 325.
Cryptodia Lindl. *II. 955. no. 4.
Cryptodiscus Schrenk. II. 427. V. 923.
— cachroides Schrenk. *II. 427. no. 1. V. 923. no. 1.
Cryptodracon Bth. III. 793.
Cryptolappa Adr. Juss. V. 349.
Cryptolepis R. Br. °VI. 474.
— Buchanani Roem. et Schult. *VI. 474. no. 1.
— *reticulata* Royle. VI. 474. no. 1.
Cryptolobus Americanus Spr. I. 750. no. 1.
— *sarmentosus* Spr. I. 750. no. 1.
Cryptopetalum Cass. VI. 104.
— *pusillum* Hook. et Arn. II. 368. no. 1.
Cryptopleura Nutt. *II. 696.
Cryptopleura Nutt. II. 696.
— *Californica* Nutt. II. 696. no. 6.
Cryptospora Kar. et Kir. II. 762.
— falcata Kar. et Kir. *II. 762. no. 1.
Cryptostegia R. Br. *VI. 479.
Cryptostemma R. Br. *II. 666. VI. 277.
— calendulaceum R. Br. *VI. 277. no. 1.
Cryptostephane C. H. Schultz. °VI. 318.
— Kraussii C. H. Schultz. *VI. 319. no. 1.
Cryptotaenia DC. *II. 394.
— *Thomasii* DC. V. 854. no. 1.
Cryptotheca Blume. *II. 101.
Ctenosperma Hook. fil. °VI. 724.
— alpinum Hook. fil. VI. 725. no. 1.
Cubios III. 88. no. 357.
Cubospermum palustre Lour. II. 72. no. 1.
Cucubalus Tournef. *I. 282.
— *Behen β. maritimus* Wahlnbrg. II. 776. no. 3.

Cucubalus congestus Willd. II. 777. no. 7.
— *Dauricus* Pall. II. 777. no. 6. γ.
— *maritimus* Prytz. II. 776. no. 3.
— *mollissimus* M. B. I. 276. no. 43.
— *parviflorus* Ehrb. II. 779. no. 19. β.
— *Sibiricus* Willd. II. 777. no. 6. α.
— *striatus* Willd. II. 777. no. 5.
— *strictus* Willd. II. 777. no. 6. α.
Cucullaria bulbosa Raf. I. 118. no. 4.
Cucumerinae Endl. II. 201. V. 761.
Cucumis Linn. II. 201.
— *agrestis* Blackw. II. 199. no. 1.
— arenarius Schum. et Thonn. II. 201. no. 7.
— bicirrha Forst. II. 202. no. 9.
— chrysocomus Schum. et Thonn. II. 202. no. 8.
— *Coloeynthis* Linn. II. 199. no. 4.
— dissectus Dcne. II. 202. no. 10.
— Hardwickii Royle. II. 201. no. 5.
— *Maderaspatanus* Linn. II. 198. no. 3. α.
— *Maderaspatanus* Rxb. II. 201. no. 9.
— *Maderaspatanus* Wall. II. 201. no. 3.
— *operculatus* Rxb. II. 200. no. 2.
— *pentandrus* Rxb. II. 200. no. 1.
— Pseudo-colocynthis Royle. II. 201. no. 6.
— pubescens Willd. *II. 201. no. 4. II. 202.†
— *pyriformis* Rxb. II. 201. no. 2.
— trigonus Rxb. II. 201. no. 3. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *tuberosus* Rxb. II. 200. no. 4.
— turbinatus Rxb. II. 201. no. 2.
— utilissimus Rxb. II. 201. no. 1.
Cucurbita Linn. II. 202. V. 761.
— *alba* Rxb. II. 201. no. 1.
— asperata Gill. II. 202. no. 1.
— *asperata* Gill. II. 199. no. 1. VI. 50. adn. no. 1.
— *Caffra* Eckl. et Zeyh. II. 199. no. 2.
— *Citrullus* Linn. II. 199. no. 1.
— *dioica* Rxb. II. 202. no. 1. α.
— *hispida?* Willd. II. 201. n. 1.
— littoralis Hsskrl. V. 761. no. 1.
— maxima Duch. *II. 202. no. 3.
— *Pepo* Rxb. II. 201. no. 1.
— *umbellata* Klein. II. 201. no. 5.
— urnigera Schrad. II. 202. no. 2.
CUCURBITACEAE DC. (ex p.) II. 194. V. 758.
CUCURBITACEAE Juss. II. 195. V. 758.
Cucurbiteae Endl. II. 195. V. 759.
Cucurbitella Wlprs. VI. 50. adn. (Nec Curcubitella err. typogr.)
— asperata Wlprs. VI. 50. adn. no. 1.
Culcitium Humb. et Bonpl. *II. 652. VI. 251.
— ascendens Bth. VI. 255. no. 5.
— *candidum* Don. II. 659. no. 50.
Culcitium dentatum Don. II. 659. no. 52.
— *depressum* Don. II. 658. no. 49.
— glaciale Meyen et Wlprs. VI. 254. no. 1.
—? hyoseridis Bth. VI. 255. no. 4.
— Magellanicum Hombron et Jacquinot. VI. 255. no. 3.
— rosmarinifolium Bth. VI. 255. no. 6.
— serratifolium Meyen et Wlprs. VI. 255. no. 2.
Cullumia R. Br. *II. 666. VI. 278.
— intermedia DC. *VI. 278. no. 1.
— *reflexa* C. H. Schultz. VI. 278. no. 1.
Cumbulu Rheede. IV. 98. no. 6.
Cumineae Koch. II. 417. V. 896.
Cuminia Colla. III. 846. °III. 988.
— eriantha Colla. III. 846. no. 1.
Cuminum Linn. *II. 417.
Cuncea Hamilt. *II. 463.
Cuneifoliae DC. (Baccharis) II. 596. VI. 136.
Cunila Linn. III. 713. °III. 982. VI. 671.
— angustifolia Bth. III. 713. no. 3.
— *Buchanani* Spr. III. 716. no. 1.
— *capitata* Linn. III. 684. no. 1. α.
— coccinea Nutt. III. 737. no. 13.
— fasciculata Bth. III. 715. no. 12.
— *fruticosa* Willd. III. 770. no. 1.
— galioides Bth. III. 714. no. 11.
— *glabella* Michx. III. 718. no. 1.
— *hispida* Spr. III. 718. no. 8.
— incana Bth. III. 713. no. 4.
— incisa Bth. III. 713. no. 2.
— leucantha Bth. III. 713. no. 5.
— lythrifolia Bth. III. 714. no. 7.
— Mariana Linn. III. 713. no. 1.
— menthoides Bth. III. 714. no. 10.
— microcephala Bth. III. 715. no. 13.
— *Nepalensis* D. Don. III. 716. no. 1.
— *piperita* Moç. et Sess. III. 716. no. 3.
— polyantha Bth. III. 714. no. 6.
— *pulegioides* Linn. III. 716. no. 2.
— stachyoides Mart. et Galeotti. VI. 671. no. 1.
— spicata Bth. III. 714. no. 9.
— stricta Bth. III. 714. no. 8.
— *thymoides* Gouan. III. 723. no. 24.
— *thymoides* Linn. III. 700. no. 13. β.
— verticillata Mnch. III. 715. no. 14.
Cunileae Endl. III. 711. III. 982. VI. 671.
Cunonia Linn. *II. 375.
Cunonieae DC. II. 373. V. 828.
Cupania Plum. I. 418. II. 815. V. 363.
— anacardiaefolia Gardn. II. 815. no. 4.
— anacardioides A. Rich. I. 420. no. 27.
— apetala Macfd. I. 418. no. 10.
— canescens Pers. *I. 418. no. 1. et no. 5.
— castaneaefolia Mart. I. 419. no. 20.

Cupania Chapelieriana Cambess. I. 418. no. 7.
— cinerea Poepp. et Endl. II. 815. no. 2.
— clethroides Mart. I. 419. no. 21.
— diplopetala Hsskrl. V. 363. no. 1.
— emarginata Cambess. I 418. no. 13.
— frutescens Mart. I. 419. no. 25.
— fulva Mart. I. 419. no. 22.
— heterophylla Mart. I. 419. no. 18.
— juglandifolia A. Rich. II. 816. no. 8.
— Lessertiana Cambess. I. 418. no. 3.
— macrophylla Mart. I. 420. no. 26.
— macrophylla A. Rich. II. 816. no. 9.
— micrantha Mart. I. 419. no. 17.
— multiflora Mart. II. 815. no. 1.
— multijuga A. Rich. II. 815. no. 6.
— oblongifolia Mart. I. 419. no. 21.
— oppositifolia A. Rich. II. 816. no. 10.
— paniculata Cambess. I. 419. no. 15.
— Perrottetii Cambess. I. 418. no. 4.
— pseudorchus A. Rich. I. 420. no. 28.
— punctata Cambess. I. 419. no. 16.
— purgans Poepp. et Endl. II. 815. no. 3.
— Ratonia Cambess. *I. 418. no. 9.
— reticulata Cambess. I. 418. no. 12.
— reticulata Splitgrbr. II. 815. no. 5.
— Roxburghii Wght. V. 363. no. 2.
— salicifolia Dcne. *I. 418. no. 2.
— subalbens Mart. I. 419. no. 23.
— subrepanda Mart. I. 419. no. 19.
— sylvatica Casaretto. V. 363. no. 3.
— Thouarsiana Cambess. I. 418. no. 8.
— Tolambitou Cambess. I. 418. no. 6.
— triquetra A. Rich. II. 816. no. 7.
— Uraguensis Hook. et Arn. I. 418. no. 11.
— zanthoxyloides Cambess. I. 418. no. 14.
Cuphea Jcq. II. 105. V. 674.
— acinifolia St. Hil. II. 105. no. 6.
— acinos St. Hil. II. 106. no. 8.
— acutissima St. Hil. II. 106. no. 11.
  β. radula St. Hil.
— anagalloidea St. Hil. II. 110. no. 42.
— *antisyphilitica* H. B. Kth. II. 107. no. 17.
— appendiculata Bth. II. 105. no. 4.
— arenarioides St. Hil. II. 110. no. 41.
  γ. muscosa St. Hil.
  β. myriophylloides St. Hil.
— arvensis Bth. II. 108. no. 24.
— Balsamona Cham. et Schlchtd. II. 107. no. 17. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— barbigera Hook. et Arn. II. 107. no. 21.
— *Bonariensis* Gill. II. 111. no. 46. β.
— calaminthaefolia Schlchtd. II. 105. no. 2.
— calcarata Bth. II. 108. no. 23.
— calophylla Cham. et Schlchtd. II. 107. no. 15.
— confertiflora St. Hil. II. 108. no. 26.
Cuphea cordata Rz. et Pav. V. 674. †
— diosmaefolia St. Hil. II. 109. no. 38.
— ericoides Cham. et Schlchtd. II. 109. no. 39.
  ε. Hervita Cambess. II. 110. no. 39.
  γ. juniperifolia Cambess. II. 109. no. 39.
  δ. linifolia Cambess. II. 110. no. 39.
  β. pithyusa Cambess. II. 109. no. 39.
— euphorbioides St. Hil. II. 108. no. 25.
— *floribunda* Hook. et Arn. II. 107. no. 20.
— floribunda Lehm. II. 105. no. 1.
— fuchsiaefolia St. Hil. II. 106. no. 12.
— glabra Gill. II. 110. no. 43.
— glutinosa Cham. et Schlchtd. II. 109. no. 33.
— heterophylla Bth. II. 108. no. 31.
— *hirsuta* Gill. II. 109. no. 33.
— Hookeriana Wlprs. II. 107. no. 20.
— hyssopioides St. Hil. II. 109. no. 35.
— impatientifolia St. Hil. II. 108. no. 27.
— ingrata Cham. et Schlchtd. II. 106. no. 13.
  β. parvifolia Cambess. II. 106. no. 13.
  γ. Platensis Cambess. II. 107. no. 13.
— lanceolata Ait. II. 112. †
— ligustrina Cham. et Schlchtd. II. 111. no. 46.
  β. chamaedendrum Cambess.
  δ. Commersoniana Cambess.
  ε. epilobioides Cambess.
  β. rosmarinifolia Cambess.
  ζ. silenoides Cambess.
— linarioides Cham. et Schlchtd. II. 109. no. 37.
  δ. crassiuscula Cambess.
  β. minutifolia Cambess.
  γ. nana Cambess.
— Llaweana DC. II. 112. †
— lysimachioides Cham. et Schlchtd. II. 109. no. 36.
— *Megapotamica* Spr.? II. 111. no. 46. δ.
— mimuloides Cham. et Schlchtd. II. 108. no. 30.
— origanifolia Cham. et Schlchtd. II. 111. no. 45.
  γ. gracillima Cambess.
  β. sublanata Cambess.
— patula St. Hill. II. 106. no. 7.
— pinetorum Bth. V. 674. no. 1.
— platycentra Bth. II. 105. no. 3.
— plumbaginea Mart. II. 108. no. 29.
— polymorpha St. Hil. II. 106. no. 10.
  β. oxycoccos Cambess.
  α. phyllireoides Cambess.
  δ. prostrata Cambess.
  γ. vincoides Cambess.
— prunellaefolia St. Hil. II. 107. no. 14.
— pseudo-vaccinium St. Hil. II. 106. no. 9.
  β. minor Cambess.
— pubiflora Bth. II. 111. no. 47.

Cuphea racemosa Spr. II. 111. no. 44. β.]
— rigidula Bth. II. 108. no. 22.
— salicifolia Schlchtd. et Cham. II. 107. no. 19.
— sessiliflora St. Hil. II. 107. no. 18.
— sessilifolia Mart. II. 112. no. 48.
— silenoides N. ab E. II. 107. no. 16.
— sperguloides St. Hil. II. 110. no. 40.
— spermacoce St. Hil. II. 108. no. 28.
— spicata Cav. *II. 110. no. 44. (c. var. β.) α. molliuscula Cambess.
— strigulosa Kth. V. 674. †
— tenella Hook. et Arn. II. 108. no. 32.
— *thymoides* Cham. et Schlchtd. II. 105. no. 5. γ.
— thymoides St. Hil. II. 105. no. 5.
ε. argentina Cambess.
β. laevis Cambess.
δ. pseudo-erica Cambess.
γ. thymoides Cambess.
— tuberosa Cham. et Schlchtd. II. 109. no. 34.
Cupia DC. II. 517.
— *corymbosa* DC. II. 517. no. 4.
— *cymosa* DC. II. 484. no. 1.
— *mollissima* Hook. et Arn. II. 517. no. 5.
— *thyrsoidea* DC. II. 504. no. 1.
Curanga Juss. III. 284. °III. 964. *VI. 643.
— amara Juss. III. 284. no. 1.
Curania amara Roem. et Schult. III. 284. no. 1.
Curatari Estrellensis Raddi. V. 757. no. 2.
Curatella L. I. 65.
— Camboiba St. Hil. I. 65. no. 1.
Curcubitella cf. Cucurbitella.
Cursonia Nutt. II. 681. VI. 320.
— Peruviana Nutt. *II. 681. no. 1. VI. 320. no. 1.
Curtisia Ait. *II. 436.
Curvembryeae Endl. III. 5. III. 953. VI. 567.
Curvembryeae Miers. VI. 567.
Cuscuta Linn. °VI. 543. adn.
Cuscuta Tournef. VI. 543.
— *Americana* Auctor. VI. 745. no. 7.
— anguina Edgewrth. VI. 544. no. 6.
— approximata Babington. VI. 544. no. 2.
— *arvensis* Beyrich. VI. 744. no. 6.
— astyla Engelm. VI. 744. no. 2.
— Bonariensis Engelm. VI. 745. no. 10.
— capillaris Edgewrth. VI. 544. no. 5.
— *Cephalanthi* Engelm. VI. 744. no. 4.
— *Chilensis* Bertero. VI. 545. no. 7.
— congesta Bth. VI. 546. no. 12.
— Coryli Engelm. VI. 745. no. 11.
— *corymbosa* Choisy. VI. 544. adn. no. 1. VI. 545. no. 7.
Cuscuta corymbosa Rz. et Pav. VI. 545. adn.
— cupulata Engelm. VI. 744. no. 3.
— cuspidata Engelm. VI. 744. no. 5.
— *diaphana* Wndrth. VI. 545. no. 7.
— *epilinum* Weihe? VI. 544. adn. no. 1.
— epithymum Linn. VI. 544. adn. no. 2.
— *epithymum β. Trifolii* Babingt. VI. 544. no. 3.
— Europaea Linn. VI. 543. no. 1. adn.
— *Europaea* Schkhr. VI. 544. adn. no. 2.
— globulosa Bth. VI. 545. no. 11.
— *Hassiaca* Pfeiff. VI. 544. adn. no. 1. VI. 545. no. 7.
— Kotschyana Boiss. VI. 544. no. 4.
— laxiflora Bth. VI. 545. no. 10.
— leiolepis Miquel. VI. 545. no. 9.
— major C. Bauh. β. Pontica C. Koch. VI. 543. no. 1.
— *minor* Choisy. VI. 544. adn. no. 3.
— patens Bth. VI. 546. no. 13.
— pentagona Engelm. VI. 744. no. 6.
— Polygonorum Engelm. VI. 744. no. 7.
— pycnantha Bth. VI. 545. no. 8.
— rostrata Engelm. VI. 745. no. 9.
— Saururi Engelm. VI. 745. no. 8.
— Schkuhriana Pfeiffer. VI. 544. adn. no. 2.
— suaveolens Seringe. VI 545. no. 7.
— tenuiflora Engelm. VI. 744. no. 4.
— Trifolii Babington. VI. 544. no. 3.
— urceolata Knze. VI. 744. no. 1.
— vulgivaga Engelm. VI. 745. no. 7.
Cuscuteae Choisy. VI. 543.
Cuspariеae DC. I. 499. V. 386.
Cuspidaria A. P. DC. *VI. 511.
Cuspidaria DC. I. 168. I. 170. no. 30. et 31.
Cussambium glabrum Ham. I. 421. no. 1.
— *pubescens* Ham. I. 421. no. 1.
Cussonia Thnbrg. II. 430. V. 925.
— calophylla Miquel. V. 925. no. 2.
— Kraussii Hochstett. V. 925. no. 1.
— Lessonii A. Rich. *II. 430. no. 2.
— paniculata Eckl. et Zeyh. II. 430. no. 1.
Cuttam Rheede. III. 578. no. 7.
Cuviera DC. *II. 489.
Cyamopsis DC. I. 759. II. 900.
— psoraleoides DC. *I. 759. no. 2. *II. 900. no. 1.
— Senegalensis Guill. et Perr. I. 759. no. 1.
Cyamus flavicomus Salisb. I. 105. no. 1.
— *luteus* Nutt. I. 105. no. 1.
Cyanaea Gaudich. *II. 708.
Cyananthus Wall. °VI. 388.
— barbatus Edgeworth. VI. 389. no. 4.
— integer Wall. VI. 388. no. 1.
— lobatus Wall. VI. 388. no. 2. *VI. 734.
— microphyllus Edgeworth. VI. 388. no. 3.

Cyanea DC. I. 106.
Cyanea Gaudich. *VI. 373.
Cyaneae DC. VI. 295.
Cyanitis sylvatica Reinw. II. 377. no. 2.
Cyanocephalus Pohl. III. 530.
Cyanopis Blume. *II. 541. II. 949. VI. 98.
— hypoleuca C. H. Schultz. VI. 98. no. 1.
— Leopoldi C. H. Schultz. II 949. no. 1.
Cyanoseris DC. VI 353. no. 4.
Cyanospermum Wght. et Arn. I. 790.
— albiflorum Wght. et Arn *I. 790. no. 1.
— tomentosum Wght. et Arn. *I. 790. no. 2.
Cyanothamnus Lindl. I. 503. V. 389.
— anethifolius Bartl. V. 389. no. 1.
— ramosus Lindl. I. 503. no. 1.
— tenuis Lindl. I. 503. no. 2.
Cyanus DC. VI. 295.
Cyathocline Cass. *II. 594. *II. 951. no. 4.
Cyathodes R. Br. *II. 731.
Cyathodiscus Hochstett. V. 410.
umbellatus Hochstett. V. 410. no. 1.
Cyathophora DC. VI. 157. no. 2.
Cybianthus Martius. VI. 451.
— angustifolius Alph. DC. *VI. 451. no. 1.
Cybistax Martius. *VI. 513.
Cyclachaena Fresen. II. 976. °VI. 155.
— xanthifolia Fresen. *II. 976. no. 1. VI. 155. no. 1.
Cyclamen Linn. VI. 445.
— deltoideum Tausch. VI. 445. no. 1.
— *Europaeum β. littorale* Rchb. VI. 445. no. 3.
— hastatum Tausch. VI. 445. no. 2.
— littorale Sadler. VI. 445. no. 3.
— macrophyllum Sieber. VI. 445. no. 4.
— macropus Zuccarini. VI. 742.
Cyclanthera Schrad. II. 203. V. 761.
— digitata Arn. *V. 762. no. 5.
— dissecta Arn. V. 762. no. 3.
— hystrix Arn. V. 762. no. 4.
— leptostachya Bth. V. 761. no. 1.
— Mathewsii Arn. *V. 662. no. 6.
— pedata Schrad. *II. 203. no. 1. V. 761. no. 2.
— *pedata* Schrad. II. 203. no. 1.
Cyclanthereae Endl. II. 203. V. 761.
Cyclogyne Bth. I. 672.
— canescens Bth. *I. 672. no. 1.
Cyclolepis Gill. et Don. *VI. 318.
Cyclolobium Bth. I. 792. V. 541.
— Blanchetianum Tulasne. V. 541. no. 1.
— Brasiliense Bth. I. 792 no. 1.
— Claussenii Bth. I. 792. no. 2.
Cyclomorium Wlprs. °II. 890.
— Caracasanum Wlprs. *II. 890. no. 1.
Cyclonema Hochstetter. IV. 101.
Cyclonema? hirsutum Hochstett. IV. 101. no. 4.
— myricoides Hochstett. IV. 101. no. 1.
— serratum Hochstett. IV. 101. no. 3.
— sylvaticum Hochstett. IV. 101. no. 2.
Cyclopappus Cass. *II. 952. no. 33.
Cyclophyllum Bnge. III. 409.
Cyclopia Vent. I. 564. II. 831.
— *brachypoda* Bth. I. 564. no. 3.
— cordifolia Bth. I. 564. no. 1.
— *cordifolia* Bth. II. 831. no. 1.
— genistoides DC. *I. 564. no. 9.
— *grandifolia* Alph. DC. II. 831. no. 2.
— *heterophylla* Eckl. et Zeyh. I. 564. no. 9.
— intermedia E. Mey. I. 564. no. 4.
— latifolia DC. *I. 564. no. 2. *II. 831. no. 1.
— *latifolia* Eckl. et Zeyh. I. 564. no. 5.
— *latifolia* E. Mey. II. 831. no. 2.
— laxiflora Bth. I. 564. no. 5.
— longifolia Vogel. I. 564. no. 6.
— Meyeriana Wlprs. I. 664. no. 10.
— pubescens Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 7.
— sessiliflora Eckl. et Zeyh. I. 564. no. 3.
— *sessiliflora* E. Meyer. I. 564. no. 10.
— *subternata* Vogel. I. 564. no. 2.
— tenuifolia Lehm. I. 564. no. 8.
— subternata Vogel. II. 831. no. 2.
— *teretifolia* Eckl. et Zeyh. I. 564. no. 9.
Cycloptychis E. Mey. II. 764.
— ....? E. Mey. II 764. no. 1.
Cyclospermum DC. (?) V. 849. no. 1.
Cyclostegia Bth. III. 583.
— *strobilifera* Bth. III. 583. no. 14.
Cyclostigma Hochstdtt. VI. 468.
— Natalense Hochstett. *VI. 468. no. 1.
Cycnium E. Mey. III. 306. °III. 967. *VI. 648.
— Adonense E. Mey. III. 306. no. 1.
— racemosum Bth. III. 306. no. 2.
Cycnopodium Naudin. °V. 723.
— latifolium Naudin. V. 723. no. 1.
Cycnoseris Endl. II. 686. °VI. 338.
— australis Endl. *II. 686. no. 1. *VI. 338. no. 1.
Cydonia Tournef. *II. 53.
Cylactis montana Raf. II. 23. no. 58.
Cylindraceae Pfeiff. (Opuntia) II. 352.
Cylindrocline Cass. *II. 599. *II. 955.
Cylindroclineae C. H. Schultz. II. 955.
Cylindrosorus Bth. *II. 644.
— *flavescens* Bth. VI. 329. no. 1.
Cylista Ait. *I. 790.
— *albiflora* Sims. I. 790. no. 1.
— *angustifolia* E. Mey. I. 790. no. 4.
— *argentea* Eckl. et Zeyh. I. 790. no. 3.
—? *ferruginea* Madr. Herb. I. 782. no. 2.

Cylista lancifolia Eckl. et Zeyh. I. 790. no. 1.
— *reticulata* Grah. I. 789. no. 39.
— *suaveolens* Grah. I. 789. no. 38.
— *tomentosa* Rxb. I. 790. no. 2.
Cymaria Bth. III. 931. °III. 992.
— dichotoma Bth. III. 931. no. 1.
— elongata Bth. III. 931. no. 2.
Cymbalaria Chavannes. III. 190. 451.
Cymbalaria Matth. III. 191. no. 9.
— *Elatine* Baumgrt. III. 193. no. 19.
— *flosculis purpurascentibus* J. Bauh. III. 191. no. 9.
— *hederacea* Grah. III. 191. no. 9.
— *Italica folio hederaceo* Lobel. III. 191. no. 9.
— *Matthioli* Dalech. III. 191. no. 9.
— *muralis* Bmgrtn. III. 191. no. 9.
— *spuria* Bmgrtn. III. 193 no. 18.
Cymbalariae DC. (Malva) I. 292.
Cymbaria Messerschm. III. 398. °III. 971. *VI. 653.
— Borysthenica Pallas. III. 398. no. 1.
— *Daurica pumila incana etc.* Amm. III. 399. no. 2.
— Davurica Linn. III. 399. no. 2.
Cymbia Torr. et Gr. II. 685.
Cymbocarpum DC. *II. 427.
Cymbochasma Endl. III. 398.
Cymbonotus Cass. *II. 666. VI. 276.
— Preissianus Steetz. VI. 276. no. 1.
Cymbosema Bth. I. 765. V. 434.
— roseum Bth. *I. 765. no. 1. V. 534. no. 1.
Cymburus mutabilis Salisb. IV. 7. no. 18.
— *urticifolius* Salisb. IV. 5. no. 7.
Cyminosma Gaertn. I. 523.
Cyminum minutum d'Urville. V. 850. no. 1.
Cymopterus Raf. II. 417.
— albiflorus Torr. et Gr. II. 418. no. 7.
— campestris Torr. et Gr. II. 418. no. 4.
— foeniculaceus Torr. et Gr. II. 418. no. 6.
— glaucus Nutt. II. 418. no. 3.
— glomeratus DC. II. 417. no. 1.
— montanus Torr. et Gr. II. 418. no. 2.
— terebinthinus Torr. et Gr. II. 418. no. 5.
— thapsoides Torr. et Gr. II. 418. no. 8.
Cynanchica DC. II. 941. VI. 22. 700. (no. 2.)
Cynanchum Linn. VI. 486.
— Abyssinicum Dcne. *VI. 486. no. 1.
— *fruticulosum* Dcne. VI. 483. no. 1. adn.
— *minus* C. Koch. VI. 483. no. 1.
Cynapium Nutt. II. 426. V. 922.
— *apiifolium* Nutt. II. 426. no. 1.
— apiifolium Nutt. *II. 426. no. 1. (c. varr. α. et β. ibid.) V. 922. no. 1.
— *nudicaule* Nutt. II. 426. no. 1. V. 922. no. 1. β.
Cynara Vaill. II. 673.
— alba Boiss. *II. 673. no. 1.
— *lamyroides* B. Webb. II. 673. no. 1.
— Tournefortii Boiss. et Reut. II. 673. no. 2.
Cynareae Lssng. II. 665. II. 992. VI. 273.
Cynaroides Boiss. VI. 300.
Cynocardamum Webb et Berthol. I. 157.
— Virginicum Webb et Berthel. *I. 157. no. 1.
Cynocephalus Plinii Dalech. III. 223. no. 6.
Cynoctonae Dcne. VI. 485.
Cynoctonum E. Mey. VI. 485.
— eurychiton Dcne. *VI. 485. no. 1.
— *molle* E. Mey. VI. 474. no. 1.
Cynogloseae A. P. DC. VI. 562.
Cynoglossum Tournef. *V. 563.
Cynometra L. I. 853. V. 573.
—? Americana Vogel. I. 853. no. 5.
— bauhiniaefolia Bth. I. 853. no. 1.
— crassifolia Bth. I. 853. no. 2.
— cuneata Tulasne. V. 573. no. 1.
— Hostmanniana Tulasne. V. 573. no. 2.
— marginata Bth. I. 853. no. 3.
— parvifolia Tulasne. V. 573. no. 3.
— racemosa Bth. I. 853. no. 4.
Cynometreae Bth. I. 853. V. 573.
Cynophalla DC. V. 54. no. 4.
Cynophallophora DC. I. 200. no. 35.
Cynorhiza Eckl. et Zeyh. II. 413.
—? alta Eckl et Zeyh. *II. 413. no. 3.
— montana Eckl. et Zeyh. II. 413. no. 2.
—? sulcata Eckl. et Zeyh. *II. 413.
— typica Eckl. et Zeyh. II. 413. no. 1.
Cynosciadium DC. *II. 401.
Cynthia Don. *VI. 328.
Cyphia Berg. *II. 711. *II. 713.
CYPHIACEAE Alph. DC. II. 711.
Cyphomandra Sendtner. °VI. 576.
— betacea Sendtner. VI. 577. no. 9.
— brachypodia Sendtner. VI. 577. no. 7.
— Cajanumensis Sendtner. VI. 579. no. 24.
— calycina Sendtner. VI. 577. no. 3.
— capsicoides Sendtner. VI. 579. no. 20.
— ciliata Sendtner. VI. 578. no. 16.
— coriacea Sendtner. VI. 579. no. 23.
— corymbiflora Sendtner. VI. 578. no. 10.
— crotonifolia Sendtner. VI. 579. no. 25.
— cylindrica Sendtner. VI. 578. no. 14.
— diploconos Sendtner. VI. 577. no. 4.
— divaricata Sendtner. VI. 577. no. 8.
γ. flexipes.
β. herbacea.
— elliptica Sendtner. VI. 578. no. 13.
— flagrans Sentner. VI. 579. no. 28.
— fragrans Sendtner. VI. 577. no. 5.
— Fraxinella Sendtner. VI. 578. no. 15.

Cyphomandra Hartwegi Sendtner. VI. 579. no. 22.
— lobata Sendtner. VI. 576. no. 2.
— Narensis Sendtner. VI. 579. no. 26.
— obliqua Sendtner. VI. 579. no. 18.
— pendula Sendtner. VI. 578. no. 17.
— sciadostylis Sendtner. VI. 577. no. 6.
— sycocarpa Sendtner. VI. 576. no. 1.
— Tejore Sendtner. VI. 579. no. 21.
— trachyphylla Sendtner. VI. 579. no. 27.
— Velloziana Sendtner. VI. 578. no. 11.
— velutina Sendtner. VI 578. no. 12.
— viridiflora Sendtner. VI. 579. no. 19.
Cypselea Turp. *II. 233.
Cypselodontia DC. *II. 601. *II. 954. no. 3.
Cyrbanthera connata Hamilt. III. 266. no. 2.
Cyrbasium Endl. I. 196.
— erosum Endl. I. 196. no. 1. (III. Emend. p. 1.)
— Jamesii Endl. I. 196. no. 2. (III. Emend. p. 1.)
Cyrilla Garden. °VI. 421.
— Antillana Michx. VI. 421. no. 2.
— *aquatica* Rxb. III. 273. no. 11.
— Caroliniana Michx. VI. 641. no. 1.
— *Indica* Koen. II. 362. no. 1.
— *oldenlandioides* Koen. II. 362. no 1.
— *racemiflora* Linn. VI. 421. no. 1.
— *spinosa* Spr. I. 255. no. 1.
— *viscosa* Koen. II. 362. no. 2.
Cyrilleae Torr. et Gr. VI. 421.
Cyrta Bth. III. 528.
Cyrtandra Forst. VI. 523.
— pendula Blume. *VI. 523. no. 1.
CYRTANDRACEAE W. Jack. VI. 520.
Cyrtandreae Blume. VI. 523.
Cyrtandreae Endl. VI. 520.
Cyrtocarpa H. B. Kth. I. 550.
— procera H. B. Kth. *I. 550. no. 1.
Cyrtoceras floribundum Maund et Henslow. VI. 494. no. 1.
Cyrtocodon Bth. III. 381.
Cyrtogyne Haw. II. 256.
— albiflora Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 1.
— Burmanniana Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 3.
— flava Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 2.
Cyrtolepis Lssng. *II. 634.
Cyrtonema Schrad. II. 195.
— digitata Schrad. II. 195. no. 2.
— latiloba Schrad. II. 195. no. 4.
— sphenoloba Schrad. II. 195. no. 3.
— triloba Schrad. II. 195. no. 1.
Cyrtophyllum Reinw. VI. 498.
— peregrinum Reinw. VI. 498. no. 1.
Cyrtorhyncha Nutt. I. 9.
— ranunculina Nutt. *I. 9. no. 1.
Cyrtotropis Wall. I. 770. V. 536.
— carnea Wall. *I. 770. no. 1. V. 536. no. 1.
Cystanche lutea Lnk. et Hffmsgg. III. 462. no. 21.
— *violacea* Lnk. et Hffmnsgg. III. 462. no. 22.
Cystanthe R. Br. *II. 733. VI. 741.
— sprengelioides R. Br. *VI. 741. no. 1.
Cysticapnos DC. *I. 122.
Cystidianthus campanulatus Hsskrl. VI. 493. no. 1.
Cytheraea dulcis Wght. et Arn. I. 556. †
Cytiso-Genista Armenia minima Tournef. V. 487. no. 58.
Cytiso-Genista Armeniaca minima Tournef. V. 487. no. 59.
Cytisoideae (Crotalaria) Bth. I. no. 623. V. 450.
Cytisoides Jaub. et Spach. II. 842.
Cytisopsis Jaub. et Spach. °V. no. 511.
— dorycniifolia Jaub. et Spach. V. 511. no. 1.
Cytisus L. I. 632. II. 845.
— Aeolicus Guss. I. 633. no. 8.
— *affinis* Boiss. I. 627. no. 5.
— affinis Prsl. I. 633. no. 4.
— Alschingeri Vis. I. 633. no. 2.
— *angulatus* Boiss. V. 506. no. 1.
— Arabicus Dcne. I. 633. no. 9.
— *Arabicus* Dcne. II. 843. no. 5.
— *arboreus* DC. I. 627. no. 4.
— *argenteus* L. I. 632. no. 17.
— *Boavista* Vell. I. 762. no. 3.
— *bicolor* DC. I. 683. no. 1. *β.*
— *Cajan* L. I. 783. no. 1. *a.*
— *calycinus* M. Bieb. I. 630 no. 2.
— *candicans β.* Lam. V. 402. no. 97.
— *candicans* Linn. V. 502. no. 95.
— candidus Prsl. I. 633. no. 6.
— chrysobotrys Fisch. II. 845. no. 2.
— chrysotrichus Boiss. II. 846. no. 8.
— *diffusus* Jcqum. II. 844. no. 8.
— *divaricatus* Sm. II. 839. no. 2.
— *elongatus β. multiflorus* DC. I. 634. no. 14.
— eriocarpus Boiss. II. 846. no. 7.
— flaccidus Bth. I. 633. no. 11.
— *flaccidus* Bth. II. 843. no. 8.
— Guineensis Schum. et Thonn. I. 633. no. 13. (cum var. *β.* ibid.)
— *heterophyllus* Lapeyr. V. 503.
— laburno-purpureus Hortor. I. 634. †
— *lanuginosus* Royle. I. 633. no. 11.
— *linifolius* Lam. V. 502. no. 101.
— Lobelii Tausch. I. 634. no. 16.
— *Malacitanus* Boiss. I. 627. no. 6.
— multiflorus Lindl. I. 633. no. 14.
— *nigricans* Linn. II. 846. no. 1. V. 510. no. 1.
— onustus Tausch. I. 634. no. 15.
— *orientalis* Lois. II. 841. no. 3.

Cytisus pallidus Poir. V. 502. no. 101. β.
— *paniculatus* Lois. V. 502. no. 98.
— parviflorus Boiss. II. 845. no. 3.
— *patens* L. I. 627. no. 1.
— *pauciflorus* Willd. I. 630. no. 2.
— pauciflorus Willd. I. 634. †
— *pentaphyllus* Slzm. I. 623. no. 2.
— pterocládos Boiss. II. 845. no. 4.
— *pterocládos* Boissier. V. 506. no. 2.
— *pubescens* Mnch. V. 502. no. 95.
— *radiatus* Koch. V. 462. no. 1.
— *ramosissimus* Poir. V. 502. no. 98.
— ramosissimus Ten. I. 633. no. 7.
— roseus Cambess. I. 633. no. 12.
— *roseus* Cambess. II. 844. no. 11.
— *sagittalis* Koch. V. 490. no. 67.
Cytisus Schimperianus Hochst. V. 510. no. 6.
— Symrnaeus Boiss. II. 846. no. 5.
β. prostratus Boiss.
— spinescens Prsl. I. 633. no. 5.
— *tener* Jcq. V. 502. no. 103.
— Tmoleus Boiss. II. 846. no. 6.
— *tomentosus* Andr. I. 630. no. I. V. 510. no. 4.
— tribracteolatus B. Webb. I. 632. no. 1.
— uniflorus Dcne. I. 633. no. 10.
— *uniflorus* Dcne. II. 843. no. 4.
— Weldenii Vis. I. 633. no. 3. *II. 845. no. 1.
Czernaevia Turczan. ° V. 870.
— conioselinum Turczan. *V. 870. no. 1.
— *laevigata* Turcz. II. 405. no. 2.
Czernjajewia conioselium Turzan. V. 870. no. 1.

D

Daboecia D. Don. *II. 729.
Dactylaena Schrad. *I. 195.
Dactylicapnos Wall. I. 118. V. 22.
— thalictrifolia Wall. I. 118. no. 1. V. 22. no. 1.
Dactyliota Blume. II. 143.
Dactyloides DC. (Saxifraga) II. 364. no. 16. II. 367. no. 41. V. 825. no. 7—8.
Daemia R. Br. *VI. 485.
Dahlia Cav. II. 602.
— Barkeriae Knwls. et Westsc. II. 602. no. 3.
— *glabrata* Lindl. II. 602. no. 2.
— Merkii Lehm. II. 602. no. 2.
— *minor* Visiani. II. 602. no. 2.
— scapigera Lnk. et Otto. II. 602. no. 1.
— variabilis Desf. var. excelsa Hensl. II. 602. †
Dais coccinea Gaudich. V. 410. no. 1.
— disperma Forst. V. 410. no. 5. adn.
— *dubiosa* Blume. V. 409. no. 2.
— *dubiosa* Dcne. V. 409. no. 3.
Dalbergia L. I. 799. II. 903. V. 545.
— acuminata Hsskarl. II. 903. no. 3.
— angustifolia Hasskarl. II. 903. no. 5.
— *arborea* Heyne. I. 799. no. 3.
— armata E. Mey. I. 800. no. 11.
— Barclayii Telfair. II. 800. no. 8.
— Brasiliensis Vogel. I. 800. no. 15.
— congesta Grah. I. 799. no. 2. (III. Emend. p. 4.)
Dalbergia densa Bth. II. 903. no. 2.
— frondosa Rxb. *I. 799. no. 3.
— *heterophylla* Willd. I. 798. no. 2.
— Luzoniensis Vogel. I. 800. no. 7.
— marginata Rxb. I. 800. †
— Melanoxylon Guill. et Perr. I. 800. no. 9.
— multijuga E. Mey. I. 800. no. 12.
— myriantha Meisn. V. 545. no. 1.
— obovata E. Mey. I. 800. no. 10.
— Oogeinensis Rxb. II. 903. †
— pendula Ten. II. 903. no. 1.
— pubinervis Spanoghe. I. 800. no. 6.
— purpurea Reinwrdt. II. 903. no. 6.
— reniformis Rxb. I. 800. †.
— rimosa Rxb. I. 800. †
— rostrata Hasskrl. II. 903. no. 4.
— *scandens* Rxb. I. 798. no. 1.
— sissooides Grah. I. 799. no. 1.
— spinosa Rxb. I. 799. no. 4. (III. Emend. p. 4.)
— stipulacea Rxb. I. 800. †.
— tamarindifolia Rxb. I. 800. †
— tomentosa Vogel. I. 800. no. 14.
— variabilis Vogel. I. 800. no. 13. (c. var. β.)
— venusta Zipp. I. 800. no. 5.
Dalbergieae Bth. I. 792. II. 902. V. 541.
Dalea L. I. 652. II. 855. V. 513.
— ....? Bth. V. 513. no. 6.
— agastachya Moric. V. 513. no. 1.

Dalea Alopecurus Moric. I. 653. no. 12.
— argyrostachys Hook. et Arn. I. 654. no. 20.
— aristata Bth. I. 654. no. 21.
— canescens Bth. V. 513. no. 5.
— canescens Mart. et Galeotti. II. 855. no. 4.
— comosa Schlchtd. I. 653. no. 14.
— crenulata Hook. et Arn. I. 654. no. 21.
— cylindrica Hook. I. 652. no. 3.
— diffusa Moric. I. 652. no. 7.
— divaricata Bth. V. 513. no. 4.
— Ehrenbergii Schlchtd. I. 653. no. 15.
— elata Hook. et Arn. I. 654. no. 19.
— elata Mart. et Galeotti. II. 855. no. 3.
— elegans Gill. I. 652. no. 4.
— flava Mart. et Galeotti. II. 855. no. 1.
— formosa Torr. I. 652. no. 2.
— gracilis Hook. et Arn. I. 554. no. 22.
— humifusa Bth. V. 513. no. 7.
— Jamesii Torr. et Gr. I. 654. no. 25. (III. Emend. p. 3.)
— *Lagopus* Willd. II. 855. no. 3.
— lanuginosa Nutt. I. 652. no. 1.
— lasiostachya Bth. I. 654. no. 23.
— laxiflora Schlchtd. I. 653. no. 17.
— leucostoma Schlchtd. I. 653. no. 18.
— *longipes* Fl. Mex. I. 653. no. 12.
— *Lippiastrum* Grtnr. IV. 43. no. 3. IV. 169. no. 6.
— macrostachya Moric. I. 652. no. 6.
— nigra Mart. et Galeotti. II. 855. no. 5.
— penicillata Moric. V. 513. no. 2.
— polyphylla Mart. et Galeotti. II. 856. no. 6.
— psoraleoides Moric. I. 652. no. 5.
— pulchella Moric. I. 653. no. 11.
— pyramidalis Schlchtd. I. 653. no. 16.
— ramosissima Bth. V. 513. no. 3.
— ramosissima Mart. et Galeotti. II. 855. no. 2.
— thymoides Schlchtd. et Cham. I. 653. no. 10.
— trifoliolata Moric. I. 654. no. 26.
— *trifoliata* Zucc. I. 654. no. 27.
— uncifera Schlchtd. et Cham. I. 653. no. 9.
— verbenacea Schlchtd. et Cham. I. 652. no. 8.
— versicolor Zuccar. I. 653. no. 13.
— Zuccarinii Wlprs. I. 654. no. 27.
Dalenia Krthls. °V. 715.
— speciosa Krthls. V. 715. no. 1.
Dalhousiea Wall. I. 566.
— bracteata Wall. *I. 566. no. 1.
Dalibarda L. II. 13.
— calycina DC. II. 13. †
— *fragarioides* Michx. *II. 46. no. 2.
— geoides Pers. *II. 13. no. 4.
— latifolia Blume. II. 13. no. 2.
— lobata Baldw. II. 13. no. 3. †
Dalibarda lobata Baldw. II. 46. no. 3.
— *pedata* Steph. II. 23. no. 57.
— pyrifolia Blume. II. 13. no. 1.
Dalibardeae Torr. et Gr. II. 13. V. 619.
Damatris Cass. *II. 701. no. 11.
Damine Endl. V. 119.
Dammara Dampier. II. 162. no. 1. II. 930. no. 8.
— *Selanica* Rmph. V. 128. no. 3.
Damnacanthus Gaertn. *II. 485.
Dampiera R. Br. II. 712. VI. 389.
— alata Lindl. II. 712. no. 3.
— azurea Vriese. VI. 389. no. 2.
— coronata Lindl. II. 712. no. 2.
— diversifolia Vriese. VI. 390. no. 11.
— epiphylloidea Vriese. VI. 390. no. 8.
— erecta Vriese. VI. 389. no. 5.
— eriophora Vriese. VI. 389. no. 3.
— inundata Vriese. VI. 390. no. 13.
— lavandulacea Lindl. II. 712. no. 4.
— Lindleyi Vriese. VI. 390. no. 7.
— Preissii Vriese. VI. 390. no. 10.
— prostrata Vriese. VI. 390. no. 12.
— repanda Vriese. VI. 389. no. 1.
— subverticillata Vriese. VI. 390. no. 9.
— teres Lindl. II. 712. no. 5.
— trigona Vriese. VI. 389. no. 4.
— trialata Vriese. VI. 389. no. 6.
— triloba Lindl. II. 712. no. 1.
Danaïs Commers. *II. 508.
Daphne monostachya Willd. II. 803. no. 1.
— *polystachya* Willd. II. 803. no. 1.
Dargeria linifolia Dcne. III. 388. no. 3.
— *pinnatifida* Dcne. III. 387. no. 2.
Darlingtonia DC. I. 864. V. 584. (ex. p.)
— *brachyloba* DC. I. 864. no. 7.
— *glandulosa* DC. I. 864. no. 7.
— *pratorum* Mcfd. I. 864. no. 8.
Dartus Lour. III. 124. °III. 956.
— Perlarius Lour. III. 124. no. 1.
Darwinia Rdge. II. 153. °V. 729.
— fascicularis Rdge. II. 153. no. 1.
— *flavescens* A. Cunn. II. 154. no. 1.
— *intermedia* All. Cunn. II. 154. no. 2.
— laxifolia All. Cunn. II. 154. no. 2.
Dasyanthera Prsl. I. 205.
— Luzoniensis Prsl. *I. 205. no. 1.
Dasycarpae Trautvett. (Isatis) V. 44.
Dasycephalae (Cordia) DC. VI. 554. no. 7.
Dasyloma DC. II. 401.
— Benghalense DC. *II. 401. no. 2.
— latifolium Lindl. II. 401. no. 1.
Dasymalla Endl. IV. 139.
— axillaris Endl. IV. 139. no. 1.
— terminalis Endl. IV. 139. no. 2.
Dasynema Schott. I. 352. II. 798. V. 115.

Dasynema alnifolium Mart. I. 352. no. 2.
— cuneifolium Mart. I. 352 no. 3.
— laurifolium Bth. I. 352. no. 4.
— obtusum Splitgerber. II. 798. no. 2.
— pubescens Poepp. et Endl. V. 116. no. 2.
— riparium Gardn. II. 798. no. 1.
— salicifolium Endl. *I. 352. no. 1. V. 115. no. 1.
Dasyphyllum H. B. Kth. *II. 678. *VI. 312.
Dasystemon DC. *II. 252.
Dasystoma Rafin. VI. 649.
— laciniatum Wlprs. VI 649. no. 1.
Datura Linn. III. 15. °III. 954. VI. 573.
— *Aegyptica* Vest. III. 17. no. 13. β.
— alba N. ab E. III. 17. no. 12.
— *arborea* Hortor. VI. 573. no. 2.
— arborea Linn. III. 15. no. 1.
— Bojeri Delile. III. 16. no. 9.
— Capensis Hort. III. 16. no. 7.
— ceratocaula Ortega. III. 18. no. 15.
— *Chinensis spinosissima* Zen. III. 16. no. 6.
— *Contarena* Prosp. Alp. III. 17. no. 13. β.
— cornigera Hook. VI. 573. no. 1.
— discolor Bernhardi. III. 15. no. 4.
— *dubia* Pers. III. 17. no. 13. α.
— erinacea Arrabida *III. 18.
— *fastuosa* Linn. III. 17. no. 13. β.
— *fastuosa δ. capsulis muticis* Poir. III. 17. no. 13. α.
— *fastuosa flore albo* Dop. III. 17. no. 12.
— ferox Linn. III. 16. no. 6.
— *ferox, pomo crassioribus aculeis robustioribus* Herm. III. 16. no. 6.
— *frutescens* Hortor. VI. 573. no. 1.
— *fruticosa* Hornem. III. 18. no. 14.
— Gardneri Hook. VI. 573. no. 2.
— *Guyaquilensis* H. B. Kth. III. 18. no. 14.
— *humilis* Dsf. 17. no. 12.
— Hummatu Bernhardi. III. 17. no. 13. III. 933.
α. dubia Bernh.
β. fastuosa Bernh.
δ. parviflora Bernh.
γ. rubra Bernh.
— *Hummatu δ. muricata* Bernh. III. 17. no. 12.
— *hybrida* Ten. III. 17. no. 12.
— inermis Jcq. III. 16. no. 5.
— *innoxia* Mill. III. 17. no. 12.
— *laevis* Linn. III. 16. no. 5.
— *laevis* Schkhr. III. 17. no. 12.
— *loricata* Sieb. III. 16. no. 7.
— *macrocaulis* Rth. III. 18. no. 15
— Metel Linn. III. 18. no. 14.
— *Metel* Mill. III. 17. no. 12.
— *Metel* Rxb. III. 17. no 12.
— *muricata* Bernhardi. III. 17. no. 12.
Datura Pseudostramonium Sieb. III. 16. no. 7.
— quercifolia H. B. Kth. III. 16. no. 11.
— sanguinea Rz. et Pav. III. 15. no. 3.
— *sarmentosa* Lam. III. 18. no. 1.
— *sarmentosa β.* Lam. III. 18. no. 2.
— Stramonium Linn. III. 16. no. 7.
β. Chalybea Koch.
— *Stramonium β. canescens* Walt. III. 16. no. 6.
— *Stramonium* L. *β. chalybea* Koch. III. 16. no. 10.
— *Stramonium* Wall. III. 16. no. 8.
— suaveolens Humb. et Bonpl. III. 15. no. 2.
— *Tatula* Linn. III. 16. no. 7.
— Tatula Linn. III. 16. no. 10.
— *Tatula β.* Poir. III. 17. no. 13. α.
— trapezia N. ab E. III. 16. no. 8.
— *Turcarum* Bessl. III. 16. no. 7.
— Wagmanni Steud. *III. 18.
— *Wagmanni* Steudel. III. 933.
Datureae G. Don. III. 15. VI. 573.
Datureae Endl. III. 954.
Datureae Miers. VI. 567.
Daubentonia DC. *I. 681.
Daucineae Koch. II. 419. V. 899.
Daucophyllum Nutt. II. 427.
Daucus Tournef. II. 419. II. 939. V. 899.
— Abyssinicus C. A. Mey. II. 939. no. 1.
— *alatus* Poir. V. 897. no. 2.
— brachylobus Boiss. II. 419. no. 3.
— *Carota* L. *var. Abyssinica* Al. Braun. II. 939. no. 1.
— coadunatus Ten. II. 419. no. 2.
— *crinitus* Boiss. II. 419. no. 3.
— gracilis Steinbl. II. 419. no. 4.
— heterocarpus Boiss. V. 899. no. 3.
— *involucratus* Sibthrp.? II. 419. no. 2.
— leptocarpus Hochstett. V. 899. no. 1.
— *melananthus* Hochstett. V. 896. no. 1.
— *microphyllus* Prsl. II. 419. no. 5. β.
— Persicus Boiss. V. 899. no. 2.
— *polygamus β. maximus* Auct. II. 419. no. 2.
— pusillus Michx. *II. 419. no. 5.
β. microphyllus.
γ. scaber.
— *scaber* Nutt. II. 419. no. 5. γ.
— speciosus Cesati. II. 419. no. 1.
Daviesia Sm. I. 569. II. 832. V. 427.
— acicularis Sm. *I. 570. no. 5. I. 571. †
— alternifolia Endl. I. 570. no. 13.
— angulata Bth. I. 570. no. 17.
— Benthamii Meisn. V. 427. no. 2.
— brachyphylla Meisn. V. 427. no. 4.
— brevifolia Lindl. II. 832. no. 2.
— chordophylla Meisn. V. 427. no. 3.

Daviesia coluteoides A. Cunn. I. 570. no. 3.
— daphnoides Meisn. V. 428. no. 11.
— decurrens Lindl. V. 428. no. 7.
— divaricata Bth. I. 570. no. 9.
— Drummondii Meisn. V. 428. no. 10.
— flexuosa Bth. I. 570. no. 11.
— genistaefolia A. Cunn. I. 570. no. 2.
— hakeoides Meisn. V. 427. no. 1.
γ. gracilenta.
β. intermedia.
α. robusta.
— horrida Preiss. V. 428. no. 12.
— *humifusa* Sieb. I. 566. no. 3.
— longifolia Bth. I. 571 no. 21.
— macrophylla Endl. I. 570. no. 12.
— nudiflora Meisn. V. 428. no. 9.
— oppositifolia Endl. I. 570. no. 15.
— paniculata Bth. I. 570. no. 10.
— pectinata Lindl. II. 832. no. 1.
— pedunculata Bth. I. 571. no. 20.
— physodes A. Cunn. I. 570. no. 4.
— polyphylla Bth. I. 570. no. 18.
— Preissii Meisn. V. 428. no. 5.
— prionodes Meisn. V. 428. no. 8.
— pubigera Cunn. I. 570. no. 6.
— *pungens* R. Cunn. I. 570. no. 5.
— quadrilatera Bth. I. 571. no. 19.
— ramulosa Bth. I. 570. no. 16.
— *ramulosa* Bth. V. 425. no. 3.
— rhombifolia Meisn. V. 429. no. 13.
— ruscifolia Cunn. I. 570. no. 7.
— spinosissima Meisn. V. 428. no. 6.
— ternata Endl. I. 570. no. 14.
— ulicina Sm. V. 429. †
— *umbellata* Sieb. I. 566. no. 3.
— villifera Cunn. I. 570. no. 8.
— virgata All. Cunn. I. 569. no. 1.
Davilla Vellozo. I. 66. II. 746. V. 13.
— angustifolia St. Hil. I. 66. no. 9.
— asperrima Splitg. II. 746. no. 1.
— *Brasiliana* DC. I. 66. no. 8.
— castaneaefolia St. Hil. I. 66. no. 7.
— ciliata A. Rich. I. 66. no. 4.
— elliptica St. Hil. I. 66. no. 6.
— flexuosa St. Hil. I. 66. no. 5.
— grandiflora St. Hil. I. 67. no. 14.
— Itaparicensis Casaretto. V. 13. no. 2.
— lacunosa Mart. I. 67. no. 13.
— latifolia Casaretto. V. 13. no. 1.
— lucida Prsl. I. 66. no. 1.
— *macrophylla* St. Hil. I. 67. no. 12.
— multiflora St. Hil. *I. 67. no. 12.
— ovata Prsl. I. 66. no. 2.
— rugosa Poir. *I. 66. no. 8.
— Sagraeana A. Rich. I. 66. no. 3.
— Sellowiana Schlchtd. I. 66. no. 11.
Davilla Surinamensis Miquel. V. 13. no. 3.
— tintinnabulata Schlchtd. I. 66. no. 10.
Davya DC. II. 118. II. 917. V. 680.
— *calophylla* Cham. II. 118. no. 1.
— calophylla Cham. II. 917. no. 1.
— Claussenii Naudin. V. 680. no. 1.
— excelsa Gardn. V. 680. no. 2.
— macrophylla Bth. V. 681. no. 3.
— paniculata DC. *II. 118. no. 1.
Decachaeta DC. *II. 551. VI. 705.
— conferta Gardn. VI. 706. no. 2.
— longifolia Gardn. VI. 705. no. 1.
Decadenia Ehrnbrg. II. 115.
Decadia aluminosa Lour. I. 367. no. 3.
Decalepis Wght. et Arn. *VI. 480.
Decaloba DC. II. 219. V. 771.
Decaloba Endl. II. 219.
Decanema Dcne. VI. 486.
— Bojerianum Dcne. *VI. 486. no. 1.
Decaneurum DC. *II. 541.
Decaneurum DC. II. 948. VI. 98.
Decaneurum C. H. Schultz. °VI. 192.
— *amygdalinum* DC. II. 948. no. 2.
— *Dendigulense* DC. II. 948. no. 8.
— *divergens* DC. II. 948. no. 13.
— *fimbrilliferum* DC. II. 948. no. 11.
— *frutescens* DC. II. 948. no. 3.
— *glabrum* DC. II. 948. no. 6.
— *grande* DC. II. 948. no. 10.
— *molle* C. H. Schultz. II. 948. no. 5.
— *obovatum* DC. II. 948. no. 9.
— *phyllonaeum* DC. II. 949. no. 14.
— *reticulatum* DC. II. 948. no. 4.
— *scariosum* DC. II. 949. no. 15.
— *Senegalense* DC. II. 948. no. 12.
— serotinum C. H. Schultz. VI. 192. no. 1.
— *Silhetense* DC. II. 948. no. 7.
Decanthera Bth. I. 546. no. 1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 19. 20.
Decarhaphe Miq. II. 146. V. 718.
— floribunda Miq. V. 718. no. 2.
— Fockeana Miq. *II. 146. no. 1. V. 718. no. 3.
— Hostmanni Steudel. V. 718. no. 1.
Decaschistia Wght. et Arn. I. 312.
— crotonifolia Wght. et Arn. *I. 312. no. 1.
— trilobata Wght. et Arn. I. 312. no. 2.
Decaspora R. Br. *II. 732. VI. 741.
— Cunninghamii DC. *VI. 741. no. 1. †
Declieuxia H. B. Kth. II. 483. VI. 46.
— coerulea Gardn. VI. 46. no. 2.
— Galeottii Martens. VI. 46. no. 1.
— juniperina St. Hil. II. 483. no. 3.
— *latifolia* Hochst. II. 941. no. 1.
— muscosa St. Hil. II. 483. no. 2.
— prunelloides Kltzsch. II. 483. no. 1.

Declieuxia prunelloides Kltzsch. II. 911. no. 1. VI. 35. no. 1.
Declinata DC. (Helichrysum) DC. VI. 239. no. 2.
Decodon Gmel. II. 102.
Decostea Rz. et Pav. II. 436.
— scandens Rz. et Pav. *II. 436. no. 1.
Decumaria Linn. *II. 151.
Decussatae Bth. (Veronica) VI. 648. no. 7.
Deguelia Aubl. *I. 805.
Dejanira Cham. et Schlchtd. * VI. 500.
Deidamia Pet. Th. *II. 218.
— *Thomsoniana* DC. II. 218. no. 1.
Deilosma DC. II. 760. no. 2. V. 38. no. 1.
Deinboellia Schum. et Thonn. V. 371.
— pinnata Schum. et Thonn. V. 371. no. 1.
Dekinia Mart. et Galeotti. ° VI. 682.
— coccinea Mart. et Galeotti. VI. 682. no. 1.
Delairea odorata Lemaire. VI. 264. no. 43.
Delastrea Alph. DC. VI. 456. (nec *Delastria* Tulasne).
Delima L. I. 67.
— castaneaefolia Don I. 67. no. 3.
— frangulaefolia Prsl. I. 67. no. 1.
— intermedia Blume. I. 67. no. 2.
— sarmentosa L. I. 67. †
Delimeae DC. I. 65. II. 746. V. 13.
Delissea Gaudich. *II. 708. VI. 373.
— clermontioides Gaudich. * VI. 373. no. 1.
— Kunthiana Gaudich. * VI. 373. no. 2.
Delisseaceae Prsl. VI. 372.
Delisseae Prsl. II. 708.
Deloderium DC. VI. 345.
Delostoma D. Don. * VI. 513.
— *latifolium* Splitgrbr. VI. 514. no. 1.
Delphinastrum DC. I. 54. II. 744. no. 11. 12. 14.—17.
Delphinellum DC. II. 744. no. 9.
Delphinium L. I. 51. II. 743. V. 6.
— *aconiti* Hohenack. I. 53. no. 19.
— aconiti L. I. 56. †
— Ajacis L. I. 56. †
β. consolidatum Notaris. II. 743. no. 1.
— *albiflorum* DC. V. 6. no. 2. *α.*
— *alpinum* W. et K. I. 55. no. 37.
— alpinum W. et K. I. 57. †
— altissimum Wall. I. 54. no. 26.
— anthoroideum Boiss. I. 53. no. 19.
— Aucheri Boiss. I. 52. no. 11.
— *azureum* DC. I. 55. no. 41.
— azureum Michx. *I. 55. no. 41.
ε. minute puberulum Torr. et Gr.
β. ochroleucum Nutt.
γ. puberulum Torr. et Gr.
δ. velutinum Torr. et Gr.
— Barlowii Paxtou. V. 7. †
Delphinium bicolor Nutt. I. 56. no. 44. (III. Emend. p. 1.)
— Bovei Dcne. I. 52. no. 6.
— brachycentrum Ldb. I. 54. no. 25.
— Brunonianum Royle. I. 55. no. 33.
— Californicum Torr. et Gr. I. 55. no. 38. (III. Emend. p. 1.)
— camptocarpum Fisch. et Mey. II. 743. no. 4.
β. Soongaricum Kar. et Kir. II. 744. no. 4.
— Cappadocicum Boiss. I. 53. no. 17.
— Carela Hamilt. I. 55. no. 35.
— *Carolinianum* Walt. I. 55. no. 41.
— Carumnae Lapeyr. II. 744. no. 8.
— Cashmerianum Royle. I. 54. no. 30.
— Caucasicum C. A. Meyer. I. 54. no. 22.
— Chamissonis Pritz. II. 744. no. 12.
— cinereum Boiss. II. 744. no. 9.
— coeruleum Jacquem. I. 54. no. 27.
— *Consolida?* Hamilt. I. 55. no. 36.
— Consolida L. I. 56. †
— crassicaule Ldb. I. 54. no. 23.
— crassifolium Schrad. I. 54. no. 24.
— dasyanthum Kar. et Kir. II. 745. no. 14.
— dasycaulon Fresen. I. 52. no. 8.
— decorum Fisch. et Mey. I. 56. no. 46.
— depauperatum Nutt. I. 56. no. 47.
— *divaricatum* Ldb. I. 52. no. 4.
— divaricatum Ldb. II. 744. no. 5.
— emarginatum Prsl. II. 744. no. 7.
— *exaltatum* H. et Arn. I. 55. no. 38.
— exaltatum Prsh. *I. 55. no. 37.
— fissum W. et K. I. 57. †
— *fissum* W. et K. V. 6. no. 2. *β.*
— Forskâlii Rchb. I. 52. no. 7.
— *gracile* DC. I. 51. no. 1. *γ.*
— *gracile* Moris. I. 51. no. 1. *α.*
— *grandiflorum* Forsk. I. 52. no. 7.
— *grandiflorum β.* Hook. et Arn. I. 55. no. 43.
— grandiflorum L. *α.* *β.* et *γ.* I. 56. †
— Hellesponticum Boiss. I. 53. no. 15.
— *hybridum* Rchb. V. 6. no. 2. *α.*
— hybridum Steph. V. 6. no. 2.
δ. dasyanthum Lallem. V. 7. no. 2.
β. fissum Lallem. V. 6. no. 2.
α. orientale Lallem. V. 6. no. 2.
γ. velutinum Lallem. V. 6. no. 2.
— Jacquemontianum Cambess. I. 54. no. 28.
— incanum Clarke. II. 743. no. 2.
— incanum Royle. I. 54. no. 29.
— intermedium Ait. I. 57. †
— intermedium DC. *I. 52. no. 5.
γ. coerulescens Lindl.
β. pallidum Lindl.
δ. palmatifidum Lindl.
ε. sapphirinum Lindl.
— *junceum* DC. I. 51. no. 1. *γ.*

Delphinium junceum DC. I. 57. †
β. cinerascens Friv. I. 51. no. 3.
— *junceum* Juss. V. 6. no. 1.
— Kurdicum Boiss. II. 745. no. 16.
— laxiflorum DC. I. 56. †
— lepidum Fisch. et Lallem. II. 745. no. 17. V. 7. no. 3.
— linarioides Boiss. I. 53. no. 18.
— *longipes* Moris. I. 51. no. 1. *β.*
— longipes Moris. V. 6. no. 1.
— Menziesii DC. *I. 55. no. 40.
— *Menziesii* DC. I. 56. no. 45.
— micranthum Boiss. II. 745. no. 15.
— montanum DC. I. 56. † I. 57. †
— nudicaule Torr. et Gr. I. 56. no. 48.
— Nuttalianum? Pritzel. II. 744. no. 13.
— *ochroleucum* Stev. V. 6. no. 2. *α.*
— officinale Wendrth. I. 56. no. 49.
— olopetalum Boiss. I. 53. no. 13.
— ornatum C. Bouché. II. 743. no. 3.
— *palmatifidum* DC. I. 52. no. 5. *δ.*
— parviflorum Turcz. II. 744. no. 11.
— pauciflorum Don. I. 55. no. 36.
— pauciflorum Nutt. I. 56. no. 45. *II. 744. no. 13.
— *pauciflorum* Rchb. II. 744. no. 12.
— penicillatum Boiss. I. 53. no. 20.
— *peregrinum* Guss. V. 6. no. 1.
— peregrinum L. *I. 51. no. 1. I. 57. †
α. confertum } Boiss. I. 51. no. 1.
γ. elongatum } Boiss. I. 51. no. 1.
β. longipes } Boiss. I. 51. no. 1.
— *peregrinum* Sibthrp. I. 51. no. 1. *α.*
— Persicum Boiss. I. 52. no. 10.
— Phrygium Boiss. I. 53. no. 12.
— pictum DC. I. 56. †
— *pubescens* Henning. I. 52. no. 4.
— puniceum Pall. I. 56. †
— *puniceum* Pall. V. 6. no. 2. *α.*
— pyramidale Royle. I. 55. no. 34.
— Ravegi Boiss. II. 744. no. 6.
— rectivenium Royle. I. 55. no. 32.
— rugulosum Boiss. I. 52. no. 9.
— *sarcophyllum* Hook. et Arn. I. 56. no. 48.
— *scabriflorum* Don. I. 55. no. 35.
— *simplex* Hook. I. 55. no. 40.
— Sinense Fisch. V. 7. †
— speciosum DC. I. 56. †
— staphisagria L. I. 57. †
— tenuissimum Sibthrp. et Sm. *I. 51. no. 4.
— tomentosum Boiss. I. 53. no. 14.
— tricorne Michx. *I. 55. no. 39.
— *tridactylum* Michx. I. 55. no. 37.
— trigonelloides Boiss. I. 53. no. 16.
— triste Fisch. I. 56. †
— tuberosum Auch. I. 54. no. 21.
Delphinium urceolatum Jcq. I. 55. no. 37.
— variegatum Torr. et Gr. I. 55. no. 43. (III. Emend. p. 1.)
— velutinum Bert. I. 51. no. 2.
— *velutinum* Bertol. V. 6. no. 2. *γ.*
— *velutinum β. orientale* DC. V. 7. no. 2. *δ.*
— *Verdunense* Balb. II. 744. no. 8.
— vestitum Wall. I. 55. no. 31.
— vimineum Don. I. 55. no. 42. I. 56. no. 50. *II. 744. no. 10.
Delucia DC. *II. 623.
Demidium DC. *II. 648.
Democritea DC. *II. 464.
Dendranthema C. H. Schultz. (Tanacetum) VI. 225.
Dendrarabis DC. I. 131.
Dendrobrychis DC. I. 747.
Dendrolobium Wght. et Arn. I. 737.
Dendromecon Bth. I. 116.
— rigidum Bth. *I. 116. no. 1.
Dendromene DC. II. 385.
Dendropemon Blume. II. 439.
Dendrophlomis Bth. III. 882.
Dendrophthoë Mart. II. 440.
Dendroseris Hook. et Arn. *II. 700.
Dendrospartum Spach. °V. 504.
— Aetnense Spach. *V. 505. no. 1.
Denekia Thnbg. *II. 600. *II. 952. no. 1.
Denekieae C. H. Schultz. II. 952.
Denhamia Meisn. I. 203.
— obscura Meisn. *I. 203. no. 1.
Dentaria Tournef. I. 138.
— *angulata* Nutt. I. 136. no. 18.
— *aphyllos* Ray. III. 479. no. 1.
— bipinnata C. A. Mey. I. 138. no. 6.
— *buguloides, radice globosa etc.* Mentz. III. 436. no. 1.
— bulbifera L. I. 139. †
— Californica Nutt. I. 138. no. 12.
— canescens Ten. I. 138. no. 1.
— *concatenata* Michx. I. 138. no. 7.
— digitata L. I. 139. †
— *dissecta* Leavenw. I. 138. no. 8.
— enneaphyllos L. I. 138. †
— glandulosa W. K. I. 138. †
— Gmelini Tausch. I. 138. no. 4.
— heptaphyllos Clus. I. 139. †
— integrifolia Nutt. I. 138. no. 11.
— laciniata Mühlbg. *I. 138. no. 7. (c. var. *α. β. γ.* et *δ.*)
— leucantha Tausch. I. 138. no. 3.
— macrocarpa Nutt. I. 138. no. 10.
— multifida Mühlbg. I. 138. no. 8.
— pentaphyllos L. I. 138. †
— polyphyllos W. K. I. 139. †
— tenella Prsh. *I. 138. no. 9.

Dentaria tenuifolia Ldb. I. 138. no. 9.
— trifolia W. K. I. 138. †
— Wallichii Don. I. 138. no. 5.
— Willdenowii Tausch. I. 138. no. 2.
Dentariae seu Anblato Cordi affinis etc. Gronow. III. 480. no. 1.
Dentella Forst. *II. 491.
— *bifida* Ham. II. 525. no. 1.
—? *geminota* Ham. II. 503. no. 9.
Dentidia Nankinensis Lour. III. 212. no. 53.
Deppea Cham. et Schlchtd. II. 469.
— hedyotidea Cham. et Schlchtd. *II. 469. no. 1.
Derderia Jaub. et Spach. °VI. 290.
— macrocephala Jaub. et Spach. VI. 290. no. 1.
Dermophylla Silva Manso. °V. 764.
— pendulina Silva Manso. *V. 764. no. 1.
Derris Lour. *I. 805.
Descarainia pinnatifida Webb. I. 130. no. 5.
Descurea DC. I. 164. I. 166. no. 31.
Desfontainia Rz. et Pav. III. 125. °III. 956.
— parvifolia D. Don. III. 125. no. 2.
— spinosa Rz. et Pav. III. 125. no. 1.
— *spinosa* Rz. III. 125. no. 2.
— *splendens* Humb. et Bonpl. III. 125. no. 1.
Desfontainieae Endl. III. 125. III. 956.
Desmanthus Bth. I. 864. °V. 584.
Desmanthus DC. (ex p.) I. 863. 864. V. 584.
Desmanthus Lour. (ex p.) I. 863.
— acinaciformis Spanoghe. I. 864. no. 9.
— *acinaciformis* Spanoghe. V. 583. no. 5.
— acuminatus Bth. I. 864. no. 4.
— brachylobus Bth. I. 864. no. 7.
— depressus Kth. *I. 864. no. 3.
— *diffusus* W.? I. 864. no. 3.
— *divergens* Willd. I. 863. no. 3.
— Jamesii Torr. et Gr. I. 864. no. 6.
— *lacustris* Willd. I. 868. no. 1. V. 583. no. 1.
— leptolobus Torr. et Gr. I. 864. no. 1.
— *leptophyllus* H. B. Kth. I. 864. no. 2.
— leptostachys DC. I. 863. no. 3.
— *natans* Willd. V. 583. no. 1.
— *nutans* DC. I. 863. no. 3.
— *nutans* Willd. I. 863. no. 1.
— *plenus* Willd. I. 863. no. 2. V. 583. no. 2.
— *polyphyllus* DC. I. 863. no. 2. V. 583. no. 2.
— *punctatus* Willd. I. 863. no. 2. V. 583. no. 2.
— reticulatus Bth. I. 864. no. 5.
— *stolonifer* DC. I. 863. no. 1. V. 583. no. 1.
— *strictus* Bertol. I. 864. no. 2.
— *trichostachys* DC. I. 863. no. 3.
— *triqueter* Willd. I. 863. no. 4. V. 583. no. 3.
Desmanthus trispermus Spanoghe. V. 583. no. 5.
— virgatus Willd. *I. 864. no. 2.
Desmocarpus missionis Wall. I. 196. no. 1.
Desmocephalum Hook. fil. °VI. 310.
Desmodium DC. I. 736. II. 890. V. 525.
Desmodium Wght. et Arn. I. 738.
— adhaesivum Schlchtd. I. 742. no. 47.
— affine Schlchtd. I. 741. no. 45.
— *Aikianum* Beck. I. 740. no. 30.
— *angulatum* DC. I. 739. no. 21.
— ascendens β. coeruleum DC. I. 744. †
— Barclayi Bth. V. 527. no. 11.
— brachystachyum Schlchtd. I. 743. no. 54.
— *bracteosum* DC. I. 740. no. 32.
— brevipes Vogel. I. 743. no. 62.
— Bullamense C. Don. II. 890. no. 1.
— *caespitosum*? DC. I. 736. no. 1.
— Caffrum Eckl. et Zeyh. I. 737. no. 10.
— Canadense DC. I. 744. †
— canescens DC. *I. 740. no. 30.
— *capitatum* DC. I. 739. no. 21.
— cateniferum Arn. I. 738. no. 20.
— cephalotes Wall. I. 737. no. 13. II. 891. † (III. Emend. p. 4.)
— Chamissonis Vogel. I. 744. no. 69.
— ciliare DC. *I. 740. no. 35. (c. var. β. et γ. ibid.)
— collinum DC. I. 744. †
— *collinum* Wall. I. 738. no. 14. *α.*
— congestum Wall. I. 737. no. 12.
— cuneatum Hook. I. 743. no. 58.
— cuspidatum Torr. et Gr. *I. 740. no. 32.
— deltoideum Schum. et Thonn. I. 737. no. 6.
— *dichotomum* DC. I. 738. no. 18.
— diffusum DC. *I. 738. no. 18.
— *diffusum* DC. II. 891. no. 8.
— Dillenii Darlingt. *I. 740. no. 31.
— discolor Vogel. I. 743. no. 65.
— diversifolium Schlchtd. I. 742. no. 46.
— dubium Lindl. I. 744. †
— elegans Schlchtd. I. 742. no. 53.
— ellipticum Mcfd. I. 743. no. 56.
— *ferrugineum* Wall. I. 736. no. 2.
— floribundum G. Don. II. 891. no. 11.
— formosum Vogel. I. 740. no. 28.
— fruticulosum Schum. et Thonn. I. 737. no. 8.
— Gangeticum DC. *I. 738. no. 15.
— glaucescens Miquel. V. 526. no. 7.
— gracile Mart. et Galeotti. V. 526. no. 5.
— grande E. Mey. I. 737. no. 11.
— granulatum Schum. et Thonn. I. 737. no. 7.
— *gyrans* DC. II. 891. no. 1.

Desmodium gyrans L. I. 744. †
— *heterocarpum* DC. I. 739. no. 21.
— *heterophyllum* DC. I. 740. no. 29. α.
— heterophyllum Hook. et Arn. I. 741. no. 41.
— *Hippocrepis* DC. I. 739. no. 21.
— hirsutum Mart. et Galeotti. V. 525. no. 1.
— hirtum Guill. et Perr. I. 736. no. 2.
— humifusum Beck. I. 741. no. 38.
— lagopodioides Endl. *I. 744. no. 72. (III. Emend. p. 4.)
— lanceolatum Schum. et Thonn. I. 737. no. 5.
— latifolium DC. *I. 738. no. 14.
γ. Plukenetii.
β. Telfairii.
— leiocarpum G. Don. *I. 743. no. 63.
— Limense Hook. I. 743. no. 59.
— *Lindleyi* Mart. I. 744. †
— linearifolium G. Don. II. 890. no. 2.
— lineatum Spanoghe. I. 739. no. 25.
— lupulinum Schlchtd. I. 742. no. 50.
— *maculatum* DC. I. 738. no. 15.
— Marylandicum Boott. *I. 740. no. 34.
— *Marylandicum* DC. I. 740. no. 31.
— molle Bth. V. 527. no. 10.
— nervosum Vogel. I. 739. no. 26.
— nitidum Mart. et Galeotti. V. 525. no. 3.
— obovatum Vogel. I. 744. no. 67.
— *obtusum* DC. I. 740. no. 34. I. 740. no. 35. β.
— orbiculare Schlchtd. I. 741. no. 44.
— *orbiculatum* Wall. I. 736. no. 4.
— ovalifolium Guill. et Perr. I. 736. no. 1.
— ovalifolium Schum. et Thonn. I. 737. no. 4.
— oxalidifolium G. Don. II. 890. no. 4.
— pachyrhiza Vogel. I. 741. no. 39.
— paleaceum Guill. et Perr. I. 637. no. 3.
— parviflorum Mart. et Galeotti. V. 525. no. 1.
— patens Wght. II. 891. †
— pendulum Wall. I. 739. no. 23.
— physocarpos Vogel. I. 744. no. 66.
— pictum Schum. et Thonn. I. 737. no. 9.
— plicatum Schlchtd. et Cham. I. 741. no. 42.
— podocarpum Hook. et Arn. I. 743. no. 55.
— polycarpum DC. *I. 739. no. 21. II. 891. †
— prehensile Schlchtd. I. 742. no. 48.
— psilophyllum Schlchtd. I. 741. no. 40.
— *punctatum* DC. I. 786. no. 3.
— *purpureum* Hook. et Arn. I. 739. no. 21.
— quinquangulatum DC. I. 744. †
— radicans Mcfd. I. 743. no. 57.
— ramosissimum G. Don. II. 891. no. 5.
— recurvatum Grah. I. 738. no. 18. (III. Emend. p. 4.)
— recurvatum Ham. II. 891. †
— retinens Schlchtd. I. 741. no. 43.
Desmodium retroflexum DC. I. 736. no. 4.
— retusum G. Don. II. 891. non. 10.
— *robustum* E. Mey. I. 736. no. 1.
— Rottleri G. Don. II. 891. no. 9.
— *rotundifolium* Wall. I. 736. no. 4.
— *Roxburghii* DC. I. 738. no. 14. α.
— *Roxburghii* Wall. I. 738. no. 18.
— rubiginosum Bth. I. 744. no. 68.
— *rufescens* DC. I. 736. no. 2.
— *Sambuense* DC. I. 736. no. 1.
— sequax Wall. I. 737. no. 24.
— sericophyllum Schlchtd. I. 742. no. 51.
— *serpens* Wall. I. 739. no. 21.
— sessilifolium Torr. et Gr. I. 740. no. 36
— *setigerum* E. Mey. I. 736. no. 2.
— *siliquosum* DC. I. 739. no. 21.
— simplex G. Don. II. 890. no. 3.
— Sinclairi Bth. V. 526. no. 9.
— sparsiflorum G. Don. II. 891. no. 6.
— spectabile Miquel. V. 526. no. 8.
— *squarrosum* Eckl. et Zeyh. I. 784. no. 6.
— *stipulaceum* Burm. I. 740. no. 29. β.
— strangulatum Wght. et Arn. I. 739. no. 22. (III. Emend. p. 4.)
— *striatum* DC. I. 748. no. 10.
— strobilaceum Schlchtd. I. 742. no. 49.
β. acutifolium Mart. et Galeotti. V. 526. no. 6.
— subsecundum Vogel. I. 743. no. 61.
— subsessile Schlchtd. I. 742. no. 52.
— sylvaticum Bth. V. 525. no. 4.
— tenue G. Don. II. 891. no. 7.
— *tenue* Grah. I. 739. no. 21.
— tenuifolium Torr. et Gr. I. 740. no. 37. (III. Emend. p. 4.)
— tiliaefolium G. Don. II. 891. no. 12.
— triflorum DC. *I. 740. no. 29. (III. Emendand. p. 4.)
α. majus Wght.
β. minus Wght.
γ. villosum Wght.
— tuberculatum Endl. *I. 744. no. 71.
— varians Endl. *I. 744. no. 70.
— venosum Vogel. I. 743. no. 64.
— violaceum G. Don. II. 891. no. 13.
— viride Vogel. I. 739. no. 27.
— viridiflorum Beck. I. 740. no. 33.
— *viridiflorum* DC. I. 740. no. 30.
— *viscidum* DC. I. 783. no. 1.
— Walkerii Arn. I. 738. no. 17.
— Wightii Grah. I. 738. no. 16. (III. Emend. p. 4.)
— Willdenowii G. Don. II. 891. no. 8.
Desmophyllum pinnatum B. Webb et Berthelot. I. 518. no. 4.
Desmos Chinensis Lour. I. 77. no. 16.

Destrugesia Gaudich. V. 55.
— scabrida Gaudich. *V. 55. no. 1.
Detarium Juss. I. 854.
— microcarpum Guill. et Perr. I. 854. no. 2.
— Senegalense Gmel. *I. 854. no. 1.
Dethawia Endl. *II. 403.
Detris DC. II. 966. no. 5.
Deutzia Thnbrg. II. 151.
— Brunoniana R. Br. II. 152. no. 6.
— corymbosa R. Br. II. 152. no. 5.
— crenata Siebld. et Zucc. II. 152. no. 7.
— gracilis Siebld. et Zucc. II. 152. no. 8.
— grandiflora Bnge. II. 152. no. 2.
— parviflora Bnge. II. 152. no. 3.
— scabra Thnbrg. *II. 151. no. 1.
— staminea R. Br. II. 152. no. 4.
Deverra DC. II. 401.
— *aphylla β. Burchellii* DC. II. 401. no. 1.
— Burchellii Eckl. et Zeyh. *II. 401. no. 1.
Deweya Torr. et Gr. II. 427. V. 922.
— arguta Torr. et Gr. *II. 427. no. 1. V. 922. no. 1.
Diacantha Lssng. *II. 678. *VI. 312.
Diacanthae (Acacia) Bth. I. 913.
Diadema Bth. V. 625.
Diadonta cf. Diodonta.
Dialesta H. B. Kth. *II. 542.
Dialium L. I. 854.
— Indum L. *I. 854. no. 1.
— *Javanicum* Burm. I. 854. no. 1.
— nitidum Guill. et Perr. I. 854. no. 2.
Diamorpha Nutt. *II. 264.
Diamorpheae Endl. II. 264. V. 807.
Diamoste Cham. III. 268.
Diantheae Kth. I. 266. II. 771. V. 77.
Dianthoseris C. H. Schultz. VI. 367.
— Rüppellii C. H. Schultz. *VI. 367. no. 2.
— Schimperi C. H. Schultz. *VI. 367. no. 1.
Dianthus L. I. 266. II. 771. V. 77.
— Abyssinicus R. Br.? V. 77. no. 1.
— acicularis Fisch. II. 773. no. 14.
— actinopetalus Fnzl. I. 269. no. 26.
— acuminatus Tausch. I. 266. no. 2.
— aggregatus Poir. I. 269. †
— alpinus L. I. 270. †
— Anatolicus Boiss. II. 772. no. 8.
— angulatus Royle. I. 269. no. 32.
— arboreus L. I. 270. †
— arenarius L. I. 270. †
— Armeria L. I. 270. †
— *Arrostii γ.* Prsl. I. 267. no. 8.
— asper Schl. I. 270. †
— atrorubens All. I. 270. †
— *attenuatus* Xatard. I. 267. no. 14.
— axilliflorus Fnzl. I. 268. no. 22.
— Balbisii Ser. I. 270. †
Dianthus barbatus L. I. 270. †
— bicolor M. B. I. 270. †
— Bisignani Ten. I. 267. no. 9.
— brachyanthus Boiss. I. 267. no. 14. β. Ruscinonensis Boiss.
— brevicaulis Fnzl. I. 268. no. 24.
— brevifolius Friv. I. 268. no. 18.
— campestris M. B. I. 270. †
— canescens C. Koch. I. 269. no. 27.
— capitatus Pall. I. 270. †
— carthusianorum L. I. 270. †
— Caucasicus M. B. I. 270. †
— ciliatus Guss. I. 266. no. 6.
— collinus Wlr. I. 270. †
— compactus Kit. I. 270. †
— Cous Boiss. II. 771. no. 5.
— Cyri Fisch. et Mey. I. 269. no. 29.
— deltoideus L. I. 270. †
— dentosus Fitch. I. 270. †
— diutinus Kit. I. 270. †
— elatus Ledeb. I. 269. no. 28.
— elongatus C. A. Meyer. I. 269. no. 31.
— erinaceus Boiss. II. 771. no. 6.
— ferrugineus L. I. 270. †
— Fischeri Spr. I. 270. †
— foliosus Turczan. I. 269. no. 30.
— giganteus d'Urv. I. 270. †
— glaucophyllus Colla. I. 269. no. 33.
— glaucophyllus Hornem. I. 270. †
— glaucus Willd. I. 270. †
— glumaceus Bory et Chaub. I. 267. no. 12
— graminifolius Prsl. I. 267. no. 8.
— guttatus M. B. I. 270. †
— inclusus C. Koch. I. 268. no. 19.
— lanceolatus Stev. I. 270. †
— lancifolius Tausch. I. 266. no. 4.
— laricifolius Boiss. et Reut. I. 267. no. 17.
— latifolius Willd. I. 270. †
— Libanotis Labill. I. 270. †
— Liburnicus Bartl. I. 270. †
— lineolatus Delile. I. 268. no. 21.
— longicaulis Ten. I. 270. †
— longiglumis Delile. V. 77. no. 1.
— Lydus Boiss. II. 771. no. 4.
— macranthus Boiss. II. 772. no. 11.
— macrolepis Boiss. II. 771. no. 1.
— Marsicus Ten. I. 267. no. 10.
— microlepis Boiss. II. 772. no. 9.
— *Monspeliacus* Ten. I. 267. no. 10.
— montanus M. B. I. 270. †
— nodosus Tausch. I. 266. no. 3.
— obcordatus Reuter. I. 267. no. 11.
— Olympicus Boiss. II. 771. no. 3.
— parviflorus Boiss. II. 772. no. 7.
— pavonius Tausch. I. 266. no. 1.
— polymorphus M. B. I. 270. †

Dianthus Ponticus Whlnbrg. I. 268. no. 20.
— prolifer Linn. *II. 773. no. 15.
— pseudarmeria M. B. I. 270. †
— pubescens Sm. I. 270. †
— *pungens* Gay. I. 267. no. 14.
— ramosissimus Poir. I. 270. †
— recticaulis Ledeb. *II. 773. no. 17.
— sanguineus Vis. I. 270. †
— Saxifraga Linn. *II. 773. no. 16.
— Schraderi Rchb. I. 269. no. 34.
— Seguieri Vill. I. 270. †
— serrulatus Desf. β. barbatus Boiss. I. 267. no. 15.
— Sinaïcus Boiss. II. 772. no. 10.
— *spinosus* Desf. I. 282. no. 2. II. 785. no. 2.
— stenocephalus Boiss. II. 771. no. 2.
— *Sternbergii* Schleich. I. 267. no. 10.
— striatellus Fnzl. I. 268. no. 23.
— suaveolens Spr. I. 270. †
— *subacaulis* Vill. I. 267. no. 14.
— Tataricus Fisch. I. 270. †
— *Tauscheri* Eversm. II. 773. no. 14.
— Toletanus Boiss. et Reut. I. 267. no. 16.
— vaginatus Vill. I. 270. †
— velutinus Guss. I. 266. no. 5.
— versicolor Fisch. I. 270. †
— *virgineus* Koch. I. 267. no. 14.
— viridescens Vis. II. 772. no. 13.
— viscidus Bory et Chaub. I. 267. no. 13.
— vulturius Guss. et Ten. I. 267. no. 7.
— Webbianus Parol. II. 772. no. 12.
— zonatus Fnzl. I. 268. no. 25.
Diaperia Nutt. II. 599. *II. 955. no. 1. VI. 139.
— multicaulis Nutt. *II. 599. no. 2.
— *multicaulis* Nutt. VI. 139. no. 1.
— prolifera Nutt. *II. 599. no. 1. VI. 139 no. 1.
Diaphoranthus fuscus Meyen. VI. 321. no. 1.
Diascia Lnk. et Otto. III. 180. °III. 958. *VI. 636.
— *Bergiana* Hb. union. itin. III. 180. no. 3.
— Bergiana Lnk. et Otto. III. 180. no. 7.
— capsularis Bth. III. 181. no. 14.
— cuneata E. Mey. III. 180. no. 6.
— denticulata Bth. III. 181. no. 16.
— diffusa Bth. III. 180. no. 2.
— elongata Bth. III. 180. no. 3.
  β. parviflora.
— heterandra Bth. III. 180. no. 1.
— integerrima E. Mey. III. 181. no. 17.
— macrophylla Bth. III. 181. no. 10.
— *montana* Spr. III. 179. no. 2.
— pachyceras E. Mey. III. 180. no. 4.
— racemulosa Bth. 181. no. 13.
— rigescens E. Mey. III. 181. no. 15.
  β. angustifolia.
Diascia runcinata E. Mey. III. 180. no. 5.
— tanyceras E. Mey. III. 180. no. 9.
— Thunbergiana Spr. III. 180. no. 8.
Diaspasis R. Br. *II. 712. *VI. 390.
Diastema Bth. °VI. 402.
— comiferum Bth. *VI. 403. no. 6.
— divaricatum Bth. *VI. 403. no. 12.
— erinoides Bth. *VI. 403. no. 5.
— incisum Bth. VI. 402. no. 4.
— longiflorum Bth. VI. 402. no. 3.
— maculatum Bth. *VI. 403. no. 7.
— molle Bth. *VI. 403. no. 10.
— ochroleucum Hook. VI. 402. no. 2.
— racemiferum Bth. VI. 402. no. 1.
— scabrum Bth. *VI. 403. no. 8.
— tenerrimum Bth. *VI. 403. no. 11.
— urticaefolium Bth. *VI. 403. no. 9.
Diastrophis Fisch. et Mey. I. 158.
— cristata Fisch. et Mey. *158. no. 1.
— *cristata* F. et M. I. 179. no. 8.
Diatonta Nutt. cf. Diodonta Nutt.
Diatonta Nutt. cf. *Diodonta* Nutt.
Diazeuxis Don. *VI. 317.
— *latifolia* Don. VI. 317. no. 1.
Dibrachium Tulasne. °V. 550.
— Brasiliense Tulasne. °V. 550. no. 1.
— Guianense Tulasne. V. 550. no. 2.
Dibrachya Sweet. I. 457.
— clypeata Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 102.
— peltata Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 100.
— scutata Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 101.
Dicalyx Lour. I. 367.
— acuminatus Blume. I. 368. no. 10.
— aluminosus Blume. I. 367. no. 3.
— ciliatus Blume. I. 368. no. 9.
— costatus Blume. I. 367. no. 4.
— Javanicus Blume. I. 367. no. 5.
— odoratissimus Blume. I. 367. no. 2.
— Salaccensis Blume. I. 367. no. 6.
— sessilifolius Blume. I. 368. no. 7.
— spicatus Blume. I. 368. no. 8.
— tinctorius Blume. I. 367. no. 1.
Dicella Griseb. °V. 195.
— *bracteosa* Griseb. V. 196. no. 2.
— holosericea Adr. Juss. V. 195. no. 1.
  β. argentea.
— lancifolia Adr. Juss. V. 196. no. 3.
— macroptera Adr. Juss. V. 196. no. 4.
— ovatifolia Adr. Juss. V. 195. no. 2.
Dicentra Bernh. I. 118. V. 23.
— Canadensis DC. *I. 118. no. 5.
— chrysantha Hook. et Arn. I. 118. no. 8.
— cucullaria DC. *I. 118. no. 4.
— *eximia* DC. I. 118. no. 6.
— formosa DC. *I. 118. no. 6.
— lachenaliaeflora DC. *I. 118. no. 2.

Dicentra saccata Nutt. *I. 118. no. 7.
— scandens Wlprs. I. 118. no. 3.
— *scandens* Wlprs. V. 23. no. 3.
— tenuifolia Ledeb. *I. 118. no. 1.
Dicentreae Endl. I. 118. V. 22.
Dicera dentata Forst. V. 121. no. 1.
—? *serrata* Forst. V. 121. no. 1.
Dicerandra Bth. III. 745. °III. 984.
— linearis Bth. III. 745. no. 1.
Diceratium canescens Boiss. I. 124. no. 3.
— *floccosum* Boiss. I. 124. no. 2.
Dicerma DC. *I. 744. II. 892.
— biarticulatum DC. *II. 892. no. 1.
— pulchellum DC. *II. 892. no. 2.
Diceros Lour. III. 436. °III. 973. *VI. 654.
— *angustifolius* Bth. III. 296. no. 2.
— caespitosus Blume. III. 437. no. 5.
— Cochinchinensis Lour. III. 436. no. 1.
— glanduliferus Blume. III. 437. no. 4.
— latifolius Blume. III 437. no. 2.
— *longifolius* Pers. III. 296. no. 3.
— montanus Blume. III. 437. no. 3.
Dichaeta Nutt. II. 628.
— tenella Nutt. II. 628. no. 1.
— uliginosa Nutt. II. 628. no. 2.
Dichaetanthera Endl. II. 137.
— articulata Endl. *II. 137. no. 1.
Dichilus DC. I. 608. V. 454.
— *candicans* E. Mey. I. 618. no. 1.
— *ciliatus* E. Mey. V. 510. no. 4.
— *ciliatus* Spr. I. 630. no. 1.
— *crassifolius* E. Mey. I. 631. no. 6.
— gracilis Eckl. et Zeyh. I. 608. no. 1.
— *lanceolatus* E. Mey. I. 632. no. 19.
— *obovatus* E. Mey. I. 632. no. 16.
— *patens* E. Mey. I. 608. no. 1.
— pusillus Bth. V. 454. no. 1.
— *sericeus* Spr. I. 630. no. 2.
— *spicatus* E. Mey. I. 618. no. 7. γ.
— strictus E. Mey. I. 608. no. 2.
Dichoglottis Fisch. et Mey. II. 773.
Dichoglottis Fisch. et Mey. °V. 78.
— bellidifolia Wlprs. *V. 78. no. 4.
— floribunda Wlprs. *V. 78. no. 7.
— frankenioides Wlprs. *V. 78. no. 1.
— hispida Wlprs *V. 78. no. 3.
— *linearifolia* Fisch. et Mey. II. 774. no. 7. β. V. 78. no. 6.
— muralis Jaub. et Spach. *V. 79. no. 9.
— Scovitsii Wlprs. *V. 78. no. 6.
 α. glabrata V. 78. no. 6.
 β. glandulosa V. 78. no. 6.
— *spathulaefolia* Fisch. et Mey. II. 774. no. 9.
— trichopoda Wlprs. *V. 78. no. 2.
— tubulosa Jaub. et Spach. V. 79. no. 10.
— tubulosa Wlprs. *V. 78. no. 5.
Dichondra Forsk. *VI. 543.
— *cymbalariaefolia* Willd. III. 334. no. 2.
Dichondreae Choisy. VI. 543.
Dichoropetalum Fnzl. II. 406. *V. 872.
— alpinum Fnzl. *II. 406. no. 1.
Dichosema Bth. I. 576. V. 433.
— racemosum Meisn. V. 433. no. 2.
— spinosum Bth. *I. 576. no. 1. V. 433. no. 3.
— subinerme Meisn. V. 433. no. 1.
Dichosma bifida G. Don. I. 511. no. 13.
Dichroanthus cinereus B. Webb et Berth. I. 125. no. 5.
— *mutabilis* B. Webb et Berthel. I. 125. no. 4.
— *scoparius* B. Webb et Berth. I. 125. no 6.
Dichrocephala DC. *II. 594. *II. 951. no. 2.
Dichroma Cav. III. 373.
— *coccineum* Cav. III. 374. no. 4.
Dichrostachys DC. I. 863. °V. 582.
— Caffra Meisn. *I. 863. no. 5.
— cinerea Wght. et Arn. I. 863. no. 2. *V. 582. no. 1.
— Forbesii Bth. I. 863. no. 4.
— macrostachya Wlprs. V. 583. no. 2.
— nutans Bth. I. 863. no. 3.
— tenuifolia Bth. I. 863. no. 1.
Diclidostigma Knze. °V. 760.
— melothrioides Knze. V. 760. no. 1.
Diclis Bth. III. 185. °III. 959. *VI. 637.
— ovata Bth. III. 185. no. 1.
— reptans Bth. III. 185. no. 2.
Diclytra DC. I. 118.
— *cucullaria* DC. I. 118. no. 4.
— *eximia* Beck. I. 118. no. 5.
— *scandens* Don. I. 118. no. 3. V. 23.
— *spectabilis* DC. V. 23. no. 1.
— *tenuifolia* DC. I. 118. no 1.
— *thalictrifolia* Don. I. 118. no. 1.
Dicoma Cass. *II. 680. *VI. 318.
Dicorynia Bth. I. 840. V. 562.
— Paraënsis Bth. *I. 840. no. 1. V. 562. no. 1.
Dicoryphe Pet. Th. *II. 431.
Dicrananthera Prsl. II. 124. V. 688.
— hedyotidea Prsl. *II. 124. no. 1. V. 688. no. 1.
Dicranostylis Bth. °VI. 528.
— scandens Bth. VI. 528. no. 1.
Dictamneae Bartl. I. 517.
Dictamnus L. I. 517.
— angustifolius G. Don. I. 517. no. 1.
— fraxinellus Pers. *I. 517. no. 3.
 β. obtusiflorus Koch.
— Himalayensis Royle. I. 517. no. 2.
Dictyaloma DC. I. 519.
— Vandelliana G. Don. I. 519. no. 1.
Dictyanthus Dene. *VI. 490.
Dictyocalyx Hook. fil. °VI. 572.

Dictyocalyx multivalvis Hook. fil. *VI. 572. no. 2.
— quadrivalvis Hook. fil. *VI. 572. no. 1.
Dictyopetalum Fisch. et Mey. II. 89.
Dicyclophora Boiss. °V. 910.
— Persica Boiss. V. 911. no. 1.
Didelta Lssng. *II. 666.
Didesmus Desvx. *I. 189.
Didiscus DC. II. 384.
— humilis I. D. Hook. II. 384. no. 1.
— pilosus Bth. II. 385. no. 2.
Didymeria Lindl. °V. 390.
— aemula Lindl. *V. 390. no. 1.
Didymocarpeae Don. VI. 520.
Didymocarpeae dubiae VI. 523.
Didymocarpus Wall. *VI. 522.
Didymocheton Blume. I. 431. V. 374.
— Gaudichaudianum A. Juss. I. 431. no. 3.
— Lechenaultianum A. Juss. I. 431. no. 2.
—? littorale Hsskrl. V. 374. no. 1.
— nutans Blume. I. 431. no. 1. (c. var. β. ibid.)
Didymotoce Endl. II. 494.
Dierbachia Spr. III. 122.
— *solanacea* Spr. III. 122. no. 1. VI. 629. no. 1.
Diervilla Tournef. II. 447.
— *Coraënsis* DC. II. 447. no. 1.
— floribunda Siebld. et Zucc. II. 447. no. 3.
— florida Siebld. et Zucc. II. 447. no. 4.
— *florida* Siebld. et Zucc. II. 450. no. 2.
— grandiflora Siebld. *II. 447. no. 1.
— hortensis Siebld. et Zucc. II. 447. no. 2.
— *Japonica* DC. II. 447. no. 5.
— versicolor Siebld. et Zucc. *II. 447. no. 5.
Diesingia Endl. I. 782.
— scandens Endl. *I. 782. no. 1.
Dieteria Nutt. II. 586. *II. 952. no. 5.
— canescens Nutt. II. 587. no. 5.
— coronopifolia Nutt. II. 587. no. 8.
— divaricata Nutt. II. 586. no. 3.
— incana Torr. et Gr. II. 586. no. 4.
— pulverulenta Nutt. II. 587. no. 6.
— sessiliflora Nutt. II. 586. no. 1.
— spinulosa Nutt. *II. 587. no. 7.
— *spinulosa* Nutt. II. 968. no. 2.
— viscosa Nutt. II. 586. no. 2.
Dieterica paniculata Ser. II. 375. no. 1.
Diffusae (Crotalaria) Bth. I. 590. no. 66. 67. V. 436.
Digitaleae Bth. III 240. III. 961. VI. 664.
Digitalis G. Don. III. 254.
Digitalis Lindley. III. 254.
Digitalis L. VI. 646. (ex p.)
Digitalis Tournef. III. 254. °III. 962. VI. 647.
— *acanthoides Canariensis frutescens, flore aureo* Comm. III. 260. no. 25.
— *alba* Lobel. III. 255. no. 1. β.
Digitalis ambigua Lindl. III. 256. no. 6. β.
— ambigua Lindl. III. 257. no. 7.
— *ambigua* Murr. III. 256. no. 6. α.
— *ambigua* Strm. III. 256. no. 6. α.
— *ambiguo-lutea* Meyer. III. 256. no. 7.
— *angustifolia Hispanica* Bocc. III. 260. no. 24.
— *angustifolia lutea* Bauh. III. 257. no. 8.
— aurea Lindl. III. 258. no. 15.
— Canariensis Linn. III. 260. no. 25.
— *Chinensis* Lour. III. 265. no. 2.
—? Cochinchinensis Lour. III. 261. no. 32.
— *dasyantha* Pall. III. 250. no. 53.
— denticulata Tausch. III. 261. no. 31.
— eriostachys Hort. Neapol. *III. 262.
— *erubescens* Dryand. III. 256. no. 5.
— ferruginea Linn. III. 258. no. 14.
β. parviflora Lindl.
— *ferruginea* Sbthrp. et Sm. III. 258. no. 15.
— *ferruginea* β. Lam. III. 259. no. 17.
— *flore ferrugineo* Rivin. III. 258. no. 14.
— *flore incarnato* Bessl. III. 255. no. 1.
— *flore luteo* Bessl. III. 256. no. 6. α.
— *flore pallido transparente etc.* Banist. III. 245. no. 22.
— *flore rubro* Bessl. III. 255. no. 2. β.
— *fucata* Ehrh. III. 257. no. 8. γ.
— fulva Lindl. III. 257. no. 10.
— fuscescens Waldst. et Kit. III. 257. no. 11.
— fusco-punctata Tausch. III. 261. no. 29.
— *glutinosa* Grtnr. III. 254. no. 1.
— grandiflora Lam. III. 256. no. 6.
α. acutiflora Koch.
β. obtusiflora Koch.
— *grandiflora* Rchb. III. 256. no. 6. α.
— *Hispanica angustifolia, flore nigricante* Tournef. III. 260. no. 24.
— *Hispanica purpurea minor* Tournef. III. 255. no. 2.
— *hybrida* Salv. III. 256. no. 5.
— *intermedia* Lapeyr. III. 256. no. 5.
— *intermedia* Pers. III. 256. no. 7.
— laciniata Lindl. III. 257. no. 9.
— laevigata Waldst. et Kit. III. 258. no. 12.
— lanata Ehrh. III. 259. no. 17.
— *lanato- (laevigato-) ambigua* Mey. III. 258. no. 11.
— *latifolia, flore ferrugineo* Moris. III. 258. no. 15.
— leucophaea Sm. III. 258. no. 16.
— Libertiana Dumort. III. 261. no. 27.
— Lindleyana Tausch. III. 261. no. 28.
— *longiflora* Lej. III. 256. no. 5.
— lutea Linn. III. 257. no. 8.
γ. fucata Lindl.
β. micrantha Lindl.

Digitalis lutea Tabern. III. 256. no. 6. *a.*
— *lutea γ. hybrida* Lindl. III. 256. no. 5.
— *lutea parva* Lob. III. 257. no. 8.
— lutescens Lindl. III. 260. no. 23.
— Mariana Boiss. III. 255. no. 3.
— *Mariana Persicae folio* Ray. III. 240. no. 2.
— *maxima ferruginea* Park. III. 258. no. 15.
— media Rth. III. 256. no. 7.
— *media flore luteo rubente* Park. III. 257. no. 10.
— *micrantha* Elm. III. 257. no. 8. *β.*
— micrantha Bth. III. 259. no. 20.
— Milleri G. Don. III. 261. no. 34.
— minor Linn. III. 256. no. 4.
β. minima Lindl.
— Nevadensis Knze. VI. 647. no. 1.
— *nova* Winterl. III. 259. no. 17.
— obscura Linn. III. 260. no. 24.
— *obscuro-ferruginea* Koelr. III. 257. no. 10.
— *ochroleuca* Jcq. III. 256. no. 6. *a.*
— *ochroleuca* Lindl. III. 256. no. 6. *a.*
— *ochroleuca* Rchb. III. 256. no. 6. *β.*
β. fuscescens Lindl. III. 258. no. 11.
— *orientalis* Elm. III. 259. no. 17.
— orientalis Lam. III. 259. no. 18.
— *orientalis* Mill. III. 261. no. 34.
— *orientalis, Tragopogi folio, flore albido* Tournef. III. 259. no. 18.
— *parviflora* All. III. 257. no. 8.
— parviflora Jcq. III. 259. no. 19.
— *perfoliata glabra, flore violaceo minore* Moris. III. 245. no. 21.
— *purpurascens* Lej. III. 261. no. 27.
— *purpurascens* Lindl. III. 261. no. 28.
— purpurascens Rth. III. 256. no. 5. III. 261. adn.
— *purpurea* Boiss. VI. 647. no. 1.
purpurea Linn. III. 254. no. 1. VI. 647. no. 2.
β. floribus albis Linn. III. 255. no. 1.
var. hortensis superba Paxton. III. 938.
— *purpurea var.* Kniphf. III. 256. no. 6. *a.*
— *purpurea* Tabern. III. 255. no. 2. *β.*
— *purpurea folio aspero* Moris. III. 255. no. 1.
— purpureo-lutea J. S. Henslow. *III. 262.
— *purpureo-lutea* Mey. III. 256. no. 5.
— rigida Lindl. III. 260. no. 22.
— sceptrum Linn. III. 260. no. 26.
— Sibirica Mill. III. 258. no. 13.
—? Sinensis Lour. III. 261. no. 33.
— *stricta* Rxb. III. 391. no. 3.
— Thapsi Linn. III. 255. no. 2.
β. intermedia Lindl.
— *tomentosa* Lk. et Hffmnsgg. III. 255. no. 2. *β.*
Digitalis tubulosa Tausch. III. 261. no. 30.
— *verbascifolia* Bocc. III. 255. no. 21.
— viridiflora Lindl. III. 259. no. 21.
— *Winterli* Rth. III. 259. no. 17.
Digitatae DC. (Indigofera) I. 663.
Diglottis Nees et Mart. *I. 500.
Digomphia Bth. *VI. 640.
— laurifolia Bth. VI. 640. no. 1.
Dileptium DC. I. 178. II. 762. no. 2. V. 42. no. 3. et 4.
Dillenia L. I. 63. II. 746.
— *angusta* Rxb. I. 63. no. 3.
— bracteata R. Wght. II. 746. no. 1.
— *elliptica* Thbg. I. 63. no. 1.
— *Indica* L. I. 63. no. 1.
— ornata Wall. I. 63. no. 2.
— *racemosa* Ham. I. 368. no. 2.
— *scabrella* Don. I. 63. no. 2.
— speciosa Thbg. *I. 63. no. 1.
DILLENIACEAE DC. I. 63. II. 746. V. 8.
Dillenieae DC. I. 63. II. 746. V. 8.
Dillwynia Sm. I. 572. II. 832. V. 430.
— adenophora Endl. I. 572. no. 11.
— brunioides Meisn. V. 430. no. 1.
— *cinerascens* DC. I. 572. no. 7.
— elegans Endl. I. 572. no. 8.
— filifolia Endl. I. 572. no. 9.
— *glycinaefolia* Sm. I. 568. no. 10.
— glycinaefolia Sm. I. 572. † V. 430. †
— hispida Lindl. II. 832. no. 1.
— juniperina Sieb. I. 572. no. 7.
— peduncularis Bth. I. 572. no. 2.
— phylicoides Cunn. I. 572. no. 1.
— pungens Mackay. I. 572. no. 6.
— *pungens* Mackay. I. 573. no. 4.
— ramosissima Bth. I. 572. no. 3.
— sericea Cunn. I. 572. no. 4.
— seriphioides Endl. I. 572. no. 10.
— speciosa Hortor. V. 430. †
— *trifoliata* Rth. I. 606. no. 1.
Dillwyniastrum DC. V. 430. no. 1.
Dimacria Sweet. I. 451.
Dimerostemma Cass. *II. 702. no. 12.
Dimetia Wght. et Arn. II. 494.
Dimetopia DC. II. 384. V. 840.
— hirta Bth. II. 384. no. 1. V. 840. no. 1.
— *isocarpa* Bartl. V. 840. no. 1.
— Preissii Bnge. V. 840. no. 2.
Dimidiatae Bth. (Acacia) I. 905.
Dimocarpus crinita Lour. V. 365. no. 3.
— *Litchi* Lour. V. 364. no. 2.
— *Longan* Lour. I. 420. no. 4. V. 364. no. 1.
— *undulatus* Wght. I. 420. no. 4.
Dimorphandra Schott. I. 854. V. 574.
— biretusa Tulasne. V. 574. no. 2.
— exaltata Schott. V. 575. no. 5.

Dimorphandra Gardneriana Tulasne. V. 574. no. 3.
— latifolia Tulasne. V. 575. no. 8.
—? macrostachya Bth. I. 854. no. 1. V. 575. no. 6.
— mollis Bth. I. 855. no. 2. V. 574. no. 1.
— pennigera Tulasne. V. 575. no. 7.
— unijuga Tulasne. V. 575. no. 4.
Dimorphandreae Bth. I. 854. V. 574.
Dimorphanthus Miquel. II. 430.
— edulis Miq. II. 431. no. 2.
— elatus Miq. II. 430. no. 1.
Dimorphopetalum Tetilla Bert. II. 265. no. 1. V. 807. no. 1.
Dimorphotheca Vaill. *II. 637.
Dinemagonum Adr. Juss. °V. 342.
— Bridgesianum Adr. Juss. V. 343. no. 2.
— Gayanum Adr. Juss. V. 342. no. 1.
Dinemandra Adr. Juss. °V. 341.
— ericoides Adr. Juss. V. 341. no. 1.
— glaberrima Adr. Juss. V. 342. no. 2.
Dioclea H. B. Kth. I. 764. V. 533.
— Apurensis H. B. Kth. *I. 765. no. 14.
—? argentea Dsvx. I. 765. no. 17.
— *argentea* Dsvx. V. 533. no. 1.
— bicolor Bth. I. 765. no. 6.
— coriacea Bth. I. 765. no. 8.
— funalis Poepp. et Endl. V. 533. no. 1.
— glabra Bth. I. 765. no. 7.
— grandiflora Mart. I. 764. no. 1.
— Guianensis Bth. I. 765. no. 10.
— Jacquiniana DC. *I. 765. no. 15.
— *lasiocarpa* Mart. I. 765. no. 9.
— lasiophylla Bth. I. 765. no. 12.
— latifolia Bth. I. 764. no. 2.
— mollis DC. *I. 765. no. 16.
— piligera Tulasne. V. 533. no. 3.
— purpurea Poepp. et Endl. V. 533. no. 2.
— rostrata Bth. I. 765. no. 5.
— rubiginosa Tulasne. V. 534. no. 4.
— rufescens Bth. I. 764. no. 3.
— Schottii Bth. I. 765. no. 11.
— sericea H. B. Kth. *I. 765. no. 13.
— violacea Mart. I. 764. no. 4.
Diocleae Bth. I. 762. II. 900. V. 532.
Diodia Linn. II. 466. VI. 30.
— barbigera Hook. et Arn. II. 466. no. 3.
—? carnosa Hochstett. VI. 30. no. 3.
— crassifolia Bth. VI. 30. no. 1.
— cymosa Cham. II. 466. no. 5.
— *elongata* E. Mey. VI. 29. no. 5.
— *Frankii* Steud. et Hochstett. VI. 54. no. 1.
— *hirsuta* Prsh. II. 466. no. 1. γ.
— paradoxa Cham. II. 466. no. 4.
— rudis Miquel. VI. 30. no. 2.
— *tetragona* Walt. II. 466. no. 1. β.
Diodia tricocca Torr. et Gr. II. 466. no. 2.
— Virginiana Linn. II. 466. no. 1.
γ. hirsuta, β. latifolia, α. Linnaei } Torr. et Gr.
— *Virginiana* Linn. II. 466. no. I. α.
Diodonta Nutt. II. 614. *VI. 164.
Diodonta Nutt. II. 979.
— aristosa Nutt. *II. 615. no. 4.
— *aristosa* Nutt. II. 980. no. 5.
— aurea Nutt. *II. 614. no. 3.
— *aurea* Nutt. II. 980. no. 3.
— bidentoides Nutt. II. 615. no. 7.
— *bidentoides* Nutt. II. 980. no. 2.
— coronata Nutt. *II. 614. no. 1.
— involucrata Nutt. *II. 615. no. 6.
— *involucrata* Nutt. II. 980. no. 6.
— leptophylla Nutt. II. 615. no. 5.
— *leptophylla* Nutt. II. 980. no. 3.
— mitis Nutt. *II. 614. no. 2.
— *mitis* Nutt. II. 980. no. 3.
Dionaea Ell. I. 230.
— muscipula L. *I. 230. no. 3.
— sessiliflora Raf. I. 230. no. 1.
— uniflora Raf. I. 230. no. 2.
Dionysia Fnzl. °VI. 442.
— aretioides Boiss. VI. 444. no. 7.
— bryoides Boiss. VI. 443. no. 3.
— caespitosa Boiss. VI. 444. no. 5.
— diapensiaefolia Boiss. VI. 443. no. 2.
— Michauxii Boiss. VI. 444. no. 6.
— odora Fnzl. VI. 443. no. 4.
— revoluta Boiss. VI. 443. no. 1.
Diosma Berg. I. 507.
Diosma DC. (ex p.) I. 506. I. 507. I. 510. V. 391.
Diosma Spr. I. 512.
— acmaeophylla Eckl. et Zeyh. I. 508. no. 10.
— *acuminata* Wendl. I. 512. no. 41.
— *alba* Thbg. I. 507. no. 2.
— *ambigua* Bartl. et Wendl. I. 508. no. 8.
— *apiculata* Spr. I. 512. no. 43.
— *Asiatica* Lour. I. 523. no. 1.
— *barbigera* Thbrg. I. 517. no. 2.
— *bifida* Jcq. I. 511. no. 13.
— *bifurca* Willd. I. 510. no. 1.
— *brevifolia* Lam. I. 510. no. 4.
— *bruniades* Lk. I. 510. no. 10.
— calycina Steud. I. 508. no. 2.
— *capitata* Brogn. I. 545. no. 1.
— *capitata* Dum. I. 511. no. 19.
— *cerifolium* Vent. I. 511. no. 20.
— *ciliata* Lam. I. 512. no. 29.
— *ciliata* L. I. 511. no. 19.
— *ciliata* Thnbg. I. 511. no. 12.
— *cistoides* Lam. I. 507. no. 6.

Diosma cordata Mart. I. 517. no. 3.
— *corymbosa* Mont. I. 512. no. 34.
— depressa Eckl. et Zeyh. I. 508. no. 11.
— eriantha Steud. I. 508. no 6.
— *glandulosa* Thbg. I. 512. no. 22.
— *hirsuta* Bartl. et Wendl. I. 508. no. 8.
— *hirta* Lam. I. 512. no. 45.
— *hispida* Thbg. I. 510. no. 2.
— *imbricata* Thbg. I. 512. no. 40.
— *juniperina* Spr. I. 509. no. 1.
— *lanceolata* Spr. I. 517. no. 1.
— *laxa* Spr. I. 512. no. 23.
— *leiophylla* Spr. I. 512. no. 26.
— *longifolia* Wendl. I. 508. no. 8.
— *lycopodioides* G. Don. I. 512. no. 42.
— *microphylla* Spr. I. 512. no. 30.
— *myrsinites* Lam. I. 512. no. 37.
— *obtusa* Meyer. I. 517. no. 4.
— *obtusata* Wendl. I. 509. no. 2.
— *oppositifolia* L. I. 508. no. 8.
— *orbicularis* Thbg. I. 512. no. 31.
— *parviflora* Willd. I. 510. no. 9.
— passerinoides Steud. I. 508. no. 3.
— *patula* Spr. I. 510. no. 3.
— *perforata* Lam. I. 512. no. 36.
— pilifera Steud I. 507. no. 1.
— *prolifera* Spr. I. 511. no. 17.
— *pubescens* Thbg. I. 512. no. 25.
— *punctata* Lichtst. I. 512. no. 35.
— *pungens* Spr. I. 509. no. 4.
— recurva Cham. I. 508. no. 7.
— *reflexa* Lodd. I. 510. no. 5.
— *rubra* L. I. 508. no. 8.
— *rufescens* Spr. I. 512. no. 44.
— *rugosa* Thbg. I. 512. no. 28.
— *serpyllacea* DC. I. 511. no. 18.
— spartiifolia Steud. I. 508. no. 5.
— *squamosa* Willd. I. 512. no. 38.
— *squarrosa* Wendl. I. 517. no. 5.
— stenopetala Steud. I. 508. no. 4.
— *tenuissima* Lodd. I. 510. no. 6.
— *teretifolia* Lk. I. 510. no. 11.
— *tetragona* Bartl. et Wendl. I. 509. no. 5.
— *tetragona* Thbg. I. 509. no. 3.
— *Thunbergiana* Spr. I. 511. no. 12.
— *thymifolia* Willd. I. 512. no. 29.
— *thyoides* Willd. I. 510. no. 7.
— thyrsophora Eckl. et Zeyh. I. 508. no. 9.
— *ulicina* Lodd. I. 509. no. 1.
— *uniflora* L. I. 507. no. 8.
— *Ventenatiana* Spr. I. 512. no. 22.
— *vestita* Spr. I. 512. no. 39.
— *virgata* Lam. I. 510. no. 8.
— vulgaris Schlchtd. I. 508. no. 8.
DIOSMEAE Adr. Juss. I. 499. II. 823. V. 386.
Diospyros Dalech. VI. 457.
— truncata Moritzi. VI. 457. no. 1.
Diotis Dsf. *II. 634.
Diotocalyx DC. II. 532.
Diotocarpus Hochstett. VI. 34.
— *angustifolius* Hochstett. VI. 35. no. 2.
— *prunelloides* Hochstett. II. 941. no. 1. VI. 35. no. 1.
Diotolotus Tausch. II. 845. °V. 510.
— Ecklonis Tausch. *II. 845. no. 1. *V. 510. no. 1.
Diphaca Lour. *I. 725.
Dipholis Alph. DC. VI. 456.
— salicifolia Alph. DC. *VI. 456. no. 1.
Diphragmus Prsl. °VI. 29.
— scaber Prsl. *VI. 29. no. 1.
Diphylleia L. C. Rich. *I. 100.
Diphysa Jcq. *I. 681.
Diplachne Baueri R. Br. II. 154. no. 1.
Diplacus Nutt. III. 274. °III. 963. *VI. 642.
— *glutinosus* Nutt. III. 274. no. 2.
— latifolius Nutt. III. 274. no. 2.
— leptanthus Nutt. III. 274. no. 3.
— longiflorus Nutt. III. 274. no. 4.
— puniceus Nutt. III. 274. no. 1.
Dipladenia Alph. VI 478.
— atropurpurea Alph. DC. *VI. 478. no. 1.
— crassinoda Dcne. *VI. 478. no. 3.
— splendens Alph. DC. *VI. 478. no. 2.
— vincaeflora Van Houtte. VI. 742.
Diplandra Hook. et Arn. II. 96. V. 670.
— lopezioides Hook. et Arn. *II. 96. no. 1. V. 670. no. 1.
Diplanthera Bnks. et Soland. III. 240. °III. 961. *VI. 638.
— tetraphylla Bnks. et Soland. III. 240. no. 1.
Diplecolobeae DC. I. 190. V. 50.
Diplectria Blume. II. 145.
Diplesthes Harv. °V. 147. adn.
— *Kraussii* Harv. V. 147. no. 1.
— Kraussii Harv. *V. 147. no. 1. adn.
Diplocalymna Spr. *VI. 546.
Diplocalyx Prsl. VI. 738.
— pallidus Prsl. VI. 739. no 1.
— tomentellus Prsl. VI. 739. no. 2.
Diplochiton DC. II. 145.
— bracteata DC. *II. 145. no. 1.
— parviflora Bth. II. 145. no. 2.
Diplochonium Fzl. II. 233. V. 784.
— sesuvioides Fzl. *II. 233. no. 1. V. 784. no. 1.
Diplofractum Desf. *I. 362.
Diplegenea Lindl. II. 145.
— viscoides Lindl. *II. 145. no. 1.
Diplolaena R. Br. *I. 505. II. 824. V. 390.

Diplolaena Dampieri Dsf. *II. 824. no. 1. V. 390. no. 1. †
— microcephala Bartl. V. 390. no. 3.
— salicifolia Brtlng. V. 390. no. 2.
β. cuneata.
α. revoluta.
Diploloma Schrenk. *VI. 563.
Diplopappeae DC. II. 577. VI. 718.
Diplopappus DC. II. 577. *II. 952. no. 4. II. 957.
— *albus* Hook. II. 573. no. 119.
— alpinus Nutt. II. 577. no. 3.
— *amygdalinus* Hook. II. 578. no. 6.
— amygdalinus Torr. et Gr. *II. 578. no. 5.
— baccharoides Bth. II. 578. no. 9.
— *canescens* Hook. II. 583. no. 38.
— cornifolius Darlingt. *II. 577. no. 4.
— *cornifolius* Lindl. II. 578. no. 5. β.
—? *divaricatus* Hook. II. 967. no. 1.
— ericoides Torr. et Gr. II. 577. no. 2.
— *filifolius* Hook. II. 582. no. 31. α.
— *grandiflorus* Hook. II. 582. no. 36. γ.
— *hispidus* Hook. II. 588. no. 3.
— *incanus* Lindl. II. 587. no. 4.
— laxus Bth. II. 578. no. 8.
— *leucophyllus* Lindl. II. 558. no. 3.
— linearifolius Hook. *II. 577. no. 1.
— *linearifolius* Lindl. II. 577. no. 1.
— *linearis* Hook. II. 582. no. 35.
— *lutescens* Lindl. II. 573. no. 120.
— Natalensis C. H. Schultz. II. 957. no. 1.
— obovatus Torr. et Gr. *II. 578. no. 7.
β. dichotomus.
— *occidentalis* Hook. et Arn. II. 582. no. 32.
— *paludosus* Lindl. II. 560. no. 10.
— *pinifolius* Less. II. 588. no. 2.
— *pinifolius glaber* Hort. Berol. II. 588. no. 1.
— *rigidus* Lindl. II. 577. no. 1.
— *scaber* Hook. II. 586. no. 1.
— *trichophylla* Hook. II. 959. no. 3.
— *umbellatus* Hook. II 578. no. 6.
— umbellatus Torr. et Gr. *II. 578. no. 6.
Diplopeltis Endl. I. 421. V. 367.
— Hügelii Endl. *I. 421. no. 1. V. 367. no. 1.
— Lehmanni Miquel. V. 368. no. 3.
— Preissii Miquel. V. 368. no. 2.
Diplophractum salicifolium Spr. I. 372. no. 1.
Diplophragma Wght. et Arn. II. 491.
Diplophyllum Lehmann. III. 335.
— *cardiocarpum* Karel. et Kiril. III. 335. no. 2.
— *Crista galli* Otto. III. 335. no. 1.
— *hirsutum* Karel. et Kiril. III. 335. no. 1.
Diplophyllum veronicaeforme Lehm. III. 335. no. 1.
Diplopterys Adr. Juss. °V. 339.
— Paralias Adr. Juss. V. 339. no. 1.
Diplospora DC. *II. 485.
Diplostegium Don. *II. 132.
— *canescens* Don. II. 129. no. 11.
Diplostemma Steud. et Hochstett. *II. 683. *VI. 326.
Diplostephieae C. H. Schultz. II. 952.
Diplostephium Cass. *II. 577. *II. 952. no. 2.
Diplostephium DC. (ex p.) II. 577.
— *acuminatum* DC. II. 571. no. 113.
— *amygdalinum* Cass. II. 578. no. 5.
β. *humilius* DC. II. 578. no. 6.
— *cornifolium* DC. II. 577. no. 4.
— *dichotomum* DC. II. 578. no. 7.
— *obovatum* DC. II. 578. no. 7.
— *umbellatum* DC. II. 578. no. 6.
Diplotaenia Boiss. °V. 880.
— cachrydifolia Boiss. V. 880. no. 1.
Diplotaxis Boiss. I. 184. adn.
Diplotaxis DC. I. 187. V. 49.
— Apula Ten. *I. 187. no. 1.
— Barrelieri DC. I. 188. †
— biloba C. Koch. I. 187. no. 4.
— *brassicaeformis* Koch. I. 184. no. 4.
— catholica DC. *I. 187. no. 2.
— *crassifolia* DC. I. 187. no. 3.
— *erucoides* DC. I. 184. no. 3. adn.
— erucoides DC. I. 188. †
— hispida DC. *I. 187. no. 3.
— *Lagascana* DC. I. 184. no. 7. adn.
— muralis DC. I. 188. †
— parvula Schrenk. V. 49. no. 1.
— *pendula* DC. I. 187. no. 3.
— *Prolongi* Boiss. I. 184. no. 2. adn.
— *saxatilis* DC. I. 184. no. 8. adn.
— saxatilis DC. I. 188. †
— tenuifolia DC. I. 188. †
— *viminea* DC. I. 184. no. 1. adn.
— viminea DC. I. 188. †
— *virgata* DC. I. 187. no. 2.
Diplothria DC. *II. 620.
Diplotropis Bth. I. 808. V. 549.
— brachypetala Tulasne. V. 550. no. 2.
— grandiflora Tulasne. V. 549. no. 1.
— Martiusii Bth. I. 808. no. 1.
— nitida Bth. I. 808. no. 2.
Diplusodon Pohl. II. 112. V. 675.
— alutaceus Pohl. *II. 113. no. 9.
— *amoenus* DC. II. 113. no. 4.
— *angustifolius* DC. II. 112. no. 2.
— arboreus Endl. II. 112. no. 1.
— *arboreus* Poepp. et Endl. II. 112. no. 1.
— Candollei Pohl. *II. 112. no. 2.

Diplusodon capitatus St. Hil. II. 113. no. 6.
— decussatus Gardn. V. 675. no. 1.
— *helianthemifolius* DC. II. 113. no. 9.
— incanus Gardn. V. 676. no. 2.
— kielmeyeroides St. Hil. II. 113. no. 8.
— lanceolatus Pohl. *II. 113. no. 7.
— *lythroides* DC. II. 113. no. 10.
— microphyllus Pohl. *II. 113. no. 5.
— *oblongus* Pohl. II. 113. no. 7.
— *pemphoides* DC. II. 113. no. 9.
— rosmarinifolius St. Hil. II. 112. no. 3.
— *scaber* Pohl. II. 113. no. 9.
— *stachyoides* DC. II. 113. no. 10.
— villosissimus Pohl. *II. 113. no. 10.
— virgatus Pohl. *II. 113. no. 4.
Diplycosia Blume. *II. 727.
Diporidium Delagoënse Eckl. et Zeyh. I. 528. no. 2.
— *Natalitium* Meisn. II. 826. no. 1.
— *pulchrum* Hook. II. 826. no. 2.
Diposis DC. *II. 387.
DIPSACEAE Juss. II. 532. VI. 84.
Dipsacus Tournef. II. 532.
— azureus Schrenk. II. 532. no. 2.
— Lechenaultii Coult. *II. 532. no. 3.
— Walkeri Arn. II. 532. no. 1.
Dipterocalyx Cham. IV. 56.
— *glabrescens* Chamisso. IV. 56. no. 57.
— *hirtus* Cham. IV. 56. no. 56.
DIPTEROCARPEAE Blume. V. 121.
Dipterocarpus Gaertn. fil. V. 121.
— alatus Rxb. V. 124. no. 13.
— *angustifolius* Wght. et Arn. V. 124. no. 14.
— Baudii Krthls. V. 123. no. 9.
— costatus Grtnr. V. 124. no. 14.
— *Dryobalanops* Steudel. V. 125. no. 1.
— elongatus Krthls. V. 123. no. 10.
— gracilis Blume. V. 123. no. 7.
— grandiflorus Wall. *V. 124.
— Hasseltii Blume. V. 123. no. 8.
— incanus Rxb. V. 124. no. 15.
— laevis Hamilt. V. 121. no. 1.
— littoralis Blume. V. 122. no. 6.
— marginatus Krthls. V. 124. no. 12.
— pilosus Rxb. V. 124. no. 17.
— retusus Blume. V. 122. no. 4.
— Spanoghei Blume. V. 122. no. 5.
— Tampurau Krthls. V. 123. no. 11.
— trinervis Blume. V. 122. no. 3.
γ. canescens.
β. elegans.
— tuberculatus Rxb. V. 124. no. 16.
— turbinatus Grtnr. fil. V. 121. no. 2.
— *turbinatus* Rxb. V. 121. no. 1.
— vestitus Wall. *V. 124.
Dipterocome Fisch. et Mey. II. 600.
Dipterosperma Hsskrl. °VI. 514.
— personatum Hsskrl. VI. 515. no. 1.
Dipterotheca C. H. Schultz. °VI. 145.
— Kotschyi C. H. Schultz. *VI. 146. no. 1.
Dipterygium Dcne. I. 180. *II. 762.
— glaucum Dcne. *I. 180. no. 1.
Dipteryx Schreb. I. 804. V. 547.
— alata Vogel. I. 804. no. 1.
— *emarginata* Spr. I. 805. no. 1.
— nudipes Tulasne V. 547. no. 1.
Diptychandra Tulasne. °V. 551.
— aurantiaca Tulasne. V. 551. no. 1.
— epunctata Tulasne. V. 551. no. 2.
Dipyrena Hooker. IV. 37.
— glaberrima Hook. IV. 37. no. 1.
Disandra Linn. III. 333. 334.
— *Africana* Linn. III. 334. no. 5.
— *prostrata* Linn. III. 334. no. 4.
Discanthera Torr. et Gr. II. 203.
— dissecta Torr. et Gr. *II. 203. no. 1.
— *dissecta* Torr. et Gr. V. 762. no. 3.
Dischidia R. Br. *VI. 493.
Dischidium Ging.? I. 219. I. 216. no. 34.
Dischisma Choisy. IV. 147.
— arenarium Mey. IV. 149. no. 4.
— capitatum Choisy. IV. 149. no. 7.
— chamaedryfolium Wlprs. IV. 148. no. 3.
— ciliatum Choisy. IV. 148. no. 2.
— clandestinum E. Mey. IV. 149. no. 8.
— flaccum E. Mey. IV. 147. no. 1.
— leptostachyum E. Mey. IV. 149. no. 5.
— spicatum Choisy. IV. 149. no. 6.
Discocactus Lindl. cf. Disocactus Lindl.
Discocactus Pfeiff. II. 323. (nec. °V. 817. cf. Disocactus Lindl.)
— biformis Lindl. (V. 817. no. 1.)
— insignis Pfeiff. II. 323. no. 1.
— Lehmanni Pfeiff. II. 323. no. 2.
— Linkii Pfeiff. II. 323. no. 3.
Discocapnos Cham. et Schlchtd. I. 122. °V. 23.
— Mundtii Cham. et Schlchtd. *I. 122. no. 1. V. 24. no. 1.
Discolobium Bth. I. 802.
— pulchellum Bth. *I. 802. no. 1.
Discolores DC. (Baccharis) II. 597.
Discopleura DC. *II. 392.
Discopoda DC. II. 987. no. 2.
Discopodium Hochstett. °VI. 611.
— penninervium Hochstett. VI. 611. no. 1.
Discostigma Hsskrl. °V. 145.
— rostratum Hsskrl. V. 145. no. 1.
Discovium Raf. *I. 192.
Discurainia Irio Webb. I. 163. no. 2.
— *millefolia* Webb. et Berth. I. 165. no. 22.
— *pinnatifida* Webb. I. 163. no. 3.

Disemma Lab. II. 221. V. 773.
— aurantia Labill. *V. 773. no. 1.
— Baueriana Endl. II. 221. no. 1.
Discrneston Spach. II. 939.
Diserneston Jaub. et Spach. V. 879.
— gummiferum Jaub. et Spach. *II. 939. no. 1.
— *gummiferum* Jaub. et Spach. V. 879. no. 1.
Disocactus Lindl. °VI. 773. adn.
— biformis Lindl. VI. 773. no. 1. adn.
Disparago Gaertn. *II. 648. VI. 249.
— Kraussii A. H. Schultz. VI. 249. no. 1.
Dispeltophorus Lam. I. 180.
Dispermae Bth. (Crotalaria) V. 446.
Dispermae Barnéoud. (Plantago) IV. 183.
Disporocarpa pharnaceoides C. A. Mey. II. 254. no. 22.
— *Schimperi* C. A. Mey. II. 254. no. 21.
Dissitiflorae Wght. et Arn. (Indigofera) I. 668.
Dissitiflori DC. (Astragalus) I. 696. II. 864. V. 517.
Dissochaeta Blume. II. 144. V. 713.
— biligulata Krthls. V. 714. no. 5.
— bipulvinata Krthls. V. 713. no. 2.
— bracteata Blume. *II. 144. no. 5.
— bracteata Krthls. V. 713. no. 1.
— cyanocarpa Blume. *II. 145. no. 15. V. 714. no. 6
— fallax Blume. *II. 144. no. 1.
— fusca Blume. II. 144. no. 7.
γ. obtuseacuminata.
β. ferruginea.
— glauca Blume. *II. 145. no. 14.
— gracilis Blume. *II. 144. no. 9.
— inappendiculata Blume. II. 144. no. 10.
β. purpurascens.
γ. tomentosa.
— intermedia Blume. II. 144. no. 2. (c. var. β. ibid.)
— leprosa Blume. *II. 144. no. 4.
— monticola Blume. II. 144. no. 3.
— nodosa Krthls. V. 714. no. 4.
— pallida Blume. *II. 145. no. 13.
— reticulata Blume. II. 144. no. 11.
— rostrata Krthls. V. 713. no. 3.
— sagittata Blume. II. 144. no. 12.
— vaccilans Blume. *II. 144. no. 6. (c. var β. ibid.)
— velutina Blume. II. 144. no. 8.
Distasis DC. *II. 578. *II. 952. no. 7.
—? *concinna* Hook. et Arn. II. 581. no. 25.
Distemma Spach. VI. 731.
Distephana Juss. V. 774.
Distephanus Cass. *II. 541.
Distichae DC. (Baccharis) VI. 138.
Distictis A. P. DC. *IV. 511.
Distigma vitelliniflorum Kltzsch. IV. 123. no. 24.
Distreptus Cass. II. 543.
Distylis Gaudich. *II. 713. *VI. 393.
Distylium Sieb. et Zucc. II. 435. V. 928.
— racemosum Sieb. et Zucc. II. 435. no. 1. V. 928. no. 1.
Disynaphia DC. *II. 549.
Ditassa R. Br. VI. 487.
— longiloba Bth. VI. 487. no. 1.
— manicata Dcne. VI. 487. †
— trivialis Poepp. et Endl. VI. 487. no. 2.
Ditassae Dcne. VI. 487.
Ditaxia betonicaefolia Rafin. III. 148. no. 3.
Ditheca Steetz. V. 69.
Dithyrea Hook. et Harvey. °V. 38.
— Californica Hook. et Harvey. V. 38. no. 1.
Ditrichum Cass. *II. 621.
Divaricatae Pfeiff. (Opuntia) II. 347.
Diversifoliae Choisy. (Ipomaea) VI. 534.
Dobrowskya Prsl. *II. 706. *VI. 375.
— scabra DC. *VI. 733.
Dodartia Linn. *VI. 642.
Dodartia Mill. III. 186. no. 1.
Dodartia Rz. et Pav. III. 230.
Dodartia Tournef. III. 271. °III. 963.
—? Indica Linn. III. 272. no. 2.
— orientalis Linn. III. 272. no. 1.
Dodecandrae Spach. (Amygdalus) II. 909.
Dodecanthera Bth. I. 546. no. 3. 4.
Dodecas Linn. *II. 112.
Dodecatheon Linn. VI. 445.
— Meadia β. laciniata Linn. VI. 445. no. 1.
Dodonaea Linn. I. 421. V. 368.
— adenophora Miquel. V. 369. no. 8.
— aptera Miquel. V. 368. no. 2.
— Baueri Endl. I. 422. no. 7.
— Brasiliensis Schlchtd. V. 370. no. 11.
— Caffra Eckl. et Zeyh. I. 421. no. 2.
— ceratocarpa Endl. I. 422. no. 6.
— Ehrenbergii Schlchtd. V. 370. no. 12.
—? ericoides Miquel. V. 369. no. 6.
— hirtella Miquel. V. 369. no. 9.
— humifusa Miquel. V. 369. no. 4.
— humilis Endl. I. 422. no. 5.
— Kohautiana Schlchtd. V. 370. no. 13.
— Mundtiana Eckl. et Zeyh. I. 421. no. 1.
— pinifolia Miquel. V. 369. no. 7.
— Preissiana Miquel. V. 369. no. 5.
— pterocaulis Miquel. V. 368. no. 1.
— repanda Thonn. et Schum. I. 421. no. 3.
— salsolaefolia Cunn. I. 422. no. 8.
— Schiedeana Schlchtd. V. 369. no. 10.
— sororia Miquel. V. 369. no. 3.

Dodonaea viscosa Cambess. I. 421. no. 4.
— *viscosa* Mart. V. 370. no. 11.
— *viscosa* Sieb. V. 370. no. 13.
Dodonaeaceae Cambess. I. 421. V. 365.
Döllia C. H. Schultz. *II. 953.
Doellieae C. H. Schultz. II. 953.
Döllingeria DC. *II. 952. no. 8.
Döllingeria N. ab E. *II. 576.
— *cornifolia* Lindl. II. 578. no. 5. γ.
— *ptarmoicoides* N. ab E. II. 573. no. 119.
Dolia Lindl. °VI. 549.
— clavata Miers. VI. 550. no. 3.
— laxa Miers. VI. 550. no. 5.
— leptophylla Miers. VI. 550. no. 4.
— salsoloides Lindl. VI. 550. no. 2.
— vermiculata Lindl. VI. 550. no. 1.
Dolchiandra Fenzliana Miquel. VI. 513. no. 2.
— *Kohautiana* Prsl. VI. 513. no. 1.
Dolichlasium Lag. *II. 683. *VI. 325.
Dolichogyne DC. *II. 700.
Dolichos Hffmsgg. I. 765. no. 6.
Dolichos L. I. 779. II. 901. V. 539.
— *albus* Lour. I. 781. no. 1.
— *altissimus* Vell. I. 765. no. 4.
— angustifolius Eckl. et Zeyh. I. 779. no. 8.
— *angustifolius* Vahl. I. 756. no. 1.
— *angustissimus* E. Mey. I. 780. no. 8.
— arborescens G. Don. II. 901. no. 6.
— *argenteus* Rxb. I. 780. no. 17.
— *argenteus* Willd. I. 760. no. 10.
— *articulatus* Lam. I. 782. no. 1.
— axillaris E. Mey. I. 780. no. 11.
β. glaber.
α. pubescens.
— *Benghalensis* Jcq. I. 781. no. 1.
— Benthamii Meisn. V. 539. no. 3.
— *biflorus* Rxb. I. 780. no. 16.
— callosus Blume. I. 780. no. 13.
— *Capensis* Thbg. I. 778. no. 2.
— *Catjang* L. I. 778. no. 1.
— *Catjang* Rxb. I. 781. no. 21. β.
— *Catjang* Wall. I. 780. no. 21.
— ciliatus Klein. *I. 770. no. 17.
— *cuneifolius* Forsk. I. 586. no. 28. V. 438. no. 38.
— *cuspidatus* Grah. I. 781. no. 1.
— cylindricus Desvx. I. 781. no. 24.
— decumbens Thnbrg. *V. 539. no. 4.
β. longepedunculatus.
— *dissectus* Lam. I. 774. no. 50.
— *emarginatus* Jcq. II. 900. no. 1.
— *ensiformis* Lour. II. 900. no. 2.
— *ensiformis* Thnbrg. I. 781. no. 2.
— *fabaeformis* L'Herit. I. 759. no. 2.
— falcatus Klein. *I. 780. no. 18. (c. varr. α. et β.)
Dolichos falciformis E. Mey. I. 780. no. 12.
— *galeatus* Gaudich. I. 766. no. 13.
— geminiflorus G. Don. II. 902. no. 7.
— gibbosus Thbg. I. 779. no. 6.
— *giganteus* Willd. I. 767. no. 4.
— glutinosus Rxb. *I. 780. no. 15.
— gracilis Guill. et Perr. I. 779. no. 1.
— hastaefolius Schnitzlein. V. 539. no. 2.
— hastaeformis E. Mey. I. 779. no. 7.
— *hirsutus* Thnbrg.? II. 902. no. 1.
— leucomelas Knze. II. 901. no. 2.
— *lignosus* Rxb. I. 781. no. 2.
— linearis E. Mey. I. 780. no. 9.
— *littoralis* Vellozo. I. 766. no. 8.
— Mexicanus Schlchtd. I. 781. no. 23.
— *minutus* Rxb. I. 783. no. 1.
— nervosus Schum. et Thonn. I. 779. no. 2.
— obliquifolius Schnitzlein. V. 539. no. 1.
— obovatus Schum. et Thonn. I. 779. no. 3.
— *oleraceus* Schum. et Thonn. I. 779. no. 9.
— ovalifolius Schum. et Thonn. I. 779. no. 4.
— *ovatus* Grah. I. 781. no. 3.
— Pavonii G. Don. II. 901. no. 5.
— pentaphyllus E. Mey. I. 780. no. 10.
— pilosus Rxb. *I. 780. no. 20.
— *prostratus* Koen. I. 780. no. 17.
— *pruriens* Rxb. I. 767. no. 7.
— punctatus Wght. et Arn. I. 780. no. 14.
— *purpureus* Jcq. I. 781. no. 1.
— *retusus* E. Mey. I. 779. no. 5.
— rhynchosioides Desvx. I. 781. no. 22.
— *rufescens* Grah. I. 790. no. 3.
— scabriusculus Hasskarl. II. 901. no. 1.
— *scarabaeoides* L. I. 783. no. 1.
— *scarabaeoides* Rxb. I. 786. no. 2. α.
— sericeus E. Mey. I. 779. no. 5.
— Sessei G. Don. II. 901. no. 4.
— Sinensis L. *I. 680. no. 21. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *Sinensis* Willd. I. 781. no. 21. α.
— *smilacinus* E. Mey. I 779. no. 6.
— *Soorootoo* Rxb. I. 768. no. 8.
— *spicatus* Rxb. I. 781. no. 1.
— *stipulaceus* Lam. I. 774. no. 51.
— subcarnosus Wght. et Arn. I. 780. no. 19.
— *tetraspermus* Willd. I. 781. no. 1.
— *tomentosus* Wght. et Arn. I. 788. no. 23.
— *Tranquebaricus* Jcq. I. 781. no. 21. β.
— *trilobatus* Wall. I. 780. no. 18.
— *trilobus* L. I. 774. no. 51.
— *trilobus* Thnbrg. I. 778. no. 4.
— *tuberosus* Rxb. I. 780. no. 18. α.
— *umbellatus* Willd. I. 779. no. 6.
— undulatus Moç. et Sess. II. 901. no. 3.
— *unguiculatus* Jcq. I. 779. no. 9.
— uniflorus L. *I. 780. no. 16.

Dolichos urens Rxb. I. 767. no. 1.
— *virosus* Rxb. I. 766. no. 10.
— *Woolawa* Rxb. I. 780. no. 16.
Doliocarpus Soland. I. 65. II. 746. V. 13.
— dentosus Mart. II. 746. no. 2.
— pubens Mart. I. 65. no. 1.
— sessiliflorus Mart. II. 746. no. 1.
— spinulifer Miquel. V. 13. no. 1.
Dollinera Endl. I. 736.
— rufescens Endl. *I. 736. no. 2.
— Sambuensis Endl. *I. 736. no. 1.
Dolomiaea DC. *II. 669.
Dombeya Cav. I. 349. II. 797.
— Amelia Guillem. I. 349. no. 2.
— angulata Cav. I. 349. †
— *angulata* Rxb. I. 349. no. 1.
— *cannabina* Boj. II. 798. no. 1.
— *cannabina* Hilsenbrg. V. 113. no. 1.
— cannabina Hels. et Boj. I. 349. no. 3.
— elliptica Boj. II. 797. no. 3.
— erythroclada Boj. II. 797. no. 5.
— hirsuta Boj. II. 797. no. 2.
— palmata Cav. *I. 349. no. 1.
— platanifolia Boj. II. 797. no. 1.
— reflexa Rchb. I. 349. †
— spectabilis Boj. II. 797. no. 4.
— triumfettaefolia Boj. II. 797. no. 6.
— viburniflora Boj. II. 797. no. 7.
Dombeyaceae Kth. I. 348. V. 113.
Donatia Forst. II. 362.
Donatia Loefl. IV. 132. no. 1.
— *fascicularis* Forst. II. 362. no. 1.
— Magellanica Forst. *II. 362. no. 1.
Dondisia DC. II. 489.
— foetida Haskarl. II. 489. no. 1.
— *Lechenaultii* DC. II. 484. no. 3.
Donia ciliata Nutt. II. 592. no. 1.
— *formosa* Don. II. 860. no. 2.
—? *lanceolata* Hook. II. 591. no. 9. II. 968. no. 3.
— *punicea* Sweet. I. 684. no. 1.
— *speciosa* G. Don. II. 860. no. 1.
— *uniflora* Hook. II. 591. no. 7. II. 968. no. 4.
Donioides DC. *II. 954. no. 1.
Dontospermeae C. H. Schultz. II. 955.
Dontospermum Neck. *II. 955. no. 3.
Dontostemon Andrz. I. 163.
— micranthus C. A. Meyer. I. 163. no. 1.
— oblongifolius Ledeb. I. 163. no. 3.
— perennis C. A. Mey. I. 163. no. 2.
Doodia alopecurioides Rxb. I. 736. no. 5.
— *hamosa* Rxb. I. 735. no. 3.
Dopatrium Hamilt. III. 288. °III. 965. *VI. 613.
— junceum Hamilt. III. 288. no. 3.
— lobelioides Bth. III. 288. no. 2.
— nudicaule Bth. III. 288. no. 1.
Doraena Thnbrg. III. 124. °III. 956.
— Japonica Thnbrg. III. 124. no. 1.
Doratanthera Bth. III. 305. °III. 966. *VI. 641.
— Senegalensis Bth. III. 305. no. 1.
Dorutolepis DC. II. 645. no. 1.
Dorema D. Don. II. 408. °V. 879.
— ammoniacum D. Don. II. 408. no. 1. V. 879. no. 1.
— Aucheri Boiss. V. 880. no. 3.
— glabrum Fisch. et Mey. II. 508. no. 2. V. 879. no. 2.
— meïfolium Fnzl. II. 408. no. 4.
— *meïfolium* Fnzl. V. 883. no. 8.
— Soongaricum Kar. et Kir. II. 408. no. 3.
Doria Lssng. II. 655.
— *acutiloba* DC. VI. 274. no. 2.
— *alata* Thnbrg. VI. 274. no. 7.
— *arbuscula* DC. VI. 274. no. 9.
— *campanulata* DC. VI. 274. no. 23.
— *carnosa* DC. VI. 274. no. 12.
— *cromochaeta* DC. VI. 274. no. 1.
— *cluytiaefolia* DC. VI. 274. no. 5.
— *cneorifolia* DC. VI. 274. no. 4.
— *digitata* Lssng. VI. 274. no. 11.
— *diversifolia* DC. VI. 274. no. 19.
— *eriocarpa* DC. VI. 274. no. 14.
— *gymnodiscus* DC. VI. 274. no. 25.
— *Kraussii* C. H. Schultz. VI. 274. no. 26.
— *lasiocarpa* DC. VI. 274. no. 3.
— *Laureola* DC. VI. 274. no. 17.
— *linearifolia* DC. VI. 274. no. 15.
— *Lingua* Lssng. VI. 274. no. 16.
— *nana* DC. VI. 274. no. 8.
— *nodulosa* DC. VI. 274. no. 21.
— *perfoliata* Thnbrg. VI. 274. no. 20.
— *ramosa* DC. VI. 274. no. 18.
— *retrofrata* DC. VI. 274. no. 10.
— *semicalva* DC. VI. 274. no. 24.
— *spinescens* DC. VI. 274. no. 6.
— *taraxacoides* DC. VI. 274. no. 13.
— *tortuosa* DC. VI. 274. no. 22.
Dorinea Hamilt. I. 410.
— vulgaris Hamilt. *I. 410. no. 1.
Dormientes Bth. I. 878. (Mimosa)
Doronicum Linn. II. 652. °VI. 253.
— cruentum C. H. Schultz. *VI. 253. no. 5.
— echinatum C. H. Schultz. *VI. 253. no. 4.
— *laevifolium* Walt. II. 581. no. 30.
— malvaefolium C. H. Schultz. *VI. 253. no. 7.
— Nentvichii Sadl. II. 652. no. 1.
— papyraceum C. H. Schultz. *VI. 253. no. 6.
— reticulatum Boiss. VI. 253. no. 1.
— tussilaginis C. H. Schultz. *VI. 253. no. 2.
— Webbii C. H. Schultz. *VI. 253. no. 3.
Dorycnium Tournef. I. 647.

Dorycnium torulosum Prsl. I. 647. no. 1.
Dorycnopsis Boiss. I. 647.
— Gerardi Boiss. *I. 647. no. 1.
Dorystigma Miers. °VI. 615.
— caulescens Miers. VI. 616. no. 1.
— squarrosum Miers. VI. 616. no. 2.
Douepea Cambess. I. 187.
— tortuosa Cambess. *I. 187. no. 1.
Douglasia Lindl. *VI. 444.
Draba L. I. 147. II. 758.
— acaulis Boiss. I. 148. no. 12.
— Adamsii Ledeb. I. 149. no. 24.
— affinis Ledeb. I. 149. no. 25.
— aïzoides L. (c. varr. *α. β. γ. δ.*) I. 153. †
— Aïzoon Whlnbrg. I. 153. †
— alpina L. I. 147. no. 3. I. 153. †
γ. brachycarpa, *δ.* glabrata, *β.* hebecarpa, *α.* legitima } Lindbl. I. 147. no. 3.
— Altaica Bge. I. 150. no. 27.
— ambigua Ledeb. I. 150. no. 31.
— *androsacea* Wahlbg. I. 147. no. 6.
— arabisans Michx. *I. 151. no. 48.
— *arabisans* Prsh. I. 151. no. 47.
— Armena Boiss. I. 149. no. 17.
— Aucheri Boiss. I. 149. no. 15.
— aurea Vahl. I. 152. †
— Austriaca Crntz. I. 152. †
— Batava Dumort. I. 147. no. 2.
— brachycarpa Nutt. I. 152. no. 53.
β. fastigiata Nutt.
— Carinthiaca Hppe. I. 152. †
— Caroliniana Walt. *I. 152. no. 54.
β. umbellata Torr. et Gr.
— Chamissonis Don. I. 152. no. 56.
— *ciliaris* Whlnbrg. I. 147. no. 6. *α.*
— ciliata Scop. I. 152. †
— *confusa* Ehrh. I. 148. no. 10. *β.*
— confusa Ehrh. I. 153. †
— *confusa* Hartm. I. 148. no. 9.
— *confusa β.* DC. 150. no. 35.
— *contorta* Mert. et Koch. I. 148. no. 10.
— *contorta* C. A. Meyer. I. 148. no. 10. *α.*
— *contorta* Retz. I. 148. no. 10. *ε.*
— crassifolia Grah. I. 151. no. 46. (III. Emend. p. 1.)
— cuneifolia Nutt. I. 152. no. 51.
— *cuspidata* DC. I. 147. no. 1.
— dasycarpa C. A. Meyer. I. 150. no. 30.
α. alpicola C. A. Mey.
β. subalpina C. A. Mey.
— densifolia Nutt. I. 151. no. 43.
— *dentata* Hook. et Arn. I. 151. no. 47.
— elegans Boiss. I. 149. no. 16.
— eriopoda Turcz. I. 151. no. 37.
Draba Fladnizensis Wulf. I. 147. no. 6. *α.* I. 152. †
— frigida Saut. I. 152. †
— gelida Turcz. II. 758. no. 2.
— Gilliesii Hook. et Arn. I. 151. no. 39.
— *glabella* Prsh. *β.* I. 151. no. 48.
— glacialis Adams. I. 151. no. 41. (c. varr. *α. β.* et *γ.*)
— globifera Ledb. I. 149. no. 20.
— glomerata Royle. I. 150. no. 32.
— *gracilis* Grah. I. 152. no. 49.
— gracilis Ledeb. I. 150 no. 35.
— grandiflora Ledeb. I. 152. †
— grandiflora C. A. Mey. I. 150. no. 28.
— *grandiflora* C. A. Mey. II. 755. no. 1.
— *grandis* Lngsdrf. I. 154. no. 13.
— *Henneana* Schlchtd. I. 151. no. 48.
— heterocoma Fnzl. II. 758. no. 5.
— hirsuta Turcz. II. 758. no. 1.
— hirta L. *I. 148. no. 9. I. 152. †
β. hebecarpa Lindbl. I. 148. no. 9.
— *hirta* Sm. I. 148. no. 8. *γ.*
— *hirta β. alpicola* DC. I. 147. no. 5.
δ. siliquosa Cham. et Schlchtd. I. 150. no. 36.
— *hirta γ.* DC. I. 148. no. 8.
— *hirta γ.* Wahlbrg. I. 148. no. 9.
— Hispanica Boiss. I. 147. no. 1.
— *hispidula* Michx. I. 152. no. 54.
— Hoppeana Rchb. I. 153. †
— imbricata C. A. Mey. 149. no. 19.
— incana L. *I. 148. no. 10. I. 153. †
δ. axillaris, *ε?* contorta, *γ.* diffusa, *β.* hebecarpa, *α.* legitima, *ζ.* nana } Lindbl. I. 148. no. 10.
— *incana β.* Blütt. I. 148. no. 10. *α.*
— *incana β.* Cham. et Schlchtd. I. 150. no. 35.
— *incana β. glabriuscula* Gray. I. 151. no. 48.
— *involuta* Ag. I. 147. no. 1.
— *lactea* Adams. I. 147. no. 6. *α.*
— lactea Adams. I. 152. †
—? *laevigata* Cham. et Schlchtd. I. 171. no. 1.
— *laevigata* Hppe. I. 148. no. 6. *γ.*
— laevigata Hppe. I. 152. †
— lanceolata Royle. I. 150. no. 34.
— *Lapponica* DC. I. 149. no. 6. *β.*
— *Lapponica* Whlnbrg. I. 147. no. 6.
— Lapponica Whlnbrg. I. 152. †
— *lasiocarpa* Adans. I. 148. no. 24.
— lasiophylla Royle. I. 150. no. 33.
— laxa Lindbl. I 148. no. 8.
ε? glabrata.
β. gracilis.

Draba laxa.
γ. hebecarpa | δ. intermedia | α. legitima } Lindbl. I. 148. no. 8.
— *leiocarpa* Lindbl. I. 148. no. 9.
— *Liljenbladii* Wallm. I. 148. no. 7.
— linearis Boiss. I. 151. no. 38.
— *Longii* Schweinitz. I. 151. no. 48.
— lutea Gilib. *I. 152. no. 49.
— *β.* longipes DC. I. 152. †
— macrophylla Turcz. II. 658. no. 4.
— micrantha Nutt. I. 152. no. 55.
— micropetala Hook. I. 151. no. 45.
— Mongholica Turcz. II. 758. no. 3.
— muralis L. I. 152. †
— *muricella* Whlnbrg. I. 148. no. 7.
— muricella Whlbg. I. 152. †
— Natolica Boiss. I. 148. no. 11.
— nemoralis Ehrh. *I. 152. no. 50. et †
— *nemoralis* Ehrh. var. *α.* et *β.* I. 152. no. 50.
— *nivalis* DC. I. 148. no. 6. *β.*
— nivalis Liljebl. I. 148. no. 7.
β. brachycarpa Lindbl.
— nivalis L. I. 152. †
— *nivalis* Willd. I. 148. no. 7.
— *Norwegica* Gunn. I. 148. no. 8.
— *nummularia* Ehrnbrg. I. 142. no. 4.
— ochroleuca Bnge. I. 149. no. 22.
— *ochroleuca* Bnge. II. 758. no. 2.
— oligosperma Hook. I. 151. no. 42.
β? Andina Nutt.
— pauciflora R. Br. I. 151. no. 44.
— Persica Boiss. I. 148. no. 13.
— platycarpa Torr. et Gr. I. 152. no. 52. (III. Emend. p. 1.)
— polytricha Ledeb. I. 149. no. 23.
— praecox Stw. I. 152. †
— radicans Royle. I. 149. no. 26.
— ramosissima Desvx. *I. 151. no. 47.
— repens M. B. I. 152. †
— *rosea* Turcz. I. 172. no. 3.
— rosularis Boiss. I 149. no. 14.
— rupestris B. Br. I. 153. †
— *rupestris* Horn. I. 148. no. 8. *γ.*
— *rupestris β.* Ldb. I. 150. no. 27.
— Sauteri Hppe. I. 153. †.
— scabra C. A. Meyer. I. 149. no. 18.
— Scandinavica Lindbl. I. 147. no. 5.
γ. distigmatica.
β. hebecarpa.
α. legitima.
— setosa Royle. I. 149. no. 21.
— Spitzelii Hppe. I. 153. †
— *stellata* Cham. I. 152. no. 56.
— stellata Jcq. I. 152. †
— stenoloba Ledeb. I. 150. no. 36.
Draba subamplexicaulis C. A. Mey. I. 150. no. 29.
— tomentosa Whlnbrg. I. 152. †
— Traunsteineri Hppe. I. 152. †
— trichella Fries. I. 147. no. 4.
— verna L. (c. var. Krockeri Andrz.) I. 152. †
— violacea DC. I. 152. †
— vulcanica Bth. I. 151. no. 40.
— Wahlenbergii Hartm. I. 147. no. 6.
γ. glabrata Lindbl.
β. heterotricha Lindbl.
α. homotricha Lindbl.
— *Wahlenbergii* Spr. I. 148. no. 6. *β.*
Drabaea Lindbl. I. 147.
Drabella DC. I. 151.
Drabella Torr. et Gr. I. 711.
Drabopsis C. Koch. II. 760.
— verna C. Koch. *II. 760. no. 1.
Dracocephalum Linn. III. 791. °III. 986. VI. 678.
Dracocephalum etc. Gmel. III. 785. no. 51.
— *Altaiense* Laxm. III. 792. no. 7.
— Argunense Fisch. III. 796. no. 25.
— aristatum Bertoloni. VI. 678. no. 3.
— Aucheri Boiss. III. 950. VI. 678. no. 1.
— Austriacum Linn. III. 797. no. 27.
— botryoides Stev. III. 791. no. 2. VI. 678. no. 1.
— *Canariense* Linn. III. 799. no. 3.
— *canescens* Linn. III. 798. no. 1.
— *chamaedryoides* Balb. III. 845. no. 6.
— Cochinchinense Lour. III. 797. no. 29.
— *cordatum* Nutt. III. 798. no. 1.
— *denticulatum* Ait. III. 800. no. 1.
— discolor Bnge. III. 791. no. 3.
— *erectum* Royle. III. 785. no. 53.
— foetidum Bnge. III. 794. no. 15.
— fragile Turczan. III. 793. no. 9.
— fruticulosum Steph. III. 796. no. 22.
— *Govanianum* Wall. III. 785. no. 52.
— grandiflorum Linn. III. 792. no. 7. VI. 746. †
— heterophyllum Bth. III. 794. no. 14.
— *hyssopifolium* F. Mart. III. 796. no. 26.
— *Ibericum* M. Bieb. III. 798. no. 2.
— imberbe Bnge. III. 792. no. 6.
— Inderiense Kar. et Kir. III. 794. no. 16.
— integrifolium Bnge. III. 796. no. 23.
— *intermedium* Nutt. III. 800. no. 1.
— Kotschyi Boiss. VI. 678. no. 2.
— lamiifolium Dsf. III. 793. no. 10.
— *lancifolium* Moench. III. 800. no. 1.
— *Mexicanum* H. B. Kth. III. 799. no. 2.
— Moldavica Linn. III. 794. no. 13.
— multicaule Montbr. et Auch. III. 795. no. 20.

Dracocephalum nutans Linn. III. 795. no. 21.
β. alpinum Kar. et Kir.
— *obovatum* Elliott. III. 800. no. 1.
— *ocymifolium* Mill. III. 798. no. 3.
— odoratissimum Poir. III. 797. no. 28.
— *origanoides* Ldb. III. 791. no. 3.
— origanoides Steph. III. 792. no. 5.
— palmatum Steph. III. 791. no. 1.
— parviflorum Nutt. III. 793. no. 11.
— *peltatum* Linn. III. 798. no. 3.
— peregrinum Linn. III. 795. no. 18.
— pinnatifidum Lam. III. 792. no. 4.
— pinnatum Linn. III. 792. no. 4.
— Royleanum Wall. III. 795. no. 17.
— Ruyschiana Linn. III. 796. no. 26.
— *Sibiricum* Linn. III. 785. no. 51.
— speciosum Bth. III. 793. no. 8.
— *speciosum* Sweet. III, 800. no. 1.
— spinescens Wndrth. III. 796. no. 24.
— stamineum Kar. et Kir. III. 794. no. 12.
— thymiflorum Linn. III. 795. no. 19.
— *variegatum* Vent. III. 800. no. 1.
— *Virginianum* Linn. III. 800. no. 1.
Dracocephalus latifolius glaber Lysimachiae luteae foliis Moris. III. 244. no. 19.
Dracophyllum Labill. *II. 733. °VI. 433.
— affine Hook. fil. VI. 434. no. 5.
— *attenuatum* A. Cunn. VI. 435. no. 8.
— latifolium A. Cunn. VI. 434. no. 3.
— Lessonianum A. Rich. VI. 435. no. 8.
— longifolium R. Br. VI. 434. no. 6.
— recurvum Hook. fil. VI. 436. no. 14.
— robustum Hook. fil. VI. 436. no. 11.
— rosmarinifolium Forst. VI. 436. no. 13.
— scoparium Hook. fil. VI. 435. no. 10.
— secundum R. Br. VI. 434. no. 1.
— squarrosum Hook. fil. VI. 435. no. 7.
— strictum Hook. fil. VI. 434. no. 4.
— subulatum Hook. fil. VI. 436. no. 12.
— Urvilleanum A. Rich. VI. 435. no. 9.
— verticillatum Labill. VI. 434. no. 2.
Dracopis Cass. *II. 612. VI. 159.
— amplexicaulis Cassini. VI. 159. no. 1.
Dracunculus Bess. II. 639. VI. 212.
Drégea Eckl. et Zeyh. II. 412.
Drégea E. Meyer. VI. 492.
— *Capensis* Eckl. et Zeyh. II. 412. no. 1.
— *collina* Eckl. et Zeyh. II. 413. no. 4.
— floribunda E. Mey. *VI. 492. no. 1.
— *montana* Eckl. et Zeyh. II. 413. no. 3.
— *virgata* Eckl. et Zeyh. II. 413. no. 2.
Drepanocarpus F. W. Mey. I. 791. V. 542.
— crista castrensis Mart. I. 794. no. 3.
— falcatus Miq. V. 542. no. 1.
— ferox Mart. I. 794. no. 4.
— floridus Mart. I. 794. no. 5. (I. 794. no. 9.)
Drepanocarpus frondosus Mart. I. 794. no. 2.
— inundatus Mart. I. 794. no. 1.
— *isadelphus* Meyer. I. 794. no. 3.
— lunatus C. F. W. Meyer. *I. 794. no. 8. (et no. 7.)
— polyphyllus Bth. I. 794. no. 6.
Drepanolobus Nutt. I. 649.
— *crassifolius* Nutt. 649. no. 15.
— *cytisoides* Nutt. I. 649. no. 12.
— *decumbens* Nutt. I. 649. no. 9.
— *junceus* Nutt. I. 649. no. 14.
— *lanatus* Nutt. I. 649. no. 10.
— *micranthus* Nutt. I. 649. no. 11.
— *prostratus* Nutt. I. 649. no. 13.
— *rubescens* Nutt. I. 649. no. 12.
— *scoparius* Nutt. I. 649. no. 16.
Drepanospron Bth. I. 770. V. 537. no. 7.
Driessenia Krthls. °V. 687.
— exantha Krthls. V. 687. no. 1.
Drimys cf. Drymis Frstr.
Drimyspermum Reinwrdt. V. 409.
— Blumei Dcne. V. 409. no. 2.
— Burmanni Dcne. V. 409. no. 5.
— laurifolium Dcne. V. 409. no. 3.
— Perrottetianum Dcne. V. 409. no. 4.
— urens Reinwrdt. V. 409. no. 1.
Drosanthe Spach. II. 809.
— fimbriata Spach. II. 809. no. 1.
— helianthemoides Spach. II. 810. no. 3.
— hirtella Spach. II. 810. no. 2.
Drosera L. I. 227. V. 61.
— arcturi Hook. I. 229. no. 23.
— ascendens St. Hil. I. 228. no. 19.
— binata Lab. I. 230. †
— brevifolia Prsh. *I. 227. no. 6.
β. major.
— bulbosa Hook. I. 229. no. 36.
— *Burmanni* DC. I. 227. no. 3.
— Burmanni Vahl. I. 230. †
— *capillaris* Poir.? I. 227. no. 7.
— communis St. Hil. I. 228. no. 17.
— Cunninghamii Wlprs. I. 229. no. 25.
— dentata Bth. I. 228. no. 22.
— erythrorhiza Lindl. I. 229. no. 35.
— *esculenta* Rxb. II. 239. no. 1. β.
— filicaulis Endl. I. 229. no. 29.
— filiformis Raf. I. 230. †
— Finlaysoni Wall. I. 227. no. 2.
— *foliosa* Ell. I. 227. no. 8.
— gigantea Lindl. I. 229. no. 32.
— glanduligera Lehm. V. 61. no. 5.
— graminifolia St. Hil. I. 228. no. 20.
— grandiflora Bartl. I. 227. no. 5.
— heterophylla Lindl. I. 229. no. 33.
— hilaris Schlchtd. et Cham. I. 227. no. 4.
— hirtella St. Hil. I. 228. no. 14.

Drosera Hügelii Endl. I. 229. no. 28.
— incisa A. Rich. I. 227. no. 10.
— Indica L. I. 230. †
— *intermedia* A. Cunn. I. 229. no. 25.
— intermedia Hayne. I. 230. †
— linearis Goldie. I. 222. no. 9.
— longifolia L. *I. 227. no. 8. et 230. †
— Lourçirii Hook. et Arn. I. 227. no. 3.
— *lunata* Ham. I. 227. no. 1.
— macrantha Endl. I. 229. no. 27.
— macrophylla Lindl. I. 229. no. 34.
— maritima St. Hil. I. 228. no. 16.
— *micrantha* Lehm. V. 61. no. 3.
— microphylla Endl. I. 229. no. 30.
— montana St. Hil. I. 228. no. 12.
— Neesii Lehm. V. 62. no. 9.
— obovata M. K. I. 230. †
— pallida Lindl. I. 229. no. 31.
— parvifolia St. Hil. I. 228. no. 15.
— peltata Sm. *I. 227. no. 1.
— platystigma Lehm. V. 61. no. 1.
— porrecta Lehm. V. 62. no. 7.
— propinqua A. Cunn. I. 229. no. 24.
— pulchella Lehm. V. 61. no. 2.
— pygmaea DC. *V. 61. no. 3.
— ramellosa Lehm. V. 62. no. 6.
— rosulata Lehm. V. 61. no. 4.
— rotundifolia L. *I. 227. no. 7. I. 230. †
— *rotundifolia* Lour. I. 227. no. 3.
— sessilifolia St. Hil. I. 228. no. 11.
— spiralis St. Hil. I. 228. no. 21.
— stolonifera Endl. I. 229. no. 26.
— sulphurea Lehm. V. 62.. no. 8.
— tomentosa St. Hil. I. 228. no. 13.
— villosa St. Hil. I. 228. no. 18.
DROSERACEAE DC. I. 227. II. 768. V. 61.
Drosocarpium DC. I. 384. no. 9. II. 805. no. 1. 2. II. 809. no. 27.
Drosophyllum Lnk. *I. 230.
Drummondia mitelloides DC. II. 370. no. 1.
Druparia Silva Manso. °V. 765.
— racemosa Silva Manso. *V. 765. no. 1.
Drusa DC. *II. 387.
Dryadanthe Endl. II. 37.
— pusilla Wlprs. *II. 37. no. 1.
Dryadeae Vent. II. 13. V. 619.
Dryas L. II. 49.
— *chamaedryfolia* Richards. II. 49. no. 1.
— Drummondii Richards. II. 49. no. 1.
— *geoides* Pall. II. 49. no. 1.
— integrifolia Vahl. *II. 49. no. 2.
— *octopetala var.* Cham. et Schlchtd. II. 49. no. 2.
— *tenella* Bnks. II. 49. no. 2.
Drymaria Willd. I. 265. II. 770. V. 76.
— apetala Bartl. I. 265. no. 1.
Drymaria crassifolia Bth. V. 76. no. 2.
— Cubensis Regel. II. 770. no. 1.
— glaberrima Bartl. I. 265. no. 3.
— glandulosa Bartl. I. 265. no. 6.
— gracilis Schlchtd. II. 770. no. 2.
— grandiflora Bartl. I. 265. no. 2.
— grandiflora Schlchtd. I. 265. no. 7.
— hirsuta Bartl. I. 265. no. 4.
— holosteoides Bth. V. 76. no. 1.
— pauciflora Bartl. I. 265. no. 5.
— palustris Schlchtd. II. 770. no. 3.
— ramosissima Schlchtd. I. 265. no. 8.
— villosa Schlchtd. II. 770. no. 4.
Drymis Forst. I. 72. V. 14.
Drymis Halinet. V. 15. no. 1.
— axillaris Forst. *V. 14. no. 2.
— Granatensis L. *I. 72. no. 1.
— Winteri Forst. *V. 14. no. 1.
— *Winteri* Mart. I. 72. no. 1.
Drymonia Mart. II. 716. VI. 406.
— cristata Miquel. VI. 406. no. 1.
— longifolia Poepp. et Endl. II. 716. no. 1.
— ochroleuca Poepp. et Endl. II. 716. no. 2. (c. var. β. ibid.)
— punctata Lindl. II. 716. no. 3. VI. 406. †
Drymosphace Bth. III. 609.
Dryobalanops Grtnr. V. 125.
— Camphorae Colebr. V. 125. no. 1.
—? sericea Krthls. V. 125. no. 2.
Drypideae Fnzl. I. 282. II. 785.
Drypis Michel. I. 282.
— spinosa L. *I. 282. no. 1.
Dryptopetalum Arn. II. 71. V. 664.
— coriaceum Arn. *II. 71. no. 1. V. 664. no. 1.
Duabanga Hamilt. II. 114.
— grandiflora Hamilt. *II. 114. no. 1.
Dubautia Nutt. *II. 630.
Duboisia R. Br. III. 240. °III. 961. *VI. 633.
— myoporoides R. Br. III. 240. no. 1.
Dubyaea DC. *VI. 366.
Duchartrea Dcne. °VI. 736.
— viridiflora Dcne. VI. 737. no. 1.
Duchsnea fragarioides Sm. II. 26. no. 5.
Ducrosia Boiss. °V. 891.
— anethifolia Boiss. V. 892. no. 1.
— flabellifolia Boiss. V. 592. no. 2.
Dufourea velutina Martens et Galeotti. VI. 512. no. 1.
Dufresnia DC. II. 526.
— leiocarpa C. Koch. II. 526. no. 1.
Duglassia spinosa Amm. IV. 100. no. 1.
Duguetia St. Hil. I. 85. II. 747.
— bracteosa Mart. I. 86. no. 5.
— dicholepidota Mart. I. 85. no. 2.
— Gardneriana Mart. I. 86. no. 4.

Duguetia lanceolata St. Hil. I. 85. no. 1.
— Moricandiana Mart. I. 86. no. 3.
— Marcgraviana Mart. I. 86. no. 9.
— Pohliana Mart. I. 86. no. 7.
— Guitarensis Bth. II. 747. no. 1.
— Schlechtendaliana Mart. I. 86. no. 8.
— Spixiana Mart. I. 86. no. 6.
Dubaldea DC. *II. 594. *II. 952. no. 37.
Dulacia singularis Vellozo. V. 139. adn. ad no. 3.
Dulcamara flexuosa Mnch. III. 44. no. 43.
Dulcis amara Trag. III. 44. no. 43.
Dulongia H. B. Kth. I. 539.
— acuminata H. B. Kth. *I. 539. no. 1.
Dumasia DC. I. 750. II. 900.
— Capensis Eckl. et Zeyh. I. 750. no. 1.
— congesta Grah. I. 750. no. 2. *II. 900. no. 1.
Dumerilia Lssng. *II. 682. *VI. 324.
Dumosi (Aster) Torr. et Gr. II. 565.
Dunalia H. B. Kth. III. 122. °III. 955. °VI. 628.
— lycioides Miers. VI. 629. no. 2.
— solanacea H. B. Kth. III. 122. no. 1. VI. 629. no. 1.
Dunantia DC. *II. 622.
Dunbaria Wght. et Arn. I. 782.
— ferruginea Wght. et Arn. I. 782. no. 2.
— Heynei Wght. et Arn. I. 782. no. 1.
— latifolia Wght. et Arn. I. 782. no. 3.
— oblonga Arn. I. 782. no. 4.
Duperreya Gaudich. *VI. 542.
Dupuisia A. Rich. I. 550. V. 411.
— juglandifolia A. Rich. *I. 550. no. 1. V. 411. no. 1.
Duranta Linn. IV. 78.
— argentea Lodd. *IV. 80.
— *buxifolia* Poir. IV. 78. no. 4.
— *buxifolia* Willd. IV. 73. no. 4.
— *dentata* Rich. IV. 79. no. 8.
— Ellisia Linn. IV. 79. no. 6.
— Fischeri Mart. IV. 80. no. 10.
— *ilicifolia* Willd. IV. 74. no. 10.
— *inermis* Linn. IV. 79. no. 5.
— macrocarpa H. B. Kth. IV. 79. no. 8.
— microphylla Dsf. IV. 79. no. 7.
— Mutisii Linn. IV. 78. no. 2.
— obtusifolia H. B. Kth. IV. 78. no. 1.
— *parietariaefolia* Juss. IV. 78. no. 2.
— parietariaefolia Juss. *IV. 80.
— *phytolaccaefolia* Juss. IV. 78. no. 2.
— phytolaccaefolia Juss. *IV. 80.
Duranta Plumieri Jcq. IV. 79. no. 5.
— *spinosa* Linn. IV. 79. no. 5.
— triacantha Juss. IV. 78. no. 4.
— vestita Cham. IV. 79. no. 9.
— Xalapensis H. B. Kth. IV. 78. no. 3.
Durieua Boiss. et Reut. II. 421. V. 910.
Durieua ......? Merat. III. 436. no. 1.
— Abyssinica Boiss. V. 900. no. 2.
— Graeca Boiss. V. 900. no. 1.
— Hispanica Boiss. et Reut. II. 421. no. 1.
Durio Rmph. *I. 331.
Dutra Bernhardi. III. 17.
— *nigra* Rmph. III. 18. no. 14.
— *rubra* Rmph. III. 17. no. 13. γ.
Duvaua Kth. I. 550. V. 413.
— cuneata Gill. I. 551. no. 3.
— dependens DC. *I. 551. no. 2. (c. varr. α. β. et γ.)
— *dependens* Hook. I. 551. no. 4.
— *inebrians* Gill. I. 551. no. 2. β.
— *latifolia* Gill. I. 551. no. 2. γ.
— latifolia Gill. I. 551. no. 4.
— longifolia Lindl. V. 413. no. 1.
— ovata Lindl. I. 550. no. 1.
Dysemone Forst. V. 672. no. 1. obs.
Dysodia Cav. *II. 623. II. 987. VI. 171.
— anthemidifolia Bth. VI. 171. no. 1.
— tagetoides Torr. et Gr. II. 987. no. 1.
Dysophylla Blume. III. 579. °III. 979. VI. 661.
— auricularia Blume. III. 579. no. 3.
— crassicaulis Bth. III. 580. no. 7.
— cruciata Bth. III. 580. no. 4.
— myosuroides Bth. III. 579. no. 2.
— pumila Bth. III. 580. no. 8.
— quadrifolia Bth. III. 580. no. 5.
γ. pubescens.
β. velutina.
— stellata Bth. III. 581. no. 9.
— strigosa Bth. III. 579. no. 1.
— verticillata Bth. III. 580. no. 6. *VI. 661. no. 1.
Dysosmia DC. II. 221.
Dysoxylon Blume. I. 429.
— acuminatissimum Blume. I. 429. no. 2.
— alliaceum Blume. I. 429. no. 1.
— *excelsum* Blume. I. 430. no. 7.
— laxiflorum Blume. I. 429. no. 5.
— longifolium Blume. I. 429. no. 3.
— macrocarpum Blume. I. 429. no. 6.
— *mollissimum* Blume. I. 430. no. 6.
— simile Blume. I. 429. no. 4.

E

Ebenaceae (ex p.) Endl. II. 722. VI. 458.
EBENACEAE Vent. VI. 457.
Ebenidium Jaub. et Spach. II. 899. °V. 527.
— Lagopus Jaub. et Spach. *II. 899. no. 1. V. 528. no. 1.
Ebenotypus Jaub. et Spach. II. 897.
Ebenus L. I. 749. II. 897.
— *barbigera* Boiss. II. 898. no. 4.
— Cretica L. *I. 749. no. 1. II. 897. no. 1.
— erinacea Jaub. et Spach. II. 899. no. 10.
— ferruginea Jaub. et Spach. II. 899. no. 9.
— horrida Jaub. et Spach. II. 899. no. 8.
— *laguroides* Boiss. II. 898. no. 3.
— macrophylla Jaub. et Spach. II. 898. no. 5.
— Montbretii Jaub. et Spach. II. 898. no. 3.
— pinnata Dsf. II. 898. no. 6.
— *pinnata* Sibthrp. et Sm. II. 898. no. 2.
— pogonotropis Jaub. et Spach. II. 898. no. 4. (c. var. β. ibid.)
— Sibthorpii DC. II. 898. no. 2.
— *stellata* Boiss. II. 899. no. 7.
— tragacanthoides Jaub. et Spach. II. 899. no. 7.
Ecastophyllum cf. Hecastophyllum.
Ecbalium L. C. Rich. II. 199.
— agreste Rchb. *II. 199. no. 1.
Eccremocarpeae Endl. VI. 516.
Eccremocarpus Rz. et Pav. *VI. 516.
Ecdysanthera Hook. et Arn. *VI. 475.
— *scandens* Hsskrl. VI. 475. no. 1.
Echaltium Wght. *VI. 472.
Echenaïs Cass. II. 676.
— Sieversii Fisch. et Mey. II. 676. no. 1.
Echeveria DC. II. 259. II. 935. V. 794.
— acutifolia Lindl. II. 259. no. 6.
— bifida Schlchtd. II. 259. no. 3.
— bracteolata Lnk. Kltzsch. et Otto. II. 259. no. 9.
— campanulata Knze. II. 935. no. 2.
— gibbiflora DC. II. 269. †
— grandifolia Haw. II. 935. no. 1.
— lanceolata Nutt. II. 260. no. 11.
Echeveria lurida Lindl. II. 259. no. 8.
— mucronata Schlchtd. II. 259. no. 4.
— Peruviana Meyen. V. 794. no. 2.
— pubescens Schlchtd. II. 259. no. 2.
— pulverulenta Nutt. II. 259. no. 10.
— racemosa Schlchtd. et Cham. II. 259. no. 1.
— rosea Lindl. II. 259. no. 5.
— Scheerii Lindl. V. 794. no. 1.
— secunda Lindl. II. 259. no. 7.
Echieae A. P. DC. VI. 557.
Echinacea Mnch. II. 611. II. 977. VI. 159.
— angustifolia DC. *II. 977. no. 1.
—? atrorubens Nutt. II. 977. no. 2. β.? graminifolia.
— *pallida* Nutt. II. 977. no. 1.
— purpurea Mnch. *VI. 159. no. 1. (c. varr. β. γ. δ.)
— sanguinea Nutt. II. 611. no. 1.
— *sanguinea* Nutt. II. 977. no. 1. γ.
— *serotina* DC. VI. 159. no. 1. γ.
Echinatae Wght. et Arn. (Indigofera) I. 667.
Echinella DC. I. 35. no. 15. I. 37. no. 45. I. 39. no. 60. 61. I. 45. no. 138.
Echinocactus Lnk. et Otto. II. 309. II. 936. V. 813.
— *Acanthion* Hort. Berol. II. 314. no. 45.
— acanthodes Lem. II. 318. no. 77.
— aciculatus S. Dyck. II. 310. no. 9.
— acuatus Lnk. et Otto. II. 311. no. 20.
— *acutangulus* Zucc. II. 311. no. 21.
— acutissimus Otto et Dietr. II. 314. no. 44.
— *agglomeratus* Hort. II. 313. no. 34.
— *agglomeratus* Karw. II. 313. no. 35. β.
— anfractuosus Mart. II. 313. no. 40.
— arachnoideus Scheidw. II. 323. no. 116.
— araneolarius Rchb. II. 317. no. 70.
— armatus S. Dyck. II. 313. no. 36.
— arrigens Lnk. II. 318. no. 78.
— aulacogonus Lem. II. 316. no. 63. β. diacopaulax.
—? aureus Meyen. II. 315. no. 54.
— *Boutillieri* Parm. II. 324. no. 9.

Echinocactus campulacanthus Scheidw. II. 318. no. 79.
— *candicans* Hort. II. 330. no. 51.
— centeterius Lehm. II. 314. no. 47. *II. 936. no. 1.
— ceratistes Otto. II. 310. no. 8.
—? cereiformis DC. II. 315. no. 55.
— cinerascens Lemaire. V. 816. no. 16.
— *coccineus* Hort. Berol. II. 310. no. 6.
— concinnus Hook. V. 813. no. 1.
— coptonogonus Lemaire. V. 817. †
— cornigerus DC. II. 311. no. 24.
— corynacanthus Scheidw. II. 319. no. 85.
— corynodes Otto. II. 311. no. 21.
— Courantii Lem. II. 318. no. 73.
— crispatus DC. II. 313. no. 38.
β. horridus DC.
— Cumingii Hopffer. II. 936. no. 3.
— curviformis Miquel. II. 315. no. 57.
— debilispinus Berg. II. 319. no. 81.
— *denudatus* Link. et Otto. II. 325. no. 3.
— depressus DC. II. 315. no. 52.
— dichroacanthus Lem. II. 313. no. 39.
— dolichacanthus Lem. II. 316. no. 61.
— Echidne DC. II. 312. no. 26.
— echinoides Lemaire. V. 813. no. 3.
— Ehrenbergii Pfeiff. II. 321. no. 104.
— electracanthus Lem. II. 316. no. 60.
— *elegans* Hort. II. 328. no. 37.
— ensiferus Lem. II. 320. no. 96.
— equitans Scheidw. II. 323. no. 113.
— erinaceus Lem. II. 317. no. 72.
— exsculptus Otto. II. 314. no. 45.
— *Eyriesii* Turp. II. 324. no. 8.
— *Fischeri* H. Berol. II. 312. no. 32.
— flavo-virens Scheidw. II. 319. no. 83.
— Forbesii F. A. Lehm. II. 319. no. 88.
— formosus Pfeiff. II. 310. no. 5.
— fossulatus Scheidw. II. 321. no. 103.
— Galeottii Scheidw. II. 319. no. 86.
— gibbosus DC. II. 325. no. 5. V. 817. †
— gilvus Alb. Dietr. V. 814. no. 7.
— gladiatus Lk. et Otto. II. 310. no. 10.
— glaucescens DC. II. 312. no. 28.
— *glaucus* Karw. II. 312. no. 25.
— gracillimus Lem. II. 322. no. 110.
— grandicornis Lem. II. 320. no. 93.
— helophorus Lem. II. 316. no. 62.
β. laevior.
γ. longifossulatus.
— heteracanthus Mühlenpfordt. V. 814. no. 9.
— hexaëdrophorus Lem. II. 322. no. 112.
— hexaëdrus Scheidw. II. 323. no. 115.
— *holopterus* Miq. II. 319. no. 87.
— Hookeri Mühlenpfordt. V. 814. no. 8.
— horizonthalonius Lem. II. 317. no. 66.
Echinocactus hybocentrus Lehm. II. 314. no. 46.
— hyctrichacanthus Lem. II. 317. no. 65.
—? hyptiacanthus Lem. II. 322. no. 108.
— hypocrateriformis Otto et Dietr. II. 318. no. 76.
— hystrichocentrus Berg. II. 319. no. 82.
— *Hystrix* DC. II. 312. no. 27.
— Jenischianus Pfeiff. II. 317. no. 71.
— ingens Zucc. II. 311. no. 18.
— insculptus Scheidw. II. 323. no. 114.
— *interruptus* Hort. Berol. II. 314. no. 45.
— intortus DC. II. 315. no. 51.
β. purpureus Plum.
— intricatus Lk. et Otto. II. 311. no. 15.
— intricatus Salm-Dyck. V. 914. no. 6.
— irroratus Scheidw. II. 321. no. 99.
— Karwinskii Zucc. II. 310. no. 7.
— lancifer Alb. Dietr. II. 321. no. 98.
— lancifer Rchb. II. 320. no. 89.
— Langsdorffii Lehm. II. 310. no. 11.
— Leeanus Hook. V. 816. no. 18.
— *Lemairii* Monv. II. 309. no. 33.
— leucacanthus Zucc. II. 314. no. 49.
— *leucanthus* Gill. II. 324. no. 4. II. 325. no. 11.
— Linkii Lehm. II. 310. no. 2.
— Mackieanus Hook. II. 321. no. 101.
— macracanthus Vriese. II. 320. no. 91.
— macrodiscus Mart. II. 312. no. 31.
— Malletianus Lemaire. V. 813. no. 5.
— mammillarioides Hook. II. 317. no. 68.
— mammilifer Miquel. II. 317. no. 69.
— marginatus Salm-Dyck. V. 813. no. 4.
— Melmsianus Wegener. V. 815. no. 11.
— melocactiformis DC. II. 315. no. 53.
— melocactoides Lam. II. 315. no. 56.
— *Mirbelii* Lam. II. 319. no. 87.
— Monvillii Lem. II. 322. no. 106.
— multiflorus Hook. V. 816. no. 19.
— *multiplex* Hort. Berol. II. 324. no. 1.
— *muricatus* Hort. II. 310. no. 3.
— muricatus Otto. II. 310. no. 4.
— *myriostigma* Salm-Dyck. V. 817. no. 1.
— obrepandus Salm-Dyck. V. 815. no. 15.
— obvallatus DC. II. 313. no. 41.
— *obvallatus* Pfeiff. II. 321. no. 98.
— oligacanthus Mart. II. 311. no. 17.
— ornatus DC. II. 313. no. 37.
— *ornatus* DC. II. 319. no. 87.
— orthocanthus Lk. et Otto. II. 311. no. 16.
— Ottonis Lehm. II. 309. no. 1.
β. tenuispinus.
— oxygonus Lk. et Otto. V. 817. †
— *oxygonus* Lk. II. 325. no. 10.
— oxypterus Zucc II. 312. no. 27.

Echinocactus pachycentrus Lehm. II. 314. no. 48.
— parvispinus DC. II. 311. no. 13.
— pectinatus Scheidw. II. 321. no. 100.
— *pectinatus* Scheidw. V. 818. no. 2.
— *pectiniferus* Lem. II. 321. no. 100.
— pectiniferus Lem. II. 322. no. 111. V. 817. †
β. laevior. II. 322. no. 111.
— pentacanthus Lem. II. 320. no. 95.
— Pentlandi Hook. V. 813. no. 2.
— Pfeifferi Zucc. II. 312. no. 29.
— phyllacanthoides Lem. II. 320. no. 92.
— phyllacanthus Mart. II. 313. no. 42.
γ. spina foliacea unicâ Scheidw. } II. 314.
β. spinis foliaceis tribus Scheidw. } no. 42.
— platyacanthus Lk. et Otto. II. 312. no. 30.
— polyacanthus Lk. et Otto. II. 310. no. 12.
— *porrectus* Lem. II. 321. no. 104.
— pruinosus Otto. II. 311. no. 19.
— *pulchellus* Mart. II. 325. no. 4.
— pumilus Lem. II. 322. no. 107.
— pycnoxiphos Lem. II. 317. no. 64.
— *pyramidalis* Hort. II. 328. no. 37.
— quadrinatus Wegener. V. 815. no. 13.
— recurvus Lk. et Otto. II. 312. no. 25.
— Reichenbachii Terscheck. II. 320. no. 90.
— rhodacanthus S. Dyck. II. 310. no. 6.
— *robustus* Karw. II. 313. no. 34.
— robustus Otto. II. 313. no. 35.
γ. monstrosus.
β. prolifer.
— *rosaceus* Hort. II. 311. no. 21.
— *Salmianus* Lk. et Otto. II. 307. no. 21.
— scelothrix Lehm. II. 321. no. 102.
— Scopa Lk. et Otto. II. 314. no. 43.
β. candidus.
— *Sellowianus* Hort. II. 311. no. 21.
— Sellowianus Lk. et Otto. II. 311. no. 22.
— sessiliflorus Hort. Mack. II. 317. no. 67.
— sessiliflorus Pfeiff. II. 311. no. 23.
— solenacanthus Scheidw. II. 319. no. 84.
— *spectabilis* Hort. II. 313. no. 35.
— spina Christi Zucc. II. 312. no. 32.
— spinosus Wegener. V. 815. no. 12.
— spiralis Karw. II. 313. no. 34.
— stellatus Scheidw. II. 319. no. 80.
— *subgibbosus* Haw. II. 314. no. 45.
— submammulosus Lem. II. 318. no. 74.
— *subporrectus* Lem. II. 321. no. 104.
— *subuliferus* Hort. II. 313. no. 35.
— subuliferus Lk. et Otto. II. 315. no. 50.
— *sulcatus* Hort. II. 324. no. 1.
— sulphureus Alb. Dietr. V. 815. no. 14.
— *tenuispinus* Lk. et Otto. II. 309. no. 1.
— tenuispinus Lk. et Otto. *II. 936. no. 2.
— tephracanthus Lk. et Otto. II. 311. no. 14.
Echinocactus Terscheckii Rchb. II. 315. no. 58.
— tetracanthus Lem. II. 318. no. 75.
— tetracentrus Lem. II. 320. no. 94.
— thrincogonus Lem. II. 322. no. 109.
β. elatior.
— tortuosus Lk. et Otto. II. 310. no. 3.
— tortus Scheidw. II. 319. no. 87.
— tuberculatus Lk. et Otto. II. 312. no. 33.
— *tubiflorus* Hortor. II. 324. no. 2.
— turbiniformis Pfeiff. II. 321. no. 105.
— undulatus Alb. Dietr. V. 814. no. 10.
— Vanderaeyi Lem. II. 316. no. 59.
— Williamsii Lemaire. V. 816. no. 17.
— *xanthacanthus* Miquel. II. 308. no. 25.
— xiphacanthus Miq. II. 320. no. 97.
Echinocarpus Blume. I. 202.
— Sigun Blume. *I. 202. no. 1.
Echinocystis Torr. et Gr. II. 203.
— lobata Torr. et Gr. *II. 203. no. 1.
Echinodiscus Bth. I. 793.
— erinaceus Bth. *I. 793. no. 1.
Echinolobium DC. (Hedysarum) I. 744. II. 892. V. 527. no. 1.
Echinomelocactus Clusius II. 305. no. 9.
— *sive Melocactus echinatus Indiae* Lobel. II. 305. no. 9.
— *major non lutescens* Herm. II. 305. no. 9.
Echinomeria Nutt. II. 611. *VI. 159.
Echinomeria Nutt. II. 983.
— apetala Nutt. *II. 611. no. 1.
— *apetala* Nutt. II. 983. no. 8.
Echinonyctanthus Decaisnianus Lem. II. 324. no. 5.
— *Eyriesii* Lem. II. 324. no. 8.
— *leucanthus* Lem. II. 324. no. 4.
— *multiplex* Lem. II. 324. no. 1.
— *nigrispinus* Lem. II. 324. no. 3.
— *oxygonus* Lem. II. 325. no. 10.
— *pictus* Lem. II. 324. no. 7.
— *Schelhasii* Lem. II. 324. no. 9.
— *tubiflorus* Lem. II. 324. no. 2.
— *turbinatus* Lem. II. 324. no. 6.
Echinophora Tournef. *II. 424. V. 912.
—? *Caspica* DC. II. 424. no. 4.
—? flabellifolia Boiss. V. 912. no. 1.
— radians Boiss. V. 912. no. 2.
Echinopoda Prosp. V. 466. no. 9.
— *di Candia* Pona. V. 466. no. 9.
Echinops Linn. II. 667. VI. 279.
— albicaulis Kar. et Kir. II. 667. no. 3.
— albidus Boiss. et Spruner. VI. 280. no. 3.
— Aucheri Boiss. VI. 280. no. 4.
— Bithynicus Boiss. VI. 281. no. 8.
— Bovei Boiss. VI. 280. no. 7.
— ceratophorus Boiss. VI. 281. no. 9.
— *corymbosus* Lnk. VI. 731. no. 1.

Echinops hispidus Fresen. II. 667. no. 1.
— integrifolius Kar. et Kir. II. 667. no. 5.
— Kotschyi Boiss. VI. 280. no. 6.
— macrochaetus Fresen. II. 667. no. 2.
— Rochelianus Griseb. VI. 280. no. 2.
— *Ruthenicus* Roch. VI. 280. no. 2.
— Sartorianus Boiss. et Hldrch. VI. 279. no. 1.
— Taygeteus Boiss. et Hldrch. VI. 280. no. 5.
— tricholepis Schrenk. II. 667. no. 4.
Echinopsideae Lssng. II. 667. VI. 279.
Echinopsis Zucc. II. 323. V. 818.
— amoena Scheidweil. V. 818. no. 1.
— campylacantha Pfeiff. II. 325. no. 11.
— Decaisneana Wlprs. II. 324. no. 5.
— Eyriesii Pfeiff. et Otto. II. 324. no. 8.
— leucantha Wlprs. II. 324. no. 4.
— multiplex Pfeiff. et Otto. II. 323. no. 1.
— nigrispina Wlprs. *II. 324. no. 3.
— oxygona Pfeiff. et Otto. II. 324. no. 10.
— pectinata Fennel. *V. 818. no. 2.
— picta Wlprs. *II. 324. no. 7.
— Schelhasii Pfeiff. et Otto. II. 324. no. 9.
— turbinata Pfeiff. et Otto. II. 324. no. 6.
— Zuccarinii Pfeiff. II. 324. no. 2.
Echinopterys Adr. Juss. °V. 194.
— lappula Adr. Juss. V. 194. no. 1.
Echinospartum Spach. V. 467.
Echinospermum Swrtz. VI. 562.
— Kotschyi Boiss. VI 562. no. 1.
Echinosphace Bth. III. 671.
Echiochilon Dsf. *VI. 557.
Echiteae G. Don. VI. 472.
Echites P. Br. VI. 475.
— aspera Martens et Galeotti. VI. 476. no. 6.
— *atropurpurea* Lindl. V. 478. no. 1.
— brevipes Bth. VI. 475. no. 1.
— *emarginata* Vellozo. VI. 477. no. 2.
— glaucescens Martens et Galeotti. VI. 476. no. 4.
— jasminiflora Martens et Galeotti. VI. 476. no. 2.
— lanata Martens et Galeotti. VI. 476. no. 5.
— lanuginosa Martens et Galeotti. VI. 477. no. 9.
— *Primula* Hort. VI. 742.
— ptarmica Poepp. et Endl. VI. 476. no. 7.
— *Sinensis* Hort. Angl. VI. 491. no. 2.
— suaveolens Martens et Galeotti. VI. 477. no. 8.
— suberecta Jcq. VI. 477. †
— tubiflora Martens et Galeotti. VI. 476. no. 3.
Echium Buck. *VI. 557.
Eckebergia Sparm. I. 431.
— Capensis Sparm. *I. 431. no. 2.
Eckebergia Indica Rxbrg. I. 428. no. 1.
— Senegalensis A. Juss. I. 431. no. 1.
Eclipta Linn. II. 602.
— hirsuta Bartl. II. 602. no. 1.
— *integrifolia* Spr. II. 958. no. 1.
Eclipteae Lssng. II. 602. VI. 145.
Eclopes Gaertn. *II. 650.
Ecordatae DC. (Mikania) VI. 713. no. 10.
Ectadium E. Mey. VI. 481.
— oblongifolium Meisn. VI. 481. no. 1.
Ecthrus trivialis Lour. I. 110. no. 1.
Edentulae Steven. (Pedicularis) III. 427.
Edgeworthia buxifolia Falconer. VI. 453. no. 2.
Edosmia Nutt. V. 862.
— Gairdneri Torr. et Gr. V. 862. no. 1.
— *montana* Nutt. V. 862. no. 1. α.
— *Oregana* Nutt. V. 862. no. 1. β.
— *pracalta* Nutt. V. 862. no. 1. α.
Edwardsia Salisb. I. 806.
— Chilensis Miers. *I. 806. no. 2.
— intermedia Tausch. I. 806. no. 5.
— Macnabiana Grah. I. 806. no. 4.
— microphylla Salisb. I. 806. †
— mollis Royle. I. 806. no. 1.
— myriophylla Wndrth. I. 806. no. 3.
— tetraptera R. Br. I. 806. †
Egeria Neraud. II. 525.
— ...... Neraud. *II. 525. no. 1.
Egletes Lssng. II. 635.
— Arkansana Nutt. *II. 635. no. 2.
— floribunda Poepp. et Endl. II. 635. no. 1.
Ehrenbergia tribuloides Mart. I. 493. no. 3.
Ehretia Linn. VI. 554.
— *articulata* Willd. IV. 75. no. 20.
— asperula Zollinger et Moritzi. VI. 554. no. 1.
— *duplicata* N. ab E. VI. 547. no. 2.
— *halimifolia* Hérit. III. 113. no. 1. VI. 547. no. 1.
— violacea Kth. VI. 744.
EHRETIACEAE Meisn. VI. 553.
Ehretiaceae Schrad. VI. 554.
Ehretieae A. P. DC. VI. 554.
Eichwaldia Ldb. II. 268. V. 808.
— Oxiana Ldb. *II. 268. no. 1. V. 809. no. 2.
— Persica Boiss. V. 808. no. 1.
Ekebergia Sparm. vid. Eckebergia.
Elachia DC. *II. 706.
Elachothamnus DC. *II. 595. *II. 952. no. 22.
Elaeocarpeae Endl. I. 363. II. 800. V. 120.
ELAEOCARPEAE Juss. (ex p.) I. 352. I. 363. V. 115.
Elaeocarpeae verae Endl. I. 363.
Elaeocarpus L. I. 363. II. 800. V. 120.
— angustifolius Blume. I. 361. no. 11.

Elaeocarpus bifida Hook. et Arn. I. 365. no. 1. V. 121. no. 1.
— *bilocularis* Rxb. I. 365. no. 3.
— *copallifer* Retz. V. 126. no. 1.
— coriaceus Hook. I. 363. no. 2.
— cuneatus Wght. I. 363. no. 3.
— *dentatus* Vahl. V. 121. no. 1.
— *Dicera* Vahl. V. 121. no. 1.
— floribundus Blume. I. 364. no. 12.
— glaber Blume. I. 364. no. 17.
— Hinau A. Cunn. V. 120. no. 1.
— lanceaefolius Rxb. II. 801. †
— lanceolatus Blume. I. 364. no. 10.
— longifolius Blume. I. 364. no. 13.
— macrophyllus Blume. I. 364. no. 18.
— monoceroides Wght. I. 363. no. 4.
— nitidus Jack. I. 364. no. 7.
— oblongus Wall. II. 801. †
— *obovatus* Arn. I. 363. no. 2.
— obovatus Arn. I. 363. no. 5.
— obovatus G. Don. II. 800. no. 2.
— obtusus Blume. I. 364. no. 19.
— parviflorus Spanoghe. I. 364. no. 9.
— pauciflorus A. Rich. I. 364. no. 20.
— photiniaefolius Hook. et Arn. I. 363. no. 1.
— pubescens Hook. I. 364. no. 8.
— resinosus Blume. I. 364. no. 16.
— robustus Rxb. II. 801. †
— *serrulatus* Rxb. I. 365. no. 3.
— stipularis Blume. I. 364. no. 14.
— strictus Lamb. II. 800. no. 1.
— tomentosus Blume. I. 364. no. 15.
— *tuberculata* Rxb. I. 365. no. 3.
— villosus Arn. I. 363. no. 6.
Elaeochytris cachroides Fnzl. V. 883. no. 8.
Elaeodendreae Endl. I. 536.
Elaeodendron Jcq. I. 536. V. 402.
Elaeodendron Jcq. I. 538.
— Capense Eckl. et Zeyh. I. 538. no. 18.
— curtipendulum Endl. I. 538. no. 20.
— ellipticum Dcne. I. 536. no. 1.
— *glaucum* Wall. I. 536. no. 3.
— integrifolium G. Don. I. 538. no. 19.
— micranthum W. J. Hook. V. 402. no. 2.
— *Neelgherrense* Wall. I. 531. no. 17.
— paniculatum Wght. et Arn. I. 536. no. 3. (III. Emend. p. 3.)
— papillosum Hochstett. V. 402. no. 1.
— Roxburghii Wght. et Arn. I. 536. no. 2.
Elaeoselineae Koch. II. 420. V. 900.
Elaeoselinum Koch. II. 420.
— foetidum Boiss. II. 420. no. 3.
— Lagascae Boiss. II. 420. no. 2.
— millefolium Boiss. II. 420. no. 1.
Elaeosticta Fnzl. ° V. 858.
— meifolia Fnzl. V. 858. no. 1.
Elaphrium Jcq. I. 558. II. 830. V. 419.
— *Capense* DC. I. 559. no. 2.
— cuneatum Schlchtd. V. 419. no. 1.
— Hindsianum Bth. V. 419. no. 3.
— *inaequale* DC. I. 559. no. 1.
—? pubescens Schlchtd. II. 830. no. 1.
— rhoifolium Bth. V. 419. no. 2.
— simplicifolium Schlchtd. II. 830. no. 2.
Elaterium Jcq. II. 203.
— pubescens Bth. II. 203. no. 2.
—? ribiflorum Schlchtd. II. 203. no. 1.
—? *ribiflorum* Schlchtd. V. 762. no. 2.
ELATINACEAE Lindl. I. 283.
Ἐλατίνη Dioscor. III. 194. no. 19.
Elatine Linn. I. 283. V. 83.
Elatine Matth. III. 194. no. 19.
— Alsinastrum Linn. I. 284. no. 10. V. 86. no. 10.
— *altera* Ger. III. 194. no. 19.
— ambigua Wght. I. 284. no. 3. V. 84. no. 3.
— *Americana* W. Arnott. I. 283. no. 1. V. 83. no. 1.
— *ammanioides α.* Wght. I. 285. no. 9.
— campylosperma Seubert. I. 284. no. 6. V. 85. no. 6.
— *Cymbalaria* Mnch. III. 190. no. 9.
— *Dioscoridis* Lob. III. 193. no. 18.
— *Fabri* Grénier. I. 284. no. 8. V. 85. no. 8. *β.*
— *foemina folio anguloso* J. Bauh. III. 194. no. 19.
— *folio acuminato* Park. III. 194. no. 19.
— *folio acuminato, flore coeruleo* C. Bauh. III. 194. no. 19. *β.*
— *folio subrotundo* C. Bauh. III. 193. no. 18.
— gratioloides A. Cunningh. I. 284. no. 4. V. 84. no. 4.
— *hastata* Mnch. III. 194. no. 19.
— *hexandra* Decand. I. 284. no. 9. *α.*
— *Hydropiper* Engl. botan. I. 284. no. 9. *α.*
— Hydropiper Linn. I. 284. no. 5. V. 84. no. 5.
— *Hydropiper* Schkbr. I. 284. no. 9. *β.*
— *Hydropiper β.* Linn. I. 284. no. 9. *α.*
— *Hydropiper β. pedunculata* Moris. I. 284. no. 6. V. 85. no. 6.
— *luxurians* Delil. I. 286. no. 11.
— macropoda Gussone. I. 284. no. 8. V. 85. no. 8.
β. erecta V. 85. no. 8.
— *major* A. Braun. I. 284. no. 9. *β.*
— *mas folio subrotundo* J. Bauh. III. 193. no. 18.
— minima Fisch. et Mey. I. 283. no. 1. V. 83. no. 1.
— *nodosa* W. Arnott. I. 284. no. 5. V. 85. no. 5.

Elatine orthosperma Düben. I. 284. no. 7. V. 85. no. 7.
— *ovata* Gray. III. 193. no. 18.
— paludosa Seubert. I. 284. no. 9. V. 86. no. 9.
α. hexandra } Seubert. I. 284. no. 9.
β. octandra }
— *prima* Tabern. III. 193. no. 18.
— *Schkuhriana* Hayne. I. 284. no. 5. V. 85. no. 5.
— *siphosperma* Dumort. I. 284. no. 5. V. 85. no. 5.
— *spathulata* Gorski. I. 284. no. 7. V. 85. no. 7.
— *Texana* Torrey et Gray. I. 285. no. 4.
— triandra Schkhr. I. 283. no. 2. V. 83. no. 2.
β. micropoda Schkhr. V. 83. no. 2.
— *verticillata* Lam. I. 284. no. 10. V. 87. no. 10.
ELATINEAE Cambess. I. 283. II. 786. V. 83.
Elatinella Seubert. I. 284. V. 84.
Elatinoides Chavannes. III. 192.
Elatinoides Seubert. I. 285.
Electra DC. *II. 622.
Eleiotis DC. *I. 747.
— *Rottleri* Wght. et Arn. I. 747. no. 1.
Elephantopeae Cass. II. 543. VI. 102.
Elephantopus Cass. II. 543.
Elephantopus Linn. II. 543. VI. 102.
— palustris Gardn. VI. 102. no. 1.
— sinuatus Zolling. et Moritzi. VI. 703.
Elephantorrhiza Bth. I. 861. °V. 581.
— Burchellii Bth. *I. 861. no. 1. *V. 581. no. 1.
Elephantosis Lessing. II. 543. VI. 102.
Elephas G. Don. III. 433.
— *Campoclarensium* Columm. III. 433. no. 2.
— *incurva* G. Don. III. 433. no. 1.
— *Italica flore magno, proboscide surrecta* Tournef. III. 433. no. 2.
— *orientalis* M. Bieb. III. 433. no. 2.
— *orientalis flore magno, proboscide incurva* Tournef. III. 433. no. 1.
— *orientalis flore parvo, proboscide surrecta* Tournef. III. 433. no. 2. *β.*
— *recta* G. Don. III. 433. no. 2.
Eleutherospermum C. Koch. II. 426. *VI. 921.
— grandifolium C. Koch. II. 426. no. 1.
Eliaea Cambess. I. 391.
— articulata Cambess. *I. 391. no. 1.
Elisanthe Fzl. II. 779. V. 82. no. 6.
Elizabetha Schomb. I. 843.
— coccinea Schomb. I. 844. no. 2.
— princeps Schomb. I. 843. no. 1
Ellimia ruderalis Nutt. II. 754. no. 1.
Elliotia Mhlnbrg. *II. 727. °VI. 422.
Elliotia racemosa Mühlnbrg. *VI. 422. no. 1.
Ellipsaria DC. I. 176.
Ellisia Linn. *VI. 524.
— *acuta* Linn. IV. 79. no. 6.
— *frutescens quandoque spinosa etc.* P. Br. IV. 79. no. 6.
Ellobum Blume. III. 277. °III. 964.
Ellobum Wlprs. VI. 644.
— *fulgens* Lilja II. 95. †
— montanum Blume. III. 277. no. 1.
Elodea Adans I. 390. II. 809.
— *axillaris* Spach. I. 391. no. 5.
— *Drummondii* Spach. I. 391. no. 4.
— *floribunda* Spach. I. 391. no. 5.
—? formosa W. Jack. I. 390. no. 2.
— *Fraseri* Spach. I. 391. no. 4.
— palustris Ldb. II. 809. no. 1.
— *pauciflora* Spach. I. 391. no. 5.
— petiolata Prsh. *I. 391. no. 5.
— Russegeri Wlprs. I. 391. no. 3.
—? Sumatrana W. Fack. I. 390. no. 1.
— tubulosa Prsh. *I. 391. no. 6.
— *tubulosa* Spach. I. 391. no. 5.
— Virginica Nutt. *I. 391. no. 4.
Elodeae Endl. I. 390.
Elsholtzia Willd. III. 581. °III. 979.
Elsholtzia Willd. III. 584.
— blanda Bth. III. 582. no. 5.
— cristata Willd. III. 584. no. 15.
— densa Bth. III. 583. no. 12.
— eristostachya Bth. III. 583. no. 11.
— flava Bth. III. 581. no. 1.
— *Javanica* Blume. III. 512. no. 51.
— incisa Bth. III. 582. no. 6.
— integrifolia Bth. III. 583. no. 9.
— leptostachya Bth. III. 581. no. 2.
— mollissima Bth. III. 582. no. 8.
— *ocymoides* Pers. III. 496. no. 6.
— *oppositifolia* Poir. III. 584. no. 1.
— *paniculata* Willd. III. 576. no. 1.
— pilosa Bth. III. 583. no. 10.
— polystachya Bth. III. 581. no. 3.
— pubescens Bth. III 582. no. 7.
— pusilla Bth. III. 583. no. 13.
— Stauntoni Bth. III. 582. no. 4.
— strobilifera Bth. III. 583. no. 14.
Elsholtzieae Endl. III. 581. III. 979.
Elsneria Wlprs. °V. 843.
— crataegifolia Wlprs. V. 843. no. 1.
Elvasia DC. *I. 525.
Elvira DC. *II. 603.
Elwendia Boiss. °V. 852.
— caroides Boiss. V. 852. no. 1.
Elythranthe Blume. II. 443.
Elythropappus Cass. *II. 648.
Ἐλξίνη Dioscorid. III. 195. no. 26.

Embelia Burm. VI. 448.
— angustifolia Alph. DC. *VI. 448. no. 1.
— *urophylla* Wall. V. 140. no. 1.
— vestita Rxb. *VI. 448. no. 2.
Embelieae Alph. DC. VI. 448.
Emerus Tournef. I. 721. II. 887.
— *aculeata* Schum. et Thonn. I. 680. no. 1.
— *pubescens* Schum. et Thonn. I. 680. no. 3. I. 724. no. 1.
Emilia Cass. *II. 651.
Emmenanthe Bth. *VI. 525.
Emmeorhiza Pohl. II. 469. *II. 524. VI. 35.
— Brasiliensis Wlprs. *II. 469. no. 1. VI. 35. no. 1.
— Pohliana Prsl. VI. 36. no. 2.
Emodiana Jaub. et Spach. II. 843.
Emmotum Dsvx. °V. 137.
— fagifolium Dsvx. V. 137. no. 1.
Empedoclea St. Hil. I. 66.
Empedoclea Rafin. III. 848. VI. 682. no. 1.
— alnifolia St. Hil. *I. 66. no. 1.
— *montana* Raf. III. 849. no. 8.
Empetrum acetosum Rmph. II. 206. no. 1.
Emphysopus Hook. fil. °VI. 719.
— Gunnii Hook. fil. VI. 719. no. 1.
Empleurum Soland. *I. 517.
Enarthrocarpus Labill. *I. 189.
Encelia Adans. II. 612. VI. 161.
— Californica Nutt. II. 612. no. 2.
— conspersa Bth. VI. 161. no. 1.
— nivea Bth. VI. 161. no. 2.
— tomentosa Wlprs. II. 612. no. 1.
Enchysia Prsl. *VI. 380.
— erecta DC. *VI. 734. no. 1.
— repens Prsl. var. reflexa Knze. VI. 734. no. 2.
Encliandra Zucc. II. 94.
Encopea Prsl. °VI. 37.
— umbellifera Prsl. VI. 37. no. 1.
Encurea Aubl. *I. 414.
Endespermum Blume. *I. 799.
Endlichera Brasiliensis Prsl. II. 469. no. 1. VI. 35. no. 1.
Endoptera DC. II. 695.
Endoptera DC. *VI. 359.
Endotropis Endl. *VI. 486.
Endraianthus Alph. DC. *VI. 382.
Endressia Gay. II. 405.
— Pyrenaica Gay. *II. 405. no. 1.
Enemion Raf. I. 48.
Enemion Raf. *I. 49.
Engelmannia Pfeiffer. VI. 544. adn.
Engelmannia Torr. et Gr. II. 605. II. 976. VI. 149.
— *migrans* Pfeiff. VI. 544. adn. no. 1.
— *pinnatifida* Torr. et Gr. II. 976. no. 1. VI. 149. no. 1.
Engyantha Mart. I. 404.
Enhydra Lour. *II. 623.
Enicostema Blume. *VI. 502.
Enkyanthus DC. II. 730.
— uniflorus Bth. II. 730. no. 1.
Enosanthes flavescens A. Cunn. II. 154. no. 1.
— *virgata* A. Cunn. II. 154. no. 2.
Enslenia Nutt. VI. 483.
— albida Nutt. *VI. 483. no. 1.
Entada L. I. 858. °V. 578.
— *Africana* Guill. et Perr. I. 858. no. 2.
— Gandu Hffmsgg. I. 858. no. 6.
—? myriadenia Bth. I. 858. no. 5.
—? Natalensis Bth. I. 858. no. 4.
— polyphylla Bth. I. 858. no. 3.
— scandens Bth. I. 858. no. 1.
Entelea R. Br. I. 353. V. 117.
— australis R. Br. *I. 353. no. 1. V. 117. no. 1.
— palmata Lindl. V. 117. no. 2.
Enterolobium Martius. °V. 621.
—? Blancheti Bth. V. 621. no. 2.
—? ellipticum Bth. V. 622. no. 3.
— *glaucescens* Martius. V. 621. no. 1.
— Mongollo Martius. *V. 622. no. 4.
—? *Tamborik* Mart. V. 619. no. 62.
— Timboüva Martius. V. 621. no. 1.
Entoganum laevigatum Soland. V. 387. no. 1.
Epacreae Rchb. II. 732. VI. 429.
EPACRIDEAE R. Br. II. 731. VI. 423.
Epacris Cav. II. 732. VI. 429.
— coccinea Hortor. VI. 442. †
— grandiflora Hort. VI. 432. †
— impressa Labill. *VI. 429 no. 2.
β. albo-rosea A. Dietr. VI. 430. no. 2.
γγ. blanda A. Dietr. VI. 431. no. 2.
μμ. brachyantha A. Dietr. VI. 432. no. 2.
αα. breviflora A. Dietr. VI. 431. no. 2.
λλ. coccinea A. Dietr. VI. 432. no. 2.
η. Deckeri A. Dietr. VI. 430. no. 2.
λ. delicatula A. Dietr. VI. 430. no. 2.
υ. dissitiflora A. Dietr. VI. 431. no. 2.
ρ. eximia A. Dietr. VI. 430. no. 2.
μ. floribunda A. Dietr. VI. 431. no. 2.
κκ. kermesina A. Dietr. VI. 432. no. 2.
α. leucantha A. Dietr. VI. 430. no. 2.
κ. longiflora A. Dietr. VI. 430. no. 2.
ββ. macrantha A. Dietr. VI. 431. no. 2.
ο. magnifica A. Dietr. VI. 430. no. 2.
γ. pudica A. Dietr. VI. 430. no. 2.
εε. pulcherrima A. Dietr. VI. 431. no. 2.
φ. puniceà A. Dietr. VI. 431. no. 2.
ξ. purpurascens A. Dietr. VI. 430. no. 2.
ζ. recurvata A. Dietr. VI. 430. no. 2.
τ. Reineckei A. Dietr. VI. 431. no. 2.
ι. rhodantha A. Dietr. VI. 430. no. 2.

Epacris impressa Labill.
μ. robusta A. Dietr. VI. 430. no. 2.
ζζ. rosea A. Dietr. VI. 431. no. 2.
ηη. rubella A. Dietr. VI. 431. no. 2.
ε. rubicunda A. Dietl. VI. 430. no. 2.
ϑ. semicolorata A. Dietr. VI. 430. no. 2.
π. speciosa A. Dietr. VI. 430. no. 2.
ν. splendens A. Dietr. VI. 430. no. 2.
σ. subdisticha A. Dietr. VI. 431. no. 2.
ω. tenuis A. Dietr. VI. 431. no. 2.
ϑϑ. tubiflora A. Dietr. VI. 431. no. 2.
χ. variegata A. Dietr. VI. 431. no. 2.
δ. variiflora A. Dietr. VI. 430. no. 2.
δδ. virginea A. Dietr. VI. 431. no. 2.
— *longifolia* Bnks. et Soland. VI. 434. no. 3.
— *longifolia* Forst. VI. 435. no. 6.
— miniata Lindl. VI. 429. no. 1.
— nivalis Lodd. VI. 432. †
— *rosmarinifolia* Forst. VI. 436. no. 13.
— *secunda* Poir. VI. 434. no. 1.
— tomentosa Lindl. II. 732. no. 1.
— variabilis Lodd. VI. 432. †
— *vaccinioides* Lhotsky. V. 429. no. 37.
Epallage DC. *II. 633.
Ephalthes Cass. *II. 600. *II. 952. no. 1.
Eperua Aubl. *I. 844.
Epeteiorhiza G. Don. III. no. 24.
Ephedroideae Bth. (Mimosa) I. 882.
Ephedrospartum (Genista) Spach. V. 463.
Ephialis pentaphylla Bnks. et Soland. IV. 87. no. 27.
Epibrissonia E. Mey. I. 673.
Epicharis Blume. I. 430.
— altissima Blume. I. 430. no. 4.
— cauliflora Blume. I. 430. no. 1.
— densiflora Blume. I. 430 no. 3.
— Kunthiana A. Juss. I. 430. no. 6.
— sericea Blume. I. 430. no. 2.
—? setosa Spanoghe. I. 430. no. 7.
— speciosa A. Juss. I. 430. no. 5.
Epiclinastrum Candollei Bojer. VI. 316. no. 13.
— *hirsutum* Bojer. VI. 316. no. 14.
Epigaea Swrtz. *II. 727.
Epilepis Bth. II. 613. VI. 161.
— rudis Bth. *II. 613. no. 1. VI. 161. no. 1.
Epilinella Pfeiffer. VI. 544. adn.
— cuscutoides Pfeiffer. VI. 544. no. 1. adn.
Epilobieae Endl. II. 76. V. 665.
Epilobium Linn. II. 90. V. 665.
— affine Bongard. II. 91. no. 18.
— alpinum L. *II. 90. no. 6.
α. parvum.
— *alpinum β. majus* Wahlbrg. II. 90. no. 6. γ.
— *alpinum* var. *nutans* Hornem. II. 90. no. 6. α.
Epilobium alsinifolium Vill. II. 90. no. 6. γ.
— alsinoides A. Cunn. II. 92. no. 31.
— anceps Fries. II. 90. no. 7.
— *Andicolum* Gill. II. 92. no. 22.
— angustifolium L. *II. 90. no. 1.
— *Arnottianum* Gill. II. 92. no. 22.
— atriplicifolium A. Cunn. II. 93. no. 33.
— brachycarpum Prsl. II. 92. no. 23.
— canescens Deen Kalaar. II. 93. no. 42.
— canescens Endl. II. 93. no. 41.
— Capense Buchinger. V. 665. no. 2.
— cinereum A. Rich. II. 92. no. 27.
— confertifolium Hook. fil. V. 666. no. 5.
— confertum A. Cunn. II. 93. no. 37.
— decumbens Dumort. II. 91. no. 10.
— *denticulatum* Rz. et Pav.? II. 92. no. 22.
— *fastigiatum* Nutt. II. 91. no. 18.
— *foliosum* Nutt. II. 92. no. 19.
— *fruticosum* Lour. II. 72. no. 2.
— gemmascens C. A. Mey. II. 91. no. 12.
— *glandulosum* Lehm. II. 91. no. 16.
— *grandiflorum* Jcquem. II. 91. no. 14.
— haloragifolium A. Cunn. II. 93. no. 39.
— hirtigerum A. Cunn. II. 93. no. 35.
— *Hornemanni* Rchb. II. 90. no. 6. α.
— incanum A. Cunn. II. 93. no. 34.
— Lamyi F. W. Schultz. V. 665. no. 1.
— latifolium L. *II. 90. no. 2. (et var. β.)
— laxum Royle. II. 91. no. 13.
— linnaeoides Hook. fil. V. 666. no. 4.
— luteum Prsh. *II. 90. no. 4.
— macranthum Hook. II. 93. no. 40.
— microphyllum A. Rich. II. 92. no. 25.
— minutum Lindl. II. 91. no. 19.
β.? foliosum.
— molle Torr. II. 91. no. 17.
— nerterioides A. Cunn. II. 92. no. 32.
— nivale Meyen. V. 666. no. 3.
— nummularifolium A. Cunn. II. 92. no. 28.
— opacum Lehm. II. 90. no. 3.
— *origanifolium* Lam. II. 90. no. 6. γ.
— pallidiflorum Soland. II. 93. no. 38.
— paniculatum Nutt. II. 92. no. 20.
— parviflorum Schreb. *II. 91. no. 11.
β. latifolium.
γ. micranthum.
— pedicellare Prsl. II. 92. no. 22.
— penduculare A. Cunn. II. 92. no. 29.
— pubens A. Rich. II. 92. no. 26.
— puberulum Hook. et Arn. II. 92. no. 21.
— *pusillum* Gill. II. 90. no. 6.
— repens Schlchtd. II. 92. no. 24.
— sparsifolium Dumort. II. 90. no. 8.
— speciosum Dcne. II. 91. no. 14.
— *spicatum* Lam. II. 90. no. 1.
— stereophyllum Fresen. II. 91. no. 15.

Epilobium strictum Mühlbrg. II. 91. no. 17.
— suffruticosum Nutt. II. 90. no. 5.
— tetragonum Linn. *II. 91. no. 16.
— *tetragonum* L.? II. 92. no. 22.
— thymifolium R. Cunn. II. 92. no. 30.
— umbrosum Dumort. II. 91. no. 9.
— virgatum A. Cunn. II. 93. no. 36.
Epimedium L. I. 100. V. 18.
— alpinum L. *I. 101. no. 6.
— *alpinum β.* DC. I. 101. no. 4.
— *diphyllum* Lodd. I. 101. no. 1.
— elatum Morr. et Dcne. I. 101. no. 5.
— *hexandrum* Hook. I. 101. no. 1.
— macranthum Morren et Dcne. I. 100. no. 1. V. 18. †
— Muschschianum Morren et Dcne. I. 100. no. 2.
— pteroceras Morren. V. 18. no. 1.
— pubigerum Morr. et Dcne. I. 101. no. 4.
— violaceum Morren et Dcne. I. 100. no. 3. V. 18. †
Epiphejus Nutt. III. 457. °III. 974.
— Americana Nutt. III. 457. no. 1.
Epiphyllum Pfeiff. II. 342. II. 936. V. 820.
— *Ackermanni* How. II. 341. no. 1.
— *alotum* Haw. II. 342. no. 5. II. 343. no. 6.
— Altensteinii Pfeiff. II. 342. no. 2.
— *ciliare* Hort. II. 342. no. 3.
— *ciliatum* Hort. II. 342. no. 3.
— *crenulatum* Hort. II. 342. no. 2.
— *crispatum* Haw. II. 342. no. 1.
— *Hookeri* Haw. II. 341. no. 5.
— *hybridum* Hort. II. 338. no. 129. β.
— *latifrons* Zucc. II. 341. no. 4.
— *oxypetalum* Hort. II. 341 no. 3.
— *phyllanthoides* Hort. II. 341. no. 2.
— *Phyllanthus* Haw. II. 342 no. 6.
— *platycarpum* Zucc. II. 342. no. 4.
— *ramulosum* Hort. II. 342. no. 3.
— *rhombeum* Hort. II. 342. no. 2.
— Russelianum Hook. II. 936. no. 1. *V. 820. no. 1.
— *speciosum* Haw. II. 341. no. 2.
— truncatum Haw. II. 342. no. 1.
γ. aurantiacum.
β. coccineum.
— *truncatum multiflorum* Hort. II. 342. no. 2.
Epiphysca Bth. II. 141. no. 1.
Epireineria E. Mey. 1. 673.
Epirhizanthus Blume. III. 482. °III. 975. *VI. 655.
— cylindrica Blume. III. 482. no. 1.
— elongata Blume. III. 482. no. 2.
— linearis Blume. III. 482. no. 3.
Episcia Mart. II. 717. *VI. 407.
Episcia hispida DC. II. 719. no. 7. VI. 403. no. 10.
— *mimuloides* Bth. VI. 740.
— rosea Martens et Galeotti. II. 717. no. 1.
Epiescieae Endl. II. 716.
Epistemum Wlprs. I. 582. *II. 835.
Epistemum Wlprs. II. 834.
— ferrugineum Wlprs. *I. 682. no. 1.
— *ferrugineum* Wlprs. II. 835. no. 1.
Epithema Blume. *VI. 523.
Epithemeae A. P. DC. VI. 523.
Epithinia W. Jack. *II. 489.
Epithymum Marant. III. 467. no. 17.
Eranthemum angustatum Linn. IV. 170. no. 4.
— *angustifolium* Linn. IV. 170. no. 4.
— *parviflorum* Bergius. VI. 170. no. 3.
— *parvifolium* Linn. IV. 170. no. 3.
— *salsoloides* Linn. fil. III. 371. no. 1.
Eranthis Salisb. I. 47.
— hiemalis Salisb. *I. 47. no. 2.
— uncinata Turcz. I. 47. no. 1.
Erato DC. *II. 587. *II. 952. no. 24.
Erechtiteae DC. II. 650. VI. 250.
Erechtites Raf. II. 651. VI. 251
— arguta DC. *VI. 727. no. 4.
γ. aspera.
β. glabrata.
δ. obovata.
— *arguta* DC. var. ε. VI. 727. no. 4.
— candicans Hook. fil. VI. 727. no. 3.
— *glabrescens* Cunn. var. β. VI. 726. no. 2.
— Gunnii Hook. fil. VI. 727. no. 5.
— hieracifolia Raf. *II. 651. no. 1. *VI. 251. no. 2.
— *hispidula* Rich. var. β. VI. 726. no. 1.
— petiolata Bth. VI. 251. no 1.
— valerianaefolia DC. *II. 651. no. 2. *VI. 251. no. 3.
Erectae (Crotalaria) Bth. V. 438.
Erectae (Mikania) DC. VI. 712. no. 1.
Ereicotis DC. II. 497. VI. 54. no. 3.
Eremaea Lindl. II. 166. *V. 750.
— ericifolia Lindl. II. 166. no. 1.
— fimbriata Lindl. II. 166. no. 3.
— pilosa Lindl. II. 166. no. 2.
Eremia D. Don. *II. 729. VI. 741.
— Bartlingiana Kltzsch. *VI. 741. no. 1.
Eremodaucus Bnge. °V. 919.
— Lehmanni Bnge. *V. 920. no. 1.
Eremodendron DC. IV. 138. °VI. 693.
— Cunninghami DC. IV. 138. no. 1. VI. 693. no. 1.
Eremolobium Jaub. et Spach. II. 843.
Eremophila R. Br. IV. 139.
— alternifolia R. Br. IV. 140. no. 3.

Eremophila oppositifolia R. Br. IV. 140. no. 2.
— viscida Endl. IV. 139. no. 1.
Eremosis (Monosis) DC. VI. 99.
Eremosparton Fisch. et Mey. II. 860.
— aphyllum Fisch. et Mey. *II. 860. no. 1.
Eremostachys Bnge. III. 891. °III. 990. VI. 684.
— affinis Schrenk. III. 892. no. 9.
— gymnocalyx Schrenk. III. 891. no. 2.
— laciniata Bnge. III. 891. no. 1. *VI. 684. no. 1.
— moluccelloides Bnge. III. 892. no. 7.
— macrophylla Montbr. et Auch. III. 892. no. 6.
— phlomoides Bnge. III. 891. no. 4.
— rotata Fisch. Mey. et Lallem. III. 892. no. 8.
— superba Royle. III. 891. no. 3.
— tuberosa Bnge. III. 892. no. 5.
Eremosyne Endl. II. 362. V. 823.
— pectinata Endl. *II. 362. no. 1. V. 823. no. 1.
Ergaleion DC. V. 61.
Eriantha (Plantago) Barnéoud. IV. 182.
Erianthae (Salvia) Bth. III. 648. VI. 664.
Erianthae Bth. (Inga) V. 639.
Erianthera G. Don. III. 249.
— *rhomboidea* Bth. III. 802. no. 4.
Erica Linn. II. 728. VI. 419.
— anthura Link. *VI. 419.
— Azorica Hochstett. VI. 419. no. 2.
α. chlorantha.
β. erythrantha.
— Banksiana Andrws. VI. 419. †
— coccinea var. echiiflora Hensl. II. 728. †
— Jacksonii Hort. VI. 419. †
— jasminiflora Andrws. VI. 419. †
— Kraussiana Kltzsch. II. 728. no. 1. VI. 419. no. 1.
— Macnabiana Hort. VI. 419. †
— Neillii Hort. VI. 419. †
— (pseudo-) vestita Hort. II. 728. †
— *scoparia β. parviflora* DC. VI. 419. no. 2. *β*.
— Shannoniana Andrws. VI. 419. †
— tricolor var. superba Paxton. VI. 419. †
— Willmorei var. hybrida Hort. II. 728. †
ERICACEAE Endl. (ex p.) II. 723. II. 725. II. 734. VI. 408. VI. 437.
ERICACEAE Lindl. II. 725. VI. 416.
Ericameria Nutt. II. 592. *II. 952. no. 48. VI. 130.
— diffusa Bth. VI. 130. no. 1.
— microphylla Nutt. II. 592. no. 1.
— nana Nutt. II. 592. no. 2.
— resinosa Nutt. II. 592. no. 3.
Ericeae D. Don. II. 728. V. 419.
Ericinella Kltzsch. *II. 728. VI. 741.
— gracilis Kltzsch. *VI. 741. no. 1.
Ericogalium DC. II. 456.
Ericoidei N. ab E. (Aster) II. 564.
Erigenia Nutt. II. 384.
— bulbosa DC. *II. 384. no. 1.
Erigereae DC. II. 578. II. 958. VI. 122.
Erigereae C. H. Schultz. II. 951.
Erigeridium Torr. et Gr. II. 581.
Erigeron DC. II. 579. II. 958. VI. 122.
Erigeron DC. II. 951. no. 17.
Erigeron Linn. (ex p.) *II. 951. no. 17.
— alpestre Gardn. VI. 124. no. 17.
— *alpinum β*. DC. II. 579. no. 12.
— *alpinum γ*. DC. II. 579. no. 9.
— alpinum Linn. *II. 579. no. 11.
— ambiguum C. H. Schultz. *VI. 125. no. 20.
— amorphoglossum Boiss. VI. 122. no. 8.
— amphibalum Ldb. VI. 122. no. 1.
— *amplexicaule* Torr. II. 580. no. 17.
— annuum Pers. *II. 581. no. 28.
— apiculatum Bth. VI. 124. no. 19.
— *asperum* Nutt. II. 581. no. 23. *β*.
— Bellidiastrum Nutt. II. 580. no. 15.
— bellidifolium Mühlbrg. *II. 580. no. 16.
— *Beyrichii* Hort. Berol. II. 581. no. 29. *γ*.
— caespitosum Nutt. II. 582. no. 36.
β. grandiflorum Nutt.
— Canadense Linn. *II. 579. no. 1.
— *Canadense* Tenore. VI. 125. no. 20.
— canescens Torr. et Gr. *II. 583. no. 38.
— *Chrysocoma* Linn. VI. 122. no. 6.
— *ciliatum* Ldb. VI. 129. no. 1.
— clematideus C. H. Schultz. II. 958. no. 2.
— coma aurea C. H. Schultz. *VI. 122. no. 6.
— compositum Prsh. *II. 579. no. 3.
β. minor Torr. et Gr.
— conchophyllum Hook. *II. 583. no. 39.
— concinnum Torr. et Gr. II. 581. no. 25.
— *contortum* Dsf. VI. 125. no. 20.
— corymbosum Nutt. II. 582. no. 34.
— *crispum* Pourr. VI. 125. no. 20.
— decumbens Nutt. II. 582. no. 33.
— divaricatum Michx. *II. 579. no. 2.
— *divaricatum* Nutt. II. 581. no. 27.
— divergens Torr. et Gr. II. 581. no. 27.
— Douglasii Torr. et Gr. II. 582. no. 32.
— *Drobachiense* Flor. Danic. VI. 125. no. 20.
— *expansus* Poepp. II. 575. no. 137.
— filifolium Nutt. II. 582. no. 31. (c. varr. *α*. et *β*.)
— *filiformis* Spr. II. 588. no. 2.
— *florifer* Hook. II. 967. no. 6.
— foliosum Nutt. II. 583. no. 42.
— *glabellum β*. Hook. II. 581. no. 22.

Erigeron glabellum Nutt. II. 581. no. 23.
β. asperum Nutt.
γ. pubescens Nutt.
— glabratum Hppe. et Hrnschch. II. 579. no. 12. (c. var. β. ibid.)
— glaucum Kar. *II. 580. no. 20. (c. var. β. ibid.)
— grandiflorum Hook. *II. 579. no. 10.
— *grandiflorum* Nutt. II. 580. no. 21. β.
— heterophyllum Ktb. et Bouché. VI. 123. no. 13.
— *heterophyllum* Mühlbrg. II. 581. no. 28.
— hispidum Nutt. II. 583. no. 40.
— *humile* Grah. II. 579. no. 9.
— *hyssopifolium* Michx. II. 571. no. 112.
— hyssopifolium C. H. Schultz. *VI. 122. no. 5.
— incisum Thnbrg. *VI. 122. no. 2.
— *integrifolium* Biegel. II. 581. no. 29. β.
— ivaefolium C. H. Schultz. *VI. 122. no. 3.
— Kotschyi Boiss. VI. 123. no. 10.
— Kraussii C. H. Schultz. II. 958. no. 5. *VI. 122. no. 4. (c. varr. α. et β.)
— lanatum Hook. *II. 579. no. 8.
— *linifolium* Willd. VI. 125. no. 20.
— macranthum Nutt. II. 580. no. 21. (c. var. β. ibid.)
— *maritimum* Nutt. II. 580. no. 20. β.
— mespilifolius C. H. Schultz. *II. 958. no. 3.
— nanum Nutt. II. 579. no. 7.
— Natalensis C. H. Schultz. II. 958. no. 4.
— nivale Boiss. VI. 123. no. 12.
— nivale Nutt. II. 579. no. 13.
— *nudicaule* Michx. II. 581. no. 30
— occidentale Nutt. II. 583. no. 41.
— ochroleucum Nutt. II. 582. no. 35.
— palustre Gardn. VI. 124. no. 16.
— *pappochroma* Labill. VI. 720. no. 3.
— pedatum Nutt. II. 579. no. 5.
— Persicum Boiss. VI. 122. no. 9.
— *Philadelphicum* Ell. II. 580. no. 18.
— Philadelphicum Linn. *II. 580. no. 17. (c. varr. β. γ. et δ. ibid.)
— *pulchellum β. Unalaschkense* DC. II. 579. no. 9.
— pumilum Nutt. *II. 581. no. 24.
— *purpureum* Ait. II. 580. no. 17.
— *purpureum β. attenuatum* Nutt. II. 580. no. 17.
— *quercifolium* DC. II. 581. no. 26.
— quercifolium Lam. *II. 580. no. 18.
— *racemosum* Nutt. II. 579. no. 12.
— radicatum Hook. *II. 579. no. 6.
— *rivulare* Swrtz. II. 575. no. 138.
— scaposum DC. *II. 580. no. 14.
— semiamplexicaule Meyen. VI. 124. no. 15.
Erigeron speciosum DC. *II. 580. no. 22. (c. var. β. ibid.)
— *speciosum* Nutt. II. 580. no. 22.
— Sprengelii C. H. Schultz. II. 958. no. 1.
— squarrosum Lindl. II. 582. no. 37.
— *strigosum* Bigel. II. 581. no. 28.
— strigosum Mühlbrg. *II. 581. no. 29. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— sulcatum Meyen. VI. 123. no. 14.
— tenue Torr. et Gr. *II. 581. no. 26.
— tenuifolium C. H. Schultz. *VI. 122. no. 7.
— trifidum Hook. II. 579. no. 4.
— uliginosum Bth. VI. 124. no. 18.
— uniflorum Linn. *II. 579. no. 9.
— Vahlii Gaudich. II. 583. †
— velutipes Hook. et Arn. II. 580. no. 19.
— vernum Torr. et Gr. *II. 581. no. 30.
— Zerdanum Boiss. VI. 123. no. 11.
ERIMATALIEAE G. Don. VI. 552.
Erinacea Boiss. I. 626.
— pungens Boiss. *I. 626. no. 1.
Erinaceae Wlprs. (Verbena) IV. 14.
Erinacoides Spach. (Genista) V. 483.
Erinia campanulacea Noulet. II. 711. no. 5.
Erinus Linn. III. 270. °III. 963. *VI. 647.
— *Aethiopicus* Thnbrg. III. 307. no. 5.
— *Africanus* Hb. un. it. III. 308. no. 10.
— *Africanus* Linn. III. 308. no. 11.
— *Africanus* Schum. et Thonn. III. 282. no. 26.
— alpinus Linn. III. 270. no. 1.
β. albiflorus Linn. III. 271. no. 1.
— *Americanus* Mill. III. 301. no. 3.
— *Capensis* Linn. III. 307. no. 5.
— *fragrans* Ait. III. 314. no. 4.
—? gracilis Lehm. III. 271. no. 2.
— *Hispanicus* Pers. III. 271. no. 1.
— *incisus* Thnbrg. III. 315. no. 11.
— *laciniatus* Linn. IV. 30. no. 76. IV. 31. no. 79.
— *Lychnidea* Linn. III. 307. no. 4.
— *lychnideus* Thnbrg. III. 314. no. 4.
— *maritimus* Thnbrg. III. 307. no. 3.
— *patens* Thnbrg. III. 315. no. 10.
— *Peruvianus* Linn. IV. 28. no. 66.
— *simplex* Thnbrg. III. 314. no. 6.
— *tomentosus* Thnbrg. III. 320. no. 30.
— *tristis* Linn. III. 314. no. 3.
— *verticillatus* Mill. III. 268. no. 19.
— *villosus* Thnbrg. III. 309. no. 15.
Eriobotrya Lindl. II. 56.
—? *cordata* Lindl. II. 56. no. 1.
— Japonica Lindl. *II. 56. no. 1.
— *obtusifolia* DC. II. 56. no. 3.
Eriocarpae Bth. (Crotalaria) V. 439.
Eriocarpum Nutt. II. 593. *II. 952. no. 54.

Eriocarpum grindelioides Nutt. *II. 593. no. 1.
— *grindelioides* Nutt. II. 968. no. 9.
Eriocephaleae Lssng. II. 643. VI. 228.
Eriocephalus Linn. *II. 643. VI. 228.
— umbellulatus DC. δ. Kraussii C. H. Schultz. VI. 228. no. 1.
Eriocladium Lindl. II. 638. VI. 211.
— pyramidatum Lindl. *II. 638. no. 1. VI. 211. no. 1.
Eriocnema Naudin. °V. 683.
— fulva Naudin. V. 683. no. 1.
— Hilariana Naudin. V. 683. no. 2.
Eriocoma heterophylla Schrad. II. 612. no. 2.
Eriocoryne DC. VI. 282. no. 3.
Eriocycla Lindl. II. 401.
— nuda Lindl. *II. 401. no. 1.
Eriodendron DC. I. 330.
— anfractuosum DC. *I. 330. no. 3.
β. Caribaeum Jcq.
— jasminodorum St. Hil. I. 330. no. 4.
— leiantherum DC. *I. 330. no. 1.
— pubiflorum St. Hil. I. 330. no. 5.
— Samauma Mart. I. 330. no. 2.
Eriodyction Bth. *VI. 566.
Erioglossum Blume. I. 417.
Erioglossum Guill. et Perr. I. 418.
— alliaceum Spanoghe. I. 417. no. 2.
— *cauliflorum* Guill. et Perr. I. 418. no. 5.
— edule Blume. I. 417. no. 1.
Eriogynia pectinata Hook. II. 51. no. 22.
Eriolaena DC. I. 351.
— Candollei Wall. I. 351. no. 1.
— Hookeriana Wght. et Arn. I. 351. no. 2.
Eriolaeneae Arn. I. 351.
Eriolepis DC. II. 674. no. 1. 4. 5. VI. 305. no. 1.
Erione Schott et Endl. I. 330.
Eriope Humb. et Bonpl. III. 570. °III. 978.
— alpestris Mart. III. 572. no. 12.
β.? glabrior Bth.
— complicata Mart. III. 572. no. 10.
— crassifolia Mart. III. 571. no. 5.
— crassipes Bth. III. 571. no. 8.
β. acutifolia Bth.
— foetida St. Hil. III. 572. no. 11.
— hypenioides Mart. III. 570. no. 1.
— macrostachya Mart. III. 572. no. 13.
β. villosa Mart.
— monticola Mart. III. 570. no. 2.
— nudiflora Humb. et Bonpl. III. 571. no. 7.
— obtusata Bth. III. 571. no. 3.
— parvifolia Mart III. 571. no. 6.
— polyphylla Mart. III. 571. no. 4.
— teucrioides St. Hil. III. 571. no. 9.
Eriopetalum Wght. VI. 494.
Eriophylla Dunal. (Solanum) III. 70.
Eriophyton Bth. III. 892. °III. 990.
— Wallichianum Bth. III. 892. no. 1.
Eriosema DC. I. 784. II. 902. V. 540.
— argenteum Wlprs. *I. 785. no. 16.
— barbatum Wlprs. I. 785. no. 14.
— capitatum E. Mey. I. 785. no. 10.
— Chinense Vogel. I. 784. no. 2.
— cordatum E. Mey. I. 784. no. 1.
— crinitum G. Don. *II. 902. no. 4.
— diffusum G. Don. *II. 902. no. 3.
— Drégei E. Mey. I. 784. no. 7.
— flaviflorum Miq. V. 540. no. 1.
— grandiflorum Schlchtd. et Cham. I. 784. no. 4.
— Kraussianum Meisn. V. 540. no. 2.
— lanceolatum Bth. I. 784. no. 3.
— parviflorum E. Mey. I. 785. no. 11.
— polystachyum E. Mey. I. 785. no. 12.
— psoraleoides G. Don. *II. 902. no. 6.
— puberulum Eckl. et Zeyh. I. 785. no. 13.
— pulchellum G. Don. *II. 902. no. 5.
— *reticulatum* E. Mey. I. 784. no. 5.
— rufum G. Don. *II. 902. no. 1.
— salignum E. Mey. I. 785. no. 8.
β. lanceolatum E. Mey.
— sericeum Eckl. et Zeyh. I. 784. no. 5.
— sessiliflorum G. Don. *II. 902. no. 8.
— sessiliflorum Wlprs. *I. 795. no. 15.
— simplicifolium G. Don. *II. 902. no. 7.
— squarrosum Wlprs. I. 784. no. 6.
— trinerve E. Mey. I. 785. no. 9.
— violaceum G. Don. *II. 902. no. 2.
— *Zeyheri* E. Mey. I. 784. no. 6.
Eriosphaera DC. II. 918. no. 1. V. 719.
Eriosphaera Lssng. *II. 616.
Eriosphaeria Bth. III. 533.
Eriostachys Bth. III. 818.
Eriostemon Sm. I. 503. II. 823. V. 389.
— Banksii A. Cunn. I. 504. no. 11.
— brevifolium A. Cunn. I. 504 no. 14.
— buxifolium Sm. *V. 389. no. 1.
— cuspidatum A. Cunn. I. 504. no. 5.
— difforme A. Cunn. I. 504. no. 13.
— ebracteatum Endl. I. 504. no. 10.
— gracile Grah. I. 504. no. 16.
— lineare A. Cunn. I. 504. no. 15.
— *linearifolium* DC. I. 522. no. 39.
— myoporoides DC. I. 504. †
— neriifolium Sieb. *I. 504. no. 6.
—? nodiflorum Lindl. I. 504. no. 17.
— obcordatum A. Cunn. I. 503. no. 1.
— obovatum A. Cunn. *I. 504. no. 4.
— pungens Lindl. II. 823. no. 1.
— racemosum Endl. I. 504. no. 9.
— rotundifolium A. Cunn. I. 504. no. 12.
— spicatum A. Rich. I. 504. no. 8.

Eriostemon squameum Labill. I. 505. no. 3.
—? trinerve Hook. I. 504. no. 2.
— verrucosum A. Rich. I. 504. no. 7.
— virgatum A. Rich. I. 504. no. 3.
Eriostomum alpinum Hoffm. et Link. III. 821. no. 19.
— *Germanicum* Hoffm. et Link. III. 820. no. 17.
— *lanatum* Hoffmsgg. III. 819. no. 15.
— *Lusitanicum* Hoffm. et Link. III. 820. no. 17.
— *polystachyum* Prsl. III. 820. no. 17.
— *salviaefolium* Prsl. III. 820. no. 16.
Eriosynaphe DC. *II. 409.
Eriotheca Schott et Endl. I. 330. II. 794.
— glabrescens St. Hil. et Naud. *II. 794. no. 3.
— parviflora Schott et Endl. I. 330. no. 1.
— pubescens St. Hil. et Naud. *II. 794. no. 2.
— pubescens Schott. et Endl. I. 330. no. 2.
— tomentosa St. Hil. et Naud. *II. 794. no. I
Eriothrix Lssng. *II. 650.
Eriothrix Regel. II. 698.
Eriothymus Bth. III. 742.
Eriotis DC. V. 865. no. 1.
Erisma Rudge. II. 69.
— violaceum Rdge. *II. 69. no. 1.
Eritrichium Schrader. *VI. 562.
Erithalis P. Browne. *II. 488.
Eriudaphus N. ab E. I. 548.
— Ecklonis Nees ab E. I. 548. no. 1.
— Mundtii Eckl. et Zeyh. I. 548. no. 1.
— Zeyheri Nees ab E. I. 548. no. 3.
Ermannia parryoides Cham. I. 134. no. 5.
Ernestia DC. *II. 126.
Ernodea Swrtz. *II. 463.
Erobatos DC. II. 743. no. 10.
Erodium Hérit. I. 445. II. 818. V. 379.
— affine Ten. I. 446. no. 13.
— albiflorum Moris. I. 447. no. 7.
— *alpinum* Ten. I. 446. no. 15.
— Apenninum Ten. I. 446. no. 15.
— Arabicum Dcne. I. 447. no. 18.
— Bocconi Viv. I. 446. no. 5.
— *Botrys* C. A. Mey. II. 818. no. 4.
— Bovei Delile. I. 446. no. 16.
— bryoniaefolium Boiss. II. 818. no. 3.
— calvifolium Boiss. et Reut. I. 445. no. 3.
— *cheilanthifolium* Boiss. I. 445. no. 1.
— *chrysanthum* Hérit.? II. 818. no. 2.
— cicutarium L. *β.* rupestre Boiss. *I. 445. no. 4.
— cinerascens Moris. I. 446. no. 8.
— cuneatum Viv. I. 446. no. 6.
— cygnorum Nees ab E. V. 379. no. 2.
Erodium daucoides Boiss. I. 445. no. 2.
— geoides St. Hil. I. 447. no. 22.
— *glaucophyllum* Bové. I. 447. no. 17.
— *gruinum* Ten. I. 446. no. 13.
— *hirtum* Jcq. V. 379. no. 1.
— Hohenackeri Ledeb. II 818. no. 7.
— Jacquinianum Fisch. Mey. et Lallem. V. 379. no. 1.
— laciniatum Guss. I. 446. no. 13.
— leucanthum Boiss. II. 818. no. 2.
— macrophyllum Hook. et Arn. I. 447. no. 21.
— maritimum Eckl. et Zeyh. *I. 447. no. 20.
— niveum Dcne. I. 446. no. 17.
— obliquifolium Ten. I. 446. no. 14.
— obtusilobum Karel. II. 818. no. 6.
— *petraeum* Sibthrp. II. 818. no. 1.
— pilosum Prsl. I. 446. no. 9.
— pulchellum Karel. II. 818. no. 5.
— *Romanum β. rupestre* Boiss. I. 445. no. 4.
— Salzmanni Delile. I. 446. no. 10.
— sebaceum Delile. I. 446. no. 11.
— serotinum Stev. I. 447. †
— Sibthorpianum Boiss. II. 818. no. 1.
— stellatum Delile. I. 446. no. 12.
— Stephanianum W. I. 447. †
— strigosum Karel. II. 818 no. 4.
— trichomanifolium l'Hérit. *I. 445. no. 1.
— Tunetanum G. Don. I. 447. no. 19.
Erophaca Baetica Boiss. I. 684. no. 1.
Erophila DC. I. 153.
— *Americana* DC. I. 153. no. 1.
— minima C. A. Mey. I. 153. no. 2.
— verna DC. *I. 153. no. 1.
Erpetion spathulatum DC. I. 216. no. 31.
Erpipomaea Choisy. VI. 532.
Eruca Tournef. I. 188.
— *alba* Noulet. I. 186. no. 3.
— *arvensis* Noulet. I. 186. no. 2.
— sativa Lam. *I. 188. no. 1.
Erucaria Gaertn. *I. 190. II. 764.
— linearloba Boiss. II. 764. no. 1.
Erucariceae DC. I. 190.
Erucastrum Prsl. I. 187. V. 49.
— *Arabicum* Fisch. et Mey. I. 186. no. 11.
— Arabicum Fisch. et Mey. V. 49. no. 1.
— Canariense B. Webb et Berthel. I. 187. no. 4.
— *de Candollei* Schimp. I. 184. no. 4. adn.
— elongatum Rchb. I. 187. †
— fruticulosum Prsl. *I. 187. no. 1.
— inodorum J. Bauh. I. 187. †
— *inodorum* Rchb. I. 185. no. 5. et no. 7.
— *Lamarckii* Spenn. I. 185. no. 6.
— *obtusangulum* Rchb. I. 185. no. 6. et no. 8.
— obtusangulum Schleich. I. 187. †

Erucastrum oleraceum Prsl. *I. 187. no. 2.
— *Pollichii* Schimp. et Spenner. I. 185. no. 7.
— *Pollichii* Spenn. I. 185. no. 5.
— virgatum Prsl. *I. 187. no. 3.
Erva de Pape III. 550. no. 124.
— *de Santa Anna* III. 550. no. 124.
Ervoideae Torr. et Gr. I. 711.
Ervum Tourref. I. 712.
— Dalmaticum Prsl. I. 713. no. 4.
— *dispermum* Rxb. I. 712. no. 1.
— *filiforme* Rxb. I. 713. no. 2.
— hirsutum L. *I. 713. no. 2.
— Hohenackeri Fisch. et Mey. I. 713. no. 7.
— Lens L. *I. 712. no. 1.
— macrocarpum Prsl. I. 713. no. 5.
— *multiflorum* Prsb. I. 711. no. 2.
— parviflorum Bertol. *I. 713. no. 3.
— subglobosum Rchb. I. 713. no. 8.
— Terronii Ten. I. 713. no. 6.
— *vicioides* Dsf.? I. 713. no. 1.
Erycibe Rxb. *VI. 552.
ERYCIBEAE Endl. VI. 552.
Eryngium Tournef. II. 389. V. 845.
— *amethystinum* Hort Chels. II. 391. no. 20.
— Andersonii Lag. II. 390. no. 20.
— anomalum Hook. et Arn. II. 390. no. 11.
— Barrelieri Boiss. V. 847. no. 8.
— Beecheyanum Hook. et Arn. II. 390. no. 14.
— Bithynicum Boiss. V. 846. no. 6.
— Bovei Boiss. V. 847. no. 7.
— bupleuroides Hook. et Arn. II. 390. no. 18.
— coeruleum M. Bieb. V. 845. no. 2.
— coronatum Hook. et Arn. II. 390. no. 10.
— *coronatum* Torr. et Gr. II. 389. no. 4.
— depressum Hook. et Arn. II. 390. no. 12.
β. flaccidum.
α. rigidum.
— *dichotomum var.* Laroche. V. 845. no. 2.
— divaricatum Hook. et Arn. II. 389. no. 8.
— flaccidum Hook. et Arn. II. 389. no. 9.
— foliosum Scheele. V. 845. no. 1.
— frutescens Moris. II. 390. no. 14.
— glaciale Boiss. II. 389. no. 1.
— glomeratum Aucher. VI. 731. no. 1.
— Hookeri Wlprs. II. 389. no. 4.
— humile *β*. Cav. II. 391. †
— intermedium Weinm. V. 846. no. 4.
— Leavenworthii Torr. et Gr. II. 389. no. 5.
— macrocalyx Schrenk. II. 389. no. 3.
— nudum Gill. II. 390. no. 17.
— petiolatum Hook. II. 389. no. 6.
— pinnatifidum Bnge.. V 847. no. 9.
— *pumilum polyrhizon* Barrel. V. 847. no. 8.
— ranunculoides Bth. II. 390. no. 15.
Eryngium sarcophyllum Hook. et Arn. II. 390. no. 19.
— scirpinum Cham. II. 390. no. 16.
— tenue Hook. et Arn. II. 389. no. 7.
— tetracephalum Bnge. V. 847. no. 10.
— thoraefolium Boiss. V. 846. no. 5.
— thyrsoideum Boiss. V. 845. no. 3.
— virens Lk. II. 389. no. 2.
Erysimastrum DC. I. 170.
Erysimastrum C. A. Mey. I. 168. no. 6.
Erysimum DC. (ex p.) I. 173.
Erysimum L. I. 167. II. 761. V. 39.
— aciphyllum Boiss. I. 169. no. 17.
— *alpinum* Pers. I. 167. no. 2.
— Altaicum C. A. Mey. I. 168. no. 13.
γ. humillimum.
β. subincanum.
α. viride.
— anceps Stev. I. 168. no. 8.
— Arkansanum Nutt. I. 170. no. 26. (III. Emend. p. 1.)
— asperum DC. *I. 170. no. 25.
— Aucheri Boiss. I. 168. no. 10.
— *Boissieri* Wlprs. I. 164. no. 7.
— Bonnanianum Prsl. I. 168. no. 4.
— Boryanum Boiss. II. 761. no. 1.
— brevirostre Tausch. I. 170. no. 30.
— canescens Roth. *I. 167. no. 2.
— Carium Boiss. I. 168. no. 9.
— Carniolicum Doll. I. 170. †
— cheiranthoides L. et *β*. latisiliquum Rchb. I. 170. †
— Cheiranthus Pers. *β*. lanceolatu mRchb. I. 171. †
— chidopodum Tausch. I. 170. no. 33.
— clavatum Wlprs. I. 169. no. 23.
— crassipes Fisch. et Mey. I. 169. no. 14.
— crassistylum Prsl. I. 167. no. 3.
— crepidifolium Rchb. I. 170. †
— *diffusum* Ehrh. I. 167. no. 2.
— diffusum Ehrh. I. 171. †
— durum Prsl. I. 170. †
— *elatum* Nutt. I. 170. no. 25.
—? *glaberrimum* Hook. et Arn. I. 165. no. 24.
— *grandiflorum* Nutt. I. 125. no. 10.
— grandiflorum Nutt. I. 170. no. 29.
— *grandiflorum* Pers. I. 167. no. 2.
— *Helveticum* DC. I. 167. no. 2.
— Helveticum DC. I. 171. †
— hieracifolium L. I. 170. †
— laciniatum Boiss. II. 761. no. 2.
— *longifolium* DC. I. 167. no. 2.
— longirostre Tausch. I. 170. no. 31.
— longisiliquum Scheidw. I. 170. †
— macilentum Bnge. I. 169. no. 20.

Erysimum macranthum Tausch. I. 168. no. 6.
— macrostigma Boiss. I. 169. no. 18.
— ochroleucum DC. I. 168. no. 12.
β. petiolatum C. Koch.
— ochroleucum Gay. I. 171. †
— odoratum Ehrh. I. 170. †
— *pallens* Koch. I. 167. no. 2.
— parviflorum Nutt. I. 170. no. 27.
— pectinatum Bory et Chaub. I. 167. no. 1.
γ. intermedium.
β. tenuifolium.
— Perofskianum Fisch. et Mey. I. 169. no. 15. *V. 39. no. 1.
— Persicum Boiss. I. 168. no. 11.
— *pinnatum* Wall. I. 166. no. 27. *a.*
— planisiliquum Wlprs. I. 169. no. 22.
β. ochroleucum Schrenk.
— *pumilum* Gaud. I. 167. no. 2.
— pumilum Gaud. I. 171. †
— pumilum Nutt. I. 170. no. 28.
— purpureum Auch. I. 169. no. 19.
—? pusillum Gill. I. 170. no. 24.
— *quadricorne* Steph. I. 171. no. 1.
— repandum L. I. 170. †
— *Rhaeticum* DC. I. 167. no. 2.
— Rhaeticum DC. I. 171. †
— Schultesii Schrad. I. 170. no. 32.
— *siliculosum* DC. I. 173. no. 1.
— sisymbrioides C. A. Mey. I. 168. no. 7.
— stoechadifolium Tausch. I. 168. no. 5.
— suffruticosum Spr. I. 170. †
— thyrsoideum Boiss. I. 169. no. 16.
— violaceum D. Don. I. 169. no. 21.
Erythraea Rencalm. VI. 501.
— Anatolica C. Koch. VI. 501. no. 2.
— *macrantha β. major* Hook. et Arn. VI. 499. no. 1.
— pauciflora Martens et Galeotti. VI. 501. no. 4.
— setacea Bth. VI. 501. no. 3.
— tenuifolia Martens et Galeotti. VI. 501. no. 1.
Erythraeaceae Griseb. VI. 500.
Erythremia Nutt. II. 693.
Erythremia Torr. et Gr. II. 693.
— *aphylla* Nutt. II. 693. no. 4.
— *grandiflora* Nutt. II. 693. no. 3.
Erythrina L. I. 768. II. 901. V. 535.
— acanthocarpa E. Mey. I. 768. no. 6.
— *alba* Rxb. I. 768. no. 2.
— *arborescens* Rxb. II. 890. no. 1.
— bracteata Prsl. I. 768. no. 8.
— *Caffra* Rchb. V. 535. no. 2.
— carnea Ait. I. 769. †
— *Corallodendron* Lour. II. 901. no. 2.
— crista Galli L. I. 769. no. 4. *V. 535. no. 3.
Erythrina fissa Prsl. I. 769. no. 13.
— Guineensis G. Don. II. 901. no. 1.
— Indica Lem. I. 769. †
— laeta Dehnh. I. 769. no. 14.
— *latifolia* Schum. et Thonn. I. 768. no. 5.
— latissima E. Mey. I. 768. no. 7.
— laurifolia Jcq. I. 769. †
— Loureirii G. Don. II. 901. no. 2.
— *maxima* Rxb. I. 768. no. 3.
— ovalifolia Rxb. I. 768. no. 4.
— poianthes Bot. Reg. I. 769. †
β. subinermis Bot. Reg. ibid.
— princeps Alb. Dietr. I. 769. no. 11.
— Raja Meisn. V. 535. no. 2.
— reticulata Prsl. I. 769. no. 9.
— rosea Alb. Dietr. I. 769. no. 10.
— Senegalensis DC. *I. 768. no. 5.
— setosa Martens et Galeotti. V. 535. no. 1.
— spinosa Voigt. I. 769. no. 12.
— stricta Rxb. I. 768. no. 1. (Ill. Emend. p. 4.)
— suberosa Rxb. I. 768. no. 2. (Ill. Emend. p. 4.)
— sublobata Rxb. I. 768. no. 3. (Ill. Emend. p. 4.)
— velutina W. I. 769. †
Erythrinae calyce spathaceo V. 536. obs.
Erythrineae Bth. I. 767. II. 900. V. 534.
Erythrochiton N. et Mart. *I. 500. V. 387.
— Brasiliense N. et Mart. *V. 387. no. 1.
Erythrogalium DC. II. 457.
Erythrolaena Sweet. *II. 676.
Erythropalum Blume. II. 205. *V. 763.
— scandens Blume. *II. 205. no. 1.
Erythrophila E. Mey. I. 411.
— undulata E. Mey. *I. 411. no. 1.
Erythrophlaeum Afzel. I. 925.
— Guineense G. Don. *I. 925. no. 1.
Erythropogon DC. *II. 648.
Erythropsis Lindl. V. 104.
— *Roxburghiana* Schott et Endl. V. 104. no. 2.
Erythrospermeae Endl. I. 206. V. 57.
Erythrospermum Lam. *I. 206.
Erythrostemon Gilliesii Kltzsch. I. 809. no. 1. II. 903. no. 1.
Erythrostigma Hsskrl. V. 415.
— diversifolium Hsskrl. V. 415. no. 1.
ERYTHROXYLEAE Kth. I. 403. II. 812.
Erythroxylon Kth. I. 403.
Erythroxylon L. I. 403. II. 812.
— acuminatum Wght. I. 407. no. 36.
— affine A. Rich. II. 813. no. 11.
— *affine* St. Hil. I. 406. no. 23.
— alaternifolium A. Rich. II. 813. no. 10.
— amplum Bth. II. 813. no. 8.

Erythroxylon anguifugum Mart. I. 404. no. 13.
— *areolatum* Vellozo. I. 405. no. 20.
— betulaceum Mart. I. 403. no. 1.
— campestre St. Hil. I. 405. no. 19.
γ. acutifolium Mart.
α. magnifolium Mart.
β. obovale Mart.
δ. ovalifolium Mart.
— caclophlebicum Mart. I. 407. no. 30.
— cincinnatum Mart. I. 404. no. 10.
— citrifolium St. Hil. I. 406. no. 29.
— Coca Lam. I. 405. no. 16.
— columbinum Mart. I. 405. no. 29.
— cuspidifolium Mart. I. 404. no. 11.
— daphnites Mart. I. 405. no. 14.
— *deciduum* St. Hil. I. 406. no. 28.
— discolor Boj. II. 812. no. 2.
— distortum Mart. I. 403. no. 4.
— ectinocalyx Mart. I. 404. no. 9.
— *flaccidum* Salzm. I. 404. no. 6.
— floribundum Mart. I. 407. no. 31.
— frangulaefolium St. Hil. I. 404. no. 8.
— jossinioides Boj. II. 812. no. 1.
— Kunthianum (var. α.) St. Hil. I. 406. no. 23.
β. angustifolium.
α. subsessile.
— *Kunthianum β.* St. Hil. I. 406. no. 24.
— lanceum Boj. II. 812. no. 4.
— lanceolatum Wght. I. 407. no. 35.
β. obtusifolium.
— macrocalyx Mart. I. 406. no. 24.
— macrocnemium Mart. I. 407. no. 34.
— macrophyllum Cav. I. 405. no. 17.
— magnoliaefolium Mart. I. 407. no. 33.
— mamacova Mart. I. 405. no. 15.
— *Margilla* Poepp. I. 406. no. 29.
— microphyllum St. Hil. I. 403. no. 2.
δ. amplifolium Mart.
α. angustifolium St. Hil.
β. cuneifolium Mart.
γ. gonoclados Mart.
ε. reticulatum Maxt.
— monogynum Rxb. I. 407. †
— mucronatum Bth. II. 812. no. 7.
— myrsinites Mart. I. 403. no. 3.
— myrtoides Boj. II. 812. no. 3.
— *nanum* St. Hil. I. 406. no. 28.
— nitidum Spr. I. 406. no. 28.
α. angustifolium Mart.
β. brevifolium Mart.
δ. glaucum Mart.
γ. longifolium Mart.
— ochranthum Mart. I. 405. no. 18.
— passerinum Mart. I. 406. no. 25.
— Pelleterianum St. Hil. I. 404. no. 6.
— platyclados Boj. II. 812. no. 5.
Erythroxylon polygonoides Mart. I. 404. no. 12.
— pulchrum St. Hil. I. 406. no. 22.
— revolutum Mart. I. 404. no. 7.
— spinescens A. Rich. II. 813. no. 9.
— suberosum St. Hil. I. 405. no. 20.
— subrotundum St. Hil. I. 403. no. 5.
— Surinamense Splitgbr. II. 812. no. 6.
— tortuosum Mart. I. 407. no. 32.
— vacciniifolium Mart. I. 406. no. 26.
— virgultosum Mart. I. 406. no. 27.
Escallonia Mart. II. 377. II. 937. V. 837.
— alpina Poepp. II. 379. †
— angustifolia Prsl. II. 378. no. 8.
— arguta Prsl. II. 378. no. 11.
— *bifida* Lnk. et Otto. II. 378. no. 3.
— callcotiae Hook. et Arn. II. 378. no. 6.
— canescens St. Hil. II. 379. no. 17.
— Carmelita Meyen. V. 837. no. 2.
— *ciliata* Roem. et Schult. V. 734. no. 4.
— farinacea St. Hil. II. 379. no. 16.
— flavescens Prsl. II. 378. no. 10.
— florida Poepp. II. 379. †
— *floribunda* Rchb. II. 378. no. 3.
— *glandulosa* Lodd. II. 378. no. 4. β.
— *glandulosa* Sweet. II. 378. no. 7.
— Grahamiana Gill. II. 378. no. 7.
— humilis St. Hil. II. 378. no. 13.
— illinita Prsl. II. 378. no. 12.
— macrantha Hook. et Arn. II. 378. no. 5.
— *microcarpa* Gill. II. 378. no. 11.
— Montevidensis DC. *II. 378. no. 3.
— multiflora Prsl. II. 378. no. 9.
— myrtoidea Gill. II. 378. no. 11.
— obtusissima St. Hil. II. 379. no. 18. (c. varr. α. et β. ibid.)
— Organensis Gardn. II. 937. no. 1.
— pulverulenta Pers. II. 379. †
— *reflexa* Gill. II. 378. no. 11.
— resiniflua Wlprs. V. 837. no. 1.
— rubra Pers. *II. 378. no. 4.
β. albiflora.
γ. pubescens.
— rubricaulis Colla. II. 378. no. 2.
— serrata Sm. II. 937. †
— spiraeoides St. Hil. II. 379. no. 15.
— thyrsoidea Bert. II. 377. no. 1.
— vaccinioides St. Hil. II. 379. no. 14.
Escallonieae DC. II. 377. V. 837.
Eschscholtzia Cham. I. 116.
— caespitosa Bth. I. 116. no. 3.
— Californica Cham. I. 116. no. 1.
— compacta Wlprs. I. 116. no. 6.
— *crocea* Bth. I. 116. no. 1.
— Douglasii Hook. et Arn. I. 116. no. 2.
— hypecooides Bth. I. 116. no. 5.
— tenuifolia Bth. I. 116. no. 4.

Eschweilera angustifolia Mart. II. 193. no. 3.
Escobedia Rz. et Pav. III. 377. °III. 969. *VI. 641.
— *laevis* Cham. et Schlchtd. III. 377. no. 2.
— linearis Schlchtd. III. 377. no. 2.
— scabrifolia Rz. et Pav. III. 377. no. 1.
— stricta Zucc. *III. 377. no. 3.
Escobedieae Bth. VI. 641.
Esenbeckia Kth. I. 501.
— *altissima* Blume. I. 331. no. 1.
— febrifuga St. Hil. I. 501. no. 4.
— grandiflora Mart I. 501. no. 6.
— latifolia Mart. I. 501. no. 5.
— maurioides Mart. I. 501. no. no. 3.
— pilocarpoides Kth. I. 501. no. 1.
— pumila Pohl. I. 501. no. 2.
Espejoa DC. *II. 627.
Espeletia Mut. *II. 605.
— *amplexicaulis* Nutt. II. 608. no. 4.
— *helianthoides* Nutt. II. 610. no. 7.
— *sagittata* Nutt. II. 610. no. 6.
Espelina Paullistarum V. 764. no. 1. et 2.
Espera W. I. 363.
Esterhazya Mikan. III. 379. °III. 970. * VI. 649.
— *alpestris* Spix et Mart. III. 383. no. 14.
— campestris Spix et Mart. III. 379. no. 1.
— macrodonta Cham. et Schlchtd. III. 380. no. 4.
— montana Spix et Mart. III. 380. no. 2.
— splendida Mikan. III. 380. no. 3.
Etaballia Bth. I. 853. V. 572.
— Guianensis Bth. *I. 853. no. 1. V. 572. no. 1.
— macrophylla Bth. V. 572. no. 2.
Ethulia Cass. *II. 538. II. 945.
— Kraussii C. H. Schultz. II. 945. no. 1.
— *Rüppellii* Hochstett. II. 704. no. 1.
Ethulieae DC. II. 538. II. 944. VI. 88.
Euacaena DC. II. 43.
Euaconitum DC. I. 57. no. 2. II. 745. no. 2.
Euaeschynomene Vogel. I. 732.
Eualyssum DC. II. 757. no. 1.
Euamelleae DC. II. 558. II. 955. (ex p.) VI. 118.
Euamelleae C. H. Schultz. II. 954.
Euammania DC. II. 101.
Euamygdalus Spach. II. 908.
Euandersonia Sonder. VI. 432.
Euandira Bth. I. 804.
Euanoplon Endl. III. 480.
Euanthemideae DC. II. 633. II. 991. VI. 185.
Euanthemis DC. II. 633.
Euaparine DC. II. 454. VI. 9.
Euastereae DC. II. 559. II. 955. VI. 119.
Euastereae C. H. Schultz. II. 952.
Eubaccharideae DC. II. 595. II. 972. VI. 135.
Eubalsamorhiza Nutt. II. 610.
Eubeaufortia Schauer. II. 928.
Eubegonia Wlprs. II. 206.
Eubignonieae A. P. DC. VI. 510.
Eublepharis Nutt. (ex p.) II. 614. II. 982.
Eubrychis DC. I. 746. II. 894.
Eubuchnereae Endl. III. 299. III. 966.
Eubuphtalmeae C. H. Schultz. II. 955.
Eucacalia DC. II. 652.
Eucaesalpinieae Bth. I. 809. II. 903. V. 554.
Eucalais DC. II. 684.
Eucallistemon Endl. II. 165.
Eucalycadenia Torr. et Gr. VI. 184.
Eucalymma Schauer. V. 737.
Eucalyptus L'Hérit. II. 163. II. 924. V. 743.
— acmenioides Schauer. II. 924. no. 3.
— alba Reinwrdt. II. 927. no. 21.
— alpina Lindl. II. 925. no. 9.
— amygdalina Labill. II. 164. †
— angulosa Schauer. II. 925. no. 11.
— Baueriana Schauer. II. 924. no. 6.
— calophylla Lindl. II. 164. no. 7. *V. 744. no. 7.
— clavigera A. Cunn. II. 926. no. 14.
— concolor Schauer. V. 743. no. 4.
— coriacea A. Cunn. II. 925. no. 7.
— Cunninghami G. Don. II. 926. no. 20.
— dealbata A. Cunn. II. 924. no. 2.
— decipiens Endl. II. 164. no. 4.
— dives Schauer. II. 926. no. 18.
— dumosa A. Cunn. II. 925. no. 10.
— elata Dehnh. II. 163. no. 2.
— enervifolia DC. II. 164. †
— eximia Schauer. II. 925. no. 12.
— ferruginea Schauer. II. 926. no. 15.
— floribunda Endl. II. 164. no. 5.
— foecunda Schauer. V. 743. no. 5.
— glandulosa Dsf. II. 926. no. 19.
— gomphocephala DC. II. 164. †
— Gunnii Hook. fil. V. 743. no. 3.
— hypoleuca Schauer. V. 744. no. 6.
— *Lehmanni* Preiss. V. 743. no. 1.
— linearis Dehnhrdt. II. 164. no. 8.
— longifolia Lk. II. 164. †
— macrocarpa Hook. II. 164. no. 10. *V. 744. no. 11.
— maculata Hook. V. 743. no. 2.
— mannifera Moudie. II. 163. no. 1.
— melliodora A. Cunn. II. 924. no. 4.
— micrantha DC. II. 164. †.
— *microphylla* Cunn. II. 927. no. 20.
— miniata A. Cunn. II. 925. no. 8.

Eucalyptus obtusiflora DC. II. 164. †
— occidentalis Endl. II. 164. no. 3.
— oligantha Schauer. II. 926. no. 13.
— piperita Sm. II. 164. †
— pleurocarpa Schauer. V. 744. no. 9.
— polyanthemos Schauer. II. 924. no. 5.
— populifolia Dsf. II. 927. no. 22.
— Preissiana Schauer. V. 744. no. 8.
— procera Dehnhrdt. II. 164. no. 9.
— pruinosa Schauer. II. 926. no. 17.
— pulchella Dsf. II. 927. no. 23.
— pulverulenta Sims. II. 164. †
— radiata Sieb. II. 164. †
— redunca Schauer. V. 743. no. 1.
— rudis Endl. II. 164. no. 6.
— setosa Schauer. II. 926. no. 16.
— spathulata Hook. V. 744. no. 10.
— splachnicarpa Hook. II. 927. no. 24.
— *splachnicarpa* Hook. V. 744. no. 7.
— stellulata DC. II. 164. †
— stricta Sieb. II. 164. †
— subulata A. Cunn. II. 924. no. 1.
— *tuberculata*? DC. II. 926. no. 19.
Eucanavalia Bth. I. 766.
Eucapnos Siebold et Zucc. °V. 23.
— spectabilis Sieb. et Zucc. *V. 23. no. 1.
Eucapparis DC. I. 198. no. 11. I. 199. no. 29. V. 54.
Eucaprifolium Rchb. II. 447.
Eucarisseae Alph. DC. VI. 466.
Eucastilleja G. Don. III. 393.
Eucaulotretus Endl. I. 851.
Eucelmisia Hook. fil. VI. 117.
Eucephalus (Aster) Nutt. II. 572.
Eucephalus Nutt. II. 576. *II. 951. no. 12.
— *albus* Nutt. II. 573. no. 119.
— *elegans* Nutt. II. 572. no. 117.
— *ericoides* Nutt. II. 577. no. 2.
— *glaucus* Nutt. II. 572. no. 118.
Euceraea Martius. V. 407.
— nitida Martius V. 407. no. 1.
Eucereus Miq. II. 325.
Euchaenactis Torr. et Gr. II. 989. VI. 177.
Euchaerophyllum DC. II. 422.
Euchaetis Bartl. et Wendl. I. 508.
— abietina Eckl. et Zeyh. I. 508. no. 3.
— elata Eckl. et Zeyh. I. 508. no. 1.
— flexilis Eckl. et Zeyh. I. 509. no. 4.
— glomerata Bartl. et Wendl. *I. 508. no. 2.
Euchamaefistula Vogel. I. 813.
Euchamaelaucieae Schauer. II. 153. V. 727.
Eucharidium Fisch. et Mey. II. 90.
— concinnum Fisch. et Mey. II. 90. no. 1.
— grandiflorum Fisch. et Mey. II. 90. no. 2.
Euchilus R. Br. I. 574.
Euchilus linearis Bth. I. 574. no. 1.
Euchilon DC. II. 647.
Euchlora Eckl. et Zeyh. I. 618.
— serpens Eckl. et Zeyh. *I. 618. no. 1.
Euchorozema Bth. I. 567. V. 424. no. 1. 2.
Euchresta Bennet. I. 804. V. 546.
Euchresta Gardn. II. 542. VI. 102.
— Horsfieldii Bennet. *I. 804. no. 1. V. 546. no. 1.
Euchroma Nutt. III. 394. VI. 651. no. 1.
— *grandiflora* Nutt. III. 395. no. 19.
— *purpurea* Nutt. III. 396. no. 21.
Euchrysosplenium Turr. et Gr. II. 959.
Eucinchoneae DC. VI. 61.
Eucinchoneae Endl. II. 507.
Eucladus suffruticosus Nutt. V. 789. no. 2.
Euclaytonia Torr. et Gr. II. 237.
Euclea Linn. VI. 457.
—? ferruginea Brnhrdi. VI. 457. no. 2.
— Kraussiana Brnhrdi. VI. 457. no. 1.
— *tomentosa* E. Mey. VI. 457. no. 1.
Euclidieae DC. I. 159.
Euclidium R. Br. I. 159.
— Syriacum R. Br. *I. 159. no. 1.
Euclisia Nutt. I. 128.
Euclitoria DC. I. 751.
Eucnide bartonioides Zucc. V. 777. no. 2.
Eucodon (Campanula) DC. VI. 384. no. 6.
Euconyzeae DC. II. 594. II. 970. VI. 132.
Euconyzeae C. H. Schultz. II. 953.
Euconyzella C. H. Schultz. VI. 125. no. 20.
Eucorepsosis Nutt. II. 613.
Eucoreopsis Torr. et Gr. II. 979.
Eucosmanthus Alph. DC. VI. 743.
Eucotula C. Koch. II. 991.
Eucouepia Bth. II. 6.
Eucrassuleae Endl. II. 251. V. 791.
Eucrepis DC. II. 697. VI. 357. no. 1.
Eucryphia Cav. *I. 366.
Eucryphia Cav. I. 366.
Eucryphieae Endl. I. 366.
Eucyclopia Bth. I. 564.
Eucymba Endl. III. 399.
Eucymopterus Torr. et Gr. II. 417.
Eudecaloba Endl. II. 219.
Eudema H. B. K. *I. 174. V. 41.
— grandiflora Plachon. V. 41. no. 1.
Eudesmia R. Br. II. 163. *II. 927. *V. 744.
— tetragona R. Br. *II. 163. no. 1.
Eudesmodium DC. I. 737.
Eudianthe Rchb. *I. 281.
Eudidymocarpeae A. P. DC. VI. 522.
Eudicteria Torr. et Gr. II. 586.
Eudimorphandra Tulasne. V. 574.
Eudioclea Bth. I. 765.
Eudiosmeae Endl. I. 506. V. 390.

Eudiplopappus DC. II. 577.
Eudiplostephium DC. II. 577.
Eudissochaeta Blume. II. 144.
Eudolichos DC. I. 779. II. 901. no. 3. 4. 5. 6. 7. V. 539.
Eudontospermeae C. H. Schultz. II. 955.
Eudoronicum DC. VI. 253
Eudoxia G. Don. *VI. 507.
Eudryadeae Torr. et Gr. II. 46. V. 656.
Euechites Dene. VI. 475. no. 1.
Euericeae Bth. II. 728.
Euerigeron DC. II. 579.
Euerigeron Torr. et Gr. II. 579. VI. 122. no. 1. VI. 123. no. 13.
Euerythraea Griseb. VI. 501. no. 1.
Euevax DC. II. 599. no. 1.
Eufaramea DC. II. 478.
Eufragia Griseb. *VI. 653.
Eugaillardieae DC. II. 624. II. 988. VI. 175.
Eugalenia Fzl. II. 232.
Eugalinsogeae DC. II. 629. VI. 181.
Eugalium DC. VI. 697. no. 1. 698. no. 2. 3. 4.
Eugardenieae DC. II. 514.
Eugastrolepis C. H. Schultz. VI. 195.
Eugenia Linn. II. 181. II. 933. V. 752.
— .... ? Bth. *II. 186. no. 55.
— aeris Wght. et Arn. II. 182. no. 7.
— *aeris* Wght. et Arn. V. 756. no. 1.
— *acutangula* Linn. II. 192. no. 1.
— Adamantium Cambess. II. 185. no. 36.
— adstringens Cambess. II. 189. no. 88.
— affinis Gill. II. 183. no. 15.
— *alba* Rxb. II. 192. no. 10.
— albo-tomentosa Cambess. II. 190. no. 104. β. Goyazensis.
— alternifolia Bth. V. 754. no. 11.
— *alternifolia* Wght. II. 179. no. 8.
— *amplexicaulis* Rxb. II. 192. no. 9.
— *androsaemoides* Wght. II. 179. no. 18.
— *angustifolia* Rxb. II. 192. no. 12.
— *aquea* Rxb. V. 756. no. 1.
— arenaria Cambess. II. 187. no. 66.
— atropunctata Steudel. V. 755. no. 15.
— *Arnottiana* Wght. II. 180. no. 24.
— *balsamea* Wall. II. 179. no. 15.
— bella Cambess. II. 189. no. 91.
— *bifaria* Wall. II. 192. no. 11.
— bracteata Rxb. *II. 182. no. 2.
— *bracteolata* Wght. II. 181. no. 9.
— Brasiliensis Lam. *II. 188. no. 77. (cum varr. β. et γ. ibid.)
— Bridgesii Hook. et Arn. II. 183. no. 19.
— *calophyllifolia* Wght. II. 180. no. 27.
— calycina Cambess. II. 188. no. 73.
— *campestris β. venulosa*? Martius. II. 186. no. 52.
Eugenia? capitellata Arn. II. 182. no. 9.
— *caryophyllaea* Wght. II. 179. no. 6.
— *caryophyllifolia* Lam. II. 179. no. 10.
— Chekan Hook. et Arn. II. 183. no. 13. (c. varr. a. et β. ibid.)
— Chrysophyllum Poir. II. 191. †
— ciliolata Cambess. II. 185. no. 46.
— cinerascens Gardn. V. 755. no. 14.
— Cisplatensis Cambess. II. 185. no. 37. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— claviflora Rxb. II. 181. no. 1.
— Codyensis Munro. II. 182. no. 6.
— compactiflora Spring. II. 186. no. 48.
— complanata Gardn. II. 933. no. 3.
— *cordifolia* Wght. II. 179. no. 9.
— coronata Schumach. II. 183. no. 10.
— correaefolia Hook et Arn. II. 187. no. 62.
— *corymbosa* Lam. II. 178. no. 6.
— costata Cambess. II. 189. no. 85.
— Cruckshanskii Hook. et Arn. II. 193. no. 16.
— Cumingii Hook. et Arn. II. 187. no. 63.
— *cylindrica* Wght. II. 192. no. 15.
— *cymosa* Rxb. II. 180. no. 25.
— decumbens Cambess. II. 184. no. 30.
— depauperata Cambess. II. 190. no. 99.
— deserti Cambess. II. 185. no. 38.
— divaricata Bth. II. 186. no. 51.
— dodonaeaefolia Cambess. II. 190. no. 95.
— Duarteana Cambess. II. 187. no. 65.
— dysantha Bth. V. 754. no. 12.
— elliptica Hook. et Arn. II. 184. no. 22.
— expansa Spring. II. 190. no. 105.
— ferruginea Hook. et Arn. II. 187. no. 61.
— formosa Cambess. II. 188. no. 76.
— *formosa* Wall. II. 191. no. 7.
— fruticosa Rxb. II. 179. no. 11.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 183. no. 14.
— glandulosa Cambess. II. 188. no. 72.
— glaucescens Cambess. II. 190. no. 103.]
— glomerata Spring. II. 186. no. 49.
— *grata* Wght. II. 181. no. 7.
—? Guayavillo Bth. V. 753. no. 3.
— *hemisphaerica* Wght. II. 191. no. 8.
— heteroclita Tussac. II. 191. †
— hiemalis Cambess. II. 189. no. 86.
— hypericifolia Gardn. II. 933. no. 4.
— *jambolifera* Rxb. II. 179. no. 10.
— *Jambolana* Lam. II. 179. no. 10.
— Ibitipocensis Cambess. II. 190. no. 96.
— Jiquitinhonhensis Cambess. II. 189. no. 83.
— incanescens Bth. II. 187. no. 57.
— *inophylla* Rxb. II. 180. no. 22.
— insipida Cambess. II. 189. no. 87.
— Itajurensis Cambess. II. 184. no. 33.
— Itapemirimensis Cambess. II. 186. no. 47.
— *laeta* Ham. II. 182. no. 2.

Eugenia lanceolata Lam. II. 181. no. 5.
— Laruotteana Cambess. II. 188. no. 69.
— laurifolia Cambess. II. 188. no. 81.
— laurifolia Spring. II. 185. no. 40.
— *laurifolia* Rxb. II. 192. no. 13.
— leptantha Bth. II. 186. no. 56.
— leptantha Wgbt. II. 181. no. 2.
— lucida Cambess. II. 188. no. 80.
— lutescens Cambess. II. 184. no. 34.
— macaboides R. Wght. II. 182. no. 5.
— macrocarpa Schlchtd. II. 191. no. 108.
— magnifica Spring. II. 191. no. 107.
— Maire A. Cunn. II. 183. no. 11.
— micrantha Bertoloni. II. 185. no. 39.
— micropetala Mart. II. 186. no. 50.
— Miersiana Gardn. V. 753. no. 4.
— montana Cambess. II. 190. no. 97.
— Mooniana Gardn. II. 933. no. 2.
— Mooniana R. Wght. II. 182. no. 4.
— multiflora Cambess. II. 189. no. 89.
β. lutescens.
— multiflora Hook. et Arn. II. 183. no. 18.
β. angustifolia.
— *Munronii* Wght. II. 191. no. 3
— myrcioides Cambess. II. 188. no. 75.
— myrtifolia Cambess. II. 190. no. 100.
— *myrtifolia* Rxb. II. 178. no. 3.
— *Neesiana* Wght. II. 178. no. 2.
— Nhanica Cambess. II. 189. no. 92.
— nitida? Bth. II. 185. no. 42.
— nitida Cambess. II. 187. no. 67.
— obcordata Raoul. V. 752. no. 1.
— *oblata* Rxb. II. 181. no. 8.
— obtusifolia Cambess. II. 190. no. 102.
— obtusifolia Rxb. II. 179. no. 10.
— *odorata* Wght. II. 179. no. 13.
— *oleïna* R. Wght. II. 178. no. 4.
— *operculata* Rxb. II. 179. no. 16.
— ovalifolia Cambess. II. 187. no. 68.
— ovata Hook. et Arn. II. 187. no. 64.
— pacifica Bth. V. 753. no. 8.
— paniculaeflora Steudel. V. 755. no. 16.
— paniculata Cambess. II. 184. no. 28.
— Patrisii Vahl. II. 191. †
— *pauciflora* Wght. II. 192. no. 14.
— Piloësis Cambess. II. 188. no. 82.
— *Pimenta* DC. V. 756. no. 2.
β. ovalifolia DC. II. 182. no. 7.
— Piresiana Cambess. II. 185. no. 35.
— pisiformis Cambess. II. 188. no. 79.
— planipes Hook. et Arn. II. 183. no. 20.
— polyantha Wght. II. 180. no. 20.
— *polypetala* Wall. II. 192. no. 12.
— protracta Steudel. V. 753. no. 6.
— pruniformis Cambess. II. 184. no. 32.
— Pseudo-Caryophylla DC. *II. 184. no. 23.
Eugenia psidioides DC. II. 191. †
— pumila Gardn. V. 753. no. 7.
— pycnantha Bth. V. 754. no. 10.
— pyriformis Cambess. II. 184. no. 24.
— quaternifolia Cambess. II. 189. no. 93.
— Quitarensis? Bth. II. 185. no. 43.
— *racemosa* Rxb. II. 192. no. 1.
— *reticulata* Wght. II. 179. no. 7.
— *revoluta* Wght. II. 180. no. 23.
— *riparia* A. Cunn. V. 755. no. 2.
— rivularis Cambess. II. 184. no. 27.
— Rottleriana Wght. et Arn. II. 181. no. 1.
— *rotundifolia* Arn. II. 180. no. 26.
— rotundifolia Casaretto. V. 753. no. 5.
— *Roxburghii* DC. II. 182. no. 2.
— *rubens* Rxb. II. 180. no. 21.
— *rubicunda* Wght. II. 178. no. 1.
— rubiginosa Cambess. II. 184. no. 29.
— sabulosa Cambess. II. 188. no. 78.
— *salicifolia* Grah. II. 179. no. 12.
— Salzmanni Bth. II. 186. no. 52.
— Schomburgkii Bth. II. 187. no. 58.
— Selkirkii Hook. et Arn. II. 187. no. 60.
— sericiflora Bth. V. 753. no. 9.
— speciosa Cambess. II. 188. no. 70.
— stenophylla Hook. et Arn. II. 183. no. 17.
α. angustifolia.
β. latifolia.
— suaveolens Cambess. II. 184. no. 31.
— subalterna Bth. II. 186. no. 54.
— subcordata Wght. et Arn. II. 182. no. 3.
— suberosa Cambess. II. 189. no. 94.
— subobliqua Bth. II. 185. no. 44.
— sulcata Spring. II. 191. no. 106.
— supraaxillaris Spring. II 185. no. 41.
— sylvatica Cambess. II. 184. no. 26.
— sylvatica Gardn. II. 933. no. 1.
— *sylvestris* Moon. II. 178. no. 5.
— Temu Hook. et Arn. II. 183. no. 12.
— ternatifolia Cambess. II. 184. no. 25.
— *ternifolia* Rxb. II. 191. no. 6.
— *tetragona* Wall. II. 179. no. 17.
— Tinguyensis Cambess. II. 189. no. 84.
— *toddalioides* Wght. II. 179. no. 14.
— tomentosa Cambess. II. 188. no. 74.
— trinervia DC. II. 191. †
— Twediei Hook. et Arn. II. 184. no. 21.
— Ubensis Cambess. II. 188. no. 71.
— Ugni Hook. et Arn. II. 187. no. 59.
— Uruguayensis Cambess. II. 189. no. 90.
— Uvalha Cambess. II. 190. no. 101.
— virgata Gardn. V. 754. no. 13.
— viridiflora Bth. II. 185. no. 45.
— vismeaefolia Cambess. II. 186. no. 53.
— vitis Idaea Raoul. V. 752. no. 2.
— *Wallichii* Wght. II. 180. no. 19.

Eugenia Wightiana Wght. II. 181. no. 4.
— *Willdenowii* DC. II. 182. no 8.
— xanthoxyloides Cambess. II. 190. no. 198.
— *Zeylanica* Rxb. II. 182. no. 2.
— *Zeylanica* Wght. II. 181. no. 6.
— Zeylanica Willd. *II. 182. no. 8.
Eugerardia Bth. III. 382.
Eugerbera DC. VI. 315.
Eugesnereae Endl. II. 717.
Eugnaphalium DC. II. 646.
Eugonospermum C. H. Schultz. VI. 210.
Euguettardeae DC. II. 486.
Eugymna Nutt. II. 593.
Euhamameleae Endl. II. 434.
Euhaplopappus DC. VI. 130. no. 4.
Euhedyotis Wght et Arn. II. 497. VI. 55. no. 5.
Euhedysareae DC. I. 725. II. 888. V. 520.
Euhelenieae DC. II. 625. II. 987. VI. 175.
Euhelianthemum DC. I. 209. no. 11.
Euhelictereae Schott et Endl. I. 332.
Euhelicteres Endl. I. 332.
Euheliotropium DC. VI. 556. no. 1.
Euhelychrysum DC. VI. 239.
Euheracleum DC. II. 415. V. 889.
Euheuchera Torr. et Gr. II. 369.
Euhomopappus Nutt. II. 591.
Euhosackia Torr. et Gr. I. 648.
Eujasoneae C. H. Schultz. II. 954.
Eujasonia DC. II. 954. no. 1.
Euinga DC. I. 928. V. 636.
Euinuleae DC. II. 600. II. 955. (ex p.) II. 973. VI. 140.
Euinuleae C. H. Schultz. II. 953.
Euismelia C. H. Schultz. VI. 202.
Eukrigia Torr. et Gr. II. 685.
Eulasiopus C. H. Schultz. VI. 315.
Euleptolobium Vogel. I. 808.
Euleptopoda Torr. et Gr. II. 988.
Euleptospermeae Schauer. II. 922. V. 739.
Euliatris DC. II. 519.
Euliatris Torr. et Gr. II. 549.
Eulicania Bth. II. 5.
Euloganieae Endl. VI. 498.
Eulophoclinium Endl. II. 552. II. 950. VI. 108.
Eulophus Nutt. II. 426.
— *ambiguus* Nutt. II. 411. no. 24.
— *triternatus* Nutt. II. 411. no. 25.
Euloranthus DC. II. 439. (ex p.)
Euloranthus Endl. II. 439. V. 937. no. 14.
Eulotus Ser. I. 647. II. 853.
Euludwigia Torr. et Gr. II. 74.
Eulychnis DC. I. 281. no. 1. 2. 3. 4.
Eulychnophora DC. VI. 99.
Eulycium G. Don. III. 106.
Eulygodesmia Torr. et Gr. II. 692.
Eulythrarieae Endl. V. 673.
Eumachia DC. *II. 483.
Eumacronema Endl. II. 592.
Eumalacothrix Torr. et Gr. II. 690.
Eumatricaria C. H. Schultz. VI. 194.
Eumelochia DC. I. 342. no. 15.
Eumentzelia Torr. et Gr. II. 223.
Eumiconia DC. II. 146. no. 5. II. 918. no. 3. V. 720.
Eumicropeae C. H. Schultz. II. 952.
Eumimosa Bth. I. 864. 865.
§. 3. *Castae* Bth. I. 866.
Eriocaules Bth. I. 872.
Filipedes Bth. I 860.
Flagellares Bth. I. 868.
Glaucae Bth. I. 870.
§. 11. *Lepidotae* Bth. I. 874.
§. 8. *Meticulosae* Bth. I. 870.
§. 2. *Modestae* Bth. I. 865.
§. 9. *Myriophyllae* Bth. I. 873.
Obstrigosae Bth. I. 873.
§. 4. *Pectinatae* Bth. I. 866.
§. 6. *Pedunculosae* Bth. I. 868.
§. 7. *Polycephalae* Bth. I. 869.
§. 5. *Pudicae* Bth. I. 867.
Rudes Bth. I. 870.
Semistrigosae Bth. I. 872.
§. 1. *Sensitivae* Bth. I. 865.
Subsericeae Bth. I. 871.
Eumimosa DC. I. 865.
Eumimoseae Bth. I. 858. V. 578.
Eumirbelia Bth. V. 433.
Eumittella Torr. et Gr. II. 371.
Eumonarda Bth. III. 681.
Eumorpha Eckl. et Zeyh. I. 458.
— catarractae Eckl. et Zeyh. I. 458. no. 129.
— elegans Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 122.
— grandiflora Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 125.
— laevigata Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 130.
— marmorata Eckl. et Zeyh. I. 458. no. 126.
— nobilis Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 124.
— tabularis Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 123.
— tenuiloba Eckl. et Zeyh. I. 458. no. 128.
— variegata Eckl. et Zeyh. *I. 458. no. 127.
Eumorphia DC. *II. 633.
Eumulgedium DC. II. 699.
Eumundia Endl. I. 244.
Eumusenium Torr. et Gr II. 427.
Eumutisieae DC. II. 679. VI. 313.
Eumyrsineaceae Alph. DC. VI. 448.
Eumyrtus Endl. II. 172.
Eunanus Bth. *VI. 642.
Eunomia DC. I. 175. V. 41.
— iberidea Boiss. I. 175. no. 2.
— Montbretii Jaub. et Spach. V. 42. no. 2.

Eunomia Moricandiana Boiss. V. 41. no. 1.
— rotundifolia C. A. Mey. I. 175. no. 1.
Euosma Alph. DC. VI. 498. no. 1.
Euozothamnus DC. VI. 238. no. 2.
Euparea Grtnr. * VI. 447.
Euparonychieae Fnzl. I. 260. V. 74.
Eupastinaca DC. II. 414. no. 2.
Eupatoriaceae DC. II. 545. II. 949. VI. 105.
Eupatorieae DC. II. 545. II. 949. VI. 105.
Eupatorium Tournef. II. 553. VI. 109.
— Adamantium Gardn. VI. 711. no. 14.
— ageratifolium DC. *II. 556. no. 33.
β. Texense.
— ageratoides Linn. fil. *II. 556. no. 31.
— album Linn. *II. 555. no. 23.
— alpestre Gardn. VI. 110. no. 6.
— altissimum Linn. *II. 555. no. 22.
— *ambiguum* Hook. II. 555. no. 21.
— *amoenum* Prsh. II. 553. no. 4. β.
— amplum Bth. VI. 111. no. 13.
— apiculatum Gardn. VI. 711. no. 12.
— arbutifolium Bth. VI. 109. no. 2.
— aromaticum Linn. *II. 556. no. 32.
— Barclayanum Bth. VI. 110. no. 11.
— bellidifolium Bth. II. 554. no. 9.
— bracteatum Gardn. VI. 709. no. 1.
— *Brickellia* DC. II. 557. no. 1.
— buddleaefolium Bth. VI. 110. no. 9.
— *calocephalum* Nutt. II. 553. no. 2.
— *ceanothifolium* DC. II. 556. no. 31.
— compactum Bth. VI. 110. no. 10.
— compressum Gardn. VI. 709. no. 4.
— confertum Gardn. VI. 110. no. 7.
— conoclinoides Gardn. VI. 710. no. 9.
— *cordatum* Walt. II. 556. no. 32.
— *cordiforme* Poir. II. 556. no. 32.
— coriaceum Scheele. VI. 110. no. 12.
— crenulatum Gardn. VI. 710. no. 8.
— *cuneatum* Engelm. II. 556. no. 28. δ.
— *cuneifolium* DC. II. 555. no. 21.
— cuneifolium Willd. *II. 555. no. 20.
— densum Bth. VI. 111. no. 15.
— dicline Edgwrth. VI. 712. no. 17b.
— dispalatum Gardn. VI. 112. no. 24.
— dissectum Bth. VI. 112. no. 23.
— *dubium* DC. II. 553. no. 4.
— fasciculare Poepp. et Endl. VI. 109. no. 3.
— *Floridanum* Raf. II. 555. no. 22.
— foeniculaceum Willd. *II. 554. no. 16.
β. glabrum } Torr. et Gr. II. 555. no. 16.
γ. laterifiorum } Torr. et Gr. II. 555. no. 16.
— *foeniculaceum β. traganthes* DC. II. 555. no. 16. γ.
— *foeniculoides* Walt. II. 555. no. 16.
— *Fraseri* Poir. II. 556. no. 32.
Eupatorium glaucescens Ell. II. 555. no. 20.
— *glaucescens β. leucolepis* DC. II. 555. no. 19.
— *Graecorum* Lob. II. 39. no. 9.
—? *grandiflorum* Hook. II. 557. no. 2.
— *Hartwegi* Bth. II. 545. no. 4.
— *hyssopifolium* DC. II. 555. no. 18. γ. et no. 20.
— *hyssopifolium* Ell. II. 555. no. 19.
— hyssopifolium Linn. *II. 555. no. 18. (c. varr. β. γ. et δ. ibid.)
— incarnatum Walt. *II. 556. no. 34.
— ivaefolium Linn. * II. 553. no. 2.
β. Ludovicianum Linn.
— ixodes Bth. II. 553. no. 6.
— Kirilowii Turcz. II. 553. no. 5.
— *laevigatum* Torr. II. 553. no. 4. γ.
— *lanceolatum* Mühlbrg. II. 555. no. 24.
— lasioneuron Hook. et Arn. II. 554. no. 12.
— latipes Bth. VI. 111. no. 16.
— laxum Gardn. VI. 711. no. 11.
— *leptophyllum* DC. II. 555. no. 16. β.
— leptopodum Gardn. VI. 711. no. 16.
— *leucanthum* Kltzsch. VI. 133. no. 3.
— leucocephalum Bth. II. 554. no. 7.
— leucolepis Torr. et Gr. II. 555. no. 19.
— *linearifolium* Michx. II. 555. no. 18. γ. no. 19. et 20.
— *linearifolium* Walt. II. 555. no. 18.
— *maculatum* DC. II. 553. no. 4.
— *maculatum* Linn. II. 553. no. 4. β.
— marginatum Poepp. et Endl. VI. 112. no. 21.
— *melissoides* Mühlbrg. II. 556. no. 32.
— monardaefolium Wlprs. II. 553. no. 3.
— multinerve Bth. VI. 113. no. 25.
— *neurolepis* Torr. II. 553. no. 2. β.
— nigrescens Hook. et Arn. II. 554. no. 11.
— nubigenum Bth. II. 554. no. 8.
— nudum Gardn. VI. 710. no. 10.
— nummularia Hook. et Arn. VI. 114. †
— *obovatum* Raf. II. 555. no. 26.
— occidentale Hook *II. 556. no. 35.
— omphaliaefolium Kth. et Bouché. VI. 113. no. 28.
— *Oreganum* Nutt. II. 556. no. 35.
— Organense Gardn. VI. 113. no. 31.
— origanoides Meyen et Wlprs. VI. 113. no. 29.
— ovaliflorum Hook. et Arn. II. 554. no. 30.
— *ovatum* Bigel. II. 555. no. 26.
— parietariaeflorum Scheele. VI. 113. no. 30.
— parviflorum Ell. *II. 555. no. 21.
β. lancifolium Ell.
— perfoliatum Linn. *II. 555. no. 28. (c. varr. β. γ. et δ. ibid.)

Eupatorium Piauhiense Gardn. VI. 709. no. 2.
— pinnatifidum Ell. *II. 555. no. 17.
— pomaderrifolium Bth. VI. 109. no. 1.
— pseudochilca Bth. VI. 111. no 18.
— pubescens Mühlbrg. *II. 555. no. 26.
— *punctatum* Willd. II. 553. no. 4. *β.*
— pungens Gardn. VI. 710. no. 5.
— *purpureum* DC. II. 553. no. 4.
— purpureum Linn. *II. 553. no. 4.
γ. angustifolium Torr. et Gr.
β. maculatum Torr. et Gr.
— *purpureum* Linn. II. 553. no. 4. *a.*
— *purpureum β.* Linn. II. 553. no. 4. *β.*
— *quintum odoratum* C. Bauh. II. 40. no. 14.
— resinosum Poepp. et Endl. VI. 109. no. 4.
— resinosum Torr. *II. 556. no. 29.
— Riedelianum Gardn. VI. 711. no. 17.
— rigidum Bth. II. 554. no. 15.
— roseum Gardn. VI. 109. no. 5.
— rotundifolium Linn. *II. 555. no. 25.
— *rotundifolium β. ovatum* Torr. II. 555. no. 26.
— rupestre Gardn. VI. 710. no. 7.
— *rupestre* Raf. II. 555. no. 22.
— *salviaefolium* Hook. II. 555. no. 28. *γ.*
— scaberrimum Wlprs. II. 554. no. 14.
— *scabrifolium* Ell. II. 555. no. 26.
— Schimperianum Scheele. VI. 113. no. 27.
— Schomburgkii Bth. II. 554. no. 13.
— semialatum Bth. VI. 113. no. 26.
— *semiserratum* DC. II. 555. no. 21.
— serotinum Michx. *II. 556. no. 30.
— sessilifolium Linn. *II. 555. no. 27.
— *speciosum* Vent. II. 549. no. 1.
— stigmafosum Meyen et Wlprs. VI. 111. no. 17.
— subdentatum Gardn. VI. 711. no. 15.
— tectum Gardn. VI. 110. no. 8.
— *ternifolium* DC. II. 553. no. 4.
— teucriifolium Willd. *II. 555. no. 24.
— theaefolium Bth. VI. 112. no. 20.
— *Torreyanum* Short. II. 555. no. 18. *δ.*
— *trifoliatum* Darlingt. II. 553. no. 4. *a.*
— *truncatum* Ell. II. 555. no. 27.
— *truncatum* Mühlbrg. II. 555. no. 28. *γ.*
— tubiflorum Bth. VI. 710. no. 6.
— umbrosum Bth. VI. 112. no. 19.
— *urticaefolium* Reich. II. 556. no. 31.
— vacciniaefolium Bth. VI. 111. no. 14.
— vagum Gardn. VI. 711. no. 14.
— variifolium Bartl. II. 553. no. 1.
— velutinum Gardn. VI. 709. no. 3.
— *verticillatum* DC. II. 553. no. 4.
— *verticillatum* Willd. II. 553. no. 4. *a.*
— vestitum Poepp. et Endl. VI. 112. no. 22.
— *veterum seu Agrimonia* Bauh. II. 39. no. 9.
Eupatorium *vulgare* Trag. II. 39. no. 9.
Eupectideae DC. II. 544. VI. 104.
Eupetalum Lindl. II. 215.
— *Lindleyanum* Gaudich. V. 769. no. 19.
Eupeucedanum DC. II. 409.
Euphaca Endl. I. 684.
Euphaseoleae Bth. I. 770. II. 901. V. 537.
Euphaseolus Bth. I. 771. V. 537. no. 3.
Euphlomis Bth. III. 879.
Euphoria Commers. I. 420.
— *glabra* Blume. I. 420. no. 1.
— *Litchi* Dsf. V. 364. no. 2.
— *Longana* Lam. I. 420. no. 4. V. 364. no. 1.
— *Nephelium* DC. V. 365 no. 3.
— *Noronhiana* Blume. I. 420. no. 2.
— *punicea* Lam. V. 364. no. 2.
—? *xerocarpa* Blume. I. 420. no. 3.
Euphotinia Lindl. II. 56.
Euphragia latifolia Griseb. III. 408. no. 4.
Euphrasia Linn. III. 401. °III. 972. *VI. 653.
— alpina R. Br. III. 404. no. 7.
— *angustis et tricuspidatis foliis, floribus ex albo purpureis* Pluken. III. 404. no. 4.
— arguta R. Br. III. 405. no. 14.
— *aspera* Boiss. III. 401. no. 12.
— *aspera* Willd. III. 292. no. 4.
— aspera Willd. III. 406. no. 23.
— *asperrima* Lnk. III. 401. no. 12.
— Azorica Watson. III. 939.
— *Bocconi* Gussone. III. 400. no. 8.
— collina R. Br. III. 405. no. 9.
— *Coris* Crntz. III. 400. no. 3.
— *Coromandeliana* Rottl. III. 388. no. 3.
— *Corsica* Low. III. 401. no. 9.
— cuneata Forst. III. 404. no. 6.
— *depauperata* Bth. III. 402. no. 1. *ε.*
— *Diemenica* Spr. III. 404. no. 7.
— glutinosa M. Bieb. III. 406. no. 22.
— grandiflora Hochst. III. 405. no. 19.
— Holliana Lowe. III. 406. no. 20.
— *Jaubertiana* Boreau. III. 401. no. 11.
— kaliformis Willd. III. 406. no. 24.
— *latifolia* Linn. III. 408. no. 4.
— *linifolia* Column. III. 400. no. 6.
— *linifolia* Lam. III. 400. no. 3.
— *linifolia* var. *a.* Linn. III. 400. no. 5.
— *linifolia* var. *β.* Linn. III. 400. no. 7.
— *longiflora* Vahl. III. 401. no. 13.
— *lutea* Dubois. III. 401. no. 11.
— *lutea* Linn. III. 399. no. 3.
— *lutea alsinaefolia, radice squamata* C. Bauh. III. 436. no. 1.
— *lutea floribus Elephantis etc.* Moris. III. 433. no. 2.
— *lutea latifolia palustris* Moris. III. 408. no. 5.

Euphrasia lutea montana angustifolia major altera Columu. III. 400. no. 3.
— *lutea palustris* Pluk. III. 408. no. 5.
— *Mariana major etc.* L. Mant. III. 397. no. 1.
— melampyroides H. B. Kth. III. 405. no. 17.
— *micrantha* Rchb. III. 402. no. 1. *δ.*
— minima Schleich. III. 403. no. 2.
— mutica H. B. Kth. III. 405. no. 18.
— *nemorosa* Rchb. III. 402. no. 1. *δ.*
β. pectinata Rchb. III. 402. no. 1. *β.*
— Odontites Linn. III. 399. no. 1.
— *Odontites β.* Linn. III. 399. no. 2.
— officinalis Linn. III. 401. no. 1.
δ. alpestris Koch.
ε. elatior Bth.
β. neglecta Koch.
γ. nemorosa Koch.
α. pratensis Koch.
— *officinalis β. alpestris* Wimm. et Grabowsk. III. 402. no. 1. *δ.*
— *officinalis var. pratensis* Fries. III. 402. no. 1. *α.*
— *officinalis* Hayne. III. 402. no. 1. *γ.*
— paludosa R. Br. III. 405. no. 11.
— *pratensis* Rchb. III. 402. no. 1. *α.*
— *pratensis α.* Rchb. III. 403. no. 2.
— *pratensis latifolia Italica* C. Bauh. III. 408. no. 4.
— *pratensis lutea* C. Bauh. III. 400. no. 3.
— *purpurea* Dsfnt. III. 401. no. 10.
— *purpurea minor* Magn. III. 408. no. 4.
— rigidifolia Bivona. III. 406. no. 21.
— *Rostkoviana* Hayne. III. 402. no. 1. *α.*
— *rubra* Rth. III. 399. no. 1.
— *rubra Westmorlandica, foliis brevibus obtusis* Raj. III. 407. no. 1.
— Salisburgensis Fnk. III. 404. no. 3.
— santolinaefolia H. B. Kth. III. 405. no. 15.
— scabra R. Br. III. 405. no. 13.
— *serotina* Lam. III. 399. no. 2.
— *simplex* D. Don. III. 402. no. 1. *ε.*
— speciosa R. Br. III. 405. no. 12.
— *squarrosa* Slzm. III. 401. no. 10.
— striata R. Br. III. 405. no. 10.
— stricta H. B. Kth. III. 405. no. 16.
— *stricta* Host. III. 402. no. 1. *γ.*
— Tatarica Fisch. III. 404. no. 5.
— *tenuifolia* Pers. III. 400. no. 6.
— *tenuissime dissecto folio angusto* Bocc. III. 404. no. 3.
— *tertia latifolia pratensis* Columu. III. 408. no. 4.
— tetragona R. Br. III. 404. no. 8.
— tricuspidata Linn. III. 404. no. 4.
— *vermiculato folio Hispanica* Barrel. III 401. no. 13.
Euphrasia verna Bellardi. III. 399. no. 1.
— *viscosa* Linn. III. 400. no. 7.
Euphrasiae affinis pusilla planta Pluken. III. 294. no. 3.
Euphrasieae Bth. VI. 651.
Euphrasioides Endl. III. 299.
Euphronia Mart. et Zucc. II. 52. V. 659.
— hirtelloides Mart. et Zucc. *II. 52. no. 1. V. 659. no. 1.
Euphrosyne DC. *II. 607.
Eupiptadenia Bth. I. 858. V. 578.
Eupittosporum Putterl. I. 250. V. 71. no. 1—5.
Eupleiogyne C. Koch. II. 992.
Euploca Nutt. VI. 557.
— convolvulacea Nutt. *VI. 557. no. 1.
Eupodalyrieae Bth. I. 562. II. 831. V. 422.
Eupolanisia Endl. I. 195.
Eupomatia R. Br. I. 92.
— laurina R. Br. *I. 92. no. 1.
Euprestinaria C. H. Schultz. VI. 163.
Euprolongoa Boiss. VI. 722.
Euptilomeris Nutt. II. 628.
Eupulicarieae C. H. Schultz. II. 954.
Eupulsatilla Ldb. I. 14.
Eupyrena Wght. et Arn. II. 487.
— glabra Wght. et Arn. II. 487. no. 1.
— hexasperma Wght. et Arn. *II. 488. no. 2.
Eupyrrhocoma Torr. et Gr. II. 969.
Eurafnia Bth.? II. 833. no. 1.
Eurhaphe Endl. II. 494.
Eurhexia Torr. et Gr. II. 126.
Eurudbeckia Torr. et Gr. II. 977.
Eurya Thbg. I. 369.
— acuminata DC. I. 370. †
— angustifolia Blume. I. 369. no. 9.
— angustifolia Wall. I. 370. no. 13.
— Blumeana Krthls. I. 369. no. 6.
— *Celebica* Reinwrdt. I. 369. no. 4.
— concocarpa Krthls. I. 369. no. 3.
— cuprista Krthls. I. 369. no. 1.
— *fasciculata* Wall. I. 369. no. 11.
— nitida Krthls. I. 369. no. 2.
— obovata Blume. I. 369. no. 10.
— obovata Krthls. I. 369. no. 4.
— reticulata Krthls. I. 369. no. 5.
— serrata Blume. I. 369. no. 8.
— tristyla Wght. et Arn. I. 369. no. 12.
— Wightiana Wall. I. 369. no. 11.
— Zeylanica Wght. I. 369. no. 7.
Euryale Salisb. *I. 106.
— *Amazonica* Poepp. I. 106. no. 1.
Euryaleae Endl. I. 106.
Euryanthe Schlchtd. I. 376.
— Schiedeana Schlchtd. *I. 376. no. 1.
Eurybia Cass. II. 577. *II. 951. no. 12. VI. 120.

Eurybia affinis Steetz. VI. 121. no. 5.
— alpina Hook. fil. VI. 716. no. 1.
— aspera Steetz. VI. 121. no. 3.
— candidissima Steetz. VI. 120. no. 1.
— chrysotricha Ten. II. 577. no. 3.
— *corymbosa* Cass. II. 559. no. 1.
— cuneifolia Wlprs. II. 577. no. 2.
— ericoides Steetz. VI. 121. no. 9.
— floribunda Hook. fil. VI. 717. no. 7.
— furfuracea DC. *II. 577. no. 1.
— *glomerata* Brnhrdi. II. 559. no. 2. β.
— glutinosa Lindl. II. 577. no. 4.
— Gunniana DC. *VI. 717. no. 2.
γ. angustifolia
β. brevipes
ε. cana
α. longipes } Hook. fil. l. c.
δ. microcephala
ζ. salicina
η. scabrella
— Lehmanniana Steetz. VI. 121. no. 6.
— linifolia Hook. fil. VI. 717. no. 6.
— *macrophylla* Cass. II. 559. no. 2.
— muricata Steetz. VI. 121. no. 8.
— obcordata Hook. fil. VI. 717. no. 4.
— paniculata Steetz. VI. 121. no. 7.
— paucidentata Steetz. VI. 121. no. 4.
γ. glabrata.
α. hispida.
β. subracemosa.
— pinifolia Hook. fil. VI. 717. no. 5.
— ramulosa DC. *VI. 717. no. 3.
δ. densa
β. elongata
ε. ericaefolia
γ. floribunda } Hook. fil. l. c.
η. grandiflora
ζ. laxa
— *Schreberi* N. ab E. II. 559. no. 2. β.
— strigosa Steetz. VI. 120. no. 2.
— *subrepanda* DC. VI. 717. no. 2.
Eurybiopsis DC. *II. 576. *II. 951. no. 8. VI 716.
— gracilis Hook. fil. VI. 716. no. 2.
— scabrida Hook. fil. VI. 716. no. 1.
Eurycoma W. Jack. *I. 562.
Eurylobium Hochstett. IV. 173.
— serrulatum Hochstett. IV. 173. no. 1.
Euryomyrtus Schauer. II. 921. °V. 735.
— alpina Schauer. II. 921. no. 1.
— diffusa Schauer. *II. 921. no. 2.
— thymifolia Schauer. *II. 922. no. 3.
Euryops Cass. *II. 665. VI. 272.
— Drégeanus C. H. Schultz. VI. 272. no. 1.
— subsessilis C. H. Schultz. VI. 272. no. 2.
Euryosma argentea Dsv. I. 785. no. 16.
Euryosma barbata Dsvx. I. 785. no. 14.
— *sessiliflora* Dsvx. I. 785. no. 15.
Euryptera Nutt. II. 412. V. 885.
— lucida Nutt. *II. 412. no. 1. V. 885. no. 1.
Eurystorhiza G. Don. III. 23.
Eusalpichroa Sendtner. VI. 613.
Euscaphis Sieb. et Zucc. I. 529. II. 826.
— simplicifolia Sieb. et Zucc. II. 826. no. 2.
— staphylaeoides Sieb. et Zucc. *I. 529. no. 1. II. 826. no. 1.
Euschrankia Bth. I. 884.
Euscorzonera DC. VI. 349.
Euselago Endl. IV. 150.
Eusenecioneae DC. II. 651. VI. 251.
Eusesameae A. P. DC. VI. 518.
Euseseli DC. II. 402. V. 864. no. 1—3.
Eusideritis Bth. III. 850.
Eusiphocampylus Alph. DC. VI. 733. no. 1.
Eusonerila Blume. II. 122.
Euspermacoceae DC. II. 464. II. 941. VI. 27.
Eusphace Bth. III. 599.
Eustachya alba Raf. III. 369. no. 3.
— *coerulea* Raf. III. 369 no. 4.
Eustachytarpheta Wlprs. IV. 4.
Eustathes Lour. *I. 422.
Eustegia R. Br. *VI. 486.
Eustegieae Dcne. VI. 486.
Eustigmatotheca C. H. Schultz. VI. 199.
Eustoma G. Don. VI. 500.
— exaltatum Griseb. *VI. 500. no. 1. VI. 743.
— Russelianum Don. *VI. 500. no. 2.
Eustreptanthus Endl. I. 128.
Eustriga Endl. III. 300.
Eustrychneae Endl. VI. 497.
Eustylopappus Endl. II. 696.
Eustylosanthes Vogel. I. 727. no. 2.
Eutacsonia DC. V. 773.
Eutanacetum C. H. Schultz. VI. 220.
Eutarchonantheae DC. II. 599. II. 972.
Eutaxia R. Br. I. 573. II. 832. V. 430.
— Baxteri Bth. I. 573. no. 1.
— cuneata Meisn. V. 431. no. 5.
— dillwynioides Meisn. V. 430. no. 1.
— epacridoides Meisn. V. 430. no. 3.
— ericoides Meisn. V. 430. no. 2.
β. filicaulis.
— parvifolia Bth. I. 573. no. 2.
— *pungens* Sweet. I. 572. no. 6.
— pungens Sweet. I. 573. no. 4. V. 431. †
— reticulata Meisn. V. 431. no. 4.
— virgata Bth. I. 573. no. 3.
Eutetradymia Torr. et Gr. II. 664.
Euthetratheca Steetz. V. 68.
Euthales R. Br. II. 713. VI. 393.
— filiformis Vriese. VI. 394. no. 2.

Euthales macrophylla Lindl. II 713. no. 1.
— pilosella Vriese. VI. 393. no. 1.
Euthalictrum DC. I. 10. no. 5. et p. 11. no. 11. 12.
Euthamia Nutt. II. 966.
— *graminifolia* Nutt. II. 966. no. 69.
— *occidentalis* Nutt. II. 966. no. 72.
— *tenuifolia* Nutt. II. 966. no. 70.
Euthemis W. Jack. I. 528. °V. 60. *V. 400.
— leucocarpa W. Jack. I. 528. no. 1. *V. 60. no. 1.
— minor W. Jack. I. 528. no. 2. *V. 60. no. 2.
Eutiarella Torr. et Gr. II. 372.
Eutoca R. Br. VI. 524.
— acaulis Martens et Galeotti. VI. 524. no. 2.
— divaricata Bth. *VI. 524. no. 3.
  β. Wrangeliana.
— gracilis Martens et Galeotti. VI. 524. no. 1.
— *Wrangeliana* Fisch. et Meyer. VI. 524. no. 3. β.
Eutorilis Koch. V. 903. no. 1.
Eutraphis cf. Euscaphis.
Eutrema R. Br. *I. 174.
— *arenicolum* Richards. I. 171. no. 1.
— *Edwardsii* R. Br. I. 171. no. 1.
— *cordifolium* Turcz. II. 761. no. 3.
— *parviflorum* Turcz. II. 761. no. 2.
— *piliferum* Turcz. II. 755. no. 1.
—? *septigerum* Bge. I. 171. no. 1.
Eutrichilia Endl. I. 432.
Eutrichosanthes Wght. et Arn. II. 202.
Eutrifolium Ser. I. 642.
Eutriphyllum Ser. II. 851.
Eutropis Falconer. *VI. 495.
Eutupa Alph. DC. VI. 378.
Eutussilagineae DC. II. 457. VI. 117.
Euvaleria Arnott. V. 126.
Euvernonieae DC. II. 538. VI. 88.
Euverticordia Schauer. II. 154. V. 730.
Euxanthosia DC. II. 385. V. 842.
Euxenia Cham. *II. 603.
Euxenieae DC. II. 603.
Evaceae C. H. Schultz. II. 955.
Evax Gaertn. II. 599. *II. 955. no. 4.
— filiaginoides Karel et Kiril. II. 599. no. 1.
— *Indica* Hamilt. VI. 247. no. 6.
— *multicaulis* DC. II. 599. no. 2. II. 972. no. 1. VI. 139. no. 1.
— *prolifera* Nutt. II. 599. no. 1. VI. 139. no 1.
— *verna* Raf. II. 972. no. 1. VI. 139. no. 1.
— *Brasiliensis* Cham. II. 470. no. 4.
Eversmannia Bnge. I. 746. II. 894.
— .... Bnge. *I. 746. no. 1.
— hedysaroides Bnge. *II. 894. no. 1. (cum var. β. ibid.)
Evodia Forst. I. 500. II. 823.
— accendens Blume. I. 500. no. 4.
Evodia glabra Blume. I. 500. no. 2.
— incerta Blume. I. 500. no. 5.
— littoralis Endl. I. 500. no. 1. *II. 823. no. 1.
— longifolia A. Rich. I. 501. no. 6.
— macrophylla Blume. I. 500. no. 3.
— *triphylla* DC. I. 520. no. 9. et 10.
Evodium Botrys? Hohenack. II. 818. no. 7.
Evolvulus Linn. VI. 542.
— albiflorus Mart. et Gal. VI. 543. no. 4.
— microphyllus Mart. et Gal. VI. 542. no. 2.
— pilosissimus Mart. et Gal. VI. 542. no. 3.
— purpurea-coeruleus Hook. VI. 542. no. 1.
— strictus Bth. VI. 543. no. 5.
Evonymeae DC. I. 529.
Evonymeae Endl. I. 529.
Evonymus Tournef. I. 530. II. 827. V. 401.
— acuminatus Bth. I. 532. no. 22.
— Americanus Linn. *I. 532. no. 24. (cum varr. α. β. γ. et δ. ibid.)
— *Americanus β. sarmentosus* Nutt. I. 533. no. 24. γ.
— atropurpureus Jcq. *I. 532. no. 23. (c. var. β. ibid.)
— atropurpureus Wall. I. 531. no. 10.
— Chinensis Lindl. I. 530. no. 3.
— crenulatus Wall. I. 531. no. 17. (III. Emend. p. 3.)
— dichotomus Heyne. I. 531. no. 15. (III. Emend. p. 3.)
— echinatus Wall. I. 530. no. 9.
— *Europaeus β. velutinus* Fisch. et Meyer. I. 530. no. 1.
— *lucidus* Don. I. 530. no. 2.
— fibrilliferus Fisch et Mey. I. 530. no. 2.
— fimbriatus Wall. I. 531. no. 13.
— *foliis subrotundis integris, fructu corniculato* Burm. I. 535. no. 3.
— garciniaefolius Rxb. I. 531. no. 11.
— *garciniaefolius* Rxb. I. 534. no. 1.
— Goughii Wght. I 531. no. 20.
— *grandiflorus* Wall. I. 530 no. 2.
— grossus Wall. I. 531. no. 14.
— Hamiltonianus Wall. I. 531. no. 10.
— Javanicus Blume. I. 530. no. 5.
— Japonicus Thnbrg. *V. 401. no. 1.
— Indicus Heyne. I. 531. no. 16.
— Mexicanus Bth. I. 532. no. 21.
— nitidus Bth. II. 827. no. 1.
— obovatus Nutt. II. 532. no. 24. δ.
— *occidentalis* Nutt. I. 532. no. 23. β.
— revolutus Wght. I. 531. no. 19.
— *rigida* Wall. I. 532. no. 1.
— *scandens* Grah. I. 530. no. 9.
— *sempervirens* Marsh. I. 532. no. 24.
— Sieboldii Blume. I. 530. no. 6.
— subtriflorus Blume. I. 530. no. 7.

Evonymus Timoriensis Zipp. I. 530. no. 4.
— tingens Wall. I. 531. no. 12.
— *Tobira* Thnbrg. I. 252. no. 18.
— Thunbergianus Blume. I. 530. no. 8.
— velutinus Fisch. et Mey. I. 530. no. 1.
— Walkerii Wght. I. 531. no. 18.
Evosmia Humb. et Bonpl. II. 489.
—? corymbosa Bth. II. 489. no. 1.
Ewyckia Blume. II. 148. V. 724.
— capitellata Wlprs. V. 724. no. 2.
— cordata Krthls. V. 724. no. 5.
— cyanea Blume. *II. 148. no. 1. 147. no. 1. V. 724. no. 1.
— echinata Wlprs. V. 724. no. 7.
— galeata Krthls. V. 724. no. 3.
— Jackiana Wlprs. V. 724. no. 6.
— tuberculata Krthls. V. 724. no. 4.
Exacum Linn. VI. 500.
— tricolor Zolling. et Moritzi. VI. 500. no. 1.
— Zeylanicum Rxb. VI. 500. no. 2.
Exadenus Griseb. VI. 508.
— alatus Mart. et Gal. VI. 508. no. 1.
— parvifolius Mart. et Gal. VI. 508. no. 2.
Eximbricata (Eupatorium) DC. VI. 710. no 7.
Exitelia Blume. I. 351. V. 115.
— corymbosa Blume. I. 351. no. 1.
— multiflora Wlprs. V. 115. no. 1.
Exoacantha Labill. *II. 424.
Exochaenium Griseb. *VI. 501.
Exogonium Choisy. VI. 532.
— Purga Hook. *VI. 743. no. 1.
Exostemma DC. II. (ex p.) 509.
Exostemma L. C. Rich. II. 508. VI. 63.
— *australe* St. Hil. VI. 70. no. 1.
— bicolor Poepp. et Endl. II. 508. no. 2.
— *cuspidatum* St Hil. VI. 70. no. 1.
— *dissimiliflorum* Roem. et Schult. VI. 67. no. 7.
— *formosum α. laeve* Cham. et Schlchtd. VI. 68. no. 3.
— *formosum β. leprosum* Cham. et Schlchtd. VI. 68. no. 2.
— longiflorum Roem. et Schult. VI. 63. †
— *longiflorum* Roem. et Schult. VI. 702.
— *macrocnemia* G. Don. VI. 67. no. 12.
— macrocnemia G. Don. II. 508. no. 4.
— Maynense Poepp. et Endl. II. 508. no. 1.
— occidentale Bth. VI. 63. no. 1.
— triflorum G. Don. II. 508. no. 3.
Exostyles Schott. I. 845.
— glabra Vogel. I. 845. no. 2.
— venusta Schott. *I. 845. no. 1.
Exothea Mcfd. I. 557. (*V. 419.)
— oblongifolia Mcfd. *I. 557. no. 1.
— *oblongifolia* Mcfd. V. 366. no. 1.
— *paniculata* Hook. V. 366. no. 1.
Exscapae Boiss. II. (Gypsophila) 773.
Eysenhardtia H. B. Kth. *I. 655.

F

Fabago Tourn. V. 386. no. 1.
— *Africana arborescens, flore sulphureo, fructu rotundo* Commel. I. 497. no. 23.
Fabera C. H. Schultz. °VI. 337.
— Cretensis C. H. Schultz. VI. 338. no. 2.
— hispida C. H. Schultz. VI. 337. no. 1.
Fabiana Rz. et Pav. III. 5. °III. 953. °VI. 567.
— denudata Miers. VI. 567. no. 1.
— imbricata Rz. et Pav. III. 5. no. 1.
— lanuginosa Hook. et Arn. III. 5. no. 2.
— *lanuginosa* Hook et Arn. VI. 550. no. 1.
— thymifolia St. Hil. III. 5. no. 4.
— *thymifolia* St. Hil. VI. 571. no. 8.
— viscosa Hook et Arn. III. 5. no. 3.
Fabianeae Miers. VI. 566.
Fabricia Gaertn. *II. 169. II. 922. *V. 740.
— *incana* Dum. II. 167. no. 8.
— *minor* Hort. II. 167. no. 8.
— *pubescens* Hort. II. 167. no. 8.
— *sericea* Willd. II. 17. no. 8.
Facelideae Lssng. II. 681. VI. 320.
Facelis Cass. *II. 681. *VI. 320.
Fagara alata Eckl. et Zeyh. I. 521. no. 16.
— *triphylla* Lam. I. 520. no. 9.
— *triphylla* Rxb. I. 520. no. 10.
— *zanthoxyloides* Willd. I. 520. no. 13.
Fagarastrum G. Don. I. 559.
— anisatum G. Don. I. 559. no. 4.
— Capense G. Don. I. 559. no. 2.
— inaequale G. Don. *I. 559. no. 1.
— *Natalense* Hochstett. V. 396. no. 2.

Fagarastrum Thunbergii G. Don. *I. 559. no. 3.
Fagelia Neck. I. 782. V. 539.
— flexuosa Meisn. V. 539. no. 1.
— pubescens Eckl. et Zeyh. I. 782. no. 1.
— viscida Eckl. et Zeyh. I. 782. no. 2.
Fagoides triloba Bkns. II. 453. no. 3.
Fagonia Tour. I. 494. II. 822. V. 385.
— Aucheri Boiss. II. 823. no. 3.
— Californica Bth. V. 385. no. 1.
β. Barclayana.
α. Hindsiana.
— Chilensis Hook. I. 494. no. 1.
— Mysorensis Rth. *I. 494. no. 2.
— Sinaïca Boiss. II. 822. no. 1.
— subinermis Boiss. II. 823. no. 2.
Fagraea Thnbrg. VI. 498.
— obovata Wall. *VI. 498. no. 1.
— *peregrina* Blume. VI. 498. no. 1.
Fagraeaceae Meisn. VI. 498.
Fagus lutea Molina. I. 521. no. 18.
Falcatula Ser. I. 637. II. 849.
Falcifoliae (Albizzia) Bth. V. 597.
Falcularia Ledeb. II. 847.
Falkia Linn. fil. VI. 543.
— oblonga Bernhardi. VI. 543. no. 1.
Fallugia Endl. II. 46.
— Mexicana Wlprs. *II. 46. no. 1.
Faramea A. Rich. II. 478. VI. 43.
— anisocalyx Poepp. et Endl. II. 478. no. 4.
— caudata Gardn. VI. 44. no. 4.
— contracta Wlprs. VI. 44. no. 5.
— crassifolia Bth. II. 478. no. 6.
— cuspidata Bth. VI. 44. no. 2.
— erythropoda Miquel. VI. 43. no. 1.
— glandulosa Poepp. et Endl. II. 479. no. 13.
— graciliflora Mart. II. 478. no. 8.
— hyacinthina Mart. II. 478. no. 3.
— longiflora Mart. II. 479. no. 14.
— longifolia Bth. II. 478. no. 7.
— macrophylla Mart. II. 479. no. 15.
— marginata Cham. II. 479. no. 12.
— marginata Mart. II. 479. no. 11.
— nemoralis Mart. II. 479. no. 16.
— nigrescens Mart. II. 478. no. 10.
— pendula Poepp. et Endl. II. 478. no. 5.
— quinqueflora Poepp. et Endl. II. 478. no. 1.
— rivularis Gardn. VI. 44. no. 3.
— salicifolia Prsl. II. 478. no. 2.
— stenopetala Mart. II. 478. no. 9.
Farameoides DC. II. 479.
Farctae (Crotalaria) Bth. V. 447.
Farnesia odora Gasparini. I. 909. no. 236.
Farquharia excelsa Hilsenberg et Boj. V. 54. no. 1.
Farsetia Turra. I. 139. II. 757.
Farsetia clypeata R. Br. I. 140. †
— Hamiltonii Royle. I. 139. no. 6.
— linearis Dcne. I. 139. no. 5.
— longisiliqua Dcne. I. 139. no. 2.
— lunarioides R. Br. I. 140. †
— *Lybica* Spr. I. 142. no. 4.
— macrocarpa Boiss. I. 139. no. 3.
— pendula Boiss. I. 139. no. 4.
— rostrata Schenk. I. 139. no. 1.
— spathulata Kar. et Kir. II. 757. no. 1.
— triquetra Prtnschlg. I. 140. †.
Farsetiana DC. II. 757. no. 1.
Fasciculatae (Malva) DC. I. 293.
Fatioa DC. II. 114.
— Nepalensis DC. *II. 114. no. 1.
Faujasia Cass. *II. 650.
Fedia Mnch. II. 528. II. 944.
— *acaulis* Stev. II. 391. no. 1.
— brachystephana Ten. II. 528. no. 1.
— *exscapa* M. B. II. 391. no. 1.
— *Fagopyrum* Torr. et Gr. II. 527. no. 13.
— graciliflora Fisch. et Mey. II. 528. no. 2.
— *laxa* Hook. et Arn. II. 528. no. 1.
— *longiflora* Torr. et Gr. II. 527. no. 11.
— *Nutallii* Torr. et Gr. II. 527. no. 12.
— orientalis Schlchtd. II. 944. no. 1.
— *radiata* Torr. II. 527. no. 13.
— *samolifolia* Bert. II. 531. no. 1.
— *Woodsiana* Torr. et Gr. II. 527. no. 8.
Felicia DC. *II. 559. *II. 951. no. 2. II. 956.
— Kraussii C. H. Schultz. II. 956. no. 1.
— Natalensis C. H. Schultz. II. 956. no. 2.
Felicanea rubiflora Cambess. II. 150. no. 1.
Fenzlia Endl. II. 150.
— obtusa Endl. II. 150. no. 1.
— retusa Endl. II. 150. no. 2.
Ferdinanda Lag. *II. 611.
Ferdinandusa Pohl. II. 510.
— elliptica Pohl. II. 510. no. 1.
— ovalis Pohl. II. 510. no. 2.
— speciosa Pohl. II. 510. no. 3.
Feretia Delile. °VI. 43.
— apodanthera Delile. *VI. 43. no. 1.
Fernandezia Barnéoud. IV. 190.
Fernelia Commers. *II. 516.
Feronia Corr. I. 382. *V. 140.
— elephantum Corr. I. 382. no. 1.
— *pellucida* Bth. I. 382. no. 1.
Ferrandia oleifolia Gaud. I. 94. no. 23.
Ferula DC. V. 874. et 877.
Ferula Tournef. II. 407. II. 938. V. 877.
—? Anatolica Boiss. V. 879. no. 8.
—? angulata Schlchtd. II. 938. no. 1.
— *angulata* Schlchtd. V. 874. no. 3.
—? Armena C. Koch. II. 408. no. 5. *V. 877. no. 1.

Ferula aurea Lnk. V. 878. no. 4.
— *Barrelieri* Ten. V. 898. no. 1.
— canescens Ldb. V. 877. no. 2.
— *carvifolia* Hook. et Arn. II. 412. no. 31.
— *Drummondii* Hook. et Arn. II. 416. no. 1.
— erubescens Boiss. V. 878. no. 7.
— *foeniculacea* Hook. II. 412. no. 28. 29.
— *foeniculacea* Nutt. II. 412. no. 28.
— *geniculata* Gussone. V. 877. no. 11.
— gracilis Ldb. V. 878. no. 5.
β. microcarpa.
— Granatensis Boiss. II. 407. no. 1.
— *hispida* Friv. V. 874. no. 2.
— Linkii B. Webb et Berth. V. 877. no. 4.
— *macrocarpa* Hook. et Arn. II. 412. no. 29.
— marathrophylla Wlprs. V. 877. no. 3.
— meïfolia Eckl et Zeyh. II. 408. no. 6.
— *meoides* Linn. V. 898. no. 4.
— *myriophylla* M. Bieb. V. 898. no. 1.
— *nodiflora* Rochel. V. 898. no. 1.
— *nudicaulis* Nutt. II. 411. no. 27.
— *Nuttallii* DC. II. 411. no. 27.
— *orientalis* Tournef. V. 882. no. 6.
— pachyloba Fnzl. II. 407. no. 3.
— *Palmella* Hook. II. 417. no. 1.
— paniculata Ldb. V. 878. no. 6.
— *parvifolia* Hook. et Arn. II. 412. no. 30.
— *paucijuga* DC. V. 893. no. 3.
— *Persica* Sims. V. 879. no. 7.
— *petiolaris* DC. V. 883. no. 10.
— *peucedanifolia* Willd. V. 884. no. 12.
— *racemifera* Szovitz. II. 408. no. 2. V. 897. no. 2.
— *resinosa* Sievers. V. 878. no. 6.
— seseloides C. A. Mey. II. 407. no. 2. V. 882. no. 1.
— *seseloides* C. A. Mey. V. 893. no. 5.
— setifolia C. Koch. II. 408. no. 4.
— *sylvatica* Bess. V. 898. no. 1.
— teterrima Kar. et Kir. II. 408. no. 7.
— *villosa* Walt. II. 407. no. 3.
Ferulogo DC. II. 407. V. 874.
Ferulago Koch. V. 874.
— asparagifolia Boiss. V. 875. no. 7.
— Aucheri Boiss. V. 876. no. 10.
— geniculata Boiss. V. 877. no. 11.
— *Granatensis* Boiss. II. 407. no. 1.
— humilis Boiss. V. 876. no. 8.
— linearifolia Boiss. V. 874. no. 3.
— longistylis Boiss. V. 875. no. 6.
— lophoptera Boiss. V. 877. no. 12.
— oxyptera Boiss. V. 875. no. 5.
— scabra Fnzl. V. 874. no. 1.
— *setifolia* C. Koch. II. 408. no. 4.
— stellata Boiss. V. 876. no. 9.
— *sylvatica* Rchb. V. 898. no. 1.
Ferulago trachycarpa Boiss. V. 875. no. 4.
— trifida Boiss. V. 874. no. 2.
Ferularia DC. II. 408. V. 877.
Fevillea Linn. *II. 191. II. 933.
— *pedata* Sm. V. 758. no. 1.
— tomentosa Gardn. II. 933. no. 1.
Ficaria Dill. I. 46. II. 740.
— calthaefolia Rchb. I. 46. †
— fascicularis C. Koch. I. 46. no. 1. *II. 740. no. 1.
— *glacialis* Fisch. I. 46. no. 1.
— ranunculoides Mnch. I. 46. †
Fichtea Schultz. * VI. 328.
FICOIDEAE DC. (ex p.) II. 268. V. 783.
FICOIDEAE Juss. (ex p.) II. 230. II. 265. V. 807.
Ficoides occidentale spinosum melonis facie, sulcis rectis Herm. II. 305. no. 9.
— *sive Melocactus Americanus tomentoso capite* Pluk. II. 305. no. 9.
Fieldia A. Cunn. * VI. 523.
Figaraea Aegyptiaca Viv. II. 52. no. 1.
Filaginopsis Torr. et Gr. *II. 599. *II. 952. no. 3. II. 972. °VI. 139.
— Drummondii Torr. et Gr. II. 972. no. 2. VI. 139. no. 2.
— multicaulis Torr. et Gr. *II. 972. no. 1. VI. 139. no. 1.
Filago Tournef. II. 648. °VI. 245.
— arvensis Linn. VI. 247. no. 9.
— Californica Nutt. II, 648. no. 1. *VI. 274. no. 4.
β. tomentosa Torr. et Gr. II. 648. no. 1.
— congesta Gussone. *VI. 247. no. 3.
— *filiformis* Lam. VI. 248. no. 1.
— *Gallica* Linn. VI. 248. no. 1.
— Germanica Linn. VI. 246. no. 2.
— Jussieui Cosson et Germain. VI. 245. no. 1.
— *minima* Fries. VI. 247. no. 7.
— montana Linn. VI. 247. no. 7.
— neglecta DC. VI. 247. no. 8.
— parvula Torr. et Gr. II. 648. no. 2. *VI. 247. no. 5.
— prostrata DC. VI. 247. no. 6.
Filicinae Bth. (Acacia) I. 919. V. 591.
Fillaea Guill. et Perr. I. 857. °V. 576.
—? Brucei Fresen. I. 857. no. 2. V. 576. no. 2.
— suaveolens Guill. et Perr. *I. 857. no. 1. V. 576. no. 1.
Fimbriaria Cujabensis Griseb. V. 356. no. 6.
— *elegans* Adr. Juss. V. 355. no. 6.
— *janusioides* Adr. Juss. V. 353. no. 1.
— *muricata* Adr. Juss. V. 354. no. 4.
Findlaya Bodwich. *VI. 447.

Findlaysonia Wall. * VI. 480.
Firmiana Marsili. ° V. 104.
Firmiana Schott et Endl. V. 104.
— colorata Horsf. et Bennet. * V. 104. no. 2.
— platanifolia Schott et Endl. * V. 104. no. 1.
Fischeria DC. * VI. 490.
— calycina Dcne. VI. 490. †
— macrocarpa Poepp. et Endl. VI. 490. no. 1.
— scandens DC. VI. 490. †
Fissenia R. Br. II. 228.
— Capensis R. Br. * II. 228. no. 1.
Fistula DC. I. 812. V. 559. no. 6.
Fitchia Hook. fil. ° VI. 365.
— nutans Hook. fil. VI. 366. no. 1.
Fivaldia Endl. * II. 587.
Flabellaria paniculata Cavanilles. V. 296. no. 4.
Flacourtia Commers. I. 205.
— amara Spanoghe. I. 205. no. 3.
— *crenata* Wall. I. 203. no. 2. et 3.
— edulis Schum. et Thonn. I. 205. no. 1.
— Japonica Wlprs. I. 205. no. 2.
— racemosa Prsl. I. 205. no. 4.
— *racemosa* Sieb. et Zucc. I. 205. no. 2.
— Ramontchi L'Hér. I. 205. †
— *Timoriensis* Zipp.? I. 205. no. 3.
— tomentosa Prsl. I. 205. no. 5.
— *Wightiana* Wall. I. 203. no. 4.
Flacourtianeae Endl. I. 205. V. 56.
FLACOURTIANEAE Rich. I. 202. V. 55.
Fladermannia Bnge. III. 686. ° III. 981.
— parviflora Trautvett. * III. 686. no. 2.
— Taurica Bnge. III. 686. no. 1.
Flammula DC. I. 3. no. 1. 7. 8. 9. 11. 12 17. 18. V. 3. no. 1.
Flaveria Juss. * II. 623. II. 987.
— linearis Lag. * II. 987. no. 1.
— *maritima* H. B. Kth. II. 987. no. 1.
— *tenuifolia* Nutt. II. 987. no. 1.
Flaverieae Lssng. II. 623. II. 987.
Fleischeria Steudel. ° V. 110.
— pubens Steudel. * V. 110. no. 1.
Flemmingia Rxb. I. 790. II. 902.
— bracteata Wght. I. 791. no. 6.
— congesta Rxb. * I. 791. no. 2. II. 902. †
— Grahamiana Wght. et Arn. I. 791. no. 4. (III. Emend. p. 4.)
— Guineensis G. Don. II. 902. no. 1.
— lineata Rxb. II. 902. †
— nana Rxb. II. 902. †
— *polysperma* Moon. I. 660. no. 1.
— procumbens Rxb. II. 902. †
— *Rothiana* DC. I. 748. no. 11.
— semialata Rxb. II. 902. †
— *semialata* Wall. I. 791. no. 2.
— *semialata var. vestita* Wall. I. 791. no. 3.
Flemmingia stricta Rxb. I. 790. no. 1.
— strobilifera Rxb. I. 791. †
— Wallichii Wght. et Arn. I. 791. no. 3.
— Wightiana Grah. I. 791. no. 5.
Flemmingiastrum DC. I. 790.
Flindersia R. Br. * I. 436.
Floerkea Willd. I. 467.
— *lacustris* Pers. I. 467. no. 1.
— *marsupiiflora* Spr. VI. 387. no. 1.
— *palustris* Nutt. I. 467. no. 1.
— proserpinoides Willd. * I. 467. no. 1.
— *uliginosa* Mühlbrg. I. 467. no. 1.
Florestina Cass. * II. 626.
— *callosa* DC. II. 949. no. 2.
Floribundae Bth. (Inga) V. 635.
Flotowia Spr. * II. 679. VI. 314.
— flagellans Casaretto. VI. 314. no. 3.
— leptacantha Gardn. VI. 314. no. 2.
— quinquenervis Gardn. VI. 314. no. 1.
Flourensia DC. * II. 618. VI. 167.
— Besseriana Meyen et Wlprs. VI. 167. no. 2.
— corymbosa DC. * VI. 167. no. 1.
Fockea Endl. * VI. 486.
Foeniculum Adans. II. 401. II. 938. V. 864.
— divaricatum Griseb. V. 864. no. 2.
— Kraussianum Meisn. II. 938. no. 1.
— multiradiatum C. Koch. V. 864. no. 1.
— panmorium DC. * II. 401. no. 1.
— *segetum* Dsf. II. 396. no. 1.
— vulgare Gaertn. * II. 401. no. 2.
Foenum Graecum Ser. I. 637. II. 848.
Foetidia Commers. * II. 193.
Foliolatae Bth. (Crotalaria) V. 443.
Foliosae Wlprs. (Verbena) IV. 13.
Folium hirci Rmph. IV. 93. no. 4.
— *hircinum seu Gumira domestica* Rmph. IV. 94. no. 10.
Fontanesia Labill. * VI. 461.
Fontanella St. Hil. et Tulasne. I. 524. (* V. 397.)
— Brasiliensis St. Hil. et Tulasne. * I. 524. no. 1.
Forgesia Commers. * II. 379.
Forstera Linn. fil. * II. 705. ° VI. 370.
Forstera Linn. fil. VI. 371.
— clavigera Hook. fil. VI. 371. no. 2.
— muscifolia Willd. * VI. 371. no. 1.
— sedifolia Linn. fil. * VI. 371. no. 3.
— *uliginosa* Hombron et Jacquinot. VI. 371. no. 1.
Forsteronia F. W. Meyer. * VI. 474.
Forsteropsis Sonder. ° VI. 371.
— Preissii Sonder. * VI. 371. no. 1.
Forsythia Vahl. * VI. 461.
Fortuynia Shuttlew. I. 183.

Fortuynia Aucheri Boiss. I. 183. no. 2.
— Garcini Shuttlew. *I. 183. no. 1.
Fothergilla Linn. fil. *II. 435.
— *involucrata* Royle. II. 840. no. 1.
Fothergilleae Endl. II. 435.
Fouquiera H. B. Kth. *I. 259.
Foveolaria Rz. et Pav. VI. 460.
— ferruginea Rz. et Pav. *VI. 460. no. 1.
Fragaria Linn. II. 25.
— *Californica* Schlchtd. II. 25. no. 3.
— Chilensis Ehrh. *II. 25. no. 3. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— Indica Andr. *II. 26. no. 5.
— *Malayana* Rxb. II. 26. no. 5.
— Mexicana Schlchtd. II. 25. no. 4.
— Nilagirica Zenk. II. 25. no. 2.
— *sericea* Dougl. II. 25. no. 3.
— Sundaica Blume. II. 25. no. 1.
Fragariastrum Ser. II. 31. V. 654.
Fragarieae Torr. et Gr. II. 25. V. 651.
Fragarius ruber Rmph. V. 708. no. 2.
Fragiferum Tournef. (Trifolium) V. 512. no. 2.
Fragosa spinosa Rz. et Pav. II. 386. no. 1.
Franciscea Pohl. III. 237. III. 452. °III. 960.
— acuminata Pohl. III. 238. no. 4. *III. 452. no. 4.
— *acuminata* Pohl. VI. 745. no. 1.
— confertiflora Pohl. III. 238. no. 6.
— divaricata Pohl. III. 238. no. 7.
— Hopeana Hook. III. 237. no. 1.
— hydrangeaeformis Pohl. III. 239. no. 8.
— *hydrangeaeformis* Pohl. VI. 633. no. 1. VI. 745. no. 2.
— latifolia Pohl. III. 238. no. 3. III. 936.
— macrophylla Cham. et Schlchtd. III. 239. no. 10.
— pauciflora Cham. et Schlchtd. III. 239. no. 9.
— ramosissima Pohl. III. 238. no. 5. *III. 936.
— uniflora Pohl. III. 237. no. 2.
Francisia Endl. *II. 160. *V. 733.
Francoa Cav. II. 264. *II. 734.
— appendiculata Cav. II. 264. no. 1.
— ramosa G. Don. II. 264. no. 4.
— rupestris Poepp. II. 264. no. 3.
— sonchifolia Cav. II. 264. no. 2.
Francoaceae Don. II. 264. V. 807.
FRANCOACEAE Adr. Juss. II. 734.
Francoeuria Cass. *II. 601. *II. 954. no. 1.
Frankenia L. I. 259. V. 74.
— campestris Schauer. V. 74. no. 1.
— capitata B. Webb et Berthel. *I. 259. no. 2. (c. varr. α. β. et γ.)
— cymbifolia Hook. I. 259. no. 6.
Frankenia ericifolia Chr. Sm. *I. 259. no. 2.
α. latifolia B. Webb et Berthel.
β. microphylla B. Webb et Berthel.
— grandifolia Cham. et Schlchtd. I. 259. no. 5.
— *hirsuta* Linn. I. 259. no. 2. α.
— *intermedia* DC. I. 259. no. 2.
— Krebsii Cham. et Schlchtd. I. 259. no. 4.
— *laevis* Linn. I. 259. no. 2. β.
— *latifolia* Prsl. I. 259. no. 5.
— *Nothria* Thbrg. I. 259. no. 2.
— pulverulenta L. *I. 259. no. 1.
— *thymifolia* Linn I. 259. no. 2. γ.
— *virens* Desf. I. 259. no. 1.
FRANKENIACEAE St. Hil. I. 259. V. 74.
Franseria Cav. II. 606. VI. 153.
— bipinnatifida Nutt. II. 606. no. 1.
— *Chamissonis α. bipinnatifida* Lssng. VI. 153. no. 1.
β. *bipinnatisecta* Lssng. II. 606. no. 1.
— chenopodiifolia Bth. VI. 154. no. 4.
— cuneifolia Nutt. II. 606. no. 4.
— discolor Nutt. II. 606. no. 3.
— hispida Bth. VI. 153. no. 3.
— Hookeriana Nutt. *II. 606. no. 6.
— Lessingii Meyen et Wlprs. VI. 153. no. 1.
— montana Nutt. II. 606. no. 5.
— pumila Nutt. II. 606. no. 2.
— Tacorensis Meyen et Wlprs. VI. 153. no. 2.
Frasera Wall. *VI. 509.
Frauenhofera Mart. I. 536.
— multiflora Mart. *I. 536. no. 1.
Fraxineae Bartl. VI. 460.
Fraxinus Tournef. VI. 460.
— coriariaefolia Scheele. VI. 460. no. 2.
— curvidens Hffmsgg. VI. 460. no. 4.
— dentata Tausch. VI. 460. no. 3.
— latifolia Bth. VI. 460. no. 1.
Fresenia DC. *II. 589. *II. 952. no. 19.
Freyera Rchb. II. 423. V. 908.
— Biasolettiana Rchb. *II. 423. no. 1.
— cynapioides Griseb. V. 908. no. 1.
Freylinia Bth. III. 263. °III. 962. *VI. 640.
— cestroides Colla. III. 263. no. 1.
— densiflora Bth. III. 263. no. 2.
— longiflora Bth. III. 263. no. 3.
— *oppositifolia* Spin. III. 263. no. 1.
— rigida G. Don. III. 263. no. 5.
— undulata Bth. III. 263. no. 4.
α. carinata.
β. foliis glabris undulatis.
γ. pubescens.
Freziera Swrtz. I. 370.
— dioica Mcfd. I. 370. no. 1.
— integrifolia Bth. I. 370. no. 2.
Friedlandia hirtella Cham. et Schlchtd. II. 113. no. 5.

Friesia DC. *I. 365. V. 121.
— racemosa A. Cunn. V. 121. no. 1.
Fridericia Martius. *VI. 511.
Fritschia Cham. II. 126.
— anisostemon Cham. II. 126. no. 2.
— erecta Cham. II. 126. no. 3.
— integrifolia Cham. II. 126. no. 1.
Froriepia C. Koch. II. 417. * V. 896.
— nuda C. Koch. II. 417. no. 1.
Frutex Africanus Ericae folio glutinosus, flore spicato albo Commel. VI. 130. no. 3.
— *baccifer verticillatus etc.* Catesb. IV. 127. no. 8.
Fruticosa C. H. Schultz. (Tanacetum) VI. 224.
Fruticosae Bth. (Crotalaria) V. 450.
Fuchsia Plum. II. 94. II. 915. V. 666.
Fuchsia Spach. II. 94.
Fuchsia Zucc. II. 94.
— affinis Cambess. II. 95. no. 12.
— *affinis* Cambess. II. 915. no. 1.
— *affinis* Gardn. II. 915 no. 1.
— alpestris Gardn. II. 95. no. 16.
— ampliata Bth. V. 668. no. 9.
— arborescens Sims. II. 95. †
— baccillaris Lindl. II. 94. no. 4.
— canescens Bth. V. 668. no. 11.
— Caracasana Gardn. V. 669. no. 16.
— *coccinea* Cav. II. 94. no. 6.
— confertifolia Gardn. V. 669. no. 15.
— cordifolia Bth. II. 94. no. 7. (V. 666. no. 1.)
— corollata Bth. V. 668. no. 12.
— corymbifera Rz. et Pav. II. 95. † *II. 915. no. 2.
— corymbiflora Rz. et Pav. V. 669. †
— curviflora Bth. V. 667. no. 7.
— cylindracea Lind. II. 94. no. 2.
— *decussata* Grah. II. 94. no. 6. *α.*
— dependens Hook. II. 94. no. 9.
— discolor Lindl. II. 95. no. 17.
— Exoniensis Hort. V. 669. †
— fulgens Moç. et Sess. II. 95. †
— globosa Lindl. II. 94. no. 10.
— *gracilis* Lindl. II. 94. no. 6. *α.*
— Hartwegi Bth. V. 668. no. 13.
— integrifolia Cambess. II. 95. no. 11. *II 915. no. 1.
— longiflora Bth. V. 657. no. 8.
— macropetala Prsl. II. 95. no. 19.
— macrostemma Rz. et Pav. *II. 94. no. 6.
α. grandiflora Sweet.
γ. parviflora Rz. et Pav.
β. recurvata Hook.
— macrostigma Bth. V. 666. no. 2.
— microphylla H. B. Kth. *II. 94. no. 1.
— montana Cambess. II. 95. no. 14.
Fuchsia pilosa Gardn. V. 669. no. 14.
— procumbens A. Cunn. II. 95. no. 18.
— pubescens Cambess. II. 95. no. 13.
— pyrifolia Prsl. II. 94. no. 8.
— *pyrifolia* Prsl. II. 915. no. 1.
— radicans Miers. II. 95. no. 15. V. 669. †
— scabriuscula Bth. V. 667. no. 6.
— serratifolia Rz. et Pav. V. 669. †
— sessilifolia Bth. V. 667. no. 5.
— spinosa Prsl. II. 94. no. 5.
— splendens Zucc. V. 669. †
— sylvatica Bth. V. 667. no. 4.
— thymifolia H. B. Kth. *II. 94. no. 3.
— umbrosa Bth. V. 667. no. 3.
— verrucosa Hartweg. V. 668. no. 10.
Fuchsieae DC. II. 94. V. 666.
Fürnrohria C. Koch. II. 395. * V. 862.
— setifolia C. Koch. II. 395. no. 1.
Fugosia Juss. I. 307. V. 92.
Fugosia DC. I. 307.
— affinis St. Hil. I. 307. no. 2.
— campestris Bth. I. 307. no. 4.
— cuneata Bth. V. 92. no. 1.
— phlomidifolia St. Hil. I. 307. no. 3.
— sulphurea St. Hil. I. 307. no. 1.
Fulcaldea Poir. * II. 678. * VI. 312.
Fullartonia DC. II. 578. *II. 951. no. 16.
Fumana Spach. *I. 206.
Fumaria Brnhrdi. °V. 26.
Fumaria Tournef. I. 122. II. 750.
Fumaria Tragus. V. 27. no. 1.
— *Aegyptiaca* Steinh. V. 27. no. 2.
— *Africana* Lam. V. 31. no. 8.
— agraria Lagasca. V. 29. no. 6.
β. Chilensis Parlatore.
— *alba latifolia repens* Cast. V. 30. no. 7.
— Alexandrina Ehrnbrg. V. 31. no. 10.
— *Alexandrina* Gasparini. V. 30. no. 7. *β.*
— *Altaica* Ledeb. I. 119. no. 4.
— *altera flore albo* Tabernaem. V. 30. no. 7.
— *altera tenerior Syriaca* Camer. V. 28. no. 4.
— *ambigua* Pall. I. 120. no. 16.
— *aurea* Ker. I. 121. no. 34.
— calycina Babingt. I. 122. no. 4.
— *calycina* Babingt. V. 27. no. 2.
— *capreolata* Buch. V. 29. no. 5.
— *capreolata* DC. V. 30. no. 7. *γ.*
— *capreolata* Delile. V. 29. no. 6.
— *capreolata* Engl. bot. I. 122. no. 2.
— *capreolata* Gaudich. V. 29. no. 6. *β.*
— capreolata Linn. V. 29. no. 7.
β. Burchellii DC. * V. 31. no. 11.
— corymbosa Dsf. V. 31. no. 8.
— *crassifolia* Dsf. V. 25. no. 2.

Fumaria crassifolia DC. I. 122. no. 2.
— *densiflora β. albida* DC. V. 28. no. 3.
— *diffusa* Arnott. V. 27. no. 1.
— *diffusa* Much. V. 28. no. 3.
— *enneaphylla* Linn. V. 24. no. 1.
— *enneaphylla Hispanica saxatilis* Bocc. V. 25. no. 1.
— *exilis foliis tenuissimis etc.* C. Bauh. V. 28. no. 3.
— *exilis Romana* Bocc. V. 28. no. 4.
— *fabacea* Lois. I. 119. no. 1.
— *flabellata* Gasparini. V. 30. no. 7. β.
— *fungosa* Willd. I. 118. no. 1.
— Gasparinii Babingt. I. 122. no. 5.
— *Gasparinii* Babingt. V. 27. no. 1.
— *Hispanica saxatilis etc.* Tournef. V. 25. no. 1.
— *intermedia* Schkhr. I. 118. no. 1.
— *leucantha* Viv. I. 122. no. 3. V. 28. no. 3.
—? Lichtensteinii Cham. et Schlchtd. I. 123. no. 7.
— Lobelii Tausch. I. 122. no. 6. *V. 31. no. 13.
— *lobis longioribus et angustioribus sparsis* Vaill. V. 28. no. 4.
— macrocarpa Parlat. II. 750. no. 2. V. 29. no. 5.
— macrosepala Boiss. I. 122. no. 1. V. 30. no. 7 b.
— *major* Badarro. V. 29. no. 6.
— *major* Tenore. V. 30. no. 7. γ.
— *major floribus dilute purpureis* Vaill. V. 29. no. 6.
— *major scandens flore pallidiore* Ray. V. 30. no. 7 a.
— *media* Bast. V. 30. no. 7. γ.
— *media* DC. I. 122. no. 2. V. 29. no. 6.
— *media* Lois. I. 122. no. 2. V. 27. no. 1.
— *media* Montgne. V. 30. no. 7.
— *media* Reuter. V. 31. no. 9.
β. prehensibilis DC. V. 27. no. 2.
— megalocarpa Boiss. II. 750. no. 1.
— *megalocarpa* Boiss. V. 29. no. 5.
— micrantha Lag. I. 123. † V. 27. no. 2.
— *micrantha* Lichtnst. I. 123. no. 7.
— *minor foeniculi tortuosi folio etc.* Bov. V. 28. no. 3.
— *minor folio oblongo capillaceo* C. Bauh. V. 28. no. 4.
— *minor sive tenuifolia surrecta* J. Baub. V. 26. no. 1.
— *Mundtii* Spr. V. 24. no. 1.
— *Neapolitana* Vaill. V. 30. no. 7.
— nobilis L. *I. 123. no. 8.
— *officinalis* Chaubard. V. 27. no. 2.
— *officinalis* Fisch. V. 28. no. 4.
Fumaria officinalis L. *I. 122. no. 2. (c. varr. β. et γ.) V. 26. no. 1.
γ. albiflora / β. densiflora } Parlatore. V. 27. no. 1.
— *officinalis* B. Webb. V. 30. no. 7.
— *officinalis* Linn. *densiflora a.* DC. V. 27. no. 1. β.
— *officinalis δ. densiflora* Moris. V. 27. no. 2.
— *officinalis β. grandiflora* DC. V. 29. no. 6.
— *officinalis β. major* Moris. V. 29. no. 6.
— *officinalis β. minor* Gasparini. V. 27. no. 1. β.
— *officinarum* Necker. V. 27. no. 1.
— parviflora Lam. *I. 122. no. 3. (c. var. β.) V. 27. no. 3.
— *parviflora* Sibthrp. I. 122. no. 2. V. 27. no. 2.
— *parviflora* Wght. et Arn. V. 28. no. 4.
β. Vaillantii Gaud. ibid.
— *peregrina* Rudlph. I. 118. no. 2.
— *Petteri* Heldreich. V. 30. no. 7. γ.
— Petteri Rchb. I. 123. † V. 31. no. 9.
— *Petteri* Tenore. V. 27. no. 1.
— *prehensibilis* Kitaib. V. 27. no. 2.
— *pumila* Host. I. 122. no. 6.
— *radice fibrosa, foliis ad petiolum sinuatis crassioribus* Plum. V. 25. no. 1.
— *scandens* E. Mey. V. 24. no. 1.
— *Schangini* Pall. I. 119. no. 5.
— *Schleicheri* Soyer-Willem. V. 28. no. 4
— *sempervirens* L. I. 121. no. 35.
— *serotina* Juss. V. 30. no. 7. γ.
— *Sicula* Pison. V. 28. no. 3.
— *spectabilis* Linn. V. 23. no. 1.
— *spicata* Balbis. V. 28. no. 4.
— *spicata* Bertero. V. 29. no. 6. β.
— *spicata* Gorter. V. 28. no. 3.
— spicata L. I. 123. †
— *spicata* Lin. V. 26. no. 1. V. 28. no. 3.
— *tenuifolia* Fl. Wetteraw. V. 28. no. 3.
— *tenuifolia erecta purpurea Hispanica* Barrel. V. 26. no. 1.
— *tenuifolia flore albo et flore rubro* Cup. V. 28. no. 3.
— *tenuifolia, foliorum pediculis scandens, floribus alatis* Tournef. V. 27. no. 2.
— *tenuifolia semine Lini* Moris. V. 26. no. 1.
— *tenuissimis foliis, flore albo* Magnol. V. 28. no. 3.
— turbinata Sm. * V. 31. no. 12.
— *Vaillantii* Loiss. I. 122. no. 3.
— Vaillantii Loisel. V. 28. no. 4.
— *Vaillantii* Ten. V. 30. no. 7. γ.
— *viticulis et capreolis plantis vicinis adhaerens* C. Bauh. V. 30. no. 7.
— *vulgaris* J. Baub. V. 27. no. 1.

Fumaria vulgaris tenuiori folia sive Delphinii Cup. V. 27. no. 1. *β.*
Fumariae species Myconi Dalech. V. 26. no. 1.
FUMARIACEAE DC. I. 109. I. 117. V. 20.
Fumariaceae Endl. I. 117. II. 750. V. 22.
Fumaricae Bernh. I. 118. V. 22.
Fumus terrae sive Fumaria vulgaris Cam. V. 27. no. 1.
Furcaria DC. I. 302. no. 2. I. 306. no. 47.
Fusanus pedatus Spr. V. 411.
Futó vel Sáne vel Orenj Kadsura Kaempf. V. 15. no. 1.

G

Gaertnera Lam. *VI. 498.
— *laurifolia* Wall. V. 294. no. 3.
— *obtusifolia* Rxb. V. 294. no. 5.
— *racemosa* Rxb. V. 294. no. 1.
Gaertnereae Arn. VI. 498.
Gagnebina Neck. *I. 861. °V. 581.
— *axillaris* DC. V. 581. no. 1.
— tamariscina DC. *V. 581. no. 1.
Gaillardia Foug. II. 624. II. 988.
— aristata Prsh. *II. 624. no. 1.
— amblyodon Gay. II. 624. no. 4.
— *bicolor* Lam. II. 624. no. 2.
— *bicolor* Prsh. II. 625. no. 5.
β. aristata Nutt. II. 624. no. 1.
β. Drummondii Hook. II. 624. no. 3.
— *Drummondii* DC. II. 624. no. 2.
— *fimbriata* Michx. II. 988. no. 3.
— *lanceolata* Michx. II. 624. no. 1.
— lanceolata Michx. II. 625. no. 5.
— *perennis* Hort. Paris. II. 624. no. 1.
— picta Sweet. II. 624. no. 3.
— pinnatifida Torr. II. 988. no. 1.
— puchella Fouger. *II. 624. no. 2.
— *rustica* Cass. II. 624. no. 1.
Gaillardieae DC. II. 624. II. 988. VI. 175.
Gaillionia A. Rich. *II. 468. VI. 32.
— Aucheri Jaub. et Spach. VI. 34. no. 10.
— Bruguierii A. Rich. VI. 32. no. 4.
— calycoptera Jaub. et Spach. VI. 33. no. 8.
— crucianelloides Jaub. et Spach. VI. 34. no. 9.
— eriantha Jaub. et Spach. VI. 33. no. 5.
— humifusa Jaub. et Spach. VI. 33. no. 7.
— hymenostephana Jaub. et Spach. VI. 33. no. 6.
— incana Jaub. et Spach. VI. 32. no. 3.
— Olivieri A. Rich. VI. 32. no. 1.
— Richardiana Jaub. et Spach. VI. 32. no. 2.
Galaceae DC. II. 734.
Galactia P. Br. I. 761. II. 900. V. 531.
— angustifolia H. B. Kth. I. 763. no. 16.
— brachypoda Torr. et Gr. I. 761. no. 6.
— brachystachys Bth. I. 762. no. 10.
— brevistyla Schlchtd. I. 762. no. 13.
— canescens Bth. I. 761. no. 4.
— *coriacea* Nees. ab Esenb. I. 752. no. 11. V. 532. no. 1.
— dubia DC. *I. 762. no. 16.
— dumetorum Bth. I. 761. no. 9.
— Floridana Torr. et Gr. V. 532. no. 3.
— *glaucescens* H. B. Kth. I. 763. no. 8.
— hirta Mart. et Galeotti. V. 531. no. 1.
— latisiliqua Desvx. I. 762. no. 11.
— *latisiliqua* Desvx. I. 763. no. 14.
— *leucocarpa* Desvx. I. 762. no. 10.
— *longiflora* Arn. I. 763. no. 7.
— longifolia G. Wght. II. 900. no. 1.
— *lucida* Grah. I. 761. no. 1.
— *Macraei* Curtis. I. 761. no. 3. *β.*
— marginalis Bth. I. 761. no. 8.
— *Martii* DC. I. 763. no. 15.
— *Neesii* DC. I. 763. no. 13.
— pauciflora Bth. I. 762. no. 11.
— *pendula* Pers. I. 763. no. 6.
— pilosa Nutt. *I. 761. no. 3.
γ. angustifolia Torr. et Gr.
β. Macraei Torr. et Gr.
— rostrata Bth. I. 762. no. 12.
— purpurea Mart. et Galeotti. V. 531. no. 2.
— sessiliflora Torr. et Gr. I. 761. no. 7.
— spiciformis Torr. et Gr. I. 761. no. 5.
— stenophylla Hook. et Arn. I. 762. no. 14.
— tenuiflora Wght. et Arn. *I. 761. no. 1.
— velutina Bth. I. 762. no. 15.
— villosa Wght. et Arn. I. 761. no. 2.
Galactites Mnch. *II. 673.

Galapagoa Hook. fil. *°VI. 565.
Galardia acaulis Prsh. VI. 179. no. 2.
Galasia Cass. II. 689.
Galasia Lssng. *II. 689.
Galatella Cass. II. 575. *II. 952. no. 2.
— *graminifolia* Hook. II. 571. no. 112.
— hyssopifolia Nees ab E. *II. 575. no. 2. (et var. β. ibid.)
— *linifolia* Nees ab E. II. 575. no. 2.
— *obtusifolia* Lehm. II. 576. no. 2.
— *platylepis* Nees ab E. II. 576. no. 5.
— punctata DC. *II. 575. no. 1.
δ. viscosa Boiss.
Galathenium Dutt. *II. 700.
— *elongatum* Nutt. II. 694. no. 3. α.
— *Floridanum* Nutt. II. 694. no. 3. γ. II. 700. no. 3.
— *integrifolium* Nutt. II. 694. no. 3. β.
— *multiflorum* Nutt. II. 700. no. 3. β.
— *salicifolium* Nutt. II. 694. no. 3. β.
— *sanguineum* Nutt. II. 694. no. 3. γ.
Galax Linn. *II. 734.
Galbanum D. Don. II. 417.
— officinale D. Don. *II. 417. no. 1.
Galeana Llaw. et Lexarz. *II. 701. no. 4.
Galedupa elliptica Rxb. V. 543. no. 1.
— *piscidia* Rxb. I. 799. no. 3.
— *uliginosa* Rxb. I. 798. no. 2.
Galega Tournef. I. 672.
— ambigua Curtis. I. 672. no. 1.
— *ambigua* Curtis. I. 677. no. 44. β.
— *barba Jovis* Burm. I. 674. no. 4.
— biloba Sweet. I. 672. no. 2.
— *coerulea* Rottl. I. 674. no. 7. β.
— *Colonila* Ham. I. 674. no. 7. α.
— *Colutea* Burm. I. 668. no. 92.
— *diffusa* Rxb. I. 674. no. 6.
— *filiformis* Thnbrg. I. 632. no. 20.
— *filiformis* Willd. I. 632. no. 20.
— *Heyneana* Rxb. I. 673. no. 1. γ.
— *hirta* Ham. I. 674. no. 5.
— *incana* Rxb. I. 674. no. 3.
— *lanceaefolia* Rxb. I. 674. no. 7. β.
— *paucifolia* Curtis. I. 677. no. 43.
— *pentaphylla* Rxb. I. 674. no. 9.
— Persica Pers. I. 672. †
— *procumbens* Ham. I. 674. no. 6.
— *prostrata* Koen. I. 674. no. 6.
— *purpurea* L. I. 674. no. 7. α.
— *sericea* Ham. I. 674. no. 7. α.
— *spicata* Walt. I. 677. no. 43.
— *tinctoria* L. I. 673. no. 1. β.
— *tricolor* Hook. I. 672. no. 1.
— *trifoliolata* Thbg. I. 630. no. 2.
Galegeae DC. I. 651. II. 855. V. 513.
Galegiformes DC. (Astragalus) I. 704. II. 868.
Galenia Linn. II. 232.
Galenia Linn. II. 232.
— collina Eckl. et Zeyh. II. 232. no. 2.
— Ecklonis Wlprs. II. 232. no. 5.
— glauca Eckl. et Zeyh. II. 232. no. 4.
— herniariaefolia Prsl. II. 232. no. 1.
— pallens Eckl. et Zeyh. II. 232. no. 3.
Galeobdolon Hudson. III. 806.
— *amplexicaule* Mnch. III. 804. no. 11.
— *luteum* Huds. III. 807. no. 25.
— *vulgare* Pers. III. 807. no. 25.
Galeopsis Fchs. III. 168. no. 19.
Galeopsis Linn. III. 813. °III. 988.
— *acuminata* Rchb. III. 814. no. 3. α.
— *altera luteo-pallida* Park. III. 165. no. 1.
— *angustifolia* Ehrh. III. 813. no. 2.
— *angustifolia* Hoffm. III. 813. no. 2. γ.
— *bifida* Bönningh. III. 814. no. 3. α.
— *canescens* Schult. III. 813. no. 2.
— *cannabina* Willd. III. 814. no. 3. γ.
— *dubia* Leers. III. 813. no. 1.
— *Galeobdolon* Linn. III. 807. no. 25.
— *grandiflora* Gmel. III. 813. no. 1.
— *hirsuta* Linn. III. 833. no. 75.
— *Hispanica* Mill. III. 833. no. 75.
— *hispida* Thunb. III. 823. no. 27.
— *intermedia* Vill. III. 813. no. 2. β.
— Ladanum Linn. III. 813. no. 2.
β. parviflora Bth.
γ. spinosa Bth.
— *latifolia* Hoffm. III. 813. no. 2. β.
— *maculosa* Lam. III. 502. no. 7.
— ochroleuca Lam. III. 813. no. 1.
— *orientalis* Mill. III. 835. no. 81.
— *parviflora* Lam. III. 813. no. 2. β.
— *prostrata* Vill. III. 813. no. 1.
— *pubescens* Besser. III. 814. no. 3. β.
— *segetum* Rchb. III. 813. no. 1.
— *speciosa* Mill. III. 814. no. 3. γ.
— *Tetrahit* Hook. III. 814. no. 3. α.
— Tetrahit Linn. III. 813. no. 3.
γ. grandiflora }
α. parviflora } Bth. III. 814. no. 3.
β. pubescens }
— *versicolor* Curt. III. 814. no. 3. γ.
— *villosa* Sm. III. 813. no. 1.
— *Wallerina* Schlchtd. III. 814. no. 3. β.
Galericularia Arth. Hamilt. III. 756. VI. 673. no. 6.
Galiniera Delile. °VI. 43.
— coffeoides Delile. VI. 43. no. 1.
Galinsogea Rz. et Pav. *II. 630. VI. 181.
— brachystephana Regel. VI. 722.
— hispida Bth. VI. 181. no. 1.
Galinsogeae DC. II. 629. VI. 181.
Γαλίοψις Dioscor. III. 166. no. 9.

Galipea St. Hil. I. 499.
— Candolleana St. Hil. I. 500. no. 7.
— Fontanesiana St. Hil. I. 499. no. 6.
— heterophylla St. Hil. I. 499. no. 3.
— odoratissima Lindl. I. 500. no. 8.
— officinalis Hancock. *I. 499. no. 1.
— ovata St. Hil. et Tulasne. I. 500. no. 9.
— pentagyna St. Hil. I. 499. no. 4.
— pentandra St. Hil. I. 499. no. 5.
— pentaphylla Mcfd. I. 499. no. 2.
Galitachia Wlprs. V. 569.
Galium Linn. II. 454. VI. 9.
— acutum Edgwrth. VI. 699. no. 7.
— Aleppicum Boiss. VI. 11. no. 8.
— alpinum Scheele. VI. 14. no. 32.
— amatymbicum Eckl. et Zeyh. II. 456. no. 21.
— amblyophyllum Schrenk. II. 458. no. 42.
— aretioides Boiss. VI. 17. no. 42.
— aristatum Linn. *VI. 12. no. 20.
— asperuloide Edgwrth. VI. 699. no. 8.
— asperum Thnbrg. *II. 457. no. 26.
β. villosum.
— Aucheri Boiss. VI. 16. no. 40.
— Benthamianum Wlprs. VI. 17. no. 47.
— *Bermudense* Linn. II. 458. no. 36. β.
— *Bermudianum* Prsh. II. 458. no. 36. β.
— *boreale* Walt. II. 458. no. 37.
— Boryanum Wlprs. II. 454. no. 1. *VI. 12. no. 14.
— *brachiatum* Mühlbrg. II. 458. no. 37.
— *brachiatum* Prsh. II. 458. no. 35.
— bracteatum Boiss. VI. 11. no. 10.
— Broterianum Boiss. et Reut. II. 457. no. 25.
— Californicum Hook. et Arn. II. 456. no. 17.
β. crebrifolium Nutt.
γ. Texanum Torr. et Gr.
— *Capense* Thnbrg. II. 250. no. 1.
— capillare Dcne. II. 456. no. 15.
— *capillare* Dcne. VI. 699. no. 6.
— capitatum Bory et Chaub. II. 460. no. 55.
— Cappadocicum Boiss. VI. 13. no. 26.
— caudatum Boiss. VI. 9. no. 1.
— ceratocarpum Boiss. VI. 12. no. 15.
— ceratopodum Boiss. VI. 9. no. 2.
— Chamissonis Hook. et Arn. II. 457. no. 33.
— chloroleucum Fisch. et Mey. II. 456. no. 13.
— circaeoides Thnbrg. *II. 462. no. 1.
— circaezans Michx. *II. 458. no. 37.
γ. montanum Torr. et Gr.
— concinnum Torr. et Gr. II. 459. no. 45.
— consanguineum Boiss. VI. 698. no. 4.
— coriaceum Bnge. II. 457. no. 28.
— Corsicum Tausch. II. 454. no. 2.
— *cuspidatum* Mühlbrg. II. 458. no. 35.
— Davuricum Turcz. VI. 17. no. 43.
Galium Decaisnei Boiss. VI. 698. no. 6.
— demissum Boiss. VI. 16. no. 39.
— densiflorum Ldb. II. 457. no. 27.
— dumosum Boiss. VI. 14. no. 29.
— *effusum* Boiss. VI. 12. no. 18.
— effusum Boiss. VI. 12. no. 19.
— expansum Thnbrg. *II. 457. no. 22.
β. elongatum.*
— firmum Tausch. II. 455. no. 11.
— floribundum Sbthrp. et Sm. *VI. 12. no. 12.
— fuscum Martens et Galeotti. VI. 13. no. 24.
— Galeottianum Wlprs. VI. 17. no. 48.
— Gardneri Wlprs. VI. 17. no. 46.
— geminiflorum Mart. et Galeotti. VI. 17. no. 44.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 458. no. 34.
— glaucum Linn. *VI. 12. no. 17.
— gracile Bnge. II. 456. no. 19.
— Haenkeanum Endl. II. 459. no. 51.
— *Halleri* Auctor. VI. 14. no. 32.
— hispidulum Michx. *II. 459. no. 48.
— horridum Thnbrg. II. 455. no. 7.
— Hyrcanicum C. A. Mey. II. 458. no. 43.
— Jalapense Schlchtd. II. 459. no. 47.
— intricatum Endl. II. 459. no. 49.
— intricatum Reuter. II. 455. no. 3.
— jungermannioides Boiss. VI. 13. no. 27.
— *Kotschyanum* Boiss. VI. 15. no. 34. α.
— Kurdicum Boiss. et Hohenack. VI. 15. no. 36.
— Laconicum Boiss. VI. 697. no. 1.
— lasiocarpum Boiss. et Hohenack. VI. 13. no. 25.
— leiophyllum Boiss. et Hohenack. VI. 14. no. 34.
α. glabrum.
β. subvelutinum.
— leucocarpum DC. *II. 459. no. 53.
— linearifolium Turcz. II. 458. no. 41.
— *Litellii* Oakes. II. 458. no. 37. γ.
— longifolium Griseb. *VI. 12. no. 18.
— Magellense Ten. II. 455. no. 10.
— megalanthum Boiss. VI. 698. no. 2.
— melanantherum Boiss. VI. 698. no. 5.
γ. brevifolium.
δ. latifolium.
β. scabrifolium.
— *microcarpum* Frivaldsky. VI. 12. no. 11.
— mite Boiss. et Hohenack. VI. 15. no. 35.
— *Mollugo β. aristatum* DC. VI. 12. no. 20.
— *mucronatum* Rz. et Pav. II. 459. no. 53.
— mucronatum Thnbrg. *II. 457. no. 23.
β. densiflorum.
γ. subglabrum.
— musciforme Boiss. VI. 13. no. 28.
β. lanceolatum.

Galium Namaquense Eckl. et Zeyh. II. 457. no. 31.
— nebulosum Boiss. VI. 11. no. 7.
β. lasiocarpum.
α. leiocarpum.
— nigricans Boiss. VI. 10. no. 6.
— nudiflorum Viv. II. 457. no. 24.
— *nutans* Nutt. II. 455. no. 8. *β*.
— *obovatum* Cham. et Schlchtd. II. 459. no. 47.
— obstipum Schlchtd. II. 459. no. 46.
β. angustifolium.
α. latifolium.
— *ochroleucum var.* Boiss. VI. 698. no. 5.
— Olympicum Boiss. VI. 16. no. 41.
— orientale Boiss. VI. 15. no. 37.
α. alpinum } Boiss. VI. 16. no. 37.
β. cinereum }
γ. glabrum }
— pauciflorum Bnge. II. 455. no. 6.
— pendulillorum Boiss. VI. 10. no. 4.
— *Pennsylvanicum* Bart. II. 458. no. 35.
— peplidifolium Boiss. VI. 10. no. 3.
— physocarpum Ldb. VI. 14. no. 30.
— pilosum Ait. *II. 458. no. 36.
β. puncticulosum.
— pratense Scheele. VI. 14. no. 31.
— productum Lowe. II. 459. no. 44.
— propinquum A. Cunn. II. 455. no. 9.
— pruinosum Boiss. II. 458. no. 39.
— pulvinatum Boiss. II. 458. no. 40.
— *punctatum* Pers. II. 458. no. 36. *β*.
— *puncticulosum* Michx. II. 458. no. 36. *β*.
— *puncticulosum β. pilosum* DC. II. 458. no. 36.
— *purpureum* Walt. II. 458. no. 36.
— pusillum Endl. II. 459. no. 52.
— *Pyrenaicum* Sbthrp. et Sm. VI. 17. no. 41.
— Requienianum Wght. et Arn. II. 457. no. 29.
— Richardianum Endl. II. 459. no. 50.
— rivale Griseb. VI. 12. no. 16.
— rivulare Boiss. et Reut. II. 458. no. 38.
— rotundatum Griseb. *VI. 12. no. 21.
— *rotundifolium* Thnbrg. II. 457. no. 30.
— *rubioides* Brot. II. 457. no 25.
— rupestre Visiani. VI. 13. no. 22.
— rupestre Wlprs. VI. 17. no. 45.
— segetum C. Koch. II. 455. no. 5.
— Sellowianum Wlprs. II. 459. no. 54.
— *setaceum* Lam. VI. 12. no. 12.
— Simense Fresen. II. 456. no. 16.
— Soongaricum Schrenk. II. 455. no. 4.
— stoloniferum C. Koch. VI. 14. no. 33.
— *suaveolens* Wahlnbrg. II. 458. no. 35.
— suberosum Sbthrp. *VI. 13. no. 23.
Galium suffruticosum Hook. et Arn. II. 457. no. 32.
— suffruticosum Nutt. II. 456. no. 20.
— Syriacum Boiss. VI. 10. no. 5.
— *Tarmense* Spr. II. 459. no. 53.
— tenuicaule A. Cunn. II. 456. no. 18.
— tenuissimum M. Bieb. *VI. 12. no. 13.
— Thunbergianum Eckl. et Zeyh. II. 457. no. 30.
— thymifolium Boiss. VI. 698. no. 3.
— Tmoleum Boiss. VI. 16. no. 38.
— trachyanthum Boiss. VI. 11. no. 9.
α. lasiocarpum.
β. leiocarpum.
— trichophorum Griseb. VI. 11. no. 11.
— trichophorum Kar. et Kir. II. 456. no. 14.
— triflorum Michx. *II. 458. no. 35.
— virgatum Nutt. II. 455. no. 8.
β. leiocarpum.
— Zakynthicum Reuter. II. 455. no. 12.
Galophthalmum Nees et Mart. *II. 701. no. 10.
Galopina Thnbrg. II. 462. VI. 25.
—? aspera Wlprs. II. 462. no. 2.
— circaeoides Thnbrg. *II. 462. no. 1.
— tomentosa Hochstett. VI. 25. no. 1.
Galphimia Cav. °V. 182.
— angustifolia Bth. V. 186. no. 11.
— *biglandulosa* Poir. V. 185. no. 7.
— Brasiliensis Adr. Juss. V. 183. no. 1.
β. pubescens.
— *Cauca* Spr. V. 357. no. 1.
— *chrysophylla* Spr. V. 156. no. 1.
— glandulosa Cavan. V. 185. no. 7.
— *glandulosa γ.* DC. V. 185. no. 7.
— *glandulosa* H. B. Kth. VI. 186. no. 8.
— glauca Cavan. V. 184. no. 3.
— *glauca* Hortor. V. 184. no. 4.
— gracilis Bartl. V. 184. no. 4.
— grandiflora Bartl. V. 184. no. 5.
— hirsuta Cavan. V. 186. no. 10.
— Humboldtiana Bartl. V. 186. no. 8.
— latifolia Bartl. V. 185. no. 6.
—? *longifolia* H. B. Kth. V. 179. no. 1.
— *mollis* Hort. V. 186. no. 10.
—? *mollis* H. B. Kth. V. 308. no. 20.
— multicaulis Adr. Juss. V. 183. no. 2.
— paniculata Bartl. V. 186. no. 9.
— *splendens* Mackoy. VI. 184. no. 4.
Galvezia Domb. III. 230. °III. 959. *VI. 638.
— Limensis Dombey. III. 230. no. 1.
— *punctata* Rz. et Pav. I. 519. no. 1.
Gamocarpha DC. *II. 537.
Gamochilum Wlprs. I. 630. II. 842.
— obcordatum Wlprs. I. 630. no. 3.
— sericeum Wlprs. *I. 630. no. 2. *II. 842. no. 1.
β. incanum Wlprs. II. 842. no. 1.

Gamochilum umbellatum Wlprs. I. 630. no. 1.
Gamolepis Lssng. *II. 635.
Gandu Rumph. I. 858. no. 6.
Garaleum Cass. *II. 951. no. 7.
Garcilassa Poepp. et Endl. II. 601. *VI. 145. °VI. 147.
— rivularis Poepp. et Endl. *II. 601. no. 1. VI. 147. no. 1.
Garcinia L. I. 394. II. 811.
— *offinis* Wght. et Arn. I. 395. no. 7.
— affinis Wght. et Arn. I. 395. no. 11.
— Brasiliensis Mart. I. 395. no. 13.
β. parvifolia.
— Cambogia Desrouss. I. 395. no. 5.
— *Cambogia* Rxb. I. 395. no. 7.
— conocarpa Wght. I. 395. no. 10.
— *Cowa* Rxb. I. 395. no. 7.
—(?) elliptica Wall. I. 395. no. 8.
— dioica Blume. I. 395. no. 2.
— gutta Wght. I. 395. no. 9.
— *Indica* Choisy. I. 395. no. 5.
— Javanica Blume. I. 395. no. 3.
— *Kydia* Wght. et Arn. I. 395. no. 5.
— lateriflora Blume. I. 394. no. 1.
— longifolia Blume. I. 395. no. 4.
— macrophylla Mart. I. 395. no. 14.
— Merguensis Wght. I. 395. no. 6.
—? parviflora Bth. II. 811. no. 1.
— Roxburghii Wght. I. 395. no. 7.
— speciosa Wall. I. 395. no. 12.
— *Zeylanica* Rxb. I. 395. no. 7.
Garcinieae Endl. I. 394.
Gardenia Ellis. II. 519. II. 944. VI. 73.
— ......? Mart. et Galeotti. VI. 74. no. 5.
—? acuminata G. Don. II. 519. no. 3.
— calycina G. Don. II. 519. no. 2.
— campanulata Rxb. VI. 75. †
— Devoniana Lindl. VI. 702. no. 2.
— enneandra Koen. VI. 75. †
— *foliolosa* Madr. Herb. II. 518. no. 3.
— fragrans Koen. II. 517. no. 1.
— globosa Hochstett. II. 944. no. 1.
— gummifera Linn. VI. 75. †
— *jasminiflora* Zipp. II. 518. no. 4.
—? longifolia G. Don. II. 519. no. 4.
— lucida Rxb. VI. 75. †
— lutea Fresen. II. 519. no. 1.
— maculata Spanoghe. II. 518. no. 4.
β. nitida.
— montana Rxb. VI. 75. †
— *Naum-papata* Rxb. II. 484. no. 1.
— Neuberia Eckl. et Zeyh. II. 519. no. 5.
— pallida Lindl. II. 519. no. 6.
— *Pandaki* Vahl. II. 518. no. 1.
— *parviflora* Poir. II. 484. no. 1.
— *Pavetta* Rxb. II. 517. no. 4.
Gardenia pictorum Hsskrl. VI. 73. no. 1.
— *propinqua* Lindl. II. 519. no. 8.
— Sherbourniae Hook. VI. 74. no. 2.
— Stanleyana Hook. VI. 74. no. 3. *VI. 702. no. 3.
— *stipularis* Rottl. et Willd. II. 518. no. 1.
— stipulosa Zolling. et Moritzi. VI. 702 no. 1.
— turgida Rxb. VI. 75. †
— Whitefieldii Lindl. VI. 74. no. 4.
Gardenicae DC. VI. 72.
Gardenieae A. Rich. II. 513. VI. 72.
Gardeniola Cham. II. 524.
— concolor Cham. II. 524. no. 1.
Gardiomyrtus Schauer. V. 737.
Gardneria Wall. *VI. 497.
Gardnerieae Endl. VI. 497.
Gardoquia Rz. et Pav. II. 735. °III. 983. VI. 672.
— argentea H. B. Kth. III. 737. no. 15.
— *betonicoides* Bth. VI. 678. no. 1.
— betonicoides Lindl. III. 735. no. 1.
— brevifolia Bth. III. 737. no. 11.
— capitata Spr. III. 740. no. 25.
— *Chilensis* Bth. III. 738. no. 17.
— discolor H. B. Kth. III. 738. no. 16.
— elegans H. B. Kth. III. 736. no. 7.
— elliptica Rz. et Pav. III. 735. no. 5.
— fasciculata Bth. VI. 672. no. 1.
— Gilliesii Grah. III. 738. no. 17.
— glabrata H. B. Kth. III. 738. no. 19.
— grandiflora H. B. Kth. III. 736. no. 10.
— Hookeri Bth. III. 737. no. 13.
— incana Rz. et Pav. III. 737. no. 12.
— Jamesoni Bth. III. 739. no. 23.
— Mexicana Bth. III. 735. no. 2.
— microphylla H. B Kth. III. 739. no. 22.
— multiflora Rz. et Pav. III. 735. no. 3.
— obovata Rz. et Pav. III. 738. no. 18.
— *obovata* Spr. III. 936.
— *origanoides* Rchb. IV. 53. no. 45.
— pulchella H. B. Kth. III. 736. no. 8.
— revoluta Rz. et Pav. III. 739. no. 24.
— rugosa Bth. III. 635. no. 4.
— sericea Prsl. III. 737. no. 14.
— spicata Spr. III. 740. no. 26.
— striata Rz. et Pav. III. 739. no. 21.
— taxifolia H. B. Kth. III. 739. no. 20.
— thymoides H. B. Kth. III. 736. no. 6.
— tomentosa H. B. Kth. III. 736. no. 9.
Gareilassa vid. Garcilassa.
Gardillea Tourn. *I. 49.
Garidella Tournef. II. 742.
— *anthemifolia* Salisb. II. 743. no. 7.
— *Nigellastrum* Linn. II. 743. no. 7.
— *unguicularis* Poir. II. 743. no. 8.
Garuga Rxbg. I. 559.

Garuga floribunda Dcne. I. 559. no. 2.
— Javanica Blume. I. 559. no. 1.
— *Madagascariensis* DC. I. 559. no. 3.
— pinnata Rxb. *I. 559. no. 3.
Garuleum Cass. *II. 585.
Gasteranthus Bth. °VI. 403.
— pilosus Bth. VI. 403. no. 2.
— Quitensis Bth. VI. 403. no. 1.
Gastonia Commers. *II. 430.
Gastrolepis C. H. Schultz (Bip.) VI. 195.
Gastrolobium Br. Br. I. 573. V. 431.
— acutum Bth. I. 574. no. 11. V. 432. †
— Brownii Meisn. V. 431. no. 6.
— calycinum Bth. I. 573. no. 7.
— cordatum Bth. I. 573. no. 5.
— Drummondii Meisn. V. 431. no. 4.
— epacridoides Meisn. V. 432. no. 8.
— Hookeri Meisn. V. 432. no. 7.
— ilicifolium Meisn. V. 431. no. 2.
— Lehmanni Meisn. V. 431. no. 5.
— obovatum Bth. I. 573. no. 9.
— oxylobioides Bth. I. 573. no. 6.
β. glabrius.
— parvifolium Bth. I. 573. no. 3.
— Preissii Meisn. V. 431. no. 3.
— retusum Lindl. I. 573. no. 1.
— spathulatum Bth. I. 574. no. 10.
— spinosum Bth. I. 573. no. 4.
— tricuspidatum Meisn. V. 431. no. 1.
β. latifolium.
γ. subinerme.
— trilobum Bth. I. 573. no. 8.
— villosum Bth. I. 573. no. 2.
Gastrolychnis DC. I. 280. no. 1—10.
Gastromeria D. Don. III. 452. °III. 960.
— *physaloides* G. Don. III. 230. no. 3.
— physaloides G. Don. III. 452. no. 1.
Gastropappus C. H. Schultz. (Bip.) VI. 200.
Gastrostylum C. H. Schultz. °VI. 195.
— annuum C. H. Schultz. VI. 196. no. 3.
— dichotomum C. H. Schultz. VI. 196. no. 4.
— praecox C. H. Schultz. *VI. 195. no. 1.
— tenellum C. H. Schultz. VI. 196. no. 2.
(c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
Gastrosulum vid. Gastrostylum.
Gatyona Cass. II. 695.
— Bergeri C. H. Schultz. II. 695. no. 1.
— leiocarpa C. H. Schultz. II. 695. no. 2.
Gaudichaudia H. B. Kth. °V. 344.
Gaudichaudia Adr. Juss. V. 346.
— acuminata Adr. Juss. V. 348. no. 14.
— albida Cham. et Schlchtd. V. 346. no. 2.
— Arnottiana Adr. Juss. V. 346. no. 7.
— brevipes Adr. Juss. V. 348. no. 15.
— congestiflora Adr. Juss. V. 344. no. 1.
— cynanchoides H. B. Kth. V. 347. no. 8.
Gaudichaudia discolor Griseb. V. 352. no. 4.
— filipendula Adr. Juss. V. 347. no. 9.
— *Guaranitica* St. Hil. V. 352. no. 5.
— *humilis* Bth. V. 319. no. 1.
— Karwinskiana Adr. Juss. V. 346. no. 5.
— *linearifolia* S. Hil. V. 352. no. 2.
— mollis Bth. V. 346. no. 4.
— mucronata Adr. Juss. V. 348. no. 12.
— oxyota Adr. Juss. V. 348. no. 13.
— pentandra Adr. Juss. V. 346. no. 6.
— podocarpa Adr. Juss. V. 348. no. 11.
— Schiedeana Adr. Juss. V. 346. no. 3.
— *sericea* St. Hil. V. 352. no. 3.
— *suffruticosa* Mohl. V. 351. no. 4.
— *triphylla* Mohl. V. 351. no. 5.
— Webbiana Adr. Juss. V. 347. no. 10.
Gaudichaudieae Adr. Juss. V. 344.
Gaultheria Kalm. II. 727. VI. 417.
— conferta Bth. VI. 417. no. 4.
— foliolosa Bth. VI. 417. no. 3.
— hirsuta Mart. et Galeotti. II. 727. no. 1.
— hirtiflora Bth. II. 727. no. 3.
— insipida Bth. VI. 418. no. 9.
— laevigata Mart. et Galeotti. II. 727. no. 3.
— Loxensis Bth. VI. 417. no. 2.
— microphylla Hook. fil. VI. 417. no. 1.
— nitida Bth. II. 727. no. 5.
— Pichinchensis Bth. VI. 418. no. 8.
— ramosissima Bth. VI. 418. no. 5.
— strigosa Bth. VI. 418. no. 6.
— tomentosa H. B. Kth. II. 727. †
— vestita Bth. VI. 418. no. 7.
Gaura Linn. II. 96. V. 670.
Gaura Spach. II. 96.
— angustifolia Michx. *II. 96. no. 5.
— biennis Linn. *II. 96. no. 4.
β. Pitcheri Torr. et Gr.
— coccinea Fras. *II. 97. no. 12.
δ. glabra Torr. et Gr.
β. integerrima Torr. et Gr.
— *decorticans* Hook. et Arn. II. 78. no. 6.
— Drummondii Torr. et Gr. II. 97. no. 10.
— epilobioides H. B. Kth. *II. 97. no. 11.
— filipes Spach. II. 96. no. 6.
β. major Torr. et Gr.
— *fruticosa* Jcq. II. 96. no. 5.
—? fruticulosa Bth. V. 670. no. 1.
— *glabra* Lehm. II. 97. no. 12. δ.
— *hexandra* Ortega. II. 96. no. 3.
— *linifolia* Nutt. II. 97. no. 1.
— *longiflora* Spach. II. 97. no. 6.
— *marginata* Lehm. II. 97. no. 12. β.
— *Michauxii* Spach. II. 96. no. 6.
— mollis H. B. Kth. *II. 96. no. 2.
— *mollis* Nutt. II. 97. no. 9.
— mutabilis Cav. *II. 96. no. 1.

Gaura parviflora Dougl. II 97. no. 9.
— *parvifolia* Torr. II. 97. no. 12. γ.
— *Pitcheri* Picker. II. 96. no. 4.
— sinuata Nutt. *II. 97. no. 7.
— tripetala Cav. *II. 96 no. 3.
— *undulata* Dsf. II. 96. no. 5.
— villosa Torr. II. 97. no. 8.
Gaureae Endl. II. 96. V. 670.
Gauridium Spach. II. 96.
— *Kunthii* Spach. II. 96. no. 2.
— *molle* Spach. II. 96. no. 2.
— *mutabile* Spach. II. 96. no. 1.
Gaya Gaud. II. 405.
Gaya H. B. Kth. I. 321.
— affinis A. Rich. I. 321. no. 2.
— aurea St. Hil. I. 322. no. 4.
— disticha Prsl. *I. 321. no. 1.
— Gaudichaudiana St. Hil. I. 321. no. 3.
Gaylussacia H. B. Kth. II. 723. VI. 410.
— angulata Gardn. VI. 410. no. 6.
— bracteata Gardn. VI. 410. no. 2.
— cordifolia Mart et Galeotti. II. 723. no. 1.
— fasciculata Gardn. VI. 411. no. 7.
— octosperma Gardn. VI. 410. no. 4.
— parvifolia Gardn. VI. 410. no. 5.
— pseudovaccinium Cham. et Schlchtd. VI. 411. †
— rigida Casaretto. VI. 410. no. 1.
— villosa Gardn. VI. 410. no. 3.
Gayophytum Adr. Juss. II. 76.
— caesium Torr. et Gr. II. 76. no. 4.
— diffusum Torr. et Gr. II. 76. no. 1.
— humile Adr. Juss. II. 76. no. 2.
— Nuttallii Torr. et Gr. II. 76. no. 6.
— racemosum Torr. et Gr. II. 76. no. 5.
— ramosissimum Torr. et Gr. II. 76. no. 3.
Gaytania Münter. °V. 900.
— Chesneyana Münter. *V. 900. no. 1.
Gazania Grtnr. II. 666. VI. 279.
— Kraussii C. H. Schultz. VI. 279. no. 2.
— leucolaena DC. *VI. 279. no. 1.
 α. Capensis C. H. Schultz. (Bip.)
 β. Natalensis C. H. Schultz. (Bip.)
— Pavonia R. Br. *II. 666. no. 1.
Geel Orant Tabern. III. 523. no. 6.
Geeria angustifolia Blume. I. 369. no. 9.
— *oborata* Blume. I. 369. no. 10.
— *serrata* Blume. I. 369. no. 8.
Geigeria Grieselich. *II. 601. *II. 953. no. 1.
Geigericae C. H. Schultz. II. 953.
Geijera Schott. I. 501.
— salicifolia Schott. *I. 501. no. 1.
Geissaspis Wght. et Arn. I. 726.
— cristata Wght. et Arn. *I. 726. no. 1.
Geissois Labill. II. 375. V. 834.
— racemosa Labill. *II. 375. no. 1. V. 834. no. 1.
Gelasia DC. VI. 351.
Gellgelle Maskal VI. 163. no. 1. β.
Gelsemieae Alph. DC. VI. 498.
Gelsemium Juss. *VI. 498.
Geminata (Solanum) G. Don. III. 58.
Genethyllis II. 153. II. 920. °V. 727.
— alpestris Lindl. II. 920. no. 1.
— citriodora Endl. II. 152. no. 4.
— diosmoides DC. II. 153. no. 2.
— pinifolia Schauer. II. 153. no. 6.
— purpurea Schauer. II. 153. no. 1.
— thymoides Schauer. II. 153. no. 5.
— vestita Endl. II. 153. no. 3.
Geniosporum Bth. III. 494.
Geniosporum Wall. III. 494. °III. 976.
— *axillare* Bth. III. 733. no. 23.
— elongatum Bth. III. 495 no. 4.
— gracile Bth. III. 495. no. 5.
— Madagascariense Bth. III. 494. no. 1.
— Palisoti Bth. III. 496. no. 8.
— parviflorum Benth. III. 495. no. 3.
— prostratum Benth. III. 495. no. 6.
— strobiliferum Wall. III. 495 no. 2.
— thymifolium Bth. III. 496. no. 7.
Geniostoma Forster. VI. 498.
— montanum Moritzi. VI. 498. no. 1.
Genipa Plumier. II. 519.
— barbata Prsl. II. 519. no. 1.
—? *striiflora* DC. II. 520. no. 2. VI. 75. no. 1.
Genista L. I. 628. II. 841. °V. 461.
— *acanthoclada* DC. V. 465. no. 9 et 10.
— acutifolia Lindl. *V. 502.
— Aegyptiaca Spr. *V. 502.
— *Aetnensis* DC. I. 627. no. 3. V. 505.
— Algarbiensis Brotero. *V. 502.
— *albida* Besser. V. 493. no. 74.
— albida M. Bieberst. V. 486. no. 58.
— alpina Host. *V. 502.
— Alpinii Spach. V 565. no. 9.
— *altera Lusitanica* Tournef. V. 469. no. 17.
— Americana Meyen. *V. 502. (Cf. Spartium Americanum Meyen.)
— Anatolica Boiss. II. 841. no. 5. *V. 502.
— ancistrocarpa Spach. V. 481. no. 46.
— andicola Gill. I. 629. no. 14. *V. 502.
— Anglica L. V. 480. no. 45.
— anxanthica Ten. I. 629. † V. 494. no. 78.
— *Anxanthica* var.? Torr. V. 503.
— apetala Labill. *V. 502.
— *aphylla* DC. II. 860. no. 1.
— arcuata Koch. V. 470. no. 21.
— *argentea* Noulet. I. 632. no. 17.
— aristata Prsl. V. 471. no. 24.
— *Armenia Linarii foliis auritis* Tournef. V. 497. no. 81.
— Armeniaca Spach. V. 487. no. 59.

Genista aspalathoides L. *I. 628. no. 2.
β. Lobelii DC.
— *aspalathoides* Moris. V. 484. no. 53. β.
— *aspalathoides β. Lobelii* Boiss. V. 484. no. 53.
— *aspalathoides β. confertior* Moris. V. 484. no. 53.
— aspalathoides Poir. V. 483. no. 52.
— Atlantica Spach. V. 474. no. 30.
— Aucheri Boiss. II. 841. no. 4. V. 462. no. 2.
— Baetica Spach. V. 484. no. 54.
— Bivonae Prsl. *V. 502.
— Boissieri Spach. V. 468. no. 16.
— bracteolata Lk. I. 629. † *V. 502.
— *bracteolata* Willd. II. 841. no. 2.
— Broteri Poir. *V. 502.
— Bruguieri Spach. V. 465. no. 10.
— *Canariensis* Bot. Reg. V. 502. no. 95.
— *Canariensis* DC. V. 502. no. 98.
— Canariensis Linn. *V. 502. no. 97.
— candicans Linn. *V. 502. no. 95.
— Cantabrica Spach. V. 501. no. 93.
— capitata Cav. *V. 502.
— Cappadocica Spach. V. 463. no. 3.
— carinalis Grieseb. II. 842. no. 7.
— cephalantha Spach. V. 469. no. 18.
— cinerea DC. V. 486. no. 56.
— clavata Poir. V. 499. no. 89. *V. 502.
δ.? casuarinoides }
γ.? Goudotiana } Spach. V. 499. no. 98.
β.? Webbiana }
— commixta Spach. V. 493. no. 77.
α. buxifolia.
β. parvifolia.
— congesta Lnk. *V. 502. no. 100.
— Corsica DC. I. 629. † V. 483. no. 50.
— Cumingii Hook. et Arn. I. 629. no. 13. *V. 503.
— Cupani Guss. I. 628. no. 7. V. 479. no. 43.
— cuspidata Cav. *V. 503.
— Dalmatica Bartl. et Wendl. V. 471. no. 22.
— *Dalmatica* Ten. V. 471. no. 23.
— decipiens Spach. V. 476. no. 35.
— *decumbens* Willd. V. 497. no. 86.
— depressa Griseb. *V. 503.
— depressa M. Bieberst. V. 492. no. 73.
— *depressa* Ten. I. 628. no. 8.
— depressa Tenore. *V. 503.
— desiderata DC. *V. 503.
— dracunculoides Spach. V. 496. no. 84.
— Duriaei Spach. V. 476. no. 37.
— echinus Spach. V. 466. no. 11.
— elata Wenderoth. I. 629. no. 17. V. 496. no. 83.
β. Sibirica.
— elegans Gill. I. 629. no. 11. *V. 503.
Genista elliptica Willd. *V. 503.
— ephedroides DC. 465. no. 8.
— *ephedroides* Gussone. V. 465. no. 7.
— *erinacea* Gilib. V. 468. no. 14.
— erioclada Spach. V. 473. no. 29.
— equisetiformis Spach. V. 498. no. 88.
— *exaltata* Lnk. V. 489. no. 64.
— falcata Brot. V. 480. no. 41.
— fasselata Dcne. I. 629. no. 10.
— ferox Poir. V. 482. no. 47.
— *filifolia* Lichtst. I. 571. no. 1.
— *florida* Asso. V. 486. no. 56.
— florida Linn. V. 489. no. 65.
— Gasparini Gussone. V. 461. no. 7.
— *Gasparini* Prsl. I. 627. no. 1.
— *Genuensis* Pers. V. 490. no. 68.
— *Germanica* Brot. V. 476. no. 35.
— Germanica Linn. V. 472. no. 25.
— Gibraltarica DC. V. 477. no. 39.
— glabra Mill. *V. 503.
— Godetii Spach. V. 487. no. 60.
— *gracilis* Poir. V. 502. no. 103.
— gracilis Spach. V. 469. no. 19.
— Hänsleri Boiss. I. 628. no. 4.
— *herbacea* Lam. V. 490. no. 67.
— heterophylla DC. *V. 503.
— *hirsuta* DC. (et var. β.) V. 473. no. 28.
— hirsuta Vahl. V. 472. no. 27.
— *hirsuta* Ten. V. 471. no. 23.
— *hirsuta* Tineo. V. 472. no. 24.
— *hirsuta var. orientalis* DC. V. 474. no. 31.
— *hirsuta* var. Steud. V. 472. no. 26.
— Hispanica Linn. V. 476. no. 36.
— *Hispanica* Wulff. V. 470. no. 20.
— *holopetala* Rchb. V. 462. no. 1. β.
— *horrida* Boiss. V. 468. no. 16.
— horrida DC. V. 468. no. 14.
— *horrida* B. Webb. V. 468. no. 15.
— humifusa Linn. *V. 503.
— *humifusa* Thore. V. 497. no. 86.
— humilis Ten. I. 628. no. 8. *V. 503.
— *incerta* Fries. II. 842. no. 7.
— infesta Prsl. *V. 503.
— interrupta Cav. *V. 503.
— involucrata Spach. V. 488. no. 62.
— Italica Loddig. *V. 503.
— *Januensis* Viviani. V. 490. no. 68.
— Jaubertii Spach. V. 463. no. 4.
— juniperina Meyen. I. 629. no. 15. *V. 503
— juniperina Spach. V. 478. no. 40.
β. inermis.
— lamprophylla Spach. V. 490. no. 69.
— lanuginosa Spach. V. 473. no. 28.
— lasiantha Spach. V. 500. no. 90.
— lasiocarpa Spach. V. 495. no. 80.
β.? Perreymonti Spach.

Genista lasiocarpa Spach.? V. 503.
— leptoclada Gay. V. 489. no. 66.
— leptophylla Spach. V. 491. no. 71.
— linifolia Linn. *V. 502. no. 101.
β. latifolia Spach.
— liparioides Boiss. II. 841. no. 3.
— Lobelii DC. V. 484. no. 53.
β. Salzmanni Spach.
— *Lobelii* d'Urville. V. 465. no. 9.
— lucida Cambess. V. 483. no. 51.
— Lusitanica Andrws. *V. 503.
— *Lusitanica* Boiss. V. 468. no. 16.
— Lusitanica Brotero. V. 468. no. 17.
— Lusitanica L. *I. 628. no. 1.
β. horrida DC.
— *Lusitanica supina* Vaill. V. 476. no. 34.
— Lydia Boiss. II. 841. no. 6. *V. 503.
— Maderensis Spach. *V. 502. no. 96.
— Mantica Pollini. *V. 503.
— Michelii Spach. V. 471. no. 23.
— *micrantha* Frivaldzk. II. 842. no. 7.
— micrantha Ortega. *V. 503.
— *minor* Lam. V. 481. no. 45.
— *microphylla* Moris. I. 629. no. 9. II. 841. no. 1. V. 482. no. 48.
— *microphylla* B. Webb. V. 502. no. 100.
— mollis Cav. *V. 503.
— *monosperma* Bové. II. 841. no. 11.
— *monosperma* DC. II. 840. no. 9.
— *monosperma* Delile. II. 839. no. 1. V. 508. no. 2.
β. *rigidula* DC. II. 839. no. 1. V. 508. no. 2.
— *monosperma* Guss. V. 508. no. 4.
— *monosperma* Lam. I. 629. no. 1. V. 507. no. 1.
— *monosperma* Lindl. V. 509. no. 7.
— Montbretii Spach. V. 487. no. 61.
— Morisii Colla. I. 628. no. 9. V. 482. no. 48.
— multibracteata Tausch. *V. 503.
— nervata Kitaib. *V. 503.
— *nitens* Lnk. V. 502. no. 101.
— nodosa Tausch. I. 628. no. 6. *V. 503.
— nuda Willd. *V. 503.
— Numidica Spach. V. 464. no. 6.
— obtusiramea Gay. V. 486. no. 57.
— Olivierii Spach. V. 474. no. 31.
— orientalis Spach. V. 474. no. 32.
— *orientalis minima humifusa foliis subrotundis, ad oras pilosis* Tournef. V. 494. no. 77.
— *ovata* Balbis. V. 495. no. 80.
— ovata Waldst. et Kit. V. 494. no. 79.
γ. lanceolata Spach. V. 495. no. 79.
α. macrophylla Spach. V. 495. no. 79.
β media Spach. V. 495. no. 79.
Genista parviflora Brot. V. 502.
— *parviflora* DC. II. 842. no. 1. II. 845. no. 3. V. 506. no. 1.
— parvifolia G. Don. II. 841. no. 1.
— patula M. Bieb. V. 496. no. 82.
— Peloponnesiaca Spach. V. 466. no. 12.
— *pendulina* Gilib. I. 628. no. 1.
— *pendulina* Poir. I. 627. no. 4.
— pilosa Linn. V. 497. no. 86.
— *pilosa* Pallas. V. 487. no. 58.
— *pilosa* Willd. V. 497. no. 86.
— polygalaefolia DC. V. 488. no. 64.
— *polygalaephylla* Brotero. V. 489. no. 64.
— polytricha Spach. V. 493. no. 76.
— Pontica Spach. V. 491. no. 70.
— *Pontica humilis verna Linariae folio utrinque glabro* Tournef. V. 491. no. 70.
— procumbens Willd. I. 629. †
— ptilophylla Spach. V. 493. no. 75.
— *pubescens* Lang. V. 496. no. 81. β.
— pulchella Vis. I. 628. no. 5. *V. 503.
— *racemosa* Hortor. II. 845. no. 2.
— radiata Scopoli. V. 462. no. 1.
γ. leiopetala Spach.
β. nana Spach.
— *radiata* Villars. V. 468. no. 14.
— *Raetam* Forsk. I. 629. no. 1. II. 839. no. 1. V. 508. no. 2.
— *ramosissima* Boiss. V. 486. no. 56.
— ramosissima Poir. V. 485. no. 55.
— ramosissima Spach. *V. 502. no. 98.
— *repens* Lam. V. 497. no. 86.
— *rhodophon* B. Webb. V. 502. no. 97.
— rigida Gill. I. 629. no. 12. *V. 503.
— *ringens* Prsl. V. 479. no. 43.
— rosmarinifolia Spach. *V. 502. no. 102.
— *sagittalis* Linn. II. 845. no. 1.
— sagittalis Linn. V. 489. no. 67.
— *Salzmanni* DC. V. 484. no. 53. β.
— *scariosa* DC. V. 490. no. 68.
— scariosa Viviani. V. 490. no. 68.
— scolopendria B. Webb. V. 500. no. 91.
— *scoparia* Vill. V. 486. no. 56.
— *scorpioides* Spach. V. 478. no. 41.
— scorpius DC. I. 629. † V. 482. no. 49.
— sericea Wulff. V. 488. no. 63.
— sessilifolia DC. *V. 503.
— *Sibirica* Hort. V. 503.
— *Sibirica* Linn. V. 496. no. 83. β.
— *Sibirica* Rchb. V. 496. no. 83.
— Spachiana B. Webb. V. 502. no. 105.
— spartioides Spach. V. 463. no. 5.
— spathulata Spach. V. 492. no. 72.
— sphacelata Denc. V. 467. no. 13.
— *sphaerocarpa* DC. V. 509. no. 8.

Genista sphaerocarpa Lam. I. 630. no. 2. V. 509. no. 8.
— *spiniflora* Lam. V. 483. no. 49.
— *splendens* B. Webb. V. 502. no. 101. β.
— stenopetala Spach. *V. 502. no. 99.
— stenoptera Spach. V. 501. no. 92.
— striata Hill. *V. 503.
— stylosa Spr. II. 841. no. 2. *V. 503.
— sylvestris Scopol. V. 470. no. 20.
— Tenorei Steudel. *V. 503.
— tenuifolia Loisel. V. 497. no. 85.
— tetragona Besser. V. 492. no. 74.
— *tinctoria* Hayne. V. 496. no. 83.
— tinctoria Linn. V. 495. no. 81.
β. latifolia.
α. vulgaris.
— *tinctoria* var. *latifolia* DC. V. 496. no. 81. β.
— *tinctoria Lusitanica maxima* Tournef. V. 489. no. 64.
— *tinctoria* var. *virgata* Koch. V. 496. no. 83.
— Tournefortii Spach. V. 475. no. 34.
— *triacanthos* Boiss. V. 478. no. 41.
— triacanthos Brotero. V. 478. no. 42.
β. galioides Spach. V. 479. no. 42.
α. Tournefortiana Spach. V. 479. no. 42.
— *triacanthos β. interrupta* DC. *V. 503.
— *triangularis* DC. V. 490. no. 68.
— *triangularis* Willd. V. 490. no. 68.
— tricuspidata Dsf. V. 477. no. 38.
— *tricuspidata* Slzm. V. 477. no. 39.
— *tricuspidata* var. *villosa* Desf. V. 473. no. 27.
— tridens Cav. *V. 503.
— tridentata Linn. V. 501. no. 94.
— *tridentata β.* Linn. V. 501. no. 92.
— *tridentata* B. Webb. V. 500. no. 90.
— triquetra Ait. *V. 502. no. 104.
— *triquetra* Waldst. et Kit. V. 490. no. 68.
— ulicina Spach. V. 475. no. 33.
— *umbellata* Loisel. V. 484. no. 53. β.
— *umbellata β. capitata* DC. V. 499. no. 89.
— umbellata Poir. V. 498. no. 87.
— *umbellata* B. Webb. V. 499. no. 88.
— Valentina Steudel. *V. 503.
— *versicolor* Wall. I. 681. no. 7. *V. 503.
— versiflora Tausch. I. 629. no. 16. *V. 503.
— virgata Ait. *V. 502. no. 103.
— *virgata* Lam. II. 860. no. 1.
— *virgata* Willd. V. 496. no. 83.
— Webbii Spach. V. 468. no. 15.
— Welwitschii Spach. V. 472. no. 26.
Genisteae DC. I. 576. II. 832. V. 433.
Genistella Tournef. V. 489.
— *fruticosa angustifolia Lusitanica* Tournef. V. 501. no. 92.
Genistella fruticosa latifolia Lusitanica Tournef. V. 501. no. 91.
— *racemosa* Mnch. V. 490. no. 67.
Genistoideae Torr. et Gr. I. 711.
Genistoides Mnch. V. 490.
— *elata* Mnch. V. 496. no. 83.
— *linifolia* Mnch. V. 502. no. 101.
— *tuberculata* Mnch. V. 497. no. 86.
Genisto-Spartium Garganicum pumilum Lini folio angustissimo Michel. V. 471. no. 23.
— *Hispanicum lanuginosum longissimis et tenuissimis aculeis tridentatis munitum* Tournef. V. 473. no. 28.
— *Lusitanicum longioribus aculeis, spicato flore* Tournef. V. 473. no. 27.
— *Lusitanicum siliqua falcata* Tournef. V. 480. no. 44.
— *minus Lusitanicum spicatum* Tournef. 476. no. 34.
— *spinosum alterum aphyllum etc.* C. Bauh. V. 465. no. 9.
Genlisea St. Hil. *VI. 439.
Gentiana Tournef. VI. 504.
— *Baconi* Edgwrth. VI. 506. no. 11.
— bellidifolia Hook. fil. VI. 505. no. 4.
— Bucovinensis Herbich. VI. 507. no. 17.
— caespitosa Martens et Galeotti. VI. 507. no. 16.
— cephalotes Edgwrth. VI. 506. no. 11.
— cerina Hook. fil. VI. 505. no. 3.
— concinna Hook. fil. VI. 505. no. 9.
β. elongata VI. 506. no. 9.
γ. robusta VI. 506. no. 9.
— diffusa H. B. Kth. *VI. 505. no. 7.
β. major Bth.
— fastigiata Bth. VI. 504. no. 1.
— gelida M. Bieb. I. 507. †
— Grisebachii Hook. fil. VI. 506. no. 10.
— laevigata Martens et Galeotti. VI. 507. no. 14.
— *minor aurea, flore simplici* Pluken. III. 480. no. 1.
— monnierioides Bth. VI. 505. no. 2.
— nubigena Edgwrth. VI. 506. no. 13.
— nummulariaefolia Griseb. *VI. 505. no. 8.
β. crassulifolia Bth.
— ovalis Martens et Galeotti. VI. 507. no. 15.
— Patagonica Griseb. VI. 507. †
— rupicola H. B. Kth. *VI. 505. no. 6.
β. vegetior Bth.
— septemfida Pall. VI. 507. †
— stipitata Edgwrth. VI. 506. no. 12.
— *swertioides* Griseb. β. Bth. VI. 505. no. 5.
GENTIANACEAE Lindl. VI. 499.
Gentianeae Griseb. VI. 499.

GENTIANEAE Juss. VI. 499.
Gentianella utriusque Indiae impatiens etc. Pluk. III. 289. no. 3.
Genuinae Bth. (Hyptis) III. 542.
Genuinae (Pavonia) II. 789. no. 5.
Genuinae Bth. (Stachys) III. 824.
Genuini N. ab E. (Aster) II. 560.
Geochorda Cham. et Schlchtd. III. 333. °III. 968. *VI. 643.
— cuneata Cham. et Schlchtd. III. 333. no. 1.
Geoffroya Jacq. I. 803.
— discolor Bth. I. 803. no. 1.
— Surinamensis Rchb. *I. 803. no. 2.
— *violacea* Pers. I. 792. no. 6.
Geophila Don. II. 469. II. 941.
— cordata Miquel. II. 941. no. 1.
— dichondraefolia A. Cunn. II. 469. no. 2.
— *diversifolia* DC. II. 469. no. 1.
— reniformis Don. *II. 469. no. 1.
Georgina scapigera Lnk. et Otto. II. 602. no. 1.
GERANIACEAE DC. I. 445. II. 818. V. 379.
Geranium L'Hérit. I. 447. II. 819. V. 379.
— acetosum L. I. 457. no. 108.
— aconitifolium L. I. 451. †
— acrocarpum Ledeb. II. 820. no. 10.
— affine Ledeb. I. 448. no. 5.
— affine Wgbt. et Arn. I. 448. no. 13.
— albicans St. Hil. I. 449. no. 22.
— *albiflorum* Hook. I. 450. no. 26.
— albiflorum Ledeb. I. 448. no. 7.
— *alchemilloides* L. I. 456. no. 113.
— *althaeoides* Cav. I. 456. no. 84.
— amethystinum Ledeb. II. 819. no. 7.
— *angustifolium* Thnbrg. I. 451. no. 5.
— *aphanoides* Thnbrg. I. 457. no. 111.
— *appendiculatum* Cav. I. 453. no. 35.
— arachnoideum St. Hil. I. 449. no. 21.
— argenteum L. I. 451. †
— *astragalifolium* Cav. I. 453. no. 31.
— Atlanticum Boiss. II. 819. no. 5.
— *auritum* Thnbrg. I. 451. no. 2.
— australe Nees ab Esenb. V. 380. no. 3.
— Berterianum Colla. I. 450. no. 25.
— *betonicum* Cav. I. 455. no. 72.
— Bohemicum L. I. 450. †
— brevicaule Hook. I. 450. no. 29.
— Brutium Gasparini. V. 379. no. 1.
— caespitosum James. I. 450. no. 27.
— caespitosum Wlprs. V. 379. no. 2. (III. Emend. p. 2.)
— Caffrum Eckl. et Zeyh. I. 449. no. 18.
— *capillare* Cav. I. 456. no. 97.
— *capitatum* L. I. 458. no. 133.
— *ciliatum* Thnbg. I. 451. no. 3.
— columbinum L. I. 450. †
β. holopetalum Griseb. II. 819. no. 1.
Geranium contortum Eckl. et Zeyh. I. 449. no. 20.
— *coriandrifolium* L. I. 456. no. 80.
— cristatum Stev. I. 450. †
— cuneatum Hook. I. 450. no. 28.
— *daucifolium* Thnbrg. I. 444. no. 52.
— delicatulum Ten. et Guss. I. 447. no. 2.
— dissectum L. I. 450. †
— *dissolutum* Linn. *var. Byzantinum* Griseb. II. 819. no. 2.
— divaricatum Ehrb. I. 450. †
— *echinatum var. flore rubro-purpureo* Andr. I. 458. no. 120.
— *elegans* Andr. I. 458. no. 122.
— *elongatum* Cav. I. 457. no. 110.
— Endressii Gay. I. 447. no. 1.
— *ensatum* Thnbrg. I. 452. no. 7.
— erianthum DC. II. 820. †
— eriostemon Fisch. I. 450. †
— *fissifolium* Andr. I. 452. no. 15.
— *flavum* Cav. I. 454. no. 45.
— *fruticosum* Cav. I. 456. no. 81.
— Freyeri Griseb. II. 819. no. 3.
— *fulgidum* L. I. 454. no. 50.
— *gibbosum* L. I. 454. no. 51.
— glandulosum Lehm. I. 499. no. 17.
— *grandiflorum* Andr. I. 458. no. 125.
— Grevilleanum Wall. I. 449. no. 13. (b.)
— *grossularioides* L. I. 456. no. 86.
— *heterophyllum* Thunb. I. 452. no. 22.
— *hirsutum* Cav. I. 452. no. 21.
— *hirtum* Burm. I. 455. no. 66.
— Hookerianum Wlprs. I. 450. no. 26.
β. incisum.
— *incisum* Nutt. I. 450. no. 26. *β.*
— *inquinans* L. I. 457. no. 103.
— intermedium Bertero. I. 450. no. 24.
— *laciniatum* Andr. I. 452. no. 13. et no. 17.
— laetum Ledeb. I. 448. no. 4.
— *laevigatum* L. fil. I. 458. no. 130.
— leiocaulon Ledeb. II. 819. no. 9.
— Libanoticum Schenk. I. 448. no. 3.
— Lindleyanum Royle. I. 449. no. 14.
— *lineare* Andr. I. 452. no. 12.
— lividum L. I. 451. †
— *lobatum* L. I. 453. no. 36.
— Londesii Fisch. I. 450. no. 30. et †
— longipes DC. *β.* adenotrichum Schrenk. I. 448. no. 9.
— lucidum Linn. I. 450. †
— macrorhizum L. I. 451. †
— macrostylum Boiss. II. 819. no. 4.
— maculatum Rchb. I. 450. †
— *maritimum* Thnbrg. I. 447. no. 20.
— Mascatense Boiss. II. 819. no. 6.
— microphyllum Hook. fil. V. 380. no. 4.

Geranium molle L. I. 451. †
— multifidum D. Don. I. 448. no. 12.
— *myrrhifolium* Thunb. I. 455. no. 73.
— Nepalense Sweet. I. 450. †
— *nobile* Dietr. I. 458. no. 124.
— nodosum L. I. 451. †
— ocellatum Jacquem. I. 449. no. 16.
— *odoratissimum* L. I. 458. no. 117.
— ornithopodon Eckl. et Zeyh. I. 449. no. 19.
— palustre L. I. 451. †
— *peltatum* L. I. 457. no. 100.
— phaeum L. I. 451. †
— *procumbens* Andr. I. 456. no. 88.
— *pinnatum* Andr. I. 453. no. 30.
— *pinnatum* Cav. I. 452. no. 26.
— platypetalum Fisch. et Mey. I. 448. no. 8.
— pratense L. I. 451. †
— *proliferum* Cav. I. 452. no. 18.
— psilostemon Ledeb. II. 819. no. 8.
— *pulverulentum* α. DC. I. 447. no. 19.
— *pulverulentum* Dsf. I. 447. no. 19.
— purpureum Vill. I. 450. †
— pusillum L. I. 450. †
— Pyrenaicum L. I. 451. †
β. umbrosum W. et Kit. ibid. †
— *radiatum* Andr. I. 452. no. 11.
— rapulum St. Hil. et Naud. II. 820. no. 11.
— reflexum L. I. 451. †
— Robertianum L. I. 450. †
— *rotundifolium* Ldb. II. 820. no. 10.
— rotundifolium L. I. 450. †
— rubifolium Lindl. I. 448. no. 11.
— sanguineum L. I. 451. †
— saxatile Karel. et Kiril. I. 448. no. 6.
— Schiedeanum Schlchtd. I. 449. no. 23.
— *setosum* Thunb. I. 452. no. 20.
— *sidaefolium* Thunb. I. 458. no. 118.
— striatum L. I. 451. †
— sylvaticum L. I. 451. †
— *tabulare* Cav. I. 458. no. 123.
— trilobum C. Koch. I. 448. no. 10.
— *triste* Cav. I. 454. no. 44.
— tuberaria Jacquem. I. 449. no. 15.
— tuberosum L. I. 451. † et adn.
— Uassovianum Fisch. I. 450. †
— *variegatum* L. I. 458. no. 127.
— villosum Ten. I. 451. †
— *villosum β. frutescens* Thunb. I. 455. no. 64.
— *villosum γ. hirtum* Thunb. I. 455. no. 66.
— Wallichianum D. Don. V. 380. †
— *zonale* L. I. 457. no. 106.
Gerardia Bth. (ex p.) III. 388.
Gerardia Linn. III. 381. °III. 970. *VI. 649.
— *Afzelia* Michx. III. 381. no. 1.
— angustifolia Mart. III. 383. no. 18.
Gerardia aphylla Nutt. III. 386. no. 35.
β. filicaulis.
γ. grandiflora.
— *aspera* Dougl. III. 385. no. 28.
— auriculata Michx. III. 382. no. 5.
— brachyphylla Cham. et Schlchtd. III. 383. no. 14.
— *caesarea* Cham. et Schlchtd. III. 380. no. 2.
— cassioides Pers. III. 381. no. 1.
— communis Cham. et Schlchtd. III. 384. no. 20.
— *crinita* Eddy. III. 385. no. 25.
— *cuneifolia* Prsb. III. 280. no. 10.
— dasyantha Schiede et Deppe. III. 384. no. 21.
— *delphiniifolia* Linn. III. 388. no. 3.
— densiflora Bth. III. 382. no. 11.
— digitalis Bth. III. 382. no. 12.
— Domingensis Spr. III. 385. no. 24.
— *Drégeana* Hochstett. VI. 650. no. 1.
— *erecta* Walt. III. 386. no. 33.
— fasciculata Elliot. III. 385. no. 23.
— filifolia Nutt. III. 386. no. 31.
— *filiformis* Schum. et Thonn. III. 389. no. 6.
— flava Prsb. III. 382. no. 6.
— *fruticosa* Prsb. III. 250. no. 54.
— genistaefolia Cham. et Schlchtd. III. 383. no. 17.
— *glutinosa* Bnge. III. 254. no. 1.
— *glutinosa* Linn. III. 265. no. 2.
— *gnidioides* Cham. et Schlchtd. III. 380. no. 3.
— grandiflora Bth. III. 382. no. 8.
— heterophylla Nutt. III. 384. no. 22.
β. grandiflora.
— *Heyneana* Bth. III. 389. no. 3. β.
— hispidula Mart. III. 384. no. 19.
— *laciniata* Martens et Galeotti. VI. 650. no. 1.
— lanceolata Bth. III. 383. no. 15.
— linarioides Cham. et Schlchtd. III. 383 no. 16.
— linifolia Nutt. III. 385. no. 29.
— longifolia Nutt. III. 385. no. 28.
— *macrodonta* Cham. et Schlchtd. III. 380 no. 4.
— macrophylla Bth. III. 381. no. 4.
— maritima Rafin. III. 385. no. 25.
β. grandiflora.
— *Nigrina* Linn. fil. III. 379. no. 3.
— *obtusifolia* Bth. III. 389. no. 5.
— *orobanchoides* Lam. III. 390. no. 2.
— *parviflora* Bth. III. 387. no. 2.
— pectinata Torrey. III. 382. no. 10.
— Pedicularia Linn. III. 382. no. 9.

Gerardia Pedicularia β. pectinata Nutt. III. 382. no. 10.
— peduncularis Bth. III. 386. no. 30.
— Plukenetii Elliot. III. 385. no. 26.
— prostrata H. B. Kth. III. 381. no. 2.
— *purpurea* Bertero. III. 385. no. 24.
— purpurea Linn. III. 385. no. 27.
β. grandiflora.
α. parviflora.
— *purpurea β. crassifolia* Prsh. III. 385. no. 25.
— quercifolia Prsh. III. 382. no. 7.
— rigida Gillies. III. 383. no. 13.
— *scabra* Linn. III. 389. no. 4.
— *scabra* Linn. fil. VI. 650. no. 1.
— *scabra* Wall. III. 388. no. 1.
—? serpyllifolia H. B. Kth. III. 381. no. 1.
— *sessiliflora* Vahl. III. 391. no. 3.
— setacea Walt. III. 386. no. 34.
β. parvifolia.
— *Sopubia* Bth. III. 388. no. 1.
—? stemodiaefolia Wlprs. III. 386. no. 36.
— *stricta* Bth. III. 388. no. 2.
— strictifolia Kth. III. 386. no. 32.
— tenuifolia Vahl. III. 386. no. 33.
α. humilis.
γ. leptophylla.
β. macrophylla.
— *tubulosa* Bth. III. 306. no. 2.
— virgata H. B. Kth. III. 381. no. 3.
Gerardieae Bth. III. 377. III. 969. VI. 649.
Gerardieae verae Bth. VI. 649.
Gerbera Burm. *II. 679. *VI. 313.
Gerbera DC. VI. 315.
Gerbera Gronov. *II. 680. VI. 315.
— Abyssinica C. H. Schultz. VI. 315. no. 4.
— ambigua C. H. Schultz. *VI. 315. no. 10.
— anandria C. H. Schultz. *VI. 316. no. 18.
— aurantiaca C. H. Schultz. VI. 316. no. 16.
— Bojeri C. H. Schultz. *VI. 316. no. 14.
— Candollei C. H. Schultz. *VI. 316. no. 13.
— coriacea C. H. Schultz. *VI. 315. no. 11.
— *ferruginea* DC. var. *β.* VI. 315. no. 1.
— *humilis* C. H. Schultz. VI. 315. no. 5. *α.*
— Kraussii C. H. Schultz. VI 316. no. 17.
— lanuginosa C. H. Schultz. *VI. 315. no. 6.
— Natalensis C. H. Schultz. VI. 315. no. 3.
— Nepalensis C. H. Schultz. *VI. 315. no. 9.
— nivea C. H. Schultz. *VI. 315. no. 8.
— piloselloides Cassini. *VI. 315. no. 5.
α. concolor C. H. Schultz.
β. discolor DC.
— pusilla C. H. Schultz. *VI. 315. no. 7.
— Schimperi C. H. Schultz. VI. 316. no. 15.
— sinuata Spr. var. β. undulata C. H. Schultz. VI. 315. no. 2.
Gerbera viridiflora C. H. Schultz. *VI. 315. no. 12.
Gerdaria Drègeana Prsl. VI. 650. no. 1.
Germanea Bth. III. 501.
— *crassifolia* Poir. III. 514. no. 4.
— *Forskâlii* Poir. III. 513. no. 2.
— *maculosa* Lam. III. 502. no. 7.
— *nudiflora* Poir. III. 512. no. 52.
— *parviflora* Poir. III. 505. no. 18.
— *punctata* Poir. III. 502. no. 7.
— *rotundifolia* Poir. III. 503. no. 9.
— *urticaefolia* Lam. III. 501. no. 1.
Gerontogea biflora Cham. et Schlchtd. II. 499. no. 66.
— *Deppeana* Cham. et Schlchtd. II. 501. no. 79.
Geropogon Linn. *II. 688. *VI. 346.
Geropogonoides Jussieui C. H. Schultz. VI. 329. no. 1.
Geruma Forsk. *I. 445.
Gesnera arborescens amplo flore fimbriato Plum. VI. 735. no. 2.
— *ventricosa* Swrtz. VI. 735. no. 8.
GESNERACEAE Endl. (ex p.) VI. 520.
Gesnereae Endl. II. 714. VI. 395.
Gesneria Mart. II. 717. II. 993. VI. 396.
— *bulbosa* Hook. II. 717. no. 1. *ϑ.* et *γ.*
— bulbosa Ker. II. 717. no. 1. *VI. 399. no. 15.
α. carnea Kltzsch. VI. 399. no. 15.
ζ. Cooperi; α. dentata; ε. faucialis; η. Houttei; δ. lateritia; β. macrorhiza — Kltzsch. II. 717. no. 1.
ι. magnifica Kltzsch. II. 718. no. 1.
ϑ. Merckii Kltzsch. II. 717. no. 1.
κ. splendens Kltzsch. II. 718. no. 1.
γ. Suttoni Kltzsch. II. 717. no. 1.
— *bulbosa* var. *lateritia* Hook. VI. 399. no. 15.
— Caracasana Otto. et Dietr. II. 718. no. 2. VI. 399. no. 16. VI. 737. (var. *β.*)
— cochlearis Hook. VI. 397. no. 5.
— Cooperi Bedf. VI. 400. †
— *Cooperi* Hort. Woburn. II. 717. no. 1. *ζ.*
— *Craniolaria* Swrtz. VI. 735. no. 2.
— *dentata* Hrnschch. II. 717. no. 1. *α.*
— discolor Lindl. II. 718. no. 9. †
— *discolor* Lindl. II. 993. no. 1.
— Douglasii *β.* Hook. VI. 400. †
— *elliptica var. β. flava* Hook. VI. 399. no. 16. *β.*
— elongata H. B. Kth. II. 718. † VI. 400. †
— eriantha Bth. VI. 397. no. 6.
— *exserta* Swrtz. VI. 736. no. 9.

Gesneria exogonia Fl. Mex. VI. 736. no. 15.
— *fascialis* Hook. II. 717. no. 1. ε.
— *faucialis* Lindl. II. 717. no. 1. ε.
— *floribus maculatis* Feuill. III. 151. no. 2.
— fragilis Poepp. et Endl. II. 718. no. 5.
— Gardneri Hook. VI. 397. no. 4. VI. 737.
— Gerardiana Paxton. VI. 737.
— Geroltiana Kth. et Bouché. VI. 399. no. 19.
— guazumaefolia Bth. VI. 396. no. 2.
— Guianensis Bth. VI. 737.
— *Houttei* Dumort. II. 717. no. 1. η.
— inaequalis Bth. VI. 396. no. 3.
— incurva Bth. VI. 396. no. 1.
— *lateritia* Lindl. II. 717. no. 1. δ.
— lateritia Lindl. VI. 400. †
— leptopus Gardn. VI. 398. no. 9.
— Libanensis Morren. VI. 737.
— longifolia Lindl. II. 718. no. 10. II. 719. †
— longipes Bth. VI. 397. no. 7.
— *macrorhiza* Dumort. II. 717. no. 1. β.
— *magnifica* Otto et Dietr. II. 718. no. 1.
— *Merckii* Wendl. jun. II. 717. no. 1. ϑ.
— mollis H. B. Kth. VI. 400. †
— petiolaris Bth. VI. 398. no. 13.
— polyantha DC. II. 719. † *II. 993. no. 1.
— *quadriflora* Lambert. VI. 735.
— reflexa Knwls. et Westsc. II. 718. no. 4.
— rhynchocarpa Bth. VI. 398. no. 12.
— rupestris Mart.? VI. 400. †
— salviaefolia Gardn. VI. 398. no. 8.
— Schiedeana Hook. VI. 398. no. 11.
— Schomburgkiana Kth. et Bouché. VI. 399. no. 18.
— Selloi Martius. VI. 400. †
— *spicata β. Schiedeana* DC. VI. 398. no. 11.
— stachydifolia Bth. VI. 399. no. 17.
— stricta Hook. et Arn. VI. 400. †
— *Suttoni* Booth. II. 717. no. 1. γ.
— tribracteata Otto et Dietr. II. 718. no. 3.
— triflora Mart. et Galeotti. II. 718. no. 7.
— trifoliata Martens. VI. 398. no. 10.
— tuberosa Mart. II. 719. †
— vestita Bth. VI. 398. no. 14.
— xanthophylla Poepp. et Endl. II. 718. no. 6.
— zebrina Paxt. II. 718. no. 8. VI. 400. †
GESNERIACEAE N. ab E. II. 714. II. 993. VI. 395.
Gesnericae DC. VI. 395.
Getonia Rxb. II. 62.
— floribunda Rxb. II. 62. no. 1.
— *nitida* Rth. II. 62. no. 1.
Geum Linn. II. 46. V. 657.
— *agrimonioides* Prsh. II. 35. no. 87.
— *album* Gmel. II. 47. no. 3.
— *Aleppicum* Jcq. II. 47. no. 4.
— *alpinum* Hornem. II. 47. no. 9.
Geum Besseri Fisch. II. 47. no. 4.
— *brachypetalum* Ser. II. 47. no. 9.
— *calthifolium* Menz. II. 48. no. 19. α.
— calthifolium Sm. II. 48. no. 19.
γ. congestum.
α. dilatatum.
β. rotundifolium.
— *Camtschaticum* Pall. II. 48. no. 19.
— *Canadense* Jcq. II. 47. no. 3.
— *Canadense* Murr. II. 47. no. 4.
— Chilense Balb. II. 47. no. 6.
β. grandiflorum.
— *coccineum* Lindl. II. 47. no. 6.
— coccineum Sbthrp. et Sm. *II. 47. no. 7.
— *dubium* Hornem. II. 47. no. 9. γ.
— elatum Wall. II. 48. no. 14.
β. humile.
— glaciale Adams. *II. 48. no. 15.
— *glaciale* Adams. II. 49. no. 1.
— grandiflorum C. Koch. V. 657. no. 1.
— heterocarpum Boiss. II. 46. no. 1.
— *heterophyllum* Desf.? II. 47. no. 3.
— *heterophyllum* Fisch. II. 47. no. 4.
— hispidum Fries. II. 48. †
— *hybridum* Jcq. II. 48 no. 11.
— incisum Dumort. II. 48. no. 13.
— *intermedium* Bess. II. 47. no. 4.
— intermedium Ehrh. II. 47. no. 9.
γ. dubium Fisch. et Mey.
α. Ehrhartianum Fisch. et Mey.
β. rubrifolium Fisch. et Mey.
— *intermedium* Willd. II. 47. no. 9. α.
— *laciniatum* Murr.? II. 47. no. 3.
— micropetalum Gasparini. II. 46. no. 2.
— montanum L. II. 48. †
— nutans Lam. II. 47. no. 10.
— *plumosum* Moç. et Sessé. V. 657. no. 2.
— Pyrenaicum DC. *II. 47. no. 8.
— *Quellyon* Sweet. II. 47. no. 6.
— radiatum Michx. *II. 48. no. 18.
— *radiatum* Prsh. II. 48. no. 19.
— *ranunculoides* Ser. II. 47. no. 11.
— rivale L. *II. 48. no. 11.
— *rivale β.* Ser. II. 47. no. 9. γ.
— *rivali-urbanum* Rchb. II. 47. no. 9.
— Rossi Ser. *II. 48. no. 17. (var. β. ibid.)
— *rotundifolium* Langsdrff. II. 48. no. 19. β.
— *rubifolium* Lej. II. 47. no. 9. β.
— *rugosum* Dsf. II. 47. no. 4.
— *Sadleri* Frivaldszk. II. 47. no. 7.
— strictum Ait. *II. 47. no. 4.
— *Sudeticum* Tausch. II. 47. no. 8.
— triflorum Prsh. *II. 48. no. 16.
— *triflorum* Torr. II. 48. no. 17.
— umbrosum Dumort. II. 48. no. 12.
— vernum Torr. et Gr. II. 47. no. 5.

Geum Virginianum L. *II. 47. no. 3.
Geunsia Blume. IV. 116.
— farinosa Blume. IV. 116. no. 1.
Ghinia mutica Willd. IV. 115. no. 3.
— *verbenacea* Swrtz. IV. 115. no. 2.
Gibbaria Cass. *II. 702. no. 15.
Gifola Cassini. VI. 245.
Gilia Rz. et Pav. VI. 526.
— achilleaefolia Bth. *VI. 526. no. 2.
— androsacea Steudel. *VI. 526. no. 5.
— coronopifolia Pers. *VI. 526. no. 4.
— densiflora Bth. *VI. 526. no. 6.
— tomentosa Martens et Galeotti. VI. 526. no. 1.
— tricolor Bth. *VI. 526. no. 3.
Gilibertia Rz. et Pav. *II. 430.
Gillenia Mnch. *II. 51.
Gimbernatia Rz. et Pav. II. 62. no. 8.
Ginalloa Krthls. II. 439.
— Arnottiana Krthls. II. 439. no. 1.
Ginginsia albens DC. II. 244. no. 4.
— *aurantiaca* DC. II. 244. no. 4. γ.
— *brevicaulis* DC. II. 245. no. 7. β.
— *conferta* DC. II. 244. no. 3. β.
— *elongata* DC. II. 244. no. 3. γ.
— *microphylla* DC. II. 243. no. 2.
— *teretifolia* DC. II. 246. no. 14.
Ginoria Jcq. *II. 112.
Ginseng Jartoux. V. 924. no. 1.
— *officinarum* Trew. V. 925. no. 2.
Githago Dsf. *I. 282.
Glabella Griseb. (Asperula) VI. 23.
Glaberrimi DC. (Senecio) VI. 264.
Glabriflorae Bth. (Inga) V. 628.
Glabripetalae Adr. Juss. (Tetrapterys) V. 314.
Glandularia Carolinensis Gmel. IV. 31. no. 79.
Glanduliferae Bth. (Mimosa) I. 876.
Glandulifolia uniflora ovata Wendl. I. 507. no. 5.
Glandulosae Bth. V. 585.
Glans terrestris costensis Rumph. III. 520. no. 29.
Glaphyria Jack. *II. 194.
Glastaria Boiss. I. 146.
— deflexa Boiss. *I. 146. no. 1.
Glastum DC. I. 180. II. 762. no. 1.
Glaucae Bth. (Crotalaria) V. 438.
Glaucium Tournef. I. 115. II. 750.
— Arabicum Fresen. I. 115. no. 1.
— calycinum Boiss. I. 115. no. 4.
— Cappadocicum Boiss. I. 115. no. 5.
— contortuplicatum Boiss. I. 115. no. 6.
— corniculatum Rchb. I. 116. †
  α. phoeniceum DC. I. 116. †
— elegans Fisch. et Mey. I. 115. no. 2.
Glaucium fulvum Sm. I. 116. †
— luteum Scop. I. 116. †
— phoeniceum Rchb. I. 116. †
— *phoeniceum* Sm. I. 116. †
— pumilum Boiss. I. 115. no. 3.
— rubrum Sm. I. 116. † (c. var. tricolor Bernh.)
— squamigerum Karel. et Kiril. II. 750. no. 1.
— violaceum Sbthrp. et Sm. I. 116. †
Glaux Linn. *VI. 445.
Glechoma Linn. III. 787.
— *erecta* Rxb. III. 781. no. 32.
— *grandiflora* DC. III. 830. no. 61.
— *hederacea* Linn. III. 787. no. 62.
— *heterophylla* Opiz. III. 787. no. 62. γ.
— *Hindostana* Roth. III. 781. no. 32.
— *hirsuta* W. et K. III. 787. no. 62. β.
— *Indicum* Spr. III. 781. no. 32.
— *intermedia* Schrader. III. 787. no. 62. γ.
— *magna* Mérat. III. 787. no. 62.
— *Marrubiastrum* Vill. III. 831. no. 65.
— *micrantha* Bönningh. III. 787. no. 62.
— *nivalis* Jcquem. III. 787. no. 63.
— *Thibetica* Jcquem. III. 787. no. 64.
Glechon Spr. III. 740. °III. 983.
— *candidum* Bth. III. 741. no. 5.
— canescens St. Hil. III. 741. no. 5.
— ciliata Bth. III. 742. no. 8.
— marifolia Bth. III. 741. no. 4.
— myrtoides St. Hil. III. 742. no. 10.
— origanifolia Bth. III. 741. no. 6.
— ringens Bth. III. 742. no. 9.
— serpyllifolia St. Hil. III. 740. no. 3.
— spathulata Bth. III. 740. no. 1.
— squarrosa Bth. III. 741. no. 7.
— thymoides Spr. III. 740. no. 2.
Gleditschia L. I. 856.
— heterophylla Bnge. I. 856. no. 1.
Glinus Loefl. II. 239. V. 788.
— Cambessedesii Fnzl. II. 240. no. 2.
  β. nudiuscula.
  α. villosa.
— denticulatus Fnzl. II. 240. no. 4.
— *dictamnoides* Lam. II. 239. no. 1.
— *dictamnoides* Linn. II. 239. no. 1. β.
— *lotoides* Burm. II. 239. no. 1. β.
— lotoides Loefl. II. 239. no. 1.
  α. candida.
  γ. setiflora.
  β. virens.
— Mollugo Fnzl. II. 240. no. 3.
  β. angustifolia.
  α. latifolia.
— parviflorus Wall. *II. 240. no. 5.
— Pauli Wilhelmi Hochstett. V. 788. no. 1
— *setiflorus* Forsk. II. 239. no. 1. γ.

Glinus trianthemoides Heyne. II. 239. no. 1. V. 788. no. 1.
Gliricidia Kth. I. 679.
— maculata Kth. *I. 679. no. 2.
— sepium Kth. *I. 679. no. 1.
Globifera umbrosa Pers. III. 291. no. 1.
Globiflorae Bth. (Acacia) V. 592.
Globularia Linn. IV. 174.
— *alpina minima Origani folio* Tournef. IV. 175. no. 6.
— Alypum Linn. IV. 176. no. 9.
— *bellidifolia* Tenore. IV. 176. no. 7. β.
— Bisnagarica Linn. IV. 177. no. 11.
— *caespitosa* Ortega. IV. 175. no. 2. β.
— cordifolia Linn. IV. 176. no. 7.
α. cordifolia Cambess.
β. nana Cambess.
— *cordifolia β.* Bertol. IV. 176. no. 7. β.
— *glauca* Balbis. IV. 175. no. 6.
— incanescens Viviani. IV. 175. no. 6.
— *linifolia* Lam. IV. 175. no. 2. β.
— *longifolia* Ait. IV. 177. no. 10.
— macrantha C. Koch. IV. 175. no. 3.
— *minima* Vill. IV. 176. no. 7. α.
— *nana* Lam. IV. 176. no. 7. β.
— nudicaulis Linn. IV. 174. no. 1.
— orientalis Linn. IV. 176. no. 8.
— *orientalis floribus per caulem sparsis* Tournef. IV. 176. no. 8.
— *punctata* Lapeyr. IV. 176. no. 7. β.
— salicina Lam. IV. 176. no. 10.
— spinosa Linn. IV. 174. no. 2. (c. varr. α. et β.) IV. 175.
— trichocalyx Steudel. *IV. 177. no. 12.
— trichosantha Fisch. et Mey. IV. 175. no. 4.
— vulgaris Linn. IV. 175. no. 5.
GLOBULARIEAE Lam. IV. 174.
Globulea Haw. *II. 255.
Glomeratae Pfeiff. (Opuntia) II. 346.
Glomeruliflorae Torr. et Gr. (Solidago) II. 960.
Glossanthus Klein. II. 716.
Glossarrhen Mart. I. 223.
— *floribundus* Mart. I. 223. no. 1.
Glossocardia Cass. *II. 623.
Glossocarya Wall. °IV. 133.
— mollis Wall. IV. 134. no. 1.
Glossogyne Cass. *II. 623.
Glossoma acuminatum Wall. II. 379. no. 1.
Glossonema Dene. VI. 486.
— Boveanum Dene. *VI. 486. no. 1.
Glossopappus Knze. °VI. 722.
— chrysanthemoides Knze. VI. 723. no. 1.
Glossoschima Krthls. I. 375. *V. 136. (cf. *Closaschima*).
— marginata Krthls. I. 375. no. 2.
— ovalis Krthls. I. 375. no. 1.
Glossospermum velutinum Wall. V. 115. no. 1.
Glossostemon Dsf. *I. 350.
Glossostephanus E. Mey. *VI. 483.
Glossostigma Arn. III. 334. °III. 968. *VI. 644.
— spathulatum Arn. III. 334. no. 1.
Glossostylis Cham. et Schlchtd. III. 390. °III. 970.
— aspera Cham. et Schlchtd. III. 390. no. 2.
— Avensis Bth. III. 390. no. 1.
— Capensis Bth. III. 391. no. 3.
Glottidium Desvx. *I. 680.
Gloxinia L'Hérit. II. 720. VI. 401.
— digitaliflora Paxt. VI. 402. †
— discolor Knze. II. 721. no. 10.
— fruticosa Dehnh. II. 720. no. 3.
— glabrata Zuccarini. VI. 401. no. 3.
— guttata Martius. VI. 402. †
— ichthyostemon Gardn. II. 720. no. 2.
— maculata L'Hérit. II. 721. †
— maxima Paxt. *VI. 401.
— Menziesiana Young. II. 720. no. 9.
— micrantha Martens et Galeotti. II. 720. no. 7.
— multiflora Mart. et Galeotti. II. 720. no. 8.
— pallidiflora Hook. VI. 401. no. 2.
— punctata Mart. et Galeotti. II. 720. no. 5.
— rubra Paxt. *VI. 401.
— Sarmentiana Gardn. II. 720. no. 1.
— speciosa Lodd. II. 721. †
— tigridia Ohlendrf. VI. 401. no. 1.
— tubiflora Hook. II. 720. no. 4.
— velutina Martius. VI. 402. †
— verticillata Mart. et Galeotti. II. 720. no. 6.
— Youngeana Paxt. *VI. 401.
Gluta L. *I. 555.
Glycideras Cass. *II. 702. no. 13.
Glycine Wght. et Arn. I. 759. II. 900. V. 531.
— anonychia Wlprs. I. 760. no. 11.
— biflora Schum. et Thonn. I. 760. no. 6.
— biloba Lindl. I. 760. no. 14.
— botrydium Wlprs. I. 760. no. 15.
— cajanoides Wlprs. V. 531. no. 3.
— *clandestina* Wendl. I. 758. no. 2.
— *debilis* Ait. I. 759. no. 1.
—? dentata Vahl. I. 760. no. 10.
— discolor Mart. et Galeotti. V. 531. no. 2.
— dolichoides Desvx. I. 759. no. 3.
— *elongata* Bth. I. 790. no. 3.
— emarginata Desvx. I. 760. no. 16.
— filiformis Desvx. I. 760. no. 18.
— *filiformis* Wall. I. 759. no. 1.
— *flaccida* Wall. I. 633. no. 11.
— gampsonychia Wlprs. I. 760. no. 12.
— *humifusa* Willd. I. 606. no. 1.

Glycine involucrata Wall. I. 761. no. 3.
— *Javanica* Linn. I. 759. no. 1.
— labialis L. *I. 759. no. 1.
— *leptocarpa* Grah. I. 606. no. 1.
— *leucosperma* Desv. I. 762. no. 10.
— *lineata* Heyne. I. 783. no. 4.
— macrophylla Schum. et Thonn. I. 760. no. 9.
— *minima* Willd. I. 758. no. 1.
— mollis Hook. II. 900. no. 1.
— mollis Wght. et Arn. I. 759. no. 2.
— *mollissima* Ell. I. 789. no. 36. ε.
— *monophylla* Nutt. I. 789. no. 36. α.
— moringaeflora Delile. I. 759. no. 4.
— oblonga Bth. V. 531. no. 1.
— *pallens* Grah. I. 759. no. 1.
— *parviflora* Lam. I. 759. no. 1.
var. *mollis* Grah. I. 759. no. 2.
— *peduncularis* Mühlbrg. I. 774. no. 52.
— *pentandra* Rxb. I. 759. no. 1.
— *Pondicheriensis* Spr. I. 789. no. 38.
— pungiunculus Desvx. I. 760. no. 17.
— rhombea Schum. et Thonn. I. 760. no. 7.
— *rhombifolia* Hb. Madr. I. 786. no. 3.
— *rhombifolia* Willd.? I. 760. no. 7.
— rufa Schum. et Thonn. I. 760. no. 5.
— *rufa* Schum. et Thonn. I. 788. no. 27.
— *secunda* Thnbrg. I. 786. no. 12.
— *simplicifolia* Ell. I. 789. no. 36. α.
— stricta Hook. I. 760. no. 13.
— sublobata Schum. et Thonn. I. 760. no. 8.
— *tenuiflora* Wall. I. 761. no. 2.
— *tenuiflora* Wght. et Arn. I. 761. no. 1.
— *tomentosa* L. I. 789. no. 36.
— *triloba* L. I. 774. no. 51.
— *umbellata* Mühlbrg. I. 774. no. 52.
— *urens* L. I. 768. no. 9.
— *vestita* Grah. I. 761. no. 1.
— *viscida* Willd. I. 783. no. 1.
Glycineae Bth. I. 759. II. 900. V. 531.
Glycipicros seu Dulcamara Bauh. III. 44. no. 43.
Glycirrhiza Tournef. I. 672. II. 857.
— astragalina Gill. I. 672. no. 3.
— brachycarpa Boiss. II. 857. no. 1.
— *foetida* Jcq. I. 672. no. 5.
— foetidissima Tausch. I. 672. no. 5.
— glutinosa Nutt. I. 672. no. 2.
— grandiflora Tausch. I 672. no. 4.
— *mediterranea* Vellozo. I. 756. no. 3.
—? triphylla Fisch. et Mey. I. 672. no. 1.
— *triphylla* Fisch. et Mey. II. 857. no. 1. V. 514. no. 1.
Glycosma Nutt. II. 423. V. 908.
— occidentalis Nutt. *II. 423. no. 1. V. 908. no. 1.
Glycosmis Correa. I. 380.
— angustifolia Lindl. I. 380. no. 3. (III. Emend. p. 2.)
— chylocarpa Wght. et Arn. I. 380. no. 5. (III. Emend. p. 2.)
— macrocarpa Wght. I. 380. no. 4.
— nitida Wght. et Arn. I. 380. no. 1. (III. Emend. p. 2.)
— triphylla Wght. I. 380. no. 2. (III. Emend. p. 2.)
Glyphia Cass. II. 702. no. 13.
Glyphospermum G. Don. *VI. 510.
Gmelina Linn. IV. 97.
— arborea Rxb. IV. 98. no. 6.
— Asiatica Linn. IV. 97. no. 2.
— *Coromandeliana* Burm. IV. 98. no 3.
— *inermis* M. Blanco. IV. 97. no. 2.
— oblongifolia Rxb. IV. 98. no. 4.
— *parviflora* Rxb IV. 98. no. 3.
— parvifolia Rxb. IV. 97. no. 3. (IV. 93. no. 6.)
— Philippensis Cham. IV. 97. no. 1.
— speciosissima D. Don. IV. 98. no. 7.
— *Tacabushia* Hamilt. IV. 98. no. 7.
— villosa Rxb. IV. 98. no. 5.
Gnaphalieae Lssng. II. 643. II. 992. VI. 228.
Gnaphalium DC. II. 646. VI. 244.
Gnaphalium Don. II. 646. VI. 244.
—? ......?? Hook. fil. VI. 245. no. 10.
— *Aegyptiacum* Pers. II. 648. no. 2.
— affine d'Urville. *VI. 245. no. 8.
— alienum Hook. et Arn. II. 647. no. 8.
— *Ammophila* Wall. II. 648. no. 2.
— antarcticum Hook. fil. VI. 245. no. 9.
— *apiculatum* Labill. VI. 237. no. 6.
— *callichrysum* Fisch. et Mey. VI. 241. no. 13.
— *cauliflorum* Desf. II. 648. no. 2.
— *Chilense* Hook. et Arn. VI. 245. no. 7.
— *Chilense* Spr. II. 647. no. 2.
— *chrysocoma* Poir. II. 648. no. 2.
— *coarctatum* Willd. VI. 245. no. 6.
— collinum Labill. *VI. 726. no. 1.
α. Billardieri Hook. fil.
β. Gunnii Hook. fil.
γ. Lawrencii Hook. fil.
— confertum Bth. II. 646. no. 1.
— *consanguineum* Gaudich. VI. 245. no. 6.
— *consanguineum* Hombron et Jacquinot. VI. 245. no. 8.
— cymatoides Knze. *VI. 244. no. 3.
β. glabrum.
— depressum Nutt. II. 647. no. 7.
— *decurrens* β. Hook. II. 647. no. 2.
— *dimorphum* Nutt. II. 649. no. 6.

Gnaphalium falcatum Lam. *VI. 245. no. 7.
—? *filaginoides* Hook. et Arn. II. 648. no. 2.
— *frigidum* Poepp. II. 681. no. 2.
— *Gallicum* Willd. VI. 248. no. 1.
— gossypinum Nutt. II. 647. no. 4.
— indutum Hook. fil. VI. 726. no. 2.
— lacteum Meyen et Wlprs. VI. 244. no. 4.
— *littorale* Bnks. et Soland. VI. 245. no. 7.
— luteo-album Linn. *VI. 245. no. 5.
β. glandulosum.
— *luteo-album β. occidentale* Nutt. II. 647. no. 2.
— microcephalum Nutt. II. 647. no. 5.
— *monanthon* Willd. VI. 241. no. 13.
— *monocephalum* Charpent. II. 649. no. 4. β.
— *Pallasii* Spr. VI. 241. no. 13.
— palustre Nutt. et var. β. II. 647. no. 3.
— *polycephalum* Willd. VI. 245. no. 5.
— *prostratum* Rxb. VI. 247. no. 6.
— psilophyllum Meyen et Wlprs. VI. 244. no. 2.
— radians Bth. VI. 244. no. 1.
— *resedaefolium* Hort. Berol. VI. 244. no. 3. β.
— *Rüppellii* Fresen. II. 648. no. 2.
— *semipapposum* Labill. VI. 237. no. 5.
— *sphacelatum* H. B. Kth. VI. 245. no. 6.
— spicatum Lam. *VI. 245. no. 6.
β. Chonoticum Hook. fil.
— *spicatum* Vahl. II. 648. no. 2.
— Sprengelii Hook. et Arn. II. 647. no. 2.
β. minus.
— *uniflorum* Pall. VI. 241, no. 13.
— ustulatum Nutt. II. 647. no. 6.
— *Webbii* C. H. Schultz. VI. 240. no. 4.
Gnaphaloides Barnéoud. IV. 189.
Gnaphalopsis DC. *II. 701.
Gnephosis Cass. *II. 644.
Gnidiaefoliae Bth. (Hyptis) III. 539.
Gochnatia H. B. Kth. *II. 679. *VI. 317.
Godetia Spach. II. 87. II. 915.
— albescens Lindl. II. 87. no. 6. *II. 915. no. 2.
— Bottae Spach. II. 88. no. 17.
— Arnottii Wlprs. II. 88. no. 8.
— Cavanillesii Spach. *II. 88. no. 11.
— decumbens Spach. II. 88. no. 14.
— Gayana Spach. II. 88. no. 16.
— grandiflora Lindl. II. 87. no. 5. *II. 915. no. 1.
— Lehmanniana Spach. *II. 87. no. 4.
— lepida Lindl. II. 88. no. 13.
— Lindleyana Spach. II. 87. no. 1.
— quadrivulnera Spach. II. 88. no. 10.
— Romanzowii Spach. *II. 88. no. 9.
— rubicunda Lindl. II. 87. no. 2.
Godetia tenuifolia Spach. *II. 88. no. 15.
— viminea Spach. II. 87. no. 7.
β. parviflora.
— vinosa Lindl. II. 87. no. 3.
— Willdenowiana Spach. II. 88. no. 12.
Godoya Rz. et Pav. I. 375.
— gemmiflora Mart. et Zucc. I. 375. no. 1.
Goethea Schkbr. (Pavonia) I. 301.
Goldbachia DC. *I. 183.
Gomara Rz. et Pav. III. 436. °III. 972. *VI. 654.
— racemosa Rz. et Pav. III. 436. no. 1.
Gomaria racemosa Spr. III. 436. no. 1.
Gomesia Llaw. *II. 702. no. 3.
Gomphandra Wall. I. 378. *II. 802. *II. 803.
— coriacea Wght. I. 378. no. 1
— polymorpha Wght. I. 378. no. 2.
α. acuminata.
γ. angustifolia.
δ. longifolia.
β. oblongifolia.
ε. ovalifolia.
Gomphia Schreb. I. 526. V. 399.
— aemula Pohl. I. 527. no. 20.
— angustifolia Vahl. *I. 526. no. 2.
— confertiflora Pohl. I. 527. no. 17.
— crassifolia Pohl. I. 527. no. 23.
— curvata St. Hil. I. 527. no. 14.
— cuspidata St. Hil. I. 526. no. 13.
— Fieldingiana Gardn. V. 400. no. 3.
— floribunda St. Hil. I. 526. no. 7.
— glaucescens St. Hil. I. 527. no. 15.
— glomerata Pohl. I. 527. no. 22.
— hexasperma St. Hil. I. 526. no. 3.
— humilis St. Hil. I. 526. no. 11.
— lanceolata Pohl. I. 527. no. 16.
— *Malabarica* DC. I. 526. no. 2.
— multiflora Pohl. I. 527. no. 21.
— nana St. Hil. I. 526. no. 10.
— nervosa St. Hil. I. 526. no. 5.
— oleaefolia St. Hil. *I. 526. no. 8.
β. monstrosa.
— olivaeformis St. Hil. I. 526. no. 12.
— ovalis Pohl. I. 527. no. 18.
— parvifolia St. Hil. I. 526. no. 9.
— persistens St. Hil. I. 526. no. 4.
— pubescens St. Hil. et Tulasne. I. 527. no. 24.
— rotundifolia Gardn. V. 400. no. 2.
— salicifolia St. Hil. et Tulasne. I. 527. no. 25.
— serratula Pohl. I. 527. no. 19.
— *serrulata* Pohl. I. 527. no. 13.
— suaveolens St. Hil. I. 526. no. 6.
— Sumatrana W. Jack. I. 526. no. 1. V. 399. no. 1.

Gomphia vaccinioides St. Hil. et Tulasne. I. 527. no. 26.
— *Zeylanica* DC. I. 526. no. 2.
Gomphocarpus R. Br. VI. 486.
— asperifolius Meisn. VI. 486. no. 2.
— hastatus E. Mey. *VI. 486. no. 1.
β. angustifolius Meisn.
Gompholobium Sm. I. 568. V. 425.
— aciculare Rchb. I. 568. no. 1.
— amplexicaule Meisn. V. 425. no. 2.
— aristatum Bth. I. 569. no. 11.
— aspalathoides Cunn. I. 568. no. 3.
— barbigerum DC. V. 426. †
— burtonioides Meisn. V. 425. no. 3.
β. subacerosum.
α. subspathulatum.
— capitatum Cunn. I. 568. no. 7.
— *ericaefolium* Cunn. I. 569. no. 1.
— glaucescens Cunn. *I. 568. no. 2.
— *grandiflorum β. setifolium* DC. I. 568. no. 2.
— *heterophyllum* A. Cunn. V. 426. no. 7.
— *heterophyllum* Don. I. 568. no. 6.
— Hügelii Bth. I. 569. no. 12.
— Knightianum Lindl. I. 568. no. 6. *V. 426. no. 7.
— marginatum R. Br. I. 569. †
— ovatum Meisn. V. 425. no. 1.
— polymorphum R. Br. V. 426. †
— Preissii Meisn. V. 426. no. 6.
— *setifolium* Sieb. I. 568. no. 2.
— Shuttleworthii Meisn. V. 425. no. 4.
— subulatum Bth. I. 568. no. 5.
— tenue Lindl. I. 568. no. 9.
— tomentosum Labill. I. 569. †
— uncinatum Cunn. I. 568. no. 4.
— venulosum Lindl. I. 568. no. 8.
— versicolor Lindl. I. 569. no. 10.
— viscidulum Meisn. V. 425. no. 5.
Gomphopetalum Turczan. II. 406.
— albiflorum Turczan. II. 406. no. 2.
— viridiflorum Turczan. II. 406. no. 1.
Gomphostemma Wall. III. 896. °III. 991. VI. 684.
— crinitum Wall. III. 897. no. 8.
— dichotomum Zolling. et Moritzi. VI. 684. no. 1.
— eriocarpum Bth. III. 897. no. 9.
— Javanicum Bth. III. 898. no. 14.
— Heyneanum Wall. III. 896. no. 3.
— lucidum Wall. III. 897. no. 5.
— melissaefolium Wall. III. 897. no. 11.
— multiflorum Bth. III. 897. no. 7.
— oblongum Wall. III. 896. no. 4.
— ovatum Wall. III. 897. no. 10.
— parviflorum Wall. III. 897. no. 6.
Gomphostemma phlomoides Bth. III. 898. no. 13.
— strobilinum Wall. III. 896. no. 1.
— velutinum Bth. III. 898. no. 12.
— viride Wall. III. 896. no. 2.
Gomphostigma Turczan. III. 264. °III. 452. °III. 962 °III. 968. *VI. 648.
— scoparioides Turczan. *III. 264. no. 1. *III. 452. no. 1.
Gongronema Endl. *VI. 492.
Gongylocarpus Cham. et Schlchtd. II. 97. V. 670.
— rubricaulis Cham. et Schlchtd. *II. 97. no. 1. V. 670. no. 1.
Goniocarpus Koen. II. 99. V. 672.
— *citriodorus* All. Cunn. II. 99. no. 11.
— *depressus* A. Cunn. II. 99. no. 10.
— *nodulosus* Nees ab Esenb. V. 672. no. 1.
— *serpyllifolius* Hook. II. 99. no. 13.
— *trifidus* Nees ab Esenb. V. 672. no. 2.
— *vernicosus* Hook. II. 99. no. 12.
Goniochiton Blume. I. 431.
— arborescens Blume. *I. 431. no. 1.
Gonioma E. Mey. *VI. 470.
Goniostemma Wght. *VI. 481.
Gonocytisus Spach. °V. 505.
— angulatus Spach. V. 506. no. 1.
— pterocladus Spach. V. 506. no. 2.
Gonolobeae R. Br. VI. 489.
Gonolobus Michx. VI. 489.
— eriocladon Bth. VI. 489. no. 2.
— hispidus Hook. et Arn. VI. 489. †
— setosus Bth. VI. 489. no. 1.
— sidaefolius Martens et Galeotti. VI. 489. no. 5.
— striatus Martens et Galeotti. VI. 489. no. 4.
— triflorus Martens et Galeotti. VI. 489. no. 3.
Gonospermum DC. VI. 210.
Gonospermum Lssng. *II. 638. °V. 210.
— *elegans* DC. VI. 211. no. 1.
— *fruticosum* DC. VI. 211. no. 1.
— fruticosum Lssng. VI. 210. no. 1.
— *multiflorum* DC VI. 210. no. 1.
— revolutum C. H. Schultz. VI. 210. no. 2.
Gonotheca Blume. II. 491.
— Blumei DC. *II. 491. no. 1.
— *Blumei* DC. II. 498. no. 59.
Gonzalea Pers. II. 490. VI. 53.
—? parviflora Cham. et Schlchtd. II. 490. no. 1.
— secunda Mart. et Galeotti. VI. 53. no. 2.
— sessiliflora Prsl. VI. 53. no. 1.
Goodenia DC. II. 713. (ex p.)
Goodenia Sm. *II. 713. VI. 393.
— geniculata Vriese. VI. 393. no. 3.

Goodenia grandiflora Sims. VI. 393. †
— junciformis Vriese. VI. 393. no. 2.
— pygmaea Vriese. VI. 393. no. 4.
— squarrosa Vriese. VI. 393. no. 1.
GOODENIACEAE Bth. VI. 389.
GOODENIACEAE Endl. II. 712.
Goodenieae G. Don. V. 393.
Goodenieae Endl. II. 713.
GOODENOVIEAE R. Br. II. 712. VI. 389.
Goodia Salisb. *I. 578.
—? *polysperma* DC. I. 630. no. 1. V. 510. no. 4.
Gordonia Ell. I. 374. II. 802. V. 134.
— anomala Spr. II. 802. no. 2.
— barbinervis? Moric. *I. 375. no. 6.
— excelsa Blume. I. 374. no. 1. II. 802. no. 1.
— marginata Endl. V. 134. no. 2.
— obtusa Wall. I. 375. no. 2.
— ovalis Krthls. V. 134. no. 1.
— parvifolia Wght. I. 375. no. 4.
— villosa Macf. I. 375. no. 5.
— Zeylanica Wght. I. 375. no. 3.
Gordonieae Endl. I. 374. V. 134.
Gorteria Grtnr. *II. 666.
Gorterieae Cass. II. 666. VI. 278.
Gossampinus Schott. et Endl. I. 330.
— *alba* Hamilt. I. 330. no. 3.
— *rubra* Hamilt. I. 330. no. 1.
Gossypium L. I. 312. II. 791. V. 93.
— ....? Bth. V. 93. no. 2.
— acuminatum Rxb. *I. 313. no. 10.
— album Hamilt. *I. 312. no. 1.
— *arboreum* L. I. 312. no. 2. γ. II. 791. no. 1.
— *Barbadense* L. I. 312. no. 2. β.
— Brasiliense Macf. I. 312. no. 6.
— *croceum* Ham. I. 312. no. 3.
— *eglandulosum* Cav. (?) I. 312. no. 1.
— *glabrum* Poir. I. 312. no. 2.
— *herbaceum* L. I. 312. no. 1.
— herbaceum Linn. *II. 791. no. 2.
— *hirsutum* L. I. 312. no. 1.
— *Indicum* Lam. I. 312. no. 2.
— Jamaicense Macf. I. 312. no. 7.
— *Javanicum* Blume. I. 312. no. 2. β.
— Javanicum Dcne. I. 312. no. 9.
— *latifolium* Murr. I. 312. no. 2.
— *Nanking* Meyen. I. 312. no. 3.
— nigrum Hamilt. *I. 312. no. 2. *II. 791. no. 1.
— *nigrum* Ham. I. 312. no. 2. β. et γ.
— oligospermum Macfd. I. 312. no. 8.
— *Peruvianum* Cav. I. 312. no. 2.
— prostratum Schum. et Thonn. I. 312. no. 5.
— punctatum Schum. et Thonn. I. 312. no. 4.
— *purpurascens* Poir. I. 312. no. 2. γ.
Gossypinum racemosum Poir. I. 312. no. 2.
— religiosum Sw. *I. 312. no. 3.
— *rubicundum* Rxb. I. 312. no. 2. γ.
— sanguineum Hsskrl. V. 93. no. 1.
— *tricuspidatum* Lam. I. 312. no. 1.
— *vitifolium* Lam. I. 312. no. 2.
— *vitifolium* Wall. I. 312. no. 2. γ.
Goupia Aubl. *I. 539.
Gourliea Gill. I. 807.
— *decorticans* Gill. I. 708. no. 1.
— decorticata Wlprs. *I. 708. no. 1.
Grabowskya Schlchtd. III. 113. °III. 955. VI. 546. (*VI. 632.)
— boerhaviaefolia Arn. VI. 546. no. 1.
— *boerhaviaefolia* Lindl. VI. 547. no. 4.
— boerhaviaefolia Schlchtd. III. 113. no. 1.
— *boerhaviaefolia* Schlchtd. VI. 547. no. 3.
— disticha Meyen. III. 113. no. 2.
— duplicata Arn. VI. 547. no. 2.
— Lindleyi Sendtner. VI. 547. no. 4.
— Meyeniana N. ab E. III. 113. no. 3.
— Schlechtendalii Sendtner. VI. 547. no. 3.
Grabowskyeae Miers. VI. 546.
Graderia Bth. VI. 650.
— *scabra* Bth. VI. 650. no. 1.
Graellsia Boiss. I. 154.
— saxifragaefolia Boiss. *I. 154. no. 1.
Graffenrieda DC. *II. 118.
— *excelsa* DC. II. 119. no. 1.
Grahamia Gill. II. 234. V. 786.
— bracteata Gill. *II. 234. no. 1. V. 786. no. 1.
Grammadenia Bth. °VI. 450.
— lineata Bth. VI. 450. no. 1.
— marginata Bth. VI. 450. no. 2.
Grammanthes DC. II. 256.
— depressa Eckl. et Zeyh. II. 256. no. 2.
— filiformis Eckl. et Zeyh. II. 256. no. 3.
— sebaeoides Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 1.
Grammotocarpus Prsl. II. 225. V. 778.
— volubilis Prsl. *II. 325. no. 1. V. 778. no. 1.
Grammatotheca Prsl. *II. 706. *VI. 374.
— Drégeana Prsl. *VI. 733.
Grammismelia C. H. Schultz. VI. 202.
Grammocarpus Ser. I. 636. II. 874.
Grammosciadium DC. *II. 423. °V. 908.
— Aucheri Boiss. V. 909. no. 3.
— macrodon Boiss. V. 909. no. 4.
— pterocarpum Boiss. V. 809. no. 5.
— scabridum Boiss. V. 908. no. 1.
— Szowitsii Boiss. V. 908. no. 2.
Granadilla DC. II. 220.
Granateae Don. II. 194.
Grandiflori (Aster) Torr. et Gr. II. 569.
Grangea Adans. *II. 594. *II. 951. no. 3.

Grangeïneae DC. II. 594. II. 951. VI. 132.
Grangeïneae C. H. Schultz. II. 951.
Grangeria Commers. *II. 7.
— *Brasiliensis* Hffmsgg. II. 4. no. 23.
Grantia Boiss. °VI. 144.
— arachnoidea Boiss. VI. 144. no. 2.
Gratiola R. Br. III. 285. °III. 965.
Gratiola Linn. *VI. 643.
— *acuminata* Prsh. III. 286. no. 11.
— *acuminata* Vahl. III. 286. no. 7.
— *alata* Rxb. III. 294. no. 3.
— *alpina* J. Bauh. III. 285. no. 1.
— *amara* Rxb. III. 284. no. 1.
— *anagallidea* Michx. III. 298. no. 5.
— *aphylla* Rth. III. 288. no. 1.
— *aspera* Rth. III. 292. no. 4.
— aurea Prsh. III. 285. no. 4.
— brachycarpa Cham. et Schlchtd. III. 290. no. 13.
— *Carolinensis* Pers. III. 285. no. 4.
— *chamaedryfolia* Lam. III. 273. no. 7.
— *chamaedrys* Rth. III. 293. no. 18.
— *centauroides* C. Bauh. III. 285. no. 1.
— *ciliata* Colsm. III. 288. no. 2.
— *ciliata* Commers. III. 289. no. 4.
— *cordifolia* Koenig. III. 294. no. 19.
— crassifolia Lag. III. 285. no. 3.
— *cuneifolia* Rxb. III. 288. no. 1.
— *debilis* Heyne. III. 290. no. 12.
— Floridana Nutt. III. 286. no. 6.
— glabra R. Br. III. 287. no. 15.
— *goodeniaefolia* Hornem. III. 272. no. 2.
— *grandiflora* Retz. III. 288. no. 3.
— *grandiflora* Rxb. III. 289. no. 6.
— *grandiflora* Willd. III. 288. no. 1.
— *hispidula* Commers. III. 290. no. 17.
— Hookeri Wlprs. III. 286. no. 13.
— *hyssopioides* Linn. III. 287. no. 10.
— *inaequalis* Walt. III. 298. no. 5.
— *inundata* Kitaib. III. 297. no. 1.
— *juncea* Rxb. III. 288. no. 3.
— linifolia Vahl. III. 285. no. 2.
— *lobelioides* Retz. III. 288. no. 2.
— *lucida* Rxb. III. 292. no. 4.
— *marginata* Colsm. III. 288. no. 3.
— megalocarpa Elliot. III. 286. no. 11.
— *minima* Rth. III. 290. no. 14.
— *Monnieria* Linn. III. 282. no. 29.
— *neglecta* Torr. III. 286. no. 7.
— *nudicaulis* Willd. III. 288. no. 1.
— *ocymifolia* Vahl. III. 290. no. 18.
— *officinalis* Brot. III. 285. no. 2.
— officinalis Linn. III. 285. no. 1.
— *officinalis* Michx. III. 285. no. 4.
— *oppositifolia* Rxb. III. 289. no. 8.
— *oppositifolia* Willd. III. 288. no. 1.
Gratiola origanifolia Vahl. III 293. no. 15.
— *parviflora* Juss. III. 283. no. 39.
— *parviflora* Rxb. III. 290. no. 11.
— pedunculata R. Br. III. 287. no. 17.
— Peruviana Vahl. III. 285. no. 5.
— *Peruviana* Walt. III. 286. no. 9.
— pilosa Michx. III. 286. no. 9.
— *portulacca* Weinm. III. 282. no. 29.
— pubescens R. Br. III. 287. no. 16.
— *pulegiifolia* Vahl. III. 289. adn.
— *punctata* Colsm. III. 290. no. 15.
— *pusilla* Will. III. 290. no. 16.
— quadridentata Michx. III. 286. no. 8.
— *racemosa* Rth. III. 288. no. 3.
— *racemosa* Rxb. III. 289. no. 4.
— ramosa Walt. III. 286. no. 8.
— *repens* Sweet. III. 291. no. 1.
— *sepens* Willd. III. 283. no. 39.
— *reptans* Rxb. III. 288. no. 2.
— *rotundifolia* Linn. III. 290. no. 12.
— *Roxburghiana* Roem. et Schult. III. 289. no. 4.
— *ruellioides* König. III. 288. no. 2.
— *rugosa* Lour. III. 288. no. 2.
— *serrata* Rxb. III. 288. no. 1.
— sexdentata R. Cunningh. III. 287. no. 14.
— sphaerocarpa Elliot. III. 286. no. 12.
— *strigosa* Rth. III. 294. no. 20.
— *tenuifolia* Colsm. III. 287. no. 9.
— tetragona Elliot. III. 286. no. 10.
— *tetragona* Hook. III. 286. no. 13.
— *trifida* Willd. III. 273. no. 6.
— *trifida β. integrifolia* Vahl. III. 273. no. 7.
— verbenaefolia Colsm. III. 289. no. 4.
— *veronicaefolia* Retz. III. 288. no. 3.
— *Virginica* Lam. III. 286. no. 8.
— Virginica Linn. IIII. 286. no. 7.
— *viscosa* Hornem. III. 296. no. 7.
Gratiolae aphyllae Dietr. III. 288.
Gratioleae Bth. III. 262. III. 962. VI. 641.
Gratioleae verae Bth. VI. 642.
Gravenhorstea N. ab E. I. 545.
— fastigiata N. ab E. *I. 545. no. 1.
Greenia Wght. et Arn. II. 504.
— Jackii Wght. et Arn. *II. 504. no. 1.
— Wightiana Wght. et Arn. II. 504. no. 2.
Greenovia B. Webb et Berthelot. *V. 804.
— aurea B. Webb et Berthelot. V. 801. no. 1.
— dodrantalis B. Webb et Berthelot. V. 805. no. 2.
Gregoria Duby. *VI. 444.
— *Aucheri* Duby. VI. 444. no. 4.
— *caespitosa* Duby. VI. 444. no. 5.
— *Michauxii* Duby. VI. 444. no. 6.
Grenvillea conspicua Sweet. I. 462. †.

Grewia Juss. I. 360. II. 799. V. 119.
Grewia L. I. 361.
— .... Wlprs. V. 120. no. 4.
— abutilifolia Juss. *I. 461. no. 18.
— affinis Lindl. I. 360. no. 5.
— *affinis* Lindl. I. 362. no. 27.
— *arborea* Rxb. I. 362. no. 22.
— Asiatica L. *I. 361. no. 21.
— *aspera* Rxb. I. 361. no. 18.
— *betulaefolia* Rth. I. 362. no. 24.
— biflora G. Don. II. 800. no. 2.
— biloba G. Don. II. 800. no. 4.
— Caffra Meisn. II. 800. no. 9.
— *carpinifolia* DC. I. 361. no. 12.
— *carpinifolia* Rth. I. 361. no. 17.
— columnaris Sm. II. 800. †
— *commutata* DC. I. 361. no. 16.
— corylifolia A. Rich. I. 362. no. 31.
— *Damine* Gaertn. I. 361. no. 14.
— *didyma* Rxb. I. 361. no. 13.
— discolor Fresen. I. 360. no. 2.
— *disperma* Rottl. I. 361. no. 13.
— echinulata Delile. I. 362. no. 29.
— elastica Royle. I. 361. no. 19.
— emarginata Wght. et Arn. I. 361. no. 17. (III. Emend. p. 2.)
— *excelsa* Wall. I. 361. no. 14.
— *flavescens* Juss. I. 361. no. 16.
— helicterifolia Wall. II. 799. no. 1.
— glabra Blume. I. 361. no. 1.
— *hirsuta* Rxb. II. 800. no. 1.
— hirsuta Vahl. *I. 361. no. 15. II. 800. †
— humilis Wall. II. 800. no. 7.
— inaequalis Blume. I. 361. no. 8.
— involucrata Blume. I. 361. no. 11.
— laevigata Vahl. *I. 361. no. 13.
— lateriflora G. Don. II. 800. no. 5.
— *macrophylla* G. Don. I. 361. no. 18.
— macrophylla G. Don. II. 800. no. 6.
— Manillensis Wlprs. V. 120. no. 2.
— Meyeniana Wlprs. V. 120. no. 3.
— *Mexicana* DC. II. 800. no. 1.
— microcos L. *I. 362. no. 27.
— micropetala Bertol. I. 362. no. 30.
— *montana* Koen. I. 361. no. 15.
— Münterii Wlprs. I. 362. no. 28.
— *obliqua* Rxb. II. 800. no. 8.
— oblongifolia Blume. I. 360. no. 7.
— *obtusa* Wall. I. 361. no. 12.
— odorata Blume. I. 361. no. 10.
— oppositifolia Ham. I. 362. no. 25. II. 800. †
— *orbiculata* G. Don. I. 361. no. 20.
— *orbicularis* Hb. Lamb. I. 362. no. 23.
— *orbiculata* Rth. I. 362. no. 23.
— orientalis L. *I. 361. no. 12.
— *orientalis* Rxb. I. 361. no. 17.
Grewia ovalifolia Juss. I. 361. no. 13.
— *paniculata* Rxb. I. 362. no. 27.
— parviflora Bnge. I. 360. no. 6.
— pilosa Lam. *I. 361. no. 16.
— populifolia Vahl. *I. 362. no. 24.
— pumila Ham. I. 362. no. 26.
— *rhamnifolia* Hb. Madr. I. 361. no. 12.
— Richardiana Wlprs. I. 362. no. 32.
— rotundifolia Juss. *I. 362. no. 23. II. 800. †
— *Roxburghii* G. Don. I. 361. no. 15.
— Roxburghii G. Don. II. 800. no. 3.
— rugosa G. Don. II. 800. no. 8.
— salutaris Spanoghe. I. 360. no. 4.
— salvifolia Heyne. *I. 361. no. 14.
— *salvifolia* Rxb. II. 800. no. 3.
— *scabrida* Wall. I. 361. no. 16.
— sclerophylla Rxb. II. 800. †
— *subinaequalis* DC. I. 361. no. 21.
— Tembensis Fresen. I. 360. no. 1.
— *tiliaefolia* A. Rich. I. 362. no. 32.
— tiliaefolia Vahl. *I. 362. no. 22.
— *tomentosa* Rxb. I. 361. no. 15.
— triflora Wlprs. V. 119. no. 1.
— ulmifolia Boj. II. 800. †
— *ulmifolia* Rxb. I. 362. no. 27.
— umbellata Rxb. II. 800. †
— *variabilis* Wall. *I. 362. no. 22.
— venusta Fresen. I. 360. no. 3.
— villosa Roth. *I. 361. no. 20.
Grewieae Endl. I. 352. V. 116.
Grias Linn. *II. 193.
Grielum L. *II. 52.
Griesebachia cf. Grisebachia.
Griffithia Wght. et Arn. II. 517.
— fragrans Wght. et Arn. *II. 517. no. 1.
Grimaldia assurgens Schrnk. I. 834. no. 245.
Grindelia Willd. II. 585. *II. 951. no. 5. II. 958.
— cuneifolia Nutt. II. 586. no. 5.
— discoidea Nutt. II. 586. no. 4.
— hirsutula Hook et Arn. *II. 959. no. 2.
— inuloides Willd. II. 586. † *II. 958. no. 1. (c. varr. β. γ.)
— lanceolata Nutt. II. 959. no. 3. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— *microcephala* DC. II. 959. no. 1.
— nana Nutt. II. 586. no. 3.
— *pubescens* Nutt. II. 959. no. 1.
— robusta Nutt. II. 585. no. 1.
— *rubricaulis* DC. II. 959. no. 2.
— virgata Nutt. II. 585. no. 2.
Grisebachia Kltzsch. *II. 729.
Griselinia Forst. V. 927. adn.
— *littoralis* Raoul. V. 927. no. 1.
— lucida Forst. V. 927. adn.
Grislea Loefll. *II. 112.

Grona Lour. I. 761.
Gronovia Linn. *II. 228.
Groseiller des Barbades Dun. II. 355. no. 1.
Grossularia DC. II. 357.
GROSSULARIEAE DC. II. 357. V. 822.
Groutia celtidifolia A. Rich. I. 377. no. 1.
Grumilea Gaertn. II. 479. VI. 44.
— congesta Wght. et Arn. II. 479. no. 2.
— globosa Hochstett. VI. 44. no. 1.
— subintegra Wght. et Arn. II. 479. no. 1.
Gruvelia A. P. DC. *VI. 562.
Gryphacantha Dunal. (Solanum) VI. 606.
Gryptocteniun Wallrth. II. 38.
Guajacum Plum. I. 498.
— officinale L. *I. 498. no. 1.
Guanabani Martius. I. 86.
Guapira Aubl. IV. 132. adn.
— Guianensis Aubl. VI. 132. no. 1. adn.
Guardiola Humb. Bonpl. *II. 604.
Guarea Linn. I. 434. II. 817. V. 375.
— affinis A. Juss. I. 434. no. 13.
— alliacea Nees ab Esenb. I. 429. no. 1.
— Aubletii A. Juss. I. 434. no. 6.
— binectarifera Rxb. *I. 435. no. 22.
— brachystachya DC. *I. 435. no. 17.
— costata A. Juss. I. 435. no. 15.
— *densiflora* Blume. I. 430. no. 3.
— densiflora Poepp. et Endl. II. 817. no. 2.
— excelsa Kth. *I. 434. no. 3.
— *humilis* Bert. I. 434. no. 1.
— Kunthiana A. Juss. I. 434. no. 14.
— Lessoniana A. Juss. I. 435. no. 19.
— macrobotrys Poepp. et Endl. II. 817. no. 1.
—? microphylla Hook. I. 435. no. 21.
— megantha A. Juss. I. 435. no. 20.
— multiflora A. Juss. I. 434. no. 7.
— *obtusifolia* Lam. I. 433. no. 19.
— paniculata Rxb. *I. 435. no. 23. *V. 375. no. 1.
— Perrottetiana A. Juss. I. 434. no. 9.
— pubescens A. Juss. I. 434. no. 10.
— pubiflora A. Juss. I. 434. no. 11.
— ramiflora Vent. *I. 434. no. 1.
— Richardiana A. Juss. I. 435. no. 16.
— scabra A. Juss. I. 434. no. 8.
— *sericea var.* Spr. I. 430 no. 4.
— spiciflora A. Juss. I. 434. no. 5.
— trichilioides Cav. *I. 434. no. 4.
— *trichilioides* A. Rich. I. 434. no. 6.
— tuberculata A. Juss. I. 435. no. 18.
— Vahliana A. Juss. I. 434. no. 2.
— velutina A. Juss. I. 434. no. 12.
Guatteria Rz. et Pav. I. 81. II. 747.
— acutiflora Mart. I. 83. no. 34.
— *acutiflora* Wall. I. 81. no. 3.
— apodocarpa Mart. I. 83. no. 36.
Guatteria australis St. Hil. I. 82. no. 26.
α. pubens.
β. glabrata.
— bifaria DC. fil. I. 81. no. 4.
— biglandulosa Blume. I. 82. no. 18.
— blepharophylla Mart. I. 85. no. 53.
— *Bragma* Blume. I. 82. no. 13.
— Candolleana Schlchtd. I. 83. no. 35.
— caniflora Mart. I. 85. no. 52.
α. angustifolia.
β. latifolia.
— cauliflora Mart. I. 85. no. 48.
— *cordata* Dun. I. 78. no. 27.
— *cuneiformis* Blume. I. 74. no. 3.
— densicoma Mart. I. 84. no 39.
— elongata Benth. II. 747. no. 1.
— excelsa Poepp. I. 82. no. 20.
— ferruginea St. Hil. I. 82. no. 27.
— flava St. Hil. I. 82. no. 25.
— foliosa Bth. II. 747. no. 2.
— globosa DC. fil. I. 81. no. 5.
— Gomeziana St. Hil. I. 82. no. 24.
— heteropetala Bth. II. 747. no. 3.
— Hilariana Schlchtd. I. 84. no. 47.
α. angustifolia } Schlchtd. I. 85. no. 47.
β. latifolia } Schlchtd. I. 85. no. 47.
— Hookeri St. Hil. et Tulasne. I. 85. no. 54.
— imbricata Blume. I. 81. no. 12.
— incerta Blume. I. 82. no. 16.
— inundata Mart. I. 85. no. 49.
β. longifolia Poepp.
— Klotzschiana Mart. I. 84. no. 41.
— Korinti Dun. *I. 81. no. 3.
— laevigata Mart. I. 84. no. 40.
— lateriflora Blume. *I. 82. no. 17.
— *laurifolia* Dun. II. 747. no. 1.
— littoralis Blume. I. 82. no. 15.
— longifolia Wall. *I. 81. no. 2.
—? lucida Prsl. I. 82. no. 22.
— *lutescens* Pohl. I. 86. no. 7.
— macrantha Prsl. I. 82. no. 21.
— macrophylla Blume. *I. 82. no. 13.
β. Bragma.
— macrophylla DC. fil. I. 81. no. 9.
— macropus Mart. I. 83. no. 30.
— *Malabarica* Dunal. I. 77. no. 19.
— Martiana Schlchtd. I. 83. no. 32.
— *Maypurensis* Hook. I. 85. no. 54.
— membranacea DC. I. 81. no. 8.
—? micrantha DC. fil. I. 81. no. 11.
— *montana* DC. I. 77. no. 19.
— nigrescens Mart. I. 84. no. 38.
— nitida DC. fil. I. 81. no. 7.
— odontopetala Mart. I. 84. no. 42.
— oligocarpa Mart. I. 84. no. 43.
— Ouregou Dun. *I. 85. no. 51.

Guatteria oxycarpa Poepp. I. 85. no. 53.
— pallida Blume. *I. 82. no. 14.
— *pisocarpa* Blume. I. 74. no. 1.
— Poeppigiana Mart. I. 85. no. 50.
— pogonopus Mart. I. 84. no. 46.
— Pohliana Schlchtd. I. 83. no. 31.
— psilopus Mart. I. 83. no. 29.
— Schlechtendaliana Mart. I. 84. no. 44.
— Schomburgkiana Mart. I. 82. no. 23.
— Sellowiana Schlchtd. I. 83. no. 37.
— sesquipedalis Colebr. I. 81. no. 1.
— subsessilis Mart. I. 83. no. 33.
— Toralae Blume. I. 82. no. 19.
— unonaefolia DC. fil. I. 81. no. 6.
— velutina DC. fil. I. 81. no. 10.
— veneficiorum Mart. I. 84. no. 45.
— villosissima St. Hil. I. 82. no. 28.
— *virgata* Dun. II. 747. no. 1.
Guazuma Plum. I. 340. V. 112.
— Blumei G. Don. I. 340. no. 1.
— Bubroma Tussac. I. 340. no. 4.
— crinita Mart. I. 340. no. 6.
— grandiflora G. Don. I. 340. no. 2.
— Invira G. Don. I. 340. no. 3.
— parvifolia A. Rich. I. 340. no. 5.
— rosea Poepp. et Endl. V. 112. no. 1.
— *tomentosa* Blume. I. 340. no. 1.
— utilis Poepp. et Endl. V. 112. no. 2.
Güldenstaedtia Fisch. I. 684.
— cuneata Bth. I. 684. no. 3.
— multiflora Bnge. I. 684. no. 1.
— *Oliveriana* Fisch. II. 859. no. 3.
— stenophylla Bnge. I. 684. no. 2.
Güntheria Spr. *II. 702. no. 14.
Guettarda Vent. II. 486. VI. 49.
—? (an protracta Bartl.) Mart. et Galeotti. VI. 49. no. 3.
— aromatica Poepp. at Endl. II. 487. no. 6.
— Brunonis Wall. II. 487. no. 5.
—? Brunonis Wall. II. 487. no. 5.
— conferta Bth. VI. 49. no. 1.
— dealbata Martens et Galeotti. VI. 49. no. 4.
— dichotoma Martens et Galeotti. VI. 49. no. 5.
— Finlaysoniana Wall. II. 487. no. 3.
— grandiflora Steudel. VI. 49. no. 2.
— macrantha Bth. II. 487. no. 7.
— missionis Wall. II. 486. no. 1.
— *paniculata* Bartl. II. 487. no. 1.
— peduncularis Wall. II. 487. no. 2.
— speciosa L. II. 487. †
— Wallichiana G. Don. II. 487. no. 4.
Guettardaceae Kth. VI. 48.
Guettardaria DC. II. 486. no. 1. II. 487. no. 2. 3. 4.
Guettardeae Kth. II. 485. II. 942. V. 48.
Guichenotia Gay. *I. 336.
Guiera Adans. II. 63.
— Senegalensis Lam. *II. 63. no. 1.
Guilandina L. I. 809.
— Bonduc L. *I. 809. no. 1.
Guildingia Hook. II. 149.
— psidioides Hook. *II. 149. no. 1.
Guilleminea H. B. Kth. *I. 266.
Guindilia Gill. I. 524.
— trinervis Gill. *I. 524. no. 1.
Guizotia Cass. II. 610. °VI. 157.
— oleifera DC. *II. 610. no. 1. VI. 158. no. 1.
— Schimperi C. H. Schultz. VI. 158. no. 2.
— Schultzii Hochstett. VI. 158. no. 3.
— villosa C. H. Schultz. VI. 158. no. 4.
Gumillea Rz. et Pav. II. 374.
— auriculata Rz. et Pav. *II. 374. no. 1.
Gumira Rmph. IV. 94. adn.
— *domestica seu folium hircinum* Rmph. IV. 94. no. 10.
— *littorea* Rmph. IV. 94. no. 8.
Gummiferae Bth. (Acacia) I. 908. V. 591.
Gundelia Tournef. *II. 543.
Gunisanthus Alph. DC. *VI. 457.
Gunnera L. II. 100. V. 672.
— bracteata Steud. II. 100. no. 4.
— Chilensis Lam. II. 100. no. 3. *V. 672. no. 2.
β. pilosa R. Br. II. 100. no. 3.
— Falklandica Hook. II. 100. no. 6.
— macrophylla Blume. II. 100. no. 1.
— *Magellanica* Lam. II. 100. no. 6.
— monoica Raoul. V. 672. no. 1.
— perpensa Linn. II. 100. no. 2.
— petaloidea Gaudich. II. 100. no. 5.
— *pilosa* H. B. Kth. II. 100. no. 3.
— *scabra var.* Bert. II. 100. no. 4.
— *scabra* Rz. et Pav. II. 100. no. 3. VI. 672. no. 2.
Gunneraceae Endl. II. 100. V. 672.
Gustavia Linn. *II. 193. V. 756.
— angustifolia Bth. V. 756. no. 1.
Gutenbergia C. H. Schultz. °II. 703. *II. 944.
— Rüppellii C. H. Schultz. II. 703. no. 1.
Gutierrhezia Lag. *II. 625. *II. 951. no. 4. II. 989.
— Californica Torr. et Gr. *II. 989. no. 1.
— Euthamiae Torr. et Gr. *II. 989. no. 2.
— Texana Torr. et Gr. II. 989. no. 3.
GUTTIFERAE Juss. (ex p.) I. 392. V. 144.
Gymnagathis Schauer. II. 927. °V. 745.
— teretifolia Schauer. *II. 927. no 1. *V. 745. no. 1.
Gymnandra Pall. III. 371. III. 456. °III. 969. *VI. 655.

Gymnandra Altaica Willd. III. 372. no. 6.
— Armena Boiss. III. 456. no. 8.
— *borealis var.* Pall. III. 372. no. 4. 5. 6.
— Cashmeriana Royle. III. 371. no. 3.
— *dentata* Willd. III. 372. no. 5.
— *elongata* Willd. III. 372. no. 6.
— Gmelini Cham. et Schlchtd. III. 372. no. 4.
— *gracilis* Willd. III. 372. no. 5.
— *integrifolia* Willd. III. 372. no. 6.
— Kunawurensis Royle. III. 371. no. 2.
— longiflora Karel. et Kiril. III. 371. no. 1.
— *minor* Willd. III. 372. no. 5.
— *ovata* Willd. III. 372. no. 4.
— Pallasii Cham. et Schlchtd. III. 372. no. 6.
— *reniformis* Willd. III. 372. no. 4.
— rubra Dougl. III. 372. no. 7.
— Stelleri Cham. et Schlchtd. III. 372. no. 5.
— stolonifera C. Koch. III. 456. no. 9.
Gymnanthemum Cass. II. 948. VI. 98.
— Abyssinicum C. H. Schultz. II. 948. no. 1.
— amygdalinum C. H. Schultz. *II. 948. no. 2. *VI. 98. no. 1.
— Dendigalense C. H. Schultz. *II. 948. no. 8.
— divergens C. H. Schultz. *II. 948. no. 13.
— fimbrilliferum Cass. *II. 948. no. 11.
— frutescens C. H. Schultz. *II. 948. no. 3.
— glabrum C. H. Schultz. *II. 948. no. 6.
— grande C. H. Schultz. *II. 948. no. 10.
— molle C. H. Schultz. II. 948. no. 5.
— obovatum Gaudich. *II. 948. no. 9.
— phyllonaeum C. H. Schultz. *II. 949. no. 14.
— reticulatum C. H. Schultz. *II. 948. no. 4.
—? scariosum C. H. Schultz. *II. 949. no. 15.
— Senegalense C. H. Schultz. *II. 948. no. 12.
— Silhetense C. H. Schultz. *II. 948. no. 7.
Gymnanthera R. Br. *VI. 480.
Gymnanthereae Bth. I. 864. II. 905. V. 584.
Gymnanthus paradoxus Jungh. II. 747. no. 1.
Gymnarrhena Dsf. *II. 594. *II. 951. no. 6.
Gymneja Bth. III. 524.
Gymnema R. Br. *VI. 492.
Gymnemae Dcne. VI. 492.
Gymnocarpae Trautvett. (Isatis) V. 46.
Gymnocarpos Forsk. *I. 262.
Gymnocimum Bth. III. 490.
Gymnocladus Lam. I. 809.
— Canadensis Lam. *I. 809. no. 1.
Gymnocline DC. II. 637. no. 4.
Gymnocoronis DC. II. 545.
— latifolia Hook. et Arn. II. 545. no. 1.
Gymnocylix Bth. III. 744.
Gymnodiscus Lssng. *II. 665. VI. 274.
— orbicularifolius C. H. Schultz. VI. 274. no. 1.
Gymnogyne Steetz. °VI. 155.
Gymnogyne cotuloides Steetz. *VI. 155. no. 1.
Gymnonychium Bartl. °V. 393.
— pubescens Bartl. V. 393. no. 1.
Gymnopetalum Arn. II. 203.
— Wightii Arn. II. 203. no. 2.
— *Zeylanicum* Arn. II. 198. no. 9.
— Zeylanicum Arn. II. 203. no. 1.
Gymnophlomis Bth. III. 880.
Gymnopodae Bth. (Inga) V. 629.
Gymnopsis DC. *II. 612. VI. 160.
— divaricata Bth. VI. 160. no. 1.
Gymnosciadium Hochstett. °V. 848.
— pimpinelloides Hochstett. V. 848. no. 1.
Gymnosperma Lssng. *II. 585. *II. 951. no. 4.
Gymnospermeae DC. II. 585. II. 951.
Gymnospermum nudatum DC. II. 987. no. 1.
Gymnosphace Bth. III. 677.
Gymnostegia Bth. II. 712. no. 1. VI. 391.
Gymnostephia DC. II. 712. no. 2.
Gymnostephium Lssng. *II. 583. *II. 952. no. 21.
Gynaion A. P. DC. *VI. 553.
Gynandropsis DC. I. 193. II. 764. V. 52.
— *affinis* Blume. I. 193. no. 1.
— affinis Blume. II. 764. no. 1.
— Candelabrum Sweet. II. 764. no. 3.
— pentaphylla DC. *I. 193. no. 1.
— trichopus Bth. V. 52. no. 1.
— viscida Bnge. I. 193. no. 2.
— viscosa Blume. II. 764. no. 2.
Gynocardia R. Br. °V. 58a.
— odorata R. Br. V. 58b. no. 1.
Gynochlades coriacea Blume. II. 942. no. 1.
Gynochtodes Blume. *II. 488.
Gynopachys Blume. *II. 521.
Gynopera DC. II. 367. no. 42.
Gynopleura Cav. II. 223. V. 775.
— angustifolia Cav. *V. 775. no. 1.
— *coerulea* Prsl. II. 223. no. 1. β.
— dilatata D. Don. II. 223. no. 2.
— linearifolia Cav. *II. 223. no. 1. (c. varr. α. β. γ. et δ. ibid.)
— solanoides Meyen. V. 775. no. 2.
Gynostemma Blume. I. 98.
— pedata Blume. I. 98. no. 1.
— simplicifolia Blume. I. 98. no. 2.
Gynotroches Blume. I. 397.
— axillaris Blume. I. 397. no. 1.
Gynoxys Cass. *II. 652. VI. 256.
— scabra Bth. VI. 256. no. 2.
— Sinclairi Bth. VI. 256. no. 1.
Gynura Cass. *II. 651.
Gypsophila L. I. 270. II. 773. V. 77. (III. Emend. p. 2.)
Gypsophila Linn. (ex p.) V. 78. et 79.
— *alpina* Habl. II. 773. no. 17.

Gypsophila altissima L. *I. 271. no. 9.
γ. eglandulosa.
β. elongata.
— aretioides Boiss. II. 773. no. 1.
— Arrostii Guss. I. 270. no. 1.
β. pubescens.
— Aucheri Boiss. II. 775. no. 17.
— bellidifolia Boiss. II. 773. no. 5.
— *bellidifolia* Boiss. V. 78. no. 4.
— caricifolia Boiss. II. 776. no. 21.
— curvifolia Fnzl. I. 271. no. 5.
— Davurica Turcz. II. 776. no. 22.
β. angustifolia.
α. latifolia.
— desertorum Fnzl. II. 775. no. 14.
— *desertorum* Fnzl. V. 80. no. 3.
— eriocalyx Boiss. II. 775. no. 19.
— fasciculata Reuter. I. 271. no. 3.
— floribunda Turcz. II. 774. no. 8.
— *floribunda* Turcz. V. 78. no. 7.
— frankenioides Boiss. II. 773. no. 2.
— *frankenioides* Boiss. V. 78. no. 1.
— glandulosa Wlprs. II. 774. no. 10.
— *glandulosa* Wlprs. V. 80. no. 4.
— Gmelini Bnge. *I. 271. no. 10.
— hispida Boiss. II. 773. no. 4.
— *hispida* Boiss. V. 78. no. 3.
— Jaligua Schrad. II. 776. no. 23.
— lepidioides Boiss. II. 775. no. 20.
— Libanotica Boiss. II. 775. no. 16.
— microphylla Fnzl. *II. 775. no. 13.
— microphylla Schrenk. I. 271. no. 8.
— *microphylla* Wlprs. V. 80. no. 2.
— *muralis* Linn. V. 79. no. 9.
— nana Bory et Chaub. I. 271. no. 2.
— *Patrini* Ser. I. 271. no. 10. *α.*
Gypsophila perfoliata L. *I. 271. no. 6.
β. tomentosa Ldb.
— petraea Bnge. *I. 271. no. 7.
— *petraea* Bnge. V. 79. no. 1.
— petraea Fnzl. II. 774. no. 12.
— reticulata Hochstett. V. 77. no. 1.
— ruscifolia Boiss. II. 775. no. 15.
— spathulaefolia Fnzl. II. 774. no. 9.
— *spathulaefolia* Fnzl. V. 78. no. 8.
— stricta Bnge. I. 271. no. 11.
— *stricta* Bnge. II. 773. no. 17.
— Szovitsii Fisch. et Mey. II. 774. no. 7.
α. glabrata.
β. glandulosa.
— *Szovitsii* Fisch. et Mey. V. 78. no. 6.
— *thesiifolia* Ser. I. 271. no. 10. *β.*
— *tomentosa* L. I. 271. no. 6.
— trichopoda Boiss. II. 773. no. 3.
— *trichopoda* Boiss. V. 78. no. 2.
— *tubulosa* Boiss. V. 78. no. 5.
— tubulosa Boiss. II. 774. no. 6.
— Uralensis Lssng. I. 271. no. 12.
— venusta Fnzl. I. 271. no. 4.
— violacea Fnzl. *II. 774. no. 10.
— *violacea* Fnzl. V. 81. no. 7.
— virgata Boiss. II. 775. no. 18.
Gyrandra Griseb. VI. 499.
— speciosa Bth. VI. 499. no. 1.
Gyranthus Nutt. II. 77.
Gyrinops Gaertn. I. 549.
— Walla Gaertn. *I. 549. no. 1.
Gyrinopsis Dcne. °V. 410.
— Cumingiana Dcne. V. 411. no. 1.
Gyrophyllum Nutt. II. 614.
Gyrophyllum Torr. et Gr. II. 980.

H

Habbasia Bth. (Mimosa) I. 864. et 875. V. 855.
§. 7. *Asperatae* Bth. I. 878.
§. 3. *Caesalpiniaefoliae* Bth. I. 876.
§. 4. *Glanduliferae* Bth. I. 876.
§. 2. *Leiocarpae* Bth. I. 876.
§. 8. *Microcephalae* Bth. I. 878.
§. 5. *Rubricaules* Bth. I. 877.
§. 6. *Somniantes* Bth. I. 877. V. 585. no. 8.
§. 1. *Tomentosae* Bth. I. 875.
Haberlea Frivaldsky. III. 438. °III. 973. *VI. 655. *VI. 522.
Haberlea Rhodopensis Frivaldsky. III. 338. no. 1.
Haberlia Dennst. V. 412. no. 1.
Habrosia Fnzl. II. 770. °V. 76.
— spinuliflora Fnzl. *II. 770. no. 1. V. 77. no. 1.
Habrosieae Fnzl. V. 76.
Habrothamnus Endl. III. 122. °III. 955. VI. 629.
— corymbosus Endl. III. 122. no. 3. *VI. 629. no. 2.
— cyaneus Lindl. III. 934.

Habrothamnus cyaneus Lindl. VI. 629 no. 1.
— elegans Scheidweil. *III. 122. no. 4. III. 934.
— *elegans* Scheidw. VI. 629. no. 1.
— fasciculatus Endl. III. 122. no. 1. III. 934. *VI. 629. no. 1.
— paniculatus Martens et Galeotti VI. 629. no. 3.
— *purpureus* Lindl. III. 934. VI. 629. no. 1.
— tomentosus Bth. III. 122. no. 2.
Habzelia DC. fil. I. 76.
— *Aethiopica* DC. jun. I. 75. no. 11.
— aromatica DC. fil. *I. 76. no. 1.
— discreta DC. *I. 76. no. 2.
— *obtusifolia* DC. jun. I. 75. no. 10.
— undulata DC. fil. *I. 76. no. 3.
Hacquetia Neck. *II. 388.
Haemadictyon Lindl. VI. 473.
— contortum Mart. et Gal. VI. 473. no. 3.
— tomentellum Bth. VI. 473. no. 2.
— trifidum Poepp. et Endl. VI. 473. no. 1.
Haematoxylon L. I. 809.
— Campechianum Linn. *I. 809. no. 1.
Haemax E. Mey. *VI. 482.
Haemocharis semiserrata Mart. et Zucc. I. 372. no. 3. V. 132. no. 1.
— *tomentosa* Mart. et Zucc. I. 372. no. 4.
Haemodoron Wallrth. III. 461.
Haenelia Wlprs. °II. 974.
— Capensis Wlprs. *II. 974. no. 1.
Haenselera Boiss. II. 684. *VI. 328.
— Granatensis Boiss. *II. 684. no. 1.
Halea Torr. et Gr. II. 977. °VI. 158.
— Ludowiciana Torr. et Gr. *II. 977. no. 1. VI. 158. no. 1.
Halenia Borkh. VI. 508.
— hypericoides Griseb. *VI. 509. no. 4. β. angustifolia Bth.
— longicornu Mart. et Gal. VI. 508. no. 1.
— nudicaulis Mart. et Gal. VI. 508. no. 2.
— nutans Mart. et Gal. VI. 509. no. 3.
Halesia Ellis. *VI. 459.
Halgania Gaudich. *VI. 551.
Halicacabus Indicus major albus Rmph. III. 25. no. 14.
— *Indicus minor niger* Rmph. III. 25. no. 15. *a.* III. 49. no. 79. *a**.
Halimodendron Fisch. *I. 682. II. 859.
— argenteum Fisch. II. 859. no. 1. β. glabrescens.
— *argenteum β. subvirescens* DC. II. 859. no. 2.
— cuspidatum Jaub. et Spach. II. 860. no. 3.
— emarginatum Jaub. et Spach. II. 860. no. 4.
— subvirescens G. Don. II. 859. no. 2.
Halimolobus patula Tausch. I. 167.
— *stricta* Tausch. I. 167.
Halleria Linn. III. 262. °III. 962. *VI. 638.
— elliptica Linn. III. 262. no. 3.
— lucida Linn. III. 262. no. 1.
— *lucida β.* Linn. III. 262. no. 3.
— ovata Bth. III. 262. no. 2.
Hallia Thnbrg. I. 582.
— imbricata Thnbrg. *I. 582. no. 1.
— sagittata Desvx. *I. 582. no. 2.
— *trifoliata* Rth. I. 748. no. 11.
Halodendrum Aub. du Petit Thouars. IV. 132. no. 1.
Halolachna } Cf. Hololachne.
Halolachne }
HALORAGEAE R. Br. II. 98. II. 916. V. 671.
HALORAGEAE DC. (ex. p.) V. 671.
Halorageae Meisn. V. 671. (ex. p.)
Haloragis Forst. II. 99. II. 916. V. 672.
— alternifolia All. Cunn. II. 99. no. 8.
— ceratophylla Zahlbruckn. II. 99. no. 3.
— citriodora Wlprs. II. 99. no. 11.
— cordigera Fnzl. II. 99. no. 6. *II. 916. no. 1.
— cyathiflora Fnzl. II. 99. no. 4.
— depressa Wlprs. II. 99. no. 10.
— disticha W. Jack. II. 99. no. 1.
— elata Fnzl. II. 99. no. 7.
— incana All. Cunn. II. 99. no. 9.
— nodulosa Wlprs. V. 672. no. 1.
— oligantha Wght. et Arn. II. 99. no. 2.
— scoparia Fnzl. II. 99. no. 5.
— serpyllifolia Wlprs. II. 99. no. 13.
— trifida Wlprs. V. 672. no. 2.
— vernicosa Wlprs. II. 99. no. 12.
Hamydryas Comm. I. 32.
— andicola Hook. I. 32. no. 1.
Hamameleae Endl. II. 434.
HAMAMELIDEAE R. Br. II. 434. II. 840. V. 928.
Hamamelis Linn. *II. 434.
— *Persica* DC. II. 435. no. 1.
Hamelia Jcq. *II. 490. VI. 51.
— lanuginosa Mart. et Gal. VI. 51. no. 1.
Hamelieae DC. II. 489. II. 943. VI. 50.
Hamiltonia Rxb. II. 488. V. 50.
— *fruticosa* Don. II. 488. no. 2.
— inodora Hsskrl. *VI. 50. no. 1.
— Mysorensis Wght. et Arn. II. 488. no. 1.
— propinqua Dcne. II. 488. no. 2.
Hammatocaulis Tausch. II. 413.
— Cretica Tausch. *II. 413. no. 1.
Hammatolobium Fnzl. I. 724. II. 888.*)
— lotoides Fnzl. I. 724. no. 1. *II. 888. no. 1.
Hampea Schlchtd. I. 331.
— integerrima Schlchtd. *I. 331. no. 1.
Hancornia Gom. VI. 466.

---

*) Nec Hamatolobium.

Hancornia floribunda Poepp. et Endl. VI. 466. no. 1.
Hansenia Turczan. ° V. 920.
— Mongholica Turcz. * V. 921. no. 1.
Hapalosia Loefflingiae Wall. I. 263. no. 2.
Hapaxantha Webb et Berth. V. 797.
Haplocarpha Lssng. * II. 666.
Haplolophium Endl. * VI. 512.
Haplopappus cf. Aplopappus.
Haplopappus Cass. II. 592. * II. 952. no. 47. II. 967. VI. 130.
—? alpigenus Torr. et Gr. II. 968. no. 6.
— anthylloides Meyen et Wlprs. VI. 130. no. 5.
— arenarius Bth. VI. 130. no. 2.
— baccharoides Bth. VI. 130. no. 1.
— bellioides Hook. fil. VI. 720. no. 4.
— cuneifolius Nutt. II. 592. no. 1.
— gramineus Bth. VI. 130. no. 3.
— Gunnii Hook. fil. VI. 720. no. 2.
— inuloides Torr. et Gr. * II. 968. no. 5.
— lanceolatus Torr. et Gr. * II. 968. no. 3.
— Menziesii Torr. et Gr. * II. 968. no. 7.
— Meyenii Wlprs. VI. 130. no. 4.
— Nuttallii Torr. et Gr. II. 968. no. 9.
— pappochroma Hook. fil. VI. 720. no. 3.
— pinnatifidus Nutt. II. 592. no. 2.
— rubiginosus Torr. et Gr. II. 967. no. 1.
— spinulosus DC. * II. 968. no. 2.
— squarrosus Hook. et Arn. * II. 968. no. 8.
— stellatus Hook. fil. VI. 720. no. 5.
— Tasmanicus Hook. fil. VI. 719. no. 1.
— uniflorus Torr. et Gr. II. 968. no. 4.
Haplophyllum Adr. Juss. I. 518. II. 824. V. 394.
— acutifolium G. Don. * I. 518. no. 11.
— Buxbaumii G. Don. * I. 518. no. 10.
— cordatum G. Don. * I. 518. no. 4.
— coronatum Grieseb. II. 824. no. 4.
— Dahuricum G. Do. * I. 518. no. 14.
— dichotomum G. Don. * I. 518. no. 2.
— fruticulosum G. Don. * I. 518. no. 5.
— glabrum G. Don. * I. 518. no. 7.
— latifolium Kar. et Kir. I. 519. no. 17.
— lineare G. Don. * I. 518. no. 12.
— linifolium G. Don. I. 518. no. 9.
— myrtifolium Boiss. II. 824. no. 3.
— Patavinum G. Don. * I. 518. no. 1.
— perforatum Kar. et Kir. I. 518. no. 16.
— pumilum Boiss. II. 824. no. 2.
— pubescens G. Don. * I. 518. no. 3.
— Reuteri Boiss. V. 394. no. 1.
— rosmarinifolium G. Don. * I. 518. no. 15.
— Sieversii Fisch. II. 824. no. 1.
— sulphureum Boiss. V. 394. no. 2.
— thesioides G. Don. * I. 518. no. 13.
— tuberculatum Adr. Juss. * I. 518. no. 6.
— villosum G. Don. * I. 518. no. 8.
Haplophyton DC. * VI. 472.
Haplosciadium Hochstett. ° V. 839.
— Abyssinicum Hochstett. V. 839. no. 1.
Haplostemma Endl. ° VI. 483. adn.
— Arabicum Endl. * VI. 483. no. 1. adn.
Haplostemmae Dcne. VI. 482.
Haplostephium Don. II. 700.
Haplostephium Mart. * II. 542.
— *Passerina* Mart. VI. 99. no. 1.
Haplotaxis cf. *Aplotaxis*.
Haplotaxis DC. II. 669. VI. 282.
— fastuosa Dcne. II. 669. no. 4.
— foliosa Edgeworth. VI. 282. no. 2.
— involucrata Kar. et Kir. II. 669. no. 2.
— Lappa Dcne. II. 669. no. 3.
— scaposa Edgeworth. VI. 282. no. 1.
— Simpsoniana Gardn. VI. 282. no. 3.
— sorocephaula Schrnk. II. 669. no. 1.
Hardenbergia Bth. I. 758. V. 530.
— Comptoniana Bth. * I. 758. no. 4. V. 530. †
— cordata Bth. I. 758. no. 3.
— digitata Lindl. I. 758. no. 7.
— *digitata* Lindl. V. 530. no. 1.
— Hügelii Bth. I. 758. no. 6.
— Lindleyi Meisn. V. 530. no. 1.
β. digitata.
α. trifoliolata.
— macrophylla Bth. I. 758. no. 5. V. 530. †
— monophylla Bth. * I. 758. no. 1.
— ovata Bth. * I. 758. no. 2.
Hardwickia Rxb. * I. 853.
Hariota DC. II. 345. II. 936. * V. 821.
— Saglionis Lem. III. 345. no. 2.
— *Saglionis* Lem. II. 936. no. 1.
— salicornioides DC. II. 345. no. 1.
β. ramosior Hort. Dyck.
Harmogia Schauer. II. 921. ° V. 734.
— Baueriana Schauer. II. 921. no. 3.
— Cunninghami Schauer. II. 921. no. 2.
— densifolia Schauer. * V. 735. no. 1.
— pinifolia Schauer. * V. 735. no. 3.
— propinqua Schauer. II. 921. no. 1.
— virgata Schauer. * V. 735. no. 2.
Haronga Thouars. * I. 391. II. 809.
— axillaris G. Don. II. 809. no. 1.
Harpachaena Bnge. * VI. 327.
Harpaecarpus Nutt. II. 631. VI. 183.
— madarioides Nutt. * II. 631. no. 1. VI. 183. no. 1.
Harpagophytum A. P. DC. VI. 520.
— Burchellii Dcne. VI. 520. no. 2.
— procumbens A. P. DC. VI. 520. no. 1.
Harpalium Cass. II. 616.
— Mexicanum Wlprs. II. 616. no. 1.
— *rigidum* Cass. II. 984. no. 11.
Harpalyce Moç. et Sess. I. 678. * I. 712.

Harpalyce Brasiliana Bth. I. 678. no. 2.
— formosa Moç. et Sess. I. 678. no. 1.
— *serpentaria* Don. II. 692. no. 1. β.
Harpaema Dcne. VI. 480.
— acuminatum Dcne.* VI. 480. no. 1.
Harpelema Jcq. I. 606. no. 1.
Harpephora Erdl. II. 622. VI. 170.
— Endlicheriana Wlprs.* II. 622. no. 1. VI. 170. no. 1.
Harpephyllum Caffrum Brnhrdi. V. 418. no. 1.
Harpocarpus Endl. II. 666.
Harpocarpus Endl. VI. 275. VI. 327.
— amplexifolius Endl.* II. 666. no. 1.
— *amplexifolius* Endl VI. 275. no. 1. VI. 327. no. 1.
Harrisonia R. Br. I. 525.
— *Browniana* Gaudich. I. 525. no. 1.
— Brownii Adr. Juss.* I. 525. no. 1.
Hartighsea Adr. Juss. I. 429. V. 374.
— Billardieri A. Juss.* I. 429. no. 2.
— excelsa Adr. Juss. I. 430. no. 7.
— Forsteri A. Juss. I. 430. no. 5.
— Fraseriana A. Juss. I. 429. no. 1.
— Lessertiana A. Juss. I. 430. no. 4.
— mollissima Adr. Juss. I. 430. no. 6.
— Patersoniana Endl. I. 430. no. 9.
— rufa A. Rich. I. 430. no. 8.
— spectabilis A. Juss. I. 430. no. 3.* V. 374. no. 1.
Hartigia Miquel.° V. 722.
— milleflora Miquel.* V. 723. no. 4.
— minutiflora Miquel* V. 723. no. 3.
— oblongifolia Miquel. V. 722. no. 2.
— spectabilis Miquel. V. 722. no. 1.
Hartmannia DC. II. 990.
Hartmannia DC. II. 631.
Hartmannia Spach. II. 84.
— *ciliata* DC. II. 990. no. 3.
— *corymbosa* DC. II. 990. no. 2.
— *epilobiifolia* Spach. II. 84. no. 52.
— *fasciculata* DC. II. 990. no. 1.
— *gauroides* Spach. II. 84. no. 46.
— *glomerata* Nutt. II. 990. no. 1.
— glomerata Nutt. II. 632. no. 2.
— *Kunthiana* Spach. II. 84. no. 49.
— *macrantha* Spach. II. 84. no. 50.
— *parviflora* Spach. II. 84. no. 48.
— pungens Hook. et Arn. II. 631. no. 1.
— *pungens* Hook. et Arn. II. 990. no. 6.
— *Tarquensis* Spach II. 84. no. 51.
— *virgata* Spach. II. 84. no. 47.
Hartogia Thnbrg. I. 536. V. 402.
— *hispida* L. I. 510. no. 2.
— ilicifolia Hochstett. V. 402. no. 1.
— multiflora Eckl. et Zeyh. I. 536. no. 1.
— riparia Eckl. et Zeyh. I. 536. no. 2.
Harveya Hook. III. 390.° III. 970. VI. 650.
— lactea Prsl.* VI. 650. no. 5.
— *parviflora* Hook. VI. 650. no. 1.
— pratensis Prst.* VI. 650. no. 2.
— purpurea Hook. III. 390. no. 1.
— speciosa Brnhrdi. VI. 650. no. 1.
— spectabilis Hook.* VI. 650. no. 4.
— Tulbaghensis Prst.* VI. 650. no. 3.
— *varia* Hook. VI. 650. no. 1.
Harveyastrum Prsl. VI. 650. no. 3.
Hasselquistia Linn.* II. 416. V. 894.
— *cordata* Linn. fil. V. 894. no. 1.
— lanata Boiss. V. 894. no. 1.
Hasseltia H. B. Kth. I. 352.
— floribunda H. B. Kth.* I. 352. no. 1.
Hastingia coccinea Sm. III. 894. no. 1.
Hauya Moç. et Sess.* II. 93.
Havetia H. B. Kth. I. 393. II. 810.
— flavida Bth. II. 810. no. 1.
— laurifolia H. B. Kth.* I. 393. no. 1.
— octandra Poepp. et Endl. I. 393. no. 2.
Haxtonia furfuracea All. Cunn. II. 577. no. 1.
Hebe Magellanica Juss. III. 346. no. 60.
Hebecladus Miers.° VI. 611.
— asper Miers. VI. 612. no. 5.
— biflorus Miers. VI. 611. no. 3.
— bicolor Miers. VI. 612. no. 4.
— intermedius Miers. VI. 612. no. 6.
— lanceolatus Miers. VI. 612. no. 7.
— Turneri Miers. VI. 612. no. 8.
— umbellatus Miers. VI. 611. no. 2.
— viridiflorus Miers. VI. 611. no. 1.
Hebeclinium DC. II. 552. VI. 108.
— macrocephalum Bth. II. 552. no. 1.
— Tepicanum Hook. et Arn. II. 552. no. 2.
— tetragonum Bth. VI. 108. no. 1.
Hebenstreitia Linn. IV. 144.
— *alba* Jcq. IV. 148. no. 2.
— *albiflora* Lnk. IV. 148. no. 2.
— aurea Andrws. IV. 146. no. 5.
— *capitata* Hort. Berol. IV. 150. no. 8.
— *capitata* Thnbrg. IV. 149. no. 7.
— *chamaedryfolia* Lnk. IV. 148. no. 3.
— *ciliata* Berg. IV. 148. no. 2. γ.
— *ciliata* Linn. IV. 148. no. 2.
— comosa Hochstett. IV. 147. no. 12.
— *cordata* Linn. IV. 143. no. 5.
— dentata Linn. IV. 144. no. 1. (cum varr. α. β. γ. ibid.)
— discoidea E. Mey. IV. 147. no. 11.
— *erinoides* Bergius. IV. 148. no. 2.
— *erinoides* Linn. IV. 148. no. 2. β.
— *erinoides* Thnbrg. IV. 148. no. 3. (c. diagn. ibid. in adnot.)
— fastigiata Jarosz.* IV. 147.

Hebenstreitia fruticosa Sims. IV. 146. no. 6.
— *fruticosa* Thnbrg. IV. 143. no. 4.
— *glabra* Sieb. IV. 161. no. 38.
— hamulosa E. Mey. IV. 146. no. 10.
— *hispida* Lam. IV. 148. no. 2. γ.
— *integrifolia* Linn. IV. 144. no. 1. γ.
— macra E. Mey. IV. 146. no. 7.
— parviflora E. Mey. IV. 146. no. 8.
— *pulchella* Salisb. IV. 144. no. 1. α.
— repens Jarosz.* IV. 147.
— robusta E. Mey. IV. 145. no. 3. (et varr. α. et β. ibid.)
— scabra Thnbrg. IV. 145. no. 2.
— *spicata* Thnbrg. IV. 149. no. 6.
— *tenera* Spr. IV. 143. no. 2.
— tenuifolia Schrad. IV. 145. no. 4.
— virgata E. Mey. IV. 146. no. 9.
Heberdenia Bnks.* VI. 451.
Hebradendron Grah. I. 396.
— *cambogioides* Grah. I. 395. no. 9.
— cambogioides Graham. I. 396. no. 1.
— ellipticum Graham. I. 396. no. 2.
Hecastophyllum Kth. I. 792. V. 541.
— Benthamianum Miquel.* V. 541. no. 1.
— Brownii Pers.* I. 792. no. 1.
— foliosum Bth. I. 792. no. 7.
— glaucum Desvx. I. 792. no. 2.
— hygrophilum Mart. I. 792. no. 4.
— Monetaria DC.* I. 792. no. 3.
— nitidum Mart. I. 792. no. 5.
— violaceum Bth.* I. 792. no. 6.
Hecatonia DC. I. 34. no. 10. I. 37. no. 37. 42. 43. 44. I. 39. I. 43. I. 42. I. 41. II. 740. no. 22.
Hectorea DC. *II. 544.
Hecubaea DC. *II. 629.
Hedaroma latifolium Lindl. II. 153. no. 4.
— *pinifolium* Lindl. II. 153. no. 6.
— *thymoides* Lindl. II. 153. no. 5.
Hedeoma Bth. III. 717.
Hedeoma Pers. III. 716. °III. 983.
— *Arkansana* Nutt. III. 718. no. 2.
— *bracteolata* Nutt. III. 718. no. 3.
— Drummondii Bth. III. 717. no. 7.
— Gilliesii Bth. III. 717. no. 4.
— *glabra* Nutt. III. 718. no. 1
— *hirta* Nutt. III. 718. no. 8.
— hispida Pursh. III. 717. no. 8.
— multiflora Bth. III. 717. no. 6.
— Nepalensis Bth. III. 716. no. 1.
— piperita Bth. III. 716. no. 3.
— polygalaefolia Bth. III. 717. no. 5.
— pulegioides Pers. III. 716. no. 2. β. Mexicana Bth.
— *thymoides* Pers. III. 700. no. 13. β.
Hedera Linn. II. 431. V. 926.
— aesculifolia Wall. II. 432. no. 10.
— alaris Schlchtd. II. 431. no. 4.
— echinops G. Don. II. 432. no. 14.
— floribunda Wall. II. 432. no. 12.
— glauca Wall. II. 432. no. 15.
— heterophylla Wall. II. 432. no. 13.
— Jackiana G. Don. II. 433. no. 16.
— Japonica Jungh. II. 431. no. 1.
— latifolia Wght. et Arn. II. 431. no. 5.
— Lechenaultii Wght. et Arn. II. 433. no. 17.
— ovata Wall. II. 431. no. 3.
— polyacantha Wall. II. 431. no. 2. II. 432. no. 7.
— sessiliflora Bth. V. 926. no. 2.
— squarrosa Jungh. II. 432. no. 8.
— subcordata Wall. II. 432. no. 11.
— *terebinthacea* Vahl. II. 433. no. 2.
— *terebinthacea* Wall. II. 433. no. 3.
— trifoliata Wght. et Arn. II. 432. no. 6.
— triloba Gardn. V. 926. no. 1.
— undulata Wall. II. 432. no. 9.
— *verticillata* Zppl. II. 431. no. 1.
Hederodonta Nutt. II. 615.
Hederula saxatilis magno flore C. Baub. III. 222. no. 1.
Hediunda jasminiano flore Feuill. III. 118. no. 35.
Hedwigia Swrtz. I. 559.
— *simplicifolia* Sieb. I. 433. no. 16.
— Tussacii Wlprs. I. 559. no. 1.
Hedycarpus W. Jack. V. 367.
— Malayanus W. Jack. V. 367. no. 1.
Hedyoteae DC. II. 491. VI. 53.
Hedyotideae Cham. et Schlchtd. II. 491. II. 943. VI. 53.
Hedyotis DC. (ex p.) II. 497. II. 491.
Hedyotis Lam. II. 491. VI. 54.
— *affinis* Roem. et Schult. II. 499. no. 70.
— affinis Wght. et Arn. II. 495. no. 28.
— alata Koen. II. 498. no. 59.
— alsinaefolia R. Br. II. 599. no. 65.
— Amatymbica Eckl. et Zeyh. II. 501. no. 81.
— approximata R. Br. II. 498. no. 53.
— argentea Wall. II. 502. no. 90.
— articularis R. Br. II. 491. no. 3.
— articularis Wall. II. 502. no. 92.
— aspera Heyne. *II. 501. no. 80.
— asperuloides Bth. VI. 54. no. 3.
— *attenuata* Willd. II. 599. no. 70.
— auricularia Linn. *II. 497. no. 45.
— biflora R. Br. *II. 498. no. 60.
— *biflora* Lam. II. 499. no. 66.
— *brachiata* Wall. II. 499. no. 70.
— brachiata Wght. II. 499. no. 67.
— brachypoda Wall. II. 500. no. 72.
— Burmanniana R. Br. *II. 499. no. 66.

Hedyotis Burmanniana Wall. II. 499. no. 64.
— caespitosa Schnitzlein. VI. 56. no. 14.
— Caffra Eckl. et Zeyh. II. 500. no. 78.
— *campanuliflora* Hook. II. 503. no. 1.
— capitata Wlprs. VI. 56. no. 13.
— capitellata R. Br. II. 494. no. 21.
— *capitellata* Wall. II. 492. no. 5.
— centranthoides Hook. et Arn. II. 501. no. 85.
— cephalophora Wall. *II. 493. no. 11.
— cephalotes Hochstett. VI. 55. no. 7.
— chlorophylla Hochstett. VI. 55. no. 5.
— ciliolata Torr. *II. 496. no. 37.
— coccinea Royle. II. 501. no. 82.
— coerulea Hook. II. 495. no. 32.
β. minor.
— congesta R. Br. II. 497. no. 49.
— conostyla Gaudich. *II. 501. no. 87.
— *coriacea* Sm. II. 501. no. 86.
— *corymbosa* Madr. Herb. II. 492. no. 6. *a.*
— *corymbosa* Wall. II. 492. no. 6. β.
— costata R. Br. II. 497. no. 48.
— decumbens Hochstett. VI. 56. no. 12.
— deltoidea Wght. et Arn. II. 494. no. 27.
— Deppeana Cham. et Schlchtd. *II. 501. no. 79.
— dichotoma Koen. *II. 499. no. 70.
— *diffusa* Spr. II. 499. no. 70.
— *diffusa* Willd. II. 499. no. 66.
— *elongata* R. Br. II. 501. no. 80.
— Frankii Prsl. VI. 54. no. 1.
— fruticosa Linn. *II. 492. no. 5. (c. var. β. ibid.)
— *fruticosa* Raf. II. 496. no. 39.
— *fruticosa* Retz. II. 492. no. 5.
— gentianoides Endl. *II. 495. no. 30.
— glabra R. Br. *II. 497. no. 51.
— glomerata Hook. et Arn. II. 501. no. 84.
— *graminifolia* Linn. II. 500. no. 71.
— Haleï Torr. et Gr. II. 501. no. 88.
— *herbacea* Willd. II. 499. no. 69.
— Heynei R. Br. *II. 499. no. 69.
— *hirsuta* Lam. II. 497. no. 45.
— *hispida* Rth. II. 498. no. 58.
— *hispida* Wall. II. 498. no. 54.
— *Indica* Roem. et Schult. II. 498. no. 58.
— intermedia Wght. et Arn. II. 499. no. 64.
— lacustris Poepp. et Endl. II. 497. no. 43.
— *lanceolata* Poir. II. 496. no. 36.
— Lapeyrousii DC. *II. 498. no. 56.
— latifolia Wlprs. VI. 55. no. 6.
— Lawsoniae Wght. et Arn. II. 491. no. 1.
— Lechenaultiana Wght. et Arn. II. 495. no. 29.
— *Lechenaultii a.* DC. II. 491. no. 2.
— Lessertiana Arn. II. 492. no. 4.
Hedyotis lineata Wall. II. 497. no. 45.
— *linifolia* Willd. II. 499. no. 72.
— longiflora Bth. II. 497. no. 40.
— longifolia Hook. II. 496. no. 38.
β. tenuifolia.
— macrophylla Wall. II. 492. no. 9. (II. 502. no. 91.)
— macrostemon Hook. et Arn. II. 493. no. 18.
— *maritima* Linn. III. 291. no. 1.
— maritima Wall. II. 500. no. 71.
— *minima* Heyne. II. 500. no. 76.
— minima Torr. et Gr. II. 495. no. 31.
— mollis Wall. II. 494. no. 23.
— monosperma Wght. et Arn. II. 494. no. 26.
— mucronata Bth. VI. 54. no. 4.
— muscosa St. Hil. II. 497. no. 41.
— Mysorensis R. Br. II. 500. no. 77.
— Natalensis Hochstett. VI. 56. no. 11.
— Neesiana Arn. II. 493. no. 17.
— nitida Wght. et Arn. II. 497. no. 52.
— *nodiflora* Wall. II. 493. no. 9.
— nodiflora Wall. II. 501. no. 89.
— nodulosa Arn. II. 493. no. 14.
— nudicaulis Wght. et Arn. II. 499. no. 68.
— nummularia Arn. II. 492. no. 8.
— nummulariformis Arn. II. 493. no. 16.
— *orbiculata* Wall. II. 499. no. 62.
— oxyphylla R. Br. II. 500. no. 75.
— *paniculata* Rottl. II. 501. no. 80.
— parvifolia Prsl. VI. 54. no. 2.
— *pentamera* Hochstett. VI. 54. no. 1.
— *pentandra* Schum. et Thonn. VI. 58. no. 4.
— perpusilla Hook. et Arn. II. 498. no. 57.
— pilosa Poepp. et Endl. II. 497. no. 44.
— pinifolia Wall. II. 498. no. 55.
— plantaginifolia Arn. II. 493. no. 15.
— polycarpa Wall. II. 494. no. 22.
— pruinosa Wght et Arn. II. 492. no. 6. (c. varr. *a.* et β. ibid.)
— puberula R. Br. II. 500. no. 73.
— pumila Linn. *II. 499. no. 63.
— purpurea Torr. et Gr. II. 496. no. 36. (c. var. β. ibid.)
— racemosa Lam. *II. 498. no. 61.
— recurva Bth. II. 494. no. 19.
— repens G. Don. II. 502. no. 92.
— Rheedei Wght. et Arn II. 494. no. 24.
— Richardiana Arn. II. 492. no. 7.
— rotundifolia Hamilt. II. 500. no. 74.
— *rotundifolia* Spr. II. 499. no. 62.
— rotundifolia Torr. et Gr. II. 496. no. 34.
— *rupestris* Raf. II. 496. no. 39.
— *scapigera* R. Br. II. 499. no. 68. II. 500. no. 74.
— scandens Rxb. *II. 494. no. 20.
— Schimperi Prsl. VI. 55. no. 10.

Hedyotis Senegalensis Cham. et Schlchtd. *II. 501. no. 83.
— serpyllacea Schlchtd. II. 496. no. 35.
— *serpyllifolia* Poir. II. 499. no. 62.
— serpyllifolia Torr. et Gr. II. 496. no. 33.
— Smithii Hook. et Arn. II. 501. no. 86.
— stenophylla Torr. et Gr. II. 496. no. 83.
— stylosa R. Br. II. 491. no. 2.
— subcarnosa Wall. *II. 497. no. 50.
— tabularis R. Br. II. 500. no. 76.
— tenella Hochstett. VI. 55. no. 8.
— thesiifolia St. Hil. II. 497. no. 42.
— thymifolia Prsl. VI. 55. no. 9.
— trinervia Roem. et Schult. II. 499. no. 62.
— ulmifolia Wall. *II. 497. no. 46.
— umbellata Lam. *II. 498. no. 58.
— uncinella Hook. et Arn. II. 493. no. 10.
— verticillaris Wall. II. 493. no. 12.
— vestita R. Br. II. 497. no. 47.
— Walkerii Arn. II. 493. no. 13.
— Wallichii Wlprs. II. 498. no. 54.
— Wightiana Wall. II. 494. no. 25. (c. varr. α. et β. ibid.)
Hedypnois Tournef. *II. 684. *VI. 327.
Hedysareae DC. I. 724. II. 887. V. 519.
Hedysaroides Jaub. et Spach. II. 898.
Hedysarum Jeaume. I. 744. II. 892. V. 527.
— *Aikini* Eat. I. 740. no. 30.
— *Altaicum* Fisch. I. 745. no. 7. δ.
— *arboreum* D. Don. II. 890. no. 1.
— *argenteum* Claus. II. 893. no. 7.
— argyrophyllum Ldb. II. 893. no. 7.
— Aucheri Boiss. II. 892. no. 3.
— *aureum* Hb. Madr. I. 786. no. 3.
— *auriculatum* Rxb. I. 738. no. 18.
— *bijugum* Klein. I. 726. no. 1.
— brachypterum Bnge. I. 745. no. 6.
— *bracteatum* Rxb. I. 791. no. 6.
— *bupleurifolium* Spr. I. 749. no. 6.
— callichroum Boiss. II. 893. no. 6.
— canescens Nutt. I. 746. no. 12.
— *capitatum* Burm. I. 739. no. 21.
— capitatum Dsf. I. 746. †
— Cappadocicum Boiss. II. 892. no. 1.
— *cephalotes* Rxb. I. 737. no. 13. II. 891. †
— *ciliare* var. *oblongifolium* Ell. I. 740. no. 35. β.
— *ciliatum* Rxb. I. 735. no. 1.
— *collinum* Rxb. I. 738. no. 15.
— *confertum* Dsf. I. 744. no. 1.
— conjunctum Weinm. I. 746. no. 15.
— criniferum Boiss. II. 892. no. 4.
— *cuspidatum* Mühlnbrg. I. 740. no. 32.
— dasycarpum Turczan. I. 745. no. 5. *II. 894. no. 14.
β. depauperatum Turcz. I. 745. no. 5.
Hedysarum deltoideum Schum. et Thonn. I. 737. no. 6.
— *diffusum* Willd. II. 891. no. 8.
— *echinatum* Gilib. II. 894. no. 1.
— echinatum Guss. I. 744. no. 2.
— *echinatum* Guss. I. 747. no. 3.
— echinocarpum Kar. et Kir. I. 745. no. 4.
— *erinaceum* Poir. I. 667. no. 83.
— esculentum Ldb. II. 894. no. 15.
— flaccidum Weinm. I. 746. no. 14.
— *floribundum* D. Don. II. 891. no. 11.
— Fontanesii Boiss. I. 744. no. 1.
β. Fontanesii DC.
— *fruticosum* Rottl. V. 521. no. 1. adn.
— *fruticulosum* Schum. et Thonn. I. 737. no. 8.
— *gemellum* Willd. I. 726. no. 7.
— glaucescens Ldb. II. 894. no. 13.
— *glutinosum* Madr. Herb. I. 780. no. 15.
— *Gmelini* Ldb. I. 745. no. 7. δ.
— *granulatum* Schum. et Thonn. I. 737. no. 7.
— *gyrans* Linn. II. 891. no. 1.
— *hamosum* Rxb. I. 735. no. 3.
— *humifusum* Mühlbg. I. 741. no. 38.
— incanum Ldb. II. 893. no. 10.
— *lagenarium* Rxb. I. 733. no. 7.
— *lagopodioides* Forst. I. 744. no. 72.
— *lanceolatum* Schum. et Thonn. I. 737. no. 5.
— *lasiocarpum* Ldb. I. 745. no. 8.
— *latifolium* Madr. Herb. I. 738. no. 19.
— *latifolium* Rxb. I. 738. no. 14. α.
— *leiocarpum* Spr. I. 743. no. 63.
— *lineare* Rottl. II. 891. no. 9.
— *longifolium* Rottl. I. 749. no. 4.
— Lydium Boiss. II. 893. no. 5.
— Mackenzii Richards. I. 746. no. 11. (c. var. β. ibid.) (III. Emend. p. 4.)
— microphyllum Turczan. II. 893. no. 8.
—? *molle* Vahl. V. 527. no. 10.
— mucronatum Blume. I. 746. no. 13.
— *Nali-Tali* Rxb. I. 733. no. 8. II. 889. no. 4.
— *Nalla-Kashina* Rxb. I. 725. no. 1.
— neglectum Ldb. *I. 745. no. 8.
β. albiflorum.
— *nummulariaefolium* L. I. 667. no. 83.
— *Onobrychis* Linn. II. 894. no. 1.
— *Onobrychis* var. *Iberica* M. Bieb. II. 894. no. 1.
— *orbiculatum* Rottl. I. 747. no. 1.
— *ovalifolium* Schum. et Thonn. I. 737. no. 4.
— *oxalidifolium* Bnks. I. 747. no. 1.
— Palavicum Hochstett. V. 527. no. 1.

Hedysarum patens Rxb. II. 891. †
— *pictum* Schum. et Thonn. I. 737. no. 9.
— *pilosum* Rxb. I. 736. no. 4.
— pogonocarpum Boiss. II. 892. no. 2.
— polymorphum Ldb. I. 745. no. 7.
γ. ascendens.
ε. elatum.
β. prostratum.
α. pumilum.
δ. suberectum.
ζ. subglabrum.
— *procumbens* Rxb. I. 736. no. 4.
— *prostratum* L. I. 667. no. 88.
— *prostratum* Pall. I. 745. no. 7. γ.
— *prostratum* Rxb. I. 783. no. 1.
— *prostratum* Siev. I. 745. no. 7.
— punctatum Rottl. I. 786. no. 3.
— *purpureum* Rxb. I. 739. no. 21.
— *quinquangulatum* Rxb. I. 738. no. 18.
— *recurvatum* Rxb. I. 738. no. 19. II. 891. †
— *reptans* Rxb. I. 740. no. 29. α.
— *retroflexum* L. I. 736. no. 4.
— *retusum* D. Don. II. 891. no. 10.
— *roseum* Steph. I. 745. no. 7.
— *Rottleri* Spr. II. 891. no. 9.
— *rufescens* Rottl. I. 789. no. 38.
— *sagittatum* Poir. I. 582. no. 2.
— *scaberrimum* Ell. I. 740. no. 30.
— *scariosum* Spr. I. 749. no. 5. β.
— scoparium Fisch. et Mey. I. 746. no. 10.
— *sennoides* Willd. V. 521. no. 1. adn.
— *sericeum* Vahl. II. 899. no. 6.
— *sessilifolium β. angustifolium* Torr. I. 740. no. 37.
— setigerum Turcz. I. 745. no. 3.
— Sipyleum Boiss. II. 893. no. 11.
— Soongaricum Bongrd. II. 893. no. 9.
— splendens Fisch. I. 746. †
— *squarrosum* Thbg. I. 784. no. 6.
— *styracifolium* L. I. 736. no. 4.
— *styracifolium* Rxb. I. 738. no. 15. I. 750. no. 7.
— *subspinosum* Fisch. I. 746. no. 1. II. 894. no. 1.
— Syriacum Boiss. II. 893. no. 12.
— *tiliaefolium* D. Don. II. 891. no. 12.
— *trifoliatum* Dill. I. 750 no. 31.
— *tuberculatum* Lab. I. 744. no. 71.
— *umbellatum* Rxb. I. 737. no. 12.
— *varians* Lab. I. 744 no. 70.
— *venosum* Madr. Herb. I. 790. no. 40.
— vicioides Turcz. I. 746. no. 9.
— *violaceum* L. I. 748. no. 12. β.
— *viridiflorum* L. I. 740. no. 33.
— *viridiflorum* Willd. I. 740. no. 30.
viscidum L. I. 783. no. 1.
Hedysarum volitans Rxb. I. 735. no. 1.
Heeria Meisn. I. 557. *V. 419.
Heeria Meisn. V. 414.
Heeria Schlchtd. II. 132. V. 703.
— argentea Meisn. *I. 557. no. 1.
— *argentea* Meisn. V. 414. no. 1.
— cupheoides Bth. V. 703. no. 1.
— elegans Schlchtd. *II. 142. no. 1. V. 703. no. 2.
Hegemone Bnge. II. 741.
— lilacina Bnge. *II. 741. no. 1.
Hegetschweileria Heer. II. 900. °V. 528.
— pulchella Heer. *II. 900. no. 1. *V. 528. no. 1.
Heimia Lk. et Otto. II. 103. II. 916.
Heimia Lk. et Otto. V. 674.
— grandiflora Hook. II. 916. no. 1.
— *myrtifolia* Cham. et Schlchtd. II. 103. no. 1. II. 916. no. 2. γ.
— *salicifolia* Lk. et Otto. II. 103. no. 2.
— *salicifolia var. grandiflora* Lindl. II. 916. no. 1.
— salicifolia Lnk. et Otto. II. 916. no. 2. (c. varr. α. β. γ. ibid.)
Heinsia DC. *II. 517. VI. 76.
— jasminiflora DC. *VI. 76. no. 1.
Heisteria L. *I. 377. II. 803.
— cyanocarpa Poepp. et Endl. II. 803. no. 2.
— tubicina Poepp. et Endl. II. 803. no. 1.
Heladena Adr. Juss. °V. 197.
— albiflora Adr. Juss. V. 198. no. 3.
— australis Adr. Juss. V. 197. no. 1.
— biglandulosa Adr. Juss. V. 198. no. 4.
— bunchosioides Adr. Juss. V. 197. no. 2.
Heldreichia Boiss. I. 158.
— bupleurifolia Boiss. I. 158. no. 3.
— Kotschyi Boiss. 158. no. 2.
— longifolia Boiss. I. 158. no. 4.
— rotundifolia Boiss. I. 158. no. 1.
Heleastrum DC. *II. 576. (*II. 952. no. 8.)
— *album* DC. II. 573. no. 119.
— *paludosum* DC. II. 560. no. 10.
Heleiotis scandens Hasskrl. V. 520. no. 1.
Helenia Linn. II. 528.
Helenieae Cass. II. 624. II. 988. VI. 175.
Helenium Linn. II. 628. II. 990. VI. 180.
— atropurpureum Kth. et Bouché. VI. 180. no. 1.
— autumnale Linn. *II. 990. no. 1.
β. grandiflorum.
δ. canaliculatum.
γ. tubiflorum.
— *canaliculatum* Lam. II. 990. no. 1. δ.
— grandiflorum Nutt. II. 628. no. 1.
— *grandiflorum* Nutt. II. 990. no. 1. β.
— micranthum Nutt. II. 629. no. 5.

Helenium micranthum Nutt. II. 988. no. 6.
— montanum Nutt. II. 628. no. 2.
— *montanum* Nutt. II. 990. no. 1. *β.*
— nudiflorum Nutt. II. 628. no. 4.
— *nudiflorum* Nutt. II. 988. no. 6.
— parviflorum Nutt. II. 628. no. 3.
— *quadridentatum* Hook. II. 988. no. 6.
— tenuifolium Nutt. II. 990. no. 2.
— *tubiflorum* DC. II. 990. no. 1. *γ.*
Helia Griseb. VI. 503. no. 1.
Heliamphora Bth. I. 109.
— nutans *I. 109. no. 1.
Heliantheae Lssng. II. 608. II. 977. VI. 157.
Helianthella Torr. et Gr. II. 986. ° VI. 166.
— Douglasii Torr. et Gr. II. 986. no. 3. VI. 167. no. 3.
— grandiflora Torr. et Gr. II. 986. no. 1. VI. 166. no. 1.
— lanceolata Torr. et Gr. *II. 986. no. 4. VI. 167. no. 4.
— tenuifolia Torr. et Gr. II. 986. no. 2. VI. 166. no. 2.
— uniflora Torr. et Gr. *II. 986. no. 5. VI. 167. no. 5.
Helianthemoides Choisy. II. 808. no. 17.
Helianthemum T. I. 208. V. 58 b.
Helianthemum DC. I. 206. (ex p.)
— Andersonii Sweet. I. 209. † (c. diagn.)
— Algarvense DC. I. 209. †
— alpestre DC. I. 209. †
— alpestre Rchb. I. 212. †
— *alpestre* Spr. I. 211. †
— Apenninum DC. I. 209. †
— Apenninum Pers. I. 212. †
— Arabicum Pers. I. 209. †
— arcuatum Prsl. I. 208. no. 2.
— barbatum Pers. I. 209. †
— bicolor Prsl. I. 208. no. 1.
— Brasiliense Pers. I. 209. †
— Breweri Planchon. V. 58 b. no. 2.
— Broussonetii Don. I. 209. †
— Canadense Michx. *I. 209. no. 14. I. 210. †
— Canariense Pers. I. 210. †
— candidum Sweet. I. 210. † (cum diagn. in adnot.)
— canescens Sweet. I. 210. † (cum diagn. in adnot.)
— canum Dun. I. 210. † 212. †
— caput felis Boiss. I. 208. no. 5.
— Carolinianum Michx. I. 210. †
— cheiranthoides Pers. I. 210. †
— confertum Dun. I. 210. †
— confusum DC. I. 210. † 212. †
— corymbosum Michx. *I. 209. no. 16.
— *corymbosum* Prsh. I. 209. no. 14.
— croceum DC. I. 210. †
Helianthemum croceum Pers. I. 212. †
— cupreum Sweet. I. 210. † (cum diagn. in adnot.)
— diversifolium Sweet. I. 210. † (cum diagn. in adnot.)
β. multiplex Sweet. I. 210. †
— eriocaulon Dun. I. 210. †
— ellipticum Pers. I. 210. †
— ericoides Dun. I. 212. †
— eriosepalon Sweet. I. 210. † (cum diagn. in adnot.)
— formosum Dun. I. 210. †
— Fumana Mill. I. 210. † 212. †
— glaucum Pers. *I. 208. no. 7. I. 210. †
γ. albiflorum I. 208. no. 7.
α. croceum I. 208. no. 7.
β. suffruticosum Boiss. I. 208. no. 7.
— glomeratum Lag. I. 210. †
— glutinosum Pers. I. 210. † 212. †
— grandiflorum All. I. 212. †
— grandiflorum DC. I. 210. †
— guttatum Mill. I. 212. †
— halimifolium DC. I. 210. †
— hirsutissimum Prsl. I. 209. no. 12.
— hirtum Pers. I. 210. † 212. †
— hyssopifolium Ten. I. 210. † (cum varr. *α.* crocatum. *β.* cupreum. *γ.* multiplex. Sweet.)
— Italicum Pers. I. 212. †
— laeve Pers. I. 212. †
— laevipes Pers. I. 210. †
— laevipes W. I. 212. †
— lanceolatum Sweet. I. 210. † (cum diagn. in adnot.)
— *lavandulaefolium* Sieb. I. 209. no. 10.
— ledifolium Pers. I. 210. †
— ledifolium W. I. 212. †
— leptophyllum Dun. I. 210. †
— lignosum Sweet. I. 210. † (cum diagn. in adnot.)
— lineare Pers. I. 211. †
— lunulatum All. I. 212. †
— macranthum Sweet. I. 211. † (cum diagn. in adnot.)
— macranthum Sweet. I. 211. †
β. multiplex Sweet. l. c. †
— marifolium DC. I. 212. †
— microphyllum Sweet. I. 211. † (cum diagn. in adnot.)
— Milleri Sweet. I. 211. † (cum diagn. in adnot.)
— mutabile Pers. I. 211. † et 212. †
β. roseum Sweet. I. 211 †
— Nebrodense Heldreich. V. 58 b. no. 1.
— nummularium DC. I. 211. †
— obcursum Pers. I. 212. †

Helianthemum ocymoides Pers. I. 211. †
— Oelandicum DC. I. 211. †
— pannosum Boiss. I. 208. no. 4.
— papillosum Boiss. I. 208. no. 8.
— piliferum Boiss. I. 208. no. 6.
— pilosum Pers. I. 211. † 212. †
— polifolium Pers. I. 211. † 212. †
— polifolium Torr. et Gr. I. 209. no. 15.
— polygalaefolium Sweet. I. 211. † (cum diagn. in adnot.)
— procumbens Dun. I. 211. †
— pulchellum Sweet. I. 211. † (cum diagn. in adnot.)
— pulverulentum DC. I. 212. †
— pulverulentum Pers. I. 211. †
— punctatum Pers. I. 211. †
— racemosum Dun. I. 211. †
— *ramuliflorum* Michx. I. 209. no. 14.
— retrofractum Pers. I. 212. †
— rhodanthum Dun. I. 211. †
— roseum DC. I. 211. † 212. †
β. multiplex Sweet. I. 211. †
— rosmarinifolium Prsl. 208. no. 10.
— *rosmarinifolium* Prsh. I. 209. no. 14.
— *rugosum β.* DC. I. 211. †
— rugosum Dun. I. 211. †
— salicifolium Pers. I. 211. †. 212. †
— scabrosum Pers. I. 211. †
— scoparium Nutt. I. 209. no. 16. (b) (III. Emend. p. 1.)
— semiglabrum Badar. I. 208. no. 9. 212. †
— serpyllifolium Mill. I. 211. † 212. †
— Soongaricum Schrenk. I. 209. no. 11.
— spartioides Rchb. I. 209. no. 13.
— stramineum Sweet. I. 211. † (c. diagn. in adnot.)
β. multiplex Sweet I. 211. †
— sulphureum Willd. I. 211. †
— Surrejanum Mill. I. 211. †
— Tauricum Fisch. I. 211. † (c. diagn. in adnot.)
— thymifolium Pers. I. 211. † 212. †
— Tuberaria Mill. I. 212. †
— Tuberaria Pers. I. 211. †
— umbellatum Pers. I. 211. †
— variegatum Sweet. I. 212. † (c. diagn. in adnot.)
— venustum Sweet. I. 212. † (c. diagn. in adnot.)
— versicolor Sweet. I. 211. † (c. diagn. in adnot.)
— vineale Pers. I. 212. †
— virgatum Pers. I. 212. †
— viride Ten. I. 212. †
— viscidulum Boiss. I. 208. no. 3.
— Vivianii Poll. I. 212. †
Helianthemum vulgare Gaertn. (c. varr. *α.* et *β.* I. 212. †
Helianthus Linn. II. 617. *II. 983. VI. 165.
— *altissimus* DC. II. 985. no. 23.
— angustifolius Linn. *II. 983. no. 6.
— *apetalus* Leconte. II. 611. no. 1. II. 983. no. 8.
— argophyllus Torr. et Gr. II. 983. no. 1.
— *aristatus* Ell. II. 615. no. 1.
— *atrorubens* Bot. Reg. II. 984. no. 11.
— atrorubens Linn. *II. 983. no. 10.
— *atrorubens* Michx. II. 983. no. 11.
— Californicus Dougl. *II. 984. no. 17. *VI. 165. no. 1.
— *Californicus* Nutt. II. 984. no. 16.
— *canescens* Michx. II. 984. no. 15.
— cinereus Torr. et Gr. II. 984. no. 14.
— colossus Kze. II. 617. no. 2. *VI. 165. no. 5.
— *corymbosus* Poepp. VI. 167. no. 1.
— crassifolius Nutt. II. 617. no. 6.
— *crassifolius* Nutt. II. 984. no. 11.
— cucumerifolius Torr. et Gr. II. 983. no. 4.
— debilis Nutt. II. 617. no. 8. *II. 983. no. 5. (c. var. *β.*)
— *decapetalus* Darl. II. 985. no. 23.
— decapetalus Linn. *II. 985. no. 24.
β. frondosus.
— *diffusus* Sims. II. 984. no. 11.
— divaricatus Linn. *II. 985. no. 27.
— *divaricatus* Michx. II. 985. no. 28.
— *divaricatus β. ferrugineus* Ell. II. 985. no. 28. *β.*
— *diversifolius* Ell. II. 985. no. 26. *β.*
— doronicoides Lam. *II. 985. no. 22. (c. varr. *β.* et *γ.* ibid.)
— Douglasii Torr. et Gr. II. 986. no. 32.
— erythrocarpus Bartl. II. 617. no. 1. *VI. 165. no. 4.
— *erythrocarpus* Bartl. II. 983. no. 2.
— *frondosus* Linn. II. 985. no. 24.
— *giganteus* Hook. II. 984. no. 20.
— giganteus Linn. *II. 984. no. 19.
β. ambiguus.
— grosseserratus Martens. II. 618. no. 11. *II. 984. no. 20. (c. varr. *β.* et *γ.*)
— heteropappus Gill. II. 615. no. 2.
— heterophyllus Nutt. II. 983. no. 9. (c. var. *β.* ibid.)
— hirsutus Raf. *II. 985. no. 26.
β. diversifolius } Torr. et Gr.
δ. stenophyllus } Torr. et Gr.
γ. trachyphyllus } Torr. et Gr.
— hispidulus Ell. VI. 168. no. 8.
— *Hookerianus* DC. II. 616. no. 7. II. 977 no. 1.

Helianthus Hookeri Don. II. 985. no. 22.
— integrifolius Nutt. II. 617 no. 3.
β. gracilis.
— *integrifolius* Nutt. II. 983. no. 3.
— laetiflorus Pers. *II. 984. no. 12.
— laevigatus Torr. et Gr. II. 985. no. 30.
— *laevis* Walt. II. 985. no. 23.
— *lanceolatus* Meyen. VI. 165. no. 1.
— lenticularis Dougl. *II. 983 no. 2. (c. var. β. ibid.)
— longeradiatus Bertol. II. 618. no. 12.
— *longifolius* Hook. II. 977. no. 1. β.
— *longifolius* Prsh. II. 616. no. 8.
— longifolius Prsh. *II. 986. no. 31.
— *macrophyllus* Willd. II. 985. no. 23.
— Maximiliani Schrad. *II. 984. no. 18.
— microcephalus Torr. et Gr. II. 985. no. 28.
— *Missouricus* Spr. II. 984. no. 11.
— Missouriensis Schweinitz. II. 617. no. 9.
— *Missouriensis* Schweinitz. II. 984. no. 11.
— mollis Lam. *II. 984. no. 15.
— *mollis* Willd. II. 985. no. 23.
— Nuttallii Torr. et Gr. II. 984. no. 16.
— occidentalis Riddell. II. 984. no. 13.
β. plantagineus.
— orgyalis DC. *II. 983. no. 7.
— *parviflorus* Bernhardi. II. 985. no. 28.
— *patens* Lehm. II. 983. no. 3.
— pauciflorus Nutt. VI. 166. no. 6.
— Peruvianus Kltzsch. II. 617. no. 10.
— petiolaris Nutt. *II. 983. no. 3.
— *pubescens* Willd. II. 984. no. 15.
— pumilus Nutt. II. 617. no. 5. VI. 166. no. 7.
β. Nicolettii Torr. et Gr. VI. 166. no. 7.
— Radula Torr. et Gr. *II. 983. no. 8.
— *revolutus* Meyen. VI. 167. no. 1.
— rigidus Dsf. *II. 983. no. 11.
β. diffusus Sims. II. 984. no. 11.
— rugosus Meyen. VI. 165. no. 2.
— scaberrimus Bth. VI. 265. no. 2.
— *scaberrimus* Ell. II. 983. no. 11.
— Schweinitzii Torr. et Gr. II. 985. no. 29.
— silphioides Hook. et Arn. II. 617. no. 4.
— *silphioides* Nutt. II. 983. no. 10.
— *sparsifolius* Ell. II. 983. no. 10.
— squarrosus Nutt. II. 617. no. 7.
— *squarrosus* Nutt. II. 984. no. 21. β.
— strumosus Linn. *II. 985. no. 23.
γ. leptophyllus } Torr. et Gr.
β. mollis }
— *tomentosus* Ell. II. 617. no. 7. II. 984. no. 21.
— tomentosus Michx. *II. 984. no. 21.
— tracheliifolius Willd. *II. 985. no. 25.
— *tracheliifolius β. foliis lanceolatis* Hook. II. 985. no. 23.
Helianthus tricuspis Ell. II. 984. no. 12. β.
— *uniflorus* Nutt. II. 616. no. 5. II. 986. no. 5. VI. 167. no. 5.
Helichroa Linnaeana elatior amoena furcata Rafin. VI. 159. no. 1.
Helichryseae Lssng. II. 644. II. 992. VI. 231.
Helichrysum DC. II. 646. II. 992. VI. 239.
— Anatolicum Boiss. VI. 240. no. 6.
— *anomalum* Lssng. VI. 239. no. 1.
— aureonitens C. H. Schultz. VI. 241. no. 17.
— *brevicilium* DC. VI. 238. no. 8.
— *callichrysum* DC. VI. 241. no. 13.
— callunoides C. H. Schultz. VI. 239. no. 1.
— capitellatum Lssng. *VI. 242. no. 20.
— *Cassinianum* Gaudich. VI. 244. no. 2.
— Chilense Hook et Arn. II. 646. no. 1.
— *ciliatum* DC. VI. 238. no. 7.
— citrispinum Delile. VI. 242. no. 21.
— *commutatum* C. H. Schultz. VI. 239. no. 1.
— comosum C. H. Schultz. VI. 239. no. 2.
— compactum Boiss. VI. 240. no. 7.
— *decumbens* Portenschl. VI. 233. no. 1. β.
— *diversifolium* C. H. Schultz. VI. 241. no. 15.
— felinum Lesss. *VI. 239. no. 3.
γ. angustifolium.
β. latifolium.
— *flavispinum* DC. VI. 237. no. 3.
— *galactosphaerum* C. H. Schultz. VI. 242. no. 19.
— glandulosum Ldb. VI. 241. no. 11.
— glutinosum Al. Braun. II. 992. no. 1.
— gossypinum B. Webb. VI. 239. no. 4.
— Gunnianum Hook. II. 646. no. 3.
— *Humboldtianum* Gaudich. VI. 244. no. 3.
— Kotschyi Boiss. VI. 240. no. 8.
— Kraussii C. H. Schultz. VI. 241. no. 16.
— *lamprosphaerum* C. H. Schultz. VI. 242. no. 18.
— *linearifolium* C. H. Schultz. VI. 239. no. 3. γ.
— Lorentei Hochstett. VI. 240. no. 9.
— macranthum Bth. II. 645. †
— Nebrodense Heldreich. VI. 240. no. 5.
— *odorum* DC. VI. 238. no. 9.
— Pallasii Ldb. *VI. 241. no. 13.
— *polycephalum* C. H. Schultz. VI. 242. no. 20.
— polyphyllum Ldb. VI. 240. no. 10.
— postratum Hook. fil. VI. 241. no. 14.
— roseum Lssng. *VI. 242. no. 18.
— rugulosum Lssng. *VI. 242. no. 19.
— salicifolium Bertol. II. 646. no. 2.
— *semipapposum* DC. VI. 237. no. 5.
— *spinosum* C. H. Schultz. VI. 242. no. 21.

Helichrysum squamosum Thnbrg. *VI. 241. no. 15.
β. denudatum.
— *squarrulosum* DC. VI. 237. no. 2.
— undulatum Ldb. VI. 241. no. 12.
Helicta Cass. *II. 608.
Helictereae Schott et Endl. I. 331. II. 794. V. 96.
Helicteres L. I. 332. II. 794.
— *apetala* Jcq. V. 98. no. 10.
— aspera St. Hil. et Naud. II. 794. no. 7.
— bracteosa Mart. I. 333. no. 13.
— Brasiliana Zucc. I. 332. no. 6.
— *Brasiliensis* Mikan. I. 334. no. 21.
— brevispina St. Hil. I. 332. no. 7.
— carpinifolia Prsl. I. 333. no. 16.
— *corylifolia* Nees ab Esenb. et Mart. I. 334. no. 21.
— Javensis Blume. I. 334. no. 20.
— furfuracea A. Rich. I. 333. no. 15.
— Gardneriana St. Hil. et Naud. II. 794. no. 6.
— hispida Prsl. I. 334. no. 22.
— Isora L. I. 334. †
— *Ixora* Rxb. II. 794. no. 1.
— Jamaicensis L. I. 334. †
— lenta Mart. I. 333. no. 12.
— macropetala St. Hil. I. 333. no. 8.
— microcarpa Spanoghe. I. 332. no. 5.
— mollis Prsl. I. 333. no. 17.
— muscosa Mart. I. 333. no. 11.
— oblonga Wall. I. 332. no. 4. II. 794. no. 5.
— ovata Lam. *I. 334. no. 21.
— *paniculata* Lour. V. 100. in obs. ad no. 29.
— Roxburghii G. Don. II. 794. no. 1.
— Sacarotha St. Hil. I. 333. no. 9.
— salicifolia Prsl. I. 334. no. 18.
— spicata Colebr. I. 332. no. 1. II. 794. no. 2.
— Sundaica G. Don. I. 332. no. 2. II. 794. no. 3.
— trapezifolia A. Rich. I. 333. no. 14.
— *undulata* Lour. V. 100. in obs.
— virgata Wall. I. 332. no. 3. II. 794. no. 4.
— viscida Blume. I. 334. no. 19.
— Vuarame Mart. I. 333. no. 10.
Helicteroides DC. V. 781.
Heligme Blume. *VI. 473.
Heliocarpus L. *I. 353.
Heliogenes Bth. II. 633.
— longifolia Bth. II. 633. no. 2.
— Reglae Bth. II. 633. no. 1.
Heliophila Burm. I. 190. II. 764.
Heliophila L. I. 191.
— *amplexicaulis* L. fil. I. 191. no. 12.
— brachycarpa Meisn. II. 764. no. 2.
Heliophila brassicaefolia Eckl. et Zeyh. I. 192. no. 21.
— *cleomoides* DC. I. 192. no. 26.
— *diffusa* DC. I. 191. no. 18.
— *dissecta* Thunb. I. 191. no. 3.
— falcata Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 19.
— *filiformis* L. fil. I. 190. no. 1.
— *longifolia* DC. I. 191. no. 6.
— maritima Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 20.
— *peltaria* DC. I. 191. no. 17.
— *pendula* Willd. I. 191. no. 9.
— *pinnata* L. fil. I. 191. no. 15.
— *pusilla* L. fil. I. 191. no. 13.
— reticulata Eckl. et Zeyh. I. 192. no. 22.
— *rivalis* Burch. I. 191. no. 10.
— sarcophylla Meisn. II. 764. no. 1.
— stricta Sims. I. 192. no. 23.
— *tenella* DC. I. 191. no. 5.
— *tenuisiliqua* DC. I. 191. no. 14.
— *trifida* DC. I. 191. no. 15.
— *trifida* Thunb. I. 191. no. 11.
Heliophileae DC. I. 190.
Heliophytum A. P. DC. *VI. 557.
Heliopsideae DC. II. 608. II. 977. VI. 157.
Heliopsis DC. (ex p.) II. 610.
Heliopsis Pers. II. 610.
— *balsamorhiza* Hook. II. 610. no. 1.
— gracilis Nutt. II. 610. no. 1.
— *terebinthacea* Hook. II. 610. no. 2.
Heliosperma Rchb. II. 780.
Heliotropeae Endl. VI. 556.
Heliotropium Tournef. VI. 556.
— *Canariense etc.* Comm. III. 687. no. 2.
— canescens C. Koch. VI. 556. no. 1.
— oblongifolium Martens et Galeotti. VI. 556. no. 2.
— rugosum Martens et Galeotti. VI. 557. no. 4.
— rupestre Martens et Galeotti. VI. 557. no. 3.
— Turcicum Frivaldsky. VI. 557. no. 5.
Helipterum DC. II. 646. VI. 242.
— *Cassinianum* DC. II. 244. no. 2.
— citrinum Steetz. VI. 243. no. 3.
— Cotula Bth. VI. 243. no. 2.
α. ramosissimum Steetz.
β. simplex Steetz.
— incanum DC. *II. 646. no. 1.
— *Humboldtianum* DC. VI. 244. no. 3.
— niveum Steetz. VI. 243. no. 5.
— seminudum C. H. Schultz. VI. 242. no. 1.
— simplex Steetz. VI. 243. no. 4.
— *speciosissimum β. angustifolium* DC. VI. 242. no. 1.
Helleboreae DC. I. 46. II. 740. V. 6.
Helleborus Adans. I. 47. II. 741.

Helleborus angustifolius cf. sequentem.
— argutifolius Viv. I. 48. no. 2. *II. 741. no. 1.
— atrorubens W. et K. I. 48. †
— Bocconi Ten. I. 48. †
— dumetorum W. et K. I. 48. †
— graveolens Host. I. 48. †
— intermedius Guss. II. 741. no. 3.
— laxus Host. I. 48. †
— lividus Ait. I. 48. †
— multifidus Visiani. I. 48. no. 3.
— niger L. *I. 47. no. 1. I. 48. †
β. altifolius Hayne. I. 48. †
β. vernalis Sweet. I. 47. no. 1.
— *niger trifoliatus* Aldin. I. 48. no. 2.
— odorus Kit. I. 48. †
— Olympicus Lindl. I. 48. no. 4. *II. 741. no. 2.
— orientalis DC. I. 48. †
— purpurascens W. et K. I. 48. †
— vesicarius Auch. I. 48. no. 5.
— viridis L. I. 48. †
Helleria Nees et Mart. I. 425.
— obovata Nees et Mart. I. 425. no. 1.
— ovalifolia Adr. Juss. I. 425. no. 2.
Helminthia Juss. *II. 689. *VI. 352.
Helogyne Bth. VI. 106.
Helogyne Nutt. II. 548. VI. 107.
— apaloidea Nutt. *II. 548. no. 1. VI. 107. no. 1.
— *fasciculata* Bth. VI. 106. no. 2.
— *urenifolia* Bth. VI. 106. no. 1.
Helophyllum Hook. fil. VI. 371.
Helophytum Eckl. et Zeyh. II. 252.
— *filiforme* Eckl. et Zeyh. II. 252. no. 15.
— *fluitans* Eckl. et Zeyh. II. 252. no. 16.
— *inane* Eckl. et Zeyh. II. 252. no. 18.
— *natans* Eckl. et Zeyh. II. 252. no. 14.
— *reflexum* Eckl. et Zeyh. II. 252. no. 17.
Helosciadium Koch. II. 392. V. 849.
— australe Bnge. V. 849. no. 1.
— Californicum Hook. et Arn. II. 392. no. 1.
— Capense Eckl. et Zeyh. II. 392. no. 3.
— Heyneanum DC. *II. 392. no. 2.
—? prostratum Bnge. V. 849. no. 2.
Heloserides DC. (Senecio) VI. 261. no. 23.
Helospora W. Jack. *II. 517.
Hemiachyris DC. *II. 585.
Hemiachyris DC. II. 951. no. 4. II. 989.
— *Texana* DC. II. 989. no. 3.
Hemiandra R. Br. III. 769. °III. 985. VI. 764.
— brevifolia Bth. III. 769. no. 4.
— emarginata Lindl. III. 769. no. 2.
— glabra Bth. III. 770. no. 7.
— hirsuta Bth. III. 769. no. 5.
— incana Bartl. VI. 674. no. 3.
Hemiandra juniperina Bartl. VI. 674. no. 1.
— linearis Bth. III. 769. no. 6.
— longifolia Bartl. VI. 674. no. 2.
— pungens R. Br. III. 769. no. 1.
— rupestris Hügel. III. 769. no. 3.
Hemianthus Nutt. *VI. 644.
Hemichaena Bth. III. 452. °III. 964.
— fruticosa Bth. III. 452. no. 1.
Hemichroma Bth. VI. 651. no. 5.
Hemicouepia Bth. II. 7.
Hemidesmus R. Br. VI. 480.
— Indicus R. Br. *VI. 480. no. 1.
Hemigenia R. Br. III. 770. °III. 985. VI. 675.
— argentea Bartl. VI. 675. no. 2.
— barbata Bartl. VI. 675. no. 3.
—? longifolia Bth. III. 770. no. 4.
— parviflora Bartl. VI. 675. no. 1.
— purpurea R. Br. III. 770. no. 1.
— *purpurea* Sieb. III. 770. no. 2.
— sericea Bth. III. 770. no. 3.
— Sieberi Bth. III. 770. no. 2.
Hemigymnia Griffith. °IV. 99.
— Macleodii Griffith. IV. 99. no. 1.
Hemimerideae Bth. III. 178. III. 958. VI. 636.
Hemimeris Thnbrg. III. 179. °III. 958. *VI. 636.
— *acutifolia* Rz. et Pav. III. 151. no. 5.
— *caulialata* Pers. III. 151. no. 6.
— *coccinea* Willd. III. 150. no. 1.
— *diffusa* Thnbrg. III. 180. no. 2.
— *hirsuta* Spr. III. 151. no. 9.
— *linariaefolia* H. B. Kth. III. 150. no. 1.
— *macrophylla* Thnbrg. III. 181. no. 10.
— montana Linn. III. 179. no. 2.
— *Mutisii* H. B. Kth. III. 151. no. 8.
— *parviflora* H. B. Kth. III. 151. no. 7.
— *peduncularis* Lam. III. 180. no. 2.
— *procumbens* Pers. III. 151. no. 4.
— sabulosa Linn. III. 179. no. 3.
— sessilifolia Bth. III. 179. no. 1.
— *urticaefolia* Willd. III. 150. no. 3.
Hemiphragma Wall. III. 375. °III. 969. *VI. 644.
— heterophyllum Wall. III. 375. no. 1.
Hemipogon Dcne. VI. 482.
— acerosus Dcne. *VI. 482. no. 1.
Hemispadon pilosus Endl. I. 660. no. 3.
Hemisphace Bth. III. 678. VI. 670.
Hemistemma Commers. *I. 65.
Hemistoma Ehrenb. III. 868.
— *ovatum* Ehrenb. III. 869. no. 2.
Hemitomus fruticosus Hérit. III. 150. no. 1.
Hemizonia DC. II. 631. II. 990. VI. 184.
angustifolia DC. *II. 990. no. 4.
— ciliata Torr. et Gr. *II. 990. no. 3.

Hemizonia congesta DC. *II. 990. no. 5.
— *congesta* Hook. et Arn. II. 990. no. 4.
— corymbosa Torr. et Gr. *II. 990. no. 2.
— fasciculata Torr. et Gr. *II. 990. no. 1.
— filipes Hook. et Arn. II. 631. no. 2. *II. 990. no. 7.
— luzulaefolia DC. *II. 990. no. 8.
— macradenia DC. *II. 990. no. 9.
— multicaulis Hook. et Arn. II. 631. no. 3.
— *multicaulis* Hook. et Arn. II. 990. no. 5.
— pungens Torr. et Gr. II. 990. no. 6.
— ramosissima Bth. VI. 184. no. 1.
— rudis Bth. VI. 184. no. 2.
— sericea Hook. et Arn. II. 631. no. 1.
— *sericea* Hook. et Arn. II. 990. no. 8.
Hemprichia Ehrenb. I. 559.
— erythraea Ehrenb. *I. 559. no. 1.
Henckelia alata Lnk. III. 294. no. 3.
— *oppositifolia* Lnk. III. 289. no. 8.
— *Roxburghiana* Lnk. III. 288. no. 2.
Henisia vid. Heinsia DC.
Henricia Cass. *II. 576. *II. 951. no. 11.
Henriettea DC. *II. 145. V. 716.
— Brasiliensis Casaretto. V. 716. no. 3.
— oblongifolia Naudin. V. 716. no. 1.
— Orinocensis Naudin. V. 716. no. 2.
Henschelia Prsl. I. 99.
— Luzoniensis Prsl. *I. 99. no. 1.
Henslowia Wall. °V. 675.
— affinis Planchon. V. 675. no. 2.
— Cumingii Planchon. V. 675. no. 5.
— glabra Wall. V. 675. no. 3.
— leptostachys Planchon. V. 675. no. 4.
— pubescens Wall. V. 675. no. 1.
Hepatica Dill. *I. 32.
Hepatica Spr. I. 30.
— *acutiloba* DC. I. 31. no. 72. β.
— *Americana* Ker. I. 31. no. 72. γ.
— *anemonoides* Vest. I. 31. no. 72..
— *angulosa* DC. I. 31. no. 73.
—? *integrifolia* DC. I. 31. no. 74.
— *integrifolia* H. B. Kth. I. 31. no. 74.
— *nobilis* Volkam. I. 31. no. 72.
— *triloba* Chaix. I. 31. no. 72.
— *triloba* var. *a.* Torr. et Gr. I. 31. no. 72. γ.
— *triloba* var. *β. acuta* Bigelow. I. 31. no. 72. β.
— *triloba* var. *angulosa* Spach. I. 31. no. 73.
— *triloba* var. δ. Hook. I. 31. no. 72. γ.
Heptapleurum stellatum Gaertn.? II. 433. no. 2.
Heptaptera Reut. II. 425. V. 919.
— colladonioides Reut. *II. 425. no. 1. V. 919. no. 1.
Heracleum Linn. II. 415. II. 939. V. 889.
Heracleum ......? C. Koch. II. 415. no. 8.
— amplissimum Wndrth. II. 416. no. 12.
— apiifolium Boiss. V. 889. no. 3.
— *aureum* Sbthrp. et Sm. V. 886. no. 1.
— *aureum β. multiradiatum* Cesati. II. 414. no. 4.
— auritum Bischof. II. 416. no. 11.
— barbatum Ldb. II. 415. no. 4.
— brevivittatum Ldb. V. 890. no. 7.
— canescens Lindl. II. 415. no. 9.
— *Carmeli* Labill. V. 891. no. 1.
— cinereum Lindl. II. 416. no. 10.
— Clausii Ldb. V. 890. no. 6.
— cyclocarpum C. Koch. II. 415. no. 7.
— *dissectum* Hort. Petrop. V. 890. no. 5.
— dissectum Ldb. II. 415. no. 3.
— dulce Fisch. V. 890. no. 5.
— Granatense Boiss. II. 415. no. 2.
— *graveolens* Spr. V. 886. no. 1.
— Hookerianum Wght. et Arn. II. 416. no. 14.
— humile Sbthrp. V. 890. no. 9.
— hypoleucum Visiani. V. 890. no. 4.
— intermedium Ldb. V. 890. no. 8.
— *lanatum* Bngrd. V. 890. no. 5.
— lasiopetalum Boiss. V. 889. no. 2.
— palmatifidum Fisch. et Lallem. II. 939. no. 1.
— pastinacifolium C. Koch. II. 416. no. 13.
— platytaenium Boiss. V. 889. no. 1.
— *sphondylium* Cham. et Schlchtd. V. 890. no. 5.
— *sphondylium* Claus. V. 890. no. 6.
— Sprengelianum Wght. et Arn. II. 415. no. 1.
— trachyloma Fisch. et Mey. II. 415. no. 5.
— Wilhemsii Fisch. et Mey. II. 415. no. 6.
Herba admirationis Rmph. III. 877. no. 45.
Herderia Cass. *II. 538.
Héritiera Ait. *I. 334.
Hériticra Dryand. °V. 106.
— attenuata Wall. V. 106. no. 2.
— *Fomes* Willd. V. 106. no. 1.
— littoralis Dryand. V. 106. no. 1.
— *minor* Lam. V. 106. no. 1.
Hermannia L. I. 344.
— alnifolia L. I. 347. †
— althaeaefolia L. I. 347. †
— angularis Jcq I. 347. †
— Arabica Hochst. et Steud. I. 346. no. 26.
— betonicaefolia Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 1.
— bicornis Eckl. et Zeyh. I. 346. no. 25.
— biflora Eckl. et Zeyh. I. 345. no. 12.
— candicans Jcq. I. 347. †
— chrysophylla Eckl. et Zeyh. I. 345. no. 10.
— cluytiaefolia Otto et Dietr. I. 347. no. 32.
— collina Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 4.

Hermannia conglomerata Eckl. et Zeyh. I. 345. no. 13.
— cuneifolia Jcq. I. 347. †
— decumbens Willd. I. 347. †
— denudata L. I. 347. †
— desertorum Eckl. et Zeyh. I. 346. no. 22.
— diosmaefolia Jcq. I 347. †
— discolor Otto et Dietr. I. 346. no. 28.
— disticha Schrad. I. 347. †
— diversifolia Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 3.
— falcata Eckl. et Zeyh. I. 345. no. 15.
— fistulosa Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 6.
— flammea Jcq. I. 347. †
— Gariepina Eckl. et Zeyh. I. 346. no. 24.
— geniculata Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 2.
— glauca Hort. Herrenh. I. 347. no. 30.
— gracilis Eckl. et Zeyh. I. 345. no. 14.
— hirsuta Schrad. I. 347. †
— hispidula Rchb. I. 346. no. 27.
— holosericea Jcq. I. 347. †
— hyssopifolia L. I. 347. †
— imbricata Eckl. et Zeyh. I. 346. no. 21.
— incana Cav. I. 347. †
— lavandulaefolia L. I. 347. †
— leucanthemifolia Otto et Dietr. I. 347. no. 31.
— *macrophylla* Hortor. V. 113. no. 1.
— micans Schrad. I. 347. †
— mollis Willd. I. 347. †
— multiflora Jcq. I. 347. †
— muricata Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 8.
— nemorosa Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 7.
— odorata Jcq. I. 347. †
— orophila Eckl. et Zeyh. I. 345. no. 17.
— pallens Eckl. et Zeyh. I. 346. no. 19.
— passerinaeformis Eckl. et Zeyh. I. 345. no. 17.
— plicata Willd. I. 347. †
— polymorpha Eckl. et Zeyh. I. 345. no. 16.
— pratensis Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 5.
— pulverulenta Andr. I. 347. †
— quercifolia Eckl. et Zeyh. I. 346. no. 23.
— scabra Cav. I. 347. †
— scordifolia Jcq. I. 347. †
— secundiflora Eckl. et Zeyh. I. 346. no. 20.
— stipulacea Lehm. I. 345. no. 11.
— trifurcata L. I. 347. †
— venosa Bartl. I. 346. no. 29.
— verrucosa Eckl. et Zeyh. I. 344. no. 9.
Hermannieae DC. I. 340. V. 112.
Hermas Linn. II. 425.
— minima Eckl. et Zeyh. II. 425. no. 2.
— quercifolia Eckl. et Zeyh. II. 425. no. 3.
— Uitenhagensis Eckl. et Zeyh. II. 425. no. 1.
Herminiera Guill. et Perr. I. 681. V. 516.
— elaphroxylon Guill. et Perr. *I. 681. no. 1. V. 516. no. 1.
Hermupoa Löffl. *I. 202.
Herniaria DC. I. 261. no. 5.
Herniaria Tournef. I. 260. V. 74.
— *Americana* Nutt. I. 262. no. 12.
— *annua* Lag. I. 260. no. 4.
— *Besseri* Fisch. I. 260. no. 4.
— *cinerea* DC. I. 260. no. 4.
— diandra Bnge. V. 74. no. 1.
— hirsuta Buch. *I. 260. no. 4.
— *millegrana* Pall. I. 260. no. 4.
— paniculata B. Webb. I. 260. no. 3.
— Pyrenaica Gay. I. 260. no. 1.
— scabrida Boiss. I. 260. no. 2.
— setigera Gill. I. 260. no. 5.
— *virescens* Slzm. I. 260. no. 4.
Herodium cf. Erodium.
Herodium Rchb. (I. 447.)
— ciconium W. I. 447. †
— cicutarium Sm. I. 447. †
— laciniatum Cav. I. 447. †
— littoreum Lam. I. 447. †
— malacoides W. I. 447. †
— maritimum Sm. I. 447. †
— moschatum Ait. I. 447. †.
— pimpinellifolium Sm. I. 447. †
Herpestes Gaertn. III. 278. °III. 961. V. 643.
— *amara* Bth. III. 284. no. 1.
—? amara Spanoghe. III. 283. no. 43.
— amplexicaulis Prsh. III. 283. no. 34.
— *Brownei* Nutt. III. 282. no. 29.
— caespitosa Cham. III. 280. no. 16.
— callitrichoides H. B. Kth. III. 280. no. 14.
— calycina Bth. III. 281. no. 21.
— caprarioides H. B. Kth. III. 279. no. 6.
— chamaedryoides H. B. Kth. III. 278. no. 3. β. colubrina III. 279. no. 3.
— *chrysantha* Cham. et Schlchtd. III. 278. no. 3.
— *colubrina* H. B. Kth. III. 279. no. 3. β.
— *Cubensis* Poepp. III. 279. no. 3.
— *cuneifolia* Prsh. III. 282. no. 29.
— *diffusa* Willd. III. 268. no. 18.
— Domingensis Spr. III. 283. no. 37.
— *erecta* Spr. III. 284. no. 1.
— flagellaris Cham. et Schlchtd. III. 279. no. 7.
— floribunda R. Br. III. 281. no. 24.
— *glechomoides* Spr. III. 333. no. 1.
— grandiflora Bth. III. 278. no. 2.
— gratioloides Bth. III. 281. no. 18.
— Hamiltoniana Bth. III. 281. no. 25.
— herniarioides Cham. III. 279. no. 5.
— Javanica Blume. III. 283. no. 42.
— *lanceolata* Wght. III. 281. no. 24.
— lanigera Cham. et Schlchtd. III. 282. no. 30.
— lanuginosa Blume. III. 283. no. 40.

Herpestes linearis Spr. III. 281. no. 24.
— Madagascariensis Bth. III. 282. no. 28.
— micrantha Prsh. III. 282. no. 33.
— Monnieria H. B. Kth. III. 282. no. 29.
— Montevidensis Spr. III. 283. no. 38.
— Moranensis H. B. Kth. III. 283. no. 35.
— nigrescens Bth. III. 280. no. 10.
— obovata Poepp. III. 283. no. 39.
— ovata Wall. III. 278. no. 1.
— peduncularis Bth. III. 280. no. 9.
— pilosa Bth. III. 280. no. 12.
— pilosa Martens et Galeotti. VI. 643. no. 1.
— polyantha Bth. III. 281. no. 20.
— *polygonoides* Bth. III. 295. no. 7.
— pratensis Bth. III. 280. no. 11.
— *procumbens* Spr. III. 282. no. 29.
— *pusilla* Meisn. III. 280. no. 15.
— radicata Bth. III. 280. no. 8.
— ranaria Bth. III. 281. no. 19.
— rotundifolia Prsh. III. 282. no. 32.
— Salzmanni Bth. III 282. no. 31.
— scabra Bth. III. 281. no. 22.
— serpylloides Cham. et Schlchtd. III. 280. no. 15.
— sessiliflora Bth. III. 282. no. 27.
— spathulata Blume. III. 283. no. 41.
— stellarioides Cham. III. 281. no. 23.
— *stellarioides β. Cayennensis* Bth. III. 283. no. 1.
— stricta Schrad. III. 283. no. 36.
— tenella Cham. et Schlchtd. III. 279. no. 4.
— Thonningii Bth. III. 282. no. 26.
— tomentosa Schlchtd. et Cham. III. 280. no. 17.
— vandellioides H. B. Kth. III. 280. no. 13.
Herpestis Brownei Nutt. conf. *Herpestes Brownei.*
Herpetica DC. I. 816.
Herrania Goudot. ° V. 111.
— albiflora Goudot. V. 111. no. 1.
— Mariae Goudot. V. 111. no. 3.
— pulcherrima Goudot. V. 111. no. 2.
Herschelia Bodwich. III. 24. no. 8. *β.*
Hertia Lssng. II. 665.
Heruchea Torr. et Gr. II. 369.
Hesiodia Bth. III. 854.
— *bicolor* Mnch. III. 855. no. 40.
— *montana* Dumort. III. 855. no. 40.
Hesperidium DC. I. 162. no. 13. 14.
Hesperis DC. (Malcolmia) I. 160. no. 6.
Hesperis L. I. 160. II. 760. V. 38.
— *aprica* Poir. II. 755. no. 1.
— Armena Boiss. I. 161. no. 3.
— Aucheri Boiss. I. 161. no. 7.
— breviscapa Boiss. I. 161. no. 10.
— *cinerea* Poir. I. 125. no. 5.
Hesperis cretacea Adams. I. 162. no. 13.
— *cretacea* Willd. I. 162. no. 13.
— diffusa Dcne. I. 161. no. 2.
— *diffusa* Spr. I. 184. no. 1.
— fragrans Fisch. I. 162. no. 20.
— glabra Royle. I. 162. no. 17.
— grandiflora Sims. I. 162. no. 21.
— Hookeri Ldb. I. 162. no. 14.
— inodora L. I. 163. †
— Kotschyana Fnzl. II. 760. no. 1.
— laciniata All. I. 163. †
— leucoclada Boiss. I. 162. no. 12.
— matronalis L. I. 163. †
— *Menziesii* Hook. I. 134. no. 1.
— Menziesii Hook. I. 162. no. 19.
— minima Torr. et Gr. * I. 162. no. 18.
— *nitens* Viv. I. 125. no. 1.
— Orsiniana Ten. I. 160. no. 1.
— *parviflora* DC. I. 124. no. 3.
— Persica Boiss. I. 161. no. 5. (c. var. *β.* ibid.)
— *pinnatifida* Michx. I. 125. no. 12.
— podocarpa Boiss. I. 161. no. 6.
— pulmonarioides Boiss. I. 162. no. 11.
— *pygmaea* DC. I. 160. no. 6.
— *pygmaea* Hook. I. 125. no. 11. I. 162. no. 14. et no. 18.
— quadrangula Boiss. I. 161. no. 9.
— *ramosissima* Desf. I. 124. no. 3.
— rhampicarpa Boiss. I. 161. no. 8.
— runcinata W. K. I. 163. †
— scabrida Boiss. I. 161. no. 4.
— secundiflora Boiss. et Spruner. II. 760. no. 2.
— Sibirica L. I. 163. †
— speciosa Sweet. I. 162. no. 15.
— trichosepala Turczan. I. 162. no. 16.
— tristis L. I. 163. †
— violacea Boiss. V. 38. no. 1.
Hesperomeles Lindl. II. 56.
— cordata Lindl. * II. 56. no. 1.
— cuneata Lindl. II. 56. no. 4.
— oblonga Lindl. II. 56. no. 2.
— obtusifolia Lindl. II. 56. no. 3.
Hesperothymus Bth. III. 718.
Heteracanthae Pfeiff. (Mamillaria) II. 288.
Heterachaena Fresen. II. 691. VI. 360.
— Massauensis Fresen. * II. 691. no. 1. VI. 360. no. 1.
Heteracia Fisch. et Mey. * II. 698. * VI. 359.
Heteractis DC. * II 665.
Heteranthesia Bth. III. 749. VI. 673. no. 4.
Heteranthia Nees et Mart. III. 297. ° III. 966. * VI. 634.
— decipiens Nees et Mart. III. 297. no. 1.
Heterocaryum Alph. DC. * VI. 563.

Heterocentron Hook. et Arn. II. 127. V. 699.
— Mexicanum Hook. et Arn. *II. 127. no. 1. V. 699. no. 1.
Heterochaenia Alph. DC. *II. 710. *VI. 381.
Heterochaeta DC. *II. 579. *II. 952. no. 9. VI. 122.
— stricta Bth. VI. 122. no. 1.
Heterochroa Bnge. °V. 79.
Heterochroa DC. I. 271. no. 7. II. 774.
— *desertorum* Bnge. II. 775. no. 4.
— desertorum Bnge. V. 80. no. 3.
— *glandulosa* Boiss. II. 774. no. 10.
— glandulosa Boiss. V. 80. no. 4.
— *microphylla* Schrenk. I. 271. no. 5. II. 775. no. 13.
— microphylla Schrenk. V. 80. no. 2.
— minuartioides Jaub. et Spach. V. 80. no. 5.
— *petraea* Bnge. II. 774. no. 12.
— petraea Bnge. V. 79. no. 1.
— spergulaefolia Jaub. et Spach. V. 80. no. 6.
— violacea Wlprs. V. 81. no. 7.
Heterocoma DC. *II. 538.
Heterocomeae DC. II. 538. II. 945. VI. 89.
Heterocylix Bth. III. 506.
Heterodendron Dsf. I. 562.
Heterodon Meisn. I. 545.
— superbum Meisn. *I. 545. no. 1.
Heterolepis Cass. *II. 666.
Heteroloma Bth. (Desmodium) V. 525. no. 5. 7. 8. 9.
Heteromelysson Bth. III. 733.
Heteromeris cymosa Spach. I. 209. no. 16.
— *polifolia* Spach. I. 209. no. 15.
Heteromorpha Cham. et Schlchtd. II. 398.
— collina Eckl. et Zeyh. II. 398. no. 2.
— trifoliata Eckl. et Zeyh. II. 398. no. 1.
Heteronoma Mart. II. 127.
— coriaceum Mart. *II. 127. no. 1.
Heteropappeae DC. II. 583. *II. 951. no. 19. VI. 125.
Heteropappus Lssng. *II. 583.
Heterophragma A. P. DC. *VI. 513.
Heterophylla Jaub. et Spach. II. 844.
Heterophylli N. ab E. II. 563.
Heteropteris cf. *Heteropterys*.
Heteropteris albida Blume. V. 221. no. 1.
— *appendiculata* DC. V. 239. no. 40.
— *argentea* H. B. Kth. V. 225. no. 7.
— *bignoniacea* Poepp. V. 223. no. 1.
— *brachiata* H. B. Kth. V. 279. no. 69.
— *Smeathmanni* DC. V. 286. no. 2.
— *tomentosa* Hook. et Arn. V. 279. no. 69.
Heteropterys Adr. Juss. °V. 254.
— aceroides Griseb. V. 275. no. 59.
— acutifolia Adr. Juss. V. 268. no. 39.
— aenea Griseb. V. 262. no. 18.
Heteropterys affinis Adr. Juss. V. 271. no. 49.
— Africana Adr. Juss. V. 267. no. 32.
— angustifolia Griseb. V. 276. no. 63.
— anomala Adr. Juss. V. 255. no. 1.
— anoptera Adr. Juss. V. 268. no. 38.
— argyrophaea Adr. Juss. V. 261. no. 17.
— *australis* Adr. Juss. V. 278. no. 64.
— banksiaefolia Griseb. V. 264. no. 25.
— Beecheyana Adr. Juss. V. 279. no. 69.
— Berteroana Adr. Juss. V. 280. no. 71.
— bicolor Adr. Juss. V. 278. no. 66.
— biglandulosa Adr. Juss. V. 266. no. 30.
— brachiata H. B. Kth. V. 280. no. 70.
— byrsonimaefolia Adr. Juss V. 271. no. 47.
— caerulea H. B. Kth. V. 267. no. 37.
— *caerulea* Adr. Juss. V. 268. no. 38.
— Candolleana Adr. Juss. V. 270. no. 45.
— campestris Adr. Juss. V. 282. no. 76.
— *catingarum* Adr. Juss. V. 260. no. 13.
— chrysophylla H. B. Kth. V. 264. no. 24.
— cochleosperma Adr. Juss. V. 256. no. 4.
— coleoptera Adr. Juss. V. 262. no. 19.
— confertiflora Adr. Juss. V. 281. no. 74.
— cordifolia Moricand. V. 284. no. 79.
— coriacea Adr. Juss. V. 272. no. 52.
— cornifolia H. B. Kth. V. 284. no. 81.
— cotinifolia Adr. Juss. V. 257. no. 6.
— discolor Adr. Juss. V. 282. no. 77.
— Duarteana Adr. Juss. V. 265. no. 27.
— eglandulosa Adr. Juss. V. 268. no. 40.
— escalloniaefolia Adr. Juss. V. 270. no. 46
— falcifera Adr. Juss. V. 257. no. 8.
— floribunda H. B. Kth. V. 267. no. 33.
— Gayana Adr. Juss. V. 257. no. 7.
— glabra Hook. et Arn. V. 276. no. 62.
— grandiflora Adr. Juss. V. 269. no. 42.
— *hiraeoides* Adr. Juss. V. 274. no. 58.
—? *hiraeoides* Martius. V. 329. no. 24.
— hypericifolia Adr. Juss. V. 278. no. 65.
— ilicifolia Griseb. V. 259. no. 12.
— laurifolia Adr. Juss. V. 267. no. 36.
— Lechenaultiana Adr. Juss. V. 272. no. 53.
— Lessertiana Adr. Juss. V. 270. no. 44.
— Lindeniana Adr. Juss. V. 267. no. 35.
— Lindleyana Adr. Juss. V. 261. no. 16.
— longifolia H. B. Kth. V. 267. no. 34.
— macrostachya Adr. Juss. V. 263. no. 22.
β. rotundifolia V. 264. no. 22.
— Martiana Adr. Juss. V. 279. no. 68.
— Mathewsiana Adr. Juss. V. 266. no. 29.
— megaptera Adr. Juss. V. 273. no. 54.
— metallochroa Adr. Juss. V. 262. no. 20.
— nervosa Adr. Juss. V. 269. no. 41.
— nitida H. B. Kth. V. 264. no. 23.
β. aurea Lindl.
— obtusata Griseb. V. 274. no. 57.

Heteropterys ochnaefolia Adr. Juss. V. 271. no. 48.
— Orinocensis Adr. Juss. V. 270. no. 43.
— *parvifolia* DC. V. 279. no. 67.
— parvifolia Martius. V. 271. no. 50.
— patens Adr. Juss. V. 255. no. 3.
— pauciflora Adr. Juss. V. 275. no. 60.
— platyptera DC. V. 266. no. 31.
— *platyptera* DC. V. 280. no. 70.
— pteropetala Adr. Juss. V. 283. no. 78.
— purpurea H. B. Kth. V. 279. no. 67.
— racemosa Adr. Juss. V. 260. no. 15.
— rhopalaefolia Adr. Juss. V. 258. no. 9.
— rubiginosa Adr. Juss. V. 280. no. 73.
— rufula Martius. V. 280. no. 72.
— saligna Martius. V. 272. no. 51.
— sericea Adr. Juss. V. 263. no. 21.
— sessilifolia Adr. Juss. V. 284. no. 80.
— spectabilis Martius. V. 258. no. 10.
— *Spiraeae* Mart. V. 283. no. 77.
— *suberosa* Griseb. V. 270. no. 45.
— sylvatica Adr. Juss. V. 273. no. 55.
— syringaefolia Griseb. V. 277. no. 64.
— ternstroemiaefolia Adr. Juss. V. 260. no. 14.
— thyrsoidea Adr. Juss. V. 255. no. 2.
— tomentosa Adr. Juss. V. 259. no. 11.
— trichanthera Adr. Juss. V. 256. no. 5.
— trigoniaefolia Adr. Juss. V. 281. no. 75.
— umbellata Adr. Juss. V. 276. no. 61.
— venosa Griseb. V. 274. no. 58.
— Wiedeana Adr. Juss. V. 274. no. 56.
— Wydleriana Adr. Juss. V. 265. no. 26.
— xanthophylla Adr. Juss. V. 265. no. 28.
Heteroptilis E. Mey. II. 938. °V. 872.
— arenaria E. Mey. *II. 938. no. 1. *V. 872. no. 1.
Heterorhachis C. H. Schultz. °VI. 278.
— spinosissima C. H. Schultz. VI. 278. no. 1.
Heterospermum Willd. *II. 623.
Heterosphace Bth. III. 672.
Heterostemma Wght. et Arn. VI. 493.
— acuminatum Dcne. VI. 493. †
— Manillense Schauer. VI. 493. no. 1.
Heterostemon Dsf. *I. 844.
Heterostemon Nutt. II. 86.
Heterotaenia Boiss. II. 423. V. 910.
— thalictrifolia Boiss. *II. 423. no. 1. V. 910. no. 1.
Heterothalameae DC. II. 558. II. 955.
Heterothalamus Less. II. 558. *II. 955. no. 1.
— spartioides Hook. et Arn. II. 558. no. 1.
— trinervis Hook. et Arn. II. 558. no. 2.
Heterotheca Cass. II. 586. *II. 952. no. 16. VI. 127.
— floribunda Bth. VI. 127. no. 1.
— grandiflora Nutt. II. 586. no. 1.
Heterotheca Lamarckii Cass. II. 588. no. 2.
— *Lamarckii* DC. II. 967. no. 1.
Heterotheceae DC. II. 586. II. 959. VI. 127.
Heterotoma Zucc. *II. 708. *VI. 375.
Heterotrichum DC. *II. 144.
Heuchera Linn. *II. 369.
— *acerifolia* Raf. II. 369. no. 2.
— Americana L. *II. 369. no. 1.
— *Barbarossa* Prsl. II. 369. no. 5.
— bracteata Ser. *II. 370. no. 12.
— caulescens Prsh. *II. 369. no. 2. (c. var. β. ibid.)
— cylindrica Dougl. II. 369. no. 9.
— *dichotoma* Murr. II. 362. no. 1.
— *divaricata* Fisch. II. 369. no. 4.
— glabella Torr. et Gr. II. 370. no. 10.
— glabra Willd. *II. 369. no. 4.
— *glauca* Raf. II. 369. no. 1.
— *grandiflora* Raf. II. 369. no. 6.
— hirtiflora Torr. et Gr. II. 370. no. 14.
— *hispida* Hook. et Arn. II. 370. no. 14.
— hispida Prsh. *II. 369. no. 7.
— *longipetala* Moç. II. 369. no. 5.
— *Menziesii* Hook. II. 370. no. 1.
— micrantha Dougl. *II. 369. no. 5. β. glabriuscula.
— ovalifolia Torr. et Gr. II. 370. no. 11.
— *parviflora* Bartl. II. 369. no. 3.
— parvifolia Nutt. II. 370. no. 13.
— pilosissima Fisch. et Mey. II. 370. no. 15.
— *Portula* Michx. II. 369. no. 1.
— pubescens Prsh. *II. 369. no. 6.
— *pulverulenta* Raf. II. 369. no. 6.
— *reniformis* Raf. II. 369. no. 7.
— ribifolia Fisch. et Lallem. II. 370. no. 16.
— Richardsonii R. Br. *II. 369. no. 8.
— *squamosa* Raf. II. 369. no. 3.
— villosa Michx. *II. 369. no. 3.
— *viscida* Prsh. II. 369. no. 1.
Heucherella Torr. et Gr. II. 370.
Heudelotia Africana Guill. et Perr. I. 558. no. 3.
Heudusa decipiens E. Mey. I. 582. no. 2.
Hexalobus DC. fil. I. 80.
— Brasiliensis St. Hil. et Tulasne. I. 80. no. 4.
— crispiflorus A. Rich. I. 80. no. 3.
— Madagascariensis DC. fil. I. 80. no. 2.
— Senegalensis DC. I. 80. no. 1.
Hexaptera Hook. I. 180.
— cuneata Gill. et Hook. I. 180. no. 3.
— pinnatifida Gill. et Hook. I. 180. no. 1.
— spathulata Gill. et Hook. I. 180. no. 2.
Hexasepalum Bartl. *II. 465.
Heydusa cf. *Heudusa*
Heylandia DC. I. 582.

Heylandia? cordifolia Grah. I. 667. no. 86.
— *hebecarpa* DC. I. 582. no. 1.
— latebrosa DC. *I. 582. no. 1.
— *leiocarpa* DC. I. 582. no. 1.
Heynea Rxb. I. 432.
— affinis A. Juss. I. 432. no. 2.
— multijuga Blume. I. 432. no. 4.
— quinquejuga Rxb. *I 432. no. 3.
— *trifoliata* Adr. Juss. I. 431. no. 1.
— trijuga Rxb. *I. 432. no. 1.
— *trijuga* Wall. I. 432. no. 2.
Heynichia Kth. °V. 373.
— malleoides Kth. *V. 374. no. 1.
Hibbertia Andrws. I. 64. V. 8.
— amplexicaulis Steudel. V. 8. no 1.
— argentea Steudel. V. 8. no. 7.
— astrophylla Steudel. V. 9. no. 16.
— aurea Steudel. V. 10. no. 22.
— basitricha Steudel. V. 9. no. 10.
— cinerascens Steudel. V. 10. no. 19.
— commutata Steudel. V. 8. no. 5.
— confertifolia Steudel. V. 8. no. 4.
— corifolia Sims. I. 64. no. 2.
— *Cunninghami* Ait. I. 64. no. 1.
— depressa Steudel. V. 9. no. 9.
— discolor Steudel. V. 8. no. 6.
— grossulariaefolia Salisb. I. 64. †
— hastata Steudel. V. 8. no. 2.
— lactucaefolia Steudel. V. 8. no. 3.
— latifolia Steudel. V. 9. no. 13.
— limosa Steudel. V. 10. no. 20.
— lineata Steudel. V. 10. no. 23.
— microphylla Steudel. V. 10. no. 24.
— montana Steudel. V. 9. no. 15.
— ovata Steudel. V. 9. no. 14.
— pachyrhiza Steudel. V. 9. no. 11.
— pallida Steudel. V. 10. no. 21.
— perfoliata Hüg. I. 64. no. 3. V. 10. †
— prostrata Scott. I. 64. no. 5.
— proxima Steudel. V. 9. no. 17.
— stellaris Endl. I. 64. no. 4.
— subexcisa Steudel. V. 9. no. 12.
— tenuiramea Steudel. V. 8. no. 8.
— trachyphylla Steudel. V. 10. no. 18.
— virgata R. Br. *I. 64. no. 1.
α. glabra Hook.
β. pilosa Hook.
Hibisceae Endl. I. 302. V. 91.
Hibiscus DC. I. 308. (ex p.) V. 92.
Hibiscus Linn. I. 302. II. 790. V. 91.
— *Abelmoschus* L. I. 309. no. 18.
— *abutiloides* Willd. I. 311. no. 6.
— *aculeatus* G. Don. I. 308. no. 4.
— amoenus Lnk. et Otto. I. 306. no. 44.
— aquaticus DC. I. 311. †
— arboreus Desvx. I. 306. no. 46.
Hibiscus Armeniacus Bouché I. 302. no. 1.
— *ascendens* G. Don. I. 310. no. 23.
— asperifolius Eckl. et Zeyh. I. 304. no. 29.
— atromarginatus Eckl. et Zeyh. I. 304. no. 30.
— Bancroftianus Macf. I. 306. no. 45.
— Berlanderianus Moric. I. 305. no. 40.
— *Borbonicus* Wght. I. 303. no. 5.
— Cameronis Knwls. et Westc. I. 304. no. 26. V. 92. †
β. fulgens Lindl. V. 92. †
— canescens Heyne. I. 302. no. 5. (III. Emend. p. 2.)
— *Chittle Berda* Rxb. I. 298. no. 10.
— *ciliaris* Prsl. I. 308. no. 9.
— *circinnatus* DC. I. 311. no. 1.
— *collinus* Rxb. I. 303. no. 8.
— collinus Voigt. II. 791. no. 12.
— *congener* Schum. et Thonn. I. 308. no. 5.
— *coriaceus* Heyne. I. 312. no. 1.
— coronopifolius Miq. V. 91. no. 5.
— corylifolius Prsl. I. 305. no. 37.
— costatus A. Rich. I. 305. no. 35.
— *crinitus* G. Don. I. 308. no. 2.
— *crotonifolius* Wall. I. 312. no. 1.
— *cruentus* Bertol. I. 310. no. 26.
— *cryptocarpus* A. Rich. I. 310. no. 29.
— Cubensis A. Rich. I. 309. no. 11.
— *cucurbitaceus* St. Hil. I. 310. no. 28.
— decipiens St. Hil. I. 305. no. 33.
— denudatus Bth. V. 91. no. 4.
— dimidiatus Zucc. II. 790. no. 5.
— Dongalensis Delile. I. 303. no. 16.
— Donii Wlprs. I. 304. no. 28.
— *elatus* DC. I. 311. no. 1.
— *elatus* Swrtz. I. 311. no. 3.
— Endlicheri Wlprs. I. 304. no. 27.
— eriocarpus DC. *I. 303. no. 8.
— *esculentus* L. I. 309. no. 15.
— *ficulneus* L. I. 308. no. 1.
— *ficulnoides* Lindl. I. 309. no. 19.
— flagellaris St. Hil. I. 305. no. 36.
— *flavescens* Cav. I. 309. no. 18.
— Fluminensis Vell. II. 790. no. 6.
— *Gangeticus* Rxb. 311. no. 4.
— *Genevii* Boj. I. 310. no. 25.
— glabrifolius St. Hil. et Naud. II. 790. no. 10.
— grewiaefolius Hsskrl. V. 91. no. 2.
— grossulariaefolius Miq. V. 92. no. 7.
— *Guineensis* DC. I. 311. no. 1.
— hackeaefolius Giordano. I. 306. no. 51.
— Hamabo Sieb. et Zucc. I. 303. no. 14.
— Hügelii Endl. I. 306. no. 50.
— hirtus L. *I. 303. no. 9.
— insularis Endl. I. 306. no. 9.

Hibiscus immutabilis Dehnh. I. 307. no. 54.
— Jacquini Colla. II. 790. no. 2.
— Javanicus Weinm. II. 790. no. 3.
— kitaibeliaefolius St. Hil. I. 305. no. 34.
— Kraussianus Buchinger. V. 91. no. 3.
— Lampas Cav. I. 307. †
— lavateroides Moris. I. 305 no. 41.
— *laxiflorus* St. Hil. I. 310. no. 27.
— Lindleyi Wall. I. 302. no. 2. V. 91. no. 1 et p. 92. †
— linearis St. Hil. et Naud. II. 790. no. 9.
— longifolius Willd. *I. 303. no. 13.
β. tuberosus Spanoghe.
— *longifolius* Willd. I. 309. no. 18.
— Ludwigii Eckl. et Zeyh. I. 304. no. 31.
— lunarifolius W. *I. 302. no. 4.
— *Mackleyanus* Bancrft. I. 306. no. 45.
— *macrophyllus* Rxb. I. 311. no. 5.
— Manihot L. I. 311. †
— *Mauritianus* Spr. I. 309. no. 19.
— Meisneri Miq. V. 91. no. 6.
— *morifolius* Rottl. I. 298. no. 10.
— *moschatus* Rxbg. I. 309. no. 18.
— multifidus Hort. V. 92. †
— multiformis St. Hil. I. 305. no. 32.
— obtusatus Schum. et Tonn. I. 304. no. 22.
— *obtusifolius* W. I. 303. no. 7.
— *odoratus* Rxb. I. 298. no. 10.
— palustris L. I. 311. †
— *panduraeformis* DC. V. 92. no. 2.
— panduriformis Burm. *I. 303. no. 6.
— parviflorus Weinm. I. 304. no. 25.
— *pentacarpos* Linn. II. 790. no. 1.
— *Pernambucensis* Bertol. I. 311. no 7.
— *persicifolius* Eckl. et Zeyh. I. 308. no. 8.
— *phoeniceus* Willd. I. 303. no. 9.
— physaloides Guill. et Perr. I. 304. no. 23.
— *pilosus* Rxb. I. 303. no. 6.
— Pinonianus Gaudich. I. 306. no. 48.
— polymorphus Bojer. I. 303. no. 17.
— *pruriens* Rxb. I. 302. no. 4.
— pseudo-abelmoschus Blume. I. 308. no. 3.
— *pseudo-abelmoschus* Blume. I. 309. no. 18.
— *pterospermoides* Wght. I. 312. no. 1.
— *quinquelobus* G. Don. I. 310. no. 24.
— Rainerianus Vis. I. 303. no. 15. II. 790. no. 1.
— ribesiaefolius Guill. et Perr. I. 304. no. 24.
— *Rosa Malabarica* Koen. I. 303. no. 9.
— Rosa Sinensis L. I. 307. †
— *rostellatus* Guillem. et Perr. I. 308. no. 6.
— salviaefolius St. Hil. I. 306. no. 43.
— Senegalensis Cav. *I. 304. no. 25. (et var. β.)
— *septemnervosus* Wght. I. 303. no. 5.
— setifer Prsl. I. 305. no. 42.
Hibiscus setosus Wall. I. 303. no. 6.
— sidoides Wght. et Arn. I. 302. no. 3. (Ill. Emend. p. 2.)
— similis Blume. I. 303. no. 12.
— *similis* Blume. I. 311. no. 1.
— *simplex* Rxb. I. 303. no. 8.
— spathaceus Blume. I. 303. no. 11.
— sphaerocarpus Bouché. I. 306. no. 53.
— *splendens* Fraser. I. 309. no. 13.
— splendens Lodd. V. 92. †
— strictus Hornem. II. 790. no. 4.
— strigosus Schum. et Thonn. I. 304. no. 21.
— Surattensis L. I. 307. †
— Syriacus var. variegatus Paxt. V. 92. †
— Tampicensis Moric. I. 305. no. 39.
— Telfairiae Maund et Henslow. I. 303. no. 18.
— *tiliaceus* L. I. 311. no. 1.
— *tricuspis* Cav. I. 311. no. 2.
— tridactylites Lindl. II. 791. no. 11.
— trilineatus St. Hil. et Naud. II. 790. no. 7.
— triumfettaefolius Schum. et Thonn. I. 304. no. 20.
— truncatus A. Rich. I. 305. no. 38.
— *truncatus* Rxb. I. 303. no. 7.
— *tubulosus* Cav. I. 303. no. 6.
— urticaefolius St. Hil. et Naud. II. 790. no. 8.
— *velutinus* DC. I. 303. no. 6.
— *venustus* Blume. I. 309. no. 20.
— *verrucosus* Guillem. et Perr. I. 308. no. 7.
— versicolor Schum. et Thonn. I. 303. no. 19.
— virgatus Blume. I. 303. no. 10.
— vitifolius L. *I. 303. no. 7.
— Vrieseanus Hassk. I. 306. no. 52.
— *Wightianus* Wall. I. 302. no. 3.
— *Wrayae* Lindl. I. 311. no. 10.
— Youngianus Gandich. I. 306. no. 47.
Hidalgoa Lssng. *II. 604.
Hidrosia E. Mey. I. 660.
— bullata E. Mey. *I. 660. no. 1.
Hieracieae Lssng. II. 698. VI. 362.
Hieracioides DC. VI. 358. no. 5. 6. 7.
Hieracium Gmel. VI. 361. no. 6. α. β.
Hieracium Linn. II. 699. VI. 362.
— *Aetnense* Cup. VI. 336. no. 20.
— albiflorum Hook. * VI. 364. no. 10.
— *alpinum* DC. VI. 358. no. 6. α.
— angustifolium β. fuscum Moritzi. II. 699. †
— *arcticum* Fröl. VI. 361. no. 8.
— argutum Nutt. II. 699. no. 6.
— *barbatum* Nutt. VI. 361. no. 6.
— caespitosum Dumort. II. 699. no. 1.
—? *Californicum* DC. II. 691. no. 5.

Hieracium Canadense Michx. VI. 363. no. 5.
a. angustifolium.
β. latifolium.
— *Canadense β. scabrum* Schweinitz. VI. 363. no. 5. *a.*
— Castellanum Boiss. et Reut. II. 699. no. 5.
— *Chondrillae folio, flore parvo* Vaill. VI. 340. no. 2.
— *Chondrilloides saxatile hirsuto folio dentato* Cup. VI. 342. no. 1.
— *croceum* Lam. VI. 358. no. 4.
— diaphanum Fries. II. 699. no. 4.
— *fasciculatum* Prsh. VI. 363. no. 5.
— *foliis glabris semipinnatis* Hall. II. 686. no. 1.
— *foliis pinnatifidis hinc hastatis etc.* Gmel. VI. 358. no. 4.
— *foliis radicalibus obsrve ovatis* Gronov. VI. 364. no. 12.
— *glaucum* Lejeune. II. 699. no. 2.
— *gracile* Hook. VI. 364. no. 8.
— Gronovii Linn. *VI. 364. no. 12.
γ. hirsutissimum
β. subnudum.
— *Hookeri* Steud. VI. 364. no. 8.
— *Kalmii* Spr. VI. 363. no. 5.
— leptocephalum Bth. VI. 365. no. 15.
— *Lessertianum* Wall. VI. 354. no. 1.
— longipilum Torr. VI. 363. no. 6.
— Loxense Bth. VI. 363. no. 3.
— *macranthum* Nutt. VI. 363. no. 5. *a.*
— *macrophyllum* Prsh. VI. 363. no. 5.
— macrotrichum Boiss. VI. 362. no. 1.
— *Marianum* Willd. VI. 364. no. 12.
— *Marianum Pulmonariae Gallicae folio* Pluk. VI. 364. no. 12.
— *multicaule Bellidis folio molli* Bocc. VII. 343. no. 1.
— Olympicum Boiss. VI. 362. no. 2.
— pannosum Boiss. VI. 364 no. 13.
— Patogonicum Hook. fil. VI. 364. no. 7.
— *polytrichum* DC. VI. 358. no. 6. *a.*
— *polytrichum* Ldb. VI. 358. no. 6. *a.*
— *polytrichum δ. apricum* Bnge. VI. 358. no. 4.
— *polytrichum a. Gmelinianum* Bnge. VI. 358. no. 4.
— prasinum Dumort. II. 699. no. 2.
— *prenanthoides* Hook. VI. 363. no. 5. *β.*
— *prenanthoides* Lejeune. II. 699. no. 3.
— Reuteriannm Boiss. VI. 364. no. 11.
— rubricaule Dumort. II. 699. no. 3.
— *runcinatum* James. II. 697. no. 5.
— *runcinatum* Turcz. VI. 358. no. 6. *β.*
— Sartorianum Boiss. VI. 363. no. 4.
— *scabriusculum* Schweinitz. VI. 363. no. 5. *a.*
Hieracium Scouleri Hook. *VI. 364. no. 9.
— *subnudum* Froel. VI. 364. no. 12. *β.*
— Taygeteum Boiss. VI. 365. no. 14.
β. scapiferum.
— triste Willd. *VI. 364. no. 8.
— *umbellatum* Richards. VI. 363. no. 5. *a.*
— *variegatum* Lam. VI. 334. no. 15.
— *virgatum* Prsh. VI. 363. no. 5.
Hierocimum Bth. III 488.
Higginsia Pers. II. 515.
— Mexicana Lk. Kltzsch. et Otto. II. 515. no. 1.
Hildegardia Endl. °V. 104.
Hildegardia Schott. et Endl. I. 335. no. 11.
— *Candollei* Schott. et Endl. V. 104. no. 1.
— populifolia Wght. *V. 104. no 1.
Hillia Jcq II. 510. VI. 701.
— prasiantha N. ab E. VI. 701. no. 1.
— tubaeflora Cham. II. 510. no. 1.
Hilsenbergia Boj. II. 798. °V. 113.
— cannabina Boj. *II. 798. no. 1. V. 113. no. 1.
Hilsenbergia Tausch. III. 125. °III. 956. (*IV. 134.)
— Ehretia Tausch. *III. 125 no. 1.
Himatanthus Willd, *II. 524.
Himeranthus Endl. III. 105. °III. 955. °VI. 613.
— erosus Miers. VI. 614. no. 2.
— runcinatus Endl. III. 105. no. 1. VI. 614. no. 1.
—?? *runcinatus* Lam. III. 106. no. 3.
— tridentatus Miers. VI. 614. no. 3.
Hindsia Bth. °VI. 60.
— longiflora Bth. VI. 61. no. 2.
— ramosissima Gardn. VI. 61. no. 3.
— violacea Bth. VI. 60. no. 1.
Hippia Linn. *II. 643.
Hippieae Lssng. II. 643. II. 992. VI. 225.
Hippobromus Eckl. et Zeyh. I. 423.
— alatus Eckl. et Zeyh. *I. 423. no. 1.
Hippocastaneae DC. I. 423. V. 371.
HIPPOCASTANEAE DC. I. 411. V. 358.
Hippocastanum Endl. I. 423.
Hippocratea L. I. 400. II. 812. V. 146.
— affinis Cambess. I. 400. no. 6.
— Arnottiana Wght. I. 400. no. 2.
— floribunda Bth. V. 146. no. 1.
— Grahamii Wght. I. 400. no. 3.
— integrifolia A. Rich. II. 812. no. 1.
— micrantha Cambess. I. 400. no. 5.
— *obtusifolia* Grah. I. 400. no. 3.
— obtusifolia Rxb. *I. 400. no. 1.
— *obtusifolia* Rxb.? I. 400. no. 4.
— paniculata Vahl. I. 400. †
— Richardiana Cambess. I. 400. †
— rigida Spanoghe. I. 400. no. 4.

Hippocratea tortuosa Wall. I. 400. no. 1.
— *volubilis* Heyne I. 400. no. 1.
HIPPOCRATEACEAE Juss. I. 400. II. 812. V. 146.
Hippocrepis L. I. 724. II. 888. V. 519.
— ciliata DC. I. 725. †
— constricta Knze. I. 725. no. 4.
— cornigera Boiss. et Reut. II. 888. no. 2.
— cornigera Parlatore. V. 519. no. 1.
— glandulosa Prsl. I. 724. no. 1.
— multisiliquosa L. I. 725. †
— prostrata Boiss. I. 725. no. 3.
— Salzmanni Boiss. et Reut. II. 888. no. 1.
— Valentina Boiss. I. 725. no. 2.
Hippoglossum Valentinum Barrel. IV. 176. no. 9.
Hippomarathroides DC. (Seseli) II. 401. II. 938.
Hippomarathrum DC. II. 401.
Hippomarathrum Lnk. ° V. 914.
— *amplifolium* Ldb. II. 424. no. 4.
— Bocconi Boiss. V. 915. no. 3.
— *crispum* Koch. II. 424. no. 3.
— crispum Koch * V. 914. no. 1.
— cristatum Boiss. V. 915. no. 4.
— *Ibericum* DC.? II. 424. no. 4.
— pterochlaenum Boiss. V. 915. no. 2.
Hippothronia undata Schrank. III. 562. no. 176.
Hippotis Rz. et Pav. * II. 517.
— *pyrifolia* Bert. II. 473. no. 14.
— *triflora* Bert. II. 473. no. 13.
Hippuris Linn. * II. 98.
Hiptage Grtnr. ° V. 293.
— acuminata Wall. V. 294. no. 6.
— Javanica Blume. V. 294. no. 2.
— laurifolia Adr. Juss. V. 294. no. 3.
— madablota Grtnr. V. 294. no. 1.
— obtusifolia DC. V. 294. no. 5.
— parvifolia Wght. et Arn. V. 294. no. 4.
Hiraea Jcq. ° V. 320.
Hiraea Jcq. V. 332.
— *acuminata* DC. V. 348. no. 14.
— acutifolia H. B. Kth. V. 321. no. 8.
— ambigua Adr. Juss. V. 326. no. 17.
β. lanata.
— anisopetala Adr. Juss. V. 323. no. 13.
— argentea Adr. Juss. V. 325. no. 16.
— Bahiensis Moricand. V. 333. no. 36.
— Barclayana Bth. V. 331. no. 32.
— bicrosa Martius. V. 322. no. 10.
— Blanchetiana Moricand. V. 333. no. 37.
— *bunchosioides* Adr. Juss. V. 197. no. 2.
— *candicans* A. Rich. V. 266. no. 31.
— chlorocarpa Adr. Juss. V. 328. no. 24.
— chrysophylla Adr. Juss. V. 336. no. 48.
Hiraea complicata H. B. Kth. V. 321. no. 6.
— *concava* Wall. V. 297. no. 2.
— *cordata* Heyne. V. 298. no. 8.
— cordifolia Adr. Juss. V. 323. no. 12.
— crassipes Adr. Juss. V. 334. no. 39.
— *crispa* Rich. V. 303. no. 8.
— cuneata Griseb. V. 335. no. 44.
— *cyclocarpa* Poepp. V. 321. no. 1.
— *cycloptera* Hook. et Arn. V. 346. no. 7.
— denticulata Adr. Juss. V. 332. no. 34.
— divaricata H. B. Kth. V. 321. no. 4.
— elegans Adr. Juss. V. 320. no. 1.
— *elliptica* Blume. V. 297. no. 1.
— Gaudichaudiana Adr Juss. V. 336. no. 45.
— fagifolia Adr. Juss. V. 333. no. 38.
— Fluminensis Griseb. V. 330. no. 29.
— fulgens Adr. Juss. V. 336. no. 47.
β. Demararensis.
— *glabriuscula* Wall. V. 298. no. 5.
— heteropetala Adr. Juss. V. 327. no. 20.
— *hirsuta* Wall. V. 298. no. 6.
— Hookeriana Adr. Juss. V. 334. no. 41.
— Houlletiana Adr. Juss. V. 337. no. 51.
— *hypericoides* Burch. V. 295. no. 1.
— *Indica* Rxb. V. 298. no. 4.
— *intermedia* Adr. Juss. V. 275. no. 58.
— Kunthiana Adr. Juss. V. 335. no. 43.
— *lanuginosa* Wall. V. 298. no. 7.
— lasiandra Adr. Juss. V. 328. no. 22.
— laurifolia Adr. Juss. V. 326. no. 18.
— *leucosepala* Griseb. V. 309. no. 25.
— *longifolia* Rich. V. 340. no. 1.
— macradena DC. V. 321. no. 3.
— microphylla Adr. Juss. V. 324. no. 14.
—? macroptera DC. V. 329. no. 25.
— maritima Adr. Juss. V. 330. no. 28.
— Moricandia Adr. Juss. V. 332. no. 33.
— *mucronata* DC. V. 348. no. 12.
— *mucranata* Rich. V. 340. no. 1.
— *multiflora* Griseb. V. 311. no. 29.
— multiradiata Adr. Juss. V. 338. no. 53.
— nitida H. B. Kth. V. 321. no. 7.
— *nutans* Rxb. V. 299. no. 9.
— oblongifolia DC. V. 321. no. 2.
— *obscura* Blume. V. 222. no. 6.
— *odorata* Willd. V. 296. no. 3.
— *ovata* Blume. V. 222. no. 6.
— *oxyota* DC. V. 348. no. 13.
— *oxyphylla* Wall. V. 297. no. 3.
— *pauciflora* Adr. Juss. V. 275. no. 60.
— *pinnata* Willd. V. 296. no. 4.
— *platyptera* Griseb. V. 331. no. 30.
— *podocarpa* DC. V. 348. no. 11.
— Poeppigana Adr. Juss. V. 326. no. 19.
— polybotrya Adr. Juss. V. 322. no. 11.
— prunifolia H. B. Kth. V. 321. no. 5.

Hiraea psilophylla Adr. Juss. V. 331. no. 30.
— pubiflora Adr. Juss. V. 329. no. 26.
— reclinata Blanco. V. 295. ad no. 6. adnot.
— *reclinata* Blanco. V. 335. no. 42.
— reclinata Jcq. V. 335. no. 42.
— renitens Adr. Juss. V. 327. no. 21.
— Riedleyana Adr. Juss. V. 334. no. 40.
— rigida Adr. Juss. V. 329. no. 27.
— *rotundifolia* Rxb. V. 299. no. 10.
— salicifolia Adr. Juss. V. 325. no. 15.
— Salzmanniana Adr. Juss. V. 333. no. 35.
— sepium Adr. Juss. V. 322. no. 9.
— septentrionalis Adr. Juss. V. 331. no. 31.
— *sericea* Adr. Juss. V. 308. no. 22.
— sericifolia Adr. Juss. V. 337. no. 49.
— Simsiana Adr. Juss. V. 328. no. 23.
— Swartziana Adr. Juss. V. 336. no. 46.
— ternifolia Adr. Juss. V. 338. no. 52.
— *tomentosa* Blume. V. 299. no. 11.
— Wiedeana Adr. Juss. V. 337. no. 50.
Hiraeeae Adr. Juss. V. 290.
Hirculus DC. II. 364. no. 22. 26. 28.
Hirpicium Cass. *II. 666.
Hirschfeldia adpressa Mnch. I. 185. no. 11. adn. I. 186. no. 5.
— *inflexa* Prsl. I. 187. no. 6.
— *integrifolia* Prsl. I. 187. no. 7.
Hirtella L. II. 3. V. 646.
— Acayacensis DC. *II. 4. no. 28.
— *aggregata* Poir. II. 4. no. 21.
— Americana Aubl. *II. 3. no. 3.
— *Americana* Jcq. II. 4. no. 12.
— angustifolia Schott. *II. 3. no. 10.
— bicornis Mart. et Zucc. II. 4. no. 26.
— bracteata Mart. et Zucc. II. 4. no. 17.
— bracteosa Steudel. V. 646. no. 4.
— bullata Bth. II. 4. no. 13.
— castanea DC. *II. 3. no. 4.
— ciliata Mart. et Zucc. II. 4. no. 23.
— cognata Steudel. V. 646. no. 5.
— coriacea Mart. et Zucc. II. 3. no. 8.
— corymbosa Schlchtd. II. 4. no. 27.
— Cosmibuena Lam. *II. 4. no. 19.
— *elliptica* Prsl. II. 4. no. 12.
— elongata Mart. et Zucc. II. 4. no. 18.
— eriandra Bth. II. 4. no. 15.
— filiformis Prsl. II. 3. no. 11.
— floribunda Cham. et Schlchtd. II. 3. no. 1.
— glaberrima Steudel. V. 646. no. 3.
— glandulosa Spr. *II. 4. no. 22.
— hebeclada Moric. *II. 3. no. 9.
— hexandra Willd. *II. 3. no. 7.
— *hirsuta* Lam. II. 4. no. 21.
— mollicoma H. B. Kth. *II. 4. no. 20.
— *nemorosa* Willd. II. 3. no. 7.
— *nitida* Willd. II. 3. no. 7.
Hirtella oblongifolia DC. *II. 3. no. 6.
— *octandra* Willd. II. 5. no. 7.
— *paniculata* Lam. II. 4. no. 12.
— paniculata Swrtz. *II. 4. no. 21.
— pendula Soland. *II. 4. no. 24.
— *Peruviana* Pers. II. 4. no. 19.
— physophora Mart. et Zucc. II. 4. no. 25.
— pilosissima Mart. et Zucc. II. 3. no. 2.
— *polyandra* H. B. Kth. II. 6. no. 3.
— *Portoricensis* Willd. II. 3. no. 5.
— *racemosa* Lam. II. 3 no. 3.
— *racemosa* Rz. et Pav. II. 4. no. 19.
— rubra Bth. II. 4. no. 14.
— rugosa Pers. *II. 3. no. 5.
— scabra Bth. II. 4. no. 16.
— *scandens* Willd. II. 3. no. 7.
— strigulosa Steudel. V. 646. no. 2.
— tentaculata Poepp. et Endl. V. 646. no. 6.
— *tomentella* Schott. II. 4. no. 23.
— triandra Swrtz. *II. 4. no. 12.
— violacea Steudel. V. 646. no. 1.
Hisingera Hellen. V. 57.
— nitida Hellen. V. 57. no. 1.
— racemosa Sieb. et Zucc. V. 57. no. 2.
Hispidella Barnad. *II. 683. *VI. 327.
Hisutsua DC. II. 636.
— serrata Hook. et Arn. II. 636. no. 1.
Hladnikia Koch. V. 921.
— cicutaria Boiss. V. 921. no. 1.
— *Golakensis* Koch. II. 425. no. 1.
Hoarea Eckl. et Zeyh. I. 451.
Hoarea Sweet. I. 451.
— angustifolia Eckl. et Zeyh. *I. 451. no. 5.
— appendiculata Eckl. et Zeyh. *I. 453. no. 35.
— astragalifolia Eckl. et Zeyh. *I. 453. no. 31.
— aurita Eckl. et Zeyh. *I. 451. no. 2.
— bijuga Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 33.
— bipinnatifida Eckl. et Zeyh. I. 452. no. 16.
— campestris Eckl. et Zeyh. I. 452. no. 19.
— ciliata Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 10.
— ensata Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 7.
— erythrophylla Eckl. et Zeyh. I. 451. no. 1.
— eupatoriifolia Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 28.
— fissifolia Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 15.
— foliolosa Eckl. et Zeyh. *I. 453. no. 30.
— gracilis Eckl. et Zeyh. I. 452. no. 25.
— heterophylla Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 22.
— hirsuta Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 21.
— laciniata Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 14.
— lancifolia Eckl. et Zeyh. I. 451. no. 4.
— lessertiaefolia Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 29.
— linearis Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 12.
— ornithopifolia Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 32.
— parnassioides Eckl. et Zeyh. *I. 451. no. 3.
— pectinata Eckl. et Zeyh. *I. 451. no. 6.
— penniformis Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 17.

Hoarea pilosellaefolia Eckl. et Zeyh. I. 452. no. 9.
— pinnata Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 26.
— prolifera Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 18.
— purpurascens Pers. *I. 452. no. 13.
— radiata Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 11.
— *reticulata* Sweet. *I. 451. no. 6.
— rhoeadifolia Eckl. et Zeyh. I. 452. no. 23.
— rapacea Eckl. et Zeyh. *I. 453. no. 34.
— setosa Eckl. et Zeyh. *I. 452. no. 20.
— strigosa Eckl. et Zeyh. I. 452. no. 8.
— theiantha Eckl. et Zeyh. I. 452. no. 24.
— trifoliolata Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 27.
Hochstetteria DC. *II. 601. *II. 953. no. 2.
Hockinia Gardn. *VI. 503.
Hoffmannia Swrtz. *II. 514.
Hoffmannseggia Cav. I. 811.
— Drummondii Torr. et Gr. I. 811. no. 1.
— glandulosa Willd. I. 811. no. 3.
— gracilis Hook. et Arn. I. 811. no. 2.
— *Jamesii* Torr. et Gr. I. 811. no. 1.
Hofmeisteria Wlprs. °VI. 106.
— fasciculata Wlprs. VI. 106. no. 2.
— urenifolia Wlprs. VI. 106. no. 1.
Hohenackeria Fisch. et Mey. II. 391.
— bupleurifolia Fisch. et Mey. *II. 391. no. 1.
Hoheria A. Cunn. I. 331. V. 97.
— populnea A. Cunn. *I. 331. no. 1. V. 97. no. 1.
Hoitzia coccinea Cav. VI. 527. no. 6.
— *floribunda* Martens et Galeotti. VI. 527. no. 5.
— *pumila* Martens et Galeotti. VI. 527. no. 4.
— *ramosissima* Martens et Galeotti. V. 526. no. 1.
— *scabra* Martens et Galeotti. VI. 527. no. 2.
— *scariosa* Martens et Galeotti. VI. 527. no. 3.
Holarges DC. I. 150.
Holargidium Turcz. II. 758.
— Kusnetzowii Ledeb. *II. 758. no. 1.
Holarrhena R. Br. *VI. 472.
Holigarna Rxbg. *I. 555.
Hollboellia Wall. I. 99.
— angustifolia Wall. I. 99. no. 2.
— latifolia Wall. I. 99. no. 1.
Holmskioldia Retz. III. 894. °III. 940.
— sanguinea Retz. III. 894. no. 1.
Holochiloma Hochstett. IV. 97.
— resinosum Hochstett. IV. 97. no. 1.
Holochlaina G. Don. III. 62. VI. 594.
Holochloa Nutt. II. 369.
— *cylindrica* Nutt. II. 370. no. 9.
— *elata* Nutt. II. 370. no. 9.
— *glabra* Nutt. II. 370. no. 10.
— *ovalifolia* Nutt. II. 370. no. 11.
Hologymne Bartl. II. 635. adn.
Hologymne Douglasii C. A. Mey. II. 635. no. 2. adn.
— glabrata Bartl. II. 635. no. 1. adn.
Hololachne Ehrnbrg. II. 268. V. 808.
— Soongarica Ehrnbrg. V. 808. no. 1.
Hololepis DC. VI. 89.
Holopetalum Turczan. °V. 33.
— pumilum Turczan. V. 33. no. 1.
Holophylla G. Don. (Solanum) III. 51.
Holophyllum Lssng. *II. 638.
Holosepalum Choisy. I. 384. no. 10.
Holostemma R. Br. *VI. 485.
Holosteum mucronatum Moç. et Sess. I. 265. no. 5.
Holostigma G. Don. *VI. 375.
— *alyssoides* Hook. II. 78. no. 11.
— *Bottae* Spach. II. 77. no. 2.
— *cheiranthifolium* Spach. II. 77. no. 3.
— *heterophyllum* Spach. II. 78. no. 8.
— *micranthum* Spach. II. 77. no. 77. no. 4.
— *paradoxum* Spach. II. 76. no. 2.
— *spirale* Spach. II. 77. no. 3.
— *virgatum* Spach. II. 78. no. 7.
Holostyla DC. *II. 490.
Holotome Bth. II. 387. V. 844.
— leucocephala Bth. *II. 387. no. 1. V. 844. no. 1.
HOMALINEAE R. Br. I. 548. V. 408.
Homalium Jcq. *I. 548. V. 408.
— Surinamense Steudel. V. 408. no. 1.
Homalobus Nutt. I. 711.
— brachycaspus Nutt. I. 712. no. 9.
— caespitosus Nutt. I. 711. no. 8.
— campestris Nutt. I. 711. no. 3.
— canescens Nutt. I. 712. no. 10.
— decumbens Nutt. I. 711. no. 6.
— dispar Nutt. I. 711. no. 1. (III. Emend. p. 4.)
— junceus Nutt. I. 711. no. 4. (III. Emend. p. 4.)
— multiflorus Torr. et Gr. I. 711. no. 2.
— *nigrescens* Nutt. I. 711. no. 2.
— orthocarpus Nutt. I. 711. no. 5. (III Emend. p. 4.)
— tenuifolius Nutt. I. 711. no. 7. (III. Emend. p. 4.)
Homalocarpos DC. I. 30.
Homalocarpus Hook. et Arn. II. 387. V. 843.
— bowlesioides Hook. et Arn. *II. 387. no. 1. V. 843. no. 1.
Homalospermum Schauer. II. 923. °V. 740.
— firmum Schauer. *II. 923. no. 1. *V. 740. no. 1.
Homalotes DC. *II. 638. (nec Homolotes)
Homalotes DC. II. 642.
Homalotheca Endl. II. 647.

Homanthis echinulata Hombron et Jacquinot. VI. 824. no. 4.
Homochilus DC. II. 707. V. 377. no. 17.
Homochroma DC. *II. 587. *II. 952. no. 26.
Homoeacantha Pfeiff. II. 283.
Homogyne Cass. *II. 557.
Homoianthus DC. VI. 324.
— *echinulatus* Cass. II. 992. no. 1.
— echinulatus Cass. *VI. 324. no. 4.
— inermis Meyen et Wlprs. VI. 324. no. 1.
— Magellanicus DC. *VI. 324. no. 5.
β. lactucoides.
— multiflorus Don. *VI. 324. no. 3.
— scaber Bth. VI. 324. no. 2.
Homopappus Nutt. II. 591. *II. 952. no. 44.
Homopappus Nutt. II. 969.
— argutus Nutt. II. 591. no. 3.
— *argutus* Nutt. II. 969. no. 5.
— glomeratus Nutt. II. 591. no. 2.
— inuloides Nutt. II. 591. no. 8.
— *inuloides* Nutt. II. 968. no. 5.
— multiflorus Nutt. II. 591. no. 9.
— *multiflorus* Nutt. II. 968. no. 3.
— paniculatus Nutt. II. 591. no. 1.
— *paniculatus* Nutt. II. 969. no. 4.
— racemosus Nutt. II. 591. no. 6.
— *racemosus* Nutt. 969. no. 3.
—? spathulatus Nutt. II. 591. no. 4.
—? squarrosus Nutt. *II. 591. no. 5.
— uniflorus Nutt. *II. 591. no. 7.
— *uniflorus* Nutt. II. 968. no. 4.
Homophylla Jaub. et Spach. II. 842.
Homoranthus All. Cunn. II. 154. [°V. 729.]
— flavescens A. Cun. II. 154. no. 1.
— virgatus A. Cunn. II. 154. no. 2.
Homostylium N. ab E. °VI. 120.
— Cabulicum N. ab E. *VI. 120. no. 1.
Honkenya Willd. I. 354.
Hoodia Sweet. *VI. 495.
Hopea Rxb. V. 127.
— Balangeran Krthls. V. 128. no. 5.
— *dichotoma* Vahl. VI. 502. no. 1.
— eglandulosa Vahl. V. 128. no. 7.
— odorata Rxb. V. 128. no. 4.
— glabra Wght. et Arn. V. 128. no. 2.
— Sangal Krthls. V. 128. no. 6.
— scaphula Rxb. V. 128. no. 8.
— Selanica Wght et Arn. V. 128. no. 3.
— Wightiana Wall. V. 127. no. 1.
Hopkirkia DC. *II. 627.
Hoplophyllum DC. II. 541.
— spinosum DC. *II. 541. no. 1.
Horkelia Cham. et Schlchtd. II. 36.
— Californica Cham. et Schlchtd. II. 35. no. 1.
— capitata Lindl. II. 36. no. 6.
— congesta Hook. II. 36. no. 2.
Horkelia cuneata Lindl. II. 36. no. 4.
— *Douglasiana* Nutt. II. 36. no. 4.
— fusca Lindl. II. 36. no. 3.
— *grandis* Hook. et Arn. II. 36. no. 1.
— *hirsuta* Lindl. II. no. 2.
— parviflora Nutt. II. 36. no. 5.
— *pilosa* Nutt. II. 36. no. 2.
Hormineae Endl. III. 686. III. 981.
Horminum Bth. III. 610.
Horminum Bth. III. 686. °III. 981.
Horminum etc. Barr. III. 626. no. 96. *β*.
— *caulescens* Ortega. III. 846. no. 1.
— *clinopodiifolium* Pers. III. 594. no. 18.
— *coccineum* Moench. III. 661. no. 241.
— *coloratum* Moench. III. 611. no. 47.
— *discrmas* Moench. III. 623. no. 87.
— *lyratum* Mill. III. 674. no. 294.
— *Niloticum* Moench. III. 672. no. 284.
— Pyrenaicum Linn. III. 686. no. 1.
— *sativum* Mill. III. 611. no. 47.
— *suaveolens* Moench. III. 614. no. 56.
— *tenui Coronopi folio* Moris. III. 395. no. 15.
— *verbenaceum* Mill. III. 626. no. 95.
— *verticillatum* Mill. III. 678. no. 307.
— *Virginicum* Linn. III. 674. no. 294.
— *viride* Moench. III. 610. no. 46.
Hormogyne Alph. DC. VI. 455.
— cotinifolia Alph. DC. *VI. 455. no. 1.
Hornemannia Bth. *VI. 644.
— *bicolor* Willd. III. 272. no. 2.
— *ovata* Lnk. et Otto. III. 292. no. 4.
— *viscosa* Willd. III. 292. no. 7.
Hornera Jungh. I. 549.
— glomerata Jungh. I. 549. no. 2.
— umbellata Jungh. I. 549. no. 1.
Hornia DC. II. 476.
Hornschuchia hypericina Blume. I. 391. no. 1.
Horrida Elkan. I. 114. (Papaver)
Horridi Boiss. (Echinops) VI. 280.
Horsfieldia Blume. II. 391.
— aculeata Blume. *II. 391. no. 1.
Hortia Vandelli. I. 501.
— Brasiliana Vand. *I. 591. no. 1.
Hortonia Wght. II. 748.
— floribunda Wght. *II. 748. no. 1.
Hosackia Dougl. I. 648. II. 855.
— angustifolia G. Don. II. 855. no. 1.
— bicolor Dougl. I. 648. no. 1.
— crassifolia Bth. I. 648. no. 6.
— crassifolia Torr. et Gr. I. 649. no. 15.
β. rubescens (III. Emend. p. 3.)
— cytisoides Bth. I. 649. no. 12.
— decumbens Bth. I. 649. no. 9.
β. glabriuscula Arn.
— elata Nutt. I. 650. no. 27. (III. Emend. p. 3.)

Hosackia floribunda Nutt. I. 650. no. 28.
— gracilis Bth. I. 648. no. 3.
— grandiflora Bth. I. 649. no. 8. (III. Emend. p. 3.)
— *Indica* Grah. I. 606. no. 1.
— juncea Bth. I. 649. no. 14.
— maritima Nutt. I. 650. no. 23.
— micrantha Torr. et Gr. I. 649. no. 11. (III. Emend. p. 3.)
— microphylla Nutt. I. 650. no. 19.
— mollis Nutt. I. 651. no. 30. (III. Emend. p. 3.)
— nudiflora Nutt. I. 650. no. 20.
— ochroleuca Nutt. I. 648. no. 7.
— parviflora Bth. I. 649. no. 18.
— pilosa Nutt. I. 650. no. 29.
— platycarpa Nutt. I. 648. no. 4. (III. Emend. p. 3.)
— prostrata Torr. et Gr. I. 649. no. 13.
— Purshiana Bth. I. 650. no. 26.
— repens G. Don. II. 855. no. 2.
— rubella Nutt. I. 650. no. 22.
— scoparia Torr. et Gr. I. 649. no. 16.
— sericea Bth. I. 649. no. 17.
— stipularis Bth. I. 748. no. 5.
— stolonifera Lindl. I. 648. no. 2.
— strigosa Nutt. I. 650. no. 21.
— subpinnata Torr. et Gr. I. 650. no. 24.
— tomentosa Hook. et Arn. I. 649. no. 10.
— unifoliolata Hook. I. 649. adn.
— Wrangeliana Torr. et Gr. I. 650. no. 25.
Hoslundia Vahl. III. 931. °III. 992.
— opposita Vahl. III. 931. no. 1.
— verticillata Vahl. III. 932. no 2.
Hosta Jcq. IV. 80.
— coerulea Jcq. IV. 80. no. 1.
— *grandiflora* Alb. Dietr. IV. 80. no. 2.
— grandifolia Cham. et Schlchtd. IV. 80. no. 2.
— latifolia H. B. Kth. IV. 81. no. 5.
— longifolia H. B. Kth. IV. 81. no. 4.
— odorata Poeppig. et Endl. IV. 80. no. 3.
— *pyramidata* A. Dietr. IV. 125. no. 1.
Hostana coerulea Pers. IV. 80. no. 1.
Hostmannia Planchon. ° V. 400.
— elvasioides Planchon. * V. 400. no. 1.
Hoteia Morr. et Dcne. II. 372.
— biternata Morr. et Dcne. * II. 372. no. 2.
— Japonica Morr. et Dcne. II. 372. no. 1.
Hottonia L. * VI. 439.
— *Indica* Linn. III. 273. no. 6.
Hottonieae Endl. VI. 439.
Houstonia Linn. II. 495.
— *angustifolia* Michx. II. 496. no. 39.
— *angustifolia* Prsh. II. 496. no. 38.
— *coerulea* Auctor. II. 495. no. 30.
— *Canadensis* Mühlbrg. II. 496. no. 37.
Houstonia ciliolata Torr. II. 496. no. 37.
— *coerulea* Linn. II. 495. no. 32.
— *Linnaei* α. *elatior* Michx. II. 495. no. 32.
— *longifolia* Gaertn. II. 496. no. 38.
— *macrosepala* Nutt. II. 496. no. 36.
— *minima* Beck. II. 495. no. 31.
— *patens* Ell. II. 495. no. 32.
— *pubescens* Raf. II. 496. no. 36.
— *purpurea* Linn. II. 496. no. 36.
— *pusilla* Schoepf. II. 495. no. 32.
— *rotundifolia* Michx. II. 496. no. 34.
— *serpyllifolia* Grah. II. 496. no. 37.
— *serpyllifolia* Michx. II. 496. no. 33.
— *tenella* Prsh. II. 496. no. 33.
— *tenuifolia* Nutt. II. 496. no. 38.
— *umbellata* Walt. II. 496. no. 36.
— *varians* Michx. II. 496. no. 36.
Hovea R. Br. I. 576. II. 832. V. 433.
— acutifolia Cunn. II. 832. no. 3.
— apiculata Cunn. II. 832. no. 1.
— Celsi Bonpl. I. 577. † V. 433. †
— chorozemaefolia DC. I. 577. †
— *chorozemaefolia* DC. I. 577. no. 1.
— crispa Lindl. I. 577. no. 5.
— ilicifolia A. Cunn. V. 433. no. 2.
— lanceolata DC. I. 577. †
— linearis R. Br. V. 433. †
— longipes Bth. I. 577. no. 8.
— Manglesii Lindl. I. 577. no. 4.
— mucronata Cunn. II. 832. no. 2.
— pannosa Cunn. I. 577. no. 3.
— pungens Bth. I. 577. no. 6. V. 433. †
— purpurea Sweet. I. 576. no. 1.
— racemulosa Lindl. I. 577. no. 9.
— rosmarinifolia Cunn. II. 832. no. 4.
— splendens Hortor.? V. 433. †
— stricta Meisn. V. 433. no. 1.
— trisperma Bth. I. 577. no. 7.
Hoya R. Br. VI. 494.
— *Africana* Dcne. VI. 491. no. 1.
— *campanulata* Blume. VI. 493. no. 1.
— imbricata Dcne. * VI. 494. no. 1.
— imperialis Lindl. VI. 743. no. 1.
— variegata Siebold. VI. 743. no. 2.
Huanaca Lag. * II. 387.
Huberia DC. II. 118.
— ovalifolia DC. * II. 118. no. 1.
— *resinosa* Prsl. II. 118. no. 1.
Hudsonia L. I. 213.
— ericoides L. * I. 213. no. 1.
— tomentosa Nutt. * I. 213. no. 2.
Hügelia R. Br. * I. 506.
Hünefeldia Wlprs. II. 584. * II. 951. no. 4. * VI. 125.
— angustifolia Wlprs. II. 584. no. 2.
— coronopifolia Wlprs. II. 584. no. 1.

Huërnia R. Br. *VI. 495.
Huertea Rz. et Pav. * I. 557.
Hugonia L. I. 366.
— ferruginea Wght. et Arn. I. 366. no. 1.
— mystax L. *I. 366. no. 2.
Hugoniaceae Endl. I. 366.
Hulthemia Dumort. II. 13.
— berberifolia Dumort. *II. 13. no. 1.
Humbertia Lam. * VI. 529.
Humboldtia Vahl. I. 844.
— Brunonis Wall. I. 844. no. 1.
Humea Sm. * II. 644.
— *elata* Rxb. V. 119. no. 1.
Humiria DC. I. 425. V. 372.
— *balsamifera* Aubl. I. 425. no. 1.
HUMIRIACEAE Mart. I. 425. II. 816. V. 372.
Humirium Mart. 425. II. 816. V. 372.
— balsamiferum Mart. *I. 425. no. 1.
— crassifolium Mart. I. 425. no. 2.
—? densiflorum Bth. II. 816. no. 3.
— dentatum Casaretto. V. 372. no. 1.
— floribundum Mart. I. 425. no. 3.
— Guianense Bth. II. 816. no. 2.
— montanum Adr. Juss. I. 425. no. 5.
— obovatum Bth. II. 816. no. 1.
— parvifolium Adr. Juss. I. 425. no. 4.
Hummatu Rheede. III. 17. no. 12.
Hunnemannia Sweet. I. 116.
— fumariaefolia Sweet. *I. 116. no. 1.
Hunnemannieae Bernh. I. 116.
Hunteria Rxb * VI. 468.
Hutchinsia R. Br. I. 175. II. 761. V. 42.
— alba Bnge. *I. 175. no. 3.
— aurea Fnzl. II. 761. no. 1.
— bifurcata Bnge. I. 175. no. 2.
— calycina Desvx. I. 176. †
— *calycina* Desvx. I. 171. no. 2.
— chrysantha Jaub. et Spach. V. 42. no. 1.
— pectinata Bnge. I. 175. no. 1.
  α. canescens.
  β. viridis.
— *procumbens* DC. I. 174. no. 1.
— *trinervia* DC. I. 175. no. 1.
Hyalaea DC. VI. 232.
Hyalis Don. *II. 679. *VI. 318.
Hyalolepis DC. *II. 643.
Hyalosperma Steetz. °VI. 242.
— glutinosum Steetz. VI. 242. no. 2.
— strictum Steetz. VI. 242. no. 1.
Hyalostemma Wall. I. 91.
— *dioica* Wall. I. 91. no. 1.
— Roxburghiana Wall. *I. 91. no. 1.
Hybanthera Endl. VI. 491.
— cordifolia Lnk. Kltzsch. et Otto. VI. 491. no. 2
— Javanica Hsskrl. VI. 491. no. 1.
Hybotropis E. Mey. I. 580.
Hydatica DC. II. 364. no. 18. 19. II. 366. no. 29—32. V. 825. no. 10. 11.
Hydnocarpus Gaertn. I. 206. V. 58 b.
— inebrians Vahl. *I. 206. no. 1. *V. 58 b. no. 1.
— *venenata* Grtnr. V. 58 b. no. 1.
Hydnophytum W. Jack. *II. 486.
Hydrangea Linn. II. 375. V. 835.
— acuminata Sieb. et Zucc. II. 376. no. 6.
— *alternifolia* Sieb. II. 377. no. 1. V. 835. no. 1.
— Azizaï Siebold. II. 375. no. 1.
— Belzoni Sieb. et Zucc. II. 376. no. 5.
— bracteata Sieb. et Zuc. II. 377. no. 14.
— cordifolia Sieb. et Zucc. II. 376. no. 9.
— *cordifolia var.* Sieb. et Zucc. II. 377. no. 14.
— hirta Sieb. et Zucc. II. 376. no. 12.
— involucrata Sieb. II. 376. no. 13.
— Japonica Siebold. II. 375. no. 3. *V. 835. no. 1.
— Otaksa Sieb. et Zucc. II. 375. no. 2.
— paniculata Sieb. II. 376. no. 11.
— *Peruviana* Moris. II. 377. no. 2.
— petiolaris Sieb. et Zucc. II. 376. no. 4.
— pubescens Courtois. II. 377. no. 15.
— *radiata* var.? Willd II. 377. no. 15.
— *scandens* Poepp. II. 377. no. 1.
— *Sits'tan* Sieb. II. 376. no 8.
— stellata Sieb. et Zucc. II. 376. no 8.
— Thunbergii Sieb. II. 376. no. 7.
— virens Sieb. *II. 376. no. 10.
Hydrangeae DC. II. 375. V. 835.
Hydranthelium Kth. III. 297. °III. 966. *VI. 644.
— callitrichoides Kth. III. 297. no. 1.
Hydrastis Lam. I. 59. no. 1.
Hydrastis L. I. 32.
— Canadensis L. *I. 32. no. 1.
Hydrocera Blume. I. 476.
— angustifolia Blume. I. 476. no. 1.
— Madagascariensis Endl. I. 476. no. 3.
— triflora Wght. et Arn. *I. 476. no. 2.
Hydrocotyle Tournef. II. 381. II. 937. V. 838.
— affinis Eckl. et Zeyh. II. 382. no. 17.
— alpestris Gardn. V. 838. no. 2.
— alpina Eckl. et Zeyh. II. 382. no. 13.
— Asiatica Linn. *II. 381. no. 2.
— *bipinnata* Mühlbrg. II. 384. no. 1.
— Brasiliensis Scheidw. II. 383. no. 24.
— Caffra Meisn. II. 937. no. 1.
— callicarpa Bnge. V. 839. no. 4.
— callicephala Cham. II. 383. no. 25.
— cordifolia J. D. Hook. II. 384. no. 27.
— cymbalaria Bth. II. 384. no. 28.
— debilis Eckl. et Zeyh. II. 382. no. 16.

Hydrocotyle dichondraefolia A. Cunn. II. 384. no. 30.
— difformis Eckl. et Zeyh. II. 382. no. 11.
β. approximata.
δ. divaricata.
γ. intermedia.
— eriantha Rich. *II. 381. no. 5.
β. major.
— falcata Eckl. et Zeyh. II. 382. no. 15.
β. angustifolia.
γ. lanceolata.
— filicaulis Eckl. et Zeyh. II. 383. no. 22.
— flexuosa Eckl. et Zeyh. II. 381. no. 7.
— fusca Eckl. et Zeyh. II. 383. no. 18.
— hederaefolia Burch. *II. 381. no. 8.
— hermanniaefolia Eckl. et Zeyh. II. 382. no. 10.
β. brevifolia.
— hispidula Bnge. V. 839. no. 3.
— lanuginosa Eckl. et Zeyh. II. 383. no. 21.
— littoralis Eckl. et Zeyh. II. 382 no. 12.
— macrocarpa Rich. *II. 383. no. 20.
δ. longifolia.
β. minor.
γ. robusta.
— *macrodus* Spr. II. 381. no. 8.
— microphylla A. Cunn. II. 384. no. 29.
— pallida DC. *II. 381. no. 6. (c. var. β. ibid.)
— pleiantha Cesati. II. 381. no. 1.
— polycephala Wght. et Arn. II. 381. no. 4.
— nigrescens Eckl. et Zeyh. II. 383. no. 19.
— rotundifolia Rchb. II. 384. †
— *rotundifolia* Wall. II. 381. no. 2.
— rupestris Eckl. et Zeyh. II. 382. no. 14.
— scaposa Steudel. V. 838. no. 1.
— striata Bth. II. 384. no. 26.
— tenella Don. *II. 381. no. 3.
— tetragonocarpa Bnge. V. 839. no. 5.
— trichophylla Eckl. et Zeyh. II. 383. no. 23.
— tripartita R. Br. II. 384. †
— villosa Linn. *II. 381. no. 9.
γ. lanceolata.
β. latifolia.
— *virgata α.* Cham. et Schlchtd. II. 383. no. 21.
— *virgata β. minor* Cham. et Schlchtd. II. 383. no. 20.
— *virgata var. γ.* Cham. et Schlchtd. II. 383. no. 20. γ.
— *virgata δ.* Cham. et Schlchtd. II. 382. no. 13.
— *Wightiana* Wall. II. 381. no. 3.
Hydrocotyleae DC. II. 381. V. 838.
Hydrolea Linn. VI. 565.
— extraaxillaris Morren. VI. 565. no. 1.
— spinosa Linn. *VI. 745. no. 1. †
HYDROLEACEAE Choisy. VI. 565.
Hydroleae Choisy. VI. 565.
Hydrolia Pet. Thouars. *VI. 565.
HYDROPELTIDEAE DC. (ex p.) I. 105. V. 19.
Hydropeltis purpurea Michx. I. 105. no. 1.
Hydrophylax Linn. *III. 463.
HYDROPHYLLACEAE Alph. DC VI. 524.
HYDROPHYLLEAE R. Br. VI. 524.
Hydrophyllum Tournef. *VI. 524.
Hydropiper Buxb. V. 85. no. 5.
Hydropityon pedunculatum Ser. III. 273. no. 6.
Hydrospondylus Hsskrl. °V. 671.
— submersus Hsskrl. V. 671. no. 1.
Hydrotriche Zuccar. III. 285. °III. 965. *VI. 649.
— *Beccabunga* Juss. III. 283. no. 39.
— hottoniaeflora Zuccar. *III. 285. no. 1.
Hylacium Palis. *II. 489.
Hylaea Griseb. VI. 23.
Hylas pinnatus Bigel. II. 98. no. 6. γ.
Hylora Griseb. VI. 12.
Hymenaea Endl. (ex p.) I. 846.
Hymenaea L. I. 846.
Hymenaea L. (ex p.) I. 846.
— Candolleana H. B. Kth. I. 847. †
— *chrysophylla* Willd. I. 852. no. 67.
— confertiflora Mart. I. 846. no. 2.
— confertifolia Hayne. I. 846. no. 3.
— Courbaril L. I. 847. †
— latifolia Hayne. I. 846. no. 6.
— Martiana Hayne. I. 846. no. 9.
— Olfersiana Hayne. I. 846. no. 8.
— rotundata Hayne. I. 846. no. 7.
— Sellowiana Hayne. I. 847. no. 10.
— splendida Vogel. I. 846. no. 1.
— stigonocarpa Mart. I. 846. no. 5.
— stilbocarpa Hayne. I. 846. no. 4.
— venosa Vahl. I. 847. †
— *verrucosa* Hornem. I. 846. no. 2.
— *verrucosa* Lam. I. 846. no. 1.
— *verrucosa* Mart. I. 846. no. 3.
Hymenandra Alph. DC. *VI. 449.
Hymenanthera R. Br. I. 225. II. 767.
— dentata R. Br. *I. 225. no. 2.
— latifolia Endl. I. 225. no. 1.
— oblongifolia A. Cunn. II. 767. no. 1.
Hymenantherum Cass. *II. 623. VI. 172.
— *Belenidium* DC. VI. 172. no. 1.
— Candolleanum Hook. et Arn. VI. 172. no. 1.
— *Kunthii* Lssng. II. 635. no. 1. VI. 180. no. 3.
Hymenanthes Bth. VI. 420. no. 1.
Hymenidium Lindl. II. 403.
— Brunonis Lindl. *II. 403. no. 1.

Hymenidium? densiflorum Lindl. II. 403. no. 2.
Hymenobrychis DC. I. 747. II. 896.
Hymenocalyx variabilis Zenk. I. 311. no. 33.
Hymenocrater Fisch. et Mey. III. 894. °III. 930.
— bituminosus Fisch. et Mey. III. 894. no. 1.
Hymenodeae DC. (Inga) I. 930.
Hymenodyction Wall. II. 509. II. 943. VI. 63.
— excelsum Wall. *II. 509. no. 2.
— flaccidum Wall. *II. 509. no. 1.
— Kurria Hochstett. *II. 943. no. 1. VI. 63. no. 2.
— obovatum Wall. *II. 509. no. 3.
— Timoriense Kltzsch. *VI. 63. no. 1.
Hymenolaena Wall. II. 426.
— *Brunonis* DC. II. 403. no. 1.
— Govaniana Wall. II. 426. no. 2.
— latifolia Lindl. II. 426. no. 1.
— stellata Lindl. *II. 426. no. 3. (c. var. β. ibid.)
Hymenolepis Cass. II. 638.
Hymenolepis Cass. °VI. 210.
— Canariensis C. H. Schultz. *VI. 211. no. 1.
β. elegans.
γ. intermedia.
δ. radiata.
α. vulgaris.
— *elegans* Cass. VI. 211. no. 1.
Hymenolobus Nutt. *II. 761.
— *divaricatus* Nutt. I. 175. no. 2.
— *erectus* Nutt. I. 175. no. 3.
— *procumbens* Nutt. I. 174. no. 1.
Hymenonema Cass. *II. 689. *VI. 349.
—? *glaucum* Hook. II. 684. no. 3.
—? *laciniatum* Hook. II. 684. no. 1.
Hymenopappus L'Hérit. II. 626. II. 989. VI. 176.
— artemisiaefolius DC. *VI. 176. no. 2.
— corymbosus Torr. et Gr. II. 989. no. 1. *VI. 176. no. 3.
β. Nuttallii Torr. et Gr. II. 989. no. 1.
— *Douglasii* DC. VI. 177. no. 6.
— *Douglasii* Hook. II. 626. no. 2.
— filifolius Hook. *VI. 176. no. 5.
— luteus Nutt. II. 626. no. 1. *VI. 176. no. 6.
— scabiosaeus L'Hérit. *VI. 176. no. 1.
— *tenuifolius* Nutt. II. 989. no. 1. β.
— tenuifolius Prsh. VI. 176. no. 4.
Hymenophysa C. A. Meyer. I. 179.
— fenestrata Boiss. I. 179. no. 2.
— pubescens C. A. Meyer. I. 179. no. 1.
Hymenopogon Wall. *II. 510.
Hymenopus Bth. II. 6.
Hymenopyramis Wall. °IV. 133.
— brachiata Wall. IV. 133. no. 1.
Hymenospermum dentatum Bth. III. 390. no. 1.
Hymenosphace Bth. III. 601. VI. 661.
Hymenostemma Knze. VI. 722.
Hymenostephus Jaub. et Spach. VI. 33.
Hymenota DC. I. 574. VI. 432.
Hymenoxys Cass. II. 627. *II. 989. VI. 177.
— Californica Hook. VI. 177. no. 1.
β. coronaria.
— calva Torr. et Gr. VI. 177. no. 3.
— *linearifolia* Hook. VI. 180. no. 7.
— mutica Torr. et Gr. VI. 177. no. 2.
— Tweediei Hook. et Arn. II. 627. no. 1.
Hyobanche Thnbrg. III. 482. °III. 975. *VI. 648. *VI. 656.
— *coccinea* Linn.? III. 482. no. 1.
— sanguinea Linn. III. 482. no. 1.
— sanguinea Thnbrg. III. 952 b.
Hyoscyameae Endl. III. 19. III. 954. VI. 573.
Hyoscyameae Miers. VI. 567.
Hyoscyamidium Wlprs. III. 19. VI. 573. no. 1.
Hyoscyamus Tournef. III. 19. °III. 954. VI. 573.
— *Aegyptius* Raj. III. 20. no. 2.
— *agrestis* Kit. III. 19. no. 1.
— albus Linn. III. 20. no. 3.
— *albus Aegyptiacus* Alp. Exot. III. 20. no. 8.
— aureus Linn. III. 20. no. 5.
— auriculatus Ten. III. 21. no. 13.
— *betulaefolius* Lam. III. 20. no. 8.
— *Bohemicus* Schmidt. III. 19. no. 1.
— Camerarii Fisch. et Mey. III. 20. no. 6.
— Canariensis Ker. III. 20. no. 10.
— Clusii G. Don. *III. 22.
— Creticus Park. III. 20. no. 5.
— *Creticus luteus major et minor* Tournef. III. 20. no. 5.
— Datorae Forsk. III. 20. no. 9.
— *flavus* Fehs. III. 19. no. 1.
— micranthus Ldb. III. 21. no. 12.
— *minor* Mill. III. 20. no. 8.
— muticus Linn. III. 20. no. 8.
— niger Linn. III. 19. no. 1.
β. pallidus Koch.
— *niger* Sims. III. 19. no. 1.
— *niger β. agrestis* N. ab E. III. 19. no. 1.
— orientalis M. Bieb. III. 21. no. 15.
— *orientalis Betae folio, tuberosa radice* Tournef. III. 21. no. 15.
— *pallidus* Waldst. et Kit. III. 19. no. 1.
— *peculiaris* Cam. III. 19. no. 2.
— *peregrinus* Clus. III. 20. no. 2.
— physaloides Linn. III. 21. no. 14.
— pictus Bernh. *III. 22.
— pinnatifidus Schlchtd. III. 933.

Hyoscyamus praealtus Wlprs. III. 21. no. 16.
— pseudophysaloides Bth. *III. 22.
— pungens Griseb. III. 933.
— purpureus Griseb. III. 933.
— pusillus Linn. III. 21. no. 11.
— *pusillus* Lob. III. 21. no. 12.
— reticulatus Linn. III. 19. no. 2.
— *Scopolia* Linn. III. 22. no. 1.
— Senecionis Willd. III. 20. no. 7.
— varians Vis. III. 20. no. 4. III. 933.
— *Verviensis* Lejeune. III. 19. no. 1.
Hyoscrideae Lssng. II. 684. VI. 327.
Hyoseris Linn. *II. 684. *VI. 327.
— *altera* Tabern. VI. 340. no. 2.
— *Capensis* Lssng. II. 686. no. 1. *δ.*
— *glauca* Zeyh. VI. 342. no. 1.
— *pusilla* Thnbrg. II. 686. no. 1. *δ.*
— *simplex* Mérat. II. 686. no. 1. *δ.*
— *tenella* Thnbrg. VI. 340. no. 2.
Hypanthera Silva Manso. °V. 758.
— Guapeva Silva Manso. *V. 758. no. 1.
Hypecoeae Endl. I. 117. V. 21.
Hypecoum Tournef. I. 117. II. 750.
— dimidiatum Delile. I. 117. no. 3.
— *erectum* L. I. 117. no. 1.
— glaucescens Guss. I. 117. no. 1.
— grandiflorum Bth. I. 117. no. 2.
— littorale Wulff. I. 117. †
— parviflorum Kar. et Kir. II. 750. no. 1.
— *pendulum* Lapeyr. I. 117. no. 2.
— procumbens L. I. 117. †
Hypelate P. Br. *I. 421. V. 366.
— oblongifolia Hook. V. 366. no. 1.
Hypenanthe Blume. II. 143.
Hypenia Mart. III. 566.
Hypericeae Endl. I. 383.
HYPERICINEAE DC. I. 383. II. 805. V. 141.
Hypericum L. I. 383. II. 805. V. 141. (I. p. 386. §. 2.* lege: capsulis tricapsularibus, loco: capsulis tetracarpellaribus. — Cf. III. Emend. p. 2.)
— acutifolium Ell. I. 388. no. 48.
— adenocarpum Montbret. II. 805. no. 2.
— adenophyllum Ldb. II. 808. no. 19.
— adenotrichum Spach. II. 806. no. 6.
— adpressum Bart. I. 386. no. 30. (III. Emend. p. 2.)
— *alpestre β.* Kar. et Kir. II. 808. no. 22.
— ambiguum Ell. I. 387. no. 39. (III. Emend. p. 2.)
— amblysepalum Hochstett. V. 142. no. 2.
— *amoenum* Prsh. I. 387. no. 36.
— *amplexicaule* Lam. I. 386. no. 28.
— anagalloides Cham. et Schlchtd. I. 389. no. 57.
— anagalloides Jaub. et Spach. II. 806. no. 9.
Hypericum angustifolium Lowe. I. 385. no. 22.
— annulatum Moris. I. 384. no. 6.
— apricum Kar. et Kir. II. 808. no. 23.
— arenarioides A. Rich. II. 809. no. 30.
— Armenum Jaub et Spach. II. 808. no. 17.
— *articulatum* Lam. I. 391. no. 1.
— *ascyroides* Willd. I. 386. no. 28.
— asperum C. A. Meyer. I. 384. no. 13.
— asperulum Jaub. et Spach. II. 807. no. 15.
— Aucherii Jaub. et Spach. II. 807. no. 16.
— aureum Bartr. *I. 387. no. 36.
— australe Ten. I. 383. no. 4.
— aviculariaefolium Jaub. et Spach. II. 807. no. 14.
— *axillare* Lam. I. 386. no. 32.
— *axillare* Michx. I. 391. no. 5.
— Baeticum Boiss. I. 383. no. 1.
— *biflorum* Desr. I. 391. no. 1.
— Blontinense Savi. I. 384. no. 5.
— *Bonapartiae* Bart. I. 386. no. 30.
— caespitosum Cham. et Schlchtd. I. 389. no. 56.
— *campanulatum* Walt. I. 391. no. 4.
— campestre Cham. et Schlchtd. I. 388. no. 52.
— Canadense L. *I. 387. no. 44.
— Canariense L. *I. 386. no. 25.
— *Cappadocicum frutescens foetido simile sed inodorum* Tournef. II. 810. no. 1.
— *Cappadocicum ptarmicae folio* Tournef. II. 806. no. 3. et no. 5.
— caprifoliatum Cham. et Schlchtd. I. 389. no. 55.
— caprifolium Boiss. I. 383. no. 2.
— cernuum Rxb. I. 385. no. 21.
— *Chinense* Rtz. I. 391. no. 1.
— chloraefolium St. Hil. I. 389. no. 58.
— cistifolium Lam. *I. 387. no. 41.
— coadunatum Chr. Sm. I. 385. no. 23.
— *Cochinchinense* Lour. I. 391. no. 1.
— collinum Schlchtd. I. 388. no. 51.
— connatum Lam. *I. 389. no. 59.
— cordiforme St. Hil. I. 389. no. 60.
— coriaceum Blume. I. 385. no. 16.
— corymbosum Mühlbrg. *I. 387. no. 35.
— cuneatum Poir. II. 808. no. 18.
— cymosum Hochstett. V. 142. no. 3.
— decipiens Watson. V. 141. no. 1.
— *densiflorum* Prsh. I. 386. no. 29.
— denudatum St. Hil. I. 390. no. 70.
— dolabriforme Vent. *I. 387. no. 38.
— Drummondii Torr. et Gr. I. 388. no. 46.
— elegans Steph. I. 390. †
— ellipticum Hook. I. 387. no. 42.
— *elodes* Linn. II. 809. no. 1.
— elongatum C. A. Meyer. I. 381. no. 14.
— elongatum Steph. I. 390. †

Hypericum empetrifolium Kotschy. II. 810. no. 2. V. 143. no. 2.
— *erectum* Masson. I. 386. no. 27.
— *euphorbiaefolium* E. Spach. II. 805. no. 2.
— fasciculatum Lam. *I. 386. no. 33. (c. var. β.)
— *fasciculatum* Michx. I. 386. no. 32.
— fastigiatum Ell. I. 388. no. 47.
— floribundum Ait. *I. 386. no. 21. I. 390. †
— *floribundum* Rchb. I. 386. no. 25.
— *frondosum* Michx. I. 387. no. 36.
— galioides Lam. *I. 386. no. 32.
— *galioides* Prsh. I. 386. no. 29. γ.
— Gebleri C. A. Meyer. I. 384. no. 12.
— glandulosum Ait. I. 390. †.
— *glaucum* Michx. I. 387. no. 37.
— grandiflorum Chois. * I. 386. no. 27.
— Hookerianum Wght. et Arn. I. 385. no. 19. (III. Emend. p. 2.)
— hyssopifolium Vill. I. 390. † * II. 808. no. 22.
α. abbreviatum } Ldb. II. 808. no. 22.
β. giganteum }
— *hyssopifolium var. hirtellum* Jaub. et Spach. II. 809. no. 24.
— *inodorum* Willd. II. 810. no. 1.
— Japonicum DC. I. 390. †
— Javanicum Blume. I. 385. no. 15.
— Jaubertii Spach. II. 806. no. 4.
— Kotschyanum Boiss. II. 809. no. 24.
— laxiusculum St. Hil. Juss. et Cambess. I. 389. no. 64.
— leprosum Boiss. II. 809. no. 27.
— leptophyllum Hochstett. V. 142. no. 4.
— linoides St. Hil. I. 389. no. 65.
— Lorentei Hochstett. V. 142. no. 5.
— Lydium Boiss. II. 809. no. 26.
— *maculatum* Michx. I. 387. no. 35.
— Michauxii Desrouss. I. 386. no. 32.
— *micranthum* Hook. I. 387. no. 35.
— Montbretii Jaub. et Spach. II. 805. no. 2.
— mutilum L. *I. 387. no. 43.
— myrianthum Cham. et Schlchtd. I. 388. no. 53.
— myrtifolium Lam. *I. 387. no. 37.
— myrtilloides Fnzl. I. 384. no. 10.
— Mysorense Hb. Madr. I. 385. no. 18. (III. Emend. p. 2.)
— nanum Poir. II. 806. no. 7.
— *nitidum* Lam. I. 386. no. 33.
— *nudicaule* Walt. I. 387. no. 45.
— *nudiflorum* Hook. et Arn. I. 387. no. 41.
— nudiflorum Michx. I. 390. †
— oblongifolium Chois. I. 390. †
— *opacum* Torr. et Gr. I. 387. no. 41.
— orientale L. I. 390. †
— *orientale* Linn. II. 806. no. 3. et 5.
Hypericum origanifolium d'Urville. II. 809. no. 1.
— origanifolium Willd. II. 805. no. 1.
— *paludosum* Chois. I. 391. no. 5.
— parviflorum St. Hil. I. 390. no. 66.
— *parviflorum* Mühlbrg. I. 387. no. 43.
— pedicellare Endl. I. 390. no. 72.
— Pelleterianum St. Hil. I. 390. no. 67.
— perfoliatum Ldb. II. 808. no. 20.
— *petiolatum* Walt. I. 391. no. 5.
— philonotis Schlchtd. I. 388. no. 50.
— platysepalum Wlprs. I. 386. no. 26.
— pratense Schlchtd. I. 388. no. 49.
— *procumbens* Michx. I. 387. no. 38.
— proliferum L. *I. 386. no. 29.
— ptarmicaefolium Spach. II. 806. no. 5.
— pubescens Boiss. I. 383. no. 3.
— pulchrum L. I. 390. †
— pulverulentum Fnzl. I. 384. no. 9.
— *punctatum* Beck. I. 387. no. 35.
— *punctatum* Rchb. I. 387. no. 35.
— punctulatum St. Hil. I. 390. no. 68.
— pyramidatum Ait. *I. 386. no. 28.
— *quinquenervium* Walt. I. 387. no. 43.
— ramosissimum Ldb. II. 808. no. 21.
— reflexum L. I. 390. †
— repens Linn. II. 806. no. 10.
— retusum Aucher. II. 807. no. 11.
— Rhodoppeum Friv. I. 384. no. 7.
— rigidum St. Hil. I. 390. no. 69.
— *rosmarinifolium* Choisy. I. 387. no. 37.
— *rosmarinifolium* Kinn. I. 386. no. 33.
— rosmarinifolium Lam. *I. 386. no. 31.
— rubrum Hochstett. V. 142. no. 6.
— rupestre Jaub. et Spach. II. 806. no. 7.
β. ovalifolium.
α. rotundifolium.
— Salicaria Rchb. I. 390. †
— Sarothra Michx. I. 387. no. 45.
— saturejaefolium Jaub. et Spach. II. 807. no. 12.
— *sessiliflorum* Spr. I. 387. no. 37.
— Skouleri Hook. I. 387. no. 34. (cum var. β. ibid.)
— Soongaricum Ldb. I. 390. †
— *speciosum* Wall. I. 385. no. 21.
— spectabile Jaub. et Spach. II. 807. no. 13.
— sphaerocarpum Michx. *I. 387. no. 40.
— *stellarioides* H. B. Kth. I. 387. no. 43.
— styphelioides A. Rich. II. 809 no. 29.
— *suberosum* Salzm. I. 383. no. 3.
— tamariscinum Cham. et Schlchtd. I. 389. no. 54.
— tenellum Tausch. II. 809. no. 28.
— tenuifolium St. Hil. I. 390. no. 71.
— *tenuifolium* Prsh. I. 386. no. 33.

Hypericum teretiusculum St Hil. I. 389. no. 62.
— ternum St. Hil. I. 389. no. 61.
— *tomentosum* Moris. I. 384. no. 6.
— tetrapetalum Lam. I. 383. no. 5.
— Tournefortii Spach. II. 805. no. 3.
— triflorum Blume. I. 385. no. 17.
— *tubulosum* Walt. I. 391. no. 6.
— Tymphresteum Boiss. et Sprun. II. 809. no. 25.
— venustum Fnzl. I. 384. no. 8.
— *Virginicum* L. I. 391. no 4.
— *Virginicum* Walt. I. 387. no. 35.
— Wightianum Wall. I. 385. no. 20. (III. Emend. p. 2.)
Hypertelis E. Mey. II. 247.
— spergulacea E. Mey. II. 247. no. 2.
— verrucosa Fnzl. II. 247. no. 1. (c. α. β. et γ. ibid.)
Hypnoticum Rodrigo. III. 104.
— *frutescens* Rodrigo. III. 104. no. 1.
Hypobathrum. Blume. *II. 486.
Hypobrichia M. O. Curt. II. 101.
— Nuttallii Torr. et Gr. *II. 101. no. 1.
Hypocalymma Endl. II. 166. II. 922. °V. 736.
— angustifolium Endl. II. 166. no. 1. V. 737. no. 6.
β. acerosum / α. linophyllum / γ. verrucosum } Schauer. V. 737. no. 6.
— asperum Schauer. *II. 922. no. 3. V. 737. no. 4.
— cordifolium Schauer. *II. 922. no. 5. V. 737. no. 7.
— Cunninghami Schauer. *II. 922. no. 1. V. 737. no. 2.
— robustum Endl. II. 166. no. 2. V. 737. no. 1.
— scariosum Schauer. *II. 922. no. 4. V. 737. no. 5.
— *suave* Lindl. V. 737. no. 6. γ.
— strictum Schauer. *II. 922. no. 2. V. 737. no. 3.
Hypocalyptus Thnbrg. I. 706.
— *canescens* Thnbrg. I. 565. no. 3.
— obcordatus Thnbrg. *I. 606. no. 1.
— *pedunculatus* Thnbrg. I. 565. no. 6.
Hypocarpus Alph. DC. V. 138.
— *Gardnerianus* Alph. DC. V. 139. no. 3.
— *pauciflorus* Alph. DC. V. 139. no. 2.
Hypochaerideae Lssng. II. 686. VI. 328.
Hypochaerides genuinae Regel. II. 686.
Hypochaeris Linn. II. 686. (cf. Hypochoeris)
— *Achyrophorus* Linn. VI. 342. no. 1. VI. 343. no. 1.
— *albicans* Ucria. VI. 343. no. 1.
— *apargioides* Hook. et Arn. VI. 335. no. 19.
Hypochaeris arachnites Bivona. VI. 340. no. 3.
— *arachnoidea* DC. II. 688. no. 5.
— arachnoidea Poir. II. 688. no. 3.
β. major / α. minima } Regel.
— *arenaria* Gaudich. VI. 335. no. 19.
— *arenaria* Hb. un. itin. VI. 335. no. 19.
— *ascendens* Brot. II. 686. no. 1. VI. 340. no. 3.
— *Balbisii* DC. II. 687. no. 1. π.
— *Balbisii* Hortor. II. 687. no. 1. ξ.
— *Balbisii* Rchb. II. 687. no. 2 ϑ. VI. 342. no. 7.
— *Berterii* Colla. VI. 335. no. 19.
— Candollei Regel. II. 688. no. 5.
— *Capensis* Lssng. VI. 340. no. 2.
— *chrysantha* Poepp. VI. 333. no. 13.
— *Corsica* Tausch. VI. 330. no. 6.
— *dimorpha* Brot. II. 686. no. 1. η. VI. 340. no. 3.
— *dimorpha* Slzm. II. 688. no. 3. VI. 341. no. 5.
— *dimorpha* Ten. II. 687. no. 1. μ.
— *dubia* Martius. VI. 330. no. 6.
— *foliosa* Vill. VI. 332. no. 11.
— *glabra* DC. II. 688. no. 3.
— *glabra* γ. δ. ε. DC. VI. 340. no. 3.
— glabra Linn. II. 686. no. 1.
π. Balbisii Regel. II. 687. no. 1.
ι. Capensis DC. II. 687. no. 1.
λ. ciliata Regel. II. 687. no. 1.
ζ. commutata Regel. II. 686. no. 1.
ξ. foliosa Regel. II. 687. no. 1.
η. hispidula Regel. 686. no. 1.
ν. intermedia Regel. II. 687. no. 1.
$\varkappa$. maxima Regel. II. 687. no. 1.
δ. minima Regel. II. 686. no. 1.
μ. multiceps Regel. II. 687. no. 1.
o. pauciflora Regel. II. 687. no. 1.
γ. pusilla Regel. II. 686. no. 1.
ρ. setigera Regel. II. 687. no. 1.
β. simplex DC. II. 686. no. 1.
ϑ. Thracica DC. II. 686. no. 1.
σ. uniflora Regel. II. 687. no. 1.
ε. vulgaris Regel. II. 686. no. 1.
— *glabra* E. Mey. II. 687. no. 1. ι. VI. 340. no. 2.
— *glauca* Prsl. VI. 342. no. 1.
— *grandiflora* Ldb. VI. 333. no. 12.
— *Helvetica* Wulf. VI. 332. no. 11.
— *hirsuta* DC. II. 688. no. 3.
— *hirsuta Endiviae folio etc.* Vaill. VI. 332. no. 10.
— *hirta* Cyrill.? VI. 338. no. 2.
— *hispida* Brot. II. 688. no 3.

Hypochaeris hispida Rth. II. 686. no. 1. ζ. VI. 340. no. 3.
— *hispida* Willd. VI. 337. no. 1.
— *intermedia* Richt. II. 687. no. 2. ϑ. VI. 342. no. 7.
— *macrorhiza* Spr. VI. 330. no. 6.
— *maculata* Linn. VI. 332. no. 10.
— *minima* Balbis. II. 687. no. 1. o. VI. 340. 342. δ. no. 4.
— *minima* Cyr. II. 686. no. 1. δ.
— *minima* Dsf. II. 688. no. 3.
— minima Dsf. VI. 340. no. 3.
β. major.
α. minor.
— *minima* Willd. VI. 335. no. 19.
— *Neapolitana* DC. II. 687. no. 1. μ.
— *pinnatifida* Aucher. VI. 338. no. 2.
— *pinnatifida* Cyr. VI. 330. no. 6.
— *platylepis* Boiss. II. 688. no. 3.
— *pusilla* Poir. II. 686. no. 1. γ. VI. 340. no 3.
— radicata Linn. II. 687. no. 2.
η. arenaria
δ. Broteri
γ. dentata
ε. glabra
ϑ. intermedia
β. leiocephala
ζ. Lusitanica
α. vulgaris
} Regel l. c.
— *rupestris* Poepp. VI. 335. no. 19.
— Salzmanniana DC. II. 688. no. 3.
—? serioloides Bertoloni. VI. 732.
— *sessiliflora* H. B. Kth. VI. 334. no. 16.
— *simplex* Mérat. VI. 340. no. 2.
— *sonchoides* Bertero. VI. 333. no. 13.
— *sonchoides* H. B. Kth. VI. 334. no. 16.
— *stellata* Gat. VI. 340. no. 2.
— *taraxacifolia* Lois. VI. 330. no. 6.
— *tenuifolia* Trevir. VI. 330. no. 6.
— *Thracica* Stev. II. 686. no. 1. ϑ. VI. 340. no. 3.
— *uniflora* Poir. II. 687. no. 1. o. π.
— *uniflora* Vill. VI. 332. no. 11.
— *urens* Linn. VI. 343. no. 1.
Hypochoerideae Lssng. VI. 328. (cf. **Hypochaerideae.**)
Hypochoeris Linn. °VI. 339. (cf. Hypochaeris.)
— arachnoidea Poir. VI. 339. no. 1.
— Balbisii Lois. VI. 340. no. 4.
— *Bartholdii* Willd. VI. 339. no. 1.
— *dimorpha* Tenore. VI. 341. no. 6.
— glabra Linn. VI. 339. no. 2.
— *heterosperma* Schultes. VI. 339. no. 1.
— minima Dsf. VI. 340. no. 3.
Hypochoeris Neapolitana DC. VI. 341. no. 6.
— radicata Linn. VI. 341. no. 7.
α. major vel vulgaris
β. minor vel ericetorum
} VI. 342. no. 7.
— *radicata* Sm. VI. 341. no. 6.
— Salzmanniana DC. VI. 340. no. 5.
Hypocraterimorphae DC. jun. (Dipladenia) VI. 742.
Hypocyrta Mart. II. 715. VI. 404.
— barbata Poepp. et Endl. II. 715. no. 4.
— *calycodonta* Van. Houtte. VI. 740. no. 2.
— carnosa Gardn. II. 715. no. 1.
— *discolor* Lindl. VI. 406. no. 1.
— epidendra Poepp. et Endl. II. 715. no. 5.
— ferruginea Poepp. et Endl. II. 716. no. 6.
— gibbosa Poepp. et Endl. II. 715. no. 3.
— macrophylla Poepp. et Endl. II. 715. no. 2.
— strigillosa Martius. *VI. 404. no. 1.
Hypoglottidei DC. (Altragalus) I. 695. II. 863.
Hypoleuci DC. (Senecio.) VI. 263.
Hypophysca DC. II. 141. no. 4.
Hypopitys Dill. *II. 734.
Hypopterygium adstringens Schlchtdl. V. 420. no. 1.
Hypothronia Schrank. °III. 521. °III. 977. (cf. *Hippothronia.)*
— undata Schrank. III. 521. no. 1.
Hypsela Prsl. *II. 706.
Hyptianthera Wght. et Arn. II. 518. VI. 701.
— rhamnoides Zolling. et Moritzi. VI. 701. no. 1.
— stricta Wght. et Arn. *II. 518. no. 1.
Hyptideae Endl. III. 522. III. 978. VI. 658.
Hyptis Jcq. III. 524. °III. 978. VI. 659.
— *acuta* Bth. III. 544. no. 93.
— Adamantium St. Hil. III. 534. no. 51.
— adpressa St. Hil. III. 530. no. 25.
— affinis Bth. III. 546. no. 105.
— albida H. B. Kth. III. 560. no. 169.
— albipes St. Hil. III. 532. no. 40.
— alpestris St. Hil. III. 535. no. 53.
— althaeaefolia Pohl. III. 550. no. 126.
— altissima St. Hil. III. 565. no. 191.
— alutacea Pohl. III. 548. no. 119.
— angulosa Schott. III. 542. no. 85.
— angustifolia Pohl. III. 533. no. 45.
— anomala Bth. III. 549. no. 122.
— aquatica Pohl. III. 551. no. 130.
— arguta Pohl. III. 531. no. 31.
— arida St. Hil. III. 551. no. 131.
— *arvensis* Poepp. III. 554. no. 145. β.
— aspera Mart. et Galeotti. VI. 660. no. 8.
— asteroides St. Hil. III. 536. no. 59.
— atrorubens Poit. III. 541. no. 82.
— barbata Schrank. III. 550. no. 127.
— Blancheti Bth. III. 567. no. 197.

Hyptis brachyphylla Mart. III. 538. no. 67.
— brachystachys Pohl. III. 566. no. 195.
— bisdentata Pohl. III. 532. no. 37.
— brevipes Poit. III. 544. no. 93.
β. glabrior Bth.
— brunnescens Pohl. III. 528. no. 21.
— caespitosa St. Hil. III. 549. no. 123.
— calida Mart. III. 563. no. 181.
— calophylla St. Hil. III. 568. no. 201.
— calycina Pohl. III. 569. no. 207.
— cana Pohl. III. 565. no. 189.
— candida Pohl. III. 530. no. 29.
— canescens H. B. Kth. III. 554. no. 145.
β. arvensis Bth.
— capitata Jcq. III. 543. no. 92.
— caprariaefolia Pohl. III. 528. no. 19.
— cardiophylla Pohl. III. 528. no. 23.
— carpinifolia Bth. III. 551. no. 129.
β. pilosa Bth.
— *Chamaedrys* Willd. III. 524. no. 1.
— Chamissonis Bth. *III. 570.
— coccinea Mart. III. 568. no. 204.
— coerulea St. Hil. III. 535. no. 52.
— communis St. Hil. III. 556. no. 155.
— complicata St. Hil. III. 547. no. 114.
— conferta Pohl. III. 548. no. 118.
— cordata Pohl. III. 547. no. 109.
— crassifolia Mart. III. 536. no. 61.
— crenata Pohl. III. 535. no. 57.
— crinita Benth. III. 537. no. 63.
β. polycephala.
— crispata Pohl. III. 568. no. 203.
— cuneata Pohl. III. 531. no. 33.
— densiflora Pohl. III. 566. no. 194.
— densifolia Pohl. III. 540. no. 76.
— desertorum Pohl. III. 528. no. 20.
— dictyodea Pohl. III. 534. no. 50.
— ditassoides Mart. III. 539. no. 73.
— divaricata Pohl. III. 528. no. 17.
— diversifolia Bth. VI. 659. no. 7.
— dubia Pohl. III. 555. no. 151.
— duplicato-dentata Pohl. III. 550. no. 125.
β. virescens Pohl.
— *ebracteata* R. Br. III. 558. no. 159.
— elongata Bth. III. 532. no. 41.
— eriocalyx St. Hil. III. 562. no. 178.
— eriophylla Pohl. III. 538. no. 66.
β. coriifolia Bth.
— excelsa Mart. et Galeotti. VI. 659. no. 3.
— expansa Pohl. III. 555. no. 150.
— fasciculata Bth. III. 562. no. 176.
— fastigiata Bth. III. 562. no. 177.
— ferruginea Bth. III. 549. no. 120.
— ferruginosa Pohl. III. 546. no. 106.
— *flabellata* Pohl. III. 556. no. 155.
— foliosa St. Hil. III. 552. no. 135.
Hyptis fragilifolia St. Hil. III. 530. no. 27.
— fruticosa Salzm. III. 556. no. 156.
— Gaudichaudii Bth. III. 544. no. 94.
— *glandulosa* Sieb. III. 628. no. 103.
— glauca St. Hil. III. 570. no. 211.
— *glomerata* Hort. VI. 658. no. 3.
— glomerata Mart. III. 551. no. 133.
— Goyazensis St. Hil. III. 535. no. 55.
— gratiolaefolia St. Hil. III. 535. no. 54.
— graveolens Salzm. III. 558. no. 160.
— *graveolens* Schrank. III. 558. no. 161. et ibid. in adn.
— halimifolia Mart. III. 536. no. 60.
— Hilarii Bth. III. 534. no. 47.
— hirsuta H. B. Kth. III. 527. no. 10.
— homalophylla Pohl. III. 545. no. 99.
— inamoena Bth. III. 543. no. 91.
— imbricata Pohl. III. 539. no. 72.
— incisa St. Hil. et Mart. III. 532. no. 38.
— *inflata* Spr. III. 524. no. 1.
— inodora Schrank. III. 553. no. 142.
— interrupta Pohl. III. 525. no. 2.
— involucrata Bth. III. 543. no. 88.
— laciniata Bth. III. 528. no. 13.
— lacunosa Pohl. III. 537. no. 62.
— lacustris St. Hil. III. 545. no. 98.
— Lagenaria St. Hil. III. 539. no. 71.
— lamiifolia Weinm. III. 559. no. 166.
— lanata Pohl. III. 530. no. 24.
— lanceaefolia Schum. et Thonn. III. 544. no. 97.
— lanceolata Poir. III. 544. no. 95.
— laniflora Bth. VI. 660. no. 10.
— lantanaefolia Poit. III. 541. no. 81.
— lappacea Bth. III. 542. no. 87.
β. hirsuta.
— lappulacea Mart. III 543. no. 89.
— latifolia Mart. III. 565. no. 192.
— laurifolia St. Hil. III. 564. no. 187.
— lavandulacea Pohl. III. 528. no. 18.
— laxiflora Mart. III. 569. no. 206.
— leucocephala Mart. III. 533. no. 42.
— leucophylla Pohl. III. 564. no. 186.
— lilacina Cham. et Schlchtd. III. 558. no. 163.
— linarioides Pohl. III. 540. no. 74.
— lippioides Pohl. III. 531. no. 34.
— lobata St. Hil. III. 539. no. 70.
— longiflora Pohl. III. 569. no. 209.
— longifolia Pohl. III. 544. no. 96.
— longipes St. Hil. III. 532. no. 39.
— lophantha Mart. III. 526. no. 5.
— lucida Pohl. III. 546. no. 107.
— *lurida* Spr. III. 524. no. 1.
— lutescens Pohl. III. 546. no. 101.
— lythroides Pohl. III. 552. no. 138.
— macrantha St. Hil. III. 569. no. 208.

Hyptis macrocephala Martens et Galeotti. VI. 659. no. 2.
— *Madagascariensis* Bojer. III. 526. no. 4.
— Marathrosma Spr. *III. 570.
— marrubiastra Pohl. III. 542. no. 84.
— Martiusii Bth. III. 537. no. 65.
— melissoides H. B. Kth. III. 557. no. 157.
— melochioides St. Hil. III. 567. no. 196.
— membranacea Bth. III. 563. no. 182.
— menthodora Schrank. *III. 570.
— micrantha Pohl. III. 554. no. 146.
— *microcephala* Bert. III. 528. no. 14.
— microphylla Pohl. III. 528. no. 16.
— Moçiniana Bth. III. 561. no. 171.
— mollis Pohl. III. 541. no. 83.
— mollissima Bth. III. 531. no. 30.
— monticola Mart. III. 548. no. 116.
— multibracteata Bth. III. 540. no. 79.
— multiflora Pohl. III. 538. no. 68.
— muricata Schott. III. 553. no. 141.
— Nepalensis Lehm. *III. 570.
— *nepetoides* Fisch. III. 560. no. 167.
— nervosa Pohl. III. 530. no. 28.
— nigrescens Pohl. III. 547. no. 113.
— nitida Mart. et Galeotti. VI. 659. no. 4.
— nudicaulis Bth. III. 526. no. 7.
— obtusata Bth. VI. 659. no. 6.
— obtusiflora Prsl. III. 545. no. 100.
— obtusifolia R. Br. *III. 570.
— obvallata Spr. III. 550. no. 128.
— odorata Bth. III. 527. no. 11.
— *oppositiflora* Schrank. III. 552. no. 133.
— orbiculata Pohl. III. 547. no. 112.
— origanoides Pohl. III. 534. no. 49.
— ovata Pohl. III. 535. no. 56.
— paludosa St. Hil. III. 528. no. 15.
— paniculata Bth. III. 568. no. 205.
— parviflora Mart. et Galeotti. VI. 659. no. 1.
— passerina Mart. III. 533. no. 43.
— Parkeri Bth. III. 545. no. 101.
— parvifolia Pohl. III. 552. no. 139.
— pauciflora Pohl. III. 552. no. 134.
— pectinata Poit. III. 560. no. 167.
— peduncularis Bth. III. 531. no. 36.
— *Persica* Poit. III. 560. no. 167.
— petiolaris Pohl. III. 541. no. 80.
— petraea St. Hil. III. 552. no. 136.
— pilosa Bth. III. 557. no. 158.
— platanifolia Mart. III. 525. no. 3.
— plectranthoides Bth. III. 556. no. 153.
— *Plumieri* Poit. III. 558. no. 159.
— Pohliana Jcq. *III. 570.
— polyantha Poit. III 558. no. 162.
— poldstachya H. B. Kth. III. 553. no. 144.
β. longiflora Bth. III. 554. no. 144.
— *procumbens* Schlchtd. III. 541. no. 82.
Hyptis proteoides St. Hil. III. 547. no. 108.
— pruinosa Pohl. III. 567. no. 198.
— *pseudochamaedrys* Poit. III. 524. no. 1.
— *pseudochamaedrys* Sieb. VI. 658. no. 2. β.
— pubescens Bth. III. 561. no. 170.
— pulegioides Pohl. III. 560. no. 168.
— pumila Pohl. III. 556. no. 154.
— punctata Mart. et Galeotti. VI. 660. no. 9.
— *racemosa* Zuccagni. III. 560. no. 167.
— racemulosa Mart. III. 558. no. 165.
— *radiata* H. B. Kth. III. 544. no. 93. β.
— radiata Willd. III. 545. no. 102.
— ramosa Pohl. III. 543. no. 90.
— recurvata Poit. III. 528. no. 14.
γ. grandifolia Bth.
β. hirsutior Bth.
— reflexa St. Hil. III. 528. no. 22.
— remota Pohl. III. 547. no. 110.
— reticulata Mart. III. 569. no. 210.
— rhabdocalyx Mart. III. 563. no. 184.
— rhomboidea Mart. et Galeotti. VI. 659. no. 5.
— rhytidea Bth. III. 555. no. 152.
— rigida Pohl. III. 530. no. 26.
— rostrata Salzm. III. 555. no. 148.
— rotundifolia Bth. III. 548. no. 115.
— rubicunda Pohl. III. 553. no. 140.
— rubiginosa Bth. III. 546. no. 103.
— rugosa Benth. III. 531. no. 32.
—? salviaefolia Pohl. III. 566. no. 193.
— Salzmanni Bth. III. 567. no. 200.
β. tomentosa III. 568. no. 200.
— saxatilis St. Hil. III. 533. no. 46.
— scabra Bth. III. 564. no. 188.
— scoparia Poit. III. 561. no. 174.
— selaginifolia Mart. III. 531. no. 35.
— Selloi Benth. III. 533. no. 44.
— sericea Bth. III. 526. no. 8.
— Sideritis Mart. III. 538. no. 69.
— simplex St. Hil. III. 567. no. 199.
— sinuata Pohl. III. 542. no. 86.
— sordida Pohl. III. 565. no. 190.
— spicata Poit. III. 554. no. 147.
— spicigera Lam. III. 525. no. 4.
— spinulosa Bth. III. 561. no. 172.
— spiraeaefolia Mart. III. 537. no. 64.
— *stachyoides* Link. III. 582. no. 6.
— stellulata Bth. III. 561. no. 173.
— stricta Bth. III. 526. no. 6.
— strictissima Pohl. III. 540. no. 75.
— suaveolens Poit. III. 557. no. 159.
— subrotunda Pohl. III. 552. no. 137.
— sylvularum St. Hil. III. 553. no. 143.
— Tafallae Bth. III. 563. no. 183.
— terniflora Bth. III. 555. no. 149.
— tetragona Pohl. III. 540. no. 78.

Hyptis tomentosa Poit. III. 564. no. 185.
— tricephala St. Hil. III. 548. no. 117.
— turneraefolia Mart. III. 536. no. 58.
— uliginosa St. Hil. III. 527. no. 12.
— umbrosa Salzm. III. 558. no. 161.
— uncinata Bth. III. 527. no. 9.
— *undulata* Schrank. III. 562. no. 176.
— urticoides H. B. Kth. III. 558. no. 164.
— velutina Pohl. III. 534. no. 48.
— vepretorum Mart. III. 562. no. 179.
— veronicaefolia Pohl. III. 540. no. 77.
— verticillata Jacq. III. 561. no. 175.
— vesiculosa Bth. III. 562. no. 180.
— vestita Bth. III. 549. no. 124.
— villosa Pohl. III. 547. no. 111.
β. reticulata Pohl.
— violacea Pohl. III. 551. no. 132.
— virgata Bth. III. 524. no. 1.
— vitifolia Pohl. III. 568. no. 202.
— xanthocephala Mart. III. 549. no. 121.
Hyssopeae Endl. III. 711. III. 982.
Hyssopifolia DC. (Lythrum) V. 674. no. 1.
Hyssopus Linn. III. 711. °III. 982.
— *alopecuroides* Fisch. III. 711. no. 1. *a.*
— *angustifolius* Bieb. III. 711. no. 1. γ.
Hyssopus anisatus Nutt. III. 773. no. 3.
— *bracteatus* Gmel. III. 584. no. 15.
— *catariaefolius* Hort. Paris. III. 774. no. 4.
— *Caucasicus* Spr. III. 711. no. 1. γ.
— *cristatus* Lam. III. 576. no. 1.
— *discolor* Desf. III. 773. no. 3.
— *Fischeri* Hortul. III. 711. no. 1. *a.*
— *Foeniculum* Spr. III. 773. no. 3.
— *lophantoides* D. Don. III. 509. no. 38.
— *Lophanthus* Linn. III. 774. no. 6.
— *myrtifolius* Desf. III. 711. no. 1. *a.*
— *nepetoides* Linn. III. 774 no. 5.
— *ocymifolius* Lam. III. 581. no. 15.
— *officinalis* Jacq. III. 711. no. 1. β.
β. *decussatus* Pers. III. 711. no. 1. *a.*
— officinalis Linn. III. 711. no. 1.
γ. angustifolius Bth.
δ. canescens DC.
a. latifolius Bth.
β. vulgaris Bth.
— *orientalis* Adam. III. 711. no. 1. γ.
— *resupinatus* Moench. III. 774. no. 6.
— *ruber* Bernh. III. 711. no. 1. β.
— *scrophulariaefolius* Willd. III. 774. no. 4.
Hysteronica Willd. *II. 702. no. 17.

I

Ibatia Dcne. *VI. 490.
Ibbetsonia Bth. I. 564.
Iberidella Boiss. I. 175.
— caespitosa Boiss. I. 176. no. 4.
— ovalifolia Boiss. I. 175. no. 3.
— sagittata Boiss. I. 175. no. 2.
— trinervia Boiss. *I. 175. no. 1.
Iberidium DC. I. 156.
Iberis L. I. 156. II. 759.
Iberis DC. (ex p.) V. 43.
— amara L. I. 157. †
— *amara* Pall. I. 156. no. 4.
— bicolor Rchb. I. 157. †
— brachystyla Fnzl. II. 759. no. 4.
— carnosa Willd. I. 156. †
— ciliata All. I. 156. †
— coronaria Sweet. I. 156. no. 5.
— divaricata Tausch. I. 156. no. 1.
— Durandii Lorey et Duret. I. 156. no. 2.
— Garrexiana All. I. 157. †
Iberis integerrima Moris. I. 156. no. 3.
— integrifolia Ledeb. I. 156. no. 4.
— *linearifolia* DC. V. 43. no. 2.
— *linifolia* Fl. Bourg. I. 156. no. 2.
— linifolia L. I. 156. †
— Loreyi Gay. I. 156. no. 2.
— nana All. I. 156. †
— ordorata L. I. 156. † II. 759. no. 2.
— pectinata Boiss. II. 759. no. 3.
— pinnata L. I. 157. †
— Raynevalii Boiss. et Reut. II. 759. no. 1.
— saxatilis L. I. 157. †
— semperflorens L. I. 157. †
— sempervirens L. I. 157. †
— Tenoreana DC. I. 156. †
— umbellata L. I. 156. †
Icacina Adr. Juss. I. 377.
— Senegalensis Adr. Juss. *I. 377. no. 1.
—? dubia Macf. I. 377. no. 2.
Icacineae Bth. II. 802. V. 136.

Icacorea Aublet. * VI. 452.
Ichnocarpus R. Br. * VI. 474.
Ichtyothere Mart. * II. 693. VI. 148.
— Cearensis Gardn. VI. 148. no. 3.
— hirsuta Gardn. VI. 148. no. 2. et 4. (Species diversae?)
— suffruticosa Gardn. VI. 148. no. 1.
Icica Aubl. I. 588.
Icica ? dentata DC. I. 381. no. 2.
— Indica Wght. et Arn. I. 558. no. 1. (III. Emend. p. 3.)
Icosandrae (Amygdalus) Spach. II. 907.
Ifloga Cass. II. 648.
— Fontanesii Fnzl. * II. 648. no. 2.
— paronychioides Fnzl. * II. 649. no. 3.
— polycnemoides Fnzl. II. 649. no. 4.
— verticillata Fnzl. * II. 648. no. 1.
Ignatia Linn. fil. * VI. 497.
Ildefonsia Gardn. III. 278. ° III. 964. * VI. 643.
— bibracteata Gardn. III. 278. no. 1.
Ilex L. I. 540. II. 828. V. 403.
— affinis Gardn. I. 540. no. 12.
— *anomala* Hook. I. 541. no. 1.
— *Asiatica* L. ? I. 541. no. 2.
— buxifolia Gardn. V. 403. no. 3.
— cassinoides Dum. I. 540. no. 14.
— crassifolia Hook. I. 540. no. 7.
— cuneifolia Hook. I. 540. no. 9.
— *cuneifolia β. Bonariensis* Lam. I. 533. no. 5.
— cymosa Blume. I. 540. no. 2.
— *dichotoma* Brnhrdi. V. 402. no. 1.
— dipyrena Wall. * I. 540. no. 6.
— *Gongonha* Lamb. I. 539. no. 5.
— *integra* Thnbrg. ? I. 541. no. 2.
— *Japonica* Thnbrg. I. 103. no. 28.
— macrophylla Blume. I. 540. no. 4.
— Martiniana Lamb. I. 540. no. 13.
— *Maté* St. Hil. I. 540. no. 11. γ.
— microphylla Hook. I. 540. no. 8.
— obcordata Swrtz. * I. 540. no. 10.
— *occidentalis* Mcfd. I. 540. no. 10.
— *Paraguariensis* A. St. Hil. I. 540. no. 11. γ.
— Paraguayensis Lamb. I. 540. no. 11. (c. varr. α. β. et γ.) * II. 828. no. 1.
— *Perado* Ait. V. 403. no. 1.
— platyphylla B. Webb et Berthelot. * V. 403. no. 1.
— pubescens Hook. et Arn. I. 540. no. 1.
— purpurea Hsskrl. V. 403. no. 2.
— *rotunda* Colebr. I. 541. no. 3.
— *ruscifolia* Lam. I. 541. no. 1.
— *Skimmia* Spr. V. 405. no. 1.
— spicata Blume. I. 540. no. 3.
— triflora Blume. I. 540. no. 5.
ILICINEAE Brogn. I. 539. II. 828. V. 403.
Illecebreae R. Br. I. 260. V. 74.
Illecebrum Gaertn. fil. * I. 260.
— *verticillatum* Burm. II. 233. no. 1. β.
Illicieae DC. I. 72. II. 747. V. 14.
Illicium Linn. I. 72. II. 747. V. 14.
— anisatum L. * I. 72. no. 1.
— Floridanum Ell. * V. 14. no. 1.
— religiosum Siebld. et Zucc. I. 72. no. 2. * II. 747. no. 1.
Ilyogeton Endlich. III. 297. ° III. 966.
Ilyogeton Endl. VI. 644.
— alsinoides Endl. III. 297. no. 1.
— subulatum Endl. III. 297. no. 2.
— subulatum Endl. III. 297. no. 3. (Species a praecedente diversa.)
Ilysanthes Rafin. * VI. 644.
Imbricaria Commers. * VI. 456.
— *ciliata* Sm. II. 920. no. 4. V. 731. no. 4.
Imbricata (Eupatorium) DC. VI. 712. no. 17. b.
Impatiens L. I. 467. II. 821. V. 382.
Impatiens Riv. I. 467. V. 382.
— *acaulis* Arn. I. 474. no. 55.
— albida Wght. I. 467. no. 2.
— angustifolia Blume. I. 469. no. 20.
— *angustifolia* Blume. I. 476. no. 1.
— arcuata Wall. I. 467. no. 3.
— auriculata Wght. I. 470. no. 22.
— *baccifera* Rxb. I. 476. no. 2.
— Balsamina L. * I. 467. no. 1.
β. longifolia. } Wght. et Arn.
α. vulgaris. }
— bicolor Royle. I. 472. no. 40.
— bicornuta Wall. I. 474. no. 61.
— biflora Prsh. I. 476. †
— bipartita Arn. I. 468. no. 6.
— brachycentra Kar. et Kir. I. 472. no. 41.
— bracteata Colebr. I. 474. no. 60.
— brevicornu Arn. I. 468. no. 9.
— *bulbosa* Moon. I. 474. no. 55.
— calycina Wall. I. 470. no. 27.
— campanulata Wght. I. 471. no. 37.
— candida Lindl. I. 475. no. 76.
— *coccinea* B. Mag. I. 467. no. 1. α.
— *coccinea* Wall. I. 467. no. 1. β.
— cordata Wght. I. 471. no. 35.
— cornigera Arn. I. 473. no. 51.
— *cornuta* L. I. 467. no. 1. α.
— *cornuta* Wall. I. 467. no. 1. β.
— cristata Wall. I. 470. no. 25.
— cuspidata Wght. et Arn. I. 468. no. 8.
— dasysperma Wght. I. 469. no. 16.
— *discolor* DC. I. 475. no. 75.
— diversifolia Wall. I. 474. no. 65. (III. Emend. p. 2.)
— elongata Arn. I. 473. no. 52.

Impatiens fasciculata Klein. I. 474. no. 66. I. 475. no. 69.
— fasciculata Lam. *I. 474. no. 64.
— filiformis Wght. et Arn. I. 475. no. 71. (III. Emend. p. 2.)
— fimbriata Hook. I. 472. no. 42.
— flaccida Arn. I. 468. no. 10.
— floribunda Wght. I. 469. no. 17. (III. Emend. p. 2.)
— fulva Nutt. I. 476. †
— gibbosa Arn. I. 468. no. 12.
— glandulifera Arn. I. 468. no. 11.
— *glandulifera* Royle. I. 476. no. 78. II. 821. no. 1.
— Goughii Wght. I. 472. no. 79.
— grandis Heyne. I. 470. no. 29.
— Hamiltoniana Don. I. 475. no. 75.
— Henslowiana Arn. I. 469. no. 13.
— *heterophylla* Wall. I. 474. no. 64. et 65.
— hirsuta Blume. I. 474. no. 57.
— Hookeriana Arn. I. 471. no. 32.
— inconspicua Bth. I. 474. no. 68. (III. Emend. p. 2.)
— *insignis* DC. I. 472. no. 43.
— insignis DC. I. 476. †
— Javensis Blume. I. 474. no. 56.
— Kleinii Wght. et Arn. I. 475. no. 69.
— Lechenaultii Wall. *I. 467. no. 4.
— *leptoceras* DC. I. 472. no. 45.
— leptopoda Arn. I. 469. no. 14.
— linearis Arn. I. 470. no. 30.
— longicornu Wall. I. 472. no. 47.
— *longifolia* Wght. I. 467. no. 1. β.
— macrochila Lindl. I. 471. no. 34.
— maculata Wght. I. 473. no. 49.
— Manillensis Wlprs. V. 382. no. 1.
— micrantha Blume. I. 474. no. 58.
— micrantha D. Don. I. 472. no. 45.
— minutiflora Spanoghe. I. 475. no. 74.
— modesta Wght. I. 473. no. 53.
— mollis Wall. I. 468. no. 7.
— Munronii Wght. I. 469. no. 18. (III. Emend. p. 2.)
— *Mysorensis* Wall. I. 474. no. 67. I. 475. no. 71.
— *natans* Willd. I. 476. no. 2.
— *noli tangere* Ham. I. 475. no. 75.
— odorata D. Don. I. 472. no. 44.
— oppositifolia L. *I 474. no. 67.
— *oppositifolia* Rottl. I. 474. no. 64.
— parviflora DC. I. 476. †
— pendula Heyne. I. 469. no. 15. (III. Emend. p. 2.)
— picta Kar. et Kir. I. 472. no. 48.
— *pubcrula* DC. I. 468. no. 7.
— *pusilla* Heyne. I. 474. no. 68.
Impatiens racemosa DC. I. 472. no. 44.
— racemosa D. Don. I. 472. no. 43.
— repens Moon. I. 469. no. 19.
— *reticulata* Wall. I. 474. no. 66.
— Rheedei Wght. et Arn. *I. 474. no. 62.
— rivalis Wght. I. 473. no. 54.
— rosea Lindl. I. 469. no. 21.
— rosmarinifolia Retz. I. 475. no. 72.
— Roylei Wlprs. I. 475. no. 78. *II. 821. no. 1.
— rufescens Bth. I. 474. no. 63. (III. Emend. p. 2.)
— *scabrida* DC. I. 475. no. 75.
— scabrida DC. V. 383. †
— scabriuscula Heyne. I. 467. no. 5.
— *scabriuscula* Wall. I. 469. no. 15.
— scapiflora Heyne. I. 473. no. 55. V. 383. †
— setacea Colebr. I. 475. no. 73.
— subcordata Arnott. I. 471. no. 31.
— sulcata Wall. I. 474. no. 59.
— tenella Heyne. I. 475. no. 70. (III. Emend. p. 2.)
— *tenella* Wall. I. 475. no. 69.
— tomentosa Heyne. I. 474. no. 66.
— tricornis Lindl. I. 472. no. 46. V. 383. †
— *triflora* L. I. 476. no. 2.
— trilobata Colebr. I. 470. no. 24.
— umbellata Heyne. I. 470. no. 28.
— uncinata Wght. I. 471. no. 36.
— urticaefolia Wall. I. 470. no. 26.
— verticillata Wght. I. 475. no. 77.
— viridiflora Wght. I. 470. no. 23.
— viscida Wght. I. 471. no. 38.
— Walkeri Hook. I. 471. no. 33.
Imperatoria DC. II. 409. V. 882.
Imperatoria Linn. II. 410.
— *Chabraei* Spr. V. 880. no. 2.
— *decursiva* Szowitz. V. 881. no. 2.
— *Hispanica* Boiss. II. 411. no. 21.
— *verticillaris* Coll. V. 881. no. 1.
Incanae Bth. (Crotalaria) V. 419.
Incani DC. (Astragalus) I. 709. II. 877.
Incarvillea tomentosa Spr. III. 262. no. 1.
Incarvilleae Endl. VI. 516.
Indigofera L. I. 660. II. 856. V. 514.
— ......? Schlchtd. I. 671. no. 124.
— ......? Torr. I. 670. no. 112.
— acanthocarpa Lindl. II. 856. no. 5.
— acutifolia Schlchtd. I. 671. no. 121.
— adenocarpa E. Mey. I. 666. no. 72.
— *adenophylla* Grah. I. 668. no. 97.
— *Adonensis* E. Mey. I. 664. no. 50.
— albicans Spanoghe. I. 667. no. 84.
— alpina Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 34.
— angustata E. Mey. I. 662. no. 27.
— *angustifolia* β. DC. I. 664. no. 47.

Indigofera angustifolia Thnbrg. I. 664. no. 47.
— *angustifolia* Willd. I. 665. no. 60.
— Anil L. I. 671. †
— Anil? Schlchtd. et Cham. I. 671. no. 123.
— *Anil* Sm. I. 669. no. 99.
— arborea Rxb. II. 857. †
— *arcuata* Willd. I. 669. no. 105.
— arenaria E. Mey. I. 667. no. 80.
— *argentea* Hnks. I. 669. no. 99.
— *argyrea* Eckl. et Zeyh. I. 666. no. 76.
— *argyroides* E. Mey. I. 666. no. 76.
— *armata* Wall. I. 670. no. 105.
— ascendens Eckl. et Zeyh. I 663. no. 32.
— *aspalathifolia* Rxb. I. 667. no. 89.
— aspalathoides Vahl. *I. 667. no. 89. II. 857. †
— asperifolia Bongrd. I. 670. no. 111.
— athroophylla Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 23.
— atropurpurea Ham. I. 671. † II. 857. †
— *auricoma* E. Mey. I. 667. no. 81.
— *axillaris* E. Mey. II. 835. no. 7.
— barbata Desvx. I. 671. no. 116.
— bifrons E. Mey. I. 663. no. 42.
β. digitata.
α. trifoliata.
— bijuga Vogel. I. 665. no. 58.
— *brachycarpa* Grah. I. 669. no. 102.
— brachystachya E. Mey. I. 664. no. 47.
— bracteolata DC. *I. 661. no. 5.
— Brunoniana Grah. I. 668. no. 96.
— Bungeana Wlprs. I. 668. no. 93.
— *caespitosa* Wght. I. 667. no. 88.
— calva E. Mey. I. 665. no. 68.
— Candolleana Meisn. V. 514. no. 3.
— *canescens* Grah. I. 668. no. 97.
— *canescens* Lam. I. 669. no. 105.
— *canescens* Spr. I. 668. no. 97.
— *cassioides* Rottl. I. 669. no. 103.
— Chinensis Vogel. I. 669. no. 104.
— *cinerascens* Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 56.
— *cinerea* Willd. I. 669. no. 105.
— coerulea Rxb. I. 669. no. 102. II. 857. †
— collina Eckl. I. 666. no. 71.
— *colorata* Rxb. I. 669. no. 99.
— complicata Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 31.
— *congesta* Grah. I. 668. no. 97.
— cordifolia Heyne. *I. 667. no. 86.
— corniculata E. Mey. I. 664. no. 56.
— coronilloides Mart. et Galeotti. II. 856. no. 1.
— costata Guill. et Perr. I. 661. no. 13.
— *cuneifolia* Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 37.
— cylindracea DC. *I. 665. no. 63.
— cytisoides Thnbrg. *I. 666. no. 75.
— *declinata* DC. I. 665. no. 67.
Indigofera densiflora Martens et Galeotti. II. 856. no. 2.
— denudata L. fil. *I. 662. no. 26.
— *depressa* Thnbrg. II. 835. no. 5.
— *digitata* Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 48.
— digitata Thnbrg. *I. 663. no. 43.
— dimidiata Vogel. I 663. no. 38.
— *discolor* E. Mey. I. 663. no. 40.
— disticha Eckl. et Zeyh. I. 667. no. 81.
— Dosua Hamilt. I. 671. †
— Drègeana E. Mey. I. 661. no. 53.
— dumosa E. Mey. I. 662. no. 20.
— echinata Willd. *I. 667. no. 83. I. 671. †
— *effusa* E. Mey. I. 666. no. 79.
— elegans Schum. et Thonn. I. 661. no. 17.
— elliptica E. Mey. I. 664. no. 51.
— enneaphylla L. *I. 667. no. 88. II. 857. †
— Enonensis E. Mey. I. 666. no. 74.
— *eriocarpa* E. Mey. I. 665. no. 65.
— excelsa Mart. et Galeotti. II. 856. no. 3.
— exigua Eckl. et Zeyh. I. 666. no. 79.
— *exigua* E. Mey. I. 667. no. 82.
— *falcata* E. Mey. I. 662. no. 24.
— *fastigiata* E. Mey. I. 665. no. 61.
— ferruginea Schum. et Thonn. I. 661. no. 9.
— filicaulis Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 45.
— flaccida Koen. *I. 670. no. 107.
— flaccida Rxb. II. 857. †
— flexuosa Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 22.
— florida E. Mey. I. 663. no. 34.
— *foliosa* E. Mey. I. 665. no. 60.
— *foliosa* Grah. I. 669. no. 101.
— *fragrans* Retz. I. 668. no. 91.
— *frumentacea* Rxb. I. 667. no. 87.
— fruticulosa Wlprs. I. 667. no. 82.
— *glabra* L. I. 668. no. 91.
— glandulosa Rxb. *I. 667. no. 87. II. 857. †
— *glandulosa* Rxb. I. 668. no. 97.
— glaucescens Eckl. et Zeyh. I. 665. no. 57.
— *glaucescens* Grah. I. 669. no. 103.
— glomerata E. Mey. I. 663. no. 41.
— *glutinosa* Perr. I. 661. no. 11.
— *glutinosa* Rxb. I. 668. no. 92.
— glutinosa Schum. et Thonn. I. 661. no. 8.
— gracilis Bongrd. I. 670. no. 110.
— grata E. Mey. I. 665. no. 66.
— *graveolens* Rxb. I. 668. no. 92.
— grisea Desvx. I. 670. no. 115.
— *Guineensis* Schum. I. 660. no. 3.
— Haïtensis Desvx. I. 670. no. 114.
— hedyantha Eckl. et Zeyh. I. 665. no. 61.
— *hedysaroides* Lam. I. 669. no. 105.
— *hedranophylla* Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 24.
— *heterophylla* Rxb. I. 668. no. 91. I. 669. no. 99.

Indigofera heterophylla Thnbrg.? I. 663. no. 42. *a.*
— hilaris Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 50.
— hippocrepoides Schlchtd. I. 671. no. 119.
— hirta E. Mey. I. 664. no. 54.
— hispida Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 46.
— *humifusa* Eckl. et Zeyh. I. 665. no. 63.
— incana Thnbrg. *I. 663. no. 36.
— Kleinii Wght. et Arn. I. 670. no. 108.
— Kraussiana Meisn. V. 514. no. 2.
— *leptocarpa* Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 32.
— *leptocaulis* Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 48.
— *leptophylla* E. Mey. I. 664. no. 48.
— leptosepala Nutt. I. 670. no. 112. (III. Emend. p. 3.)
— *lespedezioides* H. B. Kth.? I. 671. no. 115.
— linifolia Retz. *I. 667. no. 85.
—? lotoides Schlchtd. I. 671. no. 118.
— macra E. Mey. I. 666. no. 73.
— macrocalyx Guill. et Perr. I. 660. no. 4.
— macrocarpa Desvx. I. 670. no. 113.
— *macrophylla* Thonn. et Schum. I. 661. no. 7.
— Madagascariensis Schrank. I. 661. no. 19.
— *marginata* Perr. I. 661. no. 10.
— marginulata Grah. I. 670. no. 106. (III. Emend. p. 3.)
— Meyeriana Eckl. et Zeyh. I. 666. no. 77.
— *micrantha* Bnge. I. 668. no. 93.
— micrantha Desvx. I. 661. no. 18.
— *micrantha* E. Mey. I. 666. no. 69.
— minutiflora Wlprs. I. 666. no. 69.
— mollis Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 39.
— monostachys Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 29.
— *multicaulis* DC. I. 668. no. 97.
— Mundtiana Eckl. et Zeyh. I. 665. no. 67.
— Mysorensis Heyne. *I. 669. no. 100.
— *nana* Eckl. et Zeyh. I. 665. no. 59. *β.*
— *nigromontana* Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 25.
— *nivea* E. Mey. I. 663. no. 35.
— nivea Willd. *I. 666. no. 76.
— nudicaulis E. Mey. I. 662. no. 21.
— *nudicaulis* E. Mey. I. 663. no. 31.
— obcordata Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 35.
— *Orixensis* Rxb. I. 668. no. 97.
— ornithopodioides Cham. et Schlchtd. I. 671. no. 117.
— *ornithopodioides* Schum. et Thonn. I. 661. no. 10.
— *oroboides* E. Mey. I. 662. no. 29.
— parviflora Heyne. I. 668. no. 98.
— parvula Delile. I. 660. no. 1.
— pascuorum Bth. I. 670. no. 109.
— *patens* Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 24.
— pauciflora Eckl. et Zeyh. I. 665. no. 65.
Indigofera pauciflora E. Mey. I. 664. no. 49.
— paucifolia Delile. *I. 661. no. 7. *I. 669. no. 99. II. 857. †
— pedicellata Wght. et Arn. I. 668. no. 95. (III. Emend. p. 3.)
— pentaphylla L. *I. 668. no. 91. II. 857. †
— *peregrina* DC. I. 668. no. 97.
— Perrottetii DC. *I. 661. no. 12.
— pilosa Poir. *I. 660. no. 3.
— *platypoda* E. Mey. I. 662. no. 30.
— Pohliana Bth. I. 671. no. 122.
— poliota Eckl. et Zeyh. I. 665. no. 59. *β.* nana.
— *polygonoides* Wendl. I. 667. no. 85.
— *polyphylla* Heyne. I. 669. no. 100.
— *polyphylla* Rottl. I. 669. no. 101.
— porrecta Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 40.
— Prieureana Guill. et Perr. I. 661. no. 14.
— procera Schum. et Thonn. I. 661. no. 16.
— *prostrata* Klein. I. 670. no. 108.
— *prostrata* Perr. I. 661. no. 12.
— *prostrata* Rxb. I. 667. no. 83.
— *prostrata* Willd. I. 668. no. 97.
— pulchella Rxb. *I. 669. no. 103. II. 857. †
— *pungens* E. Mey. I. 662. no. 23.
— *purpurascens* Rxb. I. 669. no. 103.
— quinquefolia E. Mey. I. 663. no. 44.
— reflexa E. Mey. I. 664. no. 52.
— *retusa* Grah. I. 669. no. 102.
— rhechodes Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 25.
— *rigescens β. inermis* E. Mey. I. 662. no. 26.
— *rigescens α. spinosa* E. Mey. I. 662. no. 25.
— *rigida* Willd. I. 670. no. 105.
— rufescens E. Mey. I. 665. no. 64.
— rupestris Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 49.
— *scabra* Rth. I. 670. no. 107.
— secunda E. Mey. I. 665. no. 62.
— *sericea* Linn. II. 835. no. 2.
— sessilifolia DC. *I. 662. no. 24.
— setacea E. Mey. I. 663. no. 33.
— Sieberiana Scheele. V. 514. no. 1.
— *spinescens* E. Mey. I. 662. no. 22.
— stachyodes Lindl. II. 856. no. 1.
— *stenophylla* Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 27.
— stenophylla Guill. et Perr. I. 661. no. 15.
— *stipularis* Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 38.
— stipularis Lk. *I. 663. no. 37.
— stricta L. fil. *I. 665. no. 60.
— strigosa Spr. *I. 664. no. 48.
— *subtilis* E. Mey. I. 664. no. 45.
— subulata Vahl. *I. 660. no. 2.
— sylvatica Sieb. I. 671. †
— *ternata* Rxb. I. 669. no. 105.
— *tenuifolia* Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 43.
— tenuifolia Rottl. I. 668. no. 94. (III. Emendand. p. 3.)

Indigofera tenuissima E. Mey. I. 662. no. 28.
— tetragonoloba E. Mey. I. 666. no. 78.
— *Thonningii* Schum. I. 660. no. 2.
— *tinctoria β. brachycarpa* DC. I. 669. no. 102.
— tinctoria L. *I. 661. no. 10. II. 857. †
— *tomentosa* Eckl. et Zeyh. I. 663. no. 36.
— *torulosa* E. Mey. I. 666. no. 71.
— torulosa Hook. et Arn. I. 671. no. 120.
— trichopoda Lepr. I. 661. no. 6.
— trifoliata L. *I. 668. no. 97.
— *triquetra* E. Mey. I. 663. no. 32.
— tristis E. Mey. I. 664. no. 55.
— trita L *I. 669. no. 105. II. 857. †
— uniflora Hamilt. I. 667. no. 90. II. 857. †
— varia E. Mey. I. 666. no. 70.
— venusta Eckl. et Zeyh. I. 662. no. 30.
— *verrucosa* Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 56.
— *verrucosa* Grah. I. 669. no. 103.
— *villosa* Bergius. I. 663. no. 41.
— *viminea* E. Mey. I. 665. no. 57.
— violacea Rxb. I. 671. †
— viscosa Lam. *I. 661. no. 11. *I. 668. no. 92. II. 857. †
— Wightii Grah. I. 669. no. 101.
— Zeyheri Eckl. et Zeyh. I. 664. no. 56.
Inermes Bth. (Acacia) V. 592.
Inermia Dunal. (Solanum) III. 38.
Inga Martius. °V. 622.
(Inga P. Br. I. 928. II. 906.)
acuminata Bth. V. 633. no. 69.
— acrocephala Steudel. V. 631. no. 58.
— acutifolia Bth. V. 640. no. 109.
— *adianthifolia* Kth. V. 619. no. 60.
— affinis DC. V. 642. no. 124.
— *affinis* Steudel. V. 632. no. 67.
— *alba* DC. V. 627. no. 32.
— albicans Wlprs. I. 930. no. 20. V. 628. no. 39.
— *angulata* Grah. V. 614. no. 32.
— angustifolia Willd. V. 643. no. 130.
— *annularis* Grah. V 614. no. 28.
— *anomala* DC. V. 608. no. 58.
— *anomala β. pedicellata* DC. V. 608. no. 59.
— *anomala* H. B. Kth. I. 926. no. 5.
— *anomala* Kth. V. 608. no. 59.
— Bahiensis Bth. V. 642. no. 122.
β. foliolis minoribus 3–4-jugis.
— barbata Bth. V. 635. no. 82.
— Berteriana DC. V. 640. no. 110.
— *bigemina* Hook. et Arn. V. 614. no. 29.
— *bigemina* Willd. V. 614. no. 28.
— *biglobosa* Palis. I. 857. no. 1.
— *biglobosa* Willd. V. 577. no. 1.
— Billbergiana Bth. V. 626. no. 22.
— Bonplandiana H. B. Kth. V. 643. no. 131.
Inga Bourgoni DC. V. 627. no. 32.
—? Borbonica Hsskrl. II. 906. no. 2.
— brachyptera Bth. V. 638. no. 99.
— *brachystachya* DC.? V. 613. no. 21.
— bracteosa Bth. V. 637. no. 94.
— brevipes Bth. I. 931. no. 40. V. 623. no. 4.
— bubalina W. Jack. I. 930. no. 23.
— *bubalina* Wall. V. 614. no. 28. β.
— bullata Bth. V. 636. no. 89.
— *byrsinocarpa* Hochstett. V. 615. no. 1.
— caerulescens Wlprs. I. 928. no. 6.
— *caerulescens* Wlprs. V. 634. no. 79.
— *calocephala* Poepp. et Endl. V. 638. no. 98.
— calycina Bth. V. 639. no. 103.
— *calycina* Salzm. V. 628. no. 39.
— *candida* H. B. Kth. V. 611. no. 12.
— canescens Schlchtd. et Cham. I. 930. no. 26.
— *canescens* Cham. et Schlchtd. V. 600. no. 9.
— capitata Desvx. I. 929. no. 13. V. 628. no. 42.
— cataractae H. B. Kth. V. 616. no. 45.
— Catharinae Bth. V. 635. no. 85.
— *cauliflora* Willd. V. 617. no. 50.
— chartacea Poepp. et Endl. V. 633. no. 72.
— ciliata Prsl. I. 928. no. 3. V. 634. no. 79. β. parvifolia.
— *ciliata* Poepp. et Endl. V. 634. no. 75.
— *cinerea* H. B. Kth. V. 618. no. 51.
— *circinnalis* Willd. V. 611. no. 11.
— clypearia W. Jack. I. 930. no. 29.
— *clypearia* Jack. V. 614. no. 33
— *cochleata* Willd. V. 612. no. 18.
— *cochlocarpos* Martius. V. 612. no. 20.
— cognata Schlchtd. I. 929. no. 15.
— *comosa* Willd. V. 620. no. 70.
— *Concordiana* DC. V. 611. no. 17.
— conferta Bth. V. 643. no. 129.
— *contorta* Wall. V. 615. no. 35.
— cordistipula Mart. I. 928. no. 4. V. 625. no. 14.
— *coriacea* Desvx. V. 623. no. 6.
— *coriacea* H. B. Kth. V. 600. no. 6.
— coruscans Humb. et Bonpl. V. 626. no. 27.
— corymbifera Bth. I. 930. no. 21. V. 630. no. 53.
β? Brasiliensis V. 630. no. 53.
— Cumingiana Bth. V. 641. no. 114.
— *cyclocarpa* Willd. V. 613. no. 25.
— cylindrica Martius. V. 626. no. 26.
— diadema Martius. V. 625. no. 16.
— dimidiata Hook. et Arn. I. 931. no. 32.
— *dimidiata* Hook. et Arn. V. 615. no. 33.
— *discolor* Humb. et Bonpl. V. 619. no. 60.
— disticha Bth. I. 929. no. 10. V. 634. no. 77.

Inga dolabriformis Grah. I. 884. no. 1. V. 587. no. 1.
— *dulcis* Willd. V. 610. no. 5.
— edulis Mart. V. 642. no. 127.
— elegans Mart. et Galeotti. V. 644. no. 139.
— elliptica Blume. I. 930. no. 30.
— *emarginata* H. B. Kth. V. 599. no. 4.
— eriantha Bth. V. 640. no. 108.
— eriocarpa Bth. V. 640. no. 112.
— *excelsa* Kth. V. 611. no. 13.
— excelsa Poepp. et Endl. V. 627. no. 31.
— faeculifera Desvx. I. 931. no. 34.
— *fagaraefolia* Mart. V. 634. no. 79.
— falciformis Hsskrl. II. 906. no. 3.
— *falciformis* DC. V. 616. no. 43.
— fasciculata Poepp. et Endl. V. 642. no. 128.
— *fasciculata* Willd. V. 608. no. 61.
— fastuosa Willd. V. 638. no. 97.
— *ferruginea* Guill. et Perr. V. 596. no. 9.
—? Feuillei DC. V. 633. no. 74.
— *filicina* Willd. V. 577. no. 4.
— flagellliformis Mart. I. 930. no. 19. V. 624. no. 11.
— flexuosa Schlchtd. I. 928. no. 2. V. 641. no. 116.
— floribunda Bth. I. 929. no. 8. V. 635. no. 86.
— foliosa Bth. V. 631. no. 57.
— *forfex* Kth. V. 610. no. 7.
— fragrans Mcfd. I. 931. no. 38.
— *fragrans* Mcfd. V. 619. no. 66.
— fraxinea Willd. V. 629. no. 46.
— fulgens Kth. V. 638. no. 102.
— geminata Wght. et Arn. I. 930. no. 22. (Ill. Emend. p. 4.)
— *geminata* Wght. et Arn. V. 611. no. 15.
— gladiata Desvx. I. 929. no. 12. V. 643. no. 134.
— globosa Blume. I. 931. no. 31.
— globulifera Bth. V. 625. no. 20.
— *glomerata* DC. V. 616. no. 46.
— graciliflora Bth. V. 624. no. 10.
— *grandiflora* Wall. V. 622. no. 1.
— *Guadelupensis* Dsvx. V. 610. no. 8.
—? Guatimalensis Hook. et Arn. I. 931. no. 37.
— Guayaquilensis G. Don. V. 626. no. 24.
— Guilleminiana Bth. V. 635. no. 83.
— Harrisii Lindl. I. 930. no. 25.
— *Harrisii* Lindl. V. 599. no. 5.
— heteroptera Bth. V. 638. no. 100.
— heterophylla Willd. V. 621. no. 9.
— *Houstoni* DC. I. 926. no. 3. V. 607. no. 57.
— Humboldtiana Kth. V. 631. no. 55.
— *hymenaeaefolia* Humb. et Bonpl. V. 609. no. 2.
Inga hymenaeaefoliae proxima Cham. et Schlchtd. V. 609. no. 1.
— hymenaeoides Desvx. V. 628. no. 41.
— inaequalis Humb. et Bonpl. V. 629. no. 45.
— ingoides Willd. V. 639. no. 107.
— insignis Ktb. V. 641. no. 118.
— *Javana* DC.? V. 610. no. 5.
— Jinicuil Schlchtd. I. 929. no. 14. V. 625. no. 21.
— *Jiringa* Wall. V. 614. no. 31.
— juglandifolia Willd. V. 631. no. 56.
— Koenigii Wght. et Arn. I. 931. no. 33.
— *Koenigii* Wght. et Arn. V. 611. no. 16.
— *laeta* Poepp. V. 612. no. 19.
— laevigata Mart. et Gal. V. 643. no. 137.
— *lanceolata* Kth. V. 609. no. 1.
— *latifolia* Willd. V. 617. no. 47.
— *laurifolia* Bngrd. V. 568. no. 2.
— laurina Willd. V. 626. no. 25.
— laxiflora Bth. V. 641. no. 120.
— leiocalycina Bth. V. 631. no. 63.
— lentiscifolia Bth. V. 629. no. 43.
— leptantha Bth. V. 634. no. 78.
— leptoloba Schlchtd. I. 929. no. 16. V. 631. no. 60.
— leptopus Bth. V. 623. no. 5.
— leucoxylon Hasskarl. II. 906. no. 1.
— *lignosa* Grah. I. 884. no. 1. V. 587. no. 1.
— *ligustrina* Willd. V. 609. no. 1.
—? Lindeniana Bth. V. 637. no. 93.
— lineata Bth. V. 629. no. 49.
— *lobata* Wall. V. 614. no. 30.
— *longifolia* Humb. et Bonpl. V. 616. no. 43.
— lucida H. B. Kth. V. 638. no. 101.
— *lucida* Wall. V. 595. no. 4. V. 614. no. 28.
— Luschnathiana Bth. V. 642. no. 123.
— *macradenia* Mart. V. 631. no. 54.
— macrophylla Humb. et Bonpl. V. 638. no. 98.
— *macrostachya* DC. V. 609. no. 1.
— marginata Willd. V. 627. no. 31.
— maritima Bth. V. 633. no. 73.
— *Marthae* DC. V. 621. no. 76.
— Martinicensis Prsl. I. 929. no. 17. V. 629. no. 47.
— Mathewsiana Bth. V. 630. no. 50.
— *mellifera* Willd. I. 913. no. 277.
— *Merianeae* Splitg. V. 639. no. 107.
— *mertensioides* Nees et Mart. V. 605. no. 42
— *microphylla* H. B. Kth. V. 610. no. 9.
— *microphylla* Salzm. V. 634. no. 79.
— *mollissima* Kth. V. 600. no. 12.
— molliuscula Desvx. I. 930. no. 28.
— *monilifera* DC. V. 615. no. 37.
— *montana* Spanoghe. V. 615. no. 34.
— multiflora Bth. V. 632. no. 64.

Inga myriantha Poepp. et Endl. V. 623. no. 1.
— *nandiaefolia* DC. V. 612. no. 20.
— *Niopa* H. B. Kth. I. 860. no. 21.
— nitens Mart. et Gal. V. 644. no. 141.
— *nitida* Willd. I. 921. no. 360.
— nitida Willd. V. 633. no. 70.
— nobilis Willd. V. 631. no. 59.
— nuda Salzm. V. 636. no. 90.
— nutans Martius. V. 625. no. 15.
β. tenuis.
— ornata Kth. V. 641. no. 121.
— ornifolia H. B. Kth. V. 642. no. 125.
— pachycarpa Bth. V. 641. no. 119.
— *paniculata* Spr. V. 610. no. 6.
— parvifolia Hook. et Arn. I. 931. no. 35.
—? patens Hook. et Arn. I. 931. no. 36.
—? *patens* Hook. V. 579. no. 1.
— Pavoniana Bth. V. 630. no. 51.
— *pedicellaris* DC. V. 619. no. 64.
— *pendula* Willd. V. 577. no. 3.
— peduncularis Bth. V. 632. no. 66.
— *peduncularis* Martius. V. 628. no. 39.
— *pennatula* Cham. et Schlchtd. I. 908. no. 229.
— pezizifera Bth. V. 626. no. 28.
— pilosiuscula Desvx. V. 632. no. 67.
— platycarpa Bth. I. 928. no. 7.
— *platycarpa* Bth. V. 632. no. 68.
— platyptera Bth. V. 634. no. 76.
— Poeppigiana Bth. V. 633. no. 75.
— polystachya Bth. V. 627. no. 29.
— *protracta* Steud. V. 624. no. 9.
— pruriens Poepp. et Endl. V. 637. no. 96.
— puberula Bth. V. 627. no. 35.
— *pubescens* Bertero. V. 610. no. 6.
— pubiramea Steudel. V. 644. no. 142.
— punctata Willd. V. 631. no. 61.
— *pungens* Willd. V. 610. no. 5.
—? purpurascens Hsskrl. V. 644. no. 143.
— *purpurea* Willd. V. 604. no. 35.
— pycnostachya Bth. V. 627. no. 36.
— quassiaefolia Willd. V. 633. no. 71.
— quaternata Poepp. et Endl. V. 624. no. 12.
— *quinangemina* Hffmsgg. I. 932. no. 3.
— *ramiflora* Bngrd. V. 617. no. 52.
— *reticulata* Spr. V. 633. no. 74.
— rhoifolia Willd. V. 643. no. 135.
— Riedeliana Bth. V. 630. no. 52.
β. Surinamensis.
— rubiginosa DC. V. 639. no. 105.
— rufescens Bth. V. 625. no. 19.
— *salutaris* H. B. Kth. V. 618. no. 55.
— Salzmanniana Bth. V. 636. no. 91.
— *Saman* Willd. V. 617. no. 53.
— sapida H. B. Kth. V. 628. no. 37.
— sapindoides Willd. V. 628. no. 38.
Inga saponaria Willd. V. 614. no. 28. β.
— *Sassa* Willd. V. 598. no. 3.
— scabriuscula Bth. V. 636. no. 87.
— schinifolia Bth. V. 625. no. 17.
— sciadion Steudel. V. 623. no. 3.
— Sellowiana Bth. V. 624. no. 13.
— semialata Martius. I. 928. no. 5. V. 627. no. 33.
β. latifolia Mart. V. 627. no. 33.
— semicordata Bertol. I. 931. no. 39.
— *Senegalensis* DC. I. 857. no. 1. V. 577. no. 1.
— sericea Mart. et Gal. V. 643. no. 136.
— sertulifera DC. V. 623. no. 6.
β. minor.
— sessilis Mart. V. 639. no. 104.
— setifera DC. V. 632. no. 68.
— setigera Poepp. et Endl. V. 636. no. 88.
—? speciosa Mart. et Gal. V. 643. no. 138.
— spectabilis Willd. V. 637. no. 95.
— *spinifolia* Dsvx. V. 610. no. 10.
— splendens Willd. V. 631. no. 62.
— spuria Willd. V. 640. no. 113.
β.? sordida.
— stenoptera Bth. I. 929. no. 9. V. 632. no. 65.
— stenostachya Desvx. *I. 930. no. 27.
— stipularis DC. V. 629. no. 44.
— striata Bth. V. 637. no. 92.
— subnuda Salzm. V. 639. no. 106.
— *taxifolia* Kth. V. 604. no. 33.
— tenuifolia Bth. V. 627. no. 30.
— tenuifolia Salzm. V. 630. no. 54.
β. glabrior Bth.
— *tenuis* Martius. V. 625. no. 15. β.
— *tergemina* Willd. V. 600. no 7.
— tetraphylla Mart. I. 929. no. 18. V. 626. no. 23.
— Thibaudiana DC. V. 643. no. 133.
— thyrsoidea Desvx. V. 643. no. 132.
—? *Timoriana* DC. V. 577. no. 1.
— *trapezifolia* DC. V. 612. no. 22.
— tubulifera Bth. V. 625. no. 18.
— *umbellata* Willd. V. 611. no. 17.
— umbellifera Steudel. V. 624. no. 7.
— umbratica Poepp. et Endl. V. 623. no. 2.
— umbrosa Wall. I. 930. no. 24.
— *umbrosa* Grah. V. 595. no. 5.
— *unguis cati* Willd. V. 610. no. 8.
— unijuga Poepp. et Endl. V. 628. no. 40.
— Uraguayensis Hook. et Arn. I. 928. no. 1. V. 641. no. 117.
— *Vahliana* DC. V. 616. no. 43.
— velutina Willd. V. 642. no. 126.
— vera Willd. V. 610. no 111.
— vestita Bth. V. 634. no. 80.

Inga? villosa Mart. et Gal. V. 641. no. 140.
— virescens Bth. V. 635. no. 84.
— *virgultosa* DC. I. 928. no. 2.
— virgultosa Desvx. I. 929. no. 11. V. 624. no. 8.
— vismiaefolia Poepp. et Endl. V. 629. no. 48.
— vulpina Martius. V. 635. no. 81.
— *Wightiana* Grah. V. 614. no. 28.
— Xalapensis Bth. V. 641. no. 115.
— *xylocarpa* DC. V. 587. no. 1.
—? *Zygia* DC. I. 928. no. 3. V. 598. no. 1.
Ingae hymenodeae DC. V. 608.
— *samaneae* DC. V. 608.
Ingenhoussia ericaefolia E. Meyer. I. 581. no. 5.
— *micrantha* E. Mey. I. 582. no. 9.
— *rosea* E. Mey. I. 581. no. 1.
— *rugosa* E. Mey. I. 582. no. 1.
— *spinosa* E. Mey. I. 582. no. 12.
— *tortilis* E. Mey. I. 582. no. 2.
— *verticillata* E. Mey. I. 582. no. 11.
— *violacea* E. Mey. I. 581. no. 3. II. 835. no. 3.
Ingenhouzia Moç. *I. 328.
Inopsidium Rchb. I. 175.
— acaule Rchb. *I. 175. no. 1.
Inota Inodien Rheede. III. 25. no. 14.
Integrifoliae Choisy. (Ipomaea) VI. 533.
Intybellia Chass. II. 697.
Intybellia Cassini. *VI. 359.
Intybelloides DC. VI. 358. no. 4.
Intsia Pet. Th. *I. 845.
Inula Gaertn. II. 600. *II. 954. no. 1. VI. 140.
— Arbuscula Delile. VI. 140. no. 2.
— asperrima Edgwrth. VI. 721. no. 2.
— cordata Boiss. VI. 141. no. 5.
— *divaricata* Nutt. II. 967. no. 1.
—? *ericoides* Torr. II. 577. no. 2.
— *fruticosa* C. H. Schultz. VI. 140 no. 2.
— grandis Schrenk. II. 600. no. 2. *VI. 140. no. 1.
— involucrata Kaleniczenko. VI. 140. no. 3.
— linariaefolia Turcz. II. 601. no. 5.
— macrophylla Kar. et Kir. II. 600. no. 1.
— *macrophylla* Kar. et Kir. VI. 140. no. 1.
— melanolepida Kaleniczenko. VI. 140. no 4.
— multicaulis Boiss. VI. 141. no. 6.
— nitida Edgwrth. VI. 721. no. 1.
— repanda Turcz. II. 600. no. 4.
— rhizocephala Schrenk. II. 600. no. 3.
Inulaster C. H. Schultz. II. 953. no. 8.
Inuleae Cass. II. 600. II. 973. VI. 140.
Inuleae C. H. Schultz. II. 953.
Inuleae legitimae C. H. Schultz. II. 953.
Involucraria (Trifolium) Ser. I. 644. 646.
Involucraria Wght. et Arn. (Trichosanthes) II. 202.
Iphiona DC. II. 601. *II. 953. no. 1. VI. 143.
— horrida Boiss. VI. 143. no. 1.
— scabra DC. *VI. 144. no. 2.
β. pinnatifida.
Iphioneae C. H. Schultz. II. 953.
Ipomaea Linn. VI. 532.
— affinis Martens et Galeotti. VI. 535. no. 20.
— alulata Miquel. VI. 532. no. 6.
— apiculata Martens et Galeotti. VI. 534. no. 19.
— aristulata Martens et Galeotti. VI. 535. no. 21.
— brachypoda Bth. VI. 533. no. 9.
— codonantha Bth. VI. 532. no. 5.
— crassipes Hook. VI. 534. no. 14.
— delphiniifolia Martens et Galeotti. VI. 535. no. 25.
— ficifolia Lindl. VI. 536. †
— fulva Bertoloni. VI. 535. no. 26.
— *glabra* Choisy. VI. 530. no. 3.
— halophila Miquel. VI. 533. no. 8.
— *hederacea* Hortor. VI. 204. no. 43.
— hirta Martens et Galeotti. VI. 534. no. 15.
— hirtiflora Martens et Galeotti. VI. 533. no. 7.
— *Horsfalliae* Hook. VI. 536. †
— lactescens Bth. VI. 532. no. 4.
— latifolia Martens et Galeotti. VI. 534. no. 16.
— Lindenii Martens et Galeotti. VI. 535. no. 22.
— microsepala Bth. VI. 533. no. 11.
— oocarpa Bth. VI. 533. no. 12.
— pauciflora Martens et Galeotti. VI. 532. no. 3.
— pedatisecta Martens et Galeotti. VI. 535. no. 24.
— pedicellaris Bth. VI. 533. no. 10.
— pendula R. Br. VI. 536. †
— pilosissima Martens et Galeotti. VI. 535. no. 23.
— Platensis Lindl. VI. 536. †
— *Purga* Wndrth. VI. 743.
— puncticulata Bth. VI. 534. no. 13.
— rubro-coerulea Hook. VI. 536. †
— schizoloma Knze. VI. 534. no. 17.
— setulosa Zollinger et Moritzi. VI. 532. no. 1.
— *simplex* Thnbrg. VI. 536. †
— subtriflora Zollinger et Moritzi. VI. 532. no. 2.
— suffruticosa Burch. VI. 536. †
— Surinamensis Miquel. VI. 534. no. 18.
— tigrianthina Paxton. *VI. 536.
— tuberosa Linn. VI. 536. †
Ipomopsis Choisy. VI. 526. no. 1.
Irina Blume. I. 415.
— glabra Blume. I. 415. no. 1.

Irina integerrima Blume. I. 416. no. 3.
— tomentosa Blume. I. 416. no. 2.
Irio DC. I. 164. 165. no. 22. 26. 27. II. 760. no. 2.
Irlbachia Martius. * VI. 503.
Iroucana Aubl. V. 547. no. 16.
Isanthera N. ab E. III. 121. ° III. 956. * VI. 523. (* VI. 632. et 655.)
— permollis N. ab E. III. 124. no. 1.
Isanthus Michx. III. 585. ° III. 979.
— coeruleus Michx. III. 585. no. 1.
Isatideae DC. I. 180. V. 43.
Isatidis generis conspectus a Trautvettero elaboratus conferatur I. 180. in adnotatione.
Isatis L. I. 180. II. 762. V. 44.
Isatis DC. V. 44. (ex p.)
— *Aegyptiaca* L. V. 45. no. 4.
— Aleppica Scop. V. 45. no. 4.
— alpina All. I. 182. † * V. 48. no. 28.
— apiculata Boiss. I. 182. no. 15.
— *Armena* Linn. V. 44. no. 1.
— *Armena* C. A. Meyer. I. 182. no. 12. V. 46. no. 10.
— Aucheri Boiss. I. 182. no. 10.
— Bannatica Lk. I. 182. † * V. 48. no. 29.
— Besseri Trautvetter. V. 47. no. 17.
— brachycarpa C. A. Mey. I. 181. no. 3. V. 46. no. 14.
— campestris Stev. V. 47. no. 20.
— campylocarpa Boiss. I. 182. no. 11.
— Candolleana Boiss. I. 182. no. 14.
— canescens DC. V. 44. no. 2.
— *canescens* DC. *β. Iberica* DC. V. 45. no. 3.
— *Cappadocica* Desvx. V. 45. no. 9.
— cochlearis Boiss. I. 182. no. 9.
— cordigera Boiss. I. 182. no. 13.
— corymbosa Boiss. I. 182. no. 6.
— costata C. A. Mey. I. 180. no. 1. V. 46. no. 13.
— *Dalmatica* Mill. V. 46. no. 11.
— dasycarpa Ldb. V. 44. no. 1.
— *dentata* Pers. V. 45. no. 4.
— *emarginata* Kar. et Kir. II. 762. no. 1.
— frutescens Kar. et Kir. I. 181. no. 2.
— *Garcini* DC. I. 183. no. 1. * V. 48. no. 25.
— glauca Auch. I. 182. no. 7.
— *hebecarpa* DC. V. 45. no. 6. et 8.
— *hebecarpa* Turcz. V. 45. no. 6.
— *heterocarpa* Andrz. V. 46. no. 11.
— *hirsuta* Pers. V. 47. no. 18.
— Iberica Stev. V. 45. no. 3.
— intermedia Turcz. * V. 48. no. 30.
— laevigata Trautv. I. 181. no. 4. et adn. no. 15. V. 46. no. 15.
— *latisiliqua* C. A. Mey. V. 46. no. 10.
— latisililiqua Stev. V. 45. no. 9.
Isatis latisiliqua β. fructu glabro Stev. V. 46. no. 10.
— leiocarpa DC. * V. 48. no. 26.
— *leiocarpa* DC. *β.* I. 182. no. 14.
— littoralis Stev. V. 47. no. 19.
— Lusitanica DC. * V. 48. no. 27.
— *Lusitanica* L. V. 45. no. 4.
— *Maeotica* DC. V. 47. no. 18.
— membranacea Trautv. I. 181. adn. no. 24. V. 48. no. 24.
— microcarpa Gay. I. 182. no. 8. V. 45. no. 7.
— minima Bnge. V. 48. no. 31.
— nummularia Trautv. I. 181. adn. no. 16. V. 47. no. 16.
— oblongata DC. V. 47. no. 22.
— orientalis Willd. V. 45. no. 5.
— platycarpa Bnge. V. 48. no. 32.
— *platycarpa* Bnge. V. 49. no. 1.
— *platyloba* Lnk. V. 48. no. 27.
— praecox W. K. I. 182. † V. 46. no. 12.
— psilocarpa Ledeb. I. 182. no. 12.
— sabulosa Stev. I. 182. no. 5. V. 48. no. 23.
— Sibirica Trautv. I. 181. adn. no. 6. V. 45. no. 6.
— Steveniana Trautv. I. 181. adn. no. 10. V. 46. no. 10.
— Taurica M. Bieb. V. 47. no. 21.
— tinctoria L. I. 182. † V. 47. no. 18.
— *tinctoria* L. *δ. microcarpa* DC. V. 46. no. 11.
— undulata Aucher. I. 182. no. 16.
— Villarsii Gaud. V. 46. no. 11.
Isauxis Arnott. V. 126.
Ischina A. P. DC. * VI. 520.
Isertia Schreb. II. 490. VI. 52.
— flava Miquel. VI. 52. no. 1.
— hypoleuca Bth. II. 490. no. no. 1.
Isertieae A. Rich. II. 490. II. 943. VI. 52.
Isica Adans. VI. 6. VI. 697. no. 2.
Isidorea A. Rich. * II. 506.
Ismelia C. H. Schultz. ° VI. 201.
— Broussonettii C. H. Schultz. VI. 202. no. 3.
— carinata C. H. Schultz. VI. 202. no. 1.
— coronopifolia C. H. Schultz. VI. 202. no. 2.
β. angustifolia.
α. latifolia.
— *Maderensis* D. Don. VI. 199. no. 1.
Isnardia DC. * II. 76.
Isnardia L. II. 75.
— *alata* DC. II. 75. no. 9.
— *alternifolia* DC. II. 74. no. 1.
— *ascendens* Hall. II. 75. no. 15.
—? *aurantiaca* DC. II. 74. no. 1.
— *capitata* DC. II. 75. no. 13.
— *cylindrica* DC. II. 75. no. 7.
— *hastata* R. et Pav. II. 102. no. 11.

Isnardia hirsuta DC. II. 75. no. 8.
— *hirsuta* Hook. et Arn. II. 74. no. 2.
— *lanceolata* DC. II. 75. no. 12.
— *linearis* DC. II. 75. no. 5.
— *microcarpa* Hook. et Arn. II. 75. no. 9.
— *microcarpa* Poir. II. 75. no. 12.
— *mollis* DC. II. 75. no. 8.
— *multiflora* Guill. et Perr. II. 75. no. 14.
— *palustris β.* DC. II. 75. no. 15.
— *palustris* L. II. 75. no. 15.
— *pedunculosa* DC. II. 76. no. 18.
— *sphaerocarpa* DC. II. 75. no. 10.
— *virgata* DC. II. 75. no. 3.
Isocarpha R. Br. *II. 545. VI. 106.
— divaricata Bth. VI. 106. no. 1.
— eupatorioides Gardn. VI. 703. no. 2.
— fastigiata Gardn. VI. 703. no. 1.
— foliosa Gardn. VI. 703. no. 3.
Isocoma Nutt. II. 593. *II. 952. no. 52.
— vernonioides Nutt. *II. 593. no. 1.
— *vernonioides* Nutt. II. 968. no. 7.
Isodesmia Gardn. II. 889. °V. 523.
— tomentosa Gardn. *II. 889. no. 1. V. 523. no. 1.
Isodon Schrad. III. 507.
— *plectranthoides* Schrad. III. 510. no. 42.
Isodontia G. Don. III. 108.
Isolobus DC. jun. *VI. 375.
—? *Cunninghamii* Alph. DC. VI. 372. no. 2.
— jasionoides DC. *VI. 733.
Isoloma (Gesneria) Bth? VI. 396. 737.
Isomeria DC. II. 367. no. 36. 37. 38. 39. 40.
Isomeris Nutt. I. 196.
— arborea Nutt. *I. 196. no. 1.
Isonandra Wght. *VI. 456.
Isonema R. Br. *VI. 472.
Isopappus Torr. et Gr. *II. 592. *II. 952. no. 50. II. 967. °VI. 129.
— divaricatus Torr. et Gr. II. 967. no. 1.
— Hookerianus Torr. et Gr. II. 967. no. 2.
Isopetalum Eckl. et Zeyh. I. 457.
— alchemilloides Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 113.
— aphanoides Eckl. et Zeyh. *457. no. 111.
— articulatum Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 115.
— dimidiatum Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 112.
— elongatum Eckl. et Zeyh. *I. 457. no. 110.
— geranioides Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 116.
— ranunculophyllum Eckl. et Zeyh. I. 457. no. 114.
Isophyllum Drommondii Spach. I. 383. no. 1.
Isoplexis G. Don. III. 254.
Isoplexis Lindl. III. 260.
Isoplexis Lindl. *VI. 646.
— *Canariensis* G. Don. III. 260. no. 25.
— *Sceptrum* G. Don. III. 260. no. 26.
Isopterae Adr. Juss. (Tetrapterys) V. 308.
Isopyrum L. I. 48. II. 741.
— anemonoides Kar. et Kir. II. 741. no. 1.
— *aquilegioides* Bory et Chaub. I. 10. no. 4.
— biternatum Torr. et Gr. I. 48. no. 4. (III. Emend. p. 1.)
— fumarioides L. I. 49. †
— grandiflorum Fisch. I. 48. no. 1.
— microphyllum Royle. I. 48. no. 2.
— occidentale Hook. et Arn. I. 48. no. 3.
— thalictroides L. I. 49. †
— *thalictroides* var. Hook. I. 48. no. 4.
Isora Schott et Endl. I. 334.
— *corylifolia* Endl. I. 334. no. 21.
Isostigma Lssng. *II. 623.
Isothea DC. I. 581. II. 834.
Isotoma Lindl. *VI. 380.
Isotrichia DC. VI. 101.
Isotropis Bth. I. 567. V. 424.
— biloba Bth. I. 567. no. 3.
— cuneifolia Bth. *I. 567. no. 1.
— Drummondii Meisn. V. 424. no. 1.
— filicaulis Bth. I. 567. no. 4.
— parviflora Bth. I. 567. no. 5.
— striata Bth. I. 567. no. 2.
Isotypus H. B. Kth. *II. 680. *VI. 318.
Itea L. *II. 379.
— *Chinensis* Hook. et Arn. II. 937. no. 1.
—? *fragrans* Wall. II. 380. no. 6.
— *spinosa* Andrws. I. 255. no. 1.
Iva Linn. II. 607.
— *axillaris β.* Hook. II. 607. no. 1.
— foliolosa Nutt. II. 607. no. 1.
— microcephala Nutt. II. 607. no. 2.
— *monophylla* Walt. II. 976. no. 1. γ.
— paniculata Nutt. II. 607. no. 3.
— *paniculata* Nutt. II. 976. no. 1. VI. 155. no. 1.
— *xanthiifolia* Nutt. II. 976. no. 1. VI. 155. no. 1.
Iveae DC. II. 607. II. 976. VI. 155.
Ivira perviens Aubl. V. 99. no. 12.
Ixanthus Griseb. *VI. 502.
Ixauchenus Cass. *II. 585.
Ixerba A. Cun. II. 380. V. 838.
— brexioides A. Cun. *II. 380. no. 1. V. 838. no. 1.
Ixeris Cass. *II. 695.
Ixianthes Bth. III. 254. °III. 961. *VI. 641.
— retzioides Bth. III. 254. no. 1.
Ixiauchenus Cass. *II. 951. no. 5.
Ixiolaena Bth. *II. 645. VI. 235.
— chrysantha Steetz. VI. 235. no. 1.
— viscosa Bth. VI. 235. no. 2.
Ixionanthes W. Jack. V. 376.
— icosandra W. Jack. V. 376. no. 2.

Ixionanthes reticulata W. Jack. V. 376. no. 1.
Ixodia R. Br. *II. 641.
Ixora Linn. II. 481. VI. 45.
— *affinis* Wall. II. 481. no. 7.
— *alba* Rxb. II. 482. no. 10.
— *alba* Sm. II. 517. no. 4.
— *alternifolia* Jcq. III. 115. no. 6.
— amoena Wall. II. 481. no. 5.
— *arborea* Sm. II. 482. no. 10.
— Banduca Rxb. II. 483. †
— barbata Rxb. II. 483. †
— brachiata Rxb. *II. 482. no. 9.
— *Brunonis* Hortor. VI. 45. no. 1.
— Brunonis Wall. II. 482. no. 18.
— *coccinea* Ait. II. 481. no. 2.
— coccinea Linn. *II. 481. no. 1.
— *decipiens* DC. II. 482. no. 10.
— elongata Heyne II. 481. no. 6.
— erubescens Wall. II. 481. no. 7.
— Finlaysoniana Wall. II. 481. no. 8.
— *flammea* Salisb. II. 481. no. 2.
— fulgens Rxb. II. 483. †
— *grandiflora* DC. II. 481. no. 1.
— *incarnata* Rxb. II. 481. no. 2.
— lanceolaria Colebr. *II. 482. no. 11. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— *lanceolaria* Rxb. II. 482. no. 11. *α.*
— *leucantha* Heyne II. 482. no. 11. *β.*
— longifolia G. Don. II. 482. no. 19.
— *macrophylla* R. Br. II. 482. no. 19.
Ixora micrantha Heyne II. 482. no. 9.
— Mungista Rxb. II. 482. no. 20.
— neriifolia W. Jack. II. 482. no. 21.
— nigricans R. Br. II. 482. no. 12.
— Notoniana Wall. II. 481. no. 4.
— *Nunypapala* Rxb. II. 480. no. 1.
— *obovata*? Heyne II. 481. no. 1.
— odorata Hook. *VI. 700. no. 1. VI. 45. no. 1.
— *odorata* Spr. II. 481. no. 10.
— opaca R. Br. II. 482. no. 17.
— oxyphylla Wall. II. 482. no. 14.
— *paniculata* Lam. II. 480. no. 1.
— parviflora Vahl. *II. 482. no. 10.
— *Pavetta* Andr. II. 482. no. 10.
— *Pavetta* Rxb. II. 480. no. 1.
— *propinqua* R. Br. II. 481. no. 1.
— Siamensis Wall. II. 482. no 16.
— *speciosa* Willd. II. 481. no. 2.
— speciosa Willd. II. 483. †
— spectabilis Wall. II. 482. no. 15.
— stricta Rxb. *II. 481. no. 2. II. 483. †
— subsessilis Wall. II. 482. no. 13.
— Timorensis Dcne. II. 482. no. 22.
— *tomentosa* Rxb. II. 480. no. 3.
— tomentosa Rxb. II. 483. †
— *undulata* Wall. II. 481. no. 3.
— *velutina* Wall. II. 480. no. 3.
— Wallichii Wght. et Arn. II. 481. no. 3.

J

Jaborosa Juss. III. 106. °III. 955. °VI. 614.
— *Bonariensis* Gmel. III. 106. no. 2. VI. 614. no. 1.
— caulescens Gill. et Hook. III. 106. no. 1.
— *caulescens* Gill. et Hook. VI. 616. no. 1.
— *decurrens* Miers. VI. 616. no. 2.
— integrifolia Juss. *VI. 614. no. 1.
— integrifolia Lam. III. 106. no. 2.
— *laciniata* Miers. VI. 615. no. 1.
— Montevidensis Casaretto VI. 614. no. 2.
— *runcinata* Lnk. et Otto III. 105. no. 1. VI. 614. no. 1.
—? runcinata Lam. III. 106. no. 3.
Jacaranda Juss. *VI. 515.
— mimosaefolia Don. *VI. 743.
Jaceïneae DC. (Centaurea) VI. 294.
Jackia Wall. *II. 524.
— *excelsa* Blume. I. 248. no. 3.
— *longifolia* Blume. I. 248. no. 2.
— *ornata* Wall. *I. 248. no. 8. (?)
— *vitellina* Blume. I. 248. no. 1.
Jacksonia R. Br. I. 569. V. 426.
— alata Bth. I. 569. no. 6.
— capitata Bth. I. 569. no. 3.
— dilatata Bth. I. 569. no. 1.
— dumosa Meisn. V. 427. no. 3. *β.* glabrata.
— floribunda Endl. I. 569. no. 9.
— gracilis Meisn. V. 426. no. 2.
— hakeoides Meisn. V. 427. no. 4.

Jacksonia Lehmanni Meisn. V. 427. no. 6.
— macrocarpa Bth. I. 569. no. 4.
— restioides Meisn. V. 427. no. 5.
— sericea Bth. I. 569. no. 8.
— Sternbergiana Bth. I. 569. no. 7. *V. 426. no. 1.
  β. puberula V. 426. no. 1.
  γ. filicaulis V. 426. no. 1.
— thesioides Bth. I. 569. no. 2.
— viminalis Cunn. *I. 569. no. 5.
Jacobaea DC. VI. 257. no. 5.
— *Africana frutescens flore amplo purpureo elegantissimo, Senecionis folio* Volkam. VI. 265. no. 52.
— *Africana fruticans, oblongis foliis angustis integris incanis* Volkam. VI. 264. no. 42.
— *annua Africana minor Senecionis folio* Volkam. VI. 265. no. 51.
— *palustris altissima foliis serratis* Tournef. VI. 258. no. 6.
Jacobia (Cham. et Schlchtd.?) II. 128.
Jacosta E. Mey. * II. 638.
Jacquemontia Choisy. VI. 536.
— abutiloides Bth. VI. 536. no. 3.
— corymbulosa Bth. VI. 536. no. 2.
— pycnocephala Bth. VI. 536. no. 1.
Jacquinia Linn. VI. 453.
— macrocarpa Cav. * VI. 453. no. 1.
— *venosa?* Swrtz. II. 487. no. 1.
Jacquinieae Alph. DC. VI. 453.
Jacquinotia prostrata Hombron. VI. 432. no. 1.
Jaegeria H. B. Kth. II. 609.
— pedunculata Hook. et Arn. II. 609. no. 1.
Jaltomata edulis Schlchtd. III. 28. no. 4.
Jamacaru Piso. II. 332. no. 78. II. 334. no. 91.
— *sexta* Piso. II. 356. no. 10.
Jambosa Rmph. II. 191.
— alba Wght. et Arn. *II. 192. no. 10.
— amplexicaulis DC. *II. 192. no. 9.
— aquea DC. *II. 191. no. 2.
— *aquea* Rmph. V. 756. no. 1.
— bifaria Wght. II. 192. no. 11.
— cylindrica Wght. II. 192. no. 15.
— *cyminifera* E. Mey. V. 752. no. 1.
— formosa Wght. II. 191. no. 7.
— hemisphaerica Wght. II. 191. no. 8.
— laurifolia DC. * II. 192. no. 13.
— *macrophylla* DC. II. 192. no. 10.
— Malaccensis DC. *II. 191. no. 4.
— Munronii Wght. II. 191. no. 3.
— pauciflora Wght. II. 192. no. 14.
— polypetala Wght. II. 192. no. 12.
— purpurea DC. *II. 191. no. 5.
— *sylvestris parvifolia* Rmph. IV. 97. no. 2.
Jambosa ternifolia Wght. II. 191. no. 6.
— vulgaris DC. *II. 191. no. 1.
Janthe Griseb. °III. 446. °III. 957. * VI. 636.
Janthe Torr. et Gr. II. 577.
— bugulifolia Griseb. *III. 446. no. 1.
Janusia Adr. Juss. °V. 351.
— Californica Bth. V. 351. no. 1.
— discolor Adr. Juss. V. 352. no. 4.
— Guaranitica Adr. Juss. V. 352. no. 5.
— linearifolia Adr. Juss. V. 352. no. 2.
— sericea Adr. Juss. V. 352. no. 3.
Jasione Linn. II. 709. * VI. 381.
— amethystina Lag. et Rodigr. * II. 709. no. 2.
— penicillata Boiss. * II. 709. no. 1.
— sessiliflora Boiss. et Reut. II. 709. no. 3.
Jasioneae Endl. II. 709.
JASMINEAE R. Br. VI. 463.
Jasmini flore frutex Philippensis etc. Petiv. IV. 112. no. 58.
— *folio integro flore coeruleo racemoso* Sloan. IV. 79. no. 6.
Jasminoides Americanum lauri folio, flore albo odorato Houst. III. 121. no. 55.
— *flaccidum* Mnch. III. 107. no. 2.
— *foliis Pichaminis, flore virescente, noctu odoratissimo* Dill. III. 120. no. 48.
— *rhombifolium* Mnch. III. 106. no. 1.
Jasminum Sloane. III. 115. no. 6.
Jasminum Tournef. VI. 463.
— affine Royle. VI. 463. no. 1.
— *angulare* Hb. Petropolit. VI. 463. no. 2.
— *arborescens racemosum* etc. Plum. IV. 75. no. 22.
— *litoreum* Rmph. IV. 112. no. 58.
— multipartitum Hochstett. VI. 463. no. 4.
— nudiflorum Lindl. VI. 463. no. 2.
— Roxburghianum Wall. VI. 463. no. 3.
Jasonia DC. * II. 601. *II. 954. no. 1. (ex. p.)
Jasonieae C. H. Schultz. II. 954.
Jatus Rmph. IV. 99. no. 1.
Jaubertia Guillem. VI. 32.
Jaubertia Guillem. II. 468. II. 941.
— Aucheri Guillem. * II. 468. no. 1 *II. 941. no. 1.
— *Aucheri* Guillem. VI. 34. no. 10.
Jaumea Pers. *II. 627.
Jeffersonia Bart. I. 100.
— *Bartonis* Mchx. I. 100. no. 1.
— *binata* Bart. I. 100. no. 1.
— diphylla Pers. * I. 100. no. 1. (c. varr. *α*. *β*.)
— *lobata* Nutt. I. 100. no. 1. *β*.
Jenkinsonia Sweet. I. 455.
— antidysenterica Eckl. et Zeyh. I. 455. no. 67.
— dichotoma Eckl. et Zeyh. I. 455. no. 68.
Jochroma Bth. ° VI. 629.

Jochroma calycinum Bth. VI. 629. no. 2.
— grandiflorum Bth. VI. 630. no. 3.
— macrocalyx Miers. VI. 630. no. 4.
— tubulosum Bth. VI. 629. no. 1.
Jodina Hook. et Arn. I. 541.
— ruscifolia Hook. et Arn. *I. 541. no. 1.
Jodopappus C. H. Schultz VI. 316.
Jöedes Blume I. 95.
— ovalis Blume. I. 95. no. 1.
Johnia L. I. 759. V. 531.
— *salacioides* Rxb. I. 401. no. 6.
— Wightii Wght. et Arn. I. 759. no. 1. (III. Emend. p. 4.) * V. 531. no. 1. (c. var. β.) γ. lancea Wlprs. V. 531. no. 1. γ.
Johnsonia Americana Mill. IV. 127. no. 8.
Johrenia DC. II. 416. V. 892.
— Candollei Boiss. V. 893. no. 3.
— dichotoma DC. V. 892. no. 1.
— Graeca Boiss. et Sprun. V. 892. no. 2.
— Meyeri Boiss. V. 893. no. 5.
— Persica Boiss. V. 893. no. 4.
— platycarpa Boiss. V. 393. no. 6.
— Tordylium Fnzl. II. 416. no. 1.
— *Tordylium* Fnzl. V. 922. no. 1.
Joliffa Boj. II. 195.
— *Africana* Delile. II. 195. no. 1. V. 759. no. 1.
Jondraba DC. 157.
Jonesia Rxb. I. 844. II. 904.
— Asoca L. I. 844. † *II. 904. no. 1.
— declinata Jack. I. 844. no. 1.
Jonidium Vent. I. 221. II. 767. V. 59.
— album St. Hil. I. 221. no. 16.
— atropurpureum St. Hil. I. 223. no. 25.
— bicolor St. Hil. I. 221. no. 15.
— bigibbosum St. Hil. I. 222. no. 24.
— *calceolaria* Vent. I. 222. no. 20.
— *Capense* γ. DC. I. 221. no. 3.
— chamaedryfolium Poepp. V. 60. no. 3.
— chamaedryfolium Prsl. I. 221. no. 8.
— commune St. Hil. I 221. no. 11.
— diffusum Gill. I. 221. no. 7.
— enneaspermum Vent. *I. 221. no. 3.
— *erectum* Ging. I. 221. no. 3.
— floribundum Lindl. II. 767. no. 1.
— frutescens Blume. I. 221. no. 1.
— fruticulosum Bth. V. 60. no. 2.
— Guaraniticum St. Hil. I. 221. no. 14.
— *heterophyllum* Vent. I. 222. no. 3.
— Ipecacuanha St. Hil. *I. 222. no. 19.
— lanatum St. Hil. I. 222. no. 21.
— lasiocarpum Prsl. I. 221. no. 9.
— lineare Torr. I. 221. no. 6.
— lobelioides Schlchtd. I. 221. no. 10.
— *longifolium* R. et Schult. I. 223. no. 1.
— nanum St. Hil. I. 222. no. 22.
Jonidium orchidiflorum R. et Sch. I. 223. no. 1.
— parviflorum H. B. Kth. I. 223. †
— parviflorum Vent. *I. 222. no. 23.
— Poaya St. Hil. I. 222. no. 20. β. indicorum.
— scariosum St. Hil. I. 221. no. 17.
— setigerum St. Hil. I. 221. no. 12.
— stipulaceum Nutt. I. 221. no. 5.
— suffruticosum Ging. *I. 221. no. 2.
— sylvaticum St. Hil. I. 221. no. 13.
— thymifolium Prsl. I. 221. no. 4.
— villosissimum St. Hil. I. 222. no. 18.
— viscidulum H. B. Kth. V. 59. no. 1.
Jonopsis Hook. fil. VI. 118.
Josephinia Vent. *VI. 519.
Jossinia DC. II. 172. V. 750.
— *Indica* Wght. II. 172. no. 6.
Jovellana Rz. et Pav. III. 151. °III. 958.
Jovellana Rz. et Pav. VI. 634.
— punctata Rz. et Pav. III. 151. no. 2.
— scapiflora Rz. et Pav. III. 151. no. 1.
—? triandra Cav. III. 152. no. 4.
— violacea G. Don. III. 151. no. 3.
Juanulloa Rz. et Pav. III. 106. °III. 955. VI. 616.
— *aurantiaca* Otto et Dietr. III. 934.
— parasitica Rz. et Pav. III. 106. no. 1. III. 934. *VI. 616. no. 1.
Juàti Marcgr. VI. 597. no. 101.
Jubelina Adr. Juss. °V. 340.
— riparia Adr. Juss. V. 340. no. 1.
Jucunda Cham. II. 140.
— Lhotschyana Cham. II. 140. no. 3.
— Martiana Cham. II. 140. no. 1.
— Olfersiana Cham. II. 140. no. 4.
— Sellowiana Cham. II. 140. no. 2.
— tomentosa Bth. *II. 140. no. 5.
Juglans Catappa Lour. II. 60. no. 1. β.
Juliania Llaw et Lex. I. 493.
— caryophyllea Llaw et Lexarza. *I. 493. no. 1.
Juliania Schlchtd. °V. 420.
— adstringens Schlchtd. *V. 420. no. 1.
Juliferae Bth. (Acacia) I. 901. V. 590.
Junceae Wlprs. (Verbena) IV. 16.
Jungia Linn. *II. 682. *VI. 322.
— *altissima* Mnch. III. 667. no. 266.
— *formosa* Mnch. III. 653. no. 207.
— *tenella* Gaertn. II. 920. no. 4. V. 734. no. 4.
Jurinea Cass. II. 677. VI. 309.
— adenocarpa Schrenk. II. 678. no. 9.
— albicaulis Bnge. II. 677. no. 3.
— Anatolica Boiss. VI. 309. no. 2.
— angustifolia Bnge. II. 677. no. 4.

Jurinea arachnoidea Bnge. II. 678. no. 6.
— Cadmea Boiss. VI. 309. no. 1.
— *carduiformis* Boiss. VI. 289. no. 1.
— cretacea Bnge. II. 678. no. 7.
— Eversmanni Bnge. II. 677. no. 2.
— frigida Boiss. VI. 309. no. 4.
— Ledebourii Bnge. II. 678. no. 5.
— *longifolia* DC. II. 677. no. 3. β.
— *macrocephala* DC. VI. 290. no. 1.
— pinnata DC. II. 678. †
— *ramosissima* DC. VI. 283. no. 2.
— Sophiana Kaleniczenko. VI. 309. no. 3.
— *Staehelinae* Boiss. VI. 283. no. 1.
— tenuiloba Bnge. II. 677. no. 1.
— tenuis Bnge. II. 678. no. 8.
— *tenuis* Bnge. VI. 308. no. 2.
Juripeba altera Piso. VI. 602. no. 131.
— *prior* Piso. III. 74. no. 275.
Jussiaea Linn. II. 72. V. 654.
— alata Prsl. II. 73. no. 12.
— bracteata Hook. et Arn. II. 72. no. 8.
— calycina Prsl. II. 73. no. 11.
— caparosa Cambess. II. 73. no. 19.
— *caryophyllacea* Lam. II. 75. no. 4.
— *diffusa* Forsk.? II. 72. no. 3.
— elegans Cambess. II. 73. no. 18.
— *exaltata* Rxb. II. 72. no. 2.
— fluitans Hochstett. V. 664. no. 1.
— *fluviatilis* Blume. I. 72. no. 1.
— *fruticosa* DC. II. 72. no. 2. α.
— *grandiflora* β. Hook. et Arn. II. 72. no. 1.
— helminthorhiza Mart. II. 74. no. 27.
— hexamera Miquel. V. 665. no. 4.
— hexapetala Hook. et Arn. II. 72. no. 6.
— hirsuta Prsl. II. 73. no. 13.
— lanceolata Cambess. II. 73. no. 20.
Jussiaea Larouotteana Cambess. II. 73. no. 17.
— latifolia Bth. II. 74. no. 28.
— linearis Hochstett. V. 664. no. 2.
— longifolia Rchb. II. 73. no. 15.
— macropoda Prsl. II. 73. no. 14.
— *Mendozinensis* Gill. II. 72. no. 1.
— micropetala Mart. II. 74. no. 26.
— multinervia Hook. et Arn. II. 72. no. 7.
— myrtifolia Cambess. II. 73. no. 22.
— *oblonga* Gill. II. 72. no. 1.
— occidentalis Nutt. II. 72. no. 4.
— Palmitensis Cambess. II. 74. no. 23.
— parviflora Cambess. II. 74. no. 24.
— persicariaefolia Schlchtd. II. 73. no. 9.
—? *Prieuria* Guill. et Perr. II. 72. no. 1.
— pterophora Miq. II. 74. no. 29.
— *pumila* Gill. II. 72. no. 1.
— *racemosa* Rottl. II. 63. no. 4.
— repens L. *II. 72. no. 1.
— *sagittata* Poir. II. 102. no. 11.
— sericea Cambess. II. 73. no. 21.
— stenophylla Gill. II. 72. no. 5.
— stolonifera Guill. et Perr. II. 72. no. 3.
— *subacaulis* Prsh. II. 86. no. 68.
— *suffruticosa* L. II. 72. no. 2. α.
— Surinamensis Miquel. V. 665. no. 3.
— *Swartziana* DC. II. 72. no. 1.
— tomentosa Cambess. II. 73. no. 16.
— torulosa Arnott. II. 74. no. 30.
— Uruguayensis Cambess. II. 74. no. 25.
— venosa Prsl. II. 73. no. 10.
— villosa Lam. *II. 72. no. 2. (c. varr. α. et β. ibid.)
Jussieua cf. Jussiaea.
Jussieueae DC. II. 72. V. 664.

K

Kada Kandel Rheede. II. 63. no. 1.
Kadsura L. I. 92. V. 15.
— cauliflora Bl. I. 92. no. 3.
— grandiflora Wall. V. 15. no. 2.
— Japonica L. *I. 92. no. 1. V. 15. no. 1.
— propinqua Wall. V. 16. no. 3.
— scandens Blume. I. 92. no. 2.
— Wightiana Arn. I. 92. no. 4.
Kadua Cham. et Schlchtd. II. 501.
Kadua Arnottii G. Don. II. 501. no. 87.
— *centranthoides* Hook. et Arn. II. 501. no. 85.
— *glomerata* Hook. et Arn. II. 501. no. 84.
— *Smithii* Hook. et Arn. II. 501. no. 86.
Kaempfera Houst. IV. 115. no. 2.
Kageneckia Rz. et Pav. II. 52.
— angustifolia D. Don. II. 52. no. 2.
— *crataegifolia* Lindl. II. 52. no. 3.

Kageneckia crataegoides D. Don. II. 52. no. 3.
— oblonga Rz. et Pav. *II. 52. no. 3.
— ovata Colla. II. 52. no. 1.
Kahitutankai VI. 45. no. 1.
Kaka-pu Rheede. III. 295. no. 3.
Kalanchoë Adans. II. 256.
— acutiflora Haw. II. 257. †
— Brasiliensis Cambess. II. 257. no. 6.
— Delagoënsis Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 1.
— floribunda Wght. et Arn. II. 257. no. 4.
— grandiflora Wall. II. 256. no. 3.
—? heterophylla Wght. et Arn. II. 257. no. 5.
— *spathulata* Wall. II. 257. no. 4.
— teretifolia Hook. II. 256. no. 2.
— varians Haw. II. 257. †
— *Wightiana* Wall. II. 257. no. 3.
Kalbfussia C. H. Schultz. *II. 689. *VI. 344.
Kallstroemia Scop. I. 493.
— cistoides Endl. *I. 493. no. 2.
— maxima Wght. et Arn. *I. 493. no. 1.
— tribuloides Wght. et Arn. I. 493. no. 3.
Kalmia Linn. *II. 730.
Kalpandria Blume. I. 435.
— lanceolata Blume. I. 435. no. 1.
— Quiscosaura Korthls. I. 435. no. 2.
Kamptzia albens N. ab E. II. 160. no. 1.
Kanahia R. Br. *VI. 685.
Kandelia Wght. et Arn. II. 70.
— Rheedei Wght. et Arn. *II. 70. no. 1.
Κάπνος Dioscorid. V. 27. no. 1.
Karamyschewia Fisch. et Mey. II. 502. VI. 56.
— hedyotoides Fisch. et Mey. *II. 502. no. 1. VI. 56. no. 1.
Karelinia Lssng. *II. 594. *II. 952. no. 16.
Karivia Arn. II. 199.
— amplexicaulis Arn. *II. 199. no. 2.
— *umbellata* Arn, II. 198. no. 6.
— umbellata Arn. *II. 199. no. 1.
Karpaton Raf. *II. 454.
Karthemia DC. *II. 953. no. 8.
Katu-Kurka Rheede. III. 520. no. 1.
Katu-pee-tsjanga-puspam Rheede. III. 292. no. 4.
Katutumba Rheede. III. 496. no. 6.
Kayea Wall. I. 397.
— floribunda Wall. *I. 397. no. 1.
Keerlia DC. *II. 585. *II. 951. no. 8.
Keimodracon Bth. III. 791. VI. 678. no. 1.
Keithia Bth. III. 742. °III. 983.
Keithia Bth. III. 743.
— ciliata Bth. III. 743. no. 4.
— coccinea Bth. III. 744. no. 9.
— denudata Bth. III. 744. no. 8.
— gracilis Bth. III. 744. no. 7.
— lavanduloides Bth. III. 744. no. 6.
Keithia pilosa Bth. III. 743. no. 3.
— rubiacea Bth. III. 742. no. 1.
— scutellarioides Bth. III. 743. no. 2.
— villosa Bth. III. 743. no. 5.
Kellaua Alph. DC. *VI. 461.
Kennedya Vent. I. 757. V. 529.
— arenaria Bth. I. 757. no. 1.
— Baumanni Meisn. V. 529. no. 1.
— bracteata Gaudich. I. 757. no. 3.
— *coccinea* Vent. I. 757. no. 3.
— *cordata* Lindl. I. 758. no. 3.
— *dilatata* A. Cunn. I. 757. no. 2.
— *glabrata* Lindl. I. 757. no. 5.
— *inophylla* Lindl. I. 757. no. 1.
— *macrophylla* Lindl. I. 758. no. 5.
— Marryattae Lindl. I. 757. no. 6.
— microphylla Meisn. V. 530. no. 4.
— *minima* Sieb. I. 758. no. 1.
— *monophylla* Vent. I. 758. no. 1.
— nigricans Lindl. I. 757. no. 4.
— *ovata* Sims. I. 758. no. 2.
— parviflora Meisn. V. 530. no. 3.
— prostrata R. Br. *I. 757. no. 7.
— *prostrata β. major* DC. I. 757. no. 5.
— rubicunda Vent. *I. 757. no. 2.
— splendens Meisn. V. 530. no. 2.
— stipularis Desv. I. 757. no. 5.
— *Stirlingi* Lindl. I. 758. no. 2.
Kennedyeae Bth. I. 756. II. 900. V. 529.
Kentrophyllum Neck. *II. 672. VI. 302.
— Anatolicum Boiss. VI. 302. no. 1.
Kentrophyta Nutt. I. 712.
— montana Nutt. I. 712. no. 1. (cum var. β. ibid.) (III. Emend. p. 4.)
— viridis Nutt. I. 712. no. 2.
Keramocarpus Fnzl. °V. 921.
— Tordylium Fnzl. *V. 922. no. 1.
Keraudrenia Gay. *I. 337.
Kernera glastifolia Rchb. I. 154. †
— saxatilis Rchb. cum var. auriculata Rchb. I. 154. †
Kerria DC. II. 49.
— Japonica DC. *II. 49. no. 1.
Ketmia DC. I. 302. no. 3. 5. I. 310. no. 25. I. 303. no. 15. 19(?) 20(?) 21. 22. 26. 39. 40. 41. 42.
Khaya Adr. Juss. I. 436.
— Senegalensis Adr. Juss. *I. 436. no. 1.
Kibbesia DC. *II. 148. V. 723.
— cordata Krtbls. V. 723. no. 2.
— simplex Krtbls. V. 723. no. 1.
Kickxia Blume. VI. 471.
— arborea Blume. *VI. 471. no. 1.
— *Elatine* Dumort. III. 193. no. 19.
— *spuria* Dumort. III. 193. no. 18.
Kielmeyera Mart. et Zucc. I. 373. V. 133.

Kielmeyera angustifolia Pohl. I. 373. no. 12.
— coriacea Mart. et Zucc. I. 373. no. 3.
— corymbosa Mart. et Zucc. I. 373. no. 5.
— excelsa St. Hil. I. 373. no. 11.
— humifusa St. Hil. I. 373. no. 9.
— membranacea Casaretto. V. 133. no. 1.
— microphylla Pohl. I. 374. no. 15.
— neriifolia St. Hil. I. 373. no. 8.
— oblonga Pohl. I. 374. no. 13.
— petiolaris Mart. et Zucc. I. 373. no. 2.
— pumila Pohl. I. 374. no. 14.
— rosea Mart. et Zucc. I. 373. no. 1.
— rubriflora St. Hil. I. 373. no. 7.
— speciosa St. Hil. Juss. et Cambess. I. 373. no. 6.
— tomentosa St. Hil. I. 373. no. 10.
— variabilis Mart. et Zucc. I. 373. no. 4.
Kiesera Reinw. I. 762.
— sericea Reinw. *I. 762. no. 1.
Kigelia A. P. DC. VI. 517.
— Aethiopica Dcne. VI. 517. no. 1.
Kiggelaria L. I. 206.
— ferruginea Eckl. et Zeyh. I. 206. no. 1.
Kirschlegeria Spach. II. 94.
Kitaibelia Willd. I. 290.
— vitifolia Willd. *I. 290. no. 1.
Klaprothia H. B. Kth. *II. 225.
Klasea DC. II. 677. no. 1. 2.
Kleinhovia L. *I. 340.
Kleinhovieae Endl. I. 340.
Kleinia Linn. *II. 653.
— *neriifolia* Hav. VI. 266. no. 54.
Kleinoidei (Senecio) VI. 264. no. 42.
Klenzea C. H. Schultz. *II. 953. no. 1. °II. 973.
— Abyssinica C. H. Schultz. II. 973. no. 1.
— lycopodioides C. H. Schultz. II. 973. no. 3.
— rosmarinifolia C. H. Schultz. II. 973. no. 2.
Klotzschia Cham. II. 387. V. 844.
— Brasiliensis Cham. *II. 387. no. 1. V. 844. no. 1.
Klugia Schlchtd. *II. 716. *VI. 406. *VI. 523.
Knautia Coult. II. 533. VI. 85.
— bidens Boiss. II. 533. no. 2.
— hybrida Coult. *VI. 85. no. 1.
β. lyrata.
γ. micrantha.
— longifolia Koch. II. 533. no. 1.
— Macedonica Griseb. VI. 85. no. 2.
— Salcedi G. Don. II. 533. no. 3.
Kneiffia Spach. II. 84.
— *angustifolia* Spach. II. 84. no. 56.
— *chrysantha* Spach. II. 84. no. 57.
— *floribunda* Spach. II. 84. no. 55.
— *Fraseri* Spach. II. 84. no. 53. β.
— *glauca* Spach. II. 84. no. 53.
— *linifolia* Spach. II. 85. no. 60.
Kneiffia maculata Spach. II. 84. no. 56.
— *pumila* Spach. II. 84. no. 58.
— *riparia* Spach. II. 84. no. 54.
— *suffruticosa* Spach. II. 84. no. 55.
Knowltonia Sol. *I. 32.
Knoxia Linn. II. 468.
— corymbosa Willd. *II. 468. no. 1.
— *exserta* DC. II. 468. no. 1.
— *glabra* DC. II. 497. no. 51.
— hirsuta Arn. II. 469. no. 5. (cum. varr. α. et β. ibid.)
— mollis R. Br. *II. 468. no. 2.
— platycarpa Arn. II. 468. no. 4.
— *scandens, foliis cordato-ovatis etc.* P. Br. IV. 119. no. 5.)
— *Sumatrensis* DC. II. 468. no. 2.
— *Sumatrensis* Wall. II. 468. no. 1.
— *teres* DC. II. 468. no. 1.
— *umbellata* Bnks. II. 468. no. 1.
— *umbellifera* Rxb. II. 468. no. 2.
— Wightiana Wall. II. 468. no. 3.
Koanophyllum Arruda. *II. 702. no. 4.
Koeberlinia Zucc. I. 258.
— spinosa Zuccar. I. 258. no. 1.
Koechlea Endl. II. 669.
— mitis Endl. *II. 669. no. 1.
Köllia capitata Moench. III. 691. no. 12.
Koelreuteria Laxm. *I. 421.
Koelpinia Pall. *II. 684. *VI. 327.
Kohautia Cham. et Schlchtd. II. 501. V. 55.
— *amatymbica* Eckl. et Zeyh. II. 501. no. 81.
— *coccinea* Royle. II. 501. no. 82.
— *Senegalensis* Cham. et Schlchtd. II. 501. no. 83.
Kohlrauschia Kth. II. 773.
— diminuta L. I. 270. †.
— obcordata Reut. I. 270. †
— prolifera Knth. I. 270. †
— velutina Guss. I. 270. †
Kolbia Palis. *II. 222.
Kolleria Prsl. III. 232.
— *collina* Eckl. et Zeyh. II. 232. no. 2.
— *glauca* Eckl. et Zeyh. II. 232. no. 4.
— *herniariaefolia* Prsl. II. 232. no. 1.
— *pallens* Eckl. et Zeyh. II. 232. no. 3.
Koniga Adans. I. 142.
— halimifolia Rchb. I. 142. no. 2.
— Lagascae Webb. I. 142. no. 1.
— Lybica R. Br. *I. 142. no. 4.
— maritima R. Br. I. 142. †
— spinosa G. Don. I. 142. no 3.
Kopsia Blume. VI. 468.
— arborea Blume. *VI. 468. no. 2.
— fruticosa Alph. DC. *VI. 468. no. 1.
— *longiflora* Dumort. III. 458. no. 4.
Kosteletzkya Prsl. I. 302. II. 790.

Kosteletzkya cordata Prsl. I. 302. no. 4.
— hastata Prsl. I. 302. no. 1.
— hispida Prsl. I. 302. no. 3.
— pentacarpa Ledeb. II. 790. no. 1.
— sagittata Prsl. I. 302. no. 2.
Kotschya Endl. I. 735. V. 523.
— Africana Endl. *I. 735. no. 1. V. 523. no. 1.
Krameria Loefl. I. 247. V. 67.
— cistoidea Hook. I. 247. no. 2.
— cuspidata Prsl. I. 247. no. 1.
— grandiflora St. Hil. I. 248. no. 3.
— ixina L. I. 248. †
— parvifolia Bth. V. 67. no. 1.
— ruscifolia St. Hil. I. 248. no. 4.
— tomentosa St. Hil. I. 248. no. 5.
Kraussia Harv. II. 525. °VI. 47.
Kraussia C. H. Schultz. *II. 955. no. 3.
Kraussia C. H. Schultz. II. 974.
— *Capensis* C. H. Schultz. II. 974. no. 1.
— floribunda Harw. *II. 525. no. 1. *VI. 47. no. 1.
Krebsia Eckl. et Zeyh. I. 623. *V. 460.
Krebsia Eckl. et Zeyh. II. 837. V 455.
— argentea Eckl. et Zeyh. I. 623. no. 3.
— *argentea* Eckl. et Zeyh. V. 453. no. 5.
— carnosa Eckl. et Zeyh. I. 623. no. 4.
— *carnosa* Eckl. et Zeyh. V. 455. no. 6.
— *cytisoides* Steud. V. 455. no. 4.
— divaricata Eckl. et Zeyh. I. 623. no. 2.
— *divaricata* Eckl. et Zeyh. V. 455. no. 7.
— *eriocarpa* E. Mey. V. 455. no. 4.
— *genuflexa* Steud. V. 455. no. 5.
— *striata* E. Mey. V. 455. no. 6.
— stricta Eckl. et Zeyh. I. 623. no. 1.
— *stricta* Eckl. et Zeyh. V. 455. no. 4.
Krigia Schreb. II. 685. *VI. 328.
— Caroliniana Nutt. *II. 685. no. 3.
— *dichotoma* Nutt. II. 685. no. 2.
— *leptophylla* DC. II. 685. no. 3.
— montana Nutt. *II. 685. no. 4.
— occidentalis Nutt. II. 685. no. 1.
β. mutica.
— Virginica Willd. *II. 685. no. 2.
Krockeria Ser. I. 647.
Krubera Hffm. II. 405.
— Caffra Eckl. et Zeyh II. 405. no. 1.
Krynitzkia Fisch. et Mey. *VI. 562.
Kuhlia H. B. Kth. I. 204. V. 56.
Kuhlia glauca H. B. Kth. I. 204. no. 1.
— mollis Poepp. et Endl. V. 56. no. 1.
Kuhnia DC. VI. 704.
Kuhnia Linn. II. 548.
— *Critonia* Ell. II. 549. no. 1. γ.
— *Critonia* Willd. II. 548. no. 1.
— *eupatorioides* Ell. II. 548. no. 1. β.
— eupatorioides Linn. II. 548. no. 1.
β. corymbulosa II. 548. no. 1.
γ. gracilis II. 549. no. 1.
— *eupatorioides* Raf. II. 548. no. 1.
— *eupatorioides* Willd. II. 548. no. 1.
— *dasypia* Raf. II. 548. no. 1.
— *elliptica* Raf. II. 548. no. 1.
— *fulva* Raf. II. 548. no. 1.
— *glabra* Raf. II. 548. no. 1.
— *glutinosa* DC. II. 555. no. 22.
— *glutinosa* Ell. II. 548. no. 1. β.
— *glutinosa* Raf. II. 548. no. 1.
— *Maximiliani* Sinning. II. 549. no. 1. β. et in adnot.
— *media* Raf. II. 548. no. 1.
— *paniculata* Cass. II. 549. no. 1. γ.
— *pubescens* Raf. II. 548. no. 1.
— *suaveolens* Fresen. II. 548. no. 1. β.
— *tuberosa* Raf. II. 548. no. 1.
Kundmannia Scop. *II. 401.
Kunzea Rchb. °V. 741.
— Baxteri Schauer. V. 741. no. 1.
— corifolia Rchb. V. 741. no. 2.
— micrantha Schauer. V. 742. no. 7.
— parvifolia Schauer. V. 742. no. 5.
— pauciflora Schauer V. 742. no. 6.
— praestans Schauer. V. 741. no. 3.
— Preissiana Schauer. V. 742. no. 8.
— propinqua Schauer. V. 742. no. 11.
— recurva Schauer. V. 641. no. 10.
— Schaueri Lehm. V. 742. no. 4.
— vestita Schauer. V. 742. no. 12.
— villiceps Schauer. V. 742. no. 9.
Kurka Rheede. III. 503. no. 9.
Kurria floribunda Hochstett. II. 943. no. 1. VI. 63. no. 2.
Kutchubaea Fisch. *II. 521.
Kydia Rxb. *I. 351. V. 115.
— angustifolia Arn. V. 115. no. 1.
Kymaplenra Nutt. *II. 696.
Kymapleura Nutt. II. 696.
— *heterophylla* Nutt. II. 696. no. 7.

L

Labatia Martius. VI. 454.
— salicifolia Kltzsch VI. 454. no. 1.
LABIATAE Juss. III. 483. III. 976. VI. 657.
Labiatiflorae Endl. II. 678. II. 996. VI. 312.
Labichea Gaudich. I. 840. V. 561.
— bipunctata Paxton. *V. 562. no. 2.
— diversifolia Meisn. V. 561. no. 1.
α. brevifolia.
β. longifolia.
— lanceolata Bth. I. 840. no. 1.
— punctata Lindl. I. 840. no. 2.
Labillardiera fusiformis Roem. et Schult. I. 257. no. 1.
— *longiflora* Roem. et Schult. I. 258. no. 6.
— *mutabilis* Roem. et Schult. I. 257. no. 4.
— *scandens* Roem. et Schult. I. 257. no. 3.
Labisia Lindl. ° VI. 448.
— pothoina Lindl. VI. 449. no. 1.
Lablab Adans. I. 781. V. 539.
— cultratus DC. *I. 781. no. 2.
— *leucocarpus* Savi. I. 781. no. 1.
— *lignosus* Grah. I. 781. no. 2.
— *lignosus* Wall. I. 781. no. 1.
— *microcarpus* DC. I. 781. no. 1.
— *Nankinicus* Savi. I. 781. no. 1.
— *perennans* DC. I. 781. no. 1.
— vulgaris Savi. *I. 781. no. 1. *V. 539. no. 1.
Lablavia vulgaris Sweet. I. 781. no. 1.
Labordia Gaudich. *VI. 497.
Labordieae Endl. VI. 497.
Labourdonnaisia Bojer. *VI. 456.
Labramea Alph. DC. *VI. 456.
Laburnum DC. II. 845. no. 2. 3. 4.
Lacepedea H. B. Kth. *I. 402.
Lachanodes DC. *II. 665.
Lachnoloma Bnge. °V. 49.
— Lehmanni Bnge. *V. 49. no. 1.
Lachnopodium Blume. II. 132.
— rubrolimbatum Blume. *II. 132. no. 1.
Lachnopyleae Alph. DC. VI. 498.
Lachnopylis Hochstett. *VI. 498.
Lachnosiphonium Hochstett. II. 943. VI. 51.
Lachnosiphonium obovatum Hochst. *II. 943. no. 1. VI. 51. no. 1.
Lachnospermum Willd. *II. 648.
Lachnostoma H. B. Kth. VI. 490.
— Balbisii Dcne. *VI. 490. no. 1.
Lactuca Tournef. II. 693. VI. 352.
— Abyssinica Fresen. II. 693. no. 1.
— arvensis Edgeworth. VI. 353. no. 2.
— *Caroliniana* Walt. II. 694. no. 3. α.
— Caucasica C. Koch. VI. 353. no. 3.
α. major.
β. minor.
—? *cernua* Jacqem. II. 691. no. 2.
— elongata Mühlbrg. *II. 693. no. 3.
α. longifolia Mühlbrg. II. 693. no. 3.
β. integrifolia Mühlbrg. II. 694. no. 3.
γ. sanguinea Mühlbrg. II. 694. no. 3.
— *hastata* DC. VI. 355. no. 5.
— *hirsuta* Mühlbrg. II. 694. no. 3. γ.
— *integrifolia* Bigel. II. 691. no. 3. β.
— intricata Boiss. VI. 352. no. 1.
— *longifolia* Michx. II. 694. no. 3. α.
— *microcephala* DC. VI. 354. no. 2.
— Persica Boiss. VI. 353. no. 4.
— polyclada Boiss. VI. 353. no. 5.
— *pulchella* DC. II. 699. no. 1.
— rariflora Fresen. II. 693. no. 2.
— *sagittifolia* Ell. II. 694. no. 3. β.
— *sanguinea* Bigel. II. 691. no. 3. γ.
— *villosa* Mühlbrg. II. 694. no. 3. γ.
Lactuceae Lssng. II. 689. VI. 352.
Ladenbergia Kltzsch. ° VI. 66.
— acutifolia Kltzsch. *VI. 68. no. 18.
— Bergeniana Kltzsch. *VI. 67. no. 11.
— cava Kltzsch. *VI. 68. no. 19.
— Cujabensis Kltzsch. VI. 67. no. 8.
— densiflora Kltzsch. *VI. 68. no. 16.
— dichotoma Kltzsch. *VI. 67. no. 14.
— dissimiliflora Kltzsch. *VI. 67. no. 7.
— firmula Kltzsch. *VI. 67. no. 9.
— hexandra Kltzsch. *VI. 67. no. 3.
— Lambertiana Kltzsch. *VI. 67. no. 10.
— macrocarpa Kltzsch. *VI. 67. no. 4.
— macrocnema Kltzsch. *VI. 67. no. 12.

Ladenbergia magnifolia Kltzsch. *VI. 67. no. 13.
— Moritziana Kltzsch. VI. 67. no. 5.
— nitida Kltzsch. VI. 68. no. 22.
— ovalifolia Kltzsch. *VI. 68. no. 20.
— Riedeliana Kltzsch. VI. 68 no. 21.
— Roraimae Kltzsch. *VI. 67. no. 2.
— Schomburgkii Kltzsch. VI. 67. no. 6.
— stenocarpa Kltzsch. *VI. 68. no. 17.
— tenuiflora Kltzsch. *VI. 68. no. 15.
— undata Kltzsch. VI. 67. no. 1.
Laennecia Cass. *II. 595. *II. 952. no. 21. VI. 132.
— alpina Poepp. et Endl. VI. 132. no. 1.
Laestadia Kth. *II. 951. no. 5.
Laetevirentes Bth. (Calliandra) V. 601.
Laetia Loefl. I. 203.
— longifolia A. Rich. I. 203. no. 1.
— crenata A. Rich. I. 204. no. 2.
Laetiflori Torr. et Gr. (Helianthus) II. 984.
Lafoënsia Vandell. II. 113.
Lafoensia ....? Roemer. II. 113. no. 3.
— densiflora Pohl. II. 113. no. 1.
— kielmeyeraefolia St. Hil. II. 113. no. 4.
— microphylla Pohl. II. 113. no. 3.
— nummularifolia St. Hil. II. 113. no. 6.
— Pacari St. Hil. II. 113. no. 5.
— replicata Pohl. II. 113. no. 2.
— *Vandelliana* DC. II. 113. no. 3.
Lafuëntea Lagasca. III. 436. °III. 973. *VI. 643.
— rotundifolia Lagasca. III. 436. no. 1.
Lagarinthus E. Mey. *VI. 486.
Lagasca Cav. VI. 102. no. 1.
Lagascea H. B. Kth. *II. 543. VI. 102.
— campestris Gardn. VI. 103. no. 2.
— Kunthiana Gardn. VI. 102. no. 1.
Lagenaria Ser. *II. 201.
Lagenias E. Mey *VI. 500.
Lagenocarpus Kltzsch. *II. 729.
Lagenophora Cass. II. 585. *II. 951. no. 4. VI. 126.
— alata A. Cunn. II. 585. no. 1.
— Billardieri Cass. *VI. 126. no. 1.
— gracilis Steetz. VI. 127. no. 3.
— Gunniana Steetz. VI. 126. no. 2.
— latifolia Hook. fil. VI. 719. no. 1.
— montana Hook. fil. VI. 719. no. 2.
  α. major.
  β. minor.
Lagenula Lour. *V. 411.
— pedata Lour. *V. 411. adn.
Lagerstroemia Linn. II. 114.
— floribunda W. Jack. II. 114. no. 2.
— grandiflora Rxb. II. 114. no. 1.
Lagerstroemia microcarpa Wght. II. 114. 1. (c. varr. α. et β. ibid.)
— parviflora Rxb. II. 114. no. 3.
— *parviflora* Wght. et Arn. II. 114. no. 1.
Lagerstroemieae DC. II. 112. V. 675.
Lagetta Malabarica Poir. II. 803. no. 1.
Laggera C. H. Schultz. *II. 953. no. 2.
— *purpurasceus* C. H. Schultz. VI. 133. no. 1.
Lagochilus Bnge. III. 808. °III. 987.
— acutilobus Fisch. et Mey. III. 809. no. 8.
— Aucheri Boiss. III. 950.
— Bungei Bth. III. 810. no. 10.
— *Bungei β. minor* Schrenk. III. 809. no. 9
diacanthophyllus Bth. III. 808. no. 1.
— hirtus Fisch. et Mey. III. 810. no. 11.
— hispidus Fisch. et Mey. III. 809. no. 5.
— ilicifolius Bnge. III. 809. no. 6.
— insignis Fisch. et Mey. III. 808. no. 4.
— leiacanthus Fisch. et Mey. III. 808. no. 2.
— macracanthus Fisch. et Mey. III. 808. no. 3.
— platycalyx Fisch. et Mey. III. 809. no. 7.
Lagoecia Linn. *II. 423.
Lagondium litoreum Rmph. IV. 89. no. 37.
Lagonychium Stephanianum M. B. I. 861. no. 2. V. 582. no. 2.
Lagophylla Nutt. II. 630. VI. 182.
— ramosissima Nutt. II. 630. no. 1. VI. 182. no. 1.
Lagopsis Bnge. III. 856.
— *flava* Karel. et Kiril. III. 856. no. 4.
— *incana* Bunge. III. 856. no. 3.
— *viridis* Bunge. III. 856. no. 2.
Lagopus Ser. I. 639. no. 3. 6. 20. II. 850. V. 512.
Lagoseris M. Bieb. II. 697.
— Rüppelii A. H. Schultz. II. 697. no. 1.
— *tenuifolia* Rchb. VI. 361. no. 4.
Lagothamnus Nutt. II. 664.
— *ambiguus* Nutt. II. 664. no. 4.
— *microphyllus* Nutt. II. 664. no. 4.
Lagotis glauca Grtnr. III. 372. no. 4.
— *spermacocea*? E. Mey. VI. 25. no. 2.
Lagunaria Don. I. 311.
— cuneiformis G. Don. I. 311. no. 1.
— lilacina Lindl. I. 311. no. 2.
Laguncularia Gaertn. II. 63.
— glabrifolia Prsl. II. 63. no. 1.
— Haenkei Endl. II. 63. no. 2.
— *lutea* Gaudich. II. 63. no. 3.
— *purpurea* Gaudich. II. 63. no. 1.
— *rosea* Gaudich. II. 63. no. 2.
Lagunea Cav. I. 327.
— *aculeata* Cav. I. 308. no. 1.
— lobata Willd. *I. 327. no. 1.

Lalage Lindl. I. 577. V. 434.
—? acuminata Meisn. V. 434. no. 1.
— angustifolia Meisn. V. 434. no. 2.
— boveaefolia Bth. I. 577. no. 2.
— ornata Lindl. *I. 577. no. 1. V. 434. no. 4.
—? stipularis Meisn. V. 434. no. 3.
Lallemantia Fisch. et Mey. III. 798. °III. 986.
— canescens Fisch. et Mey. III. 798. no. 1.
— Iberica Fisch. et Mey. III. 798. no. 2.
— peltata Fisch. et Mey. III. 798. no. 3.
Lamarchea Gaudich. II. 161.
— hackeaefolia Gaudich. *II. 161. no. 1.
Lamarckea Pers. III. 14.
— *coccinea* Pers. III. 14. no. 1.
Lamarckia Spr. III. 14.
— *coccinea* Spr. III. 14. no. 1.
Lamieae Endl. III. 801. III. 987. VI. 678.
Lamiopsis Dumort. III. 801. VI. 678. no. 1.
Lamiotypus Dumort. III. 805.
Lamium Linn. III. 801. °III. 987. VI. 678.
— *album* Linn. III. 806. no. 21. β.
— amplexicaule Linn. III. 803. no. 11.
γ. clandestinum.
— Armenum Boiss. VI. 679. no. 3.
— bifidum Cyr. III. 803. no. 10.
β. clandestinum.
— *Coesfeldiae* Weibe. III. 804. no. 15.
— *calycinum* d'Urv. III. 805. no. 17. (et diagnosis ibid. in adnot.)
— *capitatum* Sm III. 806. no. 21. β.
— *Columnae* Torr. III. 806. no. 22.
— crinitum Montbr. et Auch. III. 805. no. 16.
— *cryptanthum* Guss. III. 803. no. 10. β.
— *dissectum* With. III. 804. no. 15.
— erythrotrichum Boiss. III. 950.
— flexuosum Ten. III. 807. no. 24.
— *foliosum* Crantz. III. 806. no. 21. β.
— Galeobdolon Crantz. III. 807. no. 25.
— Garganicum Linn. III. 802. no. 5.
— glechomoides Sm. III. 802. no. 7.
— *grandiflorum* Pourr. III. 806. no. 21. α.
— Gundelsheimeri C. Koch. III. 805. no. 18.
— *hirsutum* Lam. III. 806. no. 21. α.
— hirtum Poir. III. 807. no. 26.
— *hispidulum* Michx. III. III. 801. no. 1.
— *hybridum* Vill. III. 804. no. 15.
— incisum Willd. III. 804. no. 15.
— intermedium Fries. III. 804. no. 13.
— *laevigatum* DC. III. 802. no. 6.
— *laevigatum* Linn. III. 806. no. 21. α.
— longiflorum Ten. III. 802. no. 6.
— *maculatum* Linn. III. 806. no. 21. α.
— *melissaefolium* Mill. III. 806. no. 21. α.
— *Michelianum* Tausch. III. 802. no. 5.
— micranthum Weinm. III. 807. no. 27.
— microphyllum Boiss. III. 950.
Lamium molle Ait. III. 806. no. 20.
— *moluccellaefolium* Fries. III. 804. no. 13.
— moschatum Mill. III. 805. no. 17.
— multifidum Linn. III. 801. no. 2.
— *mutabile* Dumort. III. 806. no. 21. α.
— nivale Boiss. et Heldreh. VI. 679. no. 2.
— *niveum* Hortul. III. 806. no. 21. β.
— *nudum* Moench. III. 804. no. 14.
— *ocimifolium* Sm. III. 804. no. 14.
— Orvala Linn. III. 801. no. 1. (c. var. β.)
— *palmatum* Sm. III. 804. no. 11.
— *Pannonicum* Scop. III. 801. no. 1.
— *Panonicum secundum exoticum* Clus. III. 164. no. 1.
— *Parietariae facie* Moris. III. 805. no. 20.
— parietariaefolium Bth. III. 805. no. 20.
— *Pedemontanum* Rchb. III. 802. no. 6.
— petiolatum Royle. III. 805. no. 19.
— *Petitinum* Gay. III 807. no. 24.
— pubescens Sibthrp. III. 806. no. 23.
— purpureum Linn. III. 804. no. 14.
β. molle Ait.
— rectum Schenk. III. 804. no. 12.
— reniforme Montbr. et Auch. III. 802. no. 3.
— rhomboideum Bth. III. 702. no. 4.
— Robertsonii Boiss. VI. 678. no. 1.
— *rubrum* Wallr. III. 806. no. 21. α
— *rugosum* Ait. III. 806. no. 21. α
— *rugosum* Sbthrp. et Sm. III. 806. no. 23.
— *stoloniferum* Lap. III. 806. no. 21. α.
— striatum Sbthrp. et Sm. III. 803. no. 9.
— tomentosum Willd. III. 806. no. 22.
— *urticaefolium* Weihe. III. III. 804. no. 15.
— veronicaefolium Bth. III. 803. no. 8.
— vulgatum Bth. III. 806. no. 21.
β. album.
α. rubrum.
— *Westphalicum* Weihe. III. 804. no. 15.
Lamourouxia H. B. Kth. III. 397. °III. 971. VI. 652.
— bartsioides Hook. III. 398. no. 10.
— cordata Cham. et Schlchtd. III. 398. no. 5.
— laciniata Martens et Galeotti. VI. 652. no. 4.
— longiflora Bth. III. 398. no. 7.
— macrantha Martens et Galeotti. VI. 652. no. 2.
— microphylla Martens et Galeotti. VI. 652. no. 1.
— multifida H. B. Kth. III. 398. no. 9.
— ovata Martens et Galeotti. VI. 653. no. 5.
— rhinanthifolia H. B. Kth. III. 397. no. 3.
— serratifolia H. B. Kth. III. 397. no. 2.
— sylvatica H. B. Kth. III. 397. no. 4.
— tenuifolia Martens et Galeotti. VI. 652. no. 3.

Lamourouxia virgata H. B. Kth. III. 397. no. 1.
— viscosa H. B. Kth. III. 398. no. 6.
— Xalapensis H. B. Kth. III. 398. no. 8.
Lampromyrtus Schauer. V. 748.
Lampsana Tournef. *II. 683. VI. 327.
— adenophora Boiss. VI. 327. no. 1.
— *grandiflora β.* DC. VI. 327. no. 1.
Lampsaneae Lssng. II. 683. VI. 327.
Lanceolaria DC. II. 764. no. 1.
Lancifolia Barnéoud. (Plantago) IV. 185.
Lancretia Delile. *I. 391.
— *suffruticosa* Delile. I. 285. no. 6.
Landia DC. II. 522.
Landolfia Palis. *VI. 465.
Landtia Lssng. *II. 666.
Langsdorfia? ovalifolia Wght. I. 520. no. 8.
Lannea acida A. Rich. V. 412. no. 3.
— *velutina* A. Rich. I. 550. no. 2. V. 412. no. 2.
Lanneoma Delile. °V. 413.
— velutina Delile. *V. 413. no. 1.
Lansium Rmph. I. 428.
— domesticum Blume. I. 428. no. 1.
— *domesticum* W. Jack. I. 428. no. 1. (gen. no. 5523.)
Lantana Linn. IV. 59. VI. 689.
— *Abyssinica* Alb. Dietr. et Otto. IV. 53. no. 47.
— *achyranthifolia* Dsfnt. IV. 43. no. 4.
— aculeata Linn. IV. 59. no. 2.
— *Africana* Thnbrg. IV. 58. no. 1.
— alba Miller. IV. 63. no. 21.
— *albo-purpurea* Dsfnt. IV. 59. no. 2.
— albo-purpurea Dsf. *IV. 69.
— amethystina Otto et Dietr. IV. 60. no. 9.
— *angustifolia* Miller. IV. 66. no. 36.
— annua Linn. IV. 62. no. 19.
— antidotalis Thonn. et Schum. IV. 59. no. 1.
— *aromatica foliis ternis etc.* Roy. IV. 62. no. 15.
— bracteosa Martens et Galeotti. VI. 689. no. 2.
— Brasililiensis Lnk. IV. 68. no. 42.
— camara Linn. IV. 61. no. 12.
— canescens H. B. Kth. IV. 67. no. 40.
— *Capensis* Thnbrg. IV. 59. no. 1.
— celtidifolia H. B. Kth. IV. 62. no. 17.
— chamaedryfolia Cham. IV. 64. no. 27.
— cinerea Lam. IV. 68. no. 43.
— *coccinea* Lodd. IV. 60. no. 7.
— crenulata Otto et Dietr. IV. 60. no. 7.
— *crispa* Thnbrg. IV. 59. no. 1. et no. 2.
— *crocea* Jcq. IV. 60. no. 6.
— *cuneatifolia* Kltzsch. IV. 44. no. 10.
— *decumbens* Sellow. IV. 65. no. 28.
Lantana dubia Wall. IV. 63. no. 21. et no. 22.
— *flava* Medic. IV. 61. no. 10.
— *fucata* Ker. IV. 64. no. 24.
— *geminata* Spr. IV. 54. no. 48.
— Geroldiana Otto et Dietr. IV. 65. no. 31.
— glutinosa Poeppig. IV. 67. no. 37.
— hirsuta Martens et Galeotti. VI. 689. no. 3.
— *hirta* Grah. IV. 65. no. 30. (c. diagn. ibid. in adn.)
— hispida H. B. Kth. IV. 66. no. 34.
— horrida H. B. Kth. IV. 60. no. 5.
— inconspicua Tausch. IV. 68. no. 47.
— Indica Rxb. IV. 68. no. 48.
— inermis Mill. *IV. 69.
— *involucrata* Forsk. IV. 67. no. 36.
— involucrata Linn. IV. 63. no. 23.
β. incana Linn. IV. 64. no. 23.
— lamiifolia Otto et Dietr. IV. 65. no. 30.
— *lanuginosa* Mill. IV. 63. no. 23.
— *latifolia* Tausch. IV. 63. no. 20. (ibid. in adn. vid. diagnos.)
— lavandulacea Willd. IV. 64. no. 25.
— *leucantha* Hortor. IV. 63. no. 21.
— lilacina Dsf. IV. 66. no. 33.
— lippioides Hook. et Arn. IV. 68. no. 46.
— lippioides Spr. IV. 68. no. 45.
— Lockhardtii G. Don. *VI. 69.
— melissaefolia Ait. IV. 61. no. 10.
— mista Linn. IV. 60. no. 4.
— mollis Grah. *IV. 69.
— mollissima Dsf. IV. 69. no. 50.
— Moritziana Otto et Dietr. IV. 67. no. 38.
— multiflora Otto et Dietr. IV. 61. no. 11.
— nivea Venten. IV. 59. no. 3.
— *nivea* var. *mutabilis* Hook. IV. 61. no. 9.
— odorata Linn. IV. 62. no. 15.
— *odorata* Weigelt. IV. 44. no. 10.
— origanoides Martens et Galeotti. VI. 689. no. 4.
— parvifolia Dsf. IV. 69. no. 49.
— *parvifolia* Salisb. IV. 63. no. 20.
— pilosa H. B. Kth. IV. 62. no. 18.
— *pilosa* Poeppig. IV. 62. no. 14.
— *polycephala* R. Br. IV. 53. no. 47.
— pseudo-thea St. Hil. IV. 64. no. 26.
— purpurea Hornem. IV. 61. no. 13.
— racemosa Loureiro. IV. 69. no. 52.
— radula Swrtz. IV. 66. no. 32.
— recta Ait. IV. 63. no. 20.
— *reticulata* Pers. IV. 65. no. 28. (c. diagnos. ibid. in adn.)
— *rugosa* Thnbrg. IV. 64. no. 24.
— rugulosa H. B. Kth. IV. 66. no. 35.
— salicifolia H. B. Kth. IV. 62. no. 16.
— salviaefolia Jcq. IV. 64. no. 24.
— *salvifolia* Linn. III. 330. no. 61.

Lantana scabiosaefolia H. B. Kth. IV. 67. no. 39.
— scabra Wall. *IV. 69.
— scabrida Ait. IV. 60. no. 6.
— Sellowiana Lnk. et Otto. IV. 64. no. 28.
γ. longifolia Hook. IV. 65. no. 28.
β. planifolia } Cham. IV. 65. no. 28.
α. rugosa }
— *spicata* Arrabida. IV. 68. no. 42.
— stricta Swrtz. IV. 66. no. 36.
— suaveolens Dsf. IV. 69. no. 51.
— *suaveolens* Poir. IV. 67. no. 36.
— teucriifolia Otto et Dietr. IV. 65. no. 29.
— tiliaefolia Cham. IV. 68. no. 44.
— trifolia Linn. IV. 61. no. 14.
— *trifolia* Medicus. IV. 62. no. 19.
— urticaefolia Mill. *IV. 69.
— variegata Otto et Dietr. IV. 60. no. 8.
— velutina Martens et Galeotti. VI. 689. no. 1.
— viburnoides Vahl. IV. 67. no. 41.
— Wightiana Wall. *IV. 69.
Lantaneae Endl. IV. 58. VI. 689.
Lapeyrousia Thnbrg. *II. 638.
Lapithea Griseb. *VI. 500.
Laplacea H. B. Kth. I. 372. II. 801. V. 132.
— barbinervis Moris. I. 372. no. 2.
— *barbinervis* Moris. I. 375. no. 6.
— Courtyana A. Rich. V. 132. no. 2.
— praemorsa Splitgrbr. II. 801. no. 1.
— semiserrata Cambess. I. 372. no. 3. *V. 132. no. 1.
β. acuminata Cambess. I. 372. no. 3.
— tomentosa Wlprs. I. 372. no. 4.
— vulcanica Krthls. I. 372. no. 1.
Laplaceae Endl. I. 372. V. 132.
Lappa Tournef. II. 676. VI. 307.
— ...... Moris et Notar. II. 676. no. 2.
— amplissima Boiss. VI. 307. no. 1.
— glabra Lam. var. γ. Caucasica C. Koch. II. 676. no. 1.
— *minor* C. Bauh. VI. 151. no. 8.
Lappula DC. (Echinospermum) VI. 562. no. 1.
Lappula DC. (Triumfetta) DC. I. 356.
Lardizabala Rz. et Pav. I. 99.
— biternata Rz. et Pav. *I. 99. no. 2.
— *discolor* Dcne. I. 99. no. 2.
— *trifoliata* DC. *I. 99. no. 1.
— triternata Rz. et Pav. *I. 99. no. 1.
Lardizabaleae DC. I. 98.
Laretia Gill. et Hook. II. 387.
— acaulis Gill. et Hook. *II. 387. no. 1.
Larrea Cav. *I. 498. V. 386.
— Mexicana Moric. V. 386. no. 1.
—? *trigyna* Knze. I. 460. no. 2.
Laseguea Alph. DC. VI. 477.
Laseguea acutifolia Alph. DC. VI. 477. no. 4.
— emarginata Alph. DC. VI. 477. no. 2.
— glabra Alph. DC. VI. 477. no. 5.
— Guilleminiana Alph. DC. VI. 477. no. 1.
— obliquinervia Alph. DC. VI. 477. no. 3.
— Pentlandiana Alph. DC. VI. 478. no. 6.
Laserpitium Tournef. II. 418. V. 896.
— *aciphylla* Linn. fil. V. 868. no. 1.
— affine Lob. V. 897. no. 3.
— *aquilegifolium* DC. V. 897. no. 1.
— canescens Boiss. II. 418. no. 3.
— *Capense* Thnbrg. II. 412. no. 1.
— Carota Boiss. V. 897. no. 2.
— *cuneifolium* Nestler. V. 897. no. 1.
— *Dahuricum* Jcq. II. 403. no. 2. V. 866. no. 1.
— *gummiferum* Dsf. II. 420. no. 1. V. 901. no. 1. β.
— Nestleri Soyer-Willemet. V. 896. no. 1.
— *orientale folio Mei* Tournef. V. 899. no. 4.
— *polygamum* Lam. II. 420. no. 1. V. 901. no. 1. β.
— *simplex* Lapeyr. II. 405. no. 1.
— Stevenii Fisch. et Trautvett. II. 418. no. 4.
— *thapsiaeforme* Brot. II. 420. no. 1. V. 901. no. 1.
— ulopterum Trev. II. 418. no. 2.
— Winkleri Herbich. II. 418. no. 1.
Lasiandra DC. II. 128. V. 700.
— asperior Cham. II. 128. no. 5.
— coerulea Rchb. II. 128. no. 1.
— diplostegium Cham. *II. 129. no. 11.
—? dubia Cham. II. 128. no. 6.
— fissinervia DC. II. 130. †
— *Fontanesiana* DC. II. 132. no. 2.
— Fothergillae Cham. *II. 129. no. 7.
— *frigidula* Cham. II. 128. no. 2.
— Lhotschyana Prsl. II. 129. no. 10.
— Martiana Cham. *II. 128. no. 2.
— martialis Cham. II. 128. no. 3.
— *Martiusiana* Cham. II. 128. no. 2.
— Maximiliana DC. II. 130. †
— mollis Cham. II. 129. no. 12.
— muricata Prsl. II. 130. no. 17.
— obscura Cham. II. 128. no. 4.
— oleaefolia Mart. II. 130. †
— osbeckioides Steudel. V. 700. no. 1.
— petiolata Grah. II. 129. no. 9.
— pulchra Cham. II. 129. no. 13.
— salviaefolia Cham. II. 129. no. 15.
— Sellowiana Cham. II. 129. no. 14.
— setulosa Spring. II. 129. no. 8.
— *trifolia* Cham. II. 128. no. 2.
— ursina Cham. II. 129. no. 16.
Lasianthaea DC. *II. 619.
Lasianthera Palis. *I. 445.

Lasianthus DC. V. 134.
— *excelsus* Blume. I. 374. no. 1. II. 802. no. 1.
— *inodorus* Blume. VI. 50. no. 1.
Lasiocephalus Schlchtd. *II. 702. no. 5.
Lasiocorys Bth. III. 867. °III. 989.
— Abyssinica Bth. III. 867. no. 2.
— Capensis Bth. III. 867. no. 1.
Lasiolepis Horsf. et Bennet. °V. 398.
— multijuga Horsf. et Bennet. V. 399. no. 2.
— paucijuga Horsf. et Bennet. V. 398. no. 1.
Lasionema Don. II. 509. VI. 63.
— glabrescens Bth. VI. 63. no. 1.
— pubescens Bth. VI. 64. no. 2.
— roseum DC. *II. 509. no. 1 VI. 64. no. 3.
Lasiopera aspera Hffmsgg. III. 401. no. 12.
— *Bocconi* Prsl. III. 400. no. 8.
— *rhinantina* Lnk. et Hffmsgg. III. 408. no. 6.
β. versicolor Lnk. et Hffmsgg. III. 408. no. 6. *β*.
— *rigidifolia* Prsl. III. 406. no. 21.
— *viscosa* Lnk. et Hffmsgg. III. 408. no. 5.
Lasiopetaleae Gay. I. 336. V. 107.
Lasiopetalum Sm. I. 336. V. 110.
— cordifolium Endl. I. 337. no. 2.
— dasyphyllum Sieb. I. 337. no. 3.
— discolor Hook. I. 336. no. 1.
— ferrugineum Andr. I. 337. †
— indutum Steudel. V. 110. no. 1.
— purpureum Ait. I. 337. †
— quercifolium Gay. I. 337. †
— solanaceum Sims. I. 337. †
— triphyllum Sm. I. 337. †
Lasiophyton pusillum Hook. et Arn. VI. 140 no 1.
Lasiopogon Cass. *II. 647.
Lasiopus Cass. *II. 679. *II. 690.
Lasiopus DC. VI. 315.
— *ambiguus* Cassini. VI. 315. no. 10.
— *Bojeri* DC. VI. 316. no. 14.
— *Candollei* DC. VI. 316. no. 13.
— *coriaceus* DC. VI. 315. no. 11.
— *Schimperi* C. H. Schultz. VI. 316. no. 15.
— *viridiflorus* DC. VI. 315. no. 12.
Lasiorhegma Vogel. I. 827. V. 561.
Lasiorhiza Lagasc. *II. 682.
— *purpurea* Lssng. VI. 322. no. 1.
— *rosea* Poepp. VI. 322. no. 2.
Lasiorhizi DC. (Senecio) VI. 263. no. 29.
Lasiospartum Spach. (Genista) V. 497.
Lasiospermum Lag. *II. 634.
Lasiospora Cass. °VI. 346.
Lasiospora DC. VI. 346.
— candidissima C. H. Schultz. VI. 347. no. 10.
— Cretica C. H. Schultz. * VI. 346. no. 3.
Lasiospora divaricata C. H. Schultz. *VI. 347. no. 7.
— ensifolia Cass. * VI. 346. no. 4.
— eriophora C. H. Schultz. * VI. 347. no. 8.
— hirsuta Cass. * VI. 346. no. 1.
— Ispahanica Boiss. VI. 347. no. 11.
— *lanata* Fisch. et Mey. VI. 346. no. 5. *β*.
— lasiosperma C. H. Schultz. * VI. 346. no. 2.
— *latifolia* Fisch. et Mey. VI. 346. no. 6.
— macrophylla C. H. Schultz. *VI. 347. no. 9.
— nervosa C. H. Schultz. * VI. 346. no. 6.
— paniculata Boiss. VI. 347. no. 12.
— tuberosa Cassini. * VI. 346. no. 5.
α. angustifolia.
β. latifolia
— veratrifolia Fnzl. VI. 347. no. 13.
Lasiospron Bth. I. 774.
Lasiostoma Bth. II. 944. °VI. 75.
— loranthifolium Bth. II. 944. no. 1. VI. 75. no. 1.
— oblongum Bth. II. 944. no. 2. VI. 75. no. 2.
Lasiotrachyphylla Bernh. I. 110.
Lasthenia DC. (ex p.) II. 629. VI. 180.
Lasthenia Lindl. II. 635. *II. 629.
— *Californica* DC. VI. 180. no. 1.
— *glaberrima* DC. VI. 180. no. 1.
— Kunthii Hook. et Arn. *II. 635. no. 1.
— *Kunthii* Hook. et Arn. VI. 180. no. 3.
— *obtusifolia* Cassini. VI. 380. no. 2.
— *obtusifolia β. Bridgesii* DC. II. 635. no. 1. VI. 180. no. 3.
Lathraea Linn. III. 479. °III. 975.
— *Anblatum* Linn. III. 481. no. 5.
— *clandestina* Linn. III. 479. no. 1.
— *Phelipaea* Güldenst. III. 481. no. 4.
— *Phelypaea* Linn. III. 462. no. 23.
— *Phelypaea β*. Linn. III. 481. no. 4.
— squamaria Linn. III. 479. no. 1.
β. erecta C. Koch.
Lathriogyne Eckl. et Zeyh. I. 582.
— candicans Eckl. et Zeyh. I. 582. no. 2.
— parvifolia Eckl. et Zeyh. I. 582. no. 1.
Lathyrocarpum G. Don. III. 88.
Lathyrus L. I. 718. II. 886.
— Altaicus C. A. Mey. I. 720. no. 15.
— acutifolius Vogel. I. 722. no. 43.
— amoenus Fnzl. I. 718. no. 4. II. 887. †
— amphicarpus L. I. 723. †
— Armitageanus Knwls. et Westc. I. 722. no. 38.
— Berteroanus Colla. I. 719. no. 7.
— *Californicus* Dougl. I. 720. no. 22.
— ciliatus Guss. I. 718. no. 2.
— crassipes Gill. I. 719. no. 8.
— debilis Vogel. I. 722. no. 42.
— *decaphyllus* Hook. I. 721. no. 24. *γ*.

Lathyrus decaphyllus Prsh. I. 723. †
— *decaphyllus β. minor* Hook. et Arn. I. 721. no. 24. δ.
— dissitiflorus cf. sequentem.
— dissitifolius Nutt. I. 721. no. 31. (III. Emend. p. 4.)
— dubius Ten. I. 719. no. 12.
— elegans Vogel. I. 723. no. 46.
— Engelmanni Bischof. I. 719. no. 5.
— erythrinus Prsl. I. 718. no. 3.
— gladiatus Hook. I. 722. no. 37.
— *glaucifolius* Beck. I. 721. no. 25.
— Gorgoni Parlatore. II. 887. no. 2.
— Himalayensis Cambess. I. 720. no. 20.
— *hydrophilus* Nutt. I. 721. no. 27. ζ.
— inermis Rochel. I. 720. no. 14.
— linearifolius Vogel. I. 723. no. 44.
— linearis Nutt. I. 721. no. 30. (III. Emend. p. 4.)
— littoralis Endl. I. 722. no. 23.
— *Macraei* Hook. et Arn. I. 716. no. 29.
— macropus Gill. I. 722. no. 36.
— macrostachys Vogel. I. 722. no. 40.
— Magellanicus Lam. I. 723. †
— maritimus Bigel. *I. 720. no. 22.
— Mexicanus Schlchtd. I. 719. no. 9.
— Montevidensis Vogel. I. 719. no. 11. (cum var. β. ibid.)
— *multiflorus* Nutt. I. 721. no. 24. γ.
— mutabilis Sweet. I. 720. no. 16.
— myrtifolius Mühlnbrg. *I. 721. no. 26.
— nervosus Lam. II. 887. †
— nitens Vogel. I. 722. no. 41.
— *occidentalis* Nutt. I. 721. no. 27. β.
— ochroleucus Hook. I. 721. no. 25.
— ornatus Nutt. I. 721. no. 32.
— ovalis Royle. I. 720. no. 19.
— palustris L. *I. 721. no. 27. (c. varr. β. γ. δ. ε. ζ. et η. ibid.) (III. Emend. p. 4.)
— Parreiszii Prsl. I. 720. no. 17.
— petiolaris Vogel. I. 723. no. 45.
— pilosus Cham. I. 720. no. 21.
— *pisiformis* Hook. I. 720. no. 22.
— *polymorphus* Torr. I. 722. no. 32.
— polyphyllus Nutt. I. 720. no. 23. (c. var. β.)
— pseudo-aphaca Boiss. II. 886. no. 1.
— pubescens Hook. et Arn. I. 722. no. 35. II. 887. †
— *pubescens* Nutt. I. 721. no. 24. δ.
— purpureo-coeruleus Knwls. et Westsc. I. 722. no. 39.
— pusillus Ell. I. 719. no. 6.
— quadrimarginatus Bory. et Chaub. I. 720. no. 18.
— *roseus* Steven. II. 887. no. 1.
— rotundifolius var ellipticus Sweet. I. 723. †
Lathyrus sessilifolius Hook. et Arn. I. 722. no. 34.
— sessilifolius Ten. I. 718. no. 1.
— *stipulaceus* Le Comte. I. 721. no. 26.
— stipularis Prsl. I. 719. no. 10.
— strictus Nutt. I. 721. no. 29.
— Tingitanus L. I. 723. †
— tomentosus L. I. 723. †
— trigonus Vogel. I. 723. no. 47.
— venosus Mühlbg. *I. 720. no. 24. (cum var. β. γ. et δ. ibid.)
— *venosus* Sweet. I. 720. no. 22.
— venosus Willd. I. 723. †
— vestitus Nutt. I. 721. no. 28.
— villosus Trevir. I. 719. no. 13.
Latibracteatae Bth. (Hyptis) III. 541.
Latifoliae Bth. (Piptadenia) V. 578.
Latreillea DC. II. 603.
— glabrata Bth. II. 603. no. 2.
— latifolia Bth. II. 603. no. 3.
— linearis Bth. II. 603. no. 4.
— Peruviana Poepp. et Endl. II. 603. no. 1.
Laubertia Alph. DC. *VI. 478.
Laugeria Rz. et Pav. II. 387. no. 5. 6. 7.
Laurentia Mich. *II. 708. *VI. 380.
— arabidea DC. VI. 734. †
Laureola latifolia floribus albicantibus odoratis Pluk. III. 119. no. 39.
Laureria Schlchtd. III. 14. °III. 953.
— Mexicana Schlchtd. III. 14. no. 1.
— *Mexicana* Schlchtd. VI. 616. no. 1.
Lauridia Eckl. et Zeyh. I. 537.
— reticulata Eckl. et Zeyh. I. 537. no. 7.
— rupicola Eckl. et Zeyh. *I. 537. no. 8.
Laucocerasus Tournef. II. 10.
Laurophyllus Capensis Thnbrg. I. 555. no. 1.
Laurus caustica Molina I. 551. no. 1.
Lavandula Linn. III. 572. °III. 979.
— abrotanoides Lam. III. 575. no. 10.
— *angustifolia* Moench. III. 574. no. 5.
— Burmanni Bth. III. 576. no. 14.
— *Canariensis* Mill. Dict. III. 375. no. 10.
— Cariensis Boiss. III. 940.
— *carnosa* Linn. III. 520. no. 1.
— coronopifolia Poir. III. 575. no. 13.
— *dentata* Curtis. III. 573. no. 4.
— dentata Linn. III. 573. no. 4.
— *elegans* Desf. III. 575. no. 10.
— *foliis crenatis latioribus Americana frutescens* Pluken. IV. 47. no. 21.
— *foliis ovatis* etc. Gmel. III. 775. no. 3.
— *formosa* Dietr. III. 575. no. 9. β.
— *heterophylla* Poir. III. 573. no. 4.
— lanata Boiss. III. 574. no. 6.
— *latifolia* Vill. III. 574. no. 7.
— *Massoni* Cels. III. 573. no. 3.

Lavandula multifida Burm. III. 575. no. 13. III. 576 no. 14.
— multifida Linn. III. 575. no. 11.
— *officinalis* Chaix. III. 574. no. 5.
— pedunculata Cav. III. 573. no. 2.
— *pinnata* Jcq. III. 575. no. 9
— pinnata Linn. fil. III. 575. no. 9.
β. pubescens Bth.
— *pseudo-stoechas* Rchb. III. 573. no. 1. β.
— pubescens Dcne. III. 575. no. 12.
— *Pyrenaica* DC. III. 574. no. 5. β.
— rotundifolia Bth. III. 574. no. 8.
— spica DC. III. 574. no. 7.
— *spica* α. Linn. III. 574. no. 5.
— *spica* β. Linn. III. 574. no. 7.
— *spica* Lois. III. 574. no. 5.
— Stoechas Linn. III. 572. no. 1.
β. macrostachya Ging. III. 573. no. 1.
— *Stoechas* β. Linn. III. 573. no. 2.
— *Stoechas* Sibthrp. III. 573. no. 1.
— *stricta* Del. III. 575. no. 13.
— vera DC. III. 574. no. 5.
β. Pyrenaica.
— viridis Ait. III. 573. no. 3.
— *viridis* L'Hérit. III. 573. no. 3.
— *vulgaris* α. Lam. III. 574. no. 5.
— *vulgaris* β. Lam. III. 574. no. 7.
Lavandulaceae Bth. (Hyptis) III. 510.
Lavanduleae Endl. III. 572. III. 979.
Lavatera L. I. 290.
— acerifolia Cav. *I. 290. no. 2.
— arborea L. I. 291. †
— *Agrigentina* Tineo. I. 291. no. 9. β.
— *australis* A. Cunn. I. 291. no. 9. β.
— brachyfolia Wlprs. I. 291. no. 6.*)
— Cachemiriana Cambess. I. 291. no. 8.
— Cretica L. *I. 291. no. 11.
— flava Desf. *I. 291. no. 5.
— hispida Desf. *I. 290. no. 4.
— maritima Goll. I. 291. †
— Neapolitana Ten. *I. 291. no. 10.
— oblongifolia Boiss. I. 290. no. 1.
— olbia L. I. 291. †
— pallescens Moris. I. 291. no. 7.
— phoenicea Vent. *I. 290. no. 3.
— plebeja Sims. *I. 291. no. 9.
β. tomentosa.
— punctata All. I. 291. †
— *Sicula* Tineo. I. 291. no. 10.
— Thuringiaca L. I. 291. †
— trimestris L. I. 291. †
Lavauxia Spach. II. 83.
— *centaurifolia* Spach. II. 83. no. 45.
— *cuspidata* Spach. II. 83. no. 43.

*) Legatur: L. brachyphylla.

Lavauxia mutica Spach. II. 83. no. 44.
— *Nuttalliana* Spach. II. 83. no. 42.
Lavoisiera DC. II. 118. II. 916. V. 678.
— alba DC. II. 118. †
— australis Naudin. V. 679. no. 9.
— bicolor Naudin. V. 679. no. 10.
— Blancheliana Naudin. V. 678. no. 6.
— *blepharocentra* Mart. V. 680. no. 11. β.
— cataphracta DC. II. 118. †
— *cataphracta* DC. V. 680. no. 11. β.
— chamaepitys Naudin. V. 680. no. 13.
— centiformis Naudin. V. 679. no. 11.
α. clavata Naudin. V. 679. no. 11.
δ. dendroides Naudin. V. 680. no. 11.
β. imbricata Naudin. V. 679. no. 11.
γ. insignis DC. V. 680. no. 11.
ε. leucantha Naudin. V. 680. no. 11.
— *ciliata* Mart. V. 680. no. 11. β.
— *compta* DC. V. 680. no. 11. β.
— confertiflora Naudin. V. 678. no. 5.
— crassifolia DC. II. 118. †
— gentianoides DC. II. 118. †
— glandulifera Naudin. V. 678. no. 3.
— grandiflora Naudin. V. 678. no. 2.
— humilis Naudin. V. 680. no. 12.
— imbricata DC. II. 118. †
— *imbricata* DC. V. 680. no. 11. β.
— Itambana DC. II. 118. †
— *linifolia* DC. II. 126. no. 15. V. 695. no. 39.
— lycopodioides Gardn. II. 916. no. 1.
— macrocarpa Naudin. V. 678. no. 1.
— microphylla Naudin. V. 679. no. 7.
— muconifera DC. II. 118. †
— nervulosa Naudin. V. 678. no. 4.
— pulchella Cham. II. 118. no. 1.
— pulcherrima DC. II. 118. †
— punctata DC. II. 118. †
— scabrella Naudin. V. 679. no. 8.
— *viminalis* DC. V. 680. no. 11. β.
Lavoisiereae DC. II. 117. V. 676.
Lavradia Vellozo et Vandelli. I. 226.
— capillaris St. Hil. I. 226. no. 5.
β. glanduloso-pubescens.
— elegantissima St. Hil. I. 226. no. 2.
— ericoides St. Hil I. 226. no. 1.
— glandulosa St. Hil. I. 226. no. 4.
β. rubra.
— *montana* Mart. I. 226. no. 4.
— *Velloziana* Ging. I. 226. no. 3.
— Vellozii St. Hil. I. 226. no. 3.
Lawrencella Lindl. II. 645. VI. 232.
— rosea Lindl. *II. 645. no. 1. VI. 232. no. 1.
Lawrencia Hook. I. 296. II. 789. V. 89.
— glomerata Hook. II. 789. no. 1. V. 89. no. 2.
— spicata Hook. *I. 296. no. 1.
— squamata N. ab E. V. 89. no. 1.

Lawsonia L. II. 112.
— alba L. *II. 112. no. 1.
— *purpurea* Lam. II. 491. no. 1.
Laxiflorae DC. (Cordia) VI. 553. no. 1.
Laxiflorae Wght. et Arn. (Indigofera) I. 668.
Laxmannia geoides Fisch. II. 49. no. 1.
Layia Hook. et Arn. *II. 630.
— *Douglasii* Hook. et Arn. II. 632. no. 2.
— *emarginata* Hook. et Arn. II. 903. no. 1.
— *glandulosa* Hook. et Arn. II. 632. no. 3.
— *heterotricha* Hook. et Arn. II. 632. no. 1.
Leachia Cass. II. 981.
— *trifoliata* Cass. II. 981. no. 13. γ.
Leandra Raddi. II. 137.
— asperifolia Cham. II. 137. no. 1.
— auricoma Spring. II. 138. no. 3.
— ciliata Cham. II. 138. no. 2.
— involucrata DC. *II. 138. no. 4.
Leavenworthia Torr. I. 139.
— aurea Torr. I. 139. no. 1.
— Michauxii Torr. I. 139. no. 2.
Lebeckia Thnbrg. I. 606. V. 453.
— ambigua E. Mey. I. 607. no. 3.
— angustifolia E. Mey. I. I. 607. no. 9.
— armata Thnbrg. *I. 607. no. 14.
— *armata* Willd. I. 607. no. 13.
— Bowicana Bth. V. 454. no. 9.
— Candolleana Wlprs. *I. 607. no. 5.
— *canescens* E. Mey. V. 453. no. 4.
— cinerea E. Mey. V. 453. no. 3.
— *contaminata* DC. I. 607. no. 5.
— *contaminata* Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 3.
— cytisoides Thnbrg. *I. 607. no. 6.
— *decipiens* E. Mey. I. 607. no. 7.
— *decutiens* E. Mey. I. 607. no. 9. V. 453. no. 4.
— fasciculata Bth. V. 453. no. 7.
— flexuosa E. Mey. I. 607. no. 10.
— gracilis Eckl. et Zeyh. I. 607. no. 4.
— grandiflora Bth. V. 453. no. 6.
— humilis Thnbrg. *I. 607. no. 16.
— leptophylla Bth. V. 453. no. 2.
— linearifolia E. Mey. I. 607. no. 2.
— marginata E. Mey. I. 607. no. 15.
— microphylla E. Mey. I. 607. no. 13. *V. 453. no. 5.
— mucronata Bth. V. 453. no. 1.
— multiflora E. Mey. I. 607. no. 8. V. 453. no. 4.
— Plukenetiana E. Mey. I. 606. no. 1.
— psiloloba Wlprs. I. 607. no. 12.
— pulchella Wlprs. I. 607. no. 7.
— pungens Thnbrg. I. 607. no. 11.
— *sepiaria* Thnbrg.? I. 606. no. 1
— sessilifolia Bth. V. 453. no. 8.
Lebetanthus Endl. VI. 432.
Lebetanthus Americanus Endl. *VI. 432. no. 1.
Lebetina Cass. *II. 623.
Lebretonia Schrank. I. 301.
— *cernua* Spanoghe. II. 790. no. 11.
— *crenata* Hochstett. V. 89. no. 1.
— *procumbens* Wght. I. 301. no. 45.
Lecananthus W. Jack. *II. 524.
Lechea L. I. 212. V. 58b.
— *Drummondii* Spach. I. 212. no. 1.
— Drummondii Torr. et Gr. I. 213. no. 3.
— major Michx. *I. 212. no. 1.
— *Mexicana* Hort. Berol. I. 213. no. 1.
— *minor* L. I. 212. no. 1.
— minor Lam. *I. 212. no. 2.
— *racemulosa* Michx. I. 212. no. 2.
— Skinneri Bth. V. 58b. no. 1.
— *thesioides* Spach. I. 212. no. 2.
— *verticillata* Willd. I. 285. no. 10.
Lechenaultia DC. II. 713. VI. 394.
— arcuata Vriese. VI. 394. no. 4.
— biloba Lindl. II. 713. no. 2. VI. 394. †
— glauca Lindl. II. 713. no. 4.
— grandiflora Lindl. II. 713. no. 1.
— laricina Lindl. II. 713. no. 3.
— pallescens Vriese. VI. 394. no. 1. β. congesta.
— parviflora Vriese. VI. 394. no. 3.
— splendens Hook. VI. 394. no. 5. *VI. 734. β. stricta VI. 394. no. 5.
— tenuifolia Vriese. VI. 394. no. 2.
Lechidium Drummondii Spach. I. 213. no. 3.
Lecokia DC. *II. 425.
Lecontea A. Rich. *II. 485.
Lecostemon Moç. et Sess. *II. 7.
Lecythideae Rich. II. 193. V. 757.
Lecythis Loeffl. II. 193.
— angustifolia Endl. II. 193. no. 3.
— ovata Cambess. II. 193. no. 1.
— Pisonis Cambess. II. 193. no. 2.
Ledeae DC. II. 730.
LEDOCARPEAE Meisn. V. 379.
Ledocarpeae Meyen. I. 460.
Ledocarpum Dsf. I. 460. V. 380.
— *argenteum* Prsl. I. 460. no. 1.
— Chilense Dsf. I. 460. no. 1.
— *cistiflorum* Meyen. V. 380. no. 1.
— Meyenianum Wlprs. I. 460. no. 3. V. 380. no. 1.
— pedunculare Lindl. I. 460. no. 2.
— *Reynoldsii* Hook. I. 460. no. 3.
Ledum Linn. *II. 730.
Leea Linn. I. 444. V. 378.
— aculeata Blume. I. 445. no. 7.
— *aequata* Rxb. I. 444. no. 3. αa.
— hirsuta Blume. I. 445. no. 4.

Leea humilis Hsskrl. V. 378. no. 1.
— integrifolia Rxb. I. 444. no. 2.
— Javanica Blume. I. 445. no. 6.
— Manillensis Wlprs. V. 378. no. 1.
— *Ottilis* DC. I. 444. no. 3. αa.
— robusta Rxb. I. 444. no. 1.
— rubra Blume. I. 445. no. 5.
— staphylaea Rxb. I. 444. no. 3. (c. varr. αa. b. et β. ibid.) (III. Emend. p. 2.) V. 378. †
— *staphylaea* Wall. I. 443. no. 3. αa.
Leeaceae Endl. I. 444.
Lefeburea A. Rich. II. 413. V. 885.
— Abyssinica A. Rich. *II. 413. no. 1. V. 885. no. 1.
Legendrea B. Webb. *VI. 528.
Legnotideae Endl. II. 71.
LEGUMINOSAE DC. (ex p.) I. 562. I. 857.
LEGUMINOSAE Juss. II. 831. V. 422.
Lehmannia Spr. III. 14. °III. 953.
— tomentosa Spr. III. 14. no. 1.
Leianthus Griseb. VI. 504.
— longifolius Griseb. *VI. 504. no. 1. *VI. 713. no. 1.
— umbellatus Griseb. *VI. 504. no. 2.
Leiaparine DC. II. 455. VI. 9.
Leighia Cass. II. 615. VI. 165.
— Baldwiniana Nutt. II. 616. no. 9.
— debilis Nutt. II. 616. no. 10.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 615. no. 2.
— grandiflora Gardn. VI. 165. no. 1.
— Hookeriana Nutt. *II. 616. no. 7.
— lanceolata Nutt. II. 616. no. 6.
— *lanceolata* Nutt. II. 986. no. 4. VI. 167. no. 4.
— longifolia Nutt. *II. 616. no. 8.
— *longifolia* Nutt. II. 986. no. 31.
— silphioides Hook. et Arn. II. 616. no. 4.
— stenophylla Hook. et Arn. II. 615. no. 1.
— Tucumanensis Hook. et Arn. II 615. no. 3.
— uniflora Nutt. II. 616. no. 5.
— *uniflora* Nutt. II. 986. no. 5. VI. 167. no. 15.
Leiocarpae Bth. (Mimosa) I. 876.
Leiocarpae DC. (Cineraria) VI. 251. no. 2.
Leiogalium DC. II. 458. VI. 14. 699.
Leiogyne DC. II. 365. no. 27.
Leiolobium DC. I. 745. II. 893.
Leiophyllum Pers. *II. 730.
Leiospermum Don. II. 374. V. 833.
Leiospermum C. H. Schultz. (Tripleurospermum) VI. 197.
— parviflorum G. Don. *II. 374. no. 2. V. 833. no. 2.
— racemosum D. Don. *II. 374. no. 1. V. 833. no. 1.
Leiosphaeria Bth. II. 146. no. 2.
Leiospora C. A. Mey. I. 134.
Leiostegia Bth. II. 127. V. 699.
— vernicosa Bth. *II. 127. no. 1. V. 699. no. 1.
Leiothamnus Griseb. VI. 504.
— anomalus Griseb. *VI. 504. no. 1.
Leiotulus Ehrnbrg. *II. 414. *V. 886.
— *Alexandrinus* Ehrnbrg. V. 887. no. 3.
Lembotropis Griseb. II. 846. °V. 510.
— nigricans Griseb. *II. 846. no. 1. *V. 510. no. 1.
Lemmatium DC. *II. 629.
Lemon Papeda Rmph. V. 141. no. 1.
Lemonia Lindl. V. 387.
— spectabilis Lindl. V. 387. no. 1.
Lennea Kltzsch. °I. 680.
— robinioides Kltzsch. *I. 650. no. 1.
Lennoa Llawe et Lexarza. III. 482. °III. 975.
— madreporoides Llawe et Lexarza. *III. 482. no. 1.
Lentago DC. II. 451.
LENTIBULARIEAE Rich. VI. 438.
Leobordea Delile. I. 622. II. 837. *V. 460.
Leobordea Del. (Lotononis) V. 458.
— argyrolobioides Jaub. et Spach. II. 838. no. 6.
— *argyrolobioides* Jaub. et Spach. V. 459. no. 54.
— clandestina Wlprs. I. 623. no. 5.
— *clandestina* Wlprs. V. 458. no. 34.
— genistoides Fnzl. I. 623. no. 3. *II. 838. no. 5.
— *genistoides* Fnzl. V. 459. no. 53.
— lotoides Delile. I. 622. no. 1. II. 837. no. 1.
— *lotoides* Delile. V. 458. no. 35.
— lupinifolia Boiss. I. 622. no. 2. *II. 838. no. 7.
— Persica Jaub. et Spach. II. 838. no. 2.
— *Persica* Spach. V. 458. no. 35.
— porrecta Wlprs. I. 623. no. 4.
— *porrecta* Wlprs. V. 458. no. 33.
— *sericea* Bth. V. 459. no. 52.
— sericea Ldb. II. 838. no. 4.
— sphaerosperma Jaub. et Spach. II. 838. no. 3.
— *sphaerosperma* Spach. V. 458. no. 35.
Leonia Rz. et Pav. *VI. 452.
— *salvifolia* Llawe et Lex. III. 672. no. 283.
Leonotis R. Br. III. 878. °III. 989.
— *dubia* E. Mey. III. 879. no. 8.
— dysophylla E. Mey. III. 879. no. 7.
— intermedia Lindl. III. 879. no. 5.
— Leonurus R. Br. III. 879. no. 9.
— mollis E. Mey. III. 879. no. 6.
— nepetaefolia R. Br. III. 878. no. 1

Leonotis ovata Spr. III. 878. no. 4.
— pallida Bth. III. 878. no. 3.
— parvifolia Bth. III. 879. no. 8.
— Raineriana Visiani. III. 878. no. 2.
Leontice L. I. 100.
— Altaica Pall. *I. 100. no. 1.
— *chrysogonum* L. 100. no. 1.
Leonticoides DC. I. 121.
Leontodon DC. II. 688.
Leontodon Juss. *VI. 344.
Leontodon Linn. *II. 688.
— *bicolor* Turcz. VI. 356. no. 4.
— *boreale* DC. II. 698. no. 1. VI. 362. no. 1.
—? *Chilense* DC. VI. 331. no. 8.
— *Chilensis* C. H. Schultz. VI. 330. no. 8.
— *ciliatum* Scop. VI. 342. no. 7.
— *coronopifolium* Commers. VI. 335. no. 18.
— *dissectus* Ldb. VI. 356. no. 3.
— *Keretinus* Nylander. VI. 345. no. 1.
— *leucanthus* Ldb. VI. 356. no. 4.
— *mucronatum* Forsk. VI. 359. no. 1.
— *species parva floribus pallidis* Pall. VI. 356. no. 4.
— *variegatum* Poir. VI. 334. no. 15.
Leontonyx Cass. *II. 646.
Leontopodium R. Br. *II. 649. VI. 726.
— monocephalum Edgwrth. VI. 726. no. 1.
Leonurus Linn. III. 810. °III. 988.
— *Africanus* Mill. III. 879. no. 9.
— *Altaicus* Spr. III. 811. no. 5.
— *altissimus* Bnge. III. 812. no. 7.
— *canescens* Dumort. III. 811. no. 3. β.
— capitatus Fresen. III. 813. no. 11.
— Cardiaca Linn. III. 810. no. 3.
γ. crispus.
β. villosus.
— *condensatus* Hornem. III. 811. no. 3. β.
— *crispus* Murr. III. 811. oo. 3. γ.
— *eriostachys* Turcz. III. 856. no. 2.
— *Galeobdolon* Scop. III. 807. no. 25.
— glaucescens Bnge. III. 811. no. 4.
— *globosus* Moench. III. 878. no. 1.
— grandiflorus Moench. III. 879. no. 9.
— *heterophyllus* Sweet. III. 812. no. 7.
— Javanicus Blume. III. 812. no. 9.
— *Illyricus* Hortul. III. 811. no. 3.
— *Indicus* Burm. III. 877. no. 45.
— *lacerus* Lindl. III. 811. no. 3. β.
— lanatus Spr. III. 812. no. 8.
— *Marrubiastrum* Burm. III. 875. no. 37.
— Marrubiastrum Linn. III. 811. no. 6.
— *neglectus* Schrank. III. 811. no. 3. β.
— *nepetaefolius* Mill. III. 878. no. 1.
— oblongifolius Blume. III. 812. no. 10.
— *occidentalis* Hortul. III. 812. no. 7.
— *parviflorus* Moench. III. 877. no. 44.
Leonurus Persicus Boiss. III. 951.
— pubescens Bth. III. 810. no. 1.
— Royleanus Bth. 810. no. 2.
— Sibiricus Linn. III. 812. no. 7.
— *supinus* Willd. III. 856. no. 1.
— *Tataricus* Burm. III. 812. no. 7.
— Tataricus Linn. III. 811. no. 5.
— *villosus* Desf. III. 811. no. 3. β.
Lepachys Rafin. VI. 159.
— columnaris Torr. et Gr. VI. 160. no. 2.
β. pulcherrima.
— *peduncularis* Torr. et Gr. II. 979. no. 1.
— peduncularis Torr. et Gr. VI. 160. no. 3.
— pinnata Torr. et Gr. VI. 159. no. 1.
Lepechinia Willd. III. 846. °III. 988.
— *clinopodiifolia* Willd. III. 594. no. 18.
— procumbens Bth. III. 846. no. 2.
— spicata Willd. III. 846. no. 1.
Lepeostegeres Blume. II. 445.
Lepia DC. I. 177. V. 43.
— *linifolia* Dsvx. V. 43. no. 2.
— *rotunda* Dsvx. V. 43. no. 1.
— *stylata* B. Webb. I. 177. no. 15.
Lepicephalus DC. VI. 84. no. 1.
Lepidaploa DC. II. 539. no. 6. II. 945. VI. 90.
Lepidiastrum DC. I. 178. V. 42.
Lepidineae DC. I. 174. V. 41.
Lepidium R. Br. I. 176. II. 762. V. 42.
Lepidium DC. (ex p.) V. 43.
— *alpinum* Sievers. I. 171. no. 2.
— armoracium Fisch. et Mey. II. 762. no. 2.
— Aucheri Boiss. I. 177. no. 18.
— Bonnanianum Prsl. I. 177. no. 17.
— Californicum Nutt. I. 176. no. 5. (III. Emend. p. 1.)
— campestre R. Br. I. 178. †
— Chilense Knze. V. 43. no. 6.
— cordatum DC. I. 179. †
— corymbosum Hook. et Arn. I. 177. no. 10.
— crassifolium W. et K. I. 178. †
— Cumingianum Fisch. et Mey. I. 177. no. 19.
— *cynocardamum* Webb. I. 178. †
— densiflorum Schrad. I. 177. no. 13.
— desertorum Eckl. et Zeyh. I. 178. no. 25.
— desertorum Schrenk. I. 176. no. 2.
— eremophilum Schrenk. V. 42. no. 1.
— fastigiatum Ledeb. I. 178. no. 22.
— glaucescens Dumort I. 178. no. 21.
— graminifolium L. I. 178. †
— heterophyllum Bth. I. 177. no. 14.
— hirtum Sm. I. 178 †
— impressum Bnge. V. 42. no. 3.
— integrifolium Nutt. I. 176. no. 8.
— intermixtum Ten. II. 762. no. 1.
— lacerum C. A Meyer. I. 176. no. 3.

Lepidium lanceolatum Prsl. I. 178. no. 24.
— lanceolatum Wlprs. V. 43. no. 7.
— lasiocarpum Nutt. I. 176. no. 6.
— latifolium L. I. 178. †
var. glabrescens Boiss. I. 178. no. 26.
— latipes Hook I. 177. no. 20.
— *leiocarpum* Hook. et Arn. I. 178. no. 29.
— Meyenii Wlprs. V. 42. no. 5.
— montanum Nutt. I. 176. no. 7.
— nitidum Nutt. I. 178. no. 29.
— obtusum Basiner. V. 42. no. 2.
— O-Waihiense Cham. et Schlchtd. I. 177. no. 12.
— oxycarpum Torr. et Gr. I. 178. no. 28.
— perfoliatum L. I. 178. †
— Persicum Boiss. I. 178. no. 27.
— pinnatifidum Ledeb. I. 178. no. 23.
— propinquum Fisch. et Mey. I. 176. no. 1.
— puberulum Bnge. V. 42. no. 4.
— Ramburei Boiss. I. 177. no. 16.
— rotundum DC. V. 43. †
— *rotundum* DC. V. 43. no. 1.
— ruderale L. I. 178. †
— sativum L. I. 178. †
— Soongaricum Schrenk. I. 176. no. 4.
— stylatum Lag. et Rodr. I. 177. no. 15.
— sylvaticum Eckl. et Zeyh. I. 177. no. 11.
— *Virginicum* L. I. 157. no. 1.
— Virginicum L. I. 178. †
Lepidophorum Neck. *II. 534.
Lepidophyllae (Baccharis) DC. VI. 138.
Lepidophyllum Cass. *II. 585. *II. 951. no. 3.
Lepidostephanus Bartl. II. 632. *VI. 184.
Lepidostephanus Bartl. VI. 175.
— madioides Bartl *II. 632. no. 1.
— *madioides* Bartl. VI. 175. no. 1.
Lepidotae Bth. (Mimosa) I. 874.
Lepidotheca Nutt. II. 639. *VI. 211.
— suaveolens Nutt. *II. 639. no. 1.
— *suaveolens* Nutt. VI. 194. no. 4.
Lepionurus Blume. I. 377.
— sylvestris Blume. *I. 377. no. 1.
Lepisanthes Blume I. 416.
— montana Blume I. 416. no. 1.
Lepismium Pfeiff. *V. 821.
Lepismium Pfeiff. II. 344.
— commune Pfeiff. II. 344. no. 1.
— cruciforme Miq. II. 345. no. 5.
— Fluminense Miq. II. 345. no. 6.
— Knightii Pfeiff. II. 345. no. 3.
— myosurus Pfeiff. II. 345. no. 2.
— paradoxum S. Dyck. II. 345. no. 4.
Lepistemon Blume. *VI. 532.
Lepistoma Blume. *VI. 481.
Leprophora Dunal (Solanum) III. 67.
Lepta Lour. *I. 539.
Leptadenia R. Br. *VI. 493.
Leptaleum DC. *I. 172.
Leptamnium Raf. III. 457. no. 1.
Leptandra Nutt. III. 368. 369.
— *angustifolia* Lehm. III. 370. no. 5.
— *Meyeri* G. Don. III. 370. no. 5.
— *Sibirica* Nutt. III. 369. no. 4.
— *tubiflora* Fisch. et Mey. III. 370. no. 5.
— *Virginia* Nutt. III. 369. no. 3.
Lepthanthae Bth. (Inga.) V. 633.
Leptarrhena R. Br. II. 368. V. 827.
— *amplexifolia* Ser. II. 368. no. 1. V. 827. no. 1.
— pyrolifolia R. Br. *II. 368. no. 1. V. 827. no. 1.
Lepteranthus DC. VI. 294.
Leptica DC. VI. 315.
Leptidium DC. I. 216. no. 32. 33. I. 219.
Leptinella Cass. II. 643. VI. 225.
— acaenoides Hook. et Arn. II. 643. no. 1.
— intricata Hook. fil. VI. 724. no. 2.
— lanata Hook. fil. VI. 225. no. 1.
— longipes Hook. fil. VI. 723. no. 1.
— multifida Hook. fil. VI. 724. no. 3.
— plumosa Hook. fil. VI. 225. no. 2.
— propinqua Hook. fil. VI. 226. no. 3.
Leptinga Bth. I. 931. V. 623.
Leptis Eckl. et Zeyh. V. 458.
Leptis E. Mey. I. 619. II. 837. *V. 455.
— argentea Meisn. II. 837. no. 2.
— *argentea* Meisn. V. 459. no. 60.
— *brachyloba* Steud. V. 458. no. 37.
— *calycina* Steud. V. 459. no. 46.
— debilis Eckl. et. Zeyh. I. 619. no. 1.
— *debilis* Eckl. et Zeyh. V. 458. no. 33.
— divaricata Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 3.
— *divaricata* Eckl. et Zeyh. V. 459. no. 44.
— *erubescens* Steud. V. 458. no. 42.
— *falcata* Steud. V. 458. no. 38.
— filicaulis Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 5.
— *filicaulis* Eckl. et Zeyh. V. 459. no. 44.
— Kraussiana Meisn. II. 837. no. 1.
— *Kraussiana* Wlprs. V. 459. no. 44.
— *mollis* Steud. V. 458. no. 41.
— prolifera Eckl. et Zeyh. *I. 619. no. 2.
— *prolifera* Eckl. et Zeyh. V. 458. no. 33.
— versicolor Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 4.
— *versicolor* Eckl. et Zeyh. V. 459. no. 44.
Leptobalanus Bth. II. 5.
Leptocarpae (Diascia) Bth. III. 180.
Leptocarpha DC. *II. 602.
Leptocarpus chamaedryfolius Willd. IV. 115. no. 3.
Leptocaulis Nutt. *II. 392.
— *inermis* Hook. et Arn. II. 428. no. 2.
Leptocephalus DC. II. 624.

Leptoclinium (Liatris) DC. II. 551. VI. 705. no. 1.
Leptocnemia Nutt. II. 418.
— *campestris* Nutt. II. 418. no. 4.
Leptocoma Less. *II. 578. *II. 951. no. 14.
Leptocyamus Bth. I. 758.
— clandestinus Bth. *I. 758. no. 2.
— elongatus Bth. I. 758. no. 3.
— microphyllus Bth. *I. 758. no. 1.
— tomentosus Bth. I. 758. no. 4.
Leptodermis Wall. II. 488.
— lanceolata Wall. *II. 488. no. 2.
— oblonga Bnge. II. 488. no. 1.
Leptoglossis Bth. VI. 633.
Leptoglottis DC. I. 925.
— Nuttallii DC. *I. 925. no. 1.
Leptolaena Thouars. *I. 366.
Leptolobieae Bth. I. 808. V. 550.
Leptolobium Vogel. I. 808. V. 550.
— *aurantiacum* Martius. V. 551. no. 1.
— bijugum Vogel. I. 809. no. 4.
— *clandestinum* Bth. I. 758. no. 2.
— dasycarpum Vogel. I. 808. no. 1. *V. 551. no. 3. (c. varr. α. et β.)
— elegans Vogel. I. 809. no. 2.
— *elongatum* Bth. I. 758. no. 3.
— glabrifolium Tulasne. V. 551. no. 2.
— lanceolatum Tulasne. V. 550. no. 1.
—? leiocarpum Vogel. I. 809. no. 5.
— *luteum* Mart. V. 570. no. 8.
— *microphyllum* Bth. I. 758. no. 1.
— nitens Vogel. I. 809. no. 6.
— tenuifolium Vogel. I. 809. no. 3.
— *tomentosum* Bth. I. 758. no. 4.
— *tortum* Mart. V. 551. no. 3. β.
Leptonema Hook. °V. 37.
— Lindeni Hook. *V. 37. no. 1.
Leptopetalum Hook. II. 502. VI. 57.
— Mexicanum Hook. *II. 502. no. 1. VI. 57. no. 1.
Leptophylli DC. (Senecio) VI. 264.
Leptopoda Nutt. II. 625. II. 988.
— *acaulis* DC. VI. 179. no. 2.
— brachypoda Torr. et Gr. *II. 988. no. 6.
— brevifolia Nutt. II. 625. no. 3. *II. 988. no. 5.
— *decurrens* Macbride. II. 988. no. 1.
— denticulata Nutt. II. 625. no. 2.
— *denticulata* Nutt. II. 988. no. 1.
— fimbriata Torr. et Gr. II. 988. no. 3.
— Helenium Nutt. *II. 988. no. 1.
— incisa Torr. et Gr. II. 988. no. 2.
— *integrifolia* Curtis. II. 988. no. 5.
— *pinnatifida* Schrad. II. 988. no. 4. β.
— pinnatifida Schweinitz. II. 625. no. 1.
— puberula Macbride. *II. 988. no. 4. β. pinnatifida.
Leptopus Spach. II. 908.
Leptorhabdos Schrenk. *III. 232. III. 387. °III. 970. *VI. 649.
— Benthamiana Wlprs. III. 387. no. 2.
— brevidens Fisch. Mey. et Lall. III. 939.
— linifolia Wlprs. III. 388. no. 3.
— micrantha Schrenk. III. 387. no. 1.
Leptorhynchus Lssng. II. 645. °VI. 232.
— *aureus* Bth. VI. 233. no. 3.
— *citrinus* Bth. VI. 234. no. 7.
— elongatus DC. *VI. 232. no. 9.
— gracilis Wlprs. II. 645. no. 1. *VI. 232. no. 5.
— hemisphaericus DC. *VI. 232. no. 4.
— Lhotschyanus Wlprs. II. 645. no. 2. *VI. 232. no. 6.
— linearis Lssng. *VI. 232. no. 2.
— medius A. Cunn. *VI. 232. no. 8.
— nitidulus DC. *VI. 232. no. 3.
— rhydidanthe Bth. *VI. 232. no. 7.
— squamatus Lssng. *VI. 232. no. 1.
— *suaveolens* Bth. VI. 233. no. 1. β.
Leptormus DC. I. 191.
— acuminatus Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 4.
— Caledonicus Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 7.
— dissectus Eckl. et Zeyh. *I. 191. no. 3.
— longifolius Eckl. et Zeyh. *I. 191. no. 6.
— pendulus Eckl. et Zeyh. *I. 191. no. 9.
— rivalis Eckl. et Zeyh. *I. 191. no. 10.
— tenellus Eckl. et Zeyh. *I. 191. no. 5.
— trifidus Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 11.
— tripartitus Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 8.
Leptosema Bth. I. 576.
— bossiaeoides Bth. *I. 576. no. 1.
Leptoseris Nutt. *II. 690.
Leptoseris Torr. et Gr. II. 690.
— *sonchoides* Nutt. II. 690. no. 3.
Leptosiphon androsaceus Bth. VI. 526. no. 5.
— *densiflorus* Bth. VI. 526. no. 6.
Leptospartum Spach. (Genista) V. 469.
Leptospermeae DC. II. 160. II. 920. V. 731.
Leptospermoides DC. VI. 89.
Leptospermum DC. (ex p.) II. 166. V. 739.
Leptospermum Forst. II. 166. II. 933. V. 740.
— acicularc S. Schauer. II. 168. no. 12. β. majus.
— *acuminatum* Wendl.? II. 167. no. 11.
— *acutifolium* Hort. Vratisl. II. 166. no. 1.
— alpestre Blume. II. 923. no. 7.
— *ambiguum* Sm. V. 741. no. 2.
— Amboinense Blume. II. 923. no. 8.
— *aquaticum* Hort. II. 167. no. 9.
— *arachnoideum* Hort. Berol. II. 168. no. 14
— attenuatum Sm. II. 168. no. 16.
— baccatum Sm. II. 168. no. 15. β. roseum.

Leptospermum baccatum Willd. II. 168. no. 13.
— *brevifolium* Wendl. fil. II. 168. no. 19.
— buxifolium Dehnhrdt. II. 169. no. 27.
— Candollei S. Schauer. *II. 168. no. 21.
— ciliolatum Otto et Dietr. II. 169. no. 29.
— *crassipes* Lehm. V. 740. no. 1.
— cuneiforme Otto et Dietr. II. 169. no. 33.
— Cunninghami S. Schauer. II. 167. no. 6.
— cupressinum Otto et Dietr. II. 169. no. 32.
— divaricatum Schauer. II. 923. no. 5.
— *dubium* Spr. V. 738. no. 7.
— emarginatum Wendl. fil. II. 168. no. 18.
— ericoides A. Rich. II. 169. no. 23.
— erubescens Schauer. V. 740. no. 1.
— flavescens Sm. II. 168. no. 20.
— flexuosum DC. V. 739. no. 1.
— glaucescens S. Schauer. II. 167. no. 7.
— *glomeratum* Wendl. V. 739. no. 1.
— gnidiaefolium DC. *II. 168. no. 22.
— grandiflorum Lodd. II. 168. no. 19. (c. var. β. ibid.)
— grandifolium Sm. II. 166. no. 3.
γ. angustum Schauer. II. 167. no. 3.
α. argyreum Schauer. II. 166. no. 3.
β. vestitum Schauer. II. 167. no. 3.
— *humifusum* Cunn. II. 167. no. 10. γ.
— hypericifolium Otto et Dietr. II. 169. no. 31.
— *hypericifolium* Otto et Dietr. V. 739. no. 2.
— Javanicum Blume. II. 923. no. 6.
— *juniperifolium* Cav. II. 168. no. 15.
— juniperinum Sm. II. 168. no. 13.
— *juniperinum* Willd. II. 168. no. 12. β.
— lanigerum Ait. II. 167. no. 4.
β. concolor } Schauer.
α. discolor } Schauer.
— *lanigerum* A. Cunn. II. 166. no. 3.
— *lanigerum* Sm. II. 167. no. 5.
— *laricifolium* A. Cunningh. II. 922. no. 1.
— linearifolium DC. II. 169. †
— *linearifolium* DC. V. 739. no. 5.
— *lucidum* Hort. Vimar. II. 168. no. 16.
— *macrocarpum* Cunn. II. 167. no. 10. β.
— *marginatum* Labill. V. 739. no. 3.
— multicaule A. Cunn. II. 923. no. 3.
— *multiflorum* Cav. II. 168. no. 13.
— *obliquum* Colla. II. 168. no. 13.
— obovatum Sweet. II. 169. no. 25.
— *obtusum* Lodd. II. 168. no. 19.
— Oxycedrus L. Schauer. II. 168. no. 14.
— *paludosum* Hort. Berolin. II. 166. no. 1.
— *perforatum* Forst. II. 165. no. 5.
— *persiciflorum* Rchb. II. 168. no. 15.
— pilosum Schauer. II. 923. no. 2.
— *polygalaefolium* Salisb. II. 168. no. 20.
Leptospermum porophyllum Cav. II. 168. no. 20.
— *porophyllum* DC. II. 168. no. 21.
— pubescens Lam. II. 167. no. 5.
— *pubescens* Sm. II. 167. no. 4.
— *recurvifolium* Salisb. II. 168. no. 13.
— *resiniferum* Bertol. V. 739. no. 1.
— *rubricaule* Lk. II. 167. no. 10. α.
— rupestre J. D. Hook. II. 169. no. 24.
— *scabrum* Wall. II. 152. no. 6.
— *scoparium* Forst. II. 167. no. 10. α.
— scoparium Sm. II. 167. no. 10.
ε. confertifolium } Schauer.
α. Forsteri } Schauer.
δ. grandiflorum } Schauer.
γ. microphyllum } Schauer.
β. myrtifolium } Schauer.
— *scoparium α. linifolium* Willd. II. 167. no. 10. α.
— *sericeum* Cunn. II. 167. no. 5.
— *sericeum?* Hort. Berol. II. 167. no. 7.
— sericeum Labill. II. 166. no. 2.
— *sericophyllum* S. Schauer. II. 167. no. 6.
— speciosum Schauer. II. 923. no. 1.
— spinescens Endl. II. 169. no. 28.
— splendens Schauer. II. 923. no. 4.
— *squarrosum* Gaertn. II. 167. no. 10. β.
— *stamineum* Wall. II. 152. no. 4.
— stellatum Cav. II. 167. no. 11.
— styphelioides S. Schauer. II. 167. no. 9.
— *tenuifolium* Cav. II. 168. no. 13.
— *Thea* Willd. II. 167. no. 11.
— *theaeforme* A. Cunn. V. 739. no. 2.
— *thymifolium* Cunn. II. 167. no. 6.
— tomentosum Hort. Carlsruh. II. 167. no. 5.
— tonsum S. Schauer. II. 167. no. 8.
— tortuosum Dehnhrdt. II. 169. no. 26.
— triloculare Vent. II. 168. no. 17.
— *trinerve* White. II. 167. no. 4.
— villosum Otto et Dietr. II. 169. no. 30.
— virgatum S. Schauer. II. 166. no. 1.
— *virgatum* Willd. II. 168. no. 20.
Leptospron Bth. I. 772. V. 537. no. 4.
Leptostachya Mitch. IV. 37. no. 1.
Leptostigma Arn. II. 463. VI. 26.
— Arnottianum Wlprs. *II. 463. no. 1. VI. 26. no. 1.
Leptostylis DC. I. 132. no. 18.
Leptosyne DC. *II. 607. VI. 156.
— *Californica* Nutt. VI. 156. no. 1.
— Douglasii DC. VI. 156. no. 1.
Leptotaenia Nutt. II. 412.
—? Californica Nutt. II. 412. no. 3.
— dissecta Nutt. II. 412. no. 1.
— multifida Nutt. II. 412. no. 2.
Leptothamnus DC. *II. 594. *II. 952.

Leptrina Raf. *II. 239.
Læpuropetalum Elliot. II. 368.
— spathulatum Elliot. *II. 368. no. 1.
Lerchea Linn. II. 504. VI. 58.
— longicauda Linn. *II. 504. no. 1. VI. 58. no. 1.
Lereschia Boiss. °V. 854.
— Thomasii Boiss. *V. 854. no. 1.
Leretia Arrabida II. 802.
— cordata Arrabida *II. 802. no. 1.
Leria DC. *II. 681. *VI. 320.
Lericae Lssng. II. 681. VI. 320.
Lespedeza Michx. I. 748.
— *angustifolia* Darl. I. 748. no. 12. γ.
— *angustifolia* Ell. I. 749. no. 15. γ.
— bicolor Turcz. I. 748. no. 1.
— capitata Michx. *I. 749. no. 15.
γ. angustifolia } Torr. et Gr.
β. longifolia } Torr. et Gr.
δ. sericea Hook.
— Caraganae Bnge. I. 748. no. 5.
— *divergens* Prsh. I. 748. no. 12. α.
— elegans Cambess. I. 748. no. 9.
— floribunda Bnge. I. 748. no. 6.
— *frutescens* DC. I. 748. no. 12. γ.
— hirta Ell. *I. 749. no. 14.
— Indica Spr. *I. 748. no. 11.
— *juncea* Wall. I. 667. no. 89.
— Kanaoriensis Cambess. I. 748. no. 8.
— *longifolia* DC. I. 749. no. 15.
— macrocarpa Bnge. I. 748. no. 2.
— *macrocarpa* Bnge. V. 527. no. 1.
— macrophylla Bnge. I. 748. no. 4.
— medicaginoides Bnge. I. 748. no. 3.
— *Nuttallii* Darl. I. 749. no. 13. γ.
— *polystachya* Michx. I. 749. no. 14.
— *reticulata* Pers. I. 748. no. 12. γ.
— *sessiliflora* Michx. I. 748. no. 12. β.
— striata Hook. et Arn. *I. 748. no. 10.
— *Stuvei* Darl. I. 749. no. 13. γ.
— *Stuvei* Ell. I. 749. no. 13. β.
— Stuvei Nutt. I. 748. no. 13. (cum varr. α. β. et γ.)
— *Stuvei* Nutt. I. 749. no. 13. α.
— variegata Cambess. I. 748. no. 7.
— *villosa* Pers. I. 749. no. 14.
— violacea Pers. *I. 748. no. 12.
γ. angustifolia.
α. divergens.
β. sessiliflora.
— *virgata* Nutt. I. 749. no. 13. γ.
Lessertia DC. I. 682. V. 517.
— abbreviata E. Mey. I. 683. no. 9.
— acuminata E. Mey. I. 683. no. 11.
— annua DC. *I. 683. no. 8.
— *arcuata* Eckl. et Zeyh. I. 683. no. 16.
Lessertia astragalina Meisn. V. 517. no. 1.
— candida E. Mey. I. 682. no. 3.
— *capitata* E. Mey. I. 683. no. 12.
— *carnosa* Eckl. et Zeyh. I. 682. no. 2.
— diffusa R. Br. *I. 683. no. 13.
β. dendritica.
— excisa DC. *I. 683. no. 15.
— falciformis DC. *I. 683. no. 16.
β. glabrata E. Mey.
δ. minuta E. Mey.
γ. riparia E. Mey.
— flexuosa E. Mey. I. 682. no. 6.
— *linearis* DC. I. 683. no. 8.
— *margaritacea* E. Mey. I. 682. no. 4.
— *microcarpa* E. Mey. I. 683. no. 14.
— physodes Eckl. et Zeyh. I. 683. no. 10.
— propinqua Eckl. et Zeyh. I. 682. no. 4.
— rigida DC. *I. 682. no. 2.
α. leucomelaena E. Mey.
β. marina E. Mey.
— spinescens E. Mey. I. 682. no. 1. (cum varr. α. et β. ibid.)
— stenoloba E. Mey. I. 683. no. 17.
— sulcata E. Mey. I. 682. no. 5.
— tenuifolia E. Mey. I. 682. no. 7.
β? minor E. Mey. I. 683. no. 7.
— *tomentosa* DC. I. 683. no. 13.
— tumida Eckl. et Zeyh. I. 683. no. 12.
— venusta Eckl. et Zeyh. I. 683. no. 14.
— *villosa* E. Mey. I. 683. no. 15.
Lessingia Cham. *II. 593. *II. 952. no. 35.
Lessonia bupleurifolia Bert. II. 390. no. 14.
— *bupleuroides* Bert. II. 390. no. 18.
Lestadia Knth. *II. 594. VI. 132.
— rupestris Bth. VI. 132. no. 1.
Lettsomia Rz. et Pav. *I. 370.
Leucaena Bth. I. 884. °V. 586.
— canescens Bth. V. 585. no. 3.
— diversifolia Bth. I. 884. no. 3.
— glauca Bth. *I. 884. no. 1. V. 586. no. 1.
— macrophylla Bth. V. 586. no. 4.
— pulverulenta Bth. I. 884. no. 2.
— trichodes Bth. *I. 884. no. 4. V. 586. no. 2.
Leucanthemum Tournef. II. 636. °VI. 191.
— *alpinum* Cluss. VI. 223. no. 48.
— *alpinum angustifolium* Barrel. VI. 224. no. 49.
— *alpinum foliis Coronopi* Tournef. VI. 224. no. 49.
— *alpinum majus rigido folio* Tournef. VI. 191. no. 1. β.
— *Cebennense* DC. VI. 192. no. 3.
— *Chamaemelum* Lam. VI. 194. no. 1.
— *Corsicum* DC. VI. 192. no. 2.
— *gramineo folio* Tournef. VI. 192. no. 1. B.
— *graminifolium* Lam. VI. 192. no. 1. B.

Leucanthemum heterophyllum DC. VI. 191. no. 1. β.
— *lanceolatum* DC. VI. 191. no. 1. β.
— *montanum* DC. VI. 191. no. 1. β.
— *montanum β. gracilicaule* DC. VI. 192. no. 1. B.
— *pectinatum* DC. II. 636. no. 1. VI. 193. no. 1.
Leucanthi DC. (Aster) II. 564.
Leucas R. Br. III. 868. °III. 989. VI. 683.
— *affinis* R. Br. III. 869. no. 2.
— angularis Bth. III. 871. no. 13.
— angustifolia Wall. III. 872. no. 19.
— aspera Spr. III. 876. no. 40.
β. Wightiana.
— *capitata* Desf. III. 877. no. 43.
— Benthamiana Hook. et Arn. III. 872. no. 22.
— biflora R. Br. III. 872. no. 21.
— cephalotes Spreng. III. 877. no. 43.
— Chinensis R. Br. III. 869. no. 5.
— ciliata Bth. III. 875. no. 35.
β. hirsuta.
— decemdentata Sm. III. 871. no. 15.
— *decurva* Bth. III. 976. no. 41.
— diffusa Bth. III. 875. no. 38.
— *dimidiata* Bth. III. 876. no. 38.
— dimidiata Spreng. III. 876. no. 42.
— flaccida R. Br. III. 871. no. 16.
— *foliis rotundis etc.* Burm. III. 872. no. 21.
— glabrata R. Br. III. 879. no. 3.
— Hamiltoniana Bth. III. 870. no. 10.
— *helianthemifolia* Bth. III. 874. no. 33.
— helianthemifolia Desf. III. 873. no. 28.
— hirta Spr. III. 874. no. 33.
— hyssopifolia Bth. III. 876. no. 39.
— Indica R. Br. III. 868. no. 1.
— inflata Bth. III. 869. no. 4.
— Javanica Bth. III. 873. no. 25. (c. var. β. ibid.)
— lamiifolia Desf. III. 874. no. 32.
— lanata Bth. III. 870. no. 8.
— lanceaefolia Desf. III. 874. no. 30.
— linifolia Spreng. III. 877. no. 45.
— longifolia Bth. III. 872. no. 18.
— marrubioides Desf. III. 873. no. 24.
— *marrubioides β. glabrior* Bth. III. 873. no. 23.
— Martinicensis R. Br. III. 877. no. 44.
— *melissaefolia* Bth. III. 871. no. 16.
— mollissima Wall. III. 870. no. 9.
— montana Spr. III. 870. no. 6.
— neptaefolia Bth. III. 871. no. 17.
— *nutans* Bth. III. 877. no. 42.
— nutans Spreng. III. 876. no. 41.
— ovata Bth. III. 870. no. 7.
— *parviflora* Bth. III. 871. no. 16.
Leucas pilosa Bth. III. 871. no. 14.
β. pubescens.
— *Plukenetii* Spr. III. 876. no. 40.
— procumbens Desf. III. 872. no. 20.
— pubescens Bth. III. 872. no. 23.
— *quinquedentata* Br. III. 867. no. 2.
— rosmarinifolia Bth. III. 873. no. 27.
— Schimperi Prsl. VI. 683. no. 1.
— *stachydiformis* Hochstett. VI. 683. no. 1.
— *stachyoides* Spr. III. 871. no. 15.
— stelligera Wall. III. 874. no. 31.
— stricta Bth. III. 875. no. 36.
— strigosa Bth. III. 871. no. 12.
— suffruticosa Bth. III. 873. no. 26.
— teres Bth. III. 870. no. 11.
— ternifolia Desf. III. 874. no. 29.
— urticaefolia R. Br. III. 869. no. 2.
— vestita Bth. III. 875. no. 34.
— *Wightiana* Bth. III. 876. no. 40. β.
— Zeylanica R. Br. III. 875. no. 37.
Leuceria Lag. *II. 682. VI. 322.
— Meyeniana Wlprs. VI. 322. no. 1.
— *gossypina* Hook. et Arn. VI. 322. no. 3.
— *purpurea* Hook. et Arn. VI 322. no. 1.
— *runcinata* Gill. et Don. VI. 322. no. 2.
Leucoblepharis Arn. *II. 594. II. 970. °VI. 132.
— subsessilis Arn. *II. 970. no. 1. *VI. 132. no. 1.
Leucocarpum obscurum Rich. I. 203. no. 1.
Leucocarpus D. Don. III. 277. °III. 964. *VI. 641.
— alatus D. Don. III. 277. no. 1.
Leucoroma Collinsii Nutt. II. 576. no. 3. β.
Leucodraba DC. I. 150. II. 758. no. 1.
Leucoglossa (Pyrethrum) DC. VI. 202. no. 1. II. 636. no. 1.
Leucoglossa (Tanacetum) DC. VI. 222.
Leucogymnocline C. H. Schultz. VI. 221.
Leucojum spinosum Creticum Clus. III. 144. no. 78.
— *spinosum cruciatum* Alp. Exot. III. 144. no. 78.
Leucolaena R. Br. II. 385.
Leucolaena R. Br. V. 841.
Leucolaena DC. II. 385. V. 842.
— candida Bth. II. 385. no. 2.
— *candida* Bth. V. 842. no. 4.
— Hügelii Bth. II. 385. no. 3.
— *Hügelii* Bth. V. 842. no. 5.
— pannosa Bth II. 385. no. 4.
— peltigera Hook. II. 396. no. 5.
— *peltigera* Hook. V. 842. no. 1.
— pilosa Rdge. *II. 385. no. 1.
Leucomeris Don. *II. 680. *VI. 317.
Leuconotis W. Jack. *VI. 466.

Leucopholis Gardn. II. 949. °VI. 101. (*VI. 326.)
— phylicoides Gardn. *II. 949. no. 1. VI. 101. no. 1.
Leucophyllum Humb. et Bonpl. III. 376. °III. 969. *VI. 641.
— ambiguum Humb. et Bonpl. III. 376. no. 1.
Leucophyta R. Br. *II. 644. VI. 230.
— Brownii Lssng. VI. 230. no. 1.
α. candidissima } Steetz. VI. 231. no. 1.
β. virescens
Leucopodium Gardn. °VI. 134.
— campestre Gardn. *VI. 134. no. 1.
Leucopogon R. Br. II. 732. VI. 426.
— abnormis Sonder. VI. 429. no. 36.
— *acuminatus* Gaudich. VI. 429. no. 36.
— angustatus Bth. *VI. 426. no. 10.
β. hirsutus.
— *assimilis* Bth. VI. 426. no. 7.
— Bellignianus Raoul. VI. 429. no. 38.
— *blepharodes* DC. VI. 424. no. 10.
— brachycephalus DC. *VI. 426. no. 5.
β. heterophyllus.
— capitellatus DC. *VI. 426. no. 11.
β. sparsiflorus.
— cordatus Sonder. VI. 427. no. 14.
— cordifolius Lindl. II. 732. no. 2.
— corifolius Endl. II. 732. no. 1.
— corynocarpus Sonder. VI. 428. no. 30.
— crassifolius Sonder. VI. 427. no. 20.
— dasystylis Sonder. VI. 429. no. 35.
— elatior Sonder. VI. 427. no. 16.
— elegans Sonder. VI. 427. no. 22.
β. glaucifolius.
— *epacridis* DC. VI. 424. no. 7.
— flavescens Sonder. VI. 428. no. 29.
— glacialis Lindl. II. 732. no. 3.
— *glaucescens* DC. VI. 426. no. 3.
— hirsutus Sonder. VI. 426. no. 9.
— oblongifolius Sonder. VI. 428. no. 32.
— obtusatus Sonder. VI. 427. no. 13.
— oppositifolius Sonder. VI. 427. no. 19.
β. pubescens.
— ovalifolius Sonder. VI. 428. no. 33.
— ovatus Sonder. VI 428. no. 24.
— Oxycedrus Sonder. VI. 428. no. 27.
— paniculatus Sonder. VI. 426. no. 1.
— *pendulus* Bth. VI. 428. no. 26.
— planifolius Sonder. VI. 428. no. 31.
— polymorphus Sonder. VI. 426. no. 7.
— polystachyus R. Br. *VI. 426. no. 4.
γ. monostachys.
β. serratifolius.
— pulchellus Sonder. VI. 426. no. 8.
— pungens Sonder. VI. 428. no. 34.
Leucopogon racemulosus DC. *VI. 427. no. 12.
β. pauciflorus.
— rufus Lindl. II. 732. no. 4.
— rupestris Sonder. VI. 427. no. 18.
— secundiflorus Sonder. VI. 428. no. 26.
— Shuttleworthii Sonder. VI. 426. no. 2.
— similis Sonder. VI. 428. no. 28.
— sprengelioides Sonder. VI. 428. no. 25.
— tectus Sonder. VI. 427. no. 23.
— tetragonus Sonder. VI. 427. no. 21.
— vaccinioides Sonder. VI. 429. no. 37.
— vaginans Sonder. VI. 427. no. 17.
— variifolius Sonder. VI. 427. no. 15.
— verticillatus R. Br. *VI. 426. no. 3
— vitellinus Sonder. VI. 426. no. 6.
Leucopsidium DC. II. 635.
— *Arkansanum* DC. II. 635. no. 2.
— humile Bth. II. 635. no. 1.
— *canescens* DC. II. 960. no. 10.
Leucosceptrum Sm. III. 903.
— *canum* Sm. III. 903. no. 1.
Leucoseris Nutt. *II. 698.
Leucoseris Torr. et Gr. II. 690.
— *Californica* Nutt. II. 691. no. 5.
— *saxatilis* Nutt. II. 690. no. 4.
— *tenuifolia* Nutt. II. 691. no. 6.
Leucosidea Eckl. et Zeyh. II. 44. V. 656.
— sericea Eckl. et Zeyh. *II. 44. no. 1. V. 656. no. 1.
Leucosmia Bth. °V. 411.
— Burnettiana Bth. V. 411. no. 1.
Leucospora multifida Nutt. III. 271. no. 2.
Leucothamnus Lindl. I. 336.
— montanus Lindl. *I. 336. no. 1.
Leucothoë DC. *II. 728. VI. 418.
— Organensis Gardner. VI. 418. no. 1.
Leucoxylon Blume. *I. 376.
Leuwenhoekia R. Br. *II. 705. VI. 370.
— dubia Sonder. VI. 370. no. 1.
— *tiliacea* E. Meyer. I. 349. no. 3.
Leuzea DC. *II. 677.
Levisticum Koch. II. 406.
— argutum Lindl. II. 406. no. 1.
Lewisia Prsh. II. 250. °V. 790.
— rediviva Prsh. *II. 250. no. 1. *V. 790. no. 1.
Lewisieae Hook. V. 790.
Leycestria Wall. II. 447.
— formosa Wall. *II. 447. no. 1.
Leyssera Linn. *II. 650.
— *lanceolata* Walt. II. 625. no. 5.
Leyssereae Lssng. II. 650. VI. 250.
Lhotskya Schauer. II. 157. °V. 732.
— acutifolia Lindl. II. 157. no. 2.
— brevifolia Schauer. V. 733. no. 1.
— ericoides Schauer. II. 157. no. 1.

Lhotskya violacea Lindl. II. 157. no. 3.
Liabeae Cass. II. 544. VI. 103.
Liabum Adans. II. 544. VI. 104.
— amplexicaule Poepp. et Endl. II. 544. no. 1.
—? erigeroides Bth. VI. 104. no. 1.
— eriocaulon Poepp. et Endl. II. 544. no. 3.
— hastifolium Poepp. et Endl. II. 544. no. 2.
Liatris Schreb. II. 549. II. 949. VI. 705.
— *aspera* Michx. II. 551. no. 14.
— *bellidifolia* Torr. et Gr. II. 551. no. 3.
— *borealis* Paxt. II. 551. no. 14.
— Boykinii Torr. et Gr. II. 550. no. 6.
— *brachystachya* Nutt. II. 551. no. 12.
— Brasiliensis Gardn. VI. 705. no. 1.
— Champmanii Torr. et Gr. II. 949. no. 1.
— *corymbosa* Nutt. II. 551. no. 4.
— cylindracea Michx. *II. 549. no. 3.
— *cylindrica* Torr. II. 549. no. 4.
— *dubia* Bart. II. 550. no. 10. δ.
— elegans Willd. *II. 549. no. 1.
— fruticosa Nutt. II. 551. no. 17.
— *gracilis* Ell. II. 55. no. 10. γ.
— gracilis Prsh. II. 550. no. 9. (cum varr. β. γ. δ.)
α. glabriuscula.
— *gracilis* Prsh. II. 550. no. 9. α.
— *graminifolia* Nutt. II. 550. no. 10. α.
— graminifolia Willd. *II. 550. no. 10.
— heterophylla R. Br. *II. 551. no. 15.
— *heterophylla* Nutt. II. 551. no. 14.
— *laevigata* Nutt. II. 550. no. 7.
— mucronata DC. *II. 550. no. 5.
— odoratissima Willd. *II. 551. no. 18.
— *oppositifolia* Nutt. II. 553. no. 2.
— paniculata Willd. *II. 551. no. 19.
— pauciflora Prsh. *II. 551. no. 16.
— *paucifloscularsa* Nutt. II. 550. no. 9. β.
— *pilosa* Prsh. II. 550. no. 10. δ.
— *pilosa β. gracilis* Nutt. II. 550. no. 10. γ.
— *pilosa β. laevicaulis* DC. II. 550. no. 10. δ.
— pilosa Willd. *II. 551. no. 13.
— punctata Hook. *II. 549. no. 4.
— pycnostachya Michx. *II. 551. no. 12. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *resinosa* DC. II. 549. no. 4.
— *resinosa* Nutt. II. 551. no. 11. β.
— *scariosa* DC. II. 551. no. 14.
— scariosa Willd. *II. 551. no. 14.
— secunda Ell. *II. 550. no. 8.
— *sphaeroidea* DC. II. 551. no. 14.
— *sphaeroidea* Michx. II. 551. no. 14.
— spicata Willd. *II. 550. no. 11.
— *spicata γ. racemosa* DC. II. 550. no. 10. δ.
— *squamosa* Nutt. II. 551. no. 1.
Liatris squarrosa Willd. *II. 549. no. 2.
γ. compacta.
β. floribunda.
δ. intermedia..
— *squarrulosa* Michx. II. 551. no. 14.
— *stricta* Macnab. II. 549. no. 3.
— tenuifolia Nutt. *II. 550. no. 7. (c. var. β. ibid.)
— *tomentosa* Michx. II. 551. no. 2.
— *turbinata* Sweet. II. 550. no. 10. δ.
— *virgata* Nutt. II. 550. no. 10. γ.
— *Walteri* Ell. II. 551. no. 2.
Libanotis Crantz. II. 403. V. 865.
— *cachroides* DC. V. 872. no. 1.
— condensata Fisch. V. 866. no. 3.
— eriocarpa Schrenk. V. 865. no. 1.
— graveolens Ldb. V. 866. no. 2.
— *Patriniana* DC. V. 866. no. 2.
— seseloides Turczan. V. 866. no. 4.
— Sibirica C. A. Mey. II. 403. no. 1.
— *Stephaniana* DC. V. 850. no. 1.
— *villosa* Fisch. et Mey. V. 872. no. 2.
— *vulgaris δ. Sibirica* DC. II. 403. no. 1.
— *vulgaris ζ. incana* DC. V. 866. no. 2.
Licania Aubl. II. 5.
— aperta Bth. II. 5. no. 3.
— coriacea Bth. II. 6. no. 12.
— crassifolia Bth. II. 5. no. 11.
— divaricata Bth. II. 6. no. 14.
— floribunda Bth. II. 5. no. 4.
— heteromorpha Bth. II. 6. no. 15.
— humilis Cham. Schlcht. II. 5. no. 6.
— leptostachya Bth. II. 5. no. 10.
— mollis Bth. II. 5. no. 8.
— parviflora Bth. II. 6. no. 13.
— pendula Bth. II. 5. no. 2.
— pubiflora Bth. II. 5. no. 5.
— rigida Bth. II. 5. no. 9.
— triuva Cham. et Schlchtd. II. 5. no. 7.
— turbinata Bth. II. 5. no. 1.
Lichtensteinia Cham. et Schlchtd. II. 399.
Lichtensteinia Wendl. II. 442.
— Beiliana Eckl. et Zeyh. II. 399. no. 3.
— inebrians Eckl. et Zeyh. *II. 399. no. 2.
— latifolia Eckl. et Zeyh. II. 399. no. 1.
— Sprengeliana Eckl. et Zeyh. II. 399. no. 4.
Lidbeckia Bergius. *II. 635.
Lieberkühnia Cass. *II. 681. *VI. 320.
Liebigia Endl. *VI. 520.
Liebigieae A. P. DC. VI. 520.
Lightfootia L'Hérit. *II. 710. *VI. 381.
Lightfootia Swrtz. I. 204.
Lightfootieae Endl. II. 710.
Ligularia Cass. II. 651. VI. 252.
Ligularia Sweet. (nec Cass.) I. 455.
— dissecta Eckl. et Zeyh. I. 455. no. 62.

Ligularia gigantea Sieb. et Zucc. II. 651. no. 2.
— hirta Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 66.
— incisa Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 60.
— jonidiflora Eckl. et Zeyh. I. 455. no. 59.
— Kaempferi Sieb. et Zucc. II. 651. no. 1.
— nana Dcne. II. 651. no. 3. VI. 252. no. 2.
— Persica Boiss. VI. 252. no. 1.
— ramosissima Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 63.
— tenuifolia Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 65.
— trifida Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 61.
— villosa Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 64.
Liguliflorae Endl. II. 683. II. 993. VI. 326.
Ligusticum Linn. II. 404. V. 868.
— *Aciphylla* Spr. V. 868. no. 1.
— antipodum Hombr. et Jacq. V. 869. no. 2.
— *argutum* Nutt. II. 427. no. 1.
— *athamanthicum* Adams. V. 850. no. 1.
— *barbinode* Michx. II. 404. no. 3.
— *Carniolicum* Host. II. 425. no. 1.
— *Caucasicum* Willd. V. 921. no. 1.
— Corsicum Gay. II. 404. no. 2.
— *decussatum* Mnch. V. 880. no. 2.
— discolor Ldb. II. 404. no. 3.
— *ferutaceum* All. II. 403. no. 2.
— *Fischeri* Lnk. II. 405. no. 1.
— *Gmelini* Cham. et Schlchtd. V. 870. no. 1.
— *Indicum* Klein. II. 402. no. 12.
— *longifolium* Willd. II. 404. no. 1.
— *Peloponnesiacum* Pall.? II. 404. no. 3.
— saxifragum Boiss. et Sprun. V. 868. no. 1.
— *seseloides* Fisch. et Mey. V. 866. no. 4.
— *simplex* Bth. II. 405. no. 1.
— tripartitum Dumort. II. 404. no. 1.
— *vaginatum* Spr. V. 870. no. 1.
Ligustroides Linn. IV. 100. no. 1.
Ligustrum Tournef. VI. 462.
— *aculeatum, fructu testiculato* Plum. IV. 100. no. 1.
— ovalifolium Hsskrl. VI. 462. no. 1.
Limbarda DC. II. 600. no. 1. VI. 140.
— *macrophylla* Kar. et Kiril. VI. 140. no. 1.
LIMNANTHEAE R. Br. I. 467.
Limnanthemnm Gmelin. * VI. 510.
Limnanthes R. Br. I. 467.
— Douglasii R. Br. *I. 467. no. 1.
Limnia Torr. et Gr. II. 237.
— *alsinoides* Haw. II. 237. no. 4.
Limnogenneton C. H. Schultz. °VI. 146.
— Abyssinicum C. H. Schultz. VI. 147. no. 1.
Limnophila R. Br. III. 272. °III. 963. *VI. 642.
— chamaedryfolia G. Don. III. 273. no. 7.
— diffusa G. Don. III. 273. no. 12.
Limnophila elongata Bth. III. 273. no. 6. γ.
— gratioloides R. Br. III. 273. no. 6.
γ. elongata.
β. myriophylloides.
— gratissima Blume. III. 274. no. 13.
— heterophylla Bth. III. 272. no. 2.
— *hyssopifolia* Rth. III. 273. no. 11.
— *myriophylloides* Rth. III. 273. no. 6. β.
— pinnatifida Blume. III. 273. no. 8.
— polystachya Bth. III. 274. no. 14.
— punctata Blume. III. 272. no. 5.
— racemosa Bth. III. 273. no. 11.
— reflexa Bth. III. 273. no. 1.
—? Roxburghii G. Don. III. 273. no. 9.
— serrata Gaudich. III. 273. no. 10.
— sessiliflora Blume. III. 272. no. 3.
— villosa Blume. III. 273. no. 4.
Limonellus Rmph. II. 804. no. 4.
Limonia L. I. 379.
— acidissima L. *I. 379. no. 3.
— alata Hb. Madr. I. 379. no. 4. (III. Emend. p. 2.)
— *citrifolia* Moon. I. 381. no. 1.
— *crenulata* Rxb. I. 379. no. 3.
— *diacantha* DC. I. 379. no. 1.
—? *dubia* Blume. V. 140. no. 1.
—? dubia Blume. I. 379. no. 2.
—? horrida Blume. I. 379. no. 1.
— Laureola DC. I. 379. †
— *Laureola* DC. V. 405. no. 2.
— missionis Wall. I. 379. no. 5.
— *monophylla* L. I. 379. no. 1.
— retusa D. Don. I. 379. no. 6.
— *scandens* Rxb. I. 382. no. 1.
Limonieae Wght. et Arn. I. 379.
Limosella Linn. III. 334. °III. 938. *VI. 644.
— *annua* Lindern. III. 334. no. 1.
— aquatica Linn. III. 334. no. 1.
γ. caule pollicari vel bipollicari......... } Linn. III. 335. no. 1.
δ. floribus triandris } Linn. III. 335. no. 1.
β. foliis sublinearibus } Linn. III. 335. no. 1.
— australis R. Br. III. 335. no. 2.
— *diandra* Krok. III. 335. no. 1. δ.
— *diandra* Linn. III. 334. no. 1.
— *tenuifolia* Hoffm. III. 335. no. 1. β.
Linaria Caesalp. III. 203. no. 54.
Linaria Vent. III. 188. III. 450. °III. 959. VI. 637.
— *acutangula* Ten. III. 191. no. 9. β.
— *acutiloba* Fisch. III. 204. no. 54.
— Aegyptiaca Dum. III. 195. no. 26.
— aequitriloba Duby. III. 192. no. 13.
— *alba* Mnch. III. 209. no. 72.
— albifrons Spr. III. 212. no. 81.
— alsinaefolia Spr. III. 195. no. 23.

Linaria Algarviana Chav. III. 207. no. 65.
— alpina DC. III. 215. no. 89.
β. erecta DC. III. 216. no. 89.
— *Altaica* Fisch. III. 203. no. 52.
— *altera Moravica* Clus. III. 213. no. 83. *β.*
— *Americana maxima purpureo flore* Ray. III. 197. no. 33.
— amethystea Lnk. et Hffmsgg. III. 219. no. 100.
β. flava.
— *angustifolia* Rchb. III. 203. no. 53.
— *angustifolia flore cinereo striato* Dill. III. 211. no. 76. *β.*
— *annua angustifolia, flore majore luteo* Moris. III. 208. no. 66.
— *annua angustifolia, flosculis albis longis caudatis* Triumf. III. 209. no. 72.
— *annua purpureo-violacea, calcaribus longis etc.* Magn. III. 212. no. 79.
— *Antirrhinum* Chevall. III. 190. no. 6.
— aparinoides Chav. III. 205. no. 59.
β. humilis Juss. III. 206. no. 59.
— Appennina Tausch. III. 220. no. 110.
— arenaria DC. III. 217. no. 93.
— Armeniaca Chav. III. 209. no. 71.
— *arvensis coerulea erecta* C. Bauh. III. 213. no. 83.
— arvensis Dsf. III. 212. no. 83.
β. simplex Chav. III. 213. no. 83.
— *arvensis α.* Dsf. III. 213. no. 83. *β.*
— *arvensis minima* Rivin. III. 190. no. 6.
— *Aucheri* Boiss. VI. 637. no. 3.
— bellidifolia Dun. III. 186. no. 1.
— *Bellidis folio* Dalech. III. 186. no. 1.
— *Besseriana* Rchb. III. 205. no. 58. *β.*
— Biebersteinii Besser. III. 204. no. 55.
— bipartita Willd. III. 208. no. 68.
— *bipunctata* Dum. III. 219. no. 101. *β.*
— *bipunctata β. glauca* Linn. et Hffmsgg. III. 219. no. 101.
— Boissieri Wlprs. III. 211. no. 77.
β. glutinosa Boiss.
— Broussonnetii Chav. III. 218. no. 98.
— Candollei Chav. III. 217. no. 92.
— caesia DC. III. 220. no. 105.
— Canadensis Dum. III. 209. no. 73.
— *Capensis* Spr. III. 184. no. 17. III. 185. no. 26.
— *capillaceo folio odora* C. Bauh. III. 211. no. 76. *β.*
— capraria Moris et Notar. III. 220. no. 106.
— *carnosa* Mnch. III. 213. no. 83.
— *caryophyllata* Cam. III. 211. no. 76. *β.*
— Caucasica Moussin. III. 220. no. 107.
— *caule simplici, floribus violaceis, foliis Lini* Clayt. III. 209. no. 73.
— Cavanillesii Chav. III. 198. no. 36.
Linaria Chalepensis Mill. III. 209. no. 72.
— *Chalepensis minor erecta, flore albo, lineis violaceis* Moris. III. 209. no. 72.
— *chloraefolia* Rchb. III. 201. no. 50. *β.*
— *ciliata* Lang. III. 204. no. 54.
— circinnata Sweet. III. 196. no. 30.
— cirrhosa Willd. III. 194. no. 22.
— Clementei Haens. III. 206. no. 60.
— *coerulea* Hortul. III. 208. no. 68.
— *coerulea calcaribus longis* J. Bauh. III. 212. no. 79.
— *coerulea minor* Ldb. III. 212. no. 79.
— *coerulea repens* C. Bauh. III. 216. no. 89.
— commutata Bernhardi. III. 194. no. 20.
— concolor Griseb. III. 451. no. 121.
β. serpens.
— *Constantinopolitana Lini sativi folio, flore luteo* Tournef. III. 201. no. 50.
— corifolia Dsf. III. 211. no. 78.
— *crassifolia* DC. III. 189. no. 3. *γ.*
— crassifolia Knze. VI. 637. no. 4.
— cretacea Fisch. III. 199. no. 42.
— *culta vulgaris* J. Bauh. III. 203. no. 54.
— Cymlabaria Mill. 190. no. 9.
β. acutangula, *γ.* hederaefolia, *δ.* Sieberi } Chav. III. 191. no. 9.
— *Cyparissias* Tausch. III. 204. no. 54.
— Dalmatica Mill. 201. no. 49.
— *Dalmatica* Rchb. III. 201. no. 48.
— dealbata Lnk. et Hffmsgg. III. 193. no. 16.
— *decumbens* Mnch. III. 210. no. 76.
— delphinioides Gay. III. 221. no. 115.
— diffusa Lnk. et Hffmsgg. III. 219. no. 102.
— Elatine Mill. III. 193. no. 19.
γ. Sieberi, *δ.* hamosa, *β.* coerulea } Mill. III. 194. no. 19.
— *Elatine* Sieb. III. 194. no. 19. *γ.*
— *Elatine* d'Urv. III. 194. no. 21.
— elatinoides Dsf. III. 192. no. 15.
— *elongata* Dumort. III. 204. no. 54.
— fastigiata Chay. III. 200. no. 46.
— flava Dsf. III. 199. no. 41.
— flexuosa Dsfont. III. 189. no. 4.
— filifolia Lagasca. III. 221. no. 111.
— *filiformis* Mnch. III. 214. no. 87.
— *flore albo* Riv. III. 209. no. 72.
— *flore pallido, rictu aureo* C. Bauh. III. 201. no. 50.
— *flore pallido, rictu aureo elatior* Tournef. III. 201. no. 50. *β.*
— *flore purpureo Americana* Riv. III. 197. no. 33.
— *folio hirsuto subrotundo, flore ex albido flavescente* Moris. III. 193. no. 18.

Linaria folio Psyllii Riv. III. 205. no. 59.
— *foliis carnosis cinereis* C. Bauh. III. 219. no. 101.
— Fontanesiana Chav. III. 218. no. 96.
— *fruticans* Spr. III. 184. no. 18.
— fruticosa Dsf. III. 195. no. 27.
— *Gebleri* Besser. III. 203. no. 54.
— genistaefolia Mill. III. 201. no. 50.
β. procera.
γ. silenifolia.
— *Genistae folio glauca, flore luteo* Herm. III. 201. no. 50.
— *genistifolia* DC. III. 203. no. 53.
— *glabrata* H. B. Kth. III. 198. no. 37.
— glandulifera Ten. III. 221. no. 116.
— glauca Spr. III. 219. no. 101.
β. bipunctata.
γ. multicaulis.
— *glaucophylla* Lnk. et Hffmsgg. III. 215. no. 87. δ.
— *glutinosa* Lnk. et Hffmsgg. III. 217. no. 94.
— *gracilis* Dsf. III. 218. no. 96.
— Graeca Chav. III. 194. no. 21.
— grandiflora Dsf. III. 201. no. 48.
— Haelava Chav. III. 216. no. 90.
— *hastata* Royle. III. 196. no. 28.
— *hederaceo folio villoso seu Cymbalaria alpina* Tournef. III. 192. no. 12.
— *hederaefolia* Slzm. III. 191. no. 10.
— hepatica Bnge. III. 204. no. 56.
— hepaticaefolia Duby. III. 191. no. 10.
— heterophylla Dsf. III. 205. no. 59.
— heterophylla Spr. III. 196. no. 31.
— hians Spr. III. 221. no. 112.
— *hians* Spr. III. 225. no. 13.
— hirta Mnch. III. 197. no. 35.
— *hirsuto folio acuminato in basi auriculato* Moris. III. 194. no. 19.
— *Hispanica* Clus. III. 198. no. 37.
— *Hispanica altera* Clus. III. 214. no. 85.
— *Hispanica Nummulariae folio villoso* Tournef. III. 188. no. 2.
— *Hispanica procumbens* Mart. III. 214. no. 85.
— *Hispanica quarta* Clus. III. 219. no. 101.
— *Hispanica quinta* Clus. III. 214. no. 87.
— *Hispanica tenuifolia villosa et viscosa* Tournef. III. 217. no. 94.
— *Hispanica trifolia latifolia villosa* Tournef. III. 198. no 36.
— ignescens Knze. VI. 637. no. 1.
— incana Wall. III. 196. no. 29.
— *incarnata* Spr. III. 208. no. 69.
— Italica Treviran. III. 203. no. 53.
β. angustifolia.
— juncea Ait. III. 208. no. 67.
Linaria juncea Dsf. III. 208. no. 66.
— *juncea* Rchb. III. 202. no. 52.
— Kurdica Boiss. et Hohenack. III. 451. no. 120.
— lanigera Dsf. III. 193. no. 17.
— *lanigera* Lnk. et Hffmsgg. III. 193. no. 18.
— latifolia Dsf. III. 197. no. 34.
— laxiflora Dsf. III. 216. no. 91.
— linifolia Rchb. III. 202. no. 51.
— *linifolia* Roch. III. 203. no. 53.
— *linifolium* Linn. III. 202. no. 52.
— linogrisea Lnk. et Hffmsgg. III. 208. no. 69.
— littoralis Willd. III. 190. no. 8.
— Loeselii Schweigger. III. 202. no. 52.
— *Lusitanica* Mill. III. 197. no. 33.
— Lusitanica Lnk. et Hffmsgg. III. 200. no. 44.
— *Lusitanica maritima Polygalae folio* Tournef. III. 200. no. 44.
— *lutea montana Genistae tinctoriae folio* C. Bauh. III. 203. no. 53.
— *lutea parva annua* J. Bauh. III. 213. no. 83. β.
— *lutea parva serpens* J. Bauh. III. 214. no. 87.
— Macedonica Griseb. III. 451. no. 119.
— macilenta Dcne. III. 195. no. 25.
— *macroura* M. Bieb. III. 205. no. 58. β.
— macroura Rchb. III. 205. no. 58.
β. Besseriana Chav.
γ. ramosa Chav.
marginata Dsf. III. 213. no. 84.
— *marina flore pulchro, caule copioso* Grisl. III. 200. no. 44.
— *maritima* DC. III. 215. no. 87. γ.
— *maritima floribus odoratis* Loesel. III. 202. no. 52.
— *maritima minima viscosa, foliis hirsutis floribusque luteis* Moris. III. 217. no. 93.
— *maritima Sedi folio succulenta* Buxb. III. 203. no. 52.
— *maxima folio Lauri Dalmatica* J. Bauh. III. 201. no. 48.
— *meonantha* Lnk. et Hffmsgg. III. 208. no. 67.
— Michauxii Chav. III. 200. no. 45.
— micrantha Spr. III. 212. no. 82.
— microcalyx Boiss. III. 451. no. 118.
— minor Dsf. III. 189. no. 6.
— *minor flore coeruleo* Marget. III. 216. no. 89.
— *minor viscida flore luteo* Moris. III. 217. no. 93.
— minutiflora C. A. Mey. III. 212. no. 80.
— *Monspessulana* Dunn. III. 211. no. 76. β.

Linaria multicaulis Mill. III. 219. no. 101. γ.
— *multipunctata* Lnk. et Hffmsgg. III. 219. no. 100. β.
— *muralis* Slzm. III. 188. no. 2.
— *neglecta* Clarke. III. 198. no. 37.
— *neglecta* β. Guss. III 198. no. 37. β.
— nivea Boiss. et Reut. III. 210. no. 75.
— ocymifolia Spr. III. 221. no. 113.
— *ocymifolia* Spr. III. 225. no. 14.
— *odora* Fisch. III. 203. no. 52.
— *odorata* Dodon. III. 186. no. 1.
— *odorata Monspessulana* J. Bauh. III. 210. no. 76. β.
— *oreades lutea parva, brevi calcari, linifolia glauca* Cup. III. 212. no. 83. β.
— *orientalis flore luteo maximo* Tournef. III. 201. no. 48.
— *orientalis Lilii Persici foliis, florum spica densissima et pyramidata* Tourn. III. 201. no. 47.
— *orientalis vulgari similis, folio longissimo* Tournef. III. 202. no. 51.
— origanifolia DC. III. 188. no. 3.
γ. crassifolia Chav.
ε. glareosa Boiss.
β. grandiflora Bth.
δ. longepedunculata Boiss.
} III. 189. no. 3.
— *origanifolia var. rubrifolia* Bth. III. 189. no. 5.
— pallida Ten. III. 191. no. 11.
— *paniculata* Peyer et Vest. III. 203. no. 53.
— *Pannonica altera* Clus. III. 216. no. 89.
— *Pannonica flore luteo minore quam in vulgari* J. Bauh. III. 201. no. 50.
— *Pannonica prima* Clus. III. 201. no. 50.
— *parviflora* Dsf. III. 212. no. 82.
— pauciflora Bonpl. III. 218. no. 99.
— patens Spr. III. 185. no. 27.
— pedunculata Spr. III. 199. no. 40.
— Pelisseriana DC. III. 211. no. 79.
β. gracilis III. 212. no. 79.
— Persica Chav. III. 220. no. 104.
— pilosa DC. III. 191. no. 12.
β. pumila III. 192. no. 12.
— platycalyx Boiss. III. 214. no. 86.
— polygonifolia Spr. III. 218. no. 97.
— praecox Bnge. III. 204. no. 57.
— *praecox* Lnk. et Hffmsgg. III. 208. no. 66.
— *prima* Dodon. III. 203. no. 54.
— *procumbens pusilla latifolia, flore pallido, rictu aureo* Ray. III. 199. no. 39.
— *prostrata* Bönningh. III. 204. no. 54. β.
— *pubescens* Dsf. III. 190. no. 8.
— *pubescens* Prsl. III. 192. no. 12.
— *pumila foliis carnosis, flosculis minimis flavis* C. Bauh. III. 213. no. 83. β.
Linaria pumila Hispanica Park. III. 214. no. 87.
— *pumila supina lutea* C. Bauh. III. 214. no. 87.
— *pumila vulgatior arvensis* Tourn. III. 190. no. 6.
— purpurea Mill. III. 210. no. 74.
— pyramidata Spr. III. 201. no. 47.
— *Pyrenaica* DC. III. 215. no. 87. β.
— *quadrifolia coerulea procumbens* Moris. III. 216. no. 89.
— *quadrifolia supina* C. Bauh. III. 216. no. 89.
— *racemosa* Dietr. III. 221. no. 112.
— *ramosissima* Boiss. III. 211. no. 77.
— ramosissima Wall. III. 196. no. 28.
— Raveyi Boiss. III. 190. no. 7.
— reflexa Dsf. III. 199. no. 39.
β. pumila.
— reticulata Dsf. III. 206. no. 61.
— *reticulata* Rchb. III. 206. no. 59.
— *rhegina* Spr. III. 199. no. 39.
— rhyditosperma Boiss. III. 450. no. 117.
— *Roylei* Chav. III. 196. no. 28.
— rubrifolia Robill. et Cast. III. 189. no. 5.
β. humilis Chav.
— rupestris C. A. Mey. III. 220. no. 108.
— *rupestris* Juss. III. 189. no. 5. β.
— Salzmanni Boiss. III. 206. no. 63.
β. flava
α. violacea
} Boiss. III. 207. no. 63.
— sapphirina Lnk. et Hffmsgg. III. 208. no. 70.
— saturejoides Boiss. III. 217. no. 95.
— *saxatilis* Boiss. III. 215. no. 88.
— *saxatilis* DC. III. 217. no. 92.
— saxatilis Lnk. et Hffmsgg. III. 217. no. 94.
β. stricta.
— *saxatilis Thymi folio* Tournef. III. 200. no. 43.
— *scabra* Spr. III. 185. no. 23.
— scariosa Dsfont. III. 192. no. 14.
— *scoparia* Brouss. III. 196. no. 32.
— segetalis C. Koch. III. 220. no. 103.
— *segetum Nummulariae folio aurito et villoso, flore coeruleo* Tournef. III. 194. no. 19. β.
— *segetum Nummulariae folio villoso* Tournef. III. 193. no. 18.
— semiglabra Slzm. III. 198. no. 35.
— *seu Cymbalaria Clematidis saxatilis rotundo Hederae folio hirsuto purpureo* Cup. III. 192. no. 12.
— *Sicula latifolia triphylla* Bocc. III. 198. no. 37.
— *Sicula multicaulis Molluginis folio* Bocc. III. 205. no. 59.

Linaria Sieberi Rchb. III. 194. no. 19. γ.
— *silenifolia* Fisch. III. 201. no. 50. γ.
— *simplex* DC. III. 213. no. 83. β.
— spartea Lnk. et Hffmnsgg. III. 207. no. 66.
— *spartea β. violacea* Slzm. III. 207. no. 63. *a*.
— spartioides Brouss. III. 196. no. 32.
— *speciosa* Jcq. fil. III. 208. no. 68.
— *speciosa* Tenore. III. 204. no. 54. γ.
— spicata Knze. VI. 637. no. 2.
— *spinescens* Spr. III. 195. no. 26.
— spuria Mill. III. 193. no. 18.
β. dentata Chavannes.
γ. microphylla Chavannes.
— striata DC. III. 210. no. 76.
γ. galioides III. 211. no. 76.
β. Monspessulana III. 210. no. 76.
δ. tristis III. 211. no. 76.
— *striata* Hornem. III. 210. no. 76.
— stricta Guss. III. 205. no. 57.
— supina Dsfont. III. 214. no. 87.
γ. glauca Boiss.
δ. glaucophylla Chav.
γ. maritima Duby.
ϑ. minima Boiss.
ε. Nevadensis Boiss.
ζ. oblongifolia Boiss.
} III. 215. no. 87.
β. Pyrenaica Duby. III. 214. no. 87.
— tenella DC. III. 188. no. 1.
— *tenuifolia aeruginei coloris* C. Bauh. III. 214. no. 85.
— tenuis Spr. III. 221. no. 114.
— *tenuis* Spr. III. 225. no. 15.
— *tenuius spanophylla Tithymali cyparissii folio, flore purpureo* Cup. III. 212. no. 79.
— *tertia Styriaca* Clus. III. 216. no. 89.
— *tetraphylla lutea minor* Col. Ecphr. III. 213. no. 83. β.
— *tetraphylla tenuifolia* Moris. III. 213. no. 83. β.
— *Thuillieri* Mérat. III. 214. no. 87.
— thymifolia DC. III. 200. no. 43.
— *trifolia* J. Bauh. III. 198. no. 37.
— triornithophora Willd. III. 197. no. 33.
— triphylla Mill. III. 198. no. 37.
β. major.
— *triphylla exigua, calcari praelongo* Schaw. III. 199. no. 38.
— *triphylla major, floribus parvis pallescentibus, rictu aureo, calcari subcoeruleo donatis* Pluken. III. 198. no. 37.
— *triphyllos coerulea* C. Bauh. III. 198. no. 37. β.
— tristis Mill. III. 213. no. 85.
β. tenuifolia Chnv. III. 214. no. 85.
Linaria tristis Hispanica Dill. III. 214. no. 85.
— *Valentina* Clus. III. 198. no. 37.
— venosa Lindl. III. 220. no. 109.
— versicolor Mnch. III. 206. no. 62.
— verticillata Boiss. III. 215. no. 88.
— villosa DC. III. 188. no. 2.
β. pusilla Boiss.
— *villosa* Mill. III. 198. no. 35.
— *villosa et viscosa lutea saxatilis* Tournef. III. 217. no. 94.
— virgata Dsf. III. 198. no. 38.
— *viscida* Mnch. III. 190. no. 6.
— viscosa Dum. III. 207. no. 64.
— vulgaris Mill. III. 203. no. 54.
β. glandulosa Mill. III. 203. no. 54.
γ. speciosa Mill. III. 204. no. 54.
δ. acutiloba Chavannes. III. 204. no. 54.
— *vulgaris etc.* Bessl. III. 203. no. 54.
— *vulgaris lutea, flore majore* C. Bauh. III. 203. no. 54.
— *vulgaris nostras* Park. III. 203. no. 54.
— Webbiana Vis. III. 195. no. 24.
Linariastrum Chavannes. III. 197. III. 451. VI. 637.
Linconia L. I. 545.
— alopecuroidea L. I. 545. no. 1.
— *capitata* Bnks. I. 545. no. 2.
— cuspidata Swrtz. I. 545. no. 2.
Lindackeria Prsl. I. 203. V. 55.
— laurina Prsl. *I. 203. no. 1. V. 55. no. 2.
— Maynensis Poepp. et Endl. V. 55. no. 1.
Lindenbergia Lnk. et Otto. III. 265. °III. 963. *VI. 642.
— grandiflora Bth. III. 265. no. 2.
— macrostachya Bth. III. 265. no. 3.
— polyantha Royle. III. 266. no. 5.
— Sinaica Bth. III. 265. no. 1.
— urticaefolia Lnk. et Otto. III. 266. no. 4.
β. major Bth.
Lindenia Bth. II. 506.
— acutiflora Bth. II. 506. no. 2.
— rivalis Bth. II. 506. no. 1.
Lindernia Linn. III. 297. °III. 966. *VI. 644.
— *alsinoides* R. Br. III. 297. no. 1.
— attenuata Mühlbrg. III. 298. no. 6.
— *dianthera* Swrtz. III. 279. no. 3.
— dilatata Mühlbrg. III. 298. no. 5.
— grandiflora Nutt. III. 298. no. 4.
— *Japonica* Thnbrg. III. 272. no. 2.
— *Kitaibelii* G. Don. III. 297. no. 1.
— Montevidensis Spr. III. 297. no. 2.
— monticola Nutt. III. 297. no. 3.
— pyxidaria Allioni. III. 297. no. 1.
— *pyxidaria* Prsh. III. 298. no. 5.
— *scapigera* R. Br. III. 297. no. 2.

Lindernia sesamoides N. ab E. III. 281. no. 24.
— *subulata* R. Br. III. 297. no. 3.
Lindernieae Bth. VI. 643.
Lindleya H. B. Kth. *II. 52. V. 659.
Lindleya N. ab E. V. 132. no. 1.
— mespiloides H. B. Kth. *V. 659. no. 1.
LINEAE DC. I. 287. II. 786. V. 87.
Lingua major Dalech. VI. 258. no. 6.
Linkia Peruviana Pers. III. 125. no. 1.
Linnaea Gronov. *II. 446.
Linochilus Bth. °VI. 312.
— floribundus Bth. VI. 312. no. 2.
— rosmarinifolius Bth. VI. 312. no. 1.
Linociera Swrtz. VI. 462.
— crassifolia Mart. VI. 462. no. 3.
— glomerata Pohl. VI. 462. no. 2.
— micrantha Mart. VI. 462. no. 1.
Linostigma Kltzsch. I. 461.
— petiolatum Kltzsch. *I. 461. no. 1.
Linosyris Lobel. II. 593. *II. 952. no. 14. II. 969.
— albicaulis Torr. et Gr. II. 970. no. 6.
— Drummondii Torr. et Gr. II. 969. no. 2.
— graveolens Torr. et Gr. *II. 969. no. 5.
β. speciosa.
— lanceolata Torr. et Gr. *II. 969. no. 4.
— Mexicana Schlchtd. II. 593. no. 2.
— pluriflora Torr. et Gr. II. 969. no. 3.
— scoparia Kar. et Kir. II. 593. no. 1.
— Texana Torr. et Gr. II. 969. no. 1.
— viscidiflora Hook. *II. 970. no. 7.
Linum L. I. 287. II. 786. V. 87.
— *Aethiopicum* Spr. I. 288. no. 17.
— *Africanum β. latifolium* Bartl. I. 288. no. 17.
— alpinum W. I. 289. †
— Anatolicum Boiss. II. 787. no. 4.
— annotinum C. Koch. I. 288. no. 11.
— *aquilinum* Molina. I. 289. no. 21.
— aretioides Boiss. II. 786. no 3.
— *arvense* Cup. I. 287. no. 6.
— *aureum* DC. II. 786. no. 1.
— Bartlingii Eckl. et Zeyh. I. 288. no. 17.
— Bavaricum F. W. Schultz. I. 287. no. 2.
— *Berendieri* Hook. I. 289. no. 20. *β*.
— brevifolium St. Hil. et Naud. II. 788. no. 12.
— Cariense Boiss. V. 87. no. 1.
— carneum St. Hil. II. 787. no. 8.
— Chamissonis Schiede. I. 289. no. 21.
— cicanobum Hamilt. I. 288. no. 12.
— corymbulosum Rchb. II. 786. no. 1.
— crepitans Dumort. I. 287. no. 1.
— Emirnense Bojer. V. 87. no. 2.
— erigeroides St. Hil. II. 787. no. 9.
— fastigiatum Tausch. I. 288. no. 8.
— flavum L. I. 289. †
Linum Guatemalense Bth. V. 88. no. 3.
— *hirsutum* Sieb. I. 287. no. 5.
— hypericifolium Prsl. I. 289. no. 19.
— junceum St. Hil. II. 788. no. 11.
— juniperifolium Eckl. et Zeyh. I. 288. no. 16.
— Leonii F. W. Schultz. I. 287. no. 3.
— leucanthum Boiss. II. 786. no. 2.
— littorale St. Hil. II. 787. no. 10.
— Mexicanum H. B. Kth. I. 289. †
— monogynum Forst. I. 289. †
— *montanum* Hollandre. I. 287. no. 3.
— Mülleri Moris. I. 287. no. 4.
— multicaule Hook. I. 289. no. 23.
— Mysorense Heyne. I. 288. no. 14.
— Olympicum Boiss. II. 787. no. 5.
— *oligophyllum* Herb. Willd. I. 289. no. 22. *α*.
— oligophyllum Willd. I. 289. no. 22.
β. eglandulosum.
α. glandulosum.
γ. squamifolium.
— Organense Gardn. V. 88. no. 5.
— pallescens Bnge. I. 288. no. 9.
— palustre Gardn. V. 88. no. 4.
— *perenne luteum polygonifolium* Feuill. I. 289. no. 21.
— piligerum Prsl. I. 287. no. 5.
— *quadrifolium* Thnbrg. I. 288. no. 18.
— repens Hamilt. I. 288. no. 13.
— rigidum Prsh. *I. 289. no. 20.
β. Berendieri Torr. et Gr.
— *Sardoum* Müll. I. 287. no. 4.
— Schiedeanum Schlchtd. II. 787. no. 6.
— Sibiricum L. I. 289. †
— Sibthorpianum Reuter. I. 287. no. 7.
— Siculum Prsl. I. 287. no. 6.
— *striatum* Nutt. I. 289. no. 20.
— tenellum Schlchtd. II. 787. no. 7.
— thesioides Bartl. I. 288. no. 15.
— Thunbergii Eckl. et Zeyh. I. 288. no. 18.
— *usitatissimum β*. Boenningh. I. 287. no. 1.
— violascens Bnge. I. 288. no. 10.
Linzia C. H. Schultz. °II. 948.
— vernonioides C. H. Schultz. II. 948. no. 1.
Liparia L. I. 580. II. 834.
— Burchellii Bth. II. 834. no. 3.
— comantha Eckl. et Zeyh. I. 580. no. 2.
— crassinervia Meisn. II. 834. no. 2.
— *laevigata* Thnbrg. II. 834. no. 1.
— parva Vogel. I. 580. no. 3. *II. 834. no. 1.
— sphaerica L. *I. 580. no. 1.
— *tomentosa* Thnbrg. I. 581. no. 2.
— *villosa* Sieb. II. 834. no. 1.
Lipochaeta DC. II. 619. II. 987.
— Amazonica Poepp. et Endl. II. 620. no. 3.
— *cavarum* DC. II. 620. no. 3.
— *connata* DC. II. 620. no. 8.

Lipochaeta hastulata DC. II. 620. no. 1.
— macrocephala Hook. et Arn. II. 620. no. 2.
— scaberrima Bth. II. 619. no. 1.
— *succulenta* DC. II. 620. no. 4.
— Texana Torr. et Gr. II. 987. no. 1.
Lipostoma D. Don. II. 503.
— capitata D. Don. II. 503. no. 1.
— sericea D. Don. II. 503. no. 2.
Lipotactes Blume. II. 439.
Lipotriche R. Br. *II. 609. °VI. 157.
— Brownei DC. *VI. 157. no. 1.
Lipozygis E. Mey. I. 621. *V. 460.
Lipozygis E Mey. V. 457.
— *argentea* Meisn. II. 837. no. 2. V. 459. no. 60.
— brachyloba E. Mey. I. 622. no. 1.
— *brachyloba* E. Mey. V. 458. no. 37.
— calycina E. Mey. I. 622. no. 5.
— *calycina* E. Mey. V. 459. no. 46.
— carinata E. Mey. I. 622. no. 14.
— *carinata* E. Mey. V. 458. no. 39.
— corymbosa E. Mey. I. 622. no. 10.
— *corymbosa* E. Mey. V. 457. no. 31.
— erubescens E. Mey. I. 621. no. 1.
α. macrophylla.
β. microphylla.
— *erubescens* E. Mey. V. 458. no. 42.
— falcata E. Mey. I. 622. no. 8.
— *falcata* E. Mey. V. 458. no. 38.
— humifusa E. Mey. I. 621. no. 3.
— *humifusa* E. Mey. V. 458. no. 40.
— *involucrata* E. Mey. I. 621. no. 9. V. 456. no. 18.
— *Kraussiana* Meisn. II. 837. no. 1. V. 459. no. 44.
— mollis E. Mey. I. 622. no. 9.
— *mollis* E. Mey. V. 458. no. 41.
— peduncularis E. Mey. I. 622. no. 13.
— *peduncularis* E. Mey. V. 456. no. 19.
— pentaphylla E. Mey. I. 622. no. 12.
— *pentaphylla* E. Mey. V. 457. no. 28.
— polycephala E. Mey. I. 622. no. 11.
— *polycephala* E. Mey. V. 457. no. 29.
— quinata E. Mey. I. 621. no. 2.
— *quinata* E. Mey. V. 458. no. 36.
— radula E. Mey. I. 622. no. 4.
— *radula* E. Mey. V. 458. no. 43.
— tenella E. Mey. I. 622. no. 7.
β. piloso-villosa.
α. sericea.
— *tenella* var. γ. E. Mey. V. 459. no. 45.
— *umbellata* E. Mey. I. 621. no. 5. V. 456. no. 17.
Lippia Linn. IV. 42. VI. 688.
— Adoënsis Hochstett. IV. 55. no. 55.
— Americana Linn. IV. 43. no. 3.
— angustifolia Cham. IV. 44. no. 7.
Lippia asperifolia Poepp. IV. 44. no. 10.
— *asperifolia* Rchb. IV. 50. no. 31.
— asperifolia Rich. IV. 47. no. 20.
— asperrima Cham. IV. 45. no. 12.
— *attenuata* Martius. IV. 42. no. 8.
— Berterii Spr. IV. 50. no. 34.
— betulaefolia H. B. Kth. IV. 47. no. 23.
— bicolor Kth. et Bouché. VI. 688. no. 4.
— *callicarpaefolia* H. B. Kth. IV. 55. no. 52.
— calocephala Zuccarini. VI. 688. no. 3.
— canescens H. B. Kth. IV. 48. no. 26.
— Capensis Spr. IV. 43. no. 6.
— *chamaedryfolia* Steudel. IV. 41. no. 3.
— Chamissonis D. Dietr. IV. 50. no. 35.
— citrata Willd. IV. 44. no. 10.
— *citriodora* H. B. Kth. IV. 41. no. 1.
— corymbosa Cham. IV. 45. no. 15.
— cuneifolia Steud. *IV. 57.
— cylindrica Scheele. VI. 689. no. 6.
— cymosa Swrtz. IV. 56. no. 58.
— dulcis Trevir. IV. 49. no. 31.
— elegans Cham. IV. 51. no. 37.
— ferruginea H. B. Kth. IV. 48. no. 24.
— filiformis Schrader. IV. 50. no. 32.
— floribunda H. B. Kth. IV. 54. no. 49.
— florida Cham. IV. 46. no. 19.
—? geminata H. B. Kth. IV. 53. no. 48.
— glabrescens Meisn. IV. 56. no. 57.
— grandifolia Hochstett. IV. 55. no. 54.
— graveolens H. B. Kth. IV. 53. no. 46.
— hemisphaerica Jcq. IV. 43. no. 5.
— hermannioides Cham. IV. 46. no. 16.
— hieraciifolia Cham. IV. 55. no. 53.
— hirsuta Mutis. IV. 54. no. 50.
— hirta Meisn. IV. 56. no. 56.
— hyptoides Bth. VI. 688. no. 5.
— intermedia Cham. IV. 44. no. 8.
— Javanica Spr. IV. 50. no. 33.
— lanata Wlprs. IV. 43. no. 2.
— lanceolata Michx. IV. 48. no. 28.
— lasiocalycina Cham. IV. 52. no. 43.
— linearis H. B. Kth. IV. 48. no. 25.
— lupulina Cham. IV. 46. no. 18.
— *lycioides* Steudel. IV. 42. no. 5.
— macrophylla Cham. IV. 44. no. 9.
— microcephala Cham. IV. 46. no. 17.
— microphylla Cham. IV. 51. no. 38.
— *Montevidensis* Spr. IV. 65. no. 28.
— myriocephala Schlchtd. et Cham. IV. 52. no. 44.
— reptans H. B. Kth. IV. 48. no. 29.
— nodiflora Rich. IV. 49. no. 30.
β. arenaria.
γ. debilis.
δ. umbrosa.
α. vulgaris.

Lippia origanoides H. B. Kth. IV. 53. no. 45.
— *ovata* Linn. IV. 169. no. 2.
— pallescens Bth. VI. 688. no. 2.
— *polygalaefolia* Steud. IV. 41. no. 4.
— pumila Cham. IV. 45. no. 14.
— purpurea Jcq. IV. 43. no. 4.
— Queretarensis H. B. Kth. IV. 47. no. 22.
— *repens* Spr. IV. 49. no. 30.
— rotundifolia Cham. IV. 52. no. 42.
— salviaefolia Cham. IV. 51. no. 39.
— *sarmentosa* Spr. IV. 48. no. 26.
— scabra Hochstett. IV. 134. no. 59.
— sphacelifolia Bth. VI. 689. no. 7.
— Schimperi Hochstett. IV. 53. no. 47.
— *scorodonioides* H. B. Kth. IV. 41. no. 2.
— sericea Cham. IV. 52. no. 41.
— sidoides Cham. IV. 50. no. 36.
— stachyoides Cham. IV. 51. no. 40.
— stoechadifolia H. B. Kth. IV. 47. no. 21.
— strigulosa Martens et Galeotti. VI. 688. no. 1.
— triplinervis Gardn. IV. 45. no. 11.
— turnerifolia Cham. IV. 45. no. 13.
— umbellata Cavan. IV. 54. no. 52.
— uncinuligera N. ab E. IV. 48. no. 27
— *urticoides* Steudel. IV. 42. no. 6.
— valerianoides Wlprs. IV. 42. no. 1.
— vernonioides Cham. IV. 54. no. 51.
Lippieae Endl. IV. 3. VI. 686.
Liriodendron L. * I. 72.
— *grandiflorum* Rxb. I. 69. no. 5.
Liriosma Poepp. et Endl. II. 804. V. 138.
— candida Poepp. et Endl. *II. 804. no. 1. V. 138. no. 1.
— Gardneriana Wlprs. V. 139. no. 3.
— pauciflora Wlprs. V. 139. no. 2.
Lisaea Boiss. ° V. 902.
— grandiflora Boiss. V. 902. no. 1.
— papyracea Boiss. V. 903. no. 3.
— Syriaca Boiss. V. 902. no. 2.
Lisiantheae Griseb. VI. 503.
Lisianthus Aublet. VI. 503.
— amoenus Miquel. VI. 503. no. 3.
— auriculatus Bth. VI. 503. no. 2.
— *chelonioides* Sieb. VI. 465. no. 5.
— crassicaulis Martens et Galeotti. VI. 503. no. 1.
— densiflorus Bth. VI. 503. no. 5.
— macranthus Bth. VI. 503. no. 4.
— *ophiorhiza* Vellozo. VI. 632. no. 1.
— *Russellianus* Hook. VI. 500. no. 2.
— splendens Hook. * VI. 743.
Lissanthe R. Br. II. 731.
— stellata Knwls. et Westsc. II. 731. no. 1.
— verticillata Lindl. II. 731. no. 3.
— *verticillata* Lindl. VI. 426. no. 3.
Listia E. Mey. I. 624.
— heterophylla E. Mey. * I. 624. no. 1.
Litchi Chinensis Sonnerat. V. 361. no. 2.
Lithobium Bongrd. II. 121. V. 684.
— cordatum Bongrd. * II. 121. no. 1. V. 684. no. 1.
Lithophila Swrtz. * I. 262.
Lithophragma Nutt. (ex p.) II. 371.
— *cymbalaria* Torr. et Gr. II. 372. no. 6.
— *glabra* Nutt. II. 371. no. 3.
— *heterophylla* Hook. et Arn. II. 371. no. 5.
— *micrantha* Nutt. II. 371. no. 2.
— *nudicaulis* Nutt. II. 371. no. 2.
— *parviflora* Nutt. II. 371. no. 2.
— *parvifolia* Hook. et Arn. II. 371. no. 2.
— *tenella* Nutt. II. 371. no. 4.
Lithophragmella Torr. et Gr. II. 372.
Lithosanthus Blume. * II. 488.
Lithosciadium Turczan. ° V. 864.
— multicaule Turczan. * V. 865. no. 1.
— *multicaule* Turczan. V. 866. no. 2.
Lithospermeae A. P. DC. VI. 559.
Lithospermum Tournef. VI. 560.
— cyanochroum Boiss. VI. 560. no. 1.
— obtusum Visiani. VI. 560. no. 2.
Lithraea Miers. I. 551.
— *caustica* Hook. et Arn. I. 551. no. 1.
— laurina Wlprs. I. 551. no. 2.
— venenosa Miers. I. 551. no. 1.
Littorella Linn. IV. 177.
— lacustris Linn. IV. 177. no. 1.
β. pubescens Zuccar. IV. 178. no. 1.
Littorelleae N. ab E. IV. 177.
Llagunoa Rz. et Pav. I. 421.
— glandulosa Wlprs. I. 421. no. 1.
Llaupanke amplissimo Sonchi folio Feuill. II. 264. no. 2.
Llithi Endl. I. 551.
Loasa Adans. II. 225. V. 779.
Loasa DC. (ex p.) II. 227. V. 781.
acanthifolia Lindl. II. 225. no. 1
— alba D. Don. II. 226. no. 13.
— ambrosiaefolia Juss. II. 227. †
— atriplicifolia Prsl. II. 227. no. 18.
— calycina Bth. V. 779. no. 2.
— chelidoniifolia Bth. V. 779. no. 3.
— Chuquitensis Meyen. V. 780. no. 7.
— cirsiifolia Knze. V. 780. no. 6.
— *contorta* Lam. II. 227. no. 1. V. 781. no. 2.
— *coronata* Gill. II. 227. no. 1.
— dissecta Hook. et Arn. II. 226. no. 8.
— elongata Hook. et Arn. II. 226. no. 6.
— filicifolia Poepp. II. 226. no. 9.
— floribunda Hook. et Arn. II. 226. no. 7.
— *helicteroides* Meyen. V. 781. no. 4.
— heterophylla Hook. et Arn. II. 225. no. 4.

Loasa hispida L. II. 227. †
— incana Grah. II. 226. no. 16.
— insons Poepp. II. 226. no. 12.
β. prostrata.
— *insons* Poepp. V. 779. no. 4.
— lateritia Hook. II. 227. no. 17.
— *lateritia* Hook. V. 781. no. 1.
— Meyeniana Wlprs. V. 779. no. 4.
— micrantha Poepp. II. 226. no. 11.
— nitida Lam. *II. 225. no. 2. (c. var. *β.* ibid.)
— palmata Spr. II. 227. †
— *pedicularifolia* Meyen. V. 779. no. 1.
— peduncularis Prsl. II. 225. no. 3.
— Pentlandii Paxton. V. 780. no. 5.
— *pilosa* Meyen. V. 781. no. 3.
— Placei Lindl. II. 225. no. 1.
— rhoeadifolia Schlchtd. II. 226. no. 15.
— rudis Bth. V. 781. no. 9.
— rupestris Gardn. V. 780. no. 8.
— sagittata Hook. et Arn. II. 226. no. 5.
— *scandens* Meyen. V. 781. no. 4.
— stenocarpa Poepp. II. 226. no. 10.
— *striata* Meyen. V. 779. no. 1.
— *tricolor* Lindl. II. 225. no. 2.
— tricolor Weinm. II. 226. no. 14.
— volubilis Juss. * V. 779. no. 1.
LOASEAE Juss. II. 223. V. 776.
Lobadium DC. I. 554. no. 36.
Lobelia DC. (ex p.) II. 709.
Lobelia Linn. II. 706. VI. 375.
— amplexicaulis Vriese. VI. 376. no. 12.
— Andina Bth. VI. 377. no. 19.
— *angulata* Forst. VI. 373. no. 7.
— ascendens Vriese. VI. 375. no. 4.
— calcarata Bertoloni. II. 707. no. 3.
— Cavanillesii Roem. et Schult. II. 708. †
— *Cheiranthus* Linn. III. 319. no. 23.
— ciliata Vriese. IV. 376. no. 10.
— *concolor* R. Br. VI. 372. no. 2.
— concolor Mart. et Galeotti. II. 707. no. 12.
— *discolor* Kltzsch. II. 706. no. 1.
— elegans Vriese. VI. 376. no. 8.
— erecta Vriese. VI. 376. no. 5.
— erinoides Linn. II. 708. †
— Erinus Linn. var. grandiflora Paxton. VI. 377. †
— fulgens Willd. *II. 707. no. 10.
β. glabriuscula Willd. II. 707. no. 10.
γ. propinqua Paxt. VI. 377. †
— Gaudichaudii DC. VI. 377. †
— glandulosa Wall. VI. 377. †
— heterophylla Labill. VI. 377. †
β. major Paxton. VI. 377. †
— ignea Hort. VI. 377. †
— *inundata* Cunningh. VI. 372. no. 2.
Lobelia Lehmanni Vriese. VI. 375. no. 2.
— *littoralis* R. Cunningh. VI. 373. no. 7.
— longepedunculata Vriese. VI. 375. no. 3.
β. gracilior.
— longiscapa Vriese. VI. 377. no. 14.
— macrocarpa Vriese. VI. 376. no. 9.
β. genistoides.
— macrostachys Hook. et Arn. VI. 377. †
— minutiflora Knze. II. 706. no. 2.
— monanthos Vriese. VI. 377. no. 15.
— multiflora Knwls. et Westsc. II. 707. no. 9.
— *odorata β.* Grah. VI. 373. no. 6.
— ophiocephala Vriese. VI. 376. no. 13.
— Organensis Gardn. VI. 375. no. 1.
— Orizabae Mart. et Galeotti. II. 707. no. 8.
— parviflora Mart. et Galeotti. II. 707. no. 5.
— *princeps* Otto et Dietr. II. 707. no. 10. *β.*
— *punicea* Hort. Berol. VI. 378. no. 1.
— *punicea* Otto et Dietr. II. 707. no. 11.
— ramosa Bth. II. 708. †
— ramosissima Mart. et Galeotti. II. 707. no. 6.
— rhombifolia Vriese. VI. 376. no. 11.
— saxicola Vriese. VI. 377. no. 16.
— Senegalensis DC. VI. 733. †
— *splendens* Willd. II. 707. no. 10. *β.*
— splendens *β.* atrosanguinea Hook. II. 708. †
— stricta Mart. et Galeotti. II. 707. no. 7.
— stricta Vriese. VI. 376. no. 7.
— subnuda Bth. II. 706. no. 1.
— subulata Bth. VI. 377. no. 18.
— Texensis Raf. *II. 707. no. 11.
— thyrsoidea Schott. VI. 377. †
— trigona Rxb. II. 708. †
— uncinata Vriese. VI. 376. no. 6.
— velutina Martens et Galeotti. II. 707. no. 4.
— *verticillata* Knze. III. 268. no. 17.
— virescens Bth. VI. 377. no. 17.
LOBELIACEAE Juss. II. 706. VI. 372.
Lobelieae Prsl. II. 706. VI. 375.
Lobocarpus Wght. et Arn. I. 91.
— Candolleanus Wght. et Arn. *I. 91. no. 1.
Lobostemon Lehm. * VI. 557.
Lobularia Lybica Webb et Berthel. I. 142. no. 4.
Locustae DC. II. 527.
Loddigesia Sims. *I. 606.
Loefflingia L. I. 263.
— *Indica* Bz. I. 263. no. 2.
— *ramosissima* Weinm. I. 261. no. 1.
— squarrosa Nutt. I. 263. no. 1. (III. Emend. p. 2.)
— *Texana* Hook. I. 263. no. 1.

Loefflingiaceae Fnzl. I. 263.
Loeselia Linn. VI. 526.
— coccinea G. Don. * VI. 527. no. 6.
— pumila Martens et Galeotti. VI. 527. no. 4.
— ramosissima Martens et Galeotti. VI. 526. no. 1.
— rupestris Bth. * VI. 527. no. 5.
— scabra Martens et Galeotti. VI. 527. no. 2.
— scariosa Martens et Galeotti VI. 527. no. 3.
Logania R. Br. VI. 498.
— bracteolata N. ab E. VI. 498. no. 1.
— hispidula N. ab E. VI. 498. no. 2.
— hyssopoides N. ab E. VI. 498. no. 3.
LOGANIACEAE Endl. VI. 496.
Loganieae Endl. VI. 498.
Logfia Cassini. ° VI. 248.
— Gallica Cosson et Germain. VI. 248. no. 1.
— *subulata* Cassini. VI. 248. no. 1.
Logondium vulgare Rmph. IV. 83. no. 5.
Loiseleuria Dsvx. * II. 729.
Lomatocarpum cf. Lomatocarum.
Lomatocarum Fisch. et Mey. II. 393. V. 852.
— alpinum Fisch. et Mey. * II. 393. no. 1. V. 852. no. 1.
Lomatolepis Cass. * II. 695. * VI. 359.
Lonas Adans. * II. 638.
Lonchocarpus H. B. Kth. I. 678. * I. 799. V. 543.
— ......? Schlchtd. I. 679. no. 7.
—? densiflorus Bth. I. 679. no. 4.
—? floribundus Bth. I. 679. no. 2.
— hedyosmus Miquel. V. 543. no. 2.
—? laxiflorus Guill. et Perr. I. 678. no. 1.
— *maculatus* DC. I. 679. no. 2.
— *pterocarpus* DC. I. 802. no. 1.
—? rufescens Bth. I. 679. no. 3.
— *sepium* DC. I. 679. no. 1.
— tomentosus Tulasne. V. 543. no. 1.
Lonchostoma Wickstr. III. 126. ° III. 957.
— acutiflorum Wickstr. III. 126. no. 2.
— obtusiflorum Wickstr. III. 126. no. 1.
Longiflorae (Salvia) Bth. III. 651.
Longirostres (Crotalaria) Bth. V. 446.
Lonicera Dsf. II. 447. VI. 4.
— affinis Hook. et Arn. II. 449. no. 15.
— affinis Jcquem. II. 449. no. 18.
— albiflora Torr. et Gr. II. 447. no. 1.
— arborea Boiss. II. 448. no. 12.
— Aucheri Jaub. et Spach. VI. 6. no. 6.
— bracteata Royle. II. 449. no. 17.
— Bungeana Ldb. VI. 6. no. 5.
— Californica Torr. et Gr. II. 448. no. 5.
— Caucasica Pall. VI. 5. no. 4.
— Chinensis Wall. II. 450. †
— *ciliosa* Hook. et Arn. II. 448. no. 5.
Lonicera coerulea Linn. * II. 450. no. 23. β. villosa.
— *dioica* Linn. II. 447. no. 4.
— *Douglasii* DC. II. 448. no. 4.
— flava Sims. * II. 447. no. 2. (c. var. β. ibid.)
— *Goldii* Spr. II. 447. no. 3.
— heterophylla Dcne. II. 449. no. 21.
— hirsuta Eaton. * II. 447. no. 3. II. 450. †
— hispida Pall. II. 450. †
— hispidula Dougl. II. 448. no. 6.
— humilis Kar. et Kir. II. 449. no. 14.
— hypoleuca Dcne. II. 449. no. 22. VI. 7. no. 7.
— Lechenaultii Wall. II. 449. no. 16. (c. varr. α. et β. ibid)
— *media* Murr. II. 447. no. 4.
— *microphylla* Bnge. VI. 6. no. 5.
— *microphylla* Hook. II. 448. no. 6.
— microphylla Willd. II. 450. †
— *microphylla β. gracilior* Ldb. VI. 6. no. 5.
— *microphylla β. robustior* Ldb. II. 449. no. 13.
— nummulariaefolia Jaub. et Spach. VI. 4. no. 2.
— oblongifolia Hook. II. 450. no. 24.
— occidentalis Hook. II. 448. no. 10.
— *orientalis* M. Bieb. VI. 6. no. 4.
— orientalis Lam. VI. 5. no. 3.
— oxyphylla Edgwrth. VI. 697. no. 1.
— parviflora Lam. * II. 447. no. 4.
— *parviflora β.* Hook. II. 448. no. 4.
— *parviflora β.* Lam. II. 447. no. 4.
— parvifolia Edgwrth. VI. 697. no. 2.
— *Periclymenum* Lour. II. 448. no. 9.
— Persica Jaub. et Spach. VI. 4. no. 1.
— *pubescens* Sweet. II. 447. no. 3.
— purpurascens Dcne? II. 449. no. 20.
— Sieversiana Bnge. II. 448. no. 13.
— spinosa Jcquem. II. 449. no. 19.
— splendida Boiss. II. 448. no. 8.
—? subspicata Hook. et Arn. II. 448. no. 7.
— Telfairii Hook. et Arn. II. 448. no. 9.
— tubulosa Bth. II. 448. no. 11.
— *velutina* DC. II. 450. no. 23.
— *villosa* DC. II. 450. no. 23. et 24.
— *villosa* Mühlbrg. II. 447. no. 3.
— xylosteoides Tausch. II. 450. no. 25.
— *Zeylanica* Gaertn. II. 441. no. 12.
LONICEREAE Endl. II. 446. VI. 3.
Lonicereae verae R. Br. II. 446.
Lopezia Cav. II. 96. V. 670.
— haematodes Knze. V. 670. no. 1.
— lineata Zucc. II. 96. no. 1.
— macrophylla Bth. II. 96. no. 3.
— trichota Schlchtd. II. 96. no. 2.

Lopezieae Spach. II. 95. V. 669.
Lophanthera Adr. Juss. °V. 179.
— Kunthiana Adr. Juss. V. 179. no. 1.
Lophanthus Bth. III. 773. °III. 986.
— anisatus Bth. III. 773. no. 3.
— Chinensis Bth. III. 774. no. 6.
— *multifidus* Bth. III. 775. no. 3.
— nepetoides Bth. III. 774. no. 5.
— rugosus Fisch. et Mey. III. 773. no. 2.
— scrophulariaefolius Bth. III. 773. no. 4.
— urticaefolius Bth. III. 773. no. 1.
Lophiolepis DC. II. 674. no. 3. II. 992. no. 1.
Lophira Bnks. V. 128.
— *Africana* Loudon. V. 129. no. 1.
— alata Bnks. V. 128. no. 1.
— simplex G. Don. V. 129. no. 2.
Lophiraceae Endl. V. 128.
Lophocachrys echinophora Bertol. V. 915. no. 3.
Lophochaena Torr. et Gr. VI. 160.
Lophoclinium Endl. II. 552. II. 950. °VI. 108.
— album Endl. *II. 552. no. 3. II. 950. no. 3. VI. 109. no. 3.
— citrinum Endl. *II. 552. no. 2. II. 950. no. 1. VI. 108. no. 1.
— Manglesii Endl. *II. 552. no. 1. II. 950. no. 2. VI. 108. no. 2.
Lophodon Bnge. III. 421.
Lopholaena DC. *II. 653.
Lophopetalum Wght. I. 530.
— fimbriatum Wght. I. 530. no. 3.
— floribundum Wght. I. 530. no. 4.
— grandiflorum Wght. *I. 530. no. 2.
— Wightianum Arn. I. 530. no. 1.
Lophopterys Adr. Juss. °V. 200.
— splendens Adr. Juss. V. 200. no. 1.
Lophosciadium DC. *II. 419. V. 898.
— Barrelieri Griseb. V. 898. no. 1.
— meïfolium DC. V. 898. no. 4.
— Olympicum C. Koch. V. 898. no. 2.
— silaifolium Boiss. V. 898. no. 3.
Lophospermum D. Don. III. 230. °III. 959. *VI. 638.
Lophospermum G. Don. III. 231. (ex p.)
— *atrosanguineum* Zucc. III. 231. no. 1.
— erubescens D. Don. III. 230. no. 2.
var. spectabile Paxton. III. 935.
—? physaloides D. Don. III. 230. no. 3.
— *physaloides* D. Don. III. 452. no. 1.
— *Rhodochiton* D. Don. III. 231. no. 1.
— scandens D. Don. III. 230. no. 1.
— *scandens* Hook. III. 230. no. 2.
Lophostemon Schott. II. 161. *II. 927. *V. 744.
— arborescens Schott. *II. 161. no. 1.
— depressum Schott. *II. 161. no. 2.
Lophostylis Hochstett. V. 67.
— angustifolia Hochstett. V. 67. no. 1.
— gracilis Hortor. V. 67. †
— oblongifolia Hochstett. V. 67. no. 2.
Lophotaenia Griseb. °V. 886.
— aurea Griseb. V. 886. no. 1.
Lophotropis Jaub. et Spach. II. 885.
Lopimia Nees et Mart. I. 300.
— *malacophylla* Nees et Mart. I. 301. no. 38.
LORANTHACEAE Lindl. II. 436. II. 940. V. 935.
Loranthi euloranthi, clandestini DC. II. 443.
— *oscillantheri* DC. II. 444.
— *symphanthi* DC. II. 443.
— *symphanti involucrati* DC. II. 445.
Loranthus Linn. II. 439. II. 940. V. 937.
Loranthus Mart. II. 439.
— Acaciae Zucc. II. 443. no. 31.
— albiflorus Hook. V. 940. no. 20.
— *Americanus* Vellozo. II. 443. no. 34. II. 840. no. 2.
— Arnottianus Krthls. II. 443. no. 35.
— *atropurpureus β.* Blume. II. 442. no. 20.
— Bahajensis Korthls. II. 445. no. 52.
— Berteroi Hook. et Arn. II. 445. no. 49.
— *bicolor* Rxb. II. 441. no. 12. *α.*
— *bracteatus* Heyne. II. 441. no. 13.
— buddajoides Desr. II. 440. no. 9. (c. varr. β. γ. δ. ε.)
— Burchellii Eckl. et Zeyh. *II. 442. no. 29.
— *calyculatus* Hook. et Arn. V. 939. no. 13.
— Candolleanus Wght. et Arn. II. 441. no. 14.
— capitellatus Wght. et Arn. II. 445. no. 57.
— Casuarinae Miquel. V. 938. no. 6.
— catocarpus Bth. V. 939. no. 19.
— chrysanthoides Korthls. II. 442. no. 22.
— coccineus W. Jack. II. 441. no. 17.
— Colensoi Hook. fil. V. 938. no. 5.
— constrictus Krthls. II. 442. no. 27.
— *coriaceus* Desr. II. 445. no. 56.
— cuneatus Heyne. *II. 441. no. 16.
— *cuneifolius* Reinw. II. 442. no. 20.
— densiflorus Bth. II. 444. no. 42.
— Deppeanus Cham. et Schlchtd. II. 444. no. 44.
— diversifolius Bth. II. 444. no. 43.
— Drégei Eckl. et Zeyh. II. 442. no. 30.
— ellipticus Korthls. II. 442. no. 24.
— *falcatus* Linn. II. 441. no. 12. *γ.*
— ferrugineus W. Jack. II. 441. no. 18.
— flexistylus Miquel. V. 939. no. 18.
— *floribundus* Labill. II. 446. no. 1. V. 940. no. 1.
— fulvus Korthls. II. 442. no. 25.
— fuscatus Korthls. II. 442. no. 26.

Loranthus glaucus β. Burchellii DC. II. 442. no. 29.
— goodeniiflorus DC. *II. 441. no. 15.
— Grahami Bth. II. 444. no. 40.
— Hartwegi Bth. II. 444. no. 41.
— *Heyneanus* Schult. II. 441. no. 13.
— *Heynei* DC. II. 440. no. 9. δ.
— *Heyneanus* Wall. II. 440. no. 9. δ.
— Hookerianus Wght. et Arn. II. 439. no. 1.
— immersus Bth. V. 937. no. 4.
— inconspicuus Bth. V. 937. no. 3.
— Jackianus Korthls. II. 443. no. 36.
— Kalahiensis Korthls. II. 442. no. 23.
— *Koenigianus* Agrdh. II. 441. no. 12. α.
— Kraussianus Meisn. II. 940. no. 1.
— lageniflorus Wght. II. 445. no. 54.
— lanosus Krthls. II. 442. no. 28.
— *lepidotus* Schult. II. 441. no. 19.
— linophyllus Fnzl. II. 443. no. 32.
— *lobeliiflorus* DC. II. 441. no. 16.
— *longiflorus* DC. II. 441. no. 12. α.
— longiflorus Desr. *II. 441. no. 12. (c. varr. α. β. et γ. ibid.)
— loniceroides Linn. *II. 445. no. 56.
— *loniceroides* Wall. II. 446. no. 57.
— macranthus Hook. V. 939. no. 17.
— macrophyllus Korthls. II. 444. no. 38.
— macrophyllus Zenk. II. 445. no. 55.
— macrostachys Korthls. II. 440. no. 4.
— Maklottianus Korthls. II. 440. no. 5.
— Melaleucae Lehm. V. 938. no. 10.
— *melanostemon* Reinw. II. 441. no. 19.
— Melintangensis Korthls. II. 444. no. 39.
— memecylifolius Wght. et Arn. II. 441. no. 10.
— Miquelii Lehm. V. 938. no. 9.
— miraculosus Miquel. V. 938. no. 11.
— *montanus* Wght. II. 441. no. 14. et 16.
— mutabilis Poepp. et Endl. II. 444. no. 46.
— Neelgherrensis Wght. et Arn. II. 440. no. 8.
— obovatus Bth. V. 939. no. 14.
— obtusatus Wall. II. 439. no. 3.
— *pentandrus* L. II. 441. no. 19.
— Poeppigii DC. *II. 445. no. 47.
— *polystachyus* Wall. II. 439. no. 2.
— Preissii Miquel. V. 938. no. 7.
— pseudo-globosus Korthls. II. 443. no. 37.
— pycnanthus Bth. V. 939. no. 15.
— *pyrifolius* Wall. II. 440. no. 9. β.
— Quadang Lindl. II. 940. no. 3.
— quercicola Cham. et Schlchtd. II. 444. no. 45.
— quinquenervis Hochstett. V. 938. no. 12.
— repandus Blume. II. 442. no. 21.
— rhynchanthus Bth. V. 939. no. 13.
Loranthus rufieaulis Poepp. et Endl. II. 445. no. 48.
— Sakoëmbragensis Korthls. II. 445. no. 53.
— sarcophyllus Wall. II. 441. no. 11.
— Schiedeanus Cham. et Schlchtd. II. 443. no. 33.
— Schultesii Blume. II. 441. no. 19.
— scoparius Miquel. V. 938. no. 8.
— *Scurrula* Rxb. II. 440. no. 9. α.
— *Scurrula* Wall. II. 440. no. 9. δ. II. 441. no. 9. ε.
— secundus Bth. V. 939. no. 16.
— setigerus Korthls. II. 440. no. 6.
— Smythii Schmbrgk. II. 446. no. 59.
— sphenoideus Blume. II. 442. no. 20.
— Surinamensis Miquel. V. 937. no. 2.
— terrestris Heyne. II. 439. no. 2.
— *tetrandrus* Heyne. II. 439. no. 2.
— tomentosus Heyne. *II. 441. no. 13.
— *tomentosus* Madr. Herb. II. 440. no. 9. γ.
— trianthus Korthls. II. 440. no. 7.
— trigonus Wght. et Arn. II. 446. no. 58.
— *umbellatus* Heyne. II. 445. no. 56.
— Uraguensis Hook. et Arn. II. 445. no. 50.
— Vellozianus Mart. II. 443. no. 34. II. 940. no. 2.
— *Venetus* Bert. II. 445. no. 49.
— vestitus Miquel. V. 937. no. 1.
— *visciflorus* Wght. II. 441. no. 15.
— vulgaris Vell. II. 445. no. 51.
— Wallichianus Schult. *II. 439. no. 2.
— *Wightianus* Wall. II. 441. no. 12. β.
Lorentea Less. *II. 545. VI. 104.
— affinis Gardner. VI. 104. no. 2.
— congesta Gardn. VI. 105. no. 6.
— decumbens Gardn. VI. 105. no. 5.
— oligocephala Gardner. VI. 104. no. 1.
— polycephala Gardn. VI. 105. no. 4.
— ramosissima Gardn. VI. 104. no. 3.
Loreya DC. *II. 145. V. 716.
— mespiloides Miquel. V. 716. no. 1.
Loteae DC. I. 576. II. 832. V. 433.
Lotoides Jaub. et Spach. II. 837. II. 842. II. 843.
Lotoides Prsl. II. 853.
Lotononis DC. V. 455.
Lotononis Eckl. et Zeyh. I. 619.
— affinis Eckl. et Zeyh. *I. 620. no. 11. *V. 459. no. 57.
— acuminata Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 1. *V. 456. no. 13.
— acutiflora Bth. *V. 457. no. 25.
— *angustifolia* Steud. V. 457. no. 20.
— argentea Bth. *V. 459. no. 60.
— argentea Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 4. *V. 456. no. 14.
— argyrolobioides Bth. V. 459. no. 54.

Lotononis azurea Bth. * V. 456. no. 10.
— brachyloba Bth. V. 458. no. 37.
— bracteata Bth. V. 456. no. 9.
— Burchellii Bth. V. 459. no. 51.
— calycina Bth. * V. 459. no. 46.
— capnitis Bth. * V. 459. no. 59.
— carinata Bth. * V. 458. no. 39.
— carnosa Bth. * V. 455. no. 6.
— clandestina Bth. * V. 458. no. 34.
— corymbosa Bth. * V. 457. no. 31.
— crumanina Bth. V. 459. no. 50.
— cytisoides Bth. V. 455. no. 4.
— debilis Bth. * V. 457. no. 24.
— decidua Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 13. V. 459. no. 58.
— depressa Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 10.
— diffusa Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 6.
— *diffusa* Eckl. et Zeyh. V. 444. no. 124.
— divaricata Bth. * V. 455. no. 7.
— diversifolia Bth. * V. 459. no. 48.
— eriantha Bth. V. 457. no. 30.
— *excisa* Steud. V. 456. no. 11. β.
— falcata Bth. * V. 458. no. 38.
— genistoides Bth. * V. 459. no. 53.
— genuflexa Bth. * V. 455. no. 5.
— gracilis Bth. V. 455. no. 1.
— heterophylla Eckl. et Zeyh. * I. 619. no. 5.
— humifusa Burch. V. 458. no. 40.
— involucrata Bth. * V. 456. no. 18.
— lanceolata Bth. V. 457. no. 32.
— laxa Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 9. * V. 459. no. 55.
— lenticula Bth. * V. 459. no. 47.
— Leobordea Bth. * V. 458. no. 35.
— macrocarpa Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 3. * V. 456. no. 15.
— micrantha Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 12. * V. 459. no. 49.
— mollis Bth. * V. 458. no. 41.
— oxyptera Bth. * V. 457. no. 26.
— pallens Bth. * V. 457. no. 27.
— peduncularis Bth. * V. 456. no. 19.
— pentaphylla Bth. * V. 457. no. 28.
— perplexa Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 7. * V. 457. no. 22.
— polycephala Bth. * V. 457. no. 29.
— porrecta Bth. * V. 458. no. 33.
— prostrata Bth. * V. 456. no. 11.
β. glabrior.
— pumila Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 15. * V. 458. no. 42.
— pungens Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 8. * V. 459. no. 56.
— quinata Bth. V. 458. no. 36.
— radula Bth. * V. 458. no. 43.
— rigida Bth. V. 455. no. 2.
Lotononis rostrata Bth. * V. 457. no. 23.
— secunda Bth. * V. 456. no. 20.
— sericea Bth. * V. 459. no. 52.
— sericophylla Bth. V. 455. no. 8.
— tenella Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 14. * V. 459. no. 45.
— *tenuiflora* Steud. V. 457. no 23.
— trichopoda Bth. * V. 457. no. 21.
— umbellata Bth. * V. 456. no. 17.
— varia Steud. * V. 456. no. 16.
— versicolor Bth. * V. 459. no. 44.
— vexillata Eckl. et Zeyh. * I. 619. no. 2.
— *vexillata* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 11.
— viborgioides Bth. V. 455. no. 3.
— villosa Steud. V. 456. no. 12.
Lotos DC. I. 107.
Lotus L. I. 647. II. 853.
— albidus Lodd. I. 648. †
— *angustifolius* Moç. et Sess. II. 855. no. 1.
— arenarius Brot. I. 648. †
— Argolicus I. 647. no. 4.
— *aristatus* DC. I. 647. no. 2.
— Aucheri Bois. II. 854. no. 7.
— aurantiacus Boiss. I. 647. no. 1.
— *australis* Forst. I. 684. no. 1.
— Coimbrensis Brot. I. 647. no. 2.
— Creticus L. I. 648. †
— *dichotomus* Delile. II. 838. no. 1.
— divaricatus Boiss. II. 854. no. 5.
— *Fluminensis* Vellozo. I. 752. no. 3.
— *glaberrimus* DC. I. 647. no. 2.
— glinoides Delile. I. 647. no. 3.
— halophilus Boiss. II. 854. no. 6.
— lateralis Prsl. I. 648. no. 5.
— linearis Wlprs. I. 648. no. 7.
— *Macraei* Bth. I. 650. no. 25.
— *maritimus* Vell. I. 775. no. 71.
— *micranthus* Bth. I. 650. no. 18.
— *microphyllus* Hook. I. 660. no. 1.
— *pinnatus* Hook. I. 648. no. 1.
— *platycarpos* Viv. I. 622. no. 1. II. 838. no. 1. V. 458. no. 35.
— *repens* Moç. et Sess. II. 855. no. 2.
— *sericeus* Prsh. I. 650. no. 26.
— strictus Fisch. et Mey. I. 648. no. 6.
— *subpinnatus* Lag. I. 650. no. 24.
— sulphureus Boiss. II. 854. no. 2.
— thermalis Boiss. II. 853. no. 1.
— Tingitanus Boiss. II. 854. no. 4.
— unifultus Boiss. II. 854. no. 3.
— *Wrangelianus* Fisch. I. 650. no. 25.
Loudonia Lindl. II. 100.
— aurea Lindl. * II. 100. no. 1.
Louichea corvina L'Hérit. I. 262. no. 1.
— *pteranthus* Auctor. I. 262. no. 1.
Lourea Neck. I. 735.

Lourea vespertilionis Desvx. *I. 735. no. 1.
Loureira Meisn. I. 560.
— Cochinchinensis Meisn. *I. 560. no. 1.
Lowea berberifolia Lindl. II. 13. no. 1.
Loxanthera Blume. II. 443.
Loxocarpeae A. P. DC. VI. 523.
Loxocarpus R. Br. *VI. 523.
Loxodon Cass. *II. 681. *VI. 320.
Loxonia W. Jack. *VI. 523.
Loxonieae A. P. DC. VI. 522.
Loxophyllum Blume. *VI. 655.
Loxostoma Bth. III. 869.
Loxostylis Spr. I. 555.
— alata Spr. *I. 555. no. 1.
Lozania Mut. *II. 69.
Lubbun IV. 84. no. 11.
Lubinia Vent. *VI. 446.
Lucianea DC. *II. 513.
Lucilia Cass. II. 681. *VI. 320.
— Chilensis Hook. et Arn. II. 681. no. 2.
— pedunculata Poepp. et Endl. II. 681. no. 1.
Luculia Sweet. II. 509. VI. 63.
— gratissima Sweet. *II. 509. no. 1. VI. 63. no. 1.
— Pinciana Hook. VI. 63. no. 2.
Lucuma Molina. *VI. 454.
Lucya DC. II. 501.
Ludia Lam. *I. 203.
Ludwigia Rxb. II. 74.
— alata Ell. *II. 75. no. 9.
— alternifolia Linn. *II. 74. no. 1.
— *apetala* Walt. II. 75. no. 15.
— arcuata Walt. *II. 76. no. 18.
— *aurantiaca* Raf. II. 74. no. 1.
— capitata Michx. *II. 75. no. 13.
  β. pubens.
— cylindrica Ell. *II. 75. no. 7.
  β. brachycarpa.
— *diffusa* Hamilt. II. 75. no. 4.
— *glandulosa* Prsh. II. 75. no. 12.
— *heterophylla* Poir. II. 75. no. 7.
— *hirsuta* Lam. II. 75. no. 8.
— hirtella Raf. II. 74. no. 2.
— *jussiaeoides* Madr. Herb. II. 75. no. 4.
— linearis Walt. *II. 75. no. 5.
— linifolia Poir. II. 75. no. 6.
— microcarpa Michx. *II. 75. no. 12.
— mollis Michx. II. 75. no. 8.
— multiflora Wlprs. II. 75. no. 14.
— natans Ell. II. 75. no. 16.
— *nitida* Michx. II. 75. no. 15.
— *oppositifolia* L. II. 75. no. 4.
— palustris Ell. *II. 75. no. 15.
— parviflora Rxb. *II. 75. no. 4.
— *pedunculosa* Michx. II 76. no. 18.
— *perennis* Linn. II. 75. no. 4.
Ludwigia pilosa Walt. *II. 75. no. 8.
— polycarpa Short et Peter. II. 75. no. 11.
— spathulata Torr. et Gr. II. 75. no. 17.
— sphaerocarpa Ell. *II. 75. no. 10.
— *suffruticosa* Walt. II. 75. no. 13.
— virgata Michx. *II. 76. no. 3.
— *Zeylanica* Pers. II. 75. no. 4.
Ludwigiantha Torr. et Gr. II. 76.
Lühea Willd. I. 352. II. 798. V. 116.
— candicans Mart. et Zucc. I. 353. no. 5.
— candida Mart. *I. 353. no. 6.
— densiflora St. Hil. I. 353. no. 12.
— divaricata Mart. et Zucc. I. 353. no. 2.
— *ericoides* W. Schmidt. IV. 171. no. 1.
— grandifolia Mart. et Zucc. I. 352. no. 1.
— laxiflora St. Hil. I. 353. no. 11.
— macrophylla Pohl. I 353. no. 7.
— microphylla Pohl. I. 353. no. 8.
— ochrophylla Mart. II. 798. no. 1.
— paniculata Mart. et Zucc. I. 353. no. 3.
— platypetala A. Rich. V. 116. no. 1.
— rufescens St. Hil. I. 353. no. 10.
— uniflora St. Hil. I. 353. no. 9.
— villosa Mart. et Zucc. I. 353. no. 4.
Lütkea Bngrd. II. 51.
Lütkea Bngrd. *II. 368.
— *sibbaldioides* Bngrd. II. 51. no. 22.
Luffa Tournef. II. 200.
— amara Rxb. *II. 200. no. 2.
— *amara* Wall. II. 200. no. 4.
— *Cattupicinna* Ser. II. 200. no. 1.
— echinata Rxb. II. 200. no. 3.
— Kleinii Wght. et Arn. II. 201. no. 5.
— pentandra Rxb. *II. 200. no. 1.
— *Petola* Ser. II. 200. no. 1.
— *Plukenetiana* Ser. II. 200. no. 2.
— scabra Schum. et Thonn. II. 201. no. 6.
— striata Schrad. II. 201. no. 7.
— tuberosa Rxb. II. 200. no. 4.
Lugoa DC. *II. 634.
Lugoa DC. VI. 210.
— *revoluta* DC. VI. 210. no. 2.
Lumbricidia Vellozo. I. 803.
— *anthelmintica* Vellozo. I. 803. no. 7.
— *legalis* Vellozo. I. 803. no. 3.
Lumnitzera Willd. II. 63.
— *caesia* Spr. III. 498. no. 2.
— *capitata* Spr. III. 497. no. 1.
— *carnosa* Spr. III. 488. no. 17.
— *densiflora* Spr. III. 510. no. 42.
— *fastigiata* Spr. III. 676. no. 303.
— lutea Prsl. II. 63. no. 3.
— *moschata* Spr. III. 498. no. 2. III. 506 no. 24.
— *ocymoides* Jacq. III. 498. no. 4.
— *pedicellata* Prsl. II. 63. no. 2.

Lumnitzera polystachya Jcq. III. 497. no. 1.
— *prostrata* Spr. III. 496. no. 6.
— purpurea Prsl. II. 63. no. 1.
— racemosa Willd. *II. 63. no. 4.
— rosea Prsl. II. 63. no. 2.
— *rubicunda* Spr. III. 498. no. 1.
— *salvioides* Spr. III. 511. no. 50.
— *tenuiflora* Spr. III. 489. no. 18.
— *virgata* Spr. III. 499. no. 2.
Lunania W. J. Hook. °V. 57.
— *Bichy* DC. V. 106. no. 1.
— racemosa Hook. *V. 57. no. 1.
Lunaria Linn. I. 139.
Lunaria Thunb. I. 191.
— biennis Mnch. I. 139. no. 1. †
— *diffusa* Thunb. I. 191. no. 18.
— *elongata* Thunb. I. 192. no. 27.
— *Lybica* Viv. I. 142. no. 4.
— *pinnata* Thunb. I. 191. no. 17.
— rediviva L. I. 139. no. 2. †
Lundia A. P. DC. *VI. 511.
— *monocantha* Thonn. et Schum. I. 203. no. 1.
Luperia DC. I. 123. no. 2. 3. 4. 5. 6.
Lupinaster Africanus Eckl. et Zeyh. I. 641. no. 29.
— *Burchellianus* Eckl. et Zeyh. I. 641. no. 29.
— *Ecklonianus* Prsl. I. 641. no. 28.
Lupinoides Jaub. et Spach. II. 838.
Lupinus Tournef. I. 595. II. 836. V. 452.
— affinis Agdh. I. 600. no. 52.
— Africanus Lour. I. 605. no. 97.
— albicaulis Dougl. I. 602. no. 69.
— albescens Hook. et Arn. I. 605. no. 105.
— albifrons Bth. I. 603. no. 78.
— albus L. I. 597. no 20.
— alopecuroides Desvx. I. 601. no. 56.
— Andicola Gill. I. 606. no. 106.
— angustifolius L. I. 597. no. 25.
— arboreus Sims. I. 601. no. 62.
— *arbustus* Dougl. I. 602. no. 64. β.
— arenarius Gardn. II. 836. no. 4.
— argenteus Agdh. I. 602. no. 66.
— argyraeus DC. I. 602. no. 65.
— aridus Dougl. I. 603. no. 74.
— arvensis Bth. V. 452. no. 2.
— attenuatus Gardn. II. 837. no. 7.
— aureo-nitens Gill. I. 606. no. 107.
— aureus Agdh. I. 596. no. 16.
— Barkeriae Knowl. et Westsc. I. 606. no. 109.
— Barkeri Lindl. I. 597. no. 17.
— bicolor Lindl. I. 598. no. 32.
— bilineatus Bth. I. 599. no. 45.
— *bimaculatus* Hook. I. 596. no. 12. (c. adn.)
— Bivonii Prsl. I. 606. no. 108.
Lupinus bracteolaris Desr. I. 595. no. 6.
— caespitosus Nutt. I. 603. no. 73.
— campestris Schlchtd. et Cham. I. 600. no. 46.
— *campestris* Schlchtd. et Cham. I. 605. no. 99.
— Chamissonis Eschsch. I. 603. no. 77.
— chrysomelas Casaretto. V. 452. no. 5.
— *Cochinchinensis* Lour. I. 586. no. 26.
— concinnus Agdh. I. 596. no. 10.
— Consentini Guss. I. 596. no. 14.
— coriaceus Bth. I. 598. no. 30.
— *Cruckshanksii* Hook. I. 597. no. 22. β.
— cytisoides Agdh. I. 599. no. 41.
— decumbens Torr. I. 604. no. 89.
— decurrens Gardn. II. 837. no. 6.
— densiflorus Bth. I. 595. no. 4. (I. 605. no. 101.)
— *densiflorus* Nutt. I. 603. no. 75.
— diffusus Nutt. I. 605. no. 95.
— digitatus Forsk. I. 606. no. 111.
— Douglasii Agdh. I. 603. no. 79.
— Ehrenbergii Schlchtd. I. 600. no. 48.
— elegans H. B. Kth. I. 599. no. 43.
— exaltatus Zuccar. I. 605. no. 99.
— flabellaris Bertol. I. 605. no. 103.
— flexuosus Lindl. I. 603. no. 81.
— *foliosus* Nutt. I. 602. no. 64. β.
— glabellus Mart. et Galeotti. II. 836. no. 3.
— glabratus Agdh. I. 601. no. 60.
— gracilis Agdh. I. 598. no. 33.
— *gracilis* Nutt. I. 601. no. 63. γ.
— Graecus Boiss. et Sprun. II. 836. no. 1.
— grandifolius Lindl. I. 599. no. 39.
— Gussoneanus Agdh. I. 696. no. 8.
— Hartwegii Lindl. I. 597. no. 18.
— hirsutissimus Bth. I. 595. no. 5.
— hirsutus L. I. 595. no. 7.
— Hispanicus Boiss. et Reut. I. 596. no. 9.
— holosericeus Nutt. I. 604. no. 86.
— Hornemanni Agdh. I. 601. no. 57.
— incanus Grah. I. 605. no. 98.
— *integrifolius* Desr. I. 605. no. 94.
— integrifolius L. I. 605. no. 96.
— Kunthii Agdh. I. 604. no. 93.
— latifolius Agdh. I. 599. no. 40.
— laxiflorus Dougl. I. 602. no. 64.
β. foliosus Torr. et Gr.
γ. tenellus Torr. et Gr.
— lepidus Dougl. I. 599. no. 36.
— leptocarpus Bth. I. 599. no. 41. (III. Emend. p. 3.)
— leptophyllus Bth. I. 597. no. 24.
— leptophyllus Schlchtd. et Cham. I. 600. no. 49.
— leucophyllus Lindl. I. 603. no. 75.

Lupinus leucopsis Agdh. I. 602. no. 68.
— Lindleyanus Agdh. I. 597. no. 19.
— linifolius Rth. I. 598. no. 27.
— littoralis Dougl. I. 601. no. 85.
— luteus L. I. 595. no. 1.
— macrocarpus Hook. et Arn. I. 604. no. 84.
— macrophyllus Bth. I. 599. no. 38.
— Marshallianus Sweet. I. 600. no. 50.
— Menziesii Agdh. I. 595. no. 2.
— Mexicanus Cerv. I. 600. no. 51.
— micranthus Dougl. I. 598. no. 31.
— *micranthus* Gussone. I. 596. no. 8.
— microcarpus Sims. I. 595. no. 3.
— microphyllus Desr. I. 604. no. 92.
— *microphyllus* H. B. Kth. I. 605. no. 93.
— minimus Dougl. I. 598. no. 35.
— montanus H. B. Kth. I. 601. no. 59.
— multiflorus Desr. I. 603. no. 82.
— *mutabilis* Lindl. I. 597. no. 22. β.
— mutabilis Sweet. I. 597. no. 22. β. floribus coeruleis.
— nanus Dougl. I. 597. no. 23.
— *Nootkatensis β.* Hook. I. 600. no. 52.
— Nootkatensis Donn. I. 600. no. 53.
— nubigenus Kth. I. 601. no. 54.
— *Nutkanus* Spr. I. 600. no. 53.
— *odoratus* Hortor. I. 595. no. 1.
— ornatus Dougl. I. 602. no. 67.
— paniculatus Desvx. I. 604. no. 83.
— parviflorus Nutt. I. 599. no. 42. (III. Emend. p. 3.)
— parvifolius Gardn. II. 837. no. 5.
— perennis L. I. 601. no. 63. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— pilosissimus Mart. et Galeotti. II. 836. no. 2.
— *pilosus* L. I. 596. no. 13.
— *pilosus* Walt. I. 605. no. 94.
— plumosus Dougl. I. 603. no. 76.
— polyphyllus Lindl. I. 599. no. 37.
— *prolifer* Desr. I. 597. no. 21. I. 606. no. 108.
— prostratus Agdh. I. 604. no. 91.
— pusillus Prsh. I. 598. no. 34.
— ramosissimus Bth. * V. 452. no. 4.
— recurvatus Meyen. I. 606. no. 110.
— *regius* Rudolph. I. 601. no. 53.
— reticulatus Desvx. I. 605. no. 100.
— rivularis Lindl. I. 601. no. 61.
— rupestris H. B. Kth. I. 604. no. 88.
— Sabinii Dougl. I. 602. no. 70.
— sarmentosus Desr. I. 604. no. 87.
— *semiverticillatus* Lam. I. 596. no. 15.
— semperflorens Hartw. V. 452. no. 1.
— sericeus Prsh. I. 603. no. 72.
— Smithianus Kth. I. 604. no. 90.
Lupinus stipulatus Agdh. I. 601. no. 58.
— subcarnosus Hook. I. 596. no. 11.
— sulphureus Dougl. I. 602. no. 71.
— subsessilis Bth. I. 598. no. 29.
— *sylvestris* Lam. I. 596. no. 15.
— Tauris Bth. V. 452. no. 3.
— *tenellus* Dougl. I. 602. no. 64. γ.
— termis Forsk. I. 597. no. 21.
— Texensis Hook. I. 596. no. 12.
— tomentosus DC. I. 603. no. 80.
— *trifoliatus* Rottl. I. 588. no. 48.
— trochophyllus Hffmnsgg. I. 605. no. 102.
— truncatus Nutt. I. 597. no. 26. (III. Emend. p. 3)
— uncinatus Schlchtd. I. 600. no. 47.
— vaginatus Schlchtd. et Cham. I. 605. no. 104.
— varius L. I. 596. no. 15.
— *varius* Gaertn. I. 596. no. 13.
— *varius* Savi. I. 597. no. 25.
— velutinus Bth. I. 598. no. 28.
— versicolor Lindl. I. 601. no. 55.
— villosus Willd. I. 605. no. 94.
Lupularia Ser. I. 635. II. 847.
Lupulinaria Arth. Hamilt. III. 747. VI. 673. no. 1.
Luteola Tournef. II. 751.
Luvunga Ham. I. 382.
— scandens Ham. * I. 382. no. 1.
Luxemburgia St. Hil. I. 226. V. 61.
— ciliosa Gardn. V. 61. no. 1.
— corymbosa St. Hil. I. 226. no. 2.
— octandra St. Hil. * I. 226. no. 4.
— polyandra St. Hil. * I. 226. no. 3.
— speciosa St. Hil. I. 226. no. 1.
Lychnidea Veronicae folio, flore coccineo etc. Feuill. IV. 28. no. 66.
— *Verbenae tenuifoliae folio* Feuill. IV. 31. no. 79.
— *Verbenae tenuifoliae folio, vulgo Sanda-Laguen* Feuill. IV. 30. no. 76.
— *villosa* Burm. III. 314. no. 4.
Lychnideae Fnzl. I. 270. II. 773. V. 77.
Lychnis Linn. (ex p.) I. 280. I. 282.
Lychnis Rchb. (ex p.) I. 281.
Lychnis Tournef. I. 281. II. 785. V. 83.
— *alba* Mill. II. 785. no. 5.
— *apetala* Linn. II. 784. no. 1.
— *brachypetala* Hornem. II. 785. no. 3.
— Bungeana Fisch. I. 281. no. 6. * V. 83. no. 3.
— *Cashmeriana* Royle. I. 280. no. 7.
— *coeli rosa* DC. V. 82. no. 1.
— coronaria Desvx. * V. 83. no. 1.
— *cuneifolia* Royle. I. 280. no. 2.
— *dioica* DC. II. 785. no. 5.

Lychnis dioica Linn. var. *rubra* Jundz. II. 785. no. 4.
— *diurna* Sibth. II. 785. no. 4.
— divaricata Rchb. I. 281. †
— *divaricata* Rchb. II. 785. no. 6.
— fulgens Fisch. I. 281. †
— grandiflora Jcq. I. 282. † V. 83. no. 2.
— inclusa Lehm. I. 281. no. 3.
— *inclusa* Lehm. II. 785. no. 3.
— *Indica* Rxb. I. 281. no. 9.
— *inflata* Wall. I. 280. no. 3.
— macrocarpa Boiss. et Reut. I. 281. no. 1.
— *macrorhiza* Royle. I. 280. no. 1.
— media Fisch. et Mey. I. 281. no. 5.
— *multicaulis* Wall. I. 280. no. 5.
— *nutans* Wall. I. 280. no. 6.
— *oculata* Backhouse. V. 82. no. 1.
— *pauciflora* Ldb. II. 784. no. 1.
— *pratensis* Mart. II. 785. no. 5.
— *pumila* Royle. I. 280. no. 4.
— Pyrenaica Bory. I. 282. †
— *Pyrenaica* Bory. I. 281. no. 1.
— saxatilis Turcz. I. 281. no. 4.
— Senno Sieb. et Zucc. I. 281. no. 2.
— sordida Kar. et Kir. II. 785. no. 1.
— *sylvestris* Schkhr. II. 785. no. 4.
— *tristis* Bnge. I. 281. no. 10.
— *uniflora* Ldb. II. 784. no. 1.
Lychnitis Bth. III. 879.
Lychnocephalus Mart. *II. 542.
Lychnophora Mart. *II. 542. VI. 99.
— affinis Gardn. VI. 100. no. 5.
— albertinioides Gardn. VI. 100. no. 7.
— Martiana Gardn. VI. 100. no. 4.
— passerina Gardn. VI. 99. no. 1.
— ramosissima Gardn. VI. 99. no. 3.
— reticulata Gardn. VI. 100. no. 6.
— subulata Gardn. VI. 99. no. 2.
Lychnophoroides DC. VI. 100.
Lycioides Dunal. (Solanum) III. 61.
Lycioides Spach. (Amygdalus) II. 909.
Lycioplesium Miers. °VI. 617.
— horridum Miers. VI. 618. no. 4.
— Meyenianum Miers. VI. 618. no. 6.
— nitidum Miers. VI. 617. no. 2.
— obovatum Miers. VI. 617. no. 1.
— ovatum Miers. VI. 618. no. 3.
— pulchellum Wlprs. VI. 618. no. 5.
Lyciopsis Spach. II. 94.
Lycium Linn. III. 106. °III. 955. VI. 616.
Lycium Linn. (ex p.) III. 112.
— *Afrum β.* Lam. III. 109. no. 22.
— Afrum Linn. III. 109. no. 18.
— *Afrum* Thnbrg. III. 109. no. 21.
— *aggregatum* Rz. et Pav. III. 112. no. 1. VI. 619. no. 1.
Lycium arborescens Spr. III. 112. no. 1.
— *Barbarum β.* DC. III. 107. no. 8.
— *Barbarum β. Chinense* Ait. III. 107. no. 3.
— *Barbarum* Lam. III. 107. no. 6.
— Barbarum Linn. III. 107. no. 2. *α.* vulgare Ait.
— *Barbarum* Lour. III. 107. no. 3.
— *Barbarum* Thnbrg. III. 108. no. 13.
— *boerhaviaefolium* Linn. III. 113. no. 1. VI. 547. no. 1.
— *breviflorum* Sendtner. VI. 619. no. 4.
— brevipes Bth. VI. 616. no. 2.
— canum Gillies. *III. 112.
— Capense Mill. III. 110. no. 26. adn.
— *Capense* Mill. III. 110. no. 26.
— capsulare Linn. III. 111. no. 34.
— *carnosum* Duham. III. 109. no. 22.
— Carolinianum Walt. III. 111. no. 35.
— cestroides Schlchtd. III. 111. no. 30.
— *cestroides* Schlchtd. VI. 619. no. 3.
— Chilense Bertero. III. 108. no. 15.
— Chinense Mill. III. 107. no. 3.
— ciliatum Schlchtd. III. 107. no. 9.
— *ciliatum* Schlchtd. VI. 613. no. 6.
— cinereum Thnbrg. III. 110. no. 24.
— Cochinchinense Lour. III. 112. no. 39.
— cornifolium H. B. Kth. III. 111. no. 32.
— *cornifolium* H. B. Kth. VI. 619. no. 5.
— *distichum* Meyen. III. 108. no. 11. III. 113. no. 2.
— *Europaeum β.* DC. III. 107. no. 7.
— Europaeum Linn. III. 106. no. 1. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— *Europaeum* Mill. III. 107. no. 5.
— filifolium Gillies. *III. 112.
— floribundum H. B. Kth. III. 113. no. 3.
— fuchsioides Humb. et Bonpl. III. 110. no. 27.
— *fuchsioides* H. B. Kth. VI. 618. no. 1.
— gesnerioides H. B. Kth. III. 110. no. 28.
— *gesnerioides* H. B. Kth. VI. 618. no. 3.
— glomeratum Sendtner. VI. 616. no. 3.
— gracile Meyen. III. 108. no. 16.
— grandiflorum Willd. III. 111. no. 37.
— *grandiflorum* Willd. VI. 620. no. 8.
— *Guayaquilense* H. B. Kth. III. 112. no. 2.
— *halimifolium* Mill. III. 107. no. 2. et 8.
— *heterophyllum* Murr. III. 113. no. 1. VI. 547. no. 1.
— *horridum* H. B. Kth. III. 109. no. 17. VI. 618. no. 4.
— horridum Thnbrg. III. 110. no. 25.
— imbricatum Boiss. *III. 112.
— inerme Mill. III. 112. no. 38.
— intricatum Boiss. III. 109. no. 19.

Lycium Italicum Mill. III. 109. no. 22.
— lanceolatum Poir. III. 107. no. 7.
— Loxense H. B. Kth. III. 111. no. 31.
— *Loxense* H. B. Kth. VI. 619. no. 4.
— macrophyllum Bth. III. 108. no. 14.
— *macrophyllum* Bth. VI. 619. no. 1.
—? *Meyenianum* N. ab E. III. 113. no. 3. VI. 618. no. 6.
—? microphyllum Duham. III. 110. no. 23.
— *microphyllum* Humb. et Bonpl. III. 109. no. 17. VI. 618. no. 4.
— *nutans* Poepp. III. 108. no. 15.
— obovatum Rz. et Pav. III. 108. no. 10.
— *obovatum* Rz. et Pav. VI. 617. no. 1.
— obtusum Willd. III. 111. no. 36.
— *ovale* Willd. III. 111. no. 32.
— *ovatum* Duh. III. 107. no. 3.
— parvifolium Willd. III. 109. no. 17.
— *parvifolium* Willd. VI. 618. no. 4.
— *Plumieri* Miers. VI. 619. no. 5.
— propinquum G. Don. III. 109. no. 21.
— pulchellum Mart. et Galeotti. VI. 618. no. 5.
— Quitense Hook. VI. 616. no. 1.
— rigidum Thnbrg. III. 109. no. 22.
— Ruthenicum Murr. III. 107. no. 4.
— *salicifolium* Mill. III. 106. no. 1.
— salsum Rz. et Pav. III. 108. no. 12.
— scabrum N. ab E. III. 108. no. 11.
— Shawii Roem. et Schult. III. 107. no. 5.
— *Siculum* Ucria. III. 106. no. 1.
— *spathulatum* Rz. et Pav. III. 113. no. 4.
— *spinosum* Sieber. *III. 112.
— *Tataricum* Pall. III. 107. no. 4.
— tenue Willd. III. 109. no. 20.
— tetrandrum Thnbrg. III. 110. no. 26.
— Thunbergii G. Don. III. 108. no. 13.
— Trewianum Duh. III. 107. no. 6.
— turbinatum Duh. III. 107. no. 8.
— umbellatum Rz. et Pav. III. 110. no. 29.
— *umbellatum* Rz. et Pav. VI. 619. no. 2.
— umbrosum H. B. Kth. III. 111. no. 33.
— *umbrosum* H. B. Kth. VI. 618. no. 2.
Lycopersicum Tournef. III. 100. °III. 954.
— *Aethiopicum* Mill. III. 46. no. 60.
— cerasiforme Dunal. III. 101. no. 8. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— *commutatum* Roem. et Schult. III. 100. no. 2. *β.*
— dentatum Dunal. III. 101. no. 6.
— esculentum Mill. III. 101. no. 9. (c. varr. *β. γ.* et *δ.*)
— *fructu albo* Tournef. III. 102. no. 9. *δ.*
— *fructu Cerasi luteo* Tournef. III. 101. no. 8. *β.*
— *fructu Cerasi rubro* Tournef. III. 101. no. 8. *α.*
Lycopersicum fructu e rubro pallescente Tournef. III. 102. no. 9. *β.*
— *fructu luteo* Tournef. III. 102. no. 9. *γ.*
— *fructu striato duro* Tournef. III. 46. no. 60. *γ.*
— *Galeni* Mill. III. 101. no. 8.
— *Galeni* Tournef. III. 102. no. 9.
— hirsutum Dunal. III. 101. no. 7.
— Humboldtii Dunal. III. 101. no. 4.
— *inodorum* Juss. III. 100. no. 1.
— *Peruvianum* Hook. III. 100. no. 2. *α.*
— Peruvianum Mill. III. 100. no. 2.
α. parvifolium Kltzsch.
β. commutatum Spr.
— *Pimpinellae Sanguisorbae folio* Feuill. III. 100. no. 2. *α.*
— pimpinellifolium Mill. III. 100. no. 1.
— *pomum amoris* Mnch. III. 102. no. 9.
— procumbens Mill. III. 102. no. 10.
— pyriforme Dunal. III. 101. no. 3.
— regulare Dunal. III. 101. no. 5.
— *tuberosum* Mill. III. 38. no. 1.
Lycopsis Linn. *VI. 559.
Lycopus Linn. III. 595. °III. 980.
— Americanus Mühlnbrg. III. 597. no. 6.
— *angustifolius* Nutt. III. 597. no. 6. *γ.*
— *aquaticus* Mnch. III. 596. no. 4.
— australis R. Br. III. 597. no. 7.
— *bracteatus* Mühlnbrg. III. 597. no. 6.
— *dianthera* Rxb. III. 716. no. 1.
— Europaeus Linn. III. 596. no. 4.
β. pubescens.
— *Europaeus* Prsh. III. 597. no. 6.
— *Europaeus γ. argutus* Bth. III. 597. no. 7.
— *Europaeus* Sm. III. 596. no. 4.
— *exaltatus* Elliot. III. 597. no. 6. *α.*
— exaltatus Linn. fil. III. 597. no. 8.
— *exaltatus* Sibthrp. et Sm. III. 597. no. 8.
— *heterophyllus* Rafin. III. 597. no. 6. *α.*
— *longifolius* Rafin. III. 597. no. 6. *γ.*
— *lucidus* Turczan. III. 597. no. 7.
— macrophyllus Bth. III. 596. no. 2.
— obtusifolius Michx. III. 596. no. 3.
— *palustris* Lam. III. 596. no. 4.
— *pauciflorus* Rafin. III. 597. no. 6. *γ.*
— *Pennsylvanicus* Mühlnbrg. III. 597. no. 6. *γ.*
— *pinnatifidus* Pall. III. 598. no. 8.
— *pumilus* Vahl. III. 596. no. 1. *β.*
— rubellus Mnch. III. 597. no. 5.
— sinuatus Elliot. III. 597. no. 6.
γ. angustifolius.
α. dissectus.
β. vulgaris.
— *uniflorus* Michx. III. 596. no. 1. *β.*
— Virginicus Linn. III. 595. no. 1.
β. pauciflorus.

Lycopus Virginicus β. quercifolius Prsh. III. 596. no. 2.
— *vulgaris* Nutt. III. 597. no. 6. β.
— *vulgaris* Pers. III. 596. no. 4.
Lycoseris Cass. *II. 679. VI. 317.
— bracteata Bth. VI. 317. no. 2.
— latifolia Bth. VI. 317. no. 1.
— squarrosa Bth. VI. 317. no. 3.
Lycospermum arborescens foliis angulatis, fructu aureo Plum. III. 45. no. 50.
Lydaea Lyday Molina. II. 52. no. 3.
Lygodesmia Don. II. 692. *VI. 361.
— aphylla DC. II. 693. no. 4.
β. Texana.
— grandiflora Torr. et Gr. II. 693. no. 3.
— juncea Don. II. 692. no. 1.
— *minor* Hook. VI. 349. no. 1.
— spinosa Nutt. II. 692. no. 2.
Lygodysodea Rz. et Pav. *II. 485.
Lyncea hispida Cham. et Schlchtd. III. 379. no. 1.
Lyonia Nutt. II. 727.
— Jamaicensis Don. VI. 741.
— squamulosa Martens et Galeotti. II. 727. no. 1.
Lyonnetia Cass. *II. 634.
— *montana* Griseb. II. 633. no. 2.
— *pectinata* DC. VI. 188. no. 13. α.
— *tenuiloba* DC. II. 633. no. 2.
Lyonsia R. Br. *VI. 470.
Lyperia Bth. III. 314. °III. 967. *VI. 642.
— amplexicaulis Bth. III. 314. no. 2.
— argenta Bth. III. 315. no. 13. (c. varr. α. β. et γ. ibid.)
— aspalathoides Bth. III. 316. no. 24.
— canescens Bth. III. 315. no. 12.
— crassicaulis Bth. III. 316. no. 16.
— cuneata Bth. III. 316. no. 22.
— filicaulis Bth. III. 316. no. 18.
— foliolosa Bth. III. 316. no. 21.
— fragrans Bth. III. 314. no. 4.
— fruticosa Bth. III. 314. no. 1.
— glutinosa Bth. III. 315. no. 9.
— incisa Bth. III. 315. no. 11.
— macrocarpa Bth. III. 314. no. 5.
— macrophylla Bth. III. 317. no. 25.
— mollis Bth. III. 316. no. 17.
— multifida Bth. III. 316. no. 20.
— pedunculata Bth. III. 315. no. 14.
— phlogiflora Bth. III. 315. no. 15.
— pinnatifida Bth. III. 316. no. 19.
α. canescens.
ε. microphylla.
β. subcanescens.
δ. subbipinnatisecta.
γ. viscoso-pubescens.
Lyperia purpurea Bth. III. 316. no. 23.
— racemosa Bth. III. 314. no. 8.
— simplex Bth. III. 314. no. 6.
— tenuiflora Bth. III. 314. no. 7.
— tristis Bth. III. 314. no. 3.
— violacea Bth. III. 315. no. 10.
Lyrocarpa Hook. et Harv. °V. 37.
— Coulteri Hook. et Harv. V. 37. no. 1.
Lysiloma Bth. °V. 593.
— Acapulcense Bth. V. 594. no. 5.
— auritum Bth. V. 594. no. 3.
— Bahamense Bth. V. 594. no. 1.
— desmostachyum Bth. V. 594. no. 6.
— divaricatum Bth. *V. 594. no. 9.
— microphyllum Bth. V. 594. no. 4.
— nigricans Bth. *V. 594. no. 8.
— rostratum Bth. V. 594. no. 7.
— Schiedeanum Bth. V. 594. no. 2.
Lysimachia Linn. VI. 446.
— ferruginea Edgw. VI. 446. no. 2.
— glandulosa Edgw. VI. 446. no. 1.
— Lechenaultii Duby. VI. 446. †
— punctata Jcq. *VI. 446. no. 4.
β. racemosa C. Koch.
— repens d'Urville. VI. 446. no. 5.
— tomentosa Prsl. VI. 446. no. 3.
Lysimachion Tausch. II. 90.
Lysinema R. Br. II. 732. VI. 432.
— curvatum Lindl. II. 732. no. 1.
— elegans Sonder. VI. 432. no. 1.
— ovatum Sonder. VI. 432. no. 2.
— spicatum Lindl. II. 733. no. 2.
Lysionoteae Alph. DC. VI. 522.
Lysionotus Don. *VI. 522.
— *albidus* Blume. VI. 521. no. 5.
Lysiostyles Bth. °VI. 552.
— scandens Bth. VI. 552. no. 1.
Lysipoma DC. *II. 706. *VI. 374.
Lysipomeae DC. jun. VI. 374.
Lysiopomia H. B. Kth. II. 706.
LYTHRARIEAE Juss. II. 101. II. 916. V. 673.
Lythrum L. II. 103. V. 674.
— *acutangulum* Lag.? II. 104. no. 8.
— alatum Prsh. *II. 104. no. 9. (c. varr. β. γ. et δ. ibid.)
— *alatum* Prsl. II. 103. no. 2.
— anomalum St. Hil. II. 104. no. 13.
— *apetalum* Spr. II. 103. no. 1.
— Californicum Torr. et Gr. II. 104. no. 10.
— Cashmerianum Royle. II. 104. no. 7.
— divaricatum Colla. II. 104. no. 11.
— *flavum* Spr. II. 103. no. 2.
— flexicaule Schrenk. V. 674. no. 1.
— glaucescens Schrenk. V. 674. no. 2.
— gracile Bth. II. 104. no. 12.
— junceum Sol. II. 104. no. 8.

Lythrum lanceolatum Ell. II. 104. no. 9. β.
— *lineare* Hook. et Arn. II. 104. no. 10.
— linifolium Karel. et Kiril. II. 101. no. 4.
— maculatum Boiss. et Reut. II. 103. no. 1.
— microphyllum Karel. et Kiril. II. 104. no. 6.
Lythrum nanum Karel. et Kiril. II. 104. no. 5.
— Preslii Guss. II. 103. no. 2.
— tribracteatum Salzm. *II. 104. no. 3. var. cuneifolium Ten.
— *virgatum?* Walt. II. 104. no. 9. β.

M

Maba Forst. *VI. 457.
Macairea DC. II. 130.
— adenostemon DC. *II. 130. no. 5.
— multinervia Bth. II. 130. no. 1.
— pachyphylla Bth. II. 130. no. 2.
— parvifolia Bth. II. 130. no. 4.
— *radula* DC. II. 130. no. 5.
— rigida Bth. II. 130. no. 3.
Macanea Juss. *I. 398.
Macarthuria Endl. °V. 107.
— australis Hügel. V. 107. no. 1.
— foliosa Preiss. V. 107. no. 2.
Macbridea Elliott. III. 800. °III. 987.
— pulchella Elliott. III. 800. no. 1.
Maccai Merian. III. 79. no. 307.
Macfadyena Alph. DC. *VI. 511.
Machaeranthera N. ab E. *II. 576. *II. 952. no. 7.
Machaerium Pers. I. 794. V. 542.
— aculeatum Raddi. *I. 795. no. 5. V. 542. no. 1.
— acutifolium Mart. I. 797. no. 46.
— acutifolium Vogel. I. 796. no. 35.
— affine Bth. *I. 794. no. 3.
— amplum Bth. I. 794. no. 1.
— angustifolium Vogel. I. 794. no. 2. (cum var. β. ibid.)
— arboreum Bth. *I. 796. no. 28.
— armatum Vogel. I. 795. no. 6.
— Brasiliense Vogel. I. 796. no. 22.
— campestre Mart. I. 797. no. 43.
— ciliatum Bth. I. 795. no. 19.
— densicomum Mart. I. 796. no. 20.
— discolor Vogel. I. 795. no. 15.
— erianthum Bth. I. 796. no. 23.
— eriocarpum Bth. I. 794. no. 4.
— ferrugineum Pers. *I. 796. no. 29.
— firmum Bth. *I. 797. no. 49.
— glabrum Vogel. I. 796. no. 34.
Machaerium gracile Bth. I. 795. no. 7.
— Humboltianum Vogel. I. 795. no. 17.
— incorruptibile Bth. I. 797. no. 48.
— lanatum Tulasne. V. 543. no. 5.
— legale Bth. I. 797. no. 47.
— leiocarpum Vogel. I. 796. no. 26.
— leiophyllum Bth. *I. 796. no. 31.
— leucopterum Vogel. I. 797. no. 41.
— lineatum Bth. I. 795. no. 14.
— macrophyllum Bth. I. 795. no. 18.
— Martii Tulasne. V. 543. no. 2.
— minutiflorum Tulasne. V. 543. no. 4.
— mucronatum Vogel. I. 797. no. 47.
— mucronulatum Mart. I. 797. no. 44.
— muticum Bth. I. 797. no. 45.
— nervosum Vogel. I. 796. no. 33.
— nictitans Bth. I. 795. no. 12.
— nigrum Vogel. I. 797. no. 38.
— oblongifolium Vogel. I. 797. no. 37.
— opacum Vogel. I. 796. no. 30.
— pedicellatum Vogel. I. 796. no. 27.
— puberulum Mart. I. 796. no. 25.
— robiniaefolium Vogel. I. 798. no. 50.
— Schomburgkii Bth. I. 796. no. 21.
— scleroxylum Tulasne. V. 543. no. 3.
— secundiflorum Mart. I. 796. no. 36. β. laxiflorum I. 797. no. 36.
— sericiflorum Vogel. I. 795. no. 8.
— Sieberi Bth. I. 795. no. 11.
— spinosum Bth. *I. 795. no. 16.
— splendens Vogel. I. 795. no. 9.
— stipitatum Vogel. *I. 798. no. 51.
— triste Vogel. I. 798. no. 53.
— uncinatum Bth. I. 795. no. 10.
— Vellosianum Bth. I. 795. no. 13.
— velutinum Bth. I. 797. no. 39.
— verrucosum Vogel. I. 796. no. 24.
— vestitum Vogel. I. 797. no. 42.
— villosulum Mart. I. 798. no. 52.

Machaerium villosum Vogel. I. 797. no. 40.
— violaceum Vogel. I. 796. no. 32.
Machaonia Humb. et Bonpl. *II. 469. VI. 35.
— *Brasiliensis* DC. VI. 35. no. 1.
— velutina Mart. et Gal. VI. 35. no. 1.
Machlis DC. *II. 643.
Macielia Vandelli. *VI. 561.
Mackaya Arn. °V. 763.
— *populifolia* Arn. II. 205. no. 1.
— populifolia Arn. V. 763. no. 1.
Mackleya R. Br. I. 109.
— cordata R. Br. *I. 109. no. 1.
Macleania Hook. II. 724. VI. 415.
— angulata Hook. II. 724. no. 1.
— Benthamiana Wlprs. VI. 415. no. 2.
— cordifolia Bth. VI. 415. no. 4.
— *floribunda* Bth. VI. 415. no. 2.
— floribunda Hook. VI. 415. no. 1.
— insignis Mart. et Gal. II. 724. no. 2.
— macrantha Bth. VI. 415. no. 3.
— pubiflora Bth. VI. 415. no. 5.
— tenuifolia Lindl. VI. 415. no. 6.
Macnabia Bth. *II. 728.
Macoubea Aubl. *I. 398.
Macrachaenium Hook. fil. °VI. 323.
— gracile Hook. fil. VI. 323. no. 1.
Macraea Hook. fil. *°VI. 311.
— *cordata* Meyen. I. 461. no. 2.
— *crenata* Hook. I. 461. no. 4.
— *grandifolia* Linn. I. 461. no. 2.
— *parvifolia* Lindl. I. 461. no. 3.
— *rosea* Lindl. I. 461. no. 5.
Macrandria Wght. et Arn. II. 493.
Macrantha Elkan. I. 111. (Papaver)
Macranthae Pfeiff. (Echinopsis) II. 323.
Macranthae Wlprs. (Verbena) IV. 26.
Macranthea Boiss. III. 401.
Macranthera Torrey. III. 380. °III. 970. *VI. 649.
— fuchsioides Torr. III. 380. no. 1.
— Lecontei Torr. *III. 380. no. 2. III. 939.
Macranthes corymbosa Blume. I. 351. no. 1.
Macranthus Lour. *I. 792.
Macreightia Alph. DC. *VI. 457.
Macria E. Mey. IV. 163.
Macrobia B. Webb et Berth. (Aichryson) II. 264. V. 798. no. 4.
Macrocapnos Royle. I. 118. no. 3.
Macrocarpaea (Lisianthus) Griseb. VI. 503. no. 5.
Macrocarphus Nutt. II. 626. *VI. 177.
Macrocarphus Nutt. II. 989. VI. 177.
Macrocarphus Torr. et Gr. VI. 177.
— achilleaefolius Nutt. II. 626. no. 1.
— *achilleaefolius* Nutt. VI. 177. no. 5.
— Douglasii Nutt. *II. 626. no. 2.
Macrocarphus Douglasii Nutt. VI. 177. no. 6.
Macroceras Dcne. I. 100.
Macrocheton Adr. Juss. I. 430.
Macrochilus Prsl. *II. 708. *VI. 373.
Macrochlaena DC.? II. 682. no. 1.
Macrocline Torr. et Gr. II. 979.
Macrocnemum P. Br. *II. 506.
— *strictum* Rxb. II. 518. no. 1.
Macrogoni Lem. (Echinocactus) II. 315. V. 813.
Macrolobium latifolium Vogel. I. 845. no. 2. adnot.
— pendulum Willd. I. 845. no. 1. adnot.
Macromelissa Bth. III. 733.
Macromeria G. Don. *VI. 560.
Macronema Nutt. II. 592. *II. 952. no. 49.
— discoidea Nutt. II. 593. no. 2.
— suffruticosa Nutt. II. 592. no. 1.
Macronepeta Bth. III. 785. VI. 676. no. 3.
Macropetalum Burchell. *VI. 493.
Macrophyllae Bth. (Albizzia) V. 595.
Macrophyllae Bth. (Calliandra) V. 599.
Macropodium R. Br. I. 135.
— *laciniatum* Hook. I. 172. no. 1.
— nivale R. Br. *I. 135. no. 1.
Macroptilium Bth. I. 775.
Macrorhynchus Lssng. II. 695. VI. 356.
Macrorhynchus Lssng. II. 696.
— Californicus Torr. et Gr. II. 696. no. 6.
— elatus Torr. et Gr. II. 695. no. 4.
— grandiflorus Torr. et Gr. II. 696. no. 5.
— heterophyllus Nutt. II. 696. no. 7.
— laciniatus Torr. et Gr. II. 695. no. 2. β. longifolius.
— Lessingii Hook. et Arn. II. 696. no. 4.
— Poeppigii DC. *VI. 356. no. 1.
— pterocarpus Fisch. et Mey. *VI. 356. no. 2
— troximoides Torr. et Gr. II. 695. no. 1.
Macroscepis H. B. Kth. *VI. 490.
Macrosepalae (Ipomaea) Choisy. VI. 532.
Macrosiphon Hochst. III. 390. °III. 970.
— elongatus Hochst. III. 390. no. 2.
— fistulosus Hochst. III. 390. no. 1.
Macrosiphonia caespitosa Duby. VI. 444. no. 5.
Macrosolen Blume. II. 443.
Macrosperma (Tanacetum) C. H. Schultz. VI. 222.
Macrospermae C. H. Schultz. (Guizotia) VI. 158.
Macrostachyae (Crotalaria) Bth. V. 448.
Macrostylis Bartl. et Wendl. I. 517.
— barbigera Bartl. et Wendl. *I. 517. no. 2.
— cordata G. Don. I. 517. no. 3.
— lanceolata Bartl. et Wendl. *I. 517. no 1.
— obtusa Bartl. et Wendl. *I. 517. no. 4.

Macrostylis squarrosa Bartl. et Wendl. *I. 517. no. 5.
Macrothyrsus discolor Spach. I. 424. no. 4.
Macrotomia A. P. DC. *VI. 557.
Macrotropis DC. *I. 807. II. 903.
— emarginata Wlprs. II. 903. no. 1.
Macrotys DC. I. 60. adnot.
— *actaeoides* Raf. I. 60. no. 1.
Madablota Sonner. V. 294. no. 1.
Madaractis DC. *II. 664. VI. 728.
— lanuginosa Edgwrth. VI. 728. no. 1.
Madaria DC. II. 631. II. 990.
— corymbosa DC. *II. 990. no. 1.
— racemosa Nutt. II. 631. no. 1.
— *racemosa* Nutt. II. 990. no. 1.
Madariopsis Nutt. II. 631. *VI. 183.
— Chilensis Nutt. *II. 631. no. 1. VI. 183. no. 1.
Madaroglossa DC. II. 632.
— angustifolia DC. *II. 632. no. 3.
— *angustifolia* Nutt. II. 632. no. 2. II. 990. no. 1.
— carnosa Nutt. II. 632. no. 5.
— Douglasii Wlprs. *II. 632. no. 2.
— elegans Nutt. II. 632. no. 4.
— heterotricha DC. *II. 632. no. 1.
— *hirsuta* Nutt. II. 632. no. 1. II. 990. no. 1.
Madia Molina. II. 630. II. 990. VI. 182.
— capitata Nutt. II. 630. no. 1.
— *capitata* Nutt. VI. 182. no. 1. β.
— *hirsuta* Meyen. VI. 183. no. 1. γ.
— *mellosa* Jcq. VI. 182. no. 1.
— racemosa Torr. et Gr. *II. 990. no. 1.
— sativa Molina. VI. 182. no. 1.
γ. angustifolia Wlprs.
β. congesta.
— *viscosa* Cav. VI. 182. no. 1.
Madieae DC. II. 630. II. 990. VI. 182.
Madorella Nutt. II. 631. *VI. 183.
— dissitiflora Nutt. II. 631. no. 2.
— *dissitiflora* Nutt. 990. no. 2.
— racemosa Nutt. II. 631. no. 1.
Maerua Forsk. I. 197.
— *angustifolia* A. Rich. I. 197. no. 1.
— *ovalifolia* Cambess I. 197. no. 4.
— rigida R. Br. I. 197. no. 2.
— *scabra* Cambess. I. 197. no. 3.
— Senegalensis R. Br. I. 197. no. 1.
Maesa Forsk. VI. 448.
— palustris Hochstett. VI. 448. no. 2.
— picta Hochstett. VI. 448. no. 1.
Maeseae Alph. DC. VI. 448.
Magellana Cav. *I. 466.
Magnolia Linn. I. 70. II. 746.
— acuminata L. I. 70. †
— *auriculata* Lam. I. 70. no. 5.
Magnolia cordata DC. I. 70. †
— dealbata Zucc. *II. 746. no. 1.
— excelsa Wall. I. 70. no. 2.
— *excelsa* Wall. I. 71. no. 8.
— Fraseri Walt. I. 70. no. 5.
β. pyramidata Nutt.
— *fuscata* Spr. I. 71. no. 18.
— glauca L. I. 70. †
— *glauca* Moç. et Sess. I. 69. no. 9.
— *grandiflora* Moç. et Sess. I. 69. no. 9.
— insignis Wall. I. 70. no. 1.
— macrophylla Michx. I. 70. †
— *Mexicana* DC. I. 69. no. 9.
— obovata Thnbrg. *I. 70. no. 3.
β. discolor DC.
— *odoratissima* Reinw. I. 69. no. 1.
— parviflora Blume. I. 70. no. 4.
—? *parviflora* DC. I. 71. no. 18.
— *pumila* Spr. I. 69. no. 1.
— *pyramidata* Bartr. I. 70. no. 5. β.
— *Rumphii* Spr. I. 69. no. 4.
— *Soulangiana* (??) I. 70. no. 3.
— speciosa Zeel. I. 70. †
— *tripetala* L. I. 70. no. 6.
— umbrella Lam. *I. 70. no. 6.
MAGNOLIACEAE DC. I. 69. II. 746. V. 14.
Magnolieae DC. I. 69. II. 746.
Magonia St. Hil I. 422.
— glabrata St. Hil. I. 422. no. 2.
— pubescens St. Hil. I. 422. no. 1.
Magydaris Koch. II. 425.
— *ambigua* DC. II. 425. no. 1.
— nanacina DC. *II. 425. no. 1.
Maharanga Alph. DC. *VI. 560.
Mahernia L. I. 347. V. 112.
— coccocarpa Eckl. et Zeyh. I. 348. no. 7.
— diffusa Jcq. I. 348. †
— dryadiphylla Eckl. et Zeyh. I. 348. no. 9.
— fragrans Rchb. I. 347. no. 1. I. 348. †
— glabrata Cav. I. 348. †
— grandistipula Buchinger. V. 112. no. 1.
— hiliaris Eckl. et Zeyh. I. 347. no. 3.
— humifusa Eckl. et Zeyh. I. 348. no. 10.
— incana Eckl. et Zeyh. I. 347. no. 2.
— incisa Jcq. I. 348. †
— nana Eckl. et Zeyh. I. 348. no. 5.
— odorata Andr. I. 348. †
— parviflora Eckl. et Zeyh. I. 348. no. 6.
— pinnata L. I. 348. †
— scabra Eckl. et Zeyh. I. 348. no. 8.
— scoparia Eckl. et Zeyh. I. 348. no. 11. (c. var. β. ibid.)
— veronicaefolia Eckl. et Zeyh. I. 348. no. 4.
Mahonia Nutt. I. 101. I. 103. V. 19.
— *acanthifolia* Don. I. 103. no. 27.
— *aquifolium* Nutt. I. 103. no. 29. *a*.

Mahonia aquifolium Prsh. V. 19. †
— *aquifolium β. Nutkana* DC. I. 103. no. 29. γ.
— *diversifolia* Sweet. I. 104. no. 32.
— *fascicularis* DC. I. 103. no. 30.
— *glumacea* DC. I. 103. no. 31.
— *glumacea* Spr. V. 19. †
— *ilicina* Schlchtd. I. 104. no. 34.
— *Nepalensis* DC. I. 103. no. 28.
— *Nepalensis* var. DC. I. 103. no. 26.
— *nervosa* Nutt. I. 103. no. 31.
— *pinnata* DC. I. 103. no. 30.
— *repens* Don. I. 103. no. 29. *a.*
Mahurea Aubl. *I. 374. II. 802.
— exstipulata Bth. II. 802. no. 1.
Mairia DC. *II. 559. *II. 951. no. 1. II. 955.
— pinifolia C. H. Schultz. II. 955. no. 1.
Majana aurea Rmph. III. 315. no. 7.
— *foetida* Rmph. III. 579. no. 3.
Majeta Aubl. II. 142. V. 711.
— dispar Miquel. V. 711. no. 1.
— hypophysca DC. *II. 142. no. 1.
Major Barnéoud. (Plantago) IV. 179.
Majorana Mnch. III. 696. °III. 982. VI. 671.
— *crassa* Mnch. III. 696. no. 2.
— crassifolia Bth. III. 696. no. 3.
— hortensis Mnch. III. 696. no. 2.
— Mexicana Martens et Galeotti. VI. 671. no. 1.
— microphylla Bth. III. 696. no. 1.
— neglecta Vogel. III. 697. no. 8.
— nervosa Bth. III. 696. no. 4.
— Onites Bth. III. 696. no. 5.
— Oreja Vogel. III. 697. no. 7.
— turbinata Vogel. III. 697. no. 6.
Mala Aethiopica Raj. III. 46. no. 60. γ.
— *aurea* Chabr. III. 102. no. 9.
Malabaila Hoffm. °V. 886.
Malabaila Fisch. II. 425.
Malabaila Tsch. V. 886.
— Abyssinica Boiss. V. 888. no. 8.
— Aucheri Boiss. V. 887. no. 4.
— brachytaenia Boiss. V. 888. no. 7.
— *dasyantha* Fisch. et Mey. II. 414. no. 3.
— Golaka Fisch. *II. 425. no. 1.
— graveolens Hoffm. V. 886. no. 1.
— involucrata Boiss. V. 887. no. 5.
— lasiocarpa Boiss. V. 887. no. 6.
— pimpinellifolia Hoffm. V. 887. no. 2.
— platyptera Boiss. V. 887. no. 3.
— *rectistyla* Cesati. II. 414. no. 4. V. 886. no. 1.
Maluche DC. I. 298.
Malachodendron Cav. I. 374.
Malachra L. I. 322. V. 95.
— digitata Prsl. I. 322. no. 4.
Malachra Gaudichaudiana St. Hil. I. 322. no. 6.
— helodes Mart. I. 322. no. 7.
— hispida Guill. et Perr. I. 322. no. 1.
— humilis Bth. V. 95. no. 1.
— ovata Prsl. I. 322. no. 2.
— trinervis Prsl. I. 322. no. 5.
— urticaefolia Prsl. I. 322. no. 3.
Malacomonsili vel Alobahaï Blanco. V. 615. no. 33.
Malacmaea Griseb. V. 189.
— *Fluminensis* Griseb. V. 191. no. 5.
Malacocarpus Fisch. et Mey. II. 824. °V. 394.
— crithmifolius Fisch. et Mey. *II. 824. no. 1. V. 394. no. 1.
Malacomeris Nutt. *II. 700.
Malacomeris Torr. et Gr. II. 690.
— *incana* Nutt. II. 690. no. 2.
Malacothrix DC. II. 690. VI. *360.
— Californica DC. II. 690. no. 1.
— commutata Torr. et Gr. II. 691. no. 5.
— incana Torr. et Gr. II. 690. no. 2.
— saxatilis Torr. et Gr. II. 690. no. 4.
— sonchoides Torr. et Gr. II. 690. no. 3.
— tenuifolia Torr. et Gr. II. 691. no. 6.
Malanea Aubl. *II. 487.
Malcolmia R. Br. I. 160. II. 760.
— Aegyptiaca Spr. *I. 160. no. 2.
— Africana R. Br. I. 160. †
— Chia Lnk. I. 160. †
— Graeca Boiss. II. 760. no. 1.
— *incrassata* DC. I. 124. no. 2.
— intermedia C. A. Mey. I. 160. no. 3.
— littorea R. Br. *I. 160. no. 1. †
β. alyssoides DC.
γ. Broussonetii DC.
— *lyrata* DC. I. 124. no. 1.
— maritima R. Br. I. 160. †
— Meyeri Boiss. I. 160. no. 7.
— pulchella Boiss. *I. 160. no. 6.
— runcinata C. A. Mey. I. 160. no. 4.
— stricta Cambess. I. 160. no. 8.
— strigosa Boiss. I. 160. no. 5.
Malesherbia Rz. et Pav. *II. 223.
— *coronata* D. Don. II. 223. no. 1. γ.
— *dilatata* D. Don. II. 223. no. 2.
— *fasciculata* D. Don. II. 223. no. 1. δ.
— *linearifolia* Poir. II. 223. no. 1.
— *paniculata* Don. II. 223. no. 1. *a.*
—? *subalpina* Poepp. V. 775. no. 1.
MALESHERBIACEAE Don. II. 223. V. 775.
MALESHERBIEAE DC. V. 775.
Mallea Adr. Juss. I. 427.
— Rothii Adr. Juss. *I. 427. no. 1.
Mallococca Forst. V. 120. no. 2.
— *discolor* Fresen. I. 360. no. 2.

Mallococca Tembensis Fresen. I. 360. no. 1.
— *venusta* Fresen. I. 360. no. 3.
Mallophora Endl. IV. 72.
— corymbosa Endl. IV. 72. no. 2.
— globiflora Endl. IV. 72. no. 1.
Malope L. I. 290. V. 88.
— malacoides L. *I. 290. no. 2.
— trifida Cav. *I. 290. no. 1. *V. 88. no. 1.
β. grandiflora Paxton. V. 88. no. 1.
Malopeae Endl. I. 290. V. 88.
Malosma Nutt. I. 551.
Malouetia Alph. DC. VI. 470.
— Tamaquarina Alph. DC. VI. 470. no. 1.
Malpighia Plum. °V. 150.
— *alternifolia* Schum. et Thonn. V. 286. no. 4.
— *altissima* Aubl. V. 167. no. 36.
— *ambigua* Slzm. V. 159. no. 8.
— angustifolia Linn. V. 152. no. 8.
— aquifolia Linn. V. 152. no. 9.
— *argentea* Jcq. V. 193. no. 15.
— *Armeniaca* Cav. V. 189. no. 2.
— biflora Poir. V. 152. no. 12.
— *brachystachya* Spr. V. 175. no. 65.
— *Campechiensis* Poir. V. 153. no. 13.
— *canescens* Ait. V. 193. no. 17.
— *Caucanthus* Poir. V. 357. no. 1.
— *cinerea* Poir. V. 160. no. 16.
— Cnida Spr. V. 151. no. 4.
— coccifera Linn. V. 152. no. 11.
— *coccigera* Linn. V. 152. no. 11.
— *coccolobaefolia* Spr. V. 172. no. 54.
— *coriacea* Swrtz. V. 168. no. 39.
— *cotinifolia* Spr. V. 169. no. 46.
— *crassifolia* Arrabida. V. 160. no. 15.
— *crassifolia* Linn. V. 167. no. 35.
— Cubensis H. B. Kth. V. 152. no. 7.
— *densa* Poir. V. 173. no. 58.
— *diphylla* Jcq. V. 173. no. 60.
— *dubia* Cav. V. 267. no. 36.
— *elegans* F. W. Meyer. V. 187. no. 1.
— *elliptica* Dsvx. V. 279. no. 67.
—? *faginea* Swrtz. V. 336. no. 46.
— *fruticosa* Arrabida. V. 272. no. 51.
— fucata Ker. V. 150. no. 1.
— Galeottiana Adr. Juss. V. 151. no. 5.
— glabra Linn. V. 153. no. 14.
β. acuminata.
— *glandulifera* Jcq. V. 192. no. 13.
— *glandulosa* Cav. V. 192. no. 10.
— *glandulosa* Jcq. V. 193. no. 13.
— *glauca* Poir. V. 184. no. 3.
— *grandifolia* Jcq. V. 194. no. 23.
— *heteranthera* Wgbt. V. 152. no. 11.
— *hirsuta* Poir. V. 186. no. 10.
— *ilicifolia* Mill. V. 152. no. 9.
Malpighia incana Mill. V. 153. no. 13.
— *infestissima* Rich. V. 151. no. 2. β.
— *Japurensis* Martius. V. 174. no. 62.
— *laevigata* Poir. V. 173. no. 57.
— lucida Pav. V. 153. no. 15.
— *lucida* Swrtz. V. 168. no. 40.
— *macrophylla* Dsf. V. 150. no. 1.
— *macrophylla* Juss. V. 164. no. 27.
— *malifolia* Nees et Mart. V. 231. no. 21.
— *maritima* Arrabida. V. 191. no. 5.
— *Martinicensis* Jcq. V. 152. no. 10.
— *media* Ait. V. 192. no. 9.
— Mexicana Adr. Juss. V. 154. no. 18.
— *microphylla* Auctor. V. 152. no. 11.
— *nitida* Jcq. V. 192. no. 9.
—? *obovata* H. B. Kth. V. 335. no. 43.
— *odorata* Jcq. V. 194. no. 20.
— parvifolia Adr. Juss. V. 154. no. 20.
— *Peruviana* Moric. V. 153. no. 15.
— *Piauhiensis* Mart. V. 157. no. 4.
— *polyphylla* Swrtz. V. 193. no. 13.
— *polystachya* Andrws. V. 192. no. 9.
— polytricha Adr. Juss. V. 151. no. 3.
— *punicifolia* Cav. V. 152. no. 12.
— *reclinata* Colla. V. 328. no. 23.
— *reticulata* Poir. V. 266. no. 31.
— *reticulata* Spr. V. 168. no. 39.
— retusa Bth. V. 152. no. 6.
— *rufa* Poir. V. 160. no. 14.
— Semeruco Adr. Juss. V. 153. no. 17.
— setosa Bertero et Spr. V. 152. no. 10.
— *singularis* Arrabida. V. 350. no. 1.
— *spicata* Cav. V. 168. no. 39.
— *ternifolia* H. B. Kth. V. 338. no. 52.
— tomentosa Pav. V. 154. no. 19.
— *tuberculata* Jcq. V. 191. no. 6.
— undulata Adr. Juss. V. 153. no. 16.
— urens Linn. V. 150. no. 2.
β. infestissima } V. 151. no. 2.
γ. megacantha }
— *verbascifolia* Linn. V. 160. no. 15.
— *volubilis* Sims. V. 328. no. 23.
MALPIGHIACEAE Juss. (*I. 408.) V. 147.
Malpighiaceae diplostemones Adr. Juss. V. 150.
Malpighiaceae meiostemones Adr. Juss. V. 344.
Malpighieae Juss. V. 150.
Malus Fresen. II. 53. no. 7.
Malva DC. (ex p.) I. 296.
Malva L. I. 292. II. 788. V. 88.
— *abutiloides* L. I. 296. no. 5.
— *acerifolia* Nutt. I. 296. no. 2.
— Alcea L. I. 296. †
— *Alcea* β. Rchb. I. 296. †
— anomala Lnk. et Otto. I. 294. no. 25.

Malva arborea St. Hil. I. 306. no. 46.
— betuloides Schrad. I. 294. no. 21.
— bismalva Bernh. I. 296. †
— Bivoniana Prsl. I. 293. no. 18.
— Californica Prsl. I. 295. no. 36.
— campanulata Hort. V. 89. †
— circinnata Viv. I. 292. no. 4.
— concinna Knwls. et Westsc. I. 295. no. 42.
— costata Prsl. I. 295. no. 39.
— Crecana Hort. I. 293. no. 14. V. 89. †
— crispa L. I. 295. †
— digitata Torr. et Gr. I. 292. no. 7.
— echinata Prsl. I. 292. no. 5.
— erodiifolia Prsl. I. 295. no. 38.
— excisa Rchb. I. 296. † cum diagn.
— fasciculata Nutt. I. 294. no. 23. (III. Emend. p. 2.)
— fastigiata Cav. I. 296. †
— *geranioides* Gill. I. 296. no. 2.
— geranioides Schlchtd. II. 788. no. 1.
— glomerata Hook. et Arn. I. 295. no. 34.
— Haenkeana Prsl. I. 295. no. 40.
— hederacea Dougl. I. 292. no. 2.
— hirsuta Prsl. I. 293. no. 17.
— Hornschuchiana Wlprs. V. 89. no. 3.
— horrida Spanoghe. I. 294. no. 29.
— Hougtonii Torr. et Gr. I. 294. no. 31.
— humilis Gill. I. 293. no. 10.
— incana Prsl. I. 295. no. 37.
— Italica Poll. I. 296. †
— lasiocarpa St. Hil. et Naud. II. 788. no. 3.
— littoralis Deth. I. 296. †
— lucida Lindl. I. 293. no. 20.
— macrostachya Prsl. I. 295. no. 35.
— malachroides Hook. et Arn. I. 294. no. 30.
— malvensis Edgw. I. 294. no. 26.
— Mauritiana L. I. 296. †
— microcarpa Desf. I. 295. †
— Munroona Lindl. I. 294. no. 24. V. 89. †
— Morenii Poll. I. 296. †
— moschata L. I. 296. †
— Nicaeensis All. I. 296. †
— nodosa Wahlnbrg. I. 293. no. 19.
— *nuttalioides* Croom. I. 292. no. 6.
— obtusa Torr. et Gr. I. 294. no. 22.
— obtusifolia Wlprs. V. 89. no. 2.
— odorata Westc. (?) I. 293. no. 13.
— Papaver Cav. *I. 292. no. 6.
— pedata Torr. et Gr. I. 292. no. 8.
  β. umbellata I. 293. no. 8.
— peduncularis Hook. et Arn. I. 293. no. 11.
— pinnatipartita St. Hil. et Naud. II. 788. no. 2.
— plicata Nutt. I. 232. no. 3.
— plumosa Prsl. I. 295. no. 41.
— Preissiana Miq. V. 88. no. 1.
Malva pseudo-lavatera B. Webb et Berth. I. 291. no. 11.
— ptarmicaefolia St. Hil. et Naud. II. 789. no. 4.
— purpurata Lindl. I. 293. no. 9.
— ribifolia Schlchtd. I. 295. no. 33.
— rivularis Dougl. I. 294. no. 32.
— *rosea* Rxb. I. 293. no. 15.
— rotundifolia L. *I. 293. no. 15. (c. varr. *a.* et *β.*) I. 295. †
— ruderalis Blume. I. 294. no. 27.
— sylvestris L. I. 296. †
— sulphurea Gill. I. 292. no. 1.
— tenuifolia Hook. et Arn. I. 293. no. 12.
— Timorensis Blume. I. 294. no. 28.
— tomentella Prsl. I. 293. no. 16.
— *triangulata* Leavenw. I. 292. no. 6.
— vulgaris Fries. I. 296. †
Malvacea? Schlchtd. I. 299. no. 17.
MALVACEAE Juss. I. 290. II. 788. V. 88.
Malvavisci DC. I. 301. ex p.
Malvaviscoïdes Endl. I. 301.
Malvaviscoidea DC. (Pavonia) II. 790. no. 10.
Malvaviscus Dill. I. 307. V. 92.
— acerifolius Prsl. I. 307. no. 1.
— brevipes Bth. V. 92. no. 1.
— populifolius Prsl. I. 307. no. 2.
— pulvinatus A. Rich. I. 307. no. 5.
— Sagraeanus A. Rich. I. 307. no. 4.
— sepium Schlchtd. I. 307. no. 3.
Malveae Endl. I. 290. V. 88.
Malvinda Medic. V. 94. no. 11.
Mamillaria cf. Mammillaria.
Mammea L. I. 394.
— Africana G. Don. I. 394. no. 2.
— Americana L. *I. 394. no. 1.
Mammillaria Haw. II. 283. II. 936. V. 809.
— acanthoplegma Lehm. II. 289. no. 54.
— acanthostephes Lehm. II. 286. no. 30.
— acicularis Lem. II. 300. no. 158.
— aciculata Otto. II. 290. no. 63.
— aeruginosa Scheidw. II. 298. no. 143.
— affinis DC. II. 285. no. 16.
— albida Haage. II. 289. no. 59.
— ancistracantha Lem. II. 295. no. 116.
— ancistria Lem. II. 296. no. 122.
— *ancistroides* Lehm. II. 292. no. 83.
— ancistroides Lem. II. 296. no. 121.
— angularis Hort. Berol. II. 285. no. 17.
— *anisacantha* Hort. II. 286. no. 32.
— *atrata* Hort. II. 290. no. 68.
— atrata Hort. Mack. II. 295. no. 109.
— aulacothele Lem. II. 302. no. 174.
  β. sulcimamma Pfeiff.
— *aulacothele* var. *multispina* Scheidw. II. 302. no. 174. β.

Mammillaria aurata Hort. II. 290. no. 68.
— aureiceps Lem. II. 300. no. 154.
— Beneckei C. Ehrnbrg. V. 811. no. 11.
— Bergii Miq. II. 293. no. 94.
— bicolor Lehm. II. 289. no. 56.
— biglandulosa Pfeiff. II. 302. no. 175.
— bihamata Pfeiff. II. 298. no. 138.
— brevimamma Zucc. II. 291. no. 78.
— caespititia DC. II. 291. no. 81.
— *caespitosa* Hort. II. 283. no. 1.
— candida Scheidw. II. 297. no. 128.
— *canescens* H. Berol. II. 291. no. 73.
— *canescens* Hort. II. 289. no. 58.
— caput Medusae Otto. II. 287. no. 43.
— carnea Zucc. II. 287. no. 36.
— *cataphracta* Mart. II. 285. no. 16.
— Celsiana Lem. II. 301. no. 166.
— centricirrha Lem. II. 297. no. 134.
β. macrothele.
— centrispina Pfeiff. II. 287. no. 38.
— ceratocentra Berg. II. 301. no. 170.
— *ceratophora* Lehm. II. 286. no. 25.
— chrysacantha Otto. II. 289. no. 60.
— cirrhifera Mart. II. 285. no. 20.
— *cirrhifera spinis fuscis* H. Monac. II. 285. no. 21.
— clava Pfeiff. II. 295. no. 117.
— clavata Scheidw. II. 296. no. 126.
— columnaris Mart. II. 284. no. 9.
— *compressa* DC. II. 285. no. 17.
— *confinis* Haage. II. 289. no. 59.
— conica Haw. II. 292. no. 87.
— conoidea DC. II. 291. no. 79.
— conopsea Scheidw. II. 299. no. 146.
β. longispina Scheidw.
— cornifera DC. II. 291. no. 76.
— coronaria Haw. II. 291. no. 74.
— coronata Scheidw. II. 302. no. 171.
— crassispina Pfeiff. II. 297. no. 133.
— crebrispina DC. II. 291. no. 80.
— *criniformis* DC. II. 292. no. 83.
— crinita DC. II. 292. no. 85.
— crocidata Lem. II. 298. no. 137.
— crucigera Mart. II. 288. no. 50.
— *curvata* Hort. Berol. II. 286. no. 27.
— cylindracea DC. II. 291. no. 70.
— *cylindrica* Hort. II. 290. no. 69.
— *daimonoceras* Lem. II. 291. no. 76.
— decipiens Scheidw. II. 297. no. 127.
— deflexispina Lem. II. 297. no. 136.
— *densa* Lk. et Otto. II. 283. no. 1.
— *depressa* DC. II. 289. no. 58.
— depressa Scheidw. II. 301. no. 167.
— *diacantha* Lem. II. 287. no. 43.
— *diacantha nigra* Haage. II. 289. no. 53.
— diadema Mühlenpfordt. V. 810. no. 5.
Mammillaria diaphanacantha Lem. II. 301. no. 168.
— disciformis DC. II. 287. no. 44.
— discolor Haw. II. 289. no. 58.
β. prolifera.
— divergens DC. II. 285. no. 19.
— dolichocentra Lem. II. 300. no. 153. V. 812. †
— Dyckiana Zucc. II. 289. no. 55.
— *echinaria* DC. II. 283. no. 1.
— echinata DC. II. 283. no. 1.
β. densa DC.
— echinocactoides Pfeiff. II. 299. no. 151.
— *echinops* Hort. II. 296. no. 124.
— Ehrenbergii Pfeiff. II. 293. no. 99.
— elegans DC. II. 289. no. 52.
γ. globosa DC.
β. minor DC.
— elephantidens Lem. II. 294. no. 101. V. 812. †
— elongata DC. II. 283. no. 2.
— erecta Lem. II. 302. no. 172. V. 812. †
— eriacantha Otto. II. 290. no. 69.
— *criantha* Hort. II. 290. no. 69.
— *erinacea* Wendl. II. 290. no. 69. δ.
— exsudans Zucc. II. 286. no. 27.
— Fennelii Hopfer. II. 296. no. 118.
— Fischeri Pfeiff. II. 287. no. 40.
— flavescens DC. II. 284. no. 12.
— floribunda Hook. II. 295. no. 110.
— *formosa* A. Dietrich. V. 810. no. 1.
— formosa Galeotti. II. 299. no. 147.
— fulvispina Haw. II. 290. no. 65.
— Funkii Scheidw. II. 298. no. 139.
— fuscata H. Berol. II. 289. no. 61.
— *Galeottii* Otto. II. 301. no. 162.
— geminata Scheidw. II. 299. no. 149.
— *geminispina* DC. II. 289. no. 54.
— *geminispina* Haw. II. 289. no. 56.
—? gibbosa S. Dyck. II. 292. no. 86.
— gladiata Mart. II. 286. no. 24.
— glochidiata Mart. II. 292. no. 83.
β. purpurea Scheidw.
γ. sericata Lem.
— *glochidiata* var. *aurea* Hort. II. 292. no. 84.
— *glochidiata* var. *purpurea* Scheidw. II. 304. no. 186.
— *glochidiata* var. *sericata* Lem. II. 304. no. 186.
— glomerata DC. II. 293. no. 90.
— gracilis Pfeiff. II. 302. no. 176.
— grandiflora Otto. II. 291. no. 73.
— Guilleminiana Lem. II. 300. no. 160.
— Haageana Pfeiff. II. 289. no. 53.
— hamata Lehm. II. 291. no. 75.

Mammillaria Heinei C. Ehrenbrg. V. 811. no. 12.
— helicteris DC. II. 292. no. 89.
— *heteracantha* H. Berol. II. 285. no. 22.
— hexacantha S. Dyck. II. 290. no. 66.
— Hoffmannseggiana Hffmsgg. *II. 304. no. 187.
— Humboldtii Ehrnbrg. II. 294. no. 106.
— *hybrida* Hortor. II. 290. no. 68.
— imbricata Wegener. V. 811. no. 9.
— *impexicoma* Lem. II. 285. no. 23.
— inconspicua Scheidw. II. 301. no. 168.
— incurva Scheidw. II. 303. no. 184.
— intertexta DC. II. 284. no. 5.
— *inuncta* Hffmsgg.? II. 290. no. 68. γ.
— inuncta Hffmsgg. *II. 304. no. 188.
— irregularis DC. II. 285. no. 15.
— *Jalappensis* Hortor. II. 286. no. 32.
— Karwinskiana Mart. II. 287. no. 37.
— Klugei Ehrnbrg. V. 811. no. 13.
— Krameri Mühlenpfordt. V. 810. no. 7.
— Kunthii Ehrnbrg. V. 812. no. 15.
— lanifera Haw. II. 292. no. 88.
— latimamma DC. II. 286. no. 29.
— *Lehmanni* Hortor. II. 286. no. 26.
— Lehmanni H. Berol. II. 288. no. 47.
— *leucacantha* DC. II. 288. no. 47.
— leucocentra Berg. II. 297. no. 131.
— leucotricha Scheidw. II. 299. no. 150.
— longimamma DC. II. 288. no. 45.
β. hexacentra Berg.
— longiseta Mühlenpfordt. V. 810. no. 4.
— longispina Rchb. II. 301. no. 162.
— loricata Mart. II. 285. no. 22.
— Ludwigii Ehrnbrg. II. 299. no. 144.
β. clavata.
— *macrantha* DC. II. 287. no. 39.
— macrothele Mart. II. 288. no. 48.
— magnimamma Haw. II. 286. no. 25.
— Martiana Pfeiff. II. 303. no. 181.
— Meisneri Ehrnbrg. V. 811. no. 14.
— micracantha Miq. II. 294. no. 108.
— microceras Lem. II. 393. no. 96.
— minima Terscheck. II. 301. no. 163.
— mitis Mill. *II. 293. no. 92.
— mutabilis Scheidw. II. 298. no. 140.
— *Mystax* Hort. II. 287. no. 35.
— Mystax Mart. II. 287. no. 42.
— Neumanniana Lem. II. 297. no. 135.
— nitida Scheidw. II. 297. no. 130.
— nivea Wendl. II. 289. no. 57.
— nivosa Lk. II. 285. no. 14.
— nobilis Pfeiff. II. 302. no. 177.
— nuda DC. II. 293. no. 91
— obconella Scheidw. II. 303. no. 183.
β. Galeottii.
Mammillaria octacantha DC. II. 288. no. 47.
— Odieriana Lem. II. 301. no. 161.
— oothele Lem. II. 296. no. 124.
— *oothele* Lem. ? II. 296. no. 125.
— Ottonis Pfeiff. II. 295. no. 112.
— ovimamma Lem. II. 296. no. 125.
— pallescens Scheidw. II. 294. no. 102.
— Parkinsonii Ehrnbrg. II. 299. no. 152.
— *Parmentieri* H. Berol. II. 285. no. 13.
— parvimamma Haw. II. 284. no. 10.
— pentacantha Pfeiff. II. 298. no. 141.
— *Perote* Hort. II. 289. no. 53.
— Pfeifferiana Vriese. II. 303. no. 178.
γ. altissima Scheidw.
β. dichotoma Scheidw.
δ. flaviceps Scheidw.
α. fulvispina Scheidw.
ε. variabilis Scheidw.
— phaeacantha Lam. II. 196. no. 123.
— phymatothele Berg. II. 295. no. 114.
— Plaschnickii Otto. II. 288. no. 49.
— polycentra Berg. II. 297. no. 132.
— polycephala Mühlenpfordt. V. 810. no. 6.
— polyëdra Mart. II. 286. no. 31.
— *polygona* Zucc. II. 286. no. 32.
— polythele Mart. II. 284. no. 7.
— polytricha S. Dyck. II. 304. no. 185.
α. hexacantha.
β. tetracantha.
— prolifera Haw. II. 284. no. 13.
— *prolifera* Hort. II. 284. no. 10.
— *pulchella* H. Berol. II. 289. no. 58.
— *pulchra* Haw. II. 290. no. 64.
— pusilla DC. II. 292. no. 82.
β. major.
— pycnacantha Mart. II. 286. no. 28. *II. 936. no. 1.
— *pyramidalis* H. Berol. II. 290. no. 68. ζ.
— pyrrhocephala Scheidw. II. 299. no. 148.
— pyrrhochracantha Lem. II. 300. no. 155.
— quadrispina Mart. II. 284. no. 8.
— radians DC. II. 285. no. 23.
β. globosa Scheidw.
— recurva Lehm. II. 286. no. 26.
— recurvispina Vriese. II. 301. no. 165.
— retusa H. Belg. II. 293. no. 98.
— rhaphidacantha Lem. II. 295. no. 115.
— rhodantha Lk. et Otto. II. 290. no. 68.
γ. Andreae Otto.
ε. neglecta H. Berol.
β prolifera Pfeiff.
ζ. rubens Pfeiff.
δ. Wendlandii Pfeiff.
— rhodocentra Lem. II. 300. no. 156. *V. 812. no. 17.
— *rosea* Scheidw. II. 296. no. 121. V. 812. no. 17.

Mammillaria ruticeps Lem. II. 300. no. 159.
— rutila Zucc. II. 290. no. 62.
β. octospina Scheidw.
— scepontocentra Lem. II. 300. no. 157.
— Scheidweileriana Otto. *II. 304. no. 186.
— Scheerii Mühlenpfordt. V. 810. no. 3.
— Schelhasii Pfeiff. II. 296. no. 119.
— *Schiedeana* Hort. II. 286. no. 25.
— Schlechtendalii Ehrnbrg. II. 294. no. 107.
— scolymoides Scheidw. II. 295. no. 113.
— Seidelii Tersch. II. 301. no. 164.
— Seitziana Mart. II. 286. no. 33.
— *Seitziana* Miq. II. 293. no. 94.
— *Sempervivi* DC. II. 287. no. 43.
— sericata Lem. II. 294. no. 105.
— setosa Pfeiff. II. 290. no. 67.
— simplex Haw. II. 284. no. 11.
— speciosa Vriese. II. 303. no. 179.
— spectabilis Mühlenpfordt. V. 810. no. 2.
— sphacelata Mart. II. 284. no. 6.
— sphaerotricha Lem. II. 296. no. 120.
— spinosissima Lem. II. 302. no. 173.
— stella aurata Mart. II. 294. no. 100.
— stellaris Hortor. II. 292. no. 82.
— *stellata* Hort. II. 301. no. 163.
— stenocephala Scheidw. II. 294. no. 103.
— stipitata Scheidw. II. 301. no. 169.
— *straminea* Haw. II. 284. no. 12.
— subangularis DC. II. 285. no. 21.
— subcrocea DC. II. 284. no. 4.
— subcurvata Alb. Dietr. V. 809. no. 1.
— subpolyëdra S. Dyck. II. 286. no. 32.
— subtetragona Alb. Dietr. II. 293. no. 93.
— sulco-lanata Lem. II. 293. no. 95.
— *sulco-lanata* var.? Hort. II. 300. no. 157.
— *supertextu* Hort. II. 289. no. 52.
— supertexta Mart. II. 288. no. 51. (c. var. β. ibid.)
— tecta Miquel. II. 303. no. 180.
— tenuis DC. II. 284. no. 3.
— *tenuis var. β.* Pfeiff. II. 294. no. 100.
— tentaculata Otto. II. 290. no. 64.
— tetracantha S. Dyck. II. 287. no. 34. V. 812. †
— thelocamptos Lehm. II. 295. no. 111.
— *Toaldoae* Lehm. II. 289. no. 57.
— *Tortolensis* Hort. Berol. II. 285. no. 14.
— triacantha DC. II. 285. no. 18.
— *turbinata* Hook. II. 322. no. 105.
— turbinata Hook. II. 936. no. 2.
— uberiformis Zucc. II. 298. no. 46.
— uncinata Zucc. II. 291. no. 77.
— versicolor Scheidw. II. 299. no. 145.
— vetula Mart. II. 291. no. 71.
— villifera Otto. II. 287. no. 35.
— virens Scheidw. II. 294. no. 104.
Mammillaria vivipara Haw. II. 291. no. 72.
Webbiana Lem. II. 293. no. 97.
— Wegeneri C. Ehrnbrg. V. 811. no. 10.
— Wildiana Otto. II. 292. no. 84.
— Woburnensis Scheer. V. 810. no. 8.
— xanthotricha Scheidw. II. 298. no. 142. (c. var. β. ibid.)
— Zegschwitzii Tersch. II. 303. no. 182.
— zephyranthoides Scheidw. II. 297. no. 129.
— Zepnickii C. Ehrenbrg. V. 812. no. 16.
— Zuccariniana Mart. II. 287. no. 39.
Manabea arborescens Aublet. IV. 122. no. 20.
— *laevis* Aublet. IV. 119. no. 6.
— *villosa* Aublet. IV. 121. no. 16.
Manaelia Bodwich. * VI. 447.
Manam podam Rheede. III. 576. no. 1.
Mandragora Tournef. III. 104. °III. 955.
— *acaulis* Gaertn. III. 105. no. 2.
— *autumnalis* Bertol. III. 105. no. 1. et no. 4.
— *foemina* Cast. III. 105. no. 1.
— *fructu rotundo* C. Bauh. III. 105. no. 2.
— *fructu rotundo* Cup. III. 105. no. 1.
— *mas* Fchs. III. 105. no. 2.
— *Maschio* Matth. III. 105. no. 2.
— microcarpa Bertoloni. III. 105. no. 4.
— *officinalis β.* DC. III. 105 no. 3.
— *officinalis* Mill. III. 105. no. 2.
— *officinalis* Moris. III. 105. no. 4.
— officinarum Linn. III. 104. no. 1.
— *officinarum* G. Don. III. 105. no. 2.
— praecox Sweet. III. 105. no. 3.
— vernalis Bertol. III. 105. no. 2.
Μανδράγορας Dioscorid. III. 105. no. 2.
Manettia Mutis. II. 507. VI. 62.
— bicolor Hort. VI. 62. †
— cordifolia Mart. *II. 507. no. 1. VI. 62. †
— *glabra* Cham. et Schlchtd. II. 507 no. 1.
— glandulosa Poepp. et Endl. II. 508. no. 5.
— hirtella Martens et Galeotti. VI. 62. no. 1.
— hispida Poepp. et Endl. II. 508. no. 3.
— micans Poepp. et Endl. II. 508. no. 4.
— multiflora Cham. II. 507. no. 2.
— paniculata Poepp. et Endl. II. 508. no. 6.
Mangifera L. I. 555.
— *domestica* Gaertn. I. 555. no. 3.
— glauca Blume. I. 555. no. 1.
— Indica L. *I. 555. no. 3.
— macrocarpa Blume. I. 555. no. 2.
— *montana* Heyne. I. 555. no. 3.
— *oppositifolia* Rxb. I. 556. no. 1.
— *pinnata* Lam. I. 550. no. 1.
Mangium album Rmph. IV. 132. no. 1.
— *celsum* Rmph. II. 70. no. 1.
digitatum Rmph. II. 70. no. 2.
Mangle Arn. II. 70.

Mangle Laurocerasi foliis etc. Sloane. IV. 132. no. 1.
Manglesia purpurea Lindl. II. 162. no. 3. II. 929. no. 6.
Manglietia Blume. I. 70.
— glauca Blume. *I. 70. no. 1.
Manihot DC. I. 308.
Manopappus C. H. Schultz. °VI. 239.
— anomalus C. H. Schultz. *VI. 239. no. 1.
Mansoa A. P. DC. *VI. 511.
Manulea Linn III. 317. °III. 967. *VI. 642.
— *Aethiopica* Thnbrg. III. 309. no. 3.
— *alternifolia* Dsf. III. 314. no. 24.
— altissima Linn. III. 317. no. 5.
— androsacea E. Mey. III. 317. no. 3.
— *angustifolia* Lnk. et Otto. III. 319. no. 15.
— antirrhinoides Linn. III. 320. no. 26.
— *argentea* Linn. III. 315. no. 13.
— bellidifolia Bth. III. 318. no. 7.
— *Capensis* Thnbrg. III. 309. no. 1.
— *capillaris* Linn. III. 309. no. 5.
— *capitata* Linn. III. 310. no. 2.
— *cephalotes* Thnbrg. III. 312. no. 15. β.
— cephalotes Thnbrg. III. 320. no. 28.
— Cheiranthus Linn. III. 319. no. 23.
β. floribunda Linn. III. 320. no. 23..
— *coerulea* Thnbrg. III. 311. no. 1.
— *cordata* Thnbrg. III. 313. no. 22.
— corymbosa Thnbrg. III. 317. no. 4.
— crassifolia Bth. III. 318. no. 9.
— *crystallina* Weinm. III. 315. no. 10.
— *cuneifolia* Linn. III. 310. no. 1.
— densiflora Bth. III. 318. no. 12.
— *divaricata* Thnbrg. III. 308. no. 12.
— exaltata Bnks. III. 319. no. 22.
— *foetida* Dsf. III. 314. no. 24.
— Gariepina E. Mey. III. 320. no. 25.
— *heterophylla* Linn. III. 310. no. 3.
— hirta Thnbrg. III. 320. no. 29.
— *hispida* Thnbrg. III. 313. no. 20.
— incana Thnbrg. III. 318. no. 8.
— *integrifolia* Linn. III. 313. no. 18.
— *intertexta* Bnks. III. 310. no. 8.
— juncea Bth. III. 318. no. 10.
— leiostachys Bth. III. 318. no. 14.
— *linifolia* Thnbrg. III. 312. no. 13.
— longifolia Bth. III. 317. no. 6.
— *microphylla* Linn. III. 317. no. 25.
— nervosa E. Mey. III. 317. no. 1.
— obovata Bth. III. 319. no. 16.
— *oppositiflora* Vent. III. 313. no. 20.
— paniculata Bth. III. 319. no. 19.
— parviflora Bth. III. 318. no. 13.
— *pedunculata* Bth. III. 315. no. 14.
— *pinnatifida* Linn. III. 316. no. 19.
— *plantaginis* Linn. III. 309. no. 7.
Manulea purpurea Bnks. III. 316. no. 23.
— pusilla E. Mey. III. 320. no. 24.
— *rhynchantha* Lnk. III. 320. no. 23.
— rigida Bth. III. 318. no. 11.
— rubra Linn. III. 318. no. 15.
— silenoides E. Mey. III. 317. no. 2.
β. minor.
— *Sopubia* Hamilt. III. 388. no. 1.
— stellata Bth. III. 319. no. 21.
— Thunbergii G. Don. III. 320. no. 30.
— thyrsiflora Linn. III. 319. no. 18.
— tomentosa Linn. III. 319. no. 17.
— turritis Bnks. III. 319. no. 20.
— *violacea* Lnk. III. 315. no. 10.
— *virgata* Thnbrg. III. 313. no. 17. III. 320. no. 27.
— *viscosa* Willd. III. 310. no. 1.
Manuleae Endl. III. 306. III. 967.
Manuleieae Bth. VI. 641.
Mapouria Aubl. II. 473. no. 20.
Mapouria A. Rich. *II. 475.
Maralia Pet. Thouars. *II. 430.
Maranthes corymbosa Blume. I. 351. no. 1.
Maranthus multiflora Krtbls. V. 115. no. 1.
Marasmodes DC. *II. 642.
Marcellia Martius. *VI. 529.
Marcetia DC. II. 127. V. 699.
— caespitosa St. Hil. II. 127. no. 3.
— excoriata DC. *II. 127. no. 1. (c. var. β. ibid.) *V. 699. no. 1. †
— *glandulosa* DC. II. 127. no. 1.
— *juniperina* DC. II. 127. no. 2.
— taxifolia DC. *II. 127. no. 2.
— *tenuifolia* DC. II. 127. no. 2.
Marcgravia Plum. I. 399. II. 811. V. 146.
— acuminata Miquel. V. 146. no. 1.
— *cacabifera* Rz. et Pav. I. 399. no. 10.
— *Cordachida* Rz. et Pav. I. 399. no. 9.
— cuneifolia Gardn. II. 811. no. 1.
— *macrocarpa* Rz. et Pav. I. 399. no. 11.
— *obovata* Rz. et Pav. I. 399. no. 8.
— umbellata L. *I. 399. no. 1.
— *umbellata* Sieb. I. 399. no. 1.
MARCGRAVIACEAE Juss. I. 398. II. 811. V. 145.
Markea L. C. Rich. III. 14. °III. 953.
— coccinea L. C. Rich. III. 14. no. 1.
Margaranthus Schlchtd. III. 28. °III. 954.
— solanaceus Schlchtd. *III. 28. no. 1.
Margaris DC. *II. 483.
Margotia Boiss. II. 420. V. 900.
— laserpitioides Boiss. *II. 420. no. 1. V. 900. no. 1.
β. Africana II. 420. V. 901.
Margyricarpus Rz. et Pav. II. 44.
— alatus Gill. II. 44. no. 1.

Maria-Antonia Parlatore. °V. 459.
— orientalis Parlatore. V. 460. no. 1.
Marialva Vandelli. I. 392.
— *Brasiliensis* Mart. I. 392. no. 3.
— *fructipendula* Choisy. I. 392. no. 4.
Marialraea Poepp. et Endl. II. 810. no. 1.
— *Amazonica* Poepp. et Endl. I. 392. no. 8.
— *macrophylla* Poepp. et Endl. I. 392. no. 10.
— *microcarpa* Poepp. et Endl. I. 392. no. 9.
Marianthus Hügel. I. 256. V. 72.
— angustifolius Putterl. V. 72. no. 2.
— candidus Hügel. I. 256. no 1.
— coelestis Putterl. I. 256. no. 4.
— coeruleo-punctatus Lk. Kltzsch. et Otto. I. 256. no. 7. V. 72. †
— erubescens Putterl. I. 256. no. 3.
— floribundus Putterl. I. 256. no. 2.
— pictus Lindl. I. 256. no. 6. *V 72. no. 1.
— venustus Putterl. I. 256. no. 5.
Mariera Boiss. I. 180.
— spinosa Boiss. I. 180. no. 1.
— virgata Boiss. I. 180. no. 2.
Marignia Commers. *I. 558.
Marila Swtz. I. 374. V. 133.
— macrophylla Bth. V. 133. no. 1.
— tomentosa Poepp. et Endl. I. 374. no. 1.
Marilalva cf. *Marialva*.
Maripa Aublet. VI. 528.
— densiflora Bth. VI. 528. no. 1.
Maritimae Torr. et Gr. (Solidago). II. 963.
Marlea Rxb. II. 150. II. 919.
— affinis Dcne. II. 919. no. 1.
— begoniaefolia Rxb. *II. 150. no. 1.
Marlierea Cambess. II. 177.
— excoriata Mart. II. 177. no. 4.
— glabra Cambess. II. 177. no. 2.
— suaveolens Cambess. II. 177. no. 3.
— tomentosa Cambess. II. 177. no. 1.
Marmoritis Bth. III. 790. °III. 986.
— rotundifolia Royle. III. 790. no. 1.
Maquardtia Vogel. I. 855.
Maquardtia Vogel. V. 556.
— tomentosa Vogel. *I. 855. no. 1.
— *tomentosa* Vogel. V. 557. no. 1.
Marquisia A. Rich. *II. 485.
Marrubiastrae Bth. (Hyptis) III. 541.
Marrubiastrum Mnch. III. 847.
— *elegans* Mnch. III. 854. no. 36.
— *tomentosum* Mnch. III. 848. no. 4.
Marrubieae Endl. III. 847. III. 988. VI. 682.
Marrubium Bth. III. 857. VI. 672.
Marrubium Linn. III. 856. °III. 989. VI. 682.
— *acetabulosum* Linn. III. 863. no. 4.
— *affine* Hornem. III. 859. no. 16.
— *Africanum* Linn. III. 862. no. 1.
— *album Amboinicum* Rumph. III. 515. no. 5.
Marrubium Alysson Linn. III. 857. no. 6.
— *angustifolium* Moench. III. 860. no. 22.
— *Apulum* Ten. III. 861. no. 26. β.
— Astracanicum Jacq. III. 858. no. 10.
— *Astracanicum* M. Bieb. III. 859. no. 16.
— brachyodon Boiss. VI. 682. no. 1.
— candidissimum Linn. III. 860. no. 20.
— catariaefolium Desr. III. 857. no. 9.
— *catariaefolium* Rchb. III. 860. no. 20.
— cinerascens Fisch. *III. 862.
— *cinereum* Desr. III. 864. no. 7. β.
— *cinereum* Hortul. III. 864. no. 6.
— *circinnatum* Desr. III. 861. no. 27.
— coerulescens Desf. III. 857. no. 8.
— crassidens Boiss. III. 858. no. 14.
— *Creticum* Mill. III. 860. no. 22.
— *crispum* Desr. III. 864. no. 7.
— *crispum* Linn. III. 863. no. 1.
— cuneatum Russ. III. 861. no. 25.
— eriostachyum Bth. III. 856. no. 2.
— flavum Wlprs. III. 856. no. 4.
— *flexuosum* Moench. III. 860. no. 20.
— *folio palmato vel digitato* Vaill. III. 857. no. 5.
— *Germanicum* Schrank. III. 861. no. 26.
— globosum Montbr. et Auch. III. 859. no. 15.
— *hamatum* H. B. Kth. III. 861. no. 26.
— *hirsutum* Willd. III. 864. no. 7.
— *Hispanicum* Linn. III. 864. no. 6. III. 865. no. 13.
— *Hispanicum etc.* Tournef. III. 860. no. 21.
— *humile* Desf. III. 864. no. 9.
— *incanum* Desr. III. 860. no. 20.
— incisum Bth. III. 856. no. 1.
— *Indicum* Burm. III. 815. no. 5.
— Kotschyi Boiss. III. 858. no. 11.
— lanatum Bth. III. 856. no. 3.
— leonuroides Desr. III. 859. no. 16.
— lutescens Boiss. III. 858. no. 13.
— *microphyllum* Desr. III. 864. no. 8.
— *mollissimum* D. Don. III. 870. no. 8.
— *nigrum* Crantz. III. 865. no. 14.
— *odoratissimum* Pourr. III. 860. no. 20.
— *orientale* Spr. III. 866. no. 21.
— *paniculatum* Desr. III. 861. no. 23.
— Pannonicum Clus. III. 860. no. 23.
— parviflorum Fisch. et Mey. III. 862. no. 28.
— *pauciflorum* Wallrth. III. 860. no. 22.
— peregrinum Linn. III. 860. no. 22.
— *peregrinum* C. A. Mey. II. 862. no. 28.
— *peregrinum* Rchb. III. 860. no. 20.
— *peregrinum* Spreng. III. 861. no. 23.
— Persicum C. A. Mey. III. 857. no. 7.
— *plicatum* Forsk. III. 857. no. 6.
— plumosum C. A. Mey. III. 859. no. 17.
— propinquum Fisch. et Mey. III. 862. no. 29.

Marrubium Pseudodictamnus Linn. III. 863. no. 2.
— *Pseudodictamnus* Steud. III. 863. no. 4.
— radiatum Delile. III. 861. no. 24.
— *remotum* Kit. III. 861. no. 23.
— rotundifolium Boiss. III. 858. no. 12.
— *rubrum* Roth. III. 861. no. 23.
— *rugosum* Desf. III. 864. no. 9.
— *rugosum* Russ. III. 865. no. 11.
— *rugosum* var. Russ. III. 864. no. 10.
— *rupestre* Biv. III. 865. no. 13.
— *saxatile* Rafin. III. 865. no. 13.
— *scrophulariaefolium* Hortul. III. 864. no. 6.
— *scrophulariaefolium* Lag. III. 865. no. 13.
— sericeum Boiss. III. 860. no. 21.
— *setaceum* Desr. III. 860. no. 20.
— *suffruticosum* Mill. III. 863. no. 4.
— supinum Linn. III. 859. no. 19.
— *Thouini* Schult. III. 863. no. 1.
— *uncinatum* Hornem. III. 860. no. 20.
— *undulatum* Fresen. III. 863. no. 3.
— undulatum Sieb. *III. 862.
— Vaillantii Cosson et Germain. III. 857. no. 5.
— *velutinum* Sibthrp. et Sm. III. 843. no. 129.
— velutinum Sibthrp. et Sm. III. 859. no. 18.
— vulgare Linn. III. 861. no. 26.
β. lanatum.
Marsdenia R. Br. *VI. 492.
Marshallia Schreb. II. 630.
— caespitosa Nutt. *II. 630. no. 1.
Marsypianthes Mart. III. 523. °III. 978. VI. 658.
— glomerata Prsl. VI. 658. no. 3.
— hyptoides Mart. III. 523. no. 1. VI. 658. no. 1.
— secundiflora Mart. et Gal. VI. 658. no. 4.
— sessiliflora Prsl. VI. 658. no. 2.
Martia Leandro. I. 752.
— *Mexicana* Zucc. II. 900. no. 1.
— *physalodes* Leandr. I. 752. no. 5.
Martiusia Bth. I. 841. V. 562.
— excelsa Bth. I. 841. no. 1.
— parvifolia Bth. I. 841. no. 2. *V. 562. no. 1.
Martynia Linn. VI. 518.
— althaeaefolia Bth. VI. 519. no. 2.
— fallax Knze. VI. 518. no. 1.
Marum Aegyptiacum Vesling. III. 614. no. 56.
Marumia Blume. II. 145. V. 716.
— affinis Krthls. V. 716. no. 1.
— Jackii Krthls. V. 717. no. 5.
— leprosa Krthls. V. 717. no. 2.
— muscosa Blume. *II. 145. no. 1.
— nemorosa Blume. *II. 145. no. 4.
— pachygna Krthls. V. 717. no. 3.
— stellulata Blume. *II. 145. no. 3.
Marumia vulcanica Krthls. V. 717. no. 4.
— Zeylanica Blume. II. 145. no. 2.
Maruta Cass. II. 634.
— fuscata DC. *II. 634. no. 1.
Mascagnia Bertero. V. 320.
— *Americana* Bertero. V. 321. no. 3.
— *oblongifolia* Bertero. V. 321. no. 2.
Mascarenhasia Alph. DC. VI. 478.
— lisianthiflora Alph. DC. *VI. 478. no. 1.
Maschalogalium DC. II. 456.
Moschalostachys Bth. III. 762.
Mastacanthus Endl. IV. 3. VI. 686.
— Sinensis Endl. IV. 3. no. 1. *VI. 686. no. 1.
Mastichina Bth. III. 697.
Mastigophorus Cass. *II. 682.
Mastixia Blume. *II. 436.
Masus G. Don. III. 272.
— *dentatus* G. Don. III. 272. no. 3.
— *laevifolius* G. Don. III. 272. no. 5.
— *pumilio* G. Don. III. 272. no. 4.
— *rugosus* G. Don. III. 272. no. 2.
— *surculosus* G. Don. III. 272. no. 1.
Matayba Aubl. *I. 418.
Matelea Aubl. VI. 489.
— latifolia Aublet. *VI. 489. no. 1.
Matisia H. B. Kth. I. 332.
— oblongifolia Poepp. et Endl. I. 332. no. 1.
Matourea Bth. III. 278.
— *nigrescens* Bth. III. 280. no. 10.
— *pratensis* Aubl. III. 280. no. 11.
Matricaria DC. (ex p.) II. 636. adn.
Matricaria Linn. * II. 636. °VI. 193.
— *argentea* Linn. VI. 223. no. 4.
— *atrata* Schrank. VI. 224. no. 49.
— Chamomilla Linn. *VI. 194. no. 1.
— *Chamomilla β. coronata* Boiss. VI. 194. no. 3.
— *coronata* Gay. VI. 194. no. 3.
— corymbifera DC. *VI. 194. no. 5.
— *corymbosa* Desvx. VI. 222. no. 35.
— Courrantiana DC. *VI. 194. no. 3.
— *disciformis* DC. VI. 197. no. 2.
— *discoidea* DC. II. 642. no. 1.
— discoidea DC. *VI. 194. no. 4.
— *foliis bipinnatis, pedunculis solitariis* Linn. VI. 223. no. 42.
— *frutescens* Desrouss. VI. 201. no. 4.
— *glabrata* DC. VI. 208. no. 1.
— *graminifolia* Desvx. VI. 192. no. 1. B.
— *Halleri* Poir. VI. 224. no. 49.
— *inciso-serrata* Poir. VI. 192. no. 1.
— *inodora* Linn. II. 636. no. 3. adn. VI. 197. no. 1.
— Kochiana C. H. Schultz. *VI. 194. no. 1.
— *monoleucanthemos foliis argenteis etc.* Vaill. VI. 223. no. 42.

Matricaria montana Desvx. VI. 191. no. 1. *β.*
— *Myconis* Desrouss. VI. 206. no. 1.
— *nigellaefolia* DC. VI. 207. no. 1.
— *officinalis* Linn. II. 636. no. 1. adn.
— oreades Boiss. VI. 194. no. 7.
— *orientalis Tanaceti folio etc.* Tournef. VI. 222. no. 38.
— *Parthenium* Linn. VI. 222. no. 31.
— *pinnatifida β.* Desrouss. VI. 199. no. 2.
— *pinnatifida* Desrouss. VI. 199. no. 1.
— *praecox* DC. VI. 195. no. 1.
— *praecox* C. Koch. II. 636. no. 4. adn.
— *pusilla* Willd. II. 636. no. 2. adn. VI. 194. no. 3.
— *pyrethroides* DC. VI. 194. no. 3.
— *segetum* Schrank. VI. 207. no. 1.
— *suaveolens* L. v. Buch. VI. 194. no. 3.
— *suaveolens* Linn. VI. 194. no. 1.
— suaveolens Sm. *VI. 194. no. 6.
— *tanacetifolia* Lam. VI. 222. no. 38.
— *Tanaceti folio, semine umbilicato* Tourn. VI. 222. no. 35.
— *tanacetoides* Fisch. et Mey. VI. 194. no. 4.
— *tenella* DC. VI. 196. no. 2.
— trichophylla Boiss. VI. 195. no. 8.
Matthewsia Hook. I. 174.
— foliosa Hook. *I. 174. no. 1.
Matthiola R. Br. I. 123.
— acaulis Balb. I. 123. no. 1.
— angulosa Boiss. I. 124. no. 7.
— Arabica Boiss. I. 124. no. 6.
— chenopodiifolia Fisch. et Mey. I. 123. no. 2.
— deflexa Bnge. I. 123. no. 3.
— Euboea Boiss. I. 123. no. 5.
— incana R. Br. I. 124. †
— linearis Delile. I. 123. no. 4.
— odoratissima R. Br. I. 124. †
— parviflora R. Br. I. 124. †
— sinuata R. Br. I. 124. †
— tricuspidata R. Br. I. 124. †.
— tristis R. Br. I. 124. †
— *tristis* Dcne. I. 124. no. 6.
— varia DC. I. 124. †
Mattia Schultes. *VI. 564.
Mattuschkea galioides H. B. Kth. II. 468. no. 3.
— *hispida* H. B. Kth. II. 467. no. 2.
Mauchartia Neck. II. 392. no. 1.
Maurandia Ortega. III. 229. °III. 959. *VI. 638.
— antirrhiniflora Willd. III. 229. no. 3.
— Barcleyana Lindl. III. 229. no. 1.
— *personata* Sessé. III. 229. no. 3.
— *scandens* Pers. III. 229. no. 2.
— semperflorens Ortega. III. 229. no. 2.
—? stricta Hook. et Arn. III. 229. no. 4.
Maurellia (Solanum) Dunal. III. 47.
Mauria Kth. *I. 551. V. 413.
— *simplicifolia* H. B. Kth.? I. 551. no. 1
— suaveolens Poepp. et Endl. V. 413. no. 1.
Maximiliana regina Mart. et Schrnk. I. 367. no. 2.
Maycockia Alph. DC. *VI. 466.
Mayepea Aubl. *VI. 462.
Mayna Aubl. *I. 92.
Mayna Raddi. I. 203.
— *denticulata* Bth. I. 203. no. 3.
— *laxiflora* Bth. I. 203. no. 2.
— *longifolia* Poepp. et Endl. V. 55. no. 1.
— *paludosa* Bth. I. 203. no. 1.
— *sericea* Spr. I. 75. no. 7.
Maytensillo Feuill. V. 60. no. 3.
Maytenus Feuill. I. 534. II. 827. V. 402.
— aeruifolius Mart. II. 827. no. 6.
— Boaria Molina. I. 534. no. 2.
— Brasiliensis Mart. II. 827. no. 1.
— dasyclados Mart. II. 827. no. 4.
— gonoclados Mart. II. 827. no. 3.
— macrophyllus Mart. II. 828. no. 8.
— nitidus Mart. II. 827. no. 7.
— obtusifolius Mart. II. 827. no. 2.
— *phyllanthoides* Bth. V. 402. no. 1.
— rigidus Mart. II. 827. no. 5.
— uncinatus G. Don. I. 534. no. 1.
Mazus Loureir. III. 272. III. 452. °III. 963. *VI. 642.
— dentatus Wall. III. 272. no. 3.
— laevifolius Blume. III. 272. no. 5.
— *pinnatus* Wall. III. 375. no. 9.
— pumilio R. Br. III. 272. no. 4. (c. varr. *α.* et *β.*) *III. 452. no. 1.
— rugosus Lour. III. 272. no. 2.
— surculosus D. Don. III. 272. no. 1.
Mecardonia pusilla Mart. III. 280. no. 15.
Mecatillo VI. 535. no. 20.
Meckelia Mart. V. 188.
— *multiflora* Mart. V. 189. no. 6.
Meconella Nutt. I. 117.
— Oregana Nutt. *I. 117. no. 1.
Mecones Bernh. I. 113.
Meconopsis DC. I. 110.
Meconopsis Vig. I. 110. V. 20.
— aculeata Royle. I. 110. no. 3.
— crassifolia Bth. I. 110. no. 5.
— diphylla DC. I. 110. no. 6.
— heterophylla Bth. I. 110. no. 4. *V. 20. no. 1.
— Napaulensis DC. *I. 110. no. 1.
— *petiolata* DC. I. 110. no. 6.
— simplicifolia Don. I. 110. no. 2.
Mecopus Bennet. I. 736. V. 524.
— nidulans Bennet. *I. 736. no. 1. V. 524. no. 1.

Medibracteatae Bth. (Acacia) I. 910.
Medicagnieae (Crotalaria) Bth. V. 446.
Medicago Linn. I. 635. II. 847.
— arborea L. I. 636. †
— arborescens Prsl. I. 635. no. 2.
— Berteroana Moris. I. 636. no. 15.
— *brachycarpa* Fisch. I. 637. no. 2.
— *brachyloba* Fisch. I. 637. no. 2.
— ciliaris Willd. I. 636. †
— circinnata L. I. 636. †
— clypeata Lindl. I. 635. no. 5.
— crinita Prsl. I. 636. no. 13.
— cuspidata Tausch. I. 635. no. 7.
— denticulata W. β. tuberculata Moris. et γ. lappacea Moris. I. 636. †
— elegans Jcq. I. 636. †
— Gerardi W. K. I. 636. †
— *glomerata* Fisch. I. 637. no. 2.
— helix Willd. I. 636. †.
— lineata Tausch. I. 635. no. 6.
— littoralis Ten. I. 636. †
— maculata Willd. I. 636. †
— obscura Retz. *I. 635. no. 8.
— obscura Retz. *I. 635. no. 8.
β. aculeata Guss.
— olivaeformis Guss. I. 635. no. 9.
— orbicularis Willd. I. 636. †
— papillosa Boiss. II. 847. no. 3.
— *pilosa* Ser. I. 637. no. 2.
— platycarpos Ledeb. *II. 847. no. 1.
— polycycla Moris. I. 635. no. 10.
— praecox DC. I. 636. †
— prostrata Guss. *I. 635. no. 2.
β. pubescens.
— psilocarpa Trautv. I. 635. no. 1.
— pusilla Viv. I. 636. no. 14.
— rotata Boiss. II. 847. no. 4.
— Ruthenica Ledeb. *II. 847. no. 2.
— Sardoa Moris. I. 636. no. 11.
— scutellata Lam. I. 636. †
— sphaerocarpa Bertol. I. 636. †
— tenuifolia Prsl. I. 635. no. 4.
— tetracycla Prst. I. 636. no. 12.
— tribuloides Lam. I. 636. †
β. breve aculeata Moris. I. 636. †
— tuberculata Willd. I. 636. †
— turbinata Willd. I. 636. †
— *Virginica* L. I. 748. no. 12. γ.
Medinilla Gaudich. II. 142. V. 711.
— alpestris Blume. *II. 142. no. 13.
— crassifolia Blume. *II. 142. no. 7.
— bracteata Blume. II. 143. no. 21.
— crassifolia Blume. *II. 142. no. 7.
β. diaphna.
— *crassifolia* Reinw. II. 142. no. 6.
— crassinervia Blume. II. 142. no. 4.
Medinilla crispata Blume. *II. 143. no. 19.
— erythrophylla Lindl. II. 143. no. 22. *V. 711. no. 1.
— eximia Blume. *II. 142. no. 16.
— Hasseltii Blume. II. 142. no. 9.
— hypericifolia Blume. *II. 142. no. 11.
— intermedia Blume. II. 143. no. 18.
— Javanensis Blume. *II. 142. no. 15.
— Kuhlii Blume. II. 142. no. 14.
— laurifolia Blume. *II. 142. no. 6.
— macrocarpa Blume. II. 142. no. 5.
— polyantha Krthls. V. 711. no. 2.
— pterocaula Blume. II. 142. no. 3.
— quadrifolia Blume. *II. 142. no. 1.
— radicans Blume. *II. 142. no. 2.
— rosea Gaudich. *II. 143. no. 23.
— rubicunda Blume. *II. 142. no. 8.
— speciosa Blume. II. 142. no. 17.
— succulenta Blume. *II. 142. no. 10.
— venosa Blume. *II. 143. no. 20.
— verrucosa Blume. *II. 142. no. 12.
Medium (Campanula) DC. jun. VI. 383. no. 1.
Meduseae Nutt. (Diodonta) II. 614.
Megacarpaea DC. I. 158.
— laciniata DC. *I. 158. no. 1.
Megacarpha Hochstett. °VI. 73.
— pyriformis Hochstett. *VI. 73. no. 1.
Megacephalae (Hypochoeris) C. H. Schultz. VI. 340.
Megapterium Spach. II. 82.
— *Missouriense* Spach. II. 82. no. 33.
— *Nuttallii* Spach. II. 82. no. 33.
Megasanthes Don. II. 710. no. 1.
Megasiphon (Echites) DC. jun. VI. 477. no. 8.
Meionectis R. Br. II. 98. V. 671.
— Brownii Hook. *II. 98. no. 1. V. 671. no. 1.
Meisneria DC. II. 121.
— arenaria DC. II. 121. †
— cordifolia Bth. II. 121. no. 1.
— paludosa DC. II. 121. †
Melalemma Hook. fil. °VI. 250.
— humifusum Hook. fil. VI. 250. no. 1.
Melaleuca Linn. II. 162. II. 927. V. 745.
— acerosa Schauer. V. 746. no. 6.
— *angustifolia* Gaertn. II. 927. no. 1. V. 745. no. 1.
— aspalathoides Schauer. V. 747. no. 13.
— brachyphylla Schauer. II. 928. no. 7.
— callistemonea Lindl. II. 163. no. 12.
— Cunninghami Schauer. II. 927. no. 3.
— discolor Rchb. II. 162. no. 2.
— *discolor* Sieb. II. 162. no. 2.
— Drummondii Schauer. V. 746. no. 8.
— elegans Hornsch. II. 162. no. 5.
— empetrifolia Rchb. II. 162. no. 1.
— *empetrifolia* Rchb. II. 930. no. 10.

Melaleuca Endlicheriana Schauer. V. 745. no. 2.
— *fascicularis* Labill. V. 738. no. 2.
— Fraseri Hook. I. 162. no. 6.
— Gunniana Schauer. II. 928. no. 6.
— holosericea Schauer. V. 747. no. 12.
— Hügelii Endl. II. 162. no. 7.
— hypochondriaca Dehnhardt. II. 163. no. 17.
— lateritia Alb. Dietr. II. 162. no. 4.
— Lehmanni Schauer. V. 747. no. 15.
— leptospermoides Schauer. V. 746. no. 9.
— Manglesii Schauer. V. 746. no. 4.
— micromera Schauer. V. 748. no. 20.
— mimosoides A. Cunn. II. 927. no. 1.
— *mucronata* Cels. II. 167. no. 10. *α.*
— *nervosa* Hortor. II. 168. no. 18.
— ornata Schauer. V. 746. no. 3.
— parviceps Lindl. II. 163. no. 10.
— parviflora Lindl. II. 163. no. 16.
— *perforata* Räusch. II. 165. no. 5.
— polygaloides Schauer. V. 747. no. 14.
— Preissiana Schauer. V. 747. no. 16.
— propinqua Schauer. II. 928. no. 8.
— pubescens Schauer. II. 928. no. 5.
— pulchella R. Br. II. 163. †
— pungens Schauer. V. 746. no. 7.
— rhaphiophylla Schauer. V. 747. no. 17.
— radula Lindl. II. 163. no. 15.
— saligna Schauer. II. 927. no. 2.
— scabra Spr. II. 163. †
— *scoparia* Forst. II. 167. no. 10.
— *scoparia α. diosmatifolia* Wendl. et Schrad. II. 167. no. 10. *α.*
— *scoparia β.* Wendl. et Schrad. II. 167. no. 10. *β.*
— semiteres Schauer. V. 747. no. 18.
— Sieberi Schauer. II. 928. no. 4.
— spathulata Schauer. V. 745. no. 1.
— spinosa Lindl. II. 163. no. 14.
— sprengelioides DC. II. 163. †
— *sprengelioides* DC. II. 928. no. 1. V. 748. no. 1.
— striata Lindl. II. 162. no. 9.
— styphelioides Sm. II. 163. †
— subtrigona Schauer. V. 746. no. 11.
— *tenuifolia* Wendl. II. 168. no. 13.
— tenuissima Tausch. II. 162. no. 3.
— teretifolia Endl. II. 162. no. 8.
— *teretifolia* Endl. II. 927. no. 1. V. 745. no. 1.
— *Thea* Wendl. et Schrad. II. 168. no. 20.
— *thymifolia* Bot. Mag. II. 162. no. 2.
— thymifolia Sm. II. 163. †
— trichophylla Lindl. II. 163. no. 11.
— tuberculata Schauer. V. 746. no. 10.
— viminea Lindl. II. 163. no. 13.
Melaleuca violacea Schauer. V. 748. no. 19.
— *virgata* Linn. fil. V. 735. no. 2.
— Waeberi Rchb. V. 746. no. 5.
Melaleuceae Schauer. II. 927. V. 744.
Melampodieae DC. II. 603. II. 605. II. 974. II. 976. VI. 149.
Melampodineae DC. VI. 147.
Melampodium Linn. II. 605. II. 976.
— leucanthemum Torr. et Gr. II. 976. no. 1.
— montanum Bth. II. 605. no. 2.
— pumilum Bth. II. 606. no. 3.
— tenellum Hook. et Arn. II. 605. no. 1.
Melampyreae Bth. VI. 654.
Melampyrum Linn. *VI. 654.
Melampyrum Tournef. III. 435. °III. 972.
— *Africanum spicatum* etc. Herm. IV. 148. no. 2. *γ.*
— *Africanum spicatum foliis angustissimis* Burm. IV. 156. no. 24.
— *alpestre* Pers. III. 435. no. 7.
— *Americanum* Michx. III. 435. no. 7.
— *argyrocomum* Fisch. III. 435. no. 3.
— arvense Linn. III. 435. no. 3.
— barbatum Waldst. et Kitaib. III. 435. no. 4.
— Carpathicum Schult. *III. 435. no. 9.
— cristatum Linn. III. 435. no. 2.
— latifolium Mühlbrg. *III. 435. no. 8.
— *lineare* Lam. III. 435. no. 7.
— nemorosum Linn. III. 435. no. 5.
— pratense Linn. III. 435. no. 6.
— saxosum Bmgrtnr. III. 435. no. 1.
— sylvaticum Linn. III. 435. no. 7.
— *sylvaticum* Rivin. III. 435. no. 5.
— *violaceum* Lam. III. 435. no. 5.
— *vulgatum* Pers. III. 435. no. 6.
Melanchier ovalis Hook. II. 55. no. 2. *β.*
Melandrium Roehl. I. 280. II. 784.
— apetalum Fnzl. *II. 784. no. 1.
— brachypetalum Fnzl. II. 784. no. 3.
— Cashmerianum Royle. I. 280. no. 7.
— cuneifolium Royle. I. 280. no. 2.
— divaricatum Fnzl. II. 785. no. 6.
— fimbriatum Wall. I. 280. no. 8.
— Indicum Rxb. I. 281. no. 9.
— inflatum Wall. I. 280. no. 3.
— macrorhizum Royle. I. 280. no. 1.
— multicaule Wall. I. 280. no. 5.
— nutans Wall. I. 280. no. 6.
— pratense Röhlng. *II. 785. no. 5.
— pumilum Royle. I. 280. no. 4.
— sylvestre Roehlng. *II. 785. no. 4.
— triste Bnge. I. 281. no. 10.
— triste Fnzl. *II. 784. no. 2.
Melandryum Roehl. V. 82. (cf. Melandrium.)
— Soongaricum Fisch. Mey. et Lallem. V. 82. no. 1.

Melanium DC. I. 215. no. 15. 16. 17. II. 767.
Melanodendron DC. *II. 578. *II. 951. no. 13.
Melanopsidium Cels. *II. 524.
Melanorrhoea Wall. I. 555.
— glabra Wall. I. 555. no. 2.
— usitata Wall. I. 555. no. 1.
Melanoselinum Hffm. *II. 419.
Melanoseris Dcne. II. 693. °VI. 354.
— cyanea Edgew. *VI. 355. no. 7.
— hastata Edgew. *VI. 355. no. 5.
— Lessertiana Dcne. VI. 354. no. 1.
β. dentata.
— lyrata Dcne. II. 693. no. 1. VI. 354. no. 2.
— paniculata Edgew. VI. 355. no. 4.
— rapunculoides Edgew. *VI. 355. no. 6.
— saxatilis Edgew. VI. 355. no. 3.
Melanosperma Bth. *VI 642.
Melanosticta DC. *I. 812.
Melanoxylon Schott. I. 845. V. 570.
— Brauna Schott. *I. 845. no. 1. V. 570. no. 1.
— *Cadika-marum* Koen. II. 61. no. 11.
Melanthera Rohr. *II. 609.
— *Brownei* C. H. Schultz. VI. 157. no. 1.
Melantzana Arabum Rauw. III. 82. no. 319. *a*. b.
— *nigra* Rauw. III. 82. no. 319. *a*. b.
Melasanthus Pohl. IV. 9.
— *glaucus* Pohl. IV. 11. no. 37.
— *integrifolius* Pohl. IV. 11. no. 36.
— *longespicatus* Pohl. IV. 10. no. 35.
— *rhomboidalis* Pohl. IV. 10. no. 32.
— *triphyllus* Pohl. IV. 10. no. 33.
— *villosus* Pohl. IV. 10. no. 34.
Melasma Bergius. III. 378. °III. 970. *VI. 641.
—? hispidum Bth. III. 378. no. 1.
— rhinanthoides Bth. III. 379. no. 2.
— scabrum Bergius. III. 379. no. 3.
— ? Zeyheri Hook. III. 379. no. 4.
— *Zeyheri* Hook. VI. 650. no. 1.
Melastoma Burm. II. 132. V. 703.
— *album* Reinw. II. 144. no. 9.
— *alpestre* Jack. II. 142. no. 13.
— anisotrichon Schlchtd. II. 134. no. 14.
— *antennatum* Mart. II. 118. no. 1.
— arboreum Schlchtd. II. 134. no. 18.
— *aquaticum* Aubl. II. 125. no. 8.
— asperum Blume. II. 133. no. 4.
— *asperum* L. II. 136. no. 6.
— *asperum* Meerburg. II. 136. no. 7.
— *azureum* Zippel. V. 724. no. 1.
— *bibracteatum* Blume. II. 145. no. 2.
— Boryanum Krthls. V. 704. no. 3.
— *bracteatum* Jack. II. 144. no. 5.
— calycinum Bth. II. 133. no. 9.
— *carneum* Zipp. II. 142. no. 6.
Melastoma Celebicum Blume. II. 133. no. 7.
— *coeruleum* Hortor. II. 128. no. 1.
— *constrictum* Blume. II. 143. no. 1.
— cornoides Schlchtd. II. 134. no. 13.
— *crassifolium* Blume. II. 142. no. 7.
— *crispatum* Linn. II. 143. no. 19.
— *cyanocarpum* Blume. II. 145. no. 15.
— cyanocarpum Blume. V. 715. no. 6.
— cymosum W. II. 135. †
— *diaphanum* Blume. II. 142. no. 7.
— *diffusum* Reinw. II. 144. no. 1.
— *epidendron* Reinw. II. 142. no. 15.
— *exiguum* Jack. II. 143. no. 1.
— *eximium* Blume. II. 143. no. 17.
— *eximium* Jack. II. 142. no. 16.
— *fallax* Blume. II. 144. no. 2.
— *fallax* Jack. II. 144. no. 1.
— *ferrugineum* Reinw. II. 145. no. 1.
— glaberrimum Schlchtd. II. 134. no. 15.
— glaucocarpum Schlchtd. II. 134. no. 16.
— *glaucum* Jack. II. 145. no. 14.
—? globuliferum Schlchtd. et Cham. II. 133. no. 10.
— *glomeratum* Klein. II. 135. no. 4.
— *gracile* Jack. II. 144. no. 9.
— *granulosum* Bot. Mag. II. 132. no. 2.
— *heterotrichum* DC. V. 707. no. 4.
— *holosericum* var. *acuminatum* H. B. Kth. II. 147. no. 11.
— *hypericifolium* Blume. II. 142. no. 11.
— Jackianum Krthls. V. 706. no. 5.
— *Javanense* Blume. II. 142. no. 15.
— *laurifolium* Blume. II. 142. no. 6.
— laxiflorum Schlchtd. II. 135. no. 20.
— *leprosum* Blume. II. 144. no. 4.
— *lineare* Reinwrdt. II. 135. no. 1.
— lineatum Schlchtd. II. 134. no. 19.
— *Malabathricum* Jack. II. 132. no. 1.
— Malabathricum L. II. 135. †
— *Malabathricum* Royen. II. 136. no. 7.
— *Moluccanum* Blume. II. 135. no. 1. V. 708. no. 2.
— *muscosum* Blume. II. 145. no. 1.
— *nemorosum* Jack. II. 145. no. 4.
— nitidum Krthls. V. 705. no. 4.
— *nodosum* Zipp. II. 142. no. 5.
— *octandrum* Royen. II. 136. no. 7.
— *octona* Bonpl. V. 707. no. 4.
— *pallidum* Jack. II. 145. no. 13.
— petiolare Schlchtd. II. 134. no. 12.
— *pleurocarpum* E. Mey. II. 146. no. 1. V. 718. no. 3.
— polyanthum Blume. II. 132. no. 1. (c. var. *β*. ibid.)
— porphyreum Zipp. II. 133. no. 8.
— *pudibundum* Blume. II. 145. no. 1.

Melastoma pulcherrimum Krthls. V. 704. no. 2.
— *pulverulentum* Blume. II. 143. no. 2.
— *pulverulentum* Jack. II. 143. no. 1. V. 712. no. 1.
— *quadrifolium* Blume. II. 142. no. 1.
— *racemosum* Aubl. V. 723. no. 2.
— *racemosum* Miquel. V. 722. no. 1.
— *radicans* Blume. II. 142. no. 2.
— *reflexum* Reinw. II. 143. no. 2.
— *Reinwardtianum* Blume. II. 144. no. 1.
— rostratum Bertol. II. 135. no. 22.
— *rostratum* Blume. II. 145. no. 2.
— *rotundifolium* Jack. II. 146. no. 1. V. 718. no. 2.
— Roycnii Blume. II. 133. no. 3.
— *rubicundum* Jack. II. 142. no. 8.
— *rubrum* Aubl. II. 140. no. 17.
— *rubro-limbatum* Lnk. et Otto. II. 132. no. 1.
—? scorpioides Schlchtd. et Cham. II. 134. no. 11.
— *sessile* Schum. et Thonn. II. 132. no. 1.
— *sessiliflorum* Vahl. II. 140. no. 17.
— setigerum Blume. *II. 133. no. 6.
β. angustebracteatum.
γ. latebracteatum.
— *speciosum* Reinw. II. 143. no. 17.
— *stellulatum* Jack. II. 145. no. 3.
— *stipulare* Blume. II. 145. no. 3.
— *succulentum* Blume. II. 142. no. 10.
— sylvaticum Blume. *II. 133. no. 5.
β. uniflorum.
— sylvaticum Schlchtd. II. 134. no. 17.
— Tidorense Blume. II. 133. no. 2.
— umbilicatum Bertol. II. 135. no. 21.
— *vaccillans* Blume. II. 144. no. 6.
— *vaccillans* var. *α.* DC. II. 144. no. 10.
— *vaccillans* var. *γ.* DC. II. 144. no. 7.
— *varingiaefolium* Blume. II. 143. no. 2.
— *venosum* Blume. II. 143. no. 20.
— *verrucosum* Blume. II. 142. no. 12.
— *viminale* Jack. II. 145. no. 1.
MELASTOMACEAE R. Br. II. 117. II. 916. V. 676.
Melastomeae Ser. II. 117. V. 676.
Melatema vid. Melalemma.
Melhania Forsk. I. 349. II. 798.
— abutiloides Arn. *II. 798. no. 2.
— didyma Eckl. et Zeyh. I. 350. no. 3.
— Hamiltoniana Wall. I. 349. no. 1.
— incana Heyne. I. 349. no. 2. (III. Emend. p. 2.)
— laurifolia Boj. II. 798. no. 1.
Melia Linn. I. 427. V. 373.
— arguta DC. *I. 427. no. 7.
Melia Australasica A. Juss. I. 427. no. 3.
— *Azadirachta* L. I. 427. no. 1.
— Azedarach L. *I. 427. no. 1.
— *Azedarach β.* L. I. 427. no. 2.
— *baccifera* Rxb. I. 428. no. 1.
— Candollei A. Juss. I. 427. no. 4.
— *composita* DC. I. 427. no. 4.
— composita Willd. *I. 427. no. 5.
— dubia Cav. *I. 427. no. 9.
— excelsa Jack. I. 427. no. 8.
— Japonica Hsskrl. V. 373. no. 1.
— *Koetjape* Burm. I. 431. no. 1.
— Neilgherrica Wght. I. 426. no. 4.
— *pumila* Moon. I. 426. no. 3.
— *robusta* Rxb. I. 427. no. 5.
— robusta Rxb. *I. 427. no. 10.
— sambucina Blume. I. 427. no. 6.
— sempervirens Sm. *I. 427. no. 2.
— *superba* Rxb. I. 427. no. 5.
— tomentosa Rxb. *I. 427. no. 11.
Meliacea Wightiana Wall. I. 428. no. 1.
MELIACEAE DC. (ex p.) I. 425. I. 436. V. 372. V. 376.
MELIACEAE Juss. I. 426. II. 817. V. 373.
Meliantheae Endl. I. 498.
Melianthus Tournef. *I. 498.
Melichrus R. Br. *II. 731. VI. 426.
— squarrosus Sonder. VI. 426. no. 1.
Melicocca DC. (ex p.) I. 421. V. 366.
— *amoena* Hsskrl. V. 366. no. 1.
— *trijuga* Juss. I. 421. no. 1.
Melicocca L. *I. 421.
Melicope Forst. I. 500. II. 823. V. 387.
— simplex A. Cunn. I. 500. no. 1. *II. 823. no. 1.
— ternata Forst. V. 387. no. 1.
Melicytus Forst. I. 205.
— macrophyllus All. Cunn. I. 205. no. 1.
Melieae Adr. Juss. I. 426.
Melilotus Tournef. I. 638.
— *altissima* Thuill. I. 639. no. 4.
— anomala Nordm. I. 639. no. 6.
— elegans Auct. I. 639. †
— graveolens Bnge. I. 638. no. 1.
— Indica All. I. 639. †
— intermedia Boiss. I. 638. no. 3.
— leucantha Koch. *I. 639. no. 4.
— Messanensis Dsf. I. 639. †
— *minima* Rth. I. 639. no. 5.
— occidentalis Nutt. I. 638. no. 2. (III. Emend. p. 3.)
— parviflora Koch. *I. 639. no. 5.
— sulcata Dsf. I. 639. †
Melindres Wlprs. IV. 26.
Melinia Dcne. *VI. 488.
Melinospermum Wlprs. I. 651.

Melinospermum pumilum Wlprs. *I. 651. no. 1.
Meliocarpus Boiss. °V. 918.
— alatus Boiss. V. 918. no. 2.
— Anatolicus Boiss. V. 918. no. 1.
— anisopterus Boiss. V. 919. no. 3.
Meliosma Blume. I. 423. II. 816.
— alba Schlchtd. II. 816. no. 1.
— Arnottiana Wght. I. 423. no. 3.
— *congesta* Wght. et Arn. I. 423. no. 1.
— dilleniaefolia Wall. I. 423. no. 4.
— pungens Wall. I. 423. no. 1.
— simplicifolia Rchb. I. 423. no. 2.
Meliosmeae Endl. I. 423.
Meliphyllum Bth. III. 732.
Melissa Bth. III. 727. °III. 983. VI. 672.
— Acinos Bth. III. 729. no. 8.
β. villosa.
— *aetheos* Hortul. III. 728. no. 5. *β.*
— *alba* Waldst. et Kit. III. 707. no. 2.
— alpina Bth. III. 730. no. 11.
β. elatior Griseb.
— *altissima* Sbthrp. et Sm. III. 732. no. 21. *β.*
— Arundana Boiss. III. 731. no. 16.
— *atro-rubens Bugulae folio* Dill. III. 674. no. 294.
— Calamintha Linn. III. 728. no. 6.
β. villosissima.
— Caroliniana Bth. III. 729. no. 7.
— Clinopodium Bth. III. 732. no. 20.
— *coccinea* Spr. III. 737. no. 13.
— *cordifolia* Pers. III. 732. no. 21. *β.*
— *Corsica* Hortul. III. 732. no. 21.
— *Cretica* Lam. III. 726. no. 41.
—? Cretica Linn. III. 727. no. 2.
— *Cretica* Russ. III. 727. no. 1.
— debilis Bth. III. 730. no. 15.
— flava Bth. III. 733. no. 24.
— *foliosa* Opiz. III. 728. no. 6. III. 732. no. 21.
— *fruticosa* Linn. III. 726. no. 41.
— glandulosa Bth. III. 727. no. 4.
— grandiflora Linn. III. 733. no. 25.
— graveolens Bth. III. 730. no. 12.
— *graveolens* Host. III. 731. no. 21.
— *hirsuta* Balb. III. 732. no. 21. *β.*
— hirsuta Blume. III. 732. no. 22.
—? incana Bth. III. 727. no. 1.
— inodora Hsskrl. III. 734. no. 30.
— *intermedia* Baumg.? III. 728. no. 6.
— longicaulis Wall. III. 733. no. 27.
— *lotoria* Rmph. III. 516. no. 12.
— macrostemma Moç. et Sess. III. 733. no. 26.
— *majoranaefolia* Mill. III. 729. no. 9.
— *marifolia* Pers. III. 726. no. 41.
— *maxima* Arduin. III. 585. no. 1.
— microphylla Bth. III. 729. no. 10.
Melissa Nepalensis Bth. III. 716. no. 1.
— Nepeta Linn. III. 728. no. 5.
β. Athonica.
— *obtusifolia* Pers. III. 728. no. 5.
— *occidentalis* Rafin. III. 732. no. 21.
— officinalis Linn. III. 732. no. 21.
β. villosa.
— origanifolia Bth. III. 731. no. 19.
— parviflora Bth. III. 732. no. 23.
— Patavina Bth. III. 729. no. 9.
β. acuminata Frivaldsky.
— *perennis* Forsk. III. 677. no. 305.
— *pulegioides* Linn. III. 716. no. 2.
— *Pulegium* Rochel. III. 726. no. 40.
— purpurascens Bth. III. 730. no. 13.
— *Pyrenaica* Jacq. III. 686. no. 1.
— repens Bth. III. 731. no. 18.
— *Romana* Mill. III. 732. no. 21. *β.*
— rotundifolia Bth. III. 730. no. 14.
— rugosa Lour. III. 734. no. 28.
— *subnuda* Waldst. et Kit. III. 726. no. 40.
— *sylvestris* Lam. III. 800. no. 1.
— *Taurica* Hortul. III. 732. no. 21. *β.*
— teucrioides Boiss. VI. 672. no. 1.
— thymifolia Bth. III. 727. no 3.
— *umbrosa* Auct. Germ. III. 728. no. 6.
— umbrosa M. Bieb. III. 731. no. 17.
— veronicaefolia Pers. III. 734. no. 29.
Melissineae Bth. III. 716. III. 983. VI. 672.
Melissoides Bth. III. 507.
Melitteae Endl. III. 799. III. 987.
Melittis Linn. III. 799. °III. 987.
— *albida* Guss. III. 800. no. 1.
— *Caroliniana* Spr. III. 800. no. 1. [gen. 3642.]
— *grandiflora* Sm. III. 800. no. 1.
— melissophyllum Linn. III. 799. no. 1.
Mellicocca cf. *Melicocca.*
Melocactus DC. II. 304.
— *ambiguus* Hort. II. 324. no. 4. II. 325. no. 11.
— amoenus Hffmsgg. II. 306. no. 11.
— *arborescens* Plum. II. 330. no. 54.
— *arborescens tetragonus etc.* Plum. II. 334. no. 95.
— atrosanguineus Pfeiff. II. 307. no. 22.
— Besleri Lk. et Otto. II. 305. no. 4.
— *Besleri* Lk. et Otto. II. 323. no. 3.
— Brogniartii Lem. II. 306. no. 15.
— caesius Wendl. II. 308. no. 28.
— *cereiformis* Plum. II. 330. no. 54.
— communis DC. II. 305. no. 9.
ζ. conicus Pfeiff.
ε. Grengelii Hort. Dresd.
δ. laniferus Pfeiff.
β. macrocephalus Lnk. et Otto.
γ. oblongus Pfeiff.

Melocactus communis var. *Havannensis* Pfeiff. II. 306. no. 10.
— *communis* var. *Jördensii* Otto. II. 306. no. 11.
— *communis* var. *spinis brevioribus albicantibus* Hort. II. 309. no. 34.
— *communis* var. *viridis* Otto. II. 306. no. 13.
— *crassicostatus* Lem. II. 305. no. 7. β.
— crassispinus S. Dyck. II. 309. no. 33.
— curvispinus Pfeiff. II. 305. no. 6.
— depressus Hook. II. 304. no. 3.
— dichroacanthus Miquel. II. 306. no. 14.
— *elegans* Hort. II. 324. no. 4. II. 325. no. 11.
— *ex pluribus globulis Opuntiae modo nascentibus, spinosissimus* Plum. II. 333. no. 81.
— *Gilliesii* Hort. II. 310. no. 5.
— goniodacanthus Lem. II. 304. no. 1.
— griseus Wendl. II. 309. no. 29.
— Havannensis Miquel. II. 306. no. 10.
— hystrix Parmentier. II. 305. no. 8.
— *Indiae occidentalis* Boerhave. II. 306. no. 9.
— *Indiae occidentalis* C. Bauh. II. 305. no. 9.
— *ingens* Karw. II. 311. no. 18.
— *Langsdorffii* DC. II. 310. no. 11.
— *latispinus* Hort. II. 312. no. 24.
— Lehmanni Miquel. II. 307. no. 19.
— Lemairii Miquel. II. 309. no. 31.
— leucaster Hffmsgg. *II. 309. no. 34.
— macracanthoides Miquel. II. 308. no. 27.
— macracanthus S. Dyck. II. 308. no. 26.
— meonacanthus Lk. et Otto. II. 307. no. 17.
— microcephalus Miquel. II. 307. no. 20.
— Miquelii Lehm. II. 307. no. 16.
— *monoclonos etc.* Plum. II. 329. no. 42.
— Monvillianus Miquel. II. 305. no. 5.
— obtusipetalus Lem. II. 305. no. 7.
  β. crassicostatus.
— Oreas Miquel. II. 309. no. 32.
— *Parthoni* Hortor. II. 304. no. 2.
— pentacentrus Lem. II. 309. no. 30.
— pyramidalis S. Dyck. II. 307. no. 23.
  β. carneus Miquel. II. 308. no. 23.
— *rubens* Hort. II. 306. no. 11.
— rubens Pfeiff. II. 306. no. 12.
— Salmianus Otto. II. 307. no. 21.
— spatangus Pfeiff. II. 307. no. 18.
— *spinosissimus* Plum. II. 330. no. 54.
— violaceus Pfeiff. II. 304. no. 2.
— Wendlandii Miquel. II. 306. no. 13.
— xanthacanthus Miquel. II. 308. no. 25.
— Zuccarinii Miquel. II. 308. no. 24.

Melocardus Tabern. II. 305. no. 9.
— *sulcatus sulcis rectis etc.* Morison. II. 306. no. 9.
Melochia L. I. 341. II. 796.
— acutangula Spanoghe. I. 341. no. 2.
— arenosa Bth. I. 342. no. 16.
— betonicaefolia St. Hil. I. 342. no. 12.
— chamaedrys St. Hil. I. 341. no. 7.
— cinerea St. Hil. et Naud. II. 796. no. 1.
— clinopodium St. Hil. et Naud. II. 796. no. 4.
— cordiformis St. Hil. I. 342. no. 13.
— fasciculata Bth. I. 342. no. 15.
— gracilis St. Hil. et Naud. II. 796. no. 3.
— graminifolia St. Hil. I. 341. no. 6.
— hermannioides St. Hil. I. 342. no. 9.
— hispida Hook. I. 341. no. 1.
— lanata St. Hil. I. 342. no. 14.
— lanceolata Bth. I. 342. no. 17.
— lilacina St. Hil. I. 341. no. 8.
— melissaefolia Bth. I. 342. no. 20.
— nepetoides St. Hil. I. 342. no. 11.
— nitidula St. Hil. et Naud. II. 796. no. 2.
— oblonga Bth. I. 342. no. 18.
— plicata Prsl. I. 341. no. 3.
— sericea St. Hil. I. 341. no. 5.
— simplex St. Hil. I. 342. no. 10.
— splendens St. Hil. et Naud. II. 797. no. 5.
— ulmarioides St. Hil. I. 341. no. 4.
— ulmifolia Bth. I. 342. no. 19.
— ulmifolia St. Hil. et Naud. II. 797. no. 6.
— vestita Bth. I. 342. no. 21.
Melodinus Forst. VI. 466.
— orientalis Blume. VI. 466. no. 1.
Melolobium Eckl. et Zeyh. I. 618. V. 454.
— adenodes Eckl. et Zeyh. I. 618. no. 5.
— alpinum Eckl. et Zeyh. I. 619. no. 9.
— calycinum Bth. V. 454. no. 1.
— candicans Eckl. et Zeyh. I. 618. no. 1.
— canescens Bth. V. 454. no. 2.
— cernuum Eckl. et Zeyh. I. 618. no. 6.
— collinum Eckl. et Zeyh. I. 618. no. 4.
— decumbens Bth. V. 454. no. 4.
— humile Eckl. et Zeyh. I. 618. no. 8.
— microphyllum Eckl. et Zeyh. I. 618. no. 2.
— parviflorum Bth. V. 454. no. 3.
— squarrosum Eckl. et Zeyh. I. 618. no. 3.
— spicatum Eckl. et Zeyh. I. 618. no. 7.
  α. hirsutiusculum.
  β. heterotrichum.
  γ. orthotrichum.
Melongena Blackw. III. 81. no. 319. α. a.
Melongena Dunal. (Solanum) III. 81.
Melongena Rauw. III. 82. no. 319. α. b.
— *Arabum* Chabr. III. 81. no. 319. α. a.
— *fructu incurvo* Tournef. III. 82. no. 319. α. b.

Melongena fructu rotundo Tournef. III. 82. no. 319. *α.* b.
— *fructu rotundo cum spinis albo-virentibus* Tournef. III. 82. no. 322. *β.*
— *fructu rotundo nigro* Tournef. III. 82. no. 319. *α.* b.
— *fructu oblongo violaceo* Labb. III. 81. no. 319. *α.* b.
— *laurifolia fructu turbinato variegato* Feuillée. III. 42. no. 30.
— *ovata* Mill. III. 81. no. 319. *α.* a.
— *spinosa fructu longo nigro* Tournef. III. 82. no. 319. *α.* b.
— *spinosa fructu rotundo croceo* Tournef. III. 83. no. 326.
Melosperma Bth. cf. Melanosperma.
Melopospermum Koch. *II. 422.
Melothria Linn. II. 195.
— Fluminensis Gardn. II. 196. no. 3.
— *foetida* Desr. II. 197. no. 1.
— grandifolia Torr. et Gr. II. 195. no. 1.
— *quinqueloba* Eckl. et Zeyh. II. 203. no. 1.
— prunifera Poepp. et Endl. II. 196. no. 2.
— *Zeylanica* Koen. I. 443. no. 19.
Melothrieae Endl. II. 195. V. 759.
Membranaceae Bth. (Salvia) III. 646.
Memecyleae DC. II. 148. V. 725.
Memecylon Linn. II. 148.
— amplexicaule Rxb. II. 148. no. 3.
— angustifolium Wght. II. 148. no. 5.
— Capense Eckl. et Zeyh. II. 149. no. 9.
— coeruleum W. Jack. II. 148. no. 4.
— *cordatum* Wall. II. 148. no. 3.
— *depressum* Bth. II. 148. no. 3.
— Heyneanum Bth. II. 148. no. 2.
— jambosioides Wght. II. 149. no. 6.
— nigrescens Hook. et Arn. II. 149. no. 8.
— paniculatum W. Jack. II. 149. no. 7.
— pyriforme Wght. *II. 149.
— ramiflorum Lam. II. 149. †
— sessile Bth. *II. 149.
— tinctorium Koen. *II. 148. no. 1. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— *tinctorium* Willd. II. 148. no. 1.
Memphitidia Reinwrdt. *II. 486. VI. 49.
— *inodora* DC. VI. 50. no. 1.
— lanceolata Hsskrl. VI. 49. no. 1.
Menaïs Loefl. *VI. 554.
Mendezia DC. *II. 607.
Menestoria DC. *II. 517.
Meniocus Desvx. *I. 140. II. 757. V. 36.
— aureus Fnzl. II. 727. no. 1.
— filifolius Jaub. et Spach. V. 36. no. 2.
— grandiflorus Jaub. et Spach. V. 36. no. 1.
Meniscosta Blume. I. 95.
— Javanica Blume. *I. 95. no. 1.
MENISPERMACEAE DC. I. 93. II. 748. V. 17.
Menispermeae DC. I. 93.
MENISPERMEAE SPURIAE DC. I. 92. V. 15.
Menispermum Tournef. *I. 93.
— *Cocculus* L. I. 95. no. 1.
— *fenestratum* Gaertn. I. 95. no. 1.
— *glabrum* Klein. I. 94. no. 12.
— *heteroclitum* Rxb. I. 95. no. 1.
— *hexagynum* Rxb. I. 94. no. 14.
— *monadelphum* Rxb. I. 95. no. 1.
— *hirsutum* L. I. 94. no. 14.
— *myosotoides* L. I. 94. no. 14.
— *polycarpum* Rxb. I. 94. no. 13.
— *triandrum* Rxb. I. 94. no. 21.
— *villosum* Rxb I. 94. no. 18.
Menkea Lehm. °V. 41.
— australis Lehm. V. 41. no. 1.
Menodora H. B. Kth. VI. 464.
— Africana Hook. VI. 464. no. 1.
Menonvillea DC. I. 159.
— filifolia Fisch. et Mey. I. 159. no. 1.
— linearis DC. *I. 159. no. 2. (c. var. *β.*)
Mentha Linn. III. 586. °III. 980. VI. 661.
— *acutifolia* Rchb. III. 593. no. 14. *ε.*
— *acutifolia* Sm. III. 592. no. 14. *α.*
— *acutiserrata* Opiz. III. 591. no. 13.
— *adspersa* Moench. III. 590. no. 12.
— *agrestis* Sole. III. 592. no. 14. *ε.*
— angustifolia Host. III. 594. no. 23.
— aquatica Linn. III. 590. no. 13.
  γ. crispa, *β.* hirsuta, *α.* nemorosa, *δ.* subspicata } Linn. III. 591. no. 13.
— *aquatica* Sole. III. 591. no. 13.
— *aquatica suavifolia* Fries. III. 592. no. 14. *γ.*
— *aquatica tertia sativa* Fresen. III. 592. no. 14. *α.*
— *aquatica β. verticillata* Fries. III. 592. no. 14. *α.*
— *arguta* Opiz. III. 592. no. 14. *α.*
— arvensis Linn. III. 591. no. 14. (c. varr. *β.* *γ.* *ζ.*)
  ϑ. crispa, *η.* glabra } Linn. III. 593. no. 14.
  δ. rubra, *α.* sativa, *ε.* vulgaris } Linn. III. 592. no. 14.
— *arvensis* Rchb. III. 592. no. 14. *ε.*
— *arvensis* Sole. III. 592. no. 14. *ε.*
— *arvensis β.* Herb. Sm. III. 592. no. 14. *ε.*
— *arvensis* var. *agrestis* Rchb. III. 593. no. 14. *ε.*

Mentha arvensis var. *lanceolata* Rchb. III. 592. no. 14. ε.
— *arvensis* var. *parietariaefolia* Rchb. III. 593. no. 14. ε.
— *arvensis* var. *plicata* Rchb. III. 563. no. 14. ε.
— *atrovirens* Host. III. 593. no. 14. ζ.
— *auricularia* Linn. III. 579. no. 3.
— *aurita* Weihe. III. 591. no. 13.
— *australis* R. Br. III. 725. no. 34.
— *Austriaca* Host. III. 593. no. 14. ζ.
— *Austriaca* Jcq. III. 592. no. 14. ε.
— *Badensis* Gmel. III. 592. no. 14. γ.
— *ballotaefolia* Opiz. III. 591. no. 13. δ.
— *balsamea* Reichb. III. 589. no. 8.
— *balsamea* Willd. III. 590. no.10. et no. 11.
— *blanda* DC. III. 582. no. 6.
— *blanda* Wall. III. 582. no. 5.
— *borealis* Michx. III. 593. no. 15. β.
— *brachiata* Weihe. III. 591. no. 13.
— *brevispicata* Lehm. III. 589. no. 8.
— *bugulaefolia* Weihe. III. 591. no. 13.
— Canadensis Linn. III. 593. no. 15.
β. glabrata Bth. III. 593. no. 15.
γ. Mexicana Mart. et Galeotti. VI. 661. no. 2.
α. villosa Bth. III. 593. no. 15.
— *Canariensis* Linn. III. 687. no. 2.
— *candicans* Crantz. III. 587. no. 6. β.
— *candicans* Mill. III. 587. no. 6. δ.
— *canescens* Roth. III. 587. no. 6. α.
— *canescens* Sieb. III. 586. no. 3.
— *Capensis* Thunb. III. 586. no. 4.
— *capitata* Opiz. III. 591. no. 13. α.
— *Carinthiaca* Host. III. 392. no. 14. ε.
— *Carniolica* Host. III. 592. no. 14. α.
— *cervina* Linn. III. 585. no. 1.
— *Chalepensis* Mill. III. 587. no. 6. α.
— *ciliata* Opiz. III. 589. no. 9. β.
— citrata Ehrh. III. 590. no. 12.
— *citrata* Rchb. III. 591. no. 13. α.
— *coerulea* Opiz. III. 592. no. 14. α.
— *cordifolia* Opiz. III. 589. no. 8. γ.
— *crenata* Becker. III. 592. no. 14. α.
— *Cretica* Hortul. III. 586. no. 2. 3.
— *crispa* Auct. plur. III. 593. no. 14.
— *crispa* Linn. III. 591. no. 13. γ.
— *crispa* Roth. III. 589. no. 8. γ.
— *crispa* Ten. III. 588. no. 6. η.
— *crispata* Schrad. III. 589. no. 8. γ.
— Dahurica Fisch. III. 593. no. 18.
— *Dalmatica* Tausch. III. 592. no. 14. ε.
— *dentata* Willd. III. 589. no. 9. β.
— *Diemenica* Spr. III. 725. no. 35.
— *diffusa* Lej. III. 592. no. 14. ε.
— *divaricata* Host. III. 592. no. 14. ε.
Mentha divaricata Lag. III. 590. no. 10.
— *dubia* Schreb. III. 592. no. 14. α.
— *dubia* Vill. III. 591. no. 13. β.
— *dulcissima* Dumort. III. 588. no. 6. η.
— *dumetorum* Schult. III. 588. no. 6. ε. (? III. 591. no. 13. β.)
— *Eisenstadtiana* Opiz. III. 587. no. 6. γ.
— *elata* Host. III. 592. no. 14. α.
— *emarginata* Rchb. III. 588. no. 6. η.
— *exigua* Linn. III. 594. no. 20.
— *foetens* Wall. III. 582. no. 6.
— *foetida* Burm. III. 579. no. 3.
— *foliosa* Opiz. III. 588. no. 6. η.
— *fragrans* Prsl. III. 588. no. 7.
— *fruticosa* Hels. et Bojer. III. 584. no. 1.
— *gentilis* Host. III. 593. no. 14. η.
— *gentilis* α. β. Sm. III. 592. no. 14. γ.
— *gentilis* Linn. III. 592. no. 14.
— *gentilis* Mill. III. 592. no. 14. ε.
— *gentilis* Rchb. III. 592. no. 14. α.
— *gentilis* Sm. III. 593. no. 14. ζ.
— *gentilis* γ. Herb. Sm. III. 592. no. 14. ε.
— *gentilis* Sole. III. 389. no. 9.
— *Gibraltarica* Willd. III. 594. no. 20. β.
— *glabra* Sole. III. 593. no. 14. η.
— *glabrata* Vahl. III. 590. no. 11.
— *glomerulata* Jan. III. 590. no 10.
— *gracilis* R. Br. III. 725. no. 35. (et ibid. in adn.)
— *gracilis* α. Sm. III. 593. no. 14. ζ.
— *gracilis* γ. Sm. III. 589. no. 9.
— *gracilis* Sole. III. 593. no. 14. ζ.
— *Graeca* Camer. VI. 219. no. 1.
— *grata* Host. III. 593. no. 14. ζ.
— *gratissima* Wigg. III. 588. no. 6. ε.
— *gratissima* Willd. III. 587. no. 6. δ.
— graveolens Presl. III. 594. no. 22.
— *Halleri* Gmel. III. 588. no. 6. ε.
— *Hercynica* Röhl. III. 589. no. 8. γ.
— *hirsuta* Linn. III. 591. no. 13. β.
— *hirsuta* δ. Sm. III. 590. no. 11. β.
— *hirsuta* Sm. III. 591. no. 13.
— *hirsuta* ζ. *verticillata* Sm. III. 592. no. 14. α.
— *hirta* Beck. III. 588. no. 6. ε.
— *hirta* Willd. III. 590. no. 10. et 11. β.
— *hortensis* Opiz. III. 589. no. 8. γ.
— *hortensis corymbifera* C. Bauh. VI. 219. no. 1.
— *hybrida* Schleich. III. 587. no. 6. δ. η.
— *hyptiformis* Lam. III. 562. no. 175.
— *incana* Sole. III. 587. no. 6. α.
— incana Willd. III. 586. no. 2.
— *incisa* Wall. III. 582. no. 6.
— *intermedia* Host. III. 591. no. 13. α.
— *intermedia* N. ab E. III. 592. no. 14. ε.

Mentha Javanica Blume. III. 595. no. 25.
— *Kahirina* Forsk. III. 590. no. 11.
— *laevigata* Willd. III. 589. no. 8.
— *Lamarckii* Ten. III. 588. no. 6. η.
— *lamiifolia* Host. III. 592. no. 14. ε.
— lanceolata Bth. III. 593. no. 17.
— *Langii* Geiger. III. 590. no. 10.
— Lapponica Wahlenb. III. 593. no. 16.
— *latifolia* Host. III. 592. no. 14. α.
— lavandulacea Willd. III. 486. no. 1.
— *lavandulaefolia* Pers. III. 586. no. 1.
— *laxa* Host. III. 592. no. 14. ε.
— *Lejeunii* Opiz. III. 589. no. 8. β.
— *longifolia* Host. III. 592. no. 14. α.
— *longifolia* Huds. III. 587. no. 6. δ.
— *macrostachya* Ten. III. 588. no. 7.
— *maculata* Host. III. 592. no. 14. α.
— *melissaefolia* Lej. III. 592. no. 14. α.
— *melissaefolia* Host. III. 592. no. 14. ε.
— Mexicana Mart. et Galeotti. VI. 661. no. 1.
— *Michelii* Rchb. III. 589. no. 8. β.
— *montana* Host. III. 592. no. 14. γ.
— mollis Bth. III. 594. no. 19.
— *mollissima* Borkh. III 587. no. 6. α.
— *multiflora* Host. III. 592. no. 14. ε.
— *myosuroides* Roth. III. 579. no. 2.
— *neglecta* Ten. III. 588. no. 7.
— *nemorosa* Host. III. 592. no. 14. α.
— *nemorosa* Willd. III. 588. no. 6. ε.
— *nepetoides* Lej. III. 591. no. 13. β.
— *nigrescens* Weihe. III. 591. no. 13.
— *nigricans* Mill. III. 590. no. 12.
— *niliaca* Jcq. III. 588. no. 6. ε.
— *niliaca* Vahl. III. 589. no. 8.
— *niliaca* Willd. III. 587. no. 6. δ.
— *nitida* Hast. III. 592. no. 14. γ.
— Numidica Poir. III. 595. no. 24.
— *nummularia* Schreb. III. 592. no. 14. γ.
— *oblonga* Opiz. III. 587. no. 6. δ.
— *obtusata* Opiz. III. 592. no. 14. α.
— *ocimiodora* Opiz. III. 589. no. 8.
— *ocymoides* Host. III. 592. no. 14. ε.
— *ocymoides* Lam. III. 496. no. 6.
— *odorata* Sole. III. 590. no. 12.
— *origanifolia* Host. III. 592. no. 14. α.
— *origanoides* Lej. III. 591. no. 13.
— *origanoides* Ten. III. 588. no. 6. ζ.
— *ovalifolia* Opiz. III. 592. no. 14. α.
— *ovata* Cav. III. 584. no. 15.
— *pallida* N. ab Esenb. III. 587. no. 6. β.
— *paludosa* Sole. III. 591. no. 13. δ.
— *palustris* Mill. III. 591. no. 13.
— *palustris* Moench. III. 592. no. 14. α. et E.
— *palustris* Sole. III. 591. no. 13. δ.
— *palustris plicata* Rchb. III. 591. no. 13. δ.
Mentha parviflora Host. III. 592. no. 14. ε.
— *parviflora* Schultz. III. 593. no. 14. ζ.
— *parvifolia* Opiz. III. 592. no. 14. ε.
— *Patrini* Lepech. III. 584. no. 15.
— *pedunculata* Pers. III. 591. no. 13.
— *perilloides* Lam. III. 585. no. 1.
— *perilloides* Linn. III. 560. no. 167.
— *Persica* Hortul. III. 586. no. 2.
— *pilosa* Spr. III. 592. no. 14. α.
— *pilosa* Wllrth. III. 592. no. 14. ε.
— *Pimentum* N. ab E. III. 590. no. 11. β.
— piperita Linn. III. 590. no. 11.
β. subhirsuta.
— *piperita* N. ab Esenb. III. 590. no. 11.
— *piperita* γ. Sm. III. 591. no. 13. δ.
— *piperita* var. *officinalis* Sole. III. 590. no. 11.
— *piperita* var. *sylvestris* Sole. III. 590. no. 11. β.
— *piperita* var. *vulgaris* Sole. III. 590. no. 11.
— *plicata* Opiz. III. 592. no. 14. α.
— *plumosa* Linn. III. 687. no. 4.
— *polymorpha* Host. III. 592. no. 14. ε.
— *praecox* Sole. III. 593. no. 14. η.
— pratensis Sole. III. 589. no. 9.
β. crispa.
— *procumbens* Thuill. III. 592. no. 14. ε.
— *prostrata* Host. III. 592. no. 14. ε.
— *pubescens* Willd. III. 590. no. 10. III. 591. no. 13.
— *Pudina* Hamilt. III. 589. no. 8.
— *pulchella* Host. III. 593. no. 14. ζ.
— *pulegioides* Rchb. III. 594. no. 20. β.
— Pulegium Linn. III. 594. no. 20.
— *Pulegium* Sole. III. 394. no. 20.
— *pumila* Grah. III. 581. no. 8.
— *pumila* Host. III. 592. no. 14. ε.
— *punctata* Mnch. III. 585. no. 1.
— *purpurea* Host. III. 591. no. 13. α.
— *pyramidalis* Hort. Goetting. III. 587. no. 6.
— *pyramidalis* Ten. III. 591. no. 13. δ.
— *quadrifolia* D. Don. III. 580. no. 5.
— *quadrifolia* Rxb. III. 580. no. 4.
— *quaternifolia* Roth. III. 581. no. 9.
— *Ratisbonensis* Opiz. III. 587. no. 6. δ.
— *reflexifolia* Opiz. III. 587. no. 6. δ.
— Requieni Bth. III. 594. no. 21.
— *resinosa* Opiz. III. 593. no. 14. ζ.
— *riparia* Schreb. III. 591. no. 13. β.
— *rivalis* Sole. III. 591. no. 13. δ. III. 592. no. 14. α. et ε.
— *Rosani* Ten. III. 587. no. 6. γ.
— *Rothii* N. ab E. III. 592. no. 14. α.
— *rotundata* Opiz. III. 592. no. 14. γ.
— rotundifolia Linn. III. 588. no. 7.
— *rotundifolia* Sm. III. 588. no. 7.
— *rotundifolia* Sole. III. 588. no. 6. ε.

Mentha Roylcana Bth. III. 586. no. 5.
— *rubra* Herb. Smith. III. 593. no. 14. η.
— *rubra* Huds. III. 589. no. 9.
— *rubra* Sm. III. 592. no. 14. δ.
— *rubra ocymodora* Rchb. III. 592. no. 14. γ.
— *rugosa* Lam. III. 588. no. 7.
— salicina Burch. III. 586. no. 4.
— *sapida* Tausch. III. 588. no. 6. ε.
— *sativa* Beck. III. 592. no. 14. γ.
— *sativa* Linn. III. 592. no. 14.
— *sativa* N. ab E. III. 593. no. 14. ϑ.
— *sativa* Sm. III. 592. no. 14. α. et β.
— *sàtiva* Sole. III. 593. no. 14. ζ.
— *saturejoides* R. Br. III. 725. no. 33.
— *secunda* Rxb. III. 577. no. 2.
— *serotina* Host. III. 592. no. 14. α.
— *serotina* Ten. III. 588. no. 6. ε. et η.
— *simplex* Host. III. 594. no. 20.
— *Speckmoseriana* Opiz. III. 592. no. 14. α.
— *spicata* Crantz. III. 589. no. 8.
— *spicata* Forsk. III. 586. no. 2.
— *suaveolens* Ehrh. III. 588. no. 7.
— *suaveolens* Host. III. 592. no. 14. ε.
— suavis Guss. III. 589. no. 10.
— *suavis* Hffmn.? III. 587. no. 6. δ.
— stachyoides Host. III. 592. no. 14. ε.
— *stellata* Hamilt. III. 581. no. 9.
— *stellata* Lour. III. 580. no. 6.
— *subspicata* Weihe. III. 591. no. 13. δ.
— *sylvatica* Host. III. 592. no. 14. γ.
— sylvestris Linn. III. 587. no. 6.
β. candicans.
η. crispa III. 588. no. 6.
γ. glabrata III. 587. no. 6.
α. mollissima III. 587. no. 6.
ε. nemorosa III. 588. no. 6.
δ. vulgaris III. 587. no. 6.
— *sylvestris* α. Sm. III. 587. no. 6. δ. et 588. no. 6. ε.
— *sylvestris* Sole. III. 588. no. 6. ε.
— *sylvestris* var. *albida* Rchb. III. 587. no. 6. β.
— *sylvestris* var. *candicans* Rchb. III. 587. no. 6. β.
— *sylvestris* var. *nemorosa* Rchb. III. 588. no. 6. ε.
— *tenuifolia* Host. III. 592. no. 14. ε.
— *tenuifolia* Opiz. III. 589. no. 8. β.
— *tenuis* Michx. III. 589. no. 8.
— *tomentella* Hffmnsgg. et Lnk. III. 594. no. 20. β.
— *tomentosa* Borkh. III. 587. no. 6. δ.
— tomentosa d'Urville. III. 586. no. 3.
— *tomentosa* Hoppe et Hornsch. III. 588. no. 6. η.
— *tomentosa* Sm. III. 594. no. 20. β.
— *tortuosa* Host. III. 592. no. 14. α.
Mentha undulata Willd. III. 588. no. 6. η.
— *urticaefolia* Ten. III. 588. no. 6. ζ.
— *varians* Host. III. 592. no. 14. ε.
— *variegata* Sole. III. 593. no. 14. ζ.
— *velutina* Lejeune. III. 588. no. 6. η.
— *verticillata* D. Don. III. 381. no. 8.
— *verticillata* Feuill. III. 589. no. 8.
— *verticillata* Mill. III. 592. no. 14. α.
— *verticillata* Rxb. III. 580. no. 6.
— *villosa* Becker. III. 592. no. 14. α.
— *villosa* Sole. III. 587. no. 6. δ.
— *viminea* etc. P. Br. III. 725. no. 36.
— viridis Linn. III. 588. no. 8.
β. angustifolia Lej. } III. 589. no. 8.
γ. crispa Bth. } III. 589. no. 8.
— *viridis* Sole. III. 589. no. 8.
— *viridula* Host. III. 592. no. 14. α.
— *Weiheana* Opiz. III. 591. no. 13. β.
— *Wierzbeckiana* Opiz. III. 587. no. 6. δ.
— *Zeylanica* etc. Burm. III. 496. no. 6.
Menthastrum maximum Sloane. III. 557. no. 159.
Mentheae Endl. III. 584. III. 979. VI. 661.
Menthidium cf. *Minthidium*.
Menthoideae Bth. III. 576. III. 979. VI. 660.
Mentzelia Endl. V. 777. (ex p.)
Mentzelia Linn. II. 223. V. 776.
Mentzelia Torr. et Gr. II. 224. (ex p.)
— adhaerens Bth. V. 776. no. 2.
— albicaulis Dougl. II. 224. no. 6.
— *aurea* Nutt. II. 223. no. 1.
— congesta Torr. et Gr. II. 224. no. 7.
— Floridana Nutt. II. 223. no. 2.
— gracilenta Torr. et Gr. II. 224. no. 5.
— hispida Willd. II. 224. †
— *laevicaulis* Torr. et Gr. II. 224. no. 4.
— Lindleyi Torr. et Gr. II. 224. no. 4. * V. 776. no. 1.
— lobata Hook. * II. 224. no. 8.
— *micrantha* Torr. et Gr. II. 225. no. 6.
— *nuda* Torr. et Gr. II. 224. no. 2.
— oligosperma Nutt. * II. 223. no. 1.
— *ornata* Torr. et Gr. II. 224. no. 1.
— *pumila* Torr. et Gr. II. 225. no. 5.
— rhombifolia Nutt. II. 223. no. 3.
— stipitata DC. II. 224. † et in adnot.
Menyantheae Griseb. VI. 509.
Menyanthes Tournef. * VI. 510.
Menziesia Sm. * II. 729.
Mephitidia Reinwd. cf. Memphitidia.
Meratia Alph. DC. * VI. 561.
Merciera Alph. DC. * II. 711. * VI. 388.
— brevifolia Alph. DC. * VI. 734.
Mercierеae Alph. DC. VI. 388.
Meretricia Neraud. II. 525.

Meretricia ......? Neraud. *II. 525. no. 1.
Meriandra Bth. III. 598. °III. 980.
— Benghalensis Bth. III. 598. no. 2.
— strobilifera Bth. III. 598. no. 1.
Meriandreae Endl. III. 598. III. 980.
Meriania Swrtz. II. 117. V. 676.
— majalis Bth. V. 676. no. 1.
— purpurea Swrtz. *II. 117. no. 1.
Mericarpaea Boiss. ° VI. 8.
— vaillantioides Boiss. VI. 9. no. 1.
Meridema DC.? V. 829. no. 2.
Merimea Cambess. (ex p.) I. 284.
Merimea Cambess. *I. 286.
— *arenarioides* Cambess. I. 285. no. 1.
— *Texana* Hook. I. 285. no. 4.
Meriolix Raf. II. 79.
— Berlandieri Wlprs. II. 79. no. 2.
— serrulata Wlprs. II. 79. no. 1.
β. Douglasii.
γ. Drummondii.
α. Nuttallii.
δ. spinulosa.
Merista laevigata Bnks. et Soland. VI. 450. no. 1.
Meristotropis Fisch. et Mey. II. 857. ° V. 514.
— triphylla Fisch. et Mey. *II. 857. no. 1. * V. 514. no. 1.
Mertensia Bth. * VI. 561.
MESEMBRIANTHEMEAE Fnzl. II 265. V. 807.
Mesembrianthemum L. II. 265. V. 807.
— acinaciforme Linn. II. 266. †
— acutum Haw. II. 266. †
— aduncum Haw. II. 266. †
— aequilaterale Haw. II. 266. †
— anguinum Haw. II. 265. no. 2. II. 266. †
β. integrum.
α. denticulatum.
— aloides Haw. II. 266. †
— amoenum S. Dyck. II. 266. †
— anatomicum Haw. II. 266. †
— anceps Haw. II. 266. †
— asperum Haw. II. 266. †
— attenuatum Haw. II. 266. †
— aurantiacum Haw. II. 266. †
— aureum L. II. 266. †
— australe Ait. II. 266. †
— barbatum Linn. II. 266. †
— bellidiflorum L. II. 266. †
γ. subulatum Haw. II. 266. †
β. viride Haw. II. 266. †
— bicolorum L. II. 266. †
— bidentatum Haw. II. 266. †
— blandum Haw. II. 266. †
— brevicaule Haw. II. 266. †
Mesembrianthemum brevifolium Ait. II. 266. †
— bulbosum Haw. II. 266. †
— calamiforme L. II. 266. †
— calycinum Haw. II. 266. †
— candens Haw. II. 266. †
— caninum Haw. II. 266. †
— capitatum Haw. II. 266. †
— caulescens Mill. II. 266. †
— clavellatum Haw. II. 266. †
— coccineum Haw. II. 266. †
— compressum Haw. II. 266. †
— concavum Haw. II. 266. †
— conspicuum Haw. II. 266. †
— coralliflorum S. Dyck. II. 266. †
— cordifolium L. fil. II. 266. †
— corniculatum L. II. 266. †
— crassicaule Haw. II. 266. †
— crassifolium Haw. II. 266. †
— crassulinum DC. II. 266. †
— croceum Jcq. II. 267. †
— cruciatum Haw. II. 267. †
— curviflorum Haw. II. 267. †
— curvifolium Hav. II. 267. †
— defoliatum Haw. II. 267. †
— deltoides Mill. II. 267. †
— difforme Haw. II. 267. †
— diversifolium Haw. II. 267. †
β. congestum Haw. II. 267. †
— dolabriforme L. II. 267. †
— dubium Haw. II. 267. †
— echinatum Ait. II. 267. †
— elongatum Haw. II. 267. †
— Ermininum Haw. II. 265. no. 3.
— expansum L. II. 267. †
— falcatum L. II. 267. †
— falciforme Haw. II. 267. †
— felinum Haw. II. 267. †
— filamentosum L. II. 267. †
— filicaule Haw. II. 267. †
— flavum Haw. II. 267. †
— flexuosum Haw. II. 267. †
— floribundum Haw. II. 267. †
— forficatum L. II. 267. †
— formosum Haw. II. 267. †
— fragrans S. Dyck. II. 267. †
— geminiflorum Haw. II. 267. †
— glaucum L. II. 267. †
— gracile Haw. II. 267. †
— grandicaule Haw. II. 267. †
— grandiflorum Haw. II. 265. no. 5.
— grossum Haw. II. 267. †
— Haworthii Donn. II. 267. †
— heteropetalum Haw. 267. †
— hispidum L. II. 267. †
— inaequale Haw. II. 267. †
— inclaudens Haw. II. 267. †

Mesembrianthemum incomptum Haw. II. 267. †
— intonsum Haw. II. 267. †
— junceum Haw. II. 267. †
— lacerum Haw. II. 267. †
— Lehmanni Eckl. et Zeyh. II. 265. no. 6.
— lineolatum Haw. II. 267. †
— longispinulum Haw. II. 267. †
— lunatum Willd. II. 267. †
— luteum Haw. II. 266. no. 8.
— macrorhizum Haw. II. 266. no. 10.
— micans L. II. 267. †
— micranthum Haw. II. 267. †
— multipunctatum S. Dyck. II. 265. no. 1.
— muricatum Haw. II. 267. †
— musculinum Haw. II. 265. no. 4.
— mustellinum S. Dyck. II. 267. †
— mutabile Haw. II. 267. †
— nitidum Haw. II. 267. †
— nobile Haw. II. 267. †
— noctiflorum L. II. 267. †
— obconellum Haw. II. 267. †
— obliquum Haw. II. 267. †
— oligandrum Knze. V. 807. no. 1.
— pallens Ait. II. 267. †
— parvifolium Haw. II. 267. †
— patulum Haw. II. 267. †
— perfoliatum Haw. II. 267. †
— pomeridianum L. II. 268. †
— productum Haw. II. 268. †
— pulchellum Haw. II. 268. †
— purpureo-album Haw. II. 268. †
— *purpureo-croceum* β. *flavo-croceum* Haw. II. 266. no. 8.
— relaxatum Willd. II. 268. †
— rigidicaule Haw. II. 268. †
— Rossi Haw. II. 268. †
— rostellum Haw. II. 268. †
— rostratum L. II. 268. †
β. brevibracteatum Salm.
— rubricaule Haw. II. 268. †
— rubrocinctum DC. II. 268. †
— Salmii Haw. II. 268. †
— Salomoneum Haw. II. 268. †
— sarmentosum Haw. II. 268. †
— scalptratum Haw. II. 268. †
— scapiger Haw. II. 268. †
— Schottii S. Dyck. II. 268. †
— semicylindricum Haw. II. 268. †
— semidentatum S. Dyck. II. 268. †
— serrulatum Haw. II. 268. †
— spectabile Haw. II. 268. †
— spiniforme Haw. II. 268. †
— spinuliferum Haw. II. 268. †
— stenum Haw. II. 266. no. 9.
— stipulaceum L. II. 268. †
Mesembrianthemum striatum Haw. II. 268. †
— subincanum Haw. II. 268. †
— sulcatum Haw. II. 268. †
— tenuifolium L. II. 268. †
— tricolorum Haw. II. 268. †
— tripolium L. II. 268. †
— umbelliflorum Jcq. II. 268. †
— validum Haw. II. 265. no. 7.
— variabile Haw. II. 268. †
— verruculatum L. II. 268. †
— virens Haw. II. 268. †
— virescens Haw. II. 268. †
— virgatum Haw. II. 268. †
— viride Haw. II. 268. †
Mesitis Vogel. I. 809. †
Mesogramma DC. *II. 651.
Mesona Blume. III. 496. °III. 977.
— palustris Blume. III. 496. no. 1.
Mesosphaeria Bth. III. 556. VI. 659. no. 6.
Mesosphaerium hirsutum P. Browne. III. 557. no. 159.
Mespilus Lindl. II. 54.
Mespilus Tournef. II. 58. no. 2.
— *aestivalis* Walt. II. 58. no. 13.
— *Amelanchier?* Walt. II. 55. no. 2. β.
— *arborea* Michx. fil. II. 55. no. 2. α.
— *Aronia* Willd. II. 54. no. 7.
— *axillaris* Pers. II. 59. no. 16.
— Azarola DC. *II. 54. no. 7.
— *badiata* Bosc. II. 54. no. 4.
— Bosciana Spach. *II. 54. no. 4.
— *Boscii* Spach. II. 58. no. 5. ε.
— *Calpodendron* Ehrh. II. 58. no. 9.
— *Canadensis* Linn. II. 55. no. 2.
— *Canadensis* α. *obovalis* Michx. II. 55. no. 2. β.
β. *cordata* Michx. II. 55. no. 2. α.
δ. *oligocarpa* Michx. II. 55. no. 2. ζ.
γ. *rotundifolia* Michx. II. 55. no. 2. γ.
— Chinensis Blume. II. 54. no. 10.
— *corallina* Poir. II. 58. no. 12.
— corallina Tausch. II. 55. no. 12.
— *cornifolia* Poir. II. 58. no. 9.
— *crus galli* Dsf. II. 54. no. 3.
— *cuneifolia* Ehrh. II. 58. no. 5. ε. et 10.
— *elliptica* Guimpel et Hayne. II. 54. no. 3.
— *flexispina* Mnch. II. 59. no. 14.
— *flexuosa* Poir. II. 59. no. 16.
— Fontanesiana Spach. *II. 54. no. 3.
— *glandulosa* Bosc. II. 54. no. 3.
— Japonica L. II. 55. †
— *laciniata* Walt. II. 59. no. 16.
— *latifolia* Poir. II. 58. no. 9.
— lobata Poir. II. 55. †
— Loddigesiana Spach. *II. 54. no. 2.
— *melanocarpa* Fisch. II. 56. no. 1. β.

Mespilus nana Dum. II. 58. no. 5. δ.
— *odoratissima* Andr. II. 54. no. 6.
— orientalis M. Bieb. *II. 54. no. 6.
— *Phaenopyrum* Ehrh. II. 58. no. 12.
— purpurea Poir. *II. 54. no. 5.
— *purpurea* Poir. II. 58. no. 7.
— Sieboldi Blume. II. 54. no. 9.
— Smithii Ser. *II. 54. no. 1.
— spiralis Blume. II. 54. no. 8.
— *spiralis* Blume. II. 57. no. 1.
— Trewiana Tausch. II. 54. no. 11.
— *xanthocarpa* Linn. fil. II. 59. no. 16.
Messerschmidia candida Martens et Galeotti. VI. 556. no. 11.
— *chrysantha* Martens et Galeotti. VI. 556. no. 10.
Mesua L. I. 396.
— Coromandeliana Wght. I. 396. no. 2.
— *ferrea* Choisy. I. 396. no. 1.
— *ferrea* Rxb. I. 396. no. 3.
— *ferrea* W. et Arn. I. 396. no. 2.
— pedunculata Wght. I. 396. no. 1.
— Roxburghii Wght. I. 396. no. 3.
Metabasis DC. *II. 688.
— *Aetnensis* DC. VI. 343. no. 1.
— *Cretensis* DC. VI. 338. no. 2.
— *Cretensis β. serioloides* DC. VI. 338. no. 1.
— *Hymettia* DC. VI. 338. no. 2.
Metabolus Blume. *II. 491. VI. 700.
— macrophyllus Zolling. et Moritzi. VI. 700. no. 1.
Metagnanthus Endl. *II. 638.
Metagnanthus Endl. VI. 210.
Metalasia R. Br. *II. 648. VI. 248.
— compacta Zeyh. VI. 248. no. 2.
— Lichtensteinii Less. *VI. 248. no. 1. *β.* megacephala C. H. Schultz.
Metaplexis R. Br. *VI. 482.
Metastelma R. Br. VI. 482.
— Californicum Bth. VI. 483. no. 2.
— purpurascens Bth. VI. 482. no. 1.
Metaxanthus Meyen. °VI. 256.
— cacalioides Meyen. VI. 256. no. 2.
— grandiflorus Meyen. VI. 256. no. 1.
Metazanthus Meyen. *II. 701. (Cf. genus praecedens.)
Meteorus coccineus Lour. II. 192. no. 1.
Methorium Schott et Endl. I. 332.
— canum Schott et Endl. *I. 332. no. 1.
Methyscophyllum Eckl. et Zeyh. I. 560.
— glaucum Eckl. et Zeyh. I. 560. no. 1.
Meticulosae Bth. (Acacia) I. 870.
Metrocynia Pet. Th. *I. 855.
Metrodorea St. Hil. I. 501.
— nigra St. Hil. *I. 501. no. 1.
— pubescens St. Hil. et Tulasne. I. 501. no. 3.
Metrodorea stipularis Mart. I. 501. no. 2.
Metrosideros R. Br. II. 165. II. 923. V. 741.
— buxifolia All. Cunn. II. 165. no. 10.
— *capitata* Sm. V. 742. no. 4.
— *coriifolia* Vent. V. 741. no. 2.
— diffusa Sm. *II. 923. no. 1.
— falcata Dehnhrdt. II. 165. no. 9.
— *flexuosa* Willd. V. 739. no. 1.
— *glomerulifera* Sm. II. 161. no. 1.
— hypericifolia A. Cunn. II. 166. no. 12.
— *lophantha* Vent. II. 165. no. 4.
— lucida A. Rich. *V. 741. no. 1.
— macropus Hook. II. 165. no. 3.
— obovata Hook. II. 165. no. 2.
— *pauciflora* Endl. II. 166. no. 2.
— perforata A. Rich. *II. 165. no. 5.
— polymorpha Gaudich. II. 165. no. 1. (c. varr. *α.* *β.* et *γ.* ibid.)
— propinqua Endl. II. 165. no. 8.
— *propinqua* Endl. V. 742. no. 11.
— robusta All. Cunn. II. 165. no. 11.
—? salicifolia All. Cunn. II. 166. no. 13.
— *saligna* Sims. II. 165. no. 4.
— sororia Endl. II. 165. no. 6.
— *sororia* Endl. V. 745. no. 2.
— tomentosa A. Rich. II. 165. no. 4.
— *umbellata* Cav. V. 741. no. 1.
Metternichia Mikan. III. 123. °III. 956. °VI. 631. *VI. 655.
— affinis Prsl. VI. 632. no. 2.
— *princeps* Miers. VI. 632. no. 1.
— principis Mikan. III. 123. no. 1. VI. 632. no. 1.
Metternichieae Miers. VI. 566.
Metzleria Prsl. *II. 706. *VI. 375.
Meum Tournef. *II. 405.
— *Pyrenaicum* Gay. II. 405. no. 1.
— *segetum* Guss. II. 396. no. 1.
Meyenia Schlchtd. III. 122.
— *corymbosa* Schlchtd. III. 122. no. 3.
— *fasciculata* Schlchtd. III. 122. no. 1.
Meyeria DC. *II. 629.
Mezierea Gaudich. °V. 770.
— Salaciensis Gaudich. *V. 770. no. 1.
Mezoneurum Dsf. I. 811.
— cucullatum Wght. et Arn. I. 811. no. 1.
Michauxia L'Hérit. *II. 710. *VI. 383.
Michelia L. I. 70.
— aurantiaca Wall. I. 70. no. 4.
— Champaca L. *I. 70. no. 1.
— *Champacan* L. I. 71. no. 9.
— Doltsopa Buchan. *I. 70. no. 2.
— excelsa Blume? *I. 71. no. 8.
— glauca Wght. I. 71. no. 7.
— (?) lanuginosa Wall. I. 71. no. 12.
— Kisopa Buchan. *I. 70. no. 3.

Michelia longifolia Blume. *I. 71. no. 14.
β. racemosa.
— macrophylla Don. I. 71. no. 13.
— montana Blume. *I. 71. no. 16.
— Nilagirica Zenk. I. 71. no. 10.
— ovalifolia Wght. I. 71. no. 6.
— parviflora Deless. *I. 71. no. 18.
— pubinervia Blume. *I. 71. no. 15.
— Pulneyensis Wght. I. 71. no. 11.
— Rheedei Wght. I. 71. no. 9.
— *rufinervia* Spr. I. 71. no. 15.
— *rufinervis* Blume. I. 71. no. 15.
— *Tsjampaca* Blume. I. 71. no. 17.
— velutina Blume. *I. 71. no. 17.
— Walkerii Wght. I. 70. no. 5.
Miconia Rz. et Pav. II. 146. II. 918. V. 719.
— argyrophylla DC. *II. 146. no. 1.
— brevipes Bth. II. 146. no. 7.
— clidemioides Steudel. V. 721. no. 15.
— corallina Spring. II. 147. no. 13.
— depauperata Gardn. II. 918. no. 3.
— desmantha Bth. V. 719. no. 3.
— divaricata Gardn. II. 918. no. 2.
— eriophora Miquel. II. 147. no. 11.
— eriopoda Bth. II. 146. no. 2.
— erythropila Steudel. V. 720. no. 9.
— fasciculata Gardn. II. 147. no. 14.
— flammea Casaretto. V. 720. no. 7.
— Fleischeriana Steudel. V. 721. no. 12.
— Fockeana Miquel. II. 147. no. 10.
— *glaberrima* Schlchtd. II. 134. no. 15.
—? *glaucocarpa* Schlchtd. II. 134. no. 16.
— heterochroa Miquel. V. 719. no. 1.
— *holosericea* var. γ. DC. II. 147. no. 11.
— hypargyrea Miquel. V. 720. no. 8.
— jodophila Steudel. V. 720. no. 10.
—? *lineata* Schlchtd. II. 134. no. 19.
— longistyla Steudel. V. 721. no. 14.
— macrophylla Steudel. V. 720. no. 11.
— macrothyrsa Bth. II. 146. no. 4.
— myriantha Bth. II. 146. no. 9.
—? nitens Bth. II. 146. no. 5.
— Organensis Gardn. II. 918. no. 1.
— Pichinchensis Bth. V. 719. no. 5.
— polyandra Gardn. II. 918. no. 4.
— pterophora Miquel. V. 719. no. 2.
— pteropoda Bth. II. 146. no. 8.
— Quitensis Bth. V. 719. no. 4.
— *racemosa* DC. V. 723. no. 2.
— *racemosa* Miquel. V. 722. no. 1.
— Renggeri Steudel. V. 720. no. 6.
— repando-crenata Steudel. V. 721. no. 13.
— revoluta Bth. II. 146. no. 6.
— scandens Willd. *II. 556. no. 1.
β. pubescens.
— Schomburgkii Bth. II. 146. no. 3.
Miconia stenostachya DC. II. 146. no. 1.
—? *sylvatica* Schlchtd. II. 134. no. 17.
— *tomentosa* Don. II. 140. no. 5.
— tristis Spring. II. 147. no. 12.
Miconieae DC. II. 137. V. 709.
Micractis DC. *II. 621.
Micrandra Horsf. et Bennet. °V. 107.
— ternata Horsf. et Bennet. V. 107. no. 1.
Micracantha Dunal. (Solanum) III. 72.
Micranthae Pfeiff. (Echinopsis) II. 324.
Micranthae Bth. (Salvia) III. 628. VI. 662.
Micranthae Wlprs. (Verbena) IV. 18.
Micranthea Bth.? II. 810. no. 2.
Micranthea Wlprs. (Odontites) III. 399.
Micranthemum L. C. Rich. III. 291. °III. 965. *VI. 644.
— emarginatum Elliot. III. 291. no. 2.
— orbiculatum Michx. III. 291. no. 1.
Micranthera Choisy. I. 392.
— *clusiaefolia* Chois. I. 392. no. 2.
Micranthes Tausch. II. 366. no. 34.
Micrargeria Bth. *VI. 649.
Microblepharis Wght. et Arn. II. 222.
Microcala Lnk. et Hffmsgg. *VI. 502.
Microcarpaea R. Br. III. 291. °III. 965. *VI. 645.
— *cochlearifolia* Sm. III. 291. no. 1.
— *Montevidensis* Spr. III. 332. no. 2.
— muscosa R. Br. III. 291. no. 1.
— *spathulata* Hook. III. 334. no. 1.
Microcephalae Bth. (Mimosa) I. 878.
Microcephalae C. H. Schultz. (Hypochoeris) VI. 339.
Microceras Dcne. I. 101. V. 18.
Microcerasus Webb. II. 911.
Microchaeta Nutt. II. 620.
— cavarum Nutt. *II. 620. no. 3.
— connata Nutt. *II. 620. no. 8.
— hastulata Nutt. *II. 620. no. 1.
— integrifolia Nutt. II. 620. no. 5.
— lanceolata Nutt. II. 620. no. 2.
— procumbens Nutt. *II. 620. no. 6.
— strigulosa Nutt. *II. 620. no. 7.
— succulenta Nutt. *II. 620. no. 4.
Microchaete Bth. °VI. 324.
Microchaete Bth. VI. 325.
— corymbosa Bth. VI. 325. no. 2.
— glabrata Bth. *VI. 325. no. 4.
— pulchella Bth. *VI. 325. no. 5.
— teretifolia Bth. *VI. 325. no. 1.
— trichopus Bth. VI. 325. no. 6.
— vaccinioides Bth. *VI. 325. no. 3.
Microchlaena Wall. I. 351.
— quinquelocularis Wght. et Arn. I. 351. no. 2.
— spectabilis Endl. *I. 351. no. 1.

Microcochle Bth. I. 775.
Microcodon Alph. DC. *II. 710. *VI. 381.
— depressum Alph. DC. VI. 734. †
Micrococcia Hook. fil. *°VI. 311.
Microcorys R. Br. III. 772. °III. 985. VI. 676.
— barbata R. Br. III. 772. no. 3.
— purpurea R. Br. III. 772. no. 3.
— selaginoides Bart. VI. 676. no. 1.
— virgata R. Br. III. 772. no. 1.
Microcos L. I. 362.
— *Mala* Transact. Linn. Ham. I. 362. no. 27.
— *Münterii* Jack. I. 362. no. 28.
— *paniculata* L. I. 362. no. 27.
— *Stauntoniana* G. Don. I. 362. no. 27.
— *tomentosa* Sm. I. 362. no. 27.
Microderis DC. *II. 689. VI. 351.
— filii Seubert. VI. 351. no. 2.
— umbellata Hochstett. VI. 351. no. 1.
Microdesmia Bth. II. 5.
Microdon Choisy. IV. 168.
— cylindricus E. Mey. IV. 169. no. 4. (c. var. β. ibid.)
— Linkii Wlprs. IV. 169. no. 3.
— lucidus Choisy. IV. 168. no. 1. (et ibid. varr. α. β. γ.)
— ovatus Choisy. IV. 168. no. 2.
Microdonta Nutt. II. 619. VI. 169.
— nana Nutt. *II. 619. no. 1. VI. 169. no. 1.
Microgalium Griseb. VI. 11.
Microgenetes Alph. DC. *VI. 524.
Microglossa DC. II. 587. II. 951. no. 17.
Microgyne Lssng. *II. 583.
Microlecane DC. (??) VI. 171. no. 1.
Microlepis DC. *II. 137.
Microlicia DC. (ex p.) V. 697.
Microlicia DC. II. 125. °V. 690.
— acuminata Naudin. V. 694. no. 25.
β. glabra.
— *alsinaefolia* DC. V. 697. uo. 1.
— avicularis Martius. V. 692. no. 15.
— baccharoides Mart. V. 691. no. 9.
— canastrensis Naudin. V. 692. no. 11.
β. longifolia.
— chamaepitys Naudin. V. 696. no. 42.
— ciliosa Naudin. V. 693. no. 24.
— confertiflora Naudin. V. 692. no. 16.
— cordata Cham. *II. 125. no. 9.
— crenulata Mart. V. 697. no. 49.
β. microphylla.
— cryptandra Naudin. V. 692. no. 13.
— cuneata Naudin. V. 694. no. 27.
— cuspidifolia Mart. V. 696. no. 47.
— decussata Naudin. V. 692. no. 12.
— doryphylla Naudin. V. 694. no. 30.
— elegans Naudin. V. 696. no 48.
— ericoides Don. V. 696. no. 43.
Microlicia euphorbioides Mart. II. 125. no. 4. *V. 693. no. 20.
β. jonantha } II. 125. no. 4.
α. leucantha }
— fasciculata Mart. V. 694. no. 28.
— ferruginea Scheele. V. 691. no. 7.
— formosa Cham. II. 126. no. 14.
— fulva Cham. *II. 125. no. 11.
— glossophylla Naudin. V. 696. no. 46.
— glutinosa Naudin. V. 694. no. 26.
— graveolens DC. *II. 125. no. 2. V. 694. no. 31.
— Hilariana Naudin. V. 693. no. 21.
— hirsutissima Naudin. V. 694. no. 33.
— hirto-ferruginea Naudin. V. 692. no. 14.
— hispidula Naudin. V. 695. no. 35.
— holosericea Naudin. V. 695. no. 34.
— humilis Naudin. V. 693. no. 22.
— hypericoides Cham. II. 125. no. 8.
— imbricata Cham. II. 126. no. 16.
— inquinans Naudin. V. 690. no. 2.
— insignis Naudin. V. 695. no. 38.
— *inundata* DC. II. 125. no. 1. V. 690. no. 1.
— isophylla DC. V. 696. no. 45.
— jungermannioides DC. V. 691. no. 6.
— juniperina St. Hil. II. 125. no. 5.
— linifolia Cham. *II. 126. no. 15. V. 695. no. 39.
β. ciliolata V. 695. no. 39.
— loricata Naudin. V. 697. no. 50.
— macrophylla Naudin. V. 691. no. 5.
— Melastoma Lothsky et Manso. II. 125. no. 7.
— multicaulis Mart. V. 695. no. 40.
— myrtoidea Cham. II. 125. no. 13.
— oblongifolia Naudin. V. 693. no. 19.
β. leucantha.
— obtusa Naudin. V. 691. no. 4.
— parvifolia Naudin. V. 692. no. 17.
β. viscosa V. 693.
— polystemma Naudin. V. 693. no. 23.
— pulchella Cham. II. 125. no. 12.
— *pulchella* Mart. V. 693. no. 18. V. 696. no. 45.
— recurva DC. *V. 692. no. 10.
— resinosa Mart. V. 690. no. 1.
— scoparia DC. V. 695. no. 41.
— selaginea Naudin. V. 697. no. 51.
— serrulata Cham. II. 125. no. 10.
— setosa DC. V. 695. no. 36.
β. pubescens.
— stenocladon Naudin. V. 697. no. 52.
— subsetosa DC. *II. 125. no. 1.
— subuliformis Naudin. V. 696. no. 44.
— taxifolia Naudin. V. 695. no. 37.
— tomentella Naudin. V. 691. no. 8.

Microlicia trembleyaeformis Naudin. V. 691. no. 3.
— *variabilis* DC. V. 698. no. 2.
— variabilis Mart. *II. 125. no. 3.
— *variolosa* DC. II. 125. no. 9. V. 691. no. 9. V. 692. no. 15. V. 693. no. 20.
— variolosa DC. V. 694. no. 29.
— venusta Mart. V. 693. no. 18.
— vestita DC. V. 694. no. 32.
— viscidula Cham. II. 125. no. 6.
Microloma R. Br. *VI. 482.
Microlomae Dcne. VI. 482.
Microlonchus DC. *II. 670. VI. 292.
— albispinus Bnge. VI. 292. no. 1.
— *Persicus* DC. VI. 293. no. 5.
Microlophus DC. VI. 293.
Microlotus Torr. et Gr. I. 649.
Micromelium Blume. I. 382.
— *monophyllum* Wght. I. 382. no. 1.
— pubescens Blume. *I. 382. no. 1.
Micromelum Blume. V. 140.
— glabrescens Bth. V. 140. no. 2.
— pubescens Blume. V. 140. no. 1.
Micromeria Bth. III. 718. °III. 983. VI. 672.
— alternipilosa C. Koch. VI. 672. no. 1.
— approximata Rchb. III. 721. no. 16.
— Arkansana Bth. III. 718. no. 2.
— australis Bth. III. 725. no. 34.
— barbata Fisch. Mey. et Lallem. III. 947.
— biflora Bth. III. 723. no. 27.
— Boliviana Bth. III. 725. no. 37.
— bracteolata Bth. III. 718. no. 3.
— Brownei Bth. III. 718. no. 5.
— canescens Bth. III. 722. no. 20.
— cristata Griseb. III. 720. no. 12.
— Cunninghami Bth. III. 719. no. 7.
— densiflora Bth. III. 721. no. 18.
— Douglasii Bth. III. 719. no. 8.
— filiformis Bth. III. 723. no. 24.
— Forbesii Bth. III. 722. no. 19.
— Forskâlei Bth. III. 724. no. 30.
— Gilliesii Bth. III. 726. no. 39.
— glabella Bth. III. 718. no. 1.
— gracilis Bth. III. 725. no. 35.
— Graeca Bth. III. 720. no. 10.
γ. densiflora Bth.
β. longiflora Guss.
— inodora Bth. III. 721. no. 17.
— Juliana Bth. III. 719. no. 9.
β. hirsuta.
— lanata Bth. III. 721. no. 14.
— marifolia Bth. III. 726. no. 41.
— microphylla Bth. III. 722. no. 22.
α. glabriuscula.
β. villosa.
— *montana* Rchb. III. 708. no. 3.
Micromeria myrtifolia Boiss. III. 947.
— nervosa Bth. III. 722. no. 21.
— nubigena Bth. III. 726. no. 38.
— ovata Bth. III. 723. no. 23.
— obovata Bth. III. 725. no. 36.
— parviflora Rchb. III. 720. no. 11.
— Persica Boiss. VI. 672. no. 2.
— Piperella Bth. III. 724. no. 29.
— Pulegium Bth. III. 726. no. 40.
— punctata Bth. III. 723. no. 25.
— *pygmaea* Rchb. III. 708. no. 3.
— saturejoides Bth. III. 725. no. 33.
— Sinaica Bth. III. 724. no. 31.
— *spicata* Rchb. III. 708. no. 4.
— spicigera C. Koch. III. 724. no. 32.
— staminea Boiss. III. 947.
— stolonifera Bth. III. 718. no. 4.
— subcordata Visiani. III. 724. no. 28.
— Teneriffae Bth. III. 723. no. 26.
— *tenuifolia* Reichb. III. 720. no. 10. γ.
— tenuis Bth. III. 721. no. 13.
— thymoides B. Webb. *III. 947.
— *varia* Bth. III. 721. no. 15.
— *variegata* Rchb. III. 708. no. 3.
— Xalapensis Bth. III. 719. no. 6.
Micromyrtus Schauer. V. 748.
Micropeae C. H. Schultz. II. 952.
Micropetalum DC. II. 364. no. 17.
Microphyllae (Albizzia) Bth. V. 597.
Microphysa Schrenk. °VI. 18.
— galioides Schrenk. *VI. 19. no. 10.
Micropleura Lag. *II. 384.
Micropora (Solanum) Sendtner. VI. 594.
Micropsis DC. *II. 599. *II. 952. no. 2. VI. 140.
— nana DC. *VI. 140. no. 1.
Micropus Linn. II. 599. *II. 952. II. 973.
— angustifolius Nutt. II. 599. no. 1.
— *angustifolius* Nutt. II. 973. no. 1. β.
— brevissimus Wlprs. II. 600. no. 3.
— Californicus Fisch. et Mey. *II. 973. no. 1.
β. angustifolius.
— globiferus Bert. *II. 600. no. 2.
— *minimus?* DC. II. 600. no. 3.
— Oregonus Wlprs. II. 600. no. 4.
— tenellus Wlprs. II. 600. no. 5.
Micropyxis Duby. VI. 447.
— rubricaulis Duby. VI. 447. no. 1.
Microrhynchus Lssng. II. 695.
Microrhynchus Lssng. *VI. 359.
— *sarmentosus* DC. II. 993. no. 2.
— *Surinamensis* Miquel. II. 993. no. 1.
Microsciadium Boiss. °V. 849.
— tenuifolium Boiss. V. 849. no. 1.
Microseris Don. *II. 686. *VI. 328.
Microsperma Hook. II. 224.
Microsperma Hook. °V. 777.

Microsperma bartonioides Wlprs. V. 777. no. 2.
— *lobata* Hook. II. 224. no. 8.
— lobata Hook. V. 777. no. 1.
Microsperma (Tanacetum) C. H. Schultz. VI. 222.
Microspermae (Guizotia) C. H. Schultz. VI. 158.
Microspermum Lag. *II. 701. no. 7.
Microsphace (Salvia) Bth. III. 628.
Microstemma Labill. I. 372.
— salicifolium Labill. *I. 372. no. 1.
Microstephium Lssng. *II. 666.
Microstephus Jaub. et Spach. VI. 32.
Microsyphus Prsl. VI. 650.
— parviflorus Prsl. *VI. 650. no. 1.
Microthelae Pfeiff. (Mammillaria) II. 288.
Microtrichia DC. *II. 594 *II. 952. no. 38.
Microtropis Wall. I. 534.
— *coriacea* Wall. II. 71. no. 1. V. 664. no. 1.
— discolor Wall. *I. 534. no. 1.
— *hirsuta* E. Mey. I. 618. no. 1.
Middendorfia Trautv. °V. 673.
— Borysthenica Trautv. V. 673. no. 1.
— hamulosa Trautv. V. 674. no. 2.
Mikania Willd. II. 556. II. 950. VI. 114.
— affinis Gardn. VI. 115. no. 8.
— argyrostigma Miq. II. 950. no. 3.
— armigera Poepp. et Endl. II. 556. no. 3. [VI. 114. no. 4.]
— aspera Miq. II. 950. no. 2.
— Bogotensis Bth. VI. 116. no. 16.
— brachiata Poepp. et End. VI. 115. no. 10.
— campanulata Gardner. VI. 715. no. 24.
— Candolleana Gardner. VI. 713. no. 11.
— caudata Bth. VI. 114. no. 3.
— coarctata Gardner. VI. 713. no. 10.
— Cocaënsis Gardner. VI. 714. no. 19.
— complanata Gardner. VI. 714. no. 14.
— conferta Gardner. VI. 116. no. 13.
— corymbulosa Bth. VI. 114. no. 2.
— decora Poepp. et Endl. VI. 115. no. 11.
— deflexa Gardner. VI. 713. no. 7.
— divaricata Gardner. VI. 715. no. 21.
— divaricata Poepp. et Endl. VI. 115. no. 9.
— fimbriata Gardner. VI. 115. no. 6.
— flavescens Gardner. VI. 712. no. 5.
— Fockeana Miq. II. 950. no. 1.
— hispida Gardner. VI. 716. no. 26.
— Ildefonsiana Gardner. VI. 714. no. 13.
— lanigera Gardner. VI. 712. no. 2.
— maritima Gardner. VI. 715. no. 23.
— Martiana Gardner. VI. 713. no. 12.
— nigricans Gardner. VI. 714. no. 16.
— Pernambucensis Gardn. VI. 715. no. 25.
— populifolia Gardn. VI. 714. no. 15.
Mikania premnifolia Gardn. VI. 712. no. 3.
— puberula Gardn. VI. 713. no. 8.
— *pubescens* Mühlbrg. II. 556. no. 1.
— punctata Gardn. VI. 116. no. 17.
— racemulosa Bth. II. 556. no. 2.
— ramosissima Gardn. VI. 713. no. 9.
— rufa Bth. VI. 116. no. 15.
— Ruiziana Poepp. et Endl. VI. 114. no. 5.
— reticulata Gardn. VI. 712. no. 4.
— salviaefolia Gardn. VI. 715. no. 20.
— scandens Willd. *II. 566. no. 1.
— sepiaria Gardn. VI. 715. no. 22.
— Stambana Gardn. VI. 712. no. 6.
— strobilifera Gandn. VI. 712. no. 1.
— stylosa Gardn. VI. 714. no. 17.
— *senecioides* Hortor. VI. 264. no. 43.
— strigosa Gardn. VI. 116. no. 14.
— subcordata Gardn. VI. 116. no. 12.
— umbellifera Gardn. VI. 115. no. 7.
— variabilis Gardn. VI. 714. no. 18.
— variabilis Mey. et Wlprs. VI. 114. no. 1.
Miliusia Lechen. I. 74.
— Indica Lechen. I. 74. no. 1.
Millefolio affinis Maderaspatana camphorata etc Morison. IV. 158. no. 30.
Milleria Cass. *II. 602.
Millerieae DC. II. 603. II. 974. VI. 147.
Milletia Wght. et Arn. I. 799. II. 902. V. 544.
— Caffra Meisn. V. 544. no. 1.
— nitida Bth. I. 799. no. 4. [II. 902. no. 1.]
— piscidia Wght. I. 799. no. 3.
— rubiginosa Wght. et Arn. I. 799. no. 1. (III. Emend. p. 4.)
— splendens Wght. et Arn. I. 799. no. 2. (III. Emend. p. 4.)
Milligania Hook. 672. VI. 100.
— cordifolia J. Hook. *II. 100. no. 1. V. 672. no. 1.
Millina Cass. *II. 698. VI. 345.
— Persica Boiss. VI. 345. no. 1.
Millingtonia Linn. fil. *VI. 511.
Millingtonia Rxb. I. 423.
— *alba* Schlchtd. II. 816. no. 1.
— *Arnottiana* Wght. I. 423. no. 3.
— *congesta* Rxb. I. 791. no. 2.
— *dilleniaefolia* Wall. I. 423. no. 4.
— *pungens* Wall. I. 423. no. 1.
— *simplicifolia* Rxb. I. 423. no. 2.
— *stricta* Rxb. I. 790. no. 1.
Millotia Cass. *II. 646. VI. 234.
— glabra Steetz. VI. 234. no. 2.
— myosotidifolia Steetz. VI. 234. no. 1.
— robusta Steetz. VI. 234. no. 3.
— tenuifolia Cassini. VI. 234. no. 4.
Milnea Rxbrgh. I. 428.

Milnea Roxburghiana Wght. et Arn. I. 428. no. 1. (Ill. Emend. p. 2.)
Miltantha Bernh. I. 112.
Miltitzia Alph. DC. *VI. 525.
Mimosa L. I. 864. II. 905. °V. 584.
— *abstergens* Spr. I. 916. no. 299.
— Acacia H. B. Kth. V. 585. no. 7.
—? *acacioides* Bth. I. 860. no. 21. I. 883. no. 207.
— acanthocarpa Bth. *I. 881. no. 180.
— acerba Bth. I. 871. no. 70.
β. latifolia.
— *Acle* Blanco. I. 884. no. 1. V. 587. no. 1.
— acutiflora Bth. I. 877. no. 134.
— acutistipula Bth. I. 876. no. 117.
— *adenanthera* Rxb. I. 863. no. 2. V. 583. no. 2.
— adenocarpa Bth. I. 878. no. 145.
— adhaerens H. B. Kth. *I. 865. no. 3.
— adhaerens Mart. I. 883. no. 205.
— *adhaerens* Mart. I. 917. no. 310.
— adianthifolia Schum. et Thonn. I. 882. no. 196.
— adpressa Hook. et Arn. I. 873. no. 93.
— adstringens Schum. et Thonn. I. 883. no. 201.
— *adstringens* Schum. et Thonn. I. 910. no. 246.
— Aeschynomenes Bth. V. 585. no. 8.
— *agrestis* Sieb. I. 861. no. 2. V. 582. no. 2.
— *alba* Vahl. V. 627. no. 32.
— albida Kth. *I. 865. no. 1.
— angusta Bth. I. 865. no. 14.
— antrorsa Bth. I. 879. no. 156.
— *arborea* Swrtz. V. 613. no. 26.
— arcuata Mart. et Gal. V. 584. no. 1.
— asperata L. *I. 878. no. 147.
— asperrima Bth. I. 871. no. 66.
— atacta Steudel. V. 585. no. 4.
— aurivillus Mart. I. 874. no. 104.
— axillaris Bth. I. 872. no. 83.
— Bahamensis Bth. I. 881. no. 175.
— *balsamica* Molina. I. 730. no. 19.
— *Barbatimam* Vellozo. I. 860. no. 1.
— barbigera Bth. I. 868. no. 43.
— *bicolor* Hels. et Boj. I. 863. no. 1.
— *bicolor* Schum. et Thon. I. 863. no. 3.
— bicolor Schum. et Thonn. I. 883. no. 200.
— bifurca Bth. I. 880. no. 168.
— *bigemina* Vahl. V. 614. no. 28.
— *biglobosa* Jcq. V. 577. no. 1.
— bijuga Bth. I. 877. no. 139.
— biuncifera Bth. I. 881. no. 181.
— Bonplandii Bth. I. 874. no. 101.
β. minor.
— *Burgoni* Aubl. V. 627. no. 32.
Mimosa brachycarpa Bth. I. 881. no. 185.
— bracteolaris Bth. I. 880. no. 174.
— brevipes Bth. I. 872. no. 80.
— caesalpiniaefolia Bth. I. 876. no. 119.
— callosa Bth. I. 870. no. 61.
— calocephala Mart. I. 870. no. 56.
— calodendron Mart. I. 875. no. 107.
— calothamnos Mart. I. 875. no. 106.
— calycina Bth. I. 871. no. 68.
— *canescens* W. I. 878. no. 147.
— casta L. *I. 866.*no 18.
— *Catechu* Linn. fil. I. 914. no. 286.
— *catechuoides* Rxb. I. 914. no. 287.
— *Cavenia* Colla. I. 909. no. 237.
— Ceratonia L. *I. 877. no. 126.
— *chrysostachys* Boj. et Hels. I. 861. no. 2. V. 580. no. 2.
— *ciliata* W. I. 878. no. 147.
— cinerea Vellozo. I. 878. no. 149.
— *circinnalis* Linn. V. 611. no. 11.
— Claussenii Bth. I. 879. no. 162.
— *cochlearis* Lab. I. 890. no. 41.
— *cochlocarpa* Gomez. I. 932. no. 2. V. 612. no. 20.
— *colubrina* Vellozo. I. 860. no. 24.
— camporum Bth. I. 879. no. 155.
— *concinna* Willd. I. 916. no. 299.
— *contortisiliqua* Arrabida. V. 621. no. 1.
— cordistipula Bth. I. 882. no. 187.
— *coriacea* Blanco. V. 597. no. 12.
— *coriacea* Pers. V. 623. no. 6.
— *coriacea* Sieb. V. 629. no. 47.
— *cornigera* Linn. I. 912. no. 267.
— cruenta Bth. I. 880. no. 172.
— cylindracea Bth. I. 875. no. 111.
— *cylindrica* Arrabida. V. 626. no. 26.
— daleoides Bth. I. 875. no. 110.
— debilis Humb. et Bonpl. *I. 865. no. 11.
— densa Bth. I. 880. no. 164.
— depauperata Bth. I. 881. no. 183.
— *diadema* Arrabida. V. 625. no. 16.
— diffusa Bth. I. 869. no. 53.
— digitata Bth. I. 867. no. 33.
— dimidiata Bth. I. 871. no. 69.
— *Diringa* Rxb. V. 614. no. 30.
— discolor Bth. I. 875. no. 115.
— dispersa Bth. I. 868. no. 39.
— distans Bth. I. 872. no. 82.
— *divaricata* Jcq. V. 594. no. 9.
— dolens Vellozo. I. 866. no. 21.
— Domingensis Bth. *I. 881. no. 178.
— Dominiciana Desvx. I. 883. no. 202.
— dormiens Humb. et Bonpl. *I. 878. no. 151.
— *dulcis* Rxb. V. 610. no. 5.
— *eburnea* Rxb. I. 911. no. 250.

Mimosa elata Rxb. V. 597. no. 12.
— elliptica Bth. I. 878. no. 148.
— elongata Bth. I. 868. no. 38.
—? Emirnensis Bth. I. 877. no. 133.
— endymionis Mart. I. 867. no. 31.
— ephedroides Bth. I. 882. no. 194.
— erinacea Bth. I. 873. no. 85.
— eriocarpa Bth. I. 874. no. 102.
— eriocaulis Bth. I. 873. no. 86.
— extensa Bth. I. 876. no. 122.
— *fagifolia* Linn. V. 627. no. 31.
— falcipinna Bth. I. 868. no. 42.
— fasciculata Bth. I. 873. no. 87.
— *ferruginea* Rottl. I. 917. no. 306.
— *fervida* Mart. I. 865. no. 8.
— *filicifolia* Lam. V. 613. no. 26.
— filipes Mart. I. 869. no. 52.
— flagellaris Bth. I. 869. no. 46.
— *flagelliformis* Vellozo. I. 930. no. 19. V. 624. no. 11.
— flavescens Splitgerber. V. 585. no. 6.
— floribunda Willd. *I. 865. no. 2.
— *floribunda* Willd. var. *β.* I. 865. no. 2.
— *Fluminensis* Vellozo. I. 917. no. 309.
— foliolosa Bth. I. 880. no. 165.
β. pubescens.
— *fruticosa* Vellozo. I. 859. no. 2.
— furfuracea Bth. I. 875. no. 108.
— Gardneri Bth. I. 879. no. 161.
— *geminata* Koen. I. 930. no. 22. V. 611. no. 15.
— Gilliesii Bth. I. 882. no. 193.
— glaberrima Schum. et Thonn. I. 882. no. 195.
— *glaberrima* Schum. et Thonn. V. 596. no. 8.
— glabra Bth. I. 874. no. 97.
— *glauca* Linn. V. 586. no. 1.
— glaucescens Bth. I. 865. no. 12.
— Goyazensis Bth. I. 871. no. 76.
—? gracilis Bth. I. 882. no. 190.
— *grandiflora* L'Hérit. I. 926. no. 4.
— *grandiflora* Madr. Herb. I. 857. no. 2. V. 577. no. 1.
— *grandisiliqua* Vellozo. I. 918. no. 311.
— Guineensis Schum. et Thonn. I. 882. no. 197.
— hamata Willd. *I. 877. no. 131.
— *heterophylla* Rxb. V. 614. no. 32.
— hirsutissima Mart. I. 871. no. 71.
— *hispida* W. I. 878. no. 147.
— honesta Mart. I. 869. no. 47.
— *horrida* Sm. I. 911. no. 250.
— *Houstoni* L'Hérit. I. 926. no. 3.
— humilis Humb. et Bonpl. *I. 879. no. 153.
— hypoglauca Mart. I. 870. no. 57.
Mimosa ignava H. B. Kth. V. 594. no. 7.
— imbricata Bth. I. 871. no. 72.
— implexa Bth. I. 881. no. 186.
— *incana* Spr. *I. 874. no. 100.
— *incurialis* Arrabida. V. 619. no. 62.
— insidiosa Mart. I. 866. no. 22.
— intermedia Kth. *I. 879. no. 152.
— interrupta Bth. *I. 876. no. 118.
— intricata Bth. I. 880. no. 169.
— *invisa* Mart. I. 884. no. 3.
— involucrata Bth. I. 874. no. 98.
— *Jiringa* W. Jack. V. 614. no. 30.
— kermesina Otto et Alb. Dietr. I. 883. no. 206.
— *Koeringa* Rxb. V. 614. no. 30.
— lanata Bth. I. 871. no. 73.
— lasiocarpa Bth. I. 878. no. 144.
— lasiocephala Bth. I. 869. no. 50.
— latespinosa Lam. *I. 877. no. 132.
— *laurina* Swrtz. V. 626. no. 25.
— leiocarpa DC. *I. 876. no. 116.
— leiocephala Bth. I. 879. no. 159.
— leptantha Bth. I. 882. no. 189.
— leptocaulis Bth. I. 877. no. 140.
— *ligustrina* Jcq. V. 609. no. 1.
— *ligustrina* Vahl. V. 616. no. 43.
— litigiosa Mart. I. 865. no. 6.
— longipes Bth. I. 868. no. 41.
— longipinna Bth. I. 867. no. 29.
— *longisiliqua* Vellozo. I. 923. no. 388. *β.*
— *lucida* Rxb. V. 595. no. 4.
— *lucida* Vahl. V. 632. no. 67.
— lucidula Bth. I. 880. no. 170.
— lupulina Bth. I. 878. no. 143.
— *lusoria* Arrabida. V. 613. no. 24.
— *macrostachya* Vahl. V. 609. no. 1.
— malitiosa Mart. I. 865. no. 5.
— Mansii Mart. I. 867. no. 27.
— marginata Lindl. I. 868. no. 45.
— *mellifera* Vahl. I. 913. no. 277.
— meticulosa Mart. I. 872. no. 81. [I. 883. no. 204.]
β. fuscescens I. 872. no. 81.
— micrantha Bth. I. 876. no. 121.
— *micrantha* Vahl. V. 582. no. 2.
— microcephala Humb. et Bonpl. *I. 878. no. 150.
— micropteris Bth. I. 873. no. 89.
— millefoliata Scheele. V. 585. no. 5.
— misera Bth. I. 882. no. 188.
— modesta Mart. I. 866. no. 17.
— mollis Bth. I. 881. no. 176.
— monancistra Bth. I. 881. no. 182.
— *Mongollo* Arrabida. V. 622. no. 4.
— monilifera Bertol. I. 883. no. 208.
— *monilifera* Bertoloni. V. 610. no. 6.

Mimosa? montana Kth. *I. 877. no. 127.
— multiplex Bth. I. 869. no. 51.
— myriophylla Bngrd. I. 873. no. 88.
— *natans* Linn. fil. V. 583. no. 3.
— nervosa Bngrd. I. 868. no. 40.
— *nigricans* Vahl. V. 593. no. 8.
— nitens Bth. I. 879. no. 157.
— *nitida* Vahl. I. 931. no. 33. V. 611. no. 16.
— notata Steudel. V. 584. no. 2.
— nuda Bth. I. 865. no. 13.
— nutans Arrabida. V. 625. no. 15.
— oblonga Bth. I. 866. no. 23.
— obovata Bth. I. 877. no. 125.
— *obovata* Rxb. I. 914. no. 279.
— obtusifolia Willd. *I. 865. no. 8.
— oligacantha DC. *I. 877. no. 129.
— orthacantha Bth. I. 866. no. 24.
— pachycarpa Bth. I. 880. no. 167.
— paludosa Bth. I. 878. no. 146.
— paniculata Bth. I. 865. no. 10. I. 876. no. 124.
— papposa Bth. I. 870. no. 59.
— parvipinna Bth. I. 873. no. 90.
— paucifolia Bth. I. 882. no. 191.
— paupera Bth. I. 869. no. 48.
— pectinata Kth. *I. 867. no. 25.
— peduncularis Bngrd. I. 875. no. 105.
  β? rufescens.
— *pedunculata* Rxb. I. 857. no. 2. V. 577. no. 1.
— *pellita* W. I. 878. no. 147.
— pentagona Schum. et Thonn. I. 882. no. 198.
— *peregrina* Blanco. V. 577. no. 1.
— *peregrina* L. I. 860. no. 21.
— petiolaris Bth. I. 870. no. 62.
— phyllodinea Bth. I. 882. no. 192.
— *pilosiuscula* Rich. V. 632. no. 67.
— pilulifera Bth. I. 874. no. 99.
— *plana* Vellozo. I. 928. no. 4. V. 625. no. 14.
— platyloma Bth. I. 880. no. 166.
— *plena* Linn. V. 583. no. 2.
— podocarpa Bth. I. 877. no. 135.
— pogocephala Bth. I. 872. no. 84.
— Pohlii Bth. I. 870. no. 58.
— *polyacantha* W. I. 878. no. 147.
— polyantha Bth. I. 881. no. 184.
— polycarpa Kth. *I. 867. no. 26.
— polycephala Bth. I. 869. no. 55.
— polydactyla Humb. et Bonpl. *I. 867. no. 32.
— *procera* Rxb. V. 596. no. 12.
— *procumbens* Schum.? I. 878. no. 147.
— procumbens Schum. et Thonn. I. 882. no. 199.
Mimosa procurrens Bth. I. 868. no. 44.
— pteridifolia Bth. I. 875. no. 114.
— *pterocarpa* Lam. V. 581. no. 1.
— pudica L. *I. 867. no. 30.
— *pulchella* Rxb. I. 925. no. 12.
—? pumila Schlchtd. I. 883. no. 203.
— punctata Linn. V. 583. no. 2.
— pusilla Bth. V. 585. no. 9.
— pycnocoma Bth. I. 879. no. 163.
— quadrijuga Slzm. I. 877. no. 138.
— Quitensis Bth. I. 881. no. 177.
— *racemosa* Schlchtd. I. 265. no. 2.
— ramulosa Bth. I. 874. no. 95.
— reptans Bth. I. 869. no. 49.
— retrorsa Bth. I. 866. no. 20.
—? revoluta Bth. *I. 881. no. 179.
— rigescens Bth. I. 870. no. 63. (c. var. β. ibid.)
— rigida Bth. I. 870. no. 64.
— rixosa Mart.? I. 865. no. 9.
  β? vestita.
— radula Bth. I. 871. no. 67.
— *rosea* Vahl. V. 610. no. 7.
— rubricaulis Lam. *I. 877. no. 130.
— rudis Bth. I. 870. no. 65.
— rufipila Bth. I. 867. no. 35.
— *rugata* Lam. I. 916. no. 299.
— rupestris Bth. I. 873. no. 91.
— *saponaria* Lour. V. 614. no. 28. β.
— *saponaria* Rxb. I. 916. no. 299.
— scabrella Bth. I. 874. no. 103.
— *scandens* L. I. 858. no. 1.
— Schomburgkii Bth. I. 875. no. 113.
— *scutifera* Blanco. V. 616. no. 39.
— *scutifera* var. *Cosai*, *Malacomonsili* vel *Alocahai* Blanco. V. 615. no. 33.
— *semialata* Vellozo. I. 928. no. 5. V. 627. no. 33.
— sepiaria Bth. I. 877. no. 128.
— huericantha Bth. I. 876. no. 120.
— *sessilis* Arrabida. V. 639. no. 104.
— setipes Bth. I. 870. no. 60.
— setistipula Bth. I. 871. no. 75.
— setosa Bth. I. 879. no. 160.
— *sicaria* Hffmsgg. I. 878. no. 147.
— *Sinemariensis* Aubl. V. 633. no. 74.
— *Sirissa* Rxb. V. 596. no. 6.
— *Smithiana* Rxb. V. 598. no. 19.
— somnians Humb. et Bonpl. *I. 877. no. 136.
— somniculosa H. B. Kth. *I. 877. no. 137.
— sordida Bth. I. 875. no. 109.
— sparsa Bth. I. 874. no. 96.
— *spectabilis* Vahl. V. 637. no. 95.
— *spicata* E. Mey. I. 858. no. 4.
— Sprengelii DC. *I. 874. no. 94.

Mimosa stipularis Bngrd. I. 872. no. 78.
— striato-stipula Steudel. V. 584. no. 3.
— strigillosa Torr. et Gr. I. 879. no. 154.
— strigosa Willd. *I. 865. no. 4.
— subinermis Bth. I. 873. no. 92.
— subsericea Bth. I. 872. no. 79.
— subvestita Bth. I. 871. no. 74.
— *Suma* Rxb. I. 914. no. 286.
— *Sundra* Rxb. I. 915. no. 288.
— *tamariscina* Lam. V. 581. no. 1.
—? taxifolia Bngrd. I. 869. no. 54.
— *tenuis* Vellozo. V. 625. no. 15. *β.*
— *terminalis* Vellozo. V. 619. no. 65.
— tetraphylla Vellozo. V. 626. no. 23.
β. parvifolia.
— tomentosa Kth. *I. 868. no. 36.
— *torta* Rxb. I. 917. no. 306.
— trachycarpa Bth. I. 880. no. 173.
— *trapezifolia* Vahl. V. 612. no. 22.
— trapezifolia Rxb. V. 615. no. 33.
— tremula Bth. I. 872. no. 77.
β. gracilior.
— tricephala Cham. et Schlchtd. I. 866. no. 19.
— *trichodes* Jcq. V. 586. no. 2.
— trijuga Bth. I. 878. no. 141.
— trinervis Desf. *I. 876. no. 123.
— *triquetra* Vahl. V. 583. no. 3.
— *trisperma* Vellozo. I. 859. no. 13.
— *umbellifera* Vahl. V. 624. no. 7.
— *unguis Cati* Blanco. V. 610. no. 5.
— ursina Mart. I. 866. no. 16.
— Uruguayensis Hook. et Arn. I. 880. no. 171. II. 905. †
— *vaga* Vellozo. I. 932. no. 2. V. 612. no. 20.
— Vellosiana Mart. I. 865. no. 7.
— verecunda Bth. I. 867. no. 34.
— vernicosa Bngrd. I. 879. no. 158.
— verrucosa Bth. I. 875. no. 112.
— vestita Bth. I. 868. no. 37.
— violacea Bonpl. II. 905. no. 1.
— *virgultosa* Vahl. I. 928. no. 2.
— virgultosa Vahl. V. 624. no. 8.
— viscida Willd. *I. 878. no. 142.
— viva L. *I. 865. no. 15.
— *viva* Vellozo. I. 865. no. 7.
— xanthocentra Mart. I. 867. no. 28.
— *xylocarpa* Rxb. I. 884. no. 1. V. 587. no. 1.
— *Ynga* Vellozo. V. 642. no. 127.
MIMOSEAE R. Br. I. 857.
Mimoseae R. Br. V. 576.
Mimoseae DC. II. 905. V. 576.
MIMOSEAE Endl. V. 422.
Mimulus Linn. III. 274. °III. 964. *VI. 642.
— alatus Ait. III. 275. no. 4.
— *Alectorolophus* Scopol. III. 434. no. 3.
Mimulus alsinoides Dougl. III. 276. no. 23.
β. minimus.
α. paniculatus.
— Andicola H. B. Kth. III. 276. no. 19.
— Assamicus Griffith. III. 277. no. 29.
— *aurantiacus* Curt. III. 274. no. 2.
— brevipes Bth. III. 275. no. 7.
— cardinalis Dougl. III. 275. no. 9. *III. 938.
— floribundus Dougl. III. 276. no. 22.
— glabratus H. B. Kth. III. 276. no. 18.
— *glandulosus* Lehm. III. 276. no. 17.
— glutinosus Wendl. III. 274. no. 2.
— gracilis R. Br. III. 277. no. 32.
— guttatus DC. III. 275 no. 13..
— Harrissonii Paxton. *III. 938.
— hirsutus Blume. III. 275. no. 6.
— Javanicus Blume III. 277. no. 26.
— Lewisii Prsh. III. 275. no. 8.
— linearis Bth. III. 274. no. 1.
— luteus Linn. III. 275. no. 11.
β. rivularis Lindl.
— *luteus* Sims. III. 275. no. 13.
— lyratus Dougl. III. 275. no. 12.
— Macklainianus Paxton. *III. 938.
— moschatus Lindl. III. 276. no. 21.
— Nepalensis Bth. III. 277. no. 28.
— orbicularis Wall. III. 277. no. 30.
— parviflorus Lindl. III. 276. no. 15.
— pedunculatus Dougl. III. 276. no. 25.
— *perfoliatus* H. B. Kth. III. 277. no. 1.
— pilosiusculus H. B. Kth. III. 276. no. 20.
— primuloides Bth. III. 276. no. 24.
— propinquus Lindl. III. 276. no. 16.
— *propinquus* Lindl. III. 276. no. 18.
— repens R. Br. III. 277. no. 31.
— ringens Linn. III. 274. no. 3.
— rivularis Nutt. III. 276. no. 14.
— *rosea-cardinalis* Maund et Henslow. III. 275. no. 9.
— roseus Dougl. III. 275. no. 10. III. 938.
— Smithii Paxton. *III. 938.
— striatus Bth. III. 275. no. 5.
— tenellus Bnge. III. 277. no. 27.
— variegatus Paxton. III. 938.
Mimusops Linn. VI. 456.
— *Caffra* E. Mey. VI. 456. no. 1.
— revoluta Hochstett. VI. 456. no. 1.
Mina Llaw et Lexarza. *VI. 529.
Minkelersia Mart. et Galeotti. °V. 529.
— galactioides Mart. et Galeotti. V. 529. no. 1.
Minthidium Bth. III. 560. VI. 660. no. 9.
Minthostachys Bth. III. 687. VI. 670. no. 1.
Minuria DC. *II. 583. *II. 951. no. 20.
Minurothamnus DC. *II. 954. no. 2.
Minyrothamnus DC. *II. 601.

Miocarpus Naudin. °V. 688.
— paludosus Naudin. V. 688. no. 1.
Miquelia Meisn. II. 434.
— Kleinii Meisn. *II. 434. no. 1.
Mirbelia Sm. I. 576. V. 433.
— angustifolia Grah. I. 576. no. 3.
— *Baxteri* Bot. Reg. I. 566. no. 3.
— Baxteri Mackay. I. 576. no. 1.
— *Baxteri* Mackay. II. 832. no. 1.
— floribunda Bth. I. 576. no. 4. V. 433. †
— grandiflora Ait. I. 576. no. 2.
— ovata Meisn. V. 433. no. 1.
— speciosa Sieb. I. 576. †
Mirbelieae Bth. I. 576. V. 433.
Mirkooa Wght. et Arn. II. 103.
Misandra Falklandica Hook. II. 100. no. 6.
— *Magellanica* Gaudich. II. 100. no. 6.
Mischocarpus Blume. I. 418.
— *Sundaicus* Blume. I. 418. no. 3.
Miscolobium Vogel. I. 801.
— densiflorum Bth. I. 801. no. 5.
— divaricatum Bth. I. 801. no. 6.
— glaucescens Mart. I. 801. no. 3.
— polyphyllum Bth. I. 801. no. 2.
— villosum Bth. I. 801. no. 4.
— violaceum Vogel. I. 801. no. I.
Misodendron Bnks. II. 436.
— imbricatum Poepp. et Endl. II. 436. no. 4.
— lineare Poepp. et Endl. *II. 436. no. 2.
— *linearifolium* DC. II. 436. no. 2.
— microphyllum Hook. et Arn. II. 436. no. 1.
— oblongifolium DC. *II. 436. no. 3.
Mitchella Linn. *II. 486. VI. 48.
— pilosa Bth. VI. 48. no. 1.
Mitella Torr. et Gr. (ex p.) II. 370.
Mitella Tournef. II. 371.
— caulescens Nutt. II. 371. no. 3.
— *cordifolia* Lam. II. 371. no. 2.
— diphylla L. *II. 371. no. 1.
— *grandiflora* Prsh. II. 371. no. 1.
— nuda L. *II. 371. no. 2. (c. var. β. ibid.)
— *pentandra* Hook. II. 370. no. 1.
— *prostrata* Michx. II. 371. no. 2. β.
— *reniformis* Lam. II. 371. no. 2.
— *trifida* Grah. II. 370. no. 2.
Mitellaria Meisn. II. 370.
Mitellastra Torr. et Gr. II. 371.
Mitellina Meisn. II. 370.
Mitellopsis Meisn. II. 370.
— pentandra Meisn. II. 370. no. 1.
— trifida Meisn. II. 370. no. 2.
Mitostigma Dcne. VI. 482.
— tomentosum Dcne. *VI. 482. no 1.
Mitracarpum Zucc. II. 467. VI. 31.
— discolor Miquel. VI. 31. no. 2.
— Lhotskyanum Cham. II. 467. no. 3.
Mitracarpum lineare Bth. VI. 31. no. 1.
— pallidum Hook. et Arn. II. 467. no. 2.
— puberulum Bth. II. 467. no. 4.
— rude Bth. II. 467. no. 6.
— scabrellum Bth. II. 467. no. 5.
— schizangium DC. *II. 467. no. 1.
Mitragyne Africana Korthls. II. 513. no. 3. VI. 71. no. 3.
— *parvifolia* Korthls. II. 513. no. 2. VI. 71. no. 2.
— *speciosa* Korthls. II. 513. no. 1. VI. 71. no. 1.
Mitranthus Hochstetter. III. 266. °III. 963.
— latifolius Hochstetter. *III. 266. no. 1.
Mitraria Cav. *II. 714. *VI. 403.
Mitrasacme Labill. VI. 496.
— hirsuta Prsl. VI. 496. no. 1.
— *prolifera* Sieb. VI. 497. no. 1.
Mitrastigma Harw. II. 475. °VI. 46.
— lucidum Harw. *II. 475. no. 1. *VI 46. no. 1.
Mitreola Linn. VI. 496.
— inconspicua Zollinger et Moritzi. VI.496. no. 1.
Mitriostigma Hochstett. II. 942. VI. 47.
— axillare Hochstett. *II. 942. no. 1. VI. 47. no. 1.
Mitsa maculata Chap. III. 515. no. 6.
Mnemion cheiranthifolium B. Webb et Berthel. I. 214. no. 8.
— *Lagascae* B. Webb. V. 59. no. 5. β.
— *Palmense* B. Webb et Berthel. I. 214. no. 7.
Mnesiteon Raf. *II. 701. no. 6.
Mniarum Forst. I. 266.
— fasciculatum R. Br. *I. 266. no. 1.
Moacurra Rxb. I. 549.
— gelonioides Rxb. *I. 549. no. 1
Modecca Linn. II. 222. V. 774.
— *bracteata* Lam. II. 203. no. 3. β.
— cardiocarpa Hsskrl. V. 774. no. 2.
— cordifolia Blume. *II. 222. no. 4.
— *integrifolia* Lam. II. 222. no. 2.
— oblonga Hsskrl. V. 774. no. 1.
— obtusa Blume. *II. 222. no. 3.
— palmata Lam. *II. 222. no. 2.
— populifolia Blume. II. 222. no. 5.
— *tuberosa* Rxb. II. 222. no. 2.
— Wightiana Wall. II. 222. no. 1.
Modecceae Endl. II. 222. V. 774.
Modestae Bth. (Mimosa) I. 865.
Modestia Cham. et Schlchtd. III. 266.
Modica Walli Rheede. I. 80. no. 1.
Modiola Mnch. I. 296.
— geranioides Gill. I. 296. no. 2.
— reptans St. Hil. I. 296. no. 1.

Moldavica Bth. III. 794. VI. 678. no. 2.
— *elata* Moench. III. 785. no. 51.
— *punctata* Moench. III. 794. no 13.
— *Sibirica* Moench. III. 785. no. 51.
Moldenhauera Schrad. *I. 812. V. 559.
— Blanchetiana Tulasne. V. 559. no. 1.
Molina racemosa Cavan. V. 294. no. 1.
Mollia Mart. et Zucc. I. 353. V. 117.
— glabrescens Bth. I. 353. no. 2.
— speciosa Mart. et Zucc. *I. 353. no. 1. V. 117. no. 1.
Mollipedia Rz. et Pav. *I. 73. adn.
Mollugineae Fnzl. II. 239. V. 788.
Mollugo Linn. II. 240.
— arenaria Kth. II. 241. no. 2.
— *bellidifolia* Ser. II. 242. no. 8. β.
— *Berteriana* Ser. II. 241. no. 1. γ. et no. 3.
— Cerviana Ser. II. 241. no. 4.
α. linearis.
β. spathulaefolia.
— *denticulata* Guill. et Perr. II. 240. no. 4.
— *dichotoma* Sebrnk. II. 241. no. 1. β.
— *dichotoma* Ser. II. 245. no. 7.
— *diffusa* Willd. II. 241. no. 1. β. et γ.
— disticha Ser. II. 241. no. 5.
— *erecta* Burm. II. 240. no. 3. α. et β.
— *glinoides* Cambess. II. 240. no. 2. α.
— *glomerata* Ser. II. 250. no. 5.
— hirta Thnbrg. II. 242. no. 9.
— *Hoffmannseggiana* Ser. II. 241. no. 1. γ.
— juncea Fnzl. II. 241. no. 3.
— *Lichtensteiniana* Ser. II. 250. no. 2.
— *linearis* Ser. II. 245. no. 6.
— *Linkii* Ser. II. 246. no. 6. β.
— *marginata* Ser. II. 248. no. 3.
— *maritima* Ser. II. 247. †††
— *microphylla* Ser. II. 243. no. 2.
— *multiflora* Ser. II. 246. no. 6. β.
— nudicaulis Lam. II. 242. no. 8.
β. bellidifolia.
α. diffusa.
γ. gracilis.
— oppositifolia Linn. II. 242. no. 10.
— *paniculata* Burm. II. 242. no. 7.
— pentaphylla Linn. II. 242. no. 7.
β. confertiflora.
— *quadrangularis* DC. II. 247. no. 1.
— *racemosa* Lam. II. 241. no. 5.
— *radiata* Rz. et Pav. II. 240. no. 2. α.
— *Schrankii* Ser. II. 241. no. 1. β.
— *serpyllifolia* Ser. II. 245. no. 11.
— *spathulata* Poepp. II. 240. no. 2. β.
— *Spergula* DC. II. 240. no. 3. β.
— *Spergula* Linn. II. 240. no. 2. α.
— *spergulaefolia* Willd. II. 241. no. 2.
— *stricta* Blume. II. 246. no. 6. β.
Mollugo stricta Linn. II. 241. no. 6.
α. angustifolia.
β. latifolia.
— *teretifolia* Ser. II. 246. no. 14.
— *trifolia* Schult. II. 242. no. 6.
— *triphylla* Lour. II. 246. no. 6. β.
— *triphylla* Wght. et Arn. II. 242. no. 7. β.
— *verticillata* Guill. et Perr. II. 240 no. 3. β.
— verticillata Linn. II. 240. no. 1.
γ. Berteriana Linn. II. 241. no. 1.
α. latifolia } Linn. II. 240. no. 1.
β. linearis }
— *verticillata* Rxb. II. 240. no. 3. α.
— *verticillata* β. Linn. II. 241. no. 1. β.
— *verticillata* β. Linn. II. 250. no. 5.
— *verticillata* β. *longifolia* Cambess. II. 241. no. 1. β.
— *verticillata* γ. *scrobiculata* Cambess. II. 241. no. 3.
Molopospermum Koch. *II. 422.
Moltkia Lehm. *VI. 560.
Molucca Endl. III. 893.
— *laevis* Mnch. III. 893. no. 1.
— *spinosa* Linn. III. 893. no. 2.
— *spinosa* Mnch. III. 893. no. 2.
Moluccella Linn. III. 893. °III. 990.
Moluccella Pall. (ex p.) III. 808.
— *acutiloba* Ledeb. III. 809. no. 8.
— *armata* Sieb. III. 893. no. 2.
— *diacanthophylla* Pall. III. 808. no. 1.
— *frutescens* Linn. III. 866. no. 18.
— *frutescens* Sibthrp. et Sm. III. 866. no. 19.
— *grandiflora* Bnge. III. 810. no. 10.
— *grandiflora* Stephan. III. 808. no. 1.
— *integrifolia* R. Br. III. 868. no. 3.
— laevis Linn. III. 893. no. 1.
— *Marrubiastrum* Steph. III. 808. no. 1. 856. no. 3.
— *Persica* Burm. III. 866. no. 16.
— *repanda* R. Br. III. 868. no. 5.
— *scariosa* R. Br. III. 868. no. 4.
— spinosa Linn. III. 893. no. 2.
— *tuberosa* Pall. III. 892. no. 5.
Momordica Linn. II. 200.
—? .... Braam. *II. 200. no. 9.
— anthelmintica Schum. et Thonn. II. 200. no. 2.
— brachybotrys Poepp. et Endl. II. 200. no. 7.
— Charantia L. *II. 200. no. 8.
— dioica Rxb. *II. 200. no. 1. (c. var. β. ibid.)
— *echinata* Mühlbnrg. II. 203. no. 1.
— *Elaterium* L. II. 199. no. 1.
—? foetida Schum. et Thonn. II. 200. no. 3.
— hystrix Gill. II. 200. no. 4.
— *hystrix* Gillies. V. 762. no. 4.

Momordica macropoda Poepp. et Endl. II. 200. no. 5.
— *monadelpha* Rxb. II. 202. no. 1. *a.*
— pedata Feuill. II. 200. no. 6.
— *umbellata* Rxb. II. 198. no. 6.
Monactis H. B. Kth. * II. 609.
Monanthae E. Mey. (Indigofera) I. 667.
Monanthes Haw. V. 805.
— *polyphylla* Haw. V. 806. no. 1.
*Monanthos**) Barnéoud. (Plantago) VI. 695. no. 2.
Monarda Linn. III. 681. °III. 981.
— *affinis* Lnk. III. 682. no. 2.
— *allophylla* Michx. III. 682. no. 2.
— *altissima* Willd. III. 682. no. 2.
— aristata Nutt. III 683. no. 6.
— *barbata* Wndrth. III. 682. no. 2.
— Bradburiana Beck. III. 682. no. 3.
— *ciliata* Linn. III. 684. no. 1.
— *ciliata* Michx. III. 684. no. 2.
— *citriodora* Cervant. III. 683. no. 6.
— *clinopodia* Linn. III. 682. no. 2.
— *coccinea* Michx. III. 681. no. 1.
— *coerulea* Hortul. III. 682. no. 2.
— *commutata* Wndrth. III. 682. no. 2.
— *cristata* Hortul. III. 682. no. 2.
— didyma Linn. III. 681. no. 1.
— *dubia* Hortul. III. 682. no. 2.
— *fistulosa* Hook. III. 682. no. 3.
— fistulosa Linn. III. 681. no. 2.
  β. mollis.
— *fistulosa* var. Curt. III. 681. no. 1.
— *glabra* Lam. III. 682. no. 2.
— gracilis Pursh. III. 683. no. 8.
— *hirsuta* Pursh. III. 684. no. 2.
— *hybrida* Wndrth. III. 682. no. 2.
— *involucrata* Wndrth. III. 682. no. 2.
— *Kalmiana* Pursh. III. 681. no. 1.
— *lilacina* Wndrth. III. 682. no. 2.
— *longifolia* Lam. III. 682. no. 2.
— *lutea* Michx. III. 683. no. 5.
— *media* Willd. III. 682. no. 2.
— *menthaefolia* Grah. III. 682. no. 2. *β.*
— *mollis* Linn. III. 682. no. 2. *β.*
— *oblongata* Ait. III. 682. no. 2.
— *Oswegoënsis* Bart. III. 681. no. 1.
— punctata Linn. III. 682. no. 5.
— *purpurascens* Wndrth. III. 681. no. 1.
— *purpurea* Lam. III. 681. no. 1.
— *purpurea* Prsh. III. 682. no. 2.
— *rugosa* Ait. III. 682. no. 2.
— Russeliana Nutt. III. 682. no. 4.
— scabra Beck. III. 683. no. 7.
— *undulata* Tausch. III. 682. no. 2.

*) Cf. *Oliganthos.*

Monarda varians Bart. III. 682. no. 2.
— villosa Martens. III. 683. no. 9.
— *violacea* Dsf. III. 682. no. 2.
— *Zeylanica* Burm. III. 815. no. 5.
Monardeae Bth. III. 599. III. 980. VI. 661.
Monardella Bth. III. 691. °III. 982. VI. 670.
— Caroliniana Bth. III. 691. no. 1.
— Douglasii Bth. III. 692. no. 4.
— *montana* Bth. III. 691. no. 14.
— odoratissima Bth. III. 692. no. 2.
— undulata Bth. III. 692. no. 3.
— villosa Bth. VI. 670. no. 1.
Monarrhenus Cass. * II. 599. * II. 953. no. 5.
Monenteles Labill. * II. 599. * II. 953. no. 4.
Monesis Salisb. * II. 734.
Monetia L'Hérit. * I. 541.
Moniera Linn. * I. 500. II. 823.
— semiserrata Zucc. II. 823. no. 1.
Moniermos Hook. fil. (Scorzonera) VI. 733.
Monniera Africana Pers. III. 282. no. 29.
— *amplexicaulis* Michx. III. 283. no. 34.
— *Brownei* Pers. III. 282. no. 29.
— *cuneifolia* Michx. III. 282. no. 29.
— *pedunculosa* Pers. III. 282. no. 29.
— *rotundifolia* Michx. III. 282. no. 32.
Monnina Rz. et Pav. I. 245. II. 769.
— angustifolia Schlchtd. I. 245. no. 3.
— cardiocarpa St. Hil. I. 245. no. 5.
— cuneata St. Hil. I. 245. no. 7.
— emarginata St. Hil. I. 245. no. 8.
— evonymoides Schlchtd. I. 245. no. 4.
— linearifolia Rz. et Pav. I. 246. †
— marginata Prsl. I. 245. no. 2.
— obtusifolia H. B. Kth. I. 246. †
— resedoides St. Hil. I. 245. no. 6.
— retusa Prsl. I. 245. no. 1.
— Richardiana St. Hil. I. 246. no. 11.
— stenophylla St. Hil. I. 246. no. 9.
— sylvatica Schlchtd. II. 769. no. 1.
— Tristaniana St. Hil. I. 246. no. 10.
Monocera Jack. I. 364.
— ferruginea Jack. I. 365. no. 2.
— glandulifera Hook. I. 365. no. 6.
— Griffithii Wght. I. 365. no. 8.
— Munroi Wght. I. 365. no. 7.
— petiolata Jack. I. 364. no. 1.
— tuberculata Wght. et Arn. I. 365. no. 3. (III. Emend. p. 2.)
— Walkerii Wght. I. 365. no. 5.
— Zeylanica Arn. I. 365. no. 4.
Monochaetum DC. V. 701.
Monochaetum Naudin. V. 701.
— alpestre Naudin. V. 701. no. 4.
— Bonplandii Naudin. V. 702. no. 11.
— Candolleanum Naudin. * V. 702. no. 9.
— dicranantherum Naudin. * V. 702. no. 14.

Monochaetum ensiferum Naudin. V. 702. no. 6.
— fuscescens Naudin. V. 701. no. 3.
— Hartwegianum Naudin. V. 702. no. 7.
— Humboldtianum Kth. V. 702. no. 13.
— latifolium Naudin. V. 701. no. 1.
— lineatum Naudin. * V. 702. no. 15.
— multiflorum Naudin. V. 702. no. 12.
— myrtoideum Naudin. * V. 702. no. 10.
— rivulare Naudin. V. 701. no. 5.
— triplinerve Naudin. V. 702. no. 8.
— umbellatum Naudin. V. 701. no. 2.
Monochilus Fisch. et Mey. IV. 37.
— gloxinifolius Fisch. et Mey. IV. 37. no. 1.
Monocosmia Fnzl. II. 238. V. 787.
— corrigioloides Fnzl. * II. 238. no. 1. V. 787. no. 1.
Monodora Dun. I. 91.
— myristica Dun. * I. 91. no. 1.
Monolopia DC. II. 637.
— major DC. * II. 637. no. 1. †
— minor DC. * II. 637. no. 2. †
Monophyllaea R. Br. * VI. 522.
Monoploca Bnge. ° V. 43.
— linifolia Bnge. V. 43. no. 2.
— rotunda Bnge. V. 43. no. 1.
Monoporus Alph. DC. * VI. 451.
Monopsis Salisb. II. 706. * VI. 375.
— debilis Prsl. * VI. 733.
— litigiosa Fisch. et Mey. II. 706. no. 1. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
Monoptera C. H. Schultz. ° VI. 198.
— filifolia C. H. Schultz. VI. 198. no. 1.
Monosis DC. II. 542. VI. 99.
— Brasiliensis Gardn. VI. 99. no. 1.
— foliosa Bth. II. 542. no. 2.
— tomentosa DC. * II. 542. no. 1.
Monospora Hochstett. ° V. 57.
— grandifolia Hochstett. V. 58. no. 2.
— rotundifolia Hochstett. V. 58. no. 1.
Monostemma Spach. VI. 730.
Monostictides A. P. DC. VI. 510. et 513.
Monotheca Alph. DC. VI. 453.
— buxifolia Alph. DC. VI. 453. no. 2.
— Mascatensis Alph. DC. * VI. 453. no. 1.
Monotheceae Alph. DC. VI. 453.
Monotoca R. Br. * II. 732.
Monotropa Nutt. * II. 734. VI. 437.
— coccinea Zuccarini. VI. 437. no. 1.
MONOTROPEAE Nutt. II. 734. VI. 437.
Monoxora Wght. II. 173. ° V. 755.
— spectabilis Wght. * II. 173. no. 1. * V. 755. no. 1.
Monsonia L. fil. I. 451.
— filifolia L. I. 451. †
— ovata Cav. I. 451. †
Monsonia pilosa W. I. 451. †
— Senegalensis Guill. et Perr. I. 451. no. 1.
— speciosa Cav. I. 451. †
Montagnaea DC. II. 612.
— clematidea Wlprs. II. 612. no. 1.
— heterophylla Schrad. II. 612. no. 2.
Montana Barnéoud. (Plantago) IV. 184.
Montezuma Moç. et Sess. * I. 331.
Montia Micheli. II. 238.
— fontana Linn. * II. 238. no. 1.
— lamprosperma Cham. II. 239. no. 2.
— linearifolia d'Urv. II. 239. no. 3.
Montica Aubl. * VI. 655.
Montinia L. * II. 93.
Moonia Arn. * II. 607.
Moorcroftia Choisy. * VI. 529.
Moquilea Aubl. II. 6.
Moquilea Mart. et Zucc. II. 6. V. 647.
— bracteosa Bth. II. 7. no. 8.
— Canomensis Mart. II. 6. no 5.
— chrysocalyx Poepp. et Endl. V. 647. no. 1.
— comosa Bth. II. 6. no. 7.
— Eliti Mart. et Zucc. II. 6. no. 2.
— grandiflora Mart. et Zucc. II. 6. no. 1.
— Kunthiana Mart. et Zucc. * II. 6. no. 3.
— multiflora Bth. II. 7. no. 9.
— Paraënsis Mart. et Zucc. II. 6. no. 4.
— tomentosa Bth. II. 6. no. 6.
Moquinia DC. II. 679. VI. 317.
— eriosematoides Wlprs. * II. 679. no. 1. VI. 317. no. 1.
— tomentosa Bngrd. II. 679. no. 3.
— velutina Bngrd. II. 679. no. 2.
Mora Bth. I. 854. V. 574.
— conjugata Splitgrbr. V. 574. no. 2.
— excelsa Bth. * I. 854. no. 1. V. 574. no. 1.
Morelia A. Rich. * II. 524.
Morettia DC. I. 159.
— asperrima Boiss. I. 159. no. 1.
— parviflora Boiss. I. 159. no. 2.
Morgania R. Br. III. 278. III. 452. ° III. 964. * VI. 642.
— *aspera* Spr. III. 292. no. 4.
— *callitrichoides* Spr. III. 280. no. 14.
— glabra R. Br. III. 278. no. 1.
— *lucida* Spr. III. 292. no. 4.
— pubescens R. Br. III. 278. no. 2. * III. 452. no. 1.
— *strigosa* Spr. III. 294. no. 20.
Moricandia DC. I. 187.
— *arvensis* DC. I. 184. no. 4. adn.
— arvensis DC. * I. 187. no. 1.
— *Ramburei* Webb. I. 184. no. 5. adn.
Morina Tournef. II. 532. VI. 84.
— breviflora Edgwrth. VI. 702.
— Coulteriana Royle. II. 532. no. 2.

Morina longifolia DC. *II. 532. no. 4. *VI. 84. no. 1.
— parviflora Kar. et Kir. II. 532. no. 1.
— Wallichiana Royle. II. 532. no. 3.
— *Wallichiana* Royle. VI. 84. no. 1.
Morinda Vahl. II. 485. VI. 48.
— aspera Wght. et Arn. II. 485. no. 3.
— bracteata Rxb. II. 486. †
— *exserta* Rxb. II. 485. no. 2. *a.*
— exserta Rxb. *II. 485. no. 2. (c. varr. *a.* et *β.*)
— fasciculata Bth. VI. 48. no. 1.
— jasminoides A. Cunn. II. 485. no. 1.
— longiflora G. Don. II. 486. no. 7.
— *media* Ham. II. 486. no. 5.
— *Padavara* Lam. II. 486. no. 4.
— quadrangularis G. Don. II. 486. no. 6.
— *scandens* Rxb. II. 486. no. 4.
— tomentosa Heyne. *II. 486. no. 5.
— umbellata Linn. *II. 486. no. 4.
Morindeae DC. II. 485. II. 532. VI. 48.
Moringa Juss. I. 855.
— aptera Gaertn. *I. 855. no. 1.
— *oleifera* Lam. I. 856. no. 2.
— pterygosperma Gaertn. *I. 856. no. 2.
Moringeae Endl. I. 855.
Morisia Gay. I. 184.
— hypogaea Gay. *I. 184. no. 1.
Morisonia Plum. *I. 201.
Moritzia A. P. DC. *VI. 559.
Mormorhachis Sumatrana Jck. II. 433. no. 16.
Morna nitida Lindl. VI. 233. no. 3.
— *nivea* Lindl. VI. 233. no. 1. *β.*
Moronobea Aubl. I. 394.
— *coccinea* Aubl. I. 394. no. 1. et no. 2.
— exserens Endl. *I. 394. no. 3.
— globulifera Schlchtd. *I. 394. no. 2.
— montana Schlchtd. *I. 394. no. 1.
Moronobeae Endl. I. 394.
Morrenia Lindl. *VI. 488.
Mortilla Feuill. II. 187. no. 59.
Morysia Cass. II. 638. VI. 211.
— *pachyphylla* C. H. Schultz. VI. 211. no. 1.
Moscharia Rz. et Pav. *II. 682. *VI. 325.
— *asperifolia* Forsk. III. 929. no. 22.
Moschosma Rchb. III. 497. °III. 977. VI. 657.
— australe Bth. III. 497. no. 2.
— dimidiatum Bth. III. 498. no. 3.
— ocymoides Bth. III. 498. no. 4.
— polystachyum Bth. III. 497. no. 1.
— riparium Hochstett. VI. 657. no. 1.
Moschosmeae Endl. III. 483. III. 976. VI. 657.
Moschoxylum A. Juss. I. 433. II. 817.
— *affine* A. Juss. I. 433. no. 7.
— Catigua A. Juss. I. 433. no. 6.
Moschoxylum Cipo A. Juss. I. 434. no. 8.
— elegans A. Juss. I. 433. no. 2.
— odoratum A. Juss. *I. 433. no. 4.
— pentandrum Poepp. et Endl. II. 817. no. 1.
— plecanum A. Juss. I. 434. no. 9.
— pseudostipulare A. Juss. I. 433. no. 3.
— Richardianum A. Juss. I. 433. no. 1.
— Swartzii A. Juss. *I. 433. no. 5.
Mosla Bth. III. 716.
— *ocymoides* Hamilt. III. 716. no. 1.
Motandra Alph. DC. *VI. 472.
Moulinsia Cambess. I. 418.
— *cupanioides* Camb. I. 416. no. 4.
— cupanioides Camb. *I. 418. no. 1.
— *rubiginosa* G. Don. I. 416. no. 4.
Mouriria Juss. II. 149. V. 725.
— arborea Gardn. II. 149. no. 4.
— brevipes Gardn. II. 149. no. 3.
— Domingensis Wlprs. II. 149. no. 1.
— parvifolia Bth. V. 725. no. 1.
— Pusa Gardn. II. 149. no. 2.
Mouroucoa Aubl. *VI. 546.
Moutouchia Aubl. I. 792.
— crispata Bth. *I. 792. no. 2.
— Draco Bth. *I. 792. no. 1.
Mucizonia DC. II. 258.
Mucuna Adans. I. 767. II. 900.
— *altissima* Boj. I. 765. no. 4.
— anguina Wall. I. 767. no. 3.
— atropurpurea DC. I. 767. no. 2. (III. Emend. p. 4.)
— capitata Wght. et Arn. I. 767. no. 8. (III. Emend. p. 4.)
— gigantea DC. *I. 767. no. 4.
— hirsuta Wght. et Arn. I. 767. no. 6.
— macrocarpa Wall. I. 767. no. 5.
— monosperma DC. I. 767. no. 1. *II. 901. no. 3. (III. Emend. p. 4.)
— *pruriens* Wall. I. 767. no. 7.
— prurita Hook. I. 767. no. 7. (III. Emend. p. 4.)
— urens?? *I. 768. no. 9.
— utilis Wall. II. 901. no. 2.
— velutina Hsskrl. II. 900. no. 1.
Mudela-Nili-Hummatu Rheede. III. 17. no. 13. *a.* b.
Müllera L. *I. 805.
Münteria Wlprs. °V. 398.
— excelsa Wlprs. *V. 398. no. 1.
Mukia Arn. II. 199.
— *scabrella* Arn. II. 198. no. 3.
— scabrella Arn. *II. 199. no. 1.
Mulgedium Cass. II. 699. VI. 366.
— acuminatum DC. *II. 700. no. 2.
— *cacaliaefolium β. appendiculatum* Ldb. VI. 366. no. 2.

Mulgedium cyaneum DC. VI. 355. no. 7.
— Floridanum DC. *II. 700. no. 3. (c. varr. β. γ. et δ. ibid.)
— grande C. Koch. VI. 366. no. 1.
β. glabrum.
— *hastatum* Lssng. II. 692. no. 10.
— *heterophyllum* Nutt. II. 699. no. 1.
— Kamtschaticum Ldb. VI. 366. no. 3.
— *Lessertianum* DC. VI. 354. no. 1.
— leucophaeum DC. *II. 700. no. 4.
β. integrifolium.
— macrorhizum Royle. *VI. 733.
— *multiflorum* DC. II. 700. no. 3. β.
— petiolatum C. Koch. VI. 366. no. 2.
— pulchellum Nutt. II. 699. no. 1.
— *rapunculoides* DC. VI. 355. no. 6.
Mulineae DC. II. 386.
Mulinum Pers. II. 386.
— *acaule* Pers. II. 387. no. 1.
— albovaginatum Gill. II. 386. no. 3.
— *angulatum* DC. V. 843. no. 1.
— cuneatum Hook. et Arn. II. 386. no. 1.
— *Dipterygia* DC. II. 387. no. 2.
— *hirsutum* Meyen! V. 843. no. 1.
— *isatidicarpum* DC. II. 387. no. 3.
—? ulicinum Gill. II. 386. no. 2.
Multiaristatae DC. (Stevia) VI. 704. no. 2. 3.
Multiflorae DC. (Malva) I. 294.
Multijugae DC. (Indigofera) I. 661.
Multilobae Choisy. (Ipomaea) VI. 535.
Mundia Ktb. I. 244. II. 769.
— albiflora Eckl. et Zeyh. I. 244. no. 2.
— Brasiliensis St. Hil. I. 245. no. 7.
— Candolleana Meisn. II. 769. no. 2.
— desertorum Eckl. et Zeyh. I. 245. no. 5.
— glauca Eckl. et Zeyh. I. 245. no. 4.
— heterophylla E. Mey. II. 769. no. 1.
— Kraussiana Meisn. II. 769. no. 3.
— montana Eckl. et Zeyh. I. 244. no. 3.
— scoparia Eckl. et Zeyh. I. 245. no. 6.
— Tabularis Eckl. et Zeyh. I. 244. no. 1.
Mundulea DC. I. 677.
Munnicksia Dennst. V. 58 b. no. 1.
Munnozia Rz. et Pav. *II. 702. no. 16.
Munronia Wght. I. 426.
— Javanica Bennet. I. 426. no. 1.
— pumila Wght. I. 426. no. 3.
— Wallichii Wght. I. 426. no. 2.
Muntingia L. I. 363.
— Calabura L. *I. 363. no. 1.
Munychia Cass. *II. 559. *II. 951. no. 3.
Muraltia Neck. I. 243. V. 66.
— anthospermifolia Eckl. et Zeyh. I. 244. no. 8.
— asparagifolia Eckl. et Zeyh. I. 244. no. 13.
— aspera Lehm. I. 243. no. 3.
Muraltia Burchellii Eckl. et Zeyh. I. 244. no. 10.
— cliffortiaefolia Eckl. et Zeyh. I. 243. no. 1.
— divaricata Eckl. et Zeyh. I. 244. no. 14.
— Heisteri Neck. I. 244. †
— Heisteria DC. *V. 66. no. 1.
— laricifolia Eckl. et Zeyh. I. 244. no 9.
— macrocarpa Lehm. I. 243. no. 5.
— marifolia Eckl. et Zeyh. I. 244. no. 12.
— metalasiaefolia Eckl. et Zeyh. I. 243. no. 6.
— micrantha Alb. Dietr. I. 244. no. 15.
— mixta DC. I. 244. †
— onondifolia Eckl. et Zeyh. I. 243. no. 4.
— rubiacea Eckl. et Zeyh. I. 243. no. 7.
— ruscifolia Eckl. et Zeyh. I. 243. no. 2.
— squarrosa Eckl. et Zeyh. *I. 244. no. 11.
— stipulacaa Burch. *V. 66. no. 2.
Muretia Boiss. °V. 853.
— aurea Boiss. V. 853. no. 2.
— Tanaïcensis Boiss. V. 853. no. 1.
Muricaria Dsvx. *I. 188.
Murraya Koen. I. 381. II. 804.
— exotica L. I. 381. †
— heptaphylla Spanoghe. II. 804. no. 1.
— longifolia Blume. I. 381. no. 1.
— Sumatrana Rxb. I. 381. no. 2.
Murucuja Tournef. II. 221.
— *Baueri* Lindl. II. 221. no. 1.
— ocellata Pers. *II. 221. no. 1.
Muschia Dumort. *II. 711. *VI. 387.
Musenium Nutt. II. 427.
— angustifolium Nutt. II. 427. no. 3.
— divaricatum Nutt. II. 427. no. 1.
β. Hookeri.
— *Hookeri* Nutt. II. 427. no. 1. β.
— tenuifolium Nutt. II. 427. no. 4.
— trachyspermum Nutt. II. 427. no. 2.
Mussaenda Linn. II. 521. VI. 76.
— Afzelii G. Don. II. 522. no. 4. *VI. 76. no. 2.
— *angustifolia* Wall. II. 522. no. 10.
— *Belilla* Ham. II. 521. no. 1. *a.*
— calycina Wall. II. 522. no. 2.
— cordifolia Wall. II. 522. no. 9.
— *Dovinia* Ham. II. 521. no. 1. *a.*
— *flavescens* Ham. II. 521. no. 1.
— *frondosa* DC. II. 522. no. 1. γ.
— frondosa Linn. *II. 521. no. 1. (c. varr. a. β. γ. et δ. ibid. et 522.)
— *frondosa* Spr. II. 522. no. 1. β.
— *frondosa* Vahl. II. 521. no. 1. *a.*
— *longifolia* Wall. II. 522. no. 6.
— *Luculia* D. Don. VI. 63. no. 1.
— macrophylla Wall. *VI. 76. no. 1.
— parva Wall. II. 522. no. 10.
— repens Wall. II. 522. no. 11.

Mussaenda rufa Boj. II. 522. no. 12.
— tomentosa Wght. II. 522. no. 8.
— uniflora Wall. II. 522. no. 7.
— variolosa Wall. II. 522. no. 5.
— villosa Wall. II. 522. no. 3.
— Wallichii G. Don. II. 522. no. 6.
— *Zanzibarica* Bojer. II. 523. no. 12.
Mutisia Linn. fil. *II. 679. VI. 313.
— Candolleana Gardn. VI. 313. no. 5.
— *gracilis* Meyen. VI. 313. no. 2.
— hirsuta Meyen. VI. 313. no. 1.
— Hookeri Meyen. VI. 313. no. 3.
— *sanguinea* Meyen. VI. 313. no. 4.
— *sinuata* Willd. VI. 313. no. 4.
— taraxacifolia Lssng. *VI. 313. no. 4.
Mutisiaceae Lssng. II. 678. II. 992. VI. 312.
Mutisieae Lssng. II. II. 678. VI. 312.
Myagrum Tournef. I. 183.
— perfoliatum L. *I. 183. no. 1.
— *Hispanicum* L. I. 186. no. 5. II. 763. no. 1.
Myconia Neck. °VI. 205.
— *borraginea* Lapeyr. III. 438. no. 1.
— Chrysanthemum C. H. Schultz. *VI. 206. no. 1.
Myginda DG. I. 539. no. 5.
Myginda Jcq. *I. 538. V. 402.
— *myrtifolia* Nutt. I. 538. no. 1.
— theoides Bth. V. 402. no. 1.
Mylanche Virginiana Wallrth. III. 457. no. 1.
Mylocarpum ligustrinum Willd. VI. 421. no. 1.
Myonima Commers. *II. 488.
Myopordon Boiss. °VI. 303.
— Aucheri Boiss. VI. 304. no. 2.
— Persicum Boiss. VI. 303. no. 1.
MYOPORINEAE R. Br. IV. 135. VI. 693.
Myoporum Forst. IV. 135. VI. 693.
— acuminatum R. Br. IV. 136. no. 4.
— ascendens R. Br. IV. 137. no. 12.
— brevifolium Bartl. VI. 693. no. 3.
— caprarioides Bth. IV. 136. no. 5.
— crassifolium Forst. IV. 138. no. 23.
— Cunninghamii Bth. IV. 136. no. 6.
— debile R. Br. IV. 137. no. 18.
— deserti A. Cunningh. IV. 136. no. 7.
— diffusum R. Br. IV. 137. no. 19.
— ellipticum R. Br. IV. 135. no. 3.
—? euphrasioides Hook. et Arn. IV. 137. no. 21.
— floribundum A. Cunningh. IV. 136. no. 8.
— gracile Bartl. VI. 693. no. 2.
— humile R. Br. IV. 136. no. 11.
— insulare R. Br. IV. 137. no. 13.
— laetum Forst. IV. 138. no. 22.
— montanum R. Br. IV. 135. no. 2.
— obscurum Endl. IV. 135. no. 1.
Myoporum oppositifolium R. Br. IV. 137. no. 20.
— *parviflorum* Hb. Reg. Berol. IV. 136. no. 9.
— parvifolium R. Br. VI. 136. no. 9.
— platycarpum R. Br. IV. 137. no. 17.
— pubescens Forst. IV. 138. no. 24.
— serratum R. Br. IV. 137. no. 14.
— subserratum N. ab E. VI. 693. no. 1.
— tenuifolium Forst. IV. 136. no. 10.
— tuberculatum R. Br. IV. 137. no. 15.
— verrucosum Poir. IV. 138. no. 25.
— viscosum R. Br. IV. 137. no. 16.
Myosurus L. I. 33.
— minimus L. *I. 33. no. 1.
— *Sorthii* Raf. I. 33. no. 1.
Myosotis Dill. VI. 561.
— albiflora Bnks. et Soland. VI. 561. no. 3.
— antarctica Hook. fil. VI. 562. no. 5.
— capitata Hook. fil. VI. 562. no. 4.
— densiflora C. Koch. VI. 561. no. 2.
— Hortensia Dcne. VI. 561. no. 1.
Myrcia DC. II. 173. II. 932. V. 751.
—? .... n. sp.? Bth. II. 177. no. 53.
— *acris* DC. II. 182. no. 7. V. 756. no. 1.
— affinis Cambess. II. 175. no. 16.
— albo-tomentosa DC. *II. 177. no. 46.
  γ. humilis.
  β. nivea.
— anacardiaefolia Gardn. II. 933. no. 2.
— andromedoides Cambess. II. 176. no. 35.
— anomala Cambess. II. 176. no. 42.
— aromatica Schlchtd. II. 173. no. 1.
— bella Cambess. II. 176. no. 33.
— Browniana Gardn. II. 933. no. 3.
— brunnea Cambess. II. 174. no. 15.
— buxifolia Gardn. V. 751. no. 1.
— Capivarhyensis Cambess. II. 176. no. 43.
— cordata Cambess. II. 177. no. 47.
— crassicaulis Cambess. II. 175. no. 19.
— crassinervia DC. II. 177. †
— debilis Cambess. II. 176. no. 39.
— elliptica Gardn. II. 932. no. 1.
— ellipticifolia Cambess. II. 175. no. 21.
— eugenioides Cambess. II. 174. no. 11.
— Garopabensis Cambess. II. 176. no. 37.
— Gestasiana Cambess. II. 174 no. 12.
— glauca Cambess. II. 174. no. 11.
— Garopabensis Cambess. II. 176. no. 37.
— Goyazensis Cambess. II. 174. no. 14.
— grandifolia Cambess. II. 174. no. 6.
— hiemalis Cambess. II. 177. no. 48.
— hypericoides Cambess. II. 175. no. 26.
— hypoleuca Spring II. 173. no. 3.
— insularis Gardn. II. 174. no. 5.
— Itajuruensis Cambess. II. 175. no. 17.

Myrcia lanceolata Cambess. II. 177. no. 45.
β. angustifolia.
— Laruotteana Cambess. II. 175. no. 20.
β. glabriuscula.
γ. impunctata.
— laurifolia Cambess. II. 174. no. 9.
— laxiflora Cambess. II. 175. no. 28. (cum var. β. ibid.)
— linearifolia Cambess. II. 177. no. 52.
— lutescens Cambess. II. 174. no. 10.
— microcarpa Cambess. II. 176. no. 36.
— montana Cambess. II. 176. no. 38.
— Mugiensis Cambess. II. 176. no. 40.
— nitida Cambess. II. 175. no. 18.
— nivea Cambess. II. 177. no. 49.
— oocarpa Cambess. II. 174. no. 7.
— oleaefolia Cambess. II. 175. no. 22.
— ovata Cambess. II. 176. no. 29.
— pauciflora Cambess. II. 176. no. 32.
— puberula Cambess. II. 175. no. 24.
— *pimentoides* DC. II. 182. no. 7. V. 756. no. 1.
— pinifolia Cambess. II. 177. no. 51.
— reticulata Cambess. II. 174. no. 13.
— retorta Cambess. II. 176. no. 34.
— rimosa Cambess. II. 177. no. 50.
— rostrata DC. *II. 176. no. 31.
β. brunnea.
— rubella Cambess. II. 175. no. 25.
— rubiginosa Cambess. II. 174. no. 8.
— rufidula Schlchtd. II. 173. no. 2.
— strigipes Mart. II. 174. no. 4.
— suaveolens Cambess. II. 175. no. 23.
— triflora Cambess. II. 176. no. 41.
— virgata Cambess. II. 176. no. 30.
Myriactis Lssng. *II. 585. *II. 951. no. 6. VI. 719.
— gracilis Edgwrth. VI. 719. no. 2.
— oleosa Edgwrth. VI. 719. no. 1.
Myriadenus Desvx. I. 726.
— echinocarpus Moric. I. 726. no. 1.
Myriandra brachyphylla Spach. I. 386. no. 33.
— *galioides* Spach. I. 386. no. 32.
— *glauca* Spach. I. 387. no. 37.
— *Michauxii* Spach. I. 386. no. 32.
— *nitida* Spach. I. 386. no. 33.
— *prolifica* Spach. I. 386. no. 29.
— *spathulata* Spach. I. 386. no. 29.
Myrianthęia Thouars. *I. 548.
Myrianthus Nutt. II. 591.
— *racemosus* Nutt. II. 969. no. 3.
Myriaspora DC. *II. 140. V. 710.
— Surinamensis Steudel. V. 710. no. 1.
Myricaria Dsvx. II. 114.
— alopecuroides Schrenk. II. 114. no. 1.
— bracteata Royle. II. 114. no. 4.
Myricaria brevifolia Turcz. II. 114. no. 2.
— elegans Royle. II. 115. no. 5.
— macrostachys Kar. et Kir. II. 114. no. 3.
Myriocephalus Bth. *II. 644.
Myriogyne Lssng. *II. 642.
Myriomeles Lindl. II. 57.
Myriophyllae (Mimosa) Bth. I. 873.
Myriophyllum DC. (ex p.) II. 98.
Myriophyllum Vaill. II. 98.
— ambiguum Nutt. *II. 98. no. 6.
β. capillaceum Torr. et Gr.
γ. limosum Nutt.
— Brasiliense Cambess. II. 98. no. 3.
— *capillaceum* Torr. II. 98. no. 6. β.
— hippuroides Nutt. II. 98. no. 1.
— *procumbens* Bigel. II. 98. no. 6. γ.
— propinquum A. Cunn. II. 98. no. 5.
— proserpinoides Gill. II. 98. no. 2.
— scabratum Cham. et Schlchtd. II. 98. no 1.
— variifolium Hook. II. 98. no. 4.
Myripnois Bngc. *II. 680. *VI. 319.
Myrmecodia W. Jack. *II. 486.
Myrmidone Mart. II. 141.
— macrosperma Mart. II. 141. no. 1.
Myrobalanus Gaertn. II. 61.
— *Bellirica* Breyn. II. 61. no. 10.
— *minor* Sloane. I. 556. no. 8.
Myrobatindum spicatum etc. Vaill. IV. 62. no. 14.
Myrodia Schreb. I. 331. II. 794. V. 97.
— angustifolia Mart. I. 332. no. 2.
— floribunda St. Hil. et Naud. II. 794. no. 1.
— Martii St. Hil. et Naud. II. 794. no. 2.
— multiflora Steudel. V. 97. no. 1.
— penduliflora St. Hil. I. 331. no. 1.
— scabra Mart. I. 332. no. 4.
— trinervia Mart. I. 332. no. 3.
— turbinata Swrtz. I. 332. †
— *turbinata* St. Hil. II. 794. no. 2.
Myrodieae Schott. et Endl. I. 331. V. 96.
Myrospermum Jacq. I. 805.
— peruiferum DC. I. 805. no. 1.
— punctatum Kltzsch. I. 805. no. 2.
Myroxylon Linn. fil. I. 805. no. 2.
— *peruiferum* Linn. fil. I. 805. no. 1.
Myrrhidium DC. I. 455.
— anemonefolium Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 75.
— artemisiaefolium Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 82.
— athamanthoides Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 78.
— betonicum Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 72.
— bullatum Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 73.
— candicans Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 71.
— coriandrifolium Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 80.

Myrrhidium fruticosum Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 81.
— lacerum Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 79.
— longicaule Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 74.
— multicaule Eckl. et Zeyh. *I. 455. no. 76.
— senecioides Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 83.
— triangulare Eckl. et Zeyh. I. 455. no. 77.
— urbanum Eckl. et Zeyh. I. 455. no. 70.
Myrrhinium Schott. II. 150.
— atropurpureum Schott. *II. 150. no. 1.
Myrrhis Scop. *II. 423.
— *Claytoni* Michx. II. 423. no. 2.
— *foliis trilobatis* Gron. II. 423. no 1.
Myrsine Alph. DC. VI. 449. (ex p.)
Myrsine Linn. VI. 449.
— *divaricata* A. Cunningh. VI. 450. no. 2.
— erythroxyloides Bth. VI. 449. no. 1.
— *Richardiana* Endl. VI. 450. no. 1.
— *saligna* Hook. fil. VI. 450. no. 4.
— *Urvillei* Alph. DC. VI. 450. no. 1.
MYRSINEACEAE Alph. DC. VI. 448.
MYRSINEAE Endl. (ex p.) VI. 448.
Myrtaceae Meisn. V. 726.
MYRTACEAE R. Br. II. 152. II. 920. V. 726.
Myrtaceae chymocarpicae Schauer. II. 932. V. 750.
Myrtaceae xerocarpicae Schauer. II. 920. V. 726.
Myrteae DC. II. 170. V. 750.
Myrtillus Sol. II. 172.
MYRTINEAE Meisn. (ex p.) V. 726.
Myrtus DC. II. 172. V. 750.
Myrtus Tournef. II. 172. II. 932. V. 750.
— *acris* Swrtz. II. 182. no. 7. V. 756. no. 1.
— *androsaemoides* Linn. II. 179. no. 18.
— *aromatica* Poir. II. 182. no. 7. V. 756. no. 1.
— *bracteata* Willd. II. 182. no 2.
— bullata A. Cunn. II. 172. no. 5.
— bullata Soland. II. 932. no. 1.
— *calyptrata* Linn. II. 178. no. 6.
— *caryophyllata* Jcq. II. 182. no. 7. V. 756. no. 1.
— *citrifolia* Poir. V. 756. no. 1.
— *Coromandeliana* Koen. II. 182. no. 2.
— *Cumini* Linn. II. 179. no. 10.
— excelsa Cambess. II. 173. no. 10.
— Fernandesiana Hook. et Arn. II. 172. no. 4.
— Gudilla Colla. II. 172. no. 2.
Myrtus Heynei Spr. II. 182. no. 2.
— Indica Wght. II. 172. no. 6.
— *latifolia* Heyne. II. 182. no. 2.
— *littoralis* Rxb. II. 182. no. 2.
— *Luma* Spr. II. 183. no. 16.
— montana Bth. II. 172. no. 8.
— mucronata Cambess. II. 173. no. 11.
— *nitida* Vellozo. II. 191. no. 105.
— ovalifolia Cambess. II. 173. no. 15.
— oxycoccoides Bth. V. 750. no. 2.
— pauciflora Cambess. II. 173. no. 13.
— pedunculata Hook. fil. V. 751. no. 3.
— pimenta L. II. 173. †
— *pimenta β. latifolia* Rxb. V. 756. no. 1
— *Pimenta* Linn. V. 756. no. 2.
— Raran Colla. II. 172 no. 1.
— rufa Colla. II. 172. no. 3.
— *ruscifolia* Willd. II. 182. no. 1.
— sericea Cambess. II. 173. no. 12.
— *Sonneratii* Spr. II. 181. no. 5.
— *spectabilis* Blume. II. 173. no. 1. V. 785. no. 1.
— stipularis Hook. et Arn. II. 172. no. 7.
— tomentosa Ait. II. 173. †
—? trunciflora Cham. et Schlchtd. II. 173. no. 9.
— *Ugni* Bert. II. 187. no. 60.
— *Ugni* Molina. II. 187. no. 59.
— umbilicata Cambess. II. 173. no. 14
— *verticillata* Salzm. II. 186. no. 52.
— *Willdenowii* Spr. II. 182. no. 8.
— *Zeylanica* Linn. II. 181. no. 6.
Myryoneuron R. Br. II. 525.
— nutans R. Br. *II. 525. no. 1.
Myscolus Cass. *II. 683.
Mystroxylon Eckl. et Zeyh. °I. 537.
— athranthum Eckl. et Zeyh. I. 537. no. 12.
— eucleaeforme Eckl. et Zeyh. I. 537. no. 11.
— filiforme Eckl. et Zeyh. *I. 537. no. 9.
— Kubu Eckl. et Zeyh. *I. 538. no. 17.
— oligocarpum Eckl. et Zeyh. I. 537. no. 10.
— *papillosum* Hochstett. V. 402. no. 1.
— pubescens Eckl. et Zeyh. I. 538. no. 16.
— sessiliflorum Eckl. et Zeyh. I. 537. no. 14.
— sphaerophyllum Eckl. et Zeyh. I. 538. no. 15.
— spilocarpum Eckl. et Zeyh. I. 537. no. 13.
Myxa Endl. VI. 553.
Myxopyrum Blume. *VI. 461.

N

Nabalus Cass. II. 691. VI. 365.
— alatus Hook. *II. 692. no. 10.
— albus Hook. II. 691. no. 1.
β. serpentaria Torr. et Gr.
— altissimus Hook. *II. 692. no. 2.
γ. cordatus.
δ. deltoideus.
ε. dissectus.
β. ovatus.
— asper Torr. et Gr. *II. 692. no. 8.
— Bootti DC. *II. 692. no. 5.
— *cordatus* Hook. II. 692. no. 2. γ.
— crepidineus DC. *II. 692. no. 9.
— *deltoideus* DC. II. 692. no. 2. δ.
— Fraseri DC. *II. 692. no. 3.
γ. barbatus.
β. integrifolius.
— *Illinoënsis* DC. II. 692. no. 8.
— *integrifolius* Cass. II. 692. no. 3. β.
— nanus DC. *II. 692. no. 4.
— racemosus Hook. *II. 692. no. 7. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— repens Ldb. VI. 365. no. 1.
— *serpentarius* Hook. II. 601. no. 1.
— *serpentarius* β. DC. II. 692. no. 3.
— *suavis* DC. II. 691. no. 1.
— *trifoliatus* Cass. II. 691. no. 1.
— *trilobatus* Cass. II. 692. no. 3.
— virgatus DC. *II. 692. no. 6.
Nablonium Cass. *II. 634.
Naiocrene Torr. et Gr. II. 238.
Nāma Linn. VI. 565.
— ......? Martens et Galeotti. VI. 565. no. 2.
— hirsuta Martens et Galeotti. VI. 565. no. 1.
Nameae Choisy. VI. 565.
Nananthea DC. *II. 636.
Nanastrum Torr. et Gr. II. 957.
Nandina Thnbrg. *I. 104.
Napeanthus Gardn. *VI. 523.
Napoleona Palis. *II. 722. °VI. 408.
— Heudelotii Juss. VI. 408. no. 2.
— imperialis Palis. VI. 408. no. 1.
— *imperialis β. purpurea* DC. VI. 408. no. 2.
NAPOLEONEAE Palis. II. 722. VI. 408.
Naravelia DC. *I. 9.
Nardophyllum Hook. et Arn. *II. 678. *II. 679. VI. 314.
— revolutum Hook et Arn. *VI 314. no. 1.
Nardosmia Cass. II. 557.
— *Hookeriana* Nutt. II. 557. no. 1.
— palmata Hook. *II. 557. no. 1.
— *palmata* Nutt. II. 557. no. 1.
— *speciosa* Nutt. II. 557. no. 1.
Nardostachys DC. II. 526.
— Jatamansi DC. *II. 526. no. 1.
Naregamia Wght. et Arn. I. 426.
— alata Wght. et Arn. *I. 426. no. 1.
Narvalina Cass. *II. 623.
Nassauvia Commers. *II. 682. VI. 321.
Nassauvia DC. (ex p.) II. 682.
— Gaudichaudii Cassini. VI. 321. †
— multiflora Meyen. VI. 321. no. 2.
— pygmaea Hook fil. *VI. 321. no. 3.
— pyramidalis Meyen. VI. 321. no. 1.
— serpens d'Urville. VI. 321. †
Nassauviaceae Lssng. II. 681. II. 992. VI. 321.
Nassauvieae Lssng. VI. 321.
Nasturtiolum DC. I. 190. no. 1.
Nasturtium R. Br. I. 125. II. 755. V. 34.
— *amphibium* DC. I. 154. no. 11.
— amphibium L. I. 128. †
γ. auriculatum Rchb.
α. indivisum Rchb.
β. varifolium Rchb.
— *amphibium hybridum* W. K. II. 755. no. 2.
— anceps Rchb. I. 128. †
— asperum Boiss. *I. 125. no. 1.
— Austriacum Crntz. I. 128. †
— brachystylum Wallr. II. 755. no. 1.
— Camelina Fisch. et Mey. I. 126. no. 4.
— cernuum Nutt. I. 127. no. 20.
— curvisiliqua Nutt. I. 127. no. 16.
— densiflorum Turcz. II. 755. no. 4.
— dentaculatum Wallr. II. 755. no. 2.
— *divaricatum* Ham. I. 126. no. 9.

Nasturtium ellipticum Boiss. I. 126. no. 3.
— flexicaule Boiss. I. 125. no. 2.
— flexuosum Seubert. V. 34. no. 1.
— *Gangeticum* Ham. I. 126. no. 9.
— *glaucophyllum* DC. I. 153. no. 5.
— globosum Turcz. I. 126. no. 5. II. 766. no. 3.
— heterophyllum Blume. I. 126. no. 6.
— heterophyllum D. Don. I. 126. no. 8.
— humifusum Guill. et Perr. I. 126. no. 10.
— impatiens Schlchtd. et Cham. I. 127. no. 23.
— limosum Nutt. I. 127. no. 19.
— *linifolium* Nutt. I. 165. no. 24.
— Lippicense DC. I. 128. †
— lyratum Dougl. I. 127. no. 13.
— Madagascariense DC. I. 126. no. 9. (et ibid. varr. *α*. *β*. et *γ*.)
— *micranthum* DC. I. 126. no. 9.
— *micropetalum* Fisch. et Mey. I. 126. no. 12.
— microphyllum Boenningh. I. 127. †
— *montanum* Wall. I. 126. no. 9.
— natans DC. *I. 127. no. 21.
β. Americanum.
γ. brevistylum.
— *natans* DC. I. 154. no. 12. *α*.
— obtusum Nutt. I. 127. no. 18.
— officinale R. Br. I. 127. †
—? Orizabae Schlchld. et Cham. I. 127. no. 22.
— palustre Leyss. I. 128. †
β. tanacetifolium DC. I. 126. no. 12.
— polymorphum Nutt. I. 127. no. 17. (III. Emend. p. 1.)
— pumilum Cambess. I. 127. no. 24.
— *pumilum* Nutt. I. 165. no. 25.
— Pyrenaicum R. Br. I. 128. †
— radicans Wlprs. V. 34. no. 3.
— rivulare Rchb. I. 128. †
— *sagittatum* DC. I. 134. no. 1.
— *scapigerum* Auch. I. 149. no. 15.
— semipinnatifidum Hook. I. 126. no. 11.
— sessiliflorum Nutt. I. 127. no. 14.
— siifolium Rchb. I. 127. †
— sinuatum Nutt. I. 127. no. 15. (III. Emend. p. 1.)
— sparsum D. Don. I. 126. no. 7.
— sylvestre R. Br. I. 128. †
— tanacetifolium Hook et Arn. I. 126. no. 12.
— turfosum Knze. V. 34. no. 2.
Natalia Hochst. I. 415.
— lucens Hochst. *I. 415. no. 1.
Nathusia Hochst. *VI. 461.
Natre III. 52. no. 106.
Natsiatum Arn. I. 98.
Natsiatum herpeticum Arn. *I. 98. no. 1.
Nauclea Linn. II. 511. II. 913. VI. 701.
Nauclea DC. (ex p.) II. 511.
— Africana G. Don. II. 512. no. 21.
— appendiculata Bth. II. 913. no. 1.
— attenuata Korthls. II. 513. no. 27.
— Brunonis Wall. II. 511. no. 4.
— callophylla Korthls. II. 513. no. 28.
— canescens Korthls. II. 513. no. 29.
— dasyoneura Korthls. II. 513. no. 26.
— diversifolia Wall. II. 511. no. 5.
— elliptica R. Br. II. 512. no. 19.
— Gambir Hunter. *II. 513. no. 25.
— glandulifera Spanoghe. II. 511. no. 10.
— Hallii Korthls. II. 512. no. 23.
— laevigata Wall. II. 512. no. 18.
— lanceolata Blume. II. 512. no. 15.
— missionis Wall. II. 511. no. 7.
— *morindaefolia* Blume. II. 491. no. 2.
— nemorosa Krthls. II. 512. no. 24.
— obtusa Blume. II. 515. no. 14.
— *orientalis* Linn. II. 513. no. 2. VI. 71. no. 2.
— *orientalis* Madr. Herb. II. 511. no. 7.
— *ovalifolia* Rxb. II. 512. no. 19.
— *parviflora* Pers. II. 513. no. 2. VI. 71. no. 2.
— parvifolia Rxb. II. 513. †
— *parvifolia* Willd. II. 513. no. 2. VI. 71. no. 2.
— peduncularis Wall. II. 512. no. 17.
— pilosa Rxb. et Wall. *II. 512. no. 22.
— polycephala Wall. II. 511. no. 6.
— purpurascens Korthls. II. 512. no. 12.
— *purpurea* Rxb. II. 491. no. 1. II. 512. no. 17.
— Roxburghiana Korthls. II. 513. no. 30.
— Roxburghii G. Don. II. 512. no. 16.
— sericea Spanoghe. II. 511. no 9.
— sericea Wall. II. 511. no. 3.
— setiloba Bth. II. 943. no. 2.
— speciosa Wall. II. 512. no. 20.
— stellata Wall. II. 511. no. 8.
— *stipulacea* Rxb. II. 512. no. 16.
— strigosa Korthls. II. 511. no. 11.
— subdita Korthls. II. 511. no. 1.
— synkorynes Korthls. II. 512. no. 13.
— trichotoma Zolling. et Moritzi. VI. 701. no. 1.
— Wallichiana R. Br. II. 511. no. 2.
— Wallichii Korthls. *II. 513. no. 31.
Nauclearia DC. (ex p.) II. 511.
Nauclearia Endl. II. 511.
Naucleeae DC. II. 511. VI. 70.
Naumburgia Mnch. *VI. 446.
Nautonia Dcne. *VI. 482.

Navaea phoenicea B. Webb et Berth. I. 290. no. 3.
Navarretia Rz. et Pav. *VI. 526.
Navicularia Heisteri Fabric. III. 849. no. 8.
Nectouxia H. B. Kth. III. 14. °III. 953.
— formosa Kth. III. 14. no. 1.
Nectris aquatica Nutt. I. 105. no. 1.
— *peltata* Prsh. I. 105. no. 1.
— *pinnata* Prsh. I. 467. no. 1.
Needhamia R. Br. *II. 732. VI. 741.
— Pumilio DC. *VI. 741. no. 1.
Neesia Blume. I. 331.
— altissima Blume. I. 331. no. 1.
Nefflea Bth. III. 149.
Negundo Mnch. I. 410.
— *arbor mas* Baub. IV. 89. no. 37.
— Californicum Torr. et Gr. I. 410. no. 1.
Nehemia Fresen. I. 360. no. 1. 2. 3.
Nehug VI. 158. no. 1.
Nehugai VI. 158. no. 3.
Neillia Don. *II. 51. *II. 372.
Neja D. Don. II. 587. *II. 952. no. 17.
— falcata N. ab E. II. 587. no. 1.
— filiformis N. ab E. *II. 588. no. 2.
Nelon Tsjunda Rheede. III. 48. no. 78. β. *
Netitris Gaertn. II. 170.
— paniculata Lindl. *II. 170. no. 1.
Nelumbium Juss. I. 105. V. 20.
— Caspicum Fisch. *V. 20. no. 1.
— *codophyllum* Raf. I. 105. no. 1.
— Indicum Tussac. I. 105. no. 2.
— luteum Willd. *I. 105. no. 1.
— Rhedeï Prsl. I. 105. no. 4.
— *speciosum* Hortor. I. 105. no. 4.
— speciosum Willd. I. 105. no. 5.
— *speciosum* Willd. γ. *Caspicum* DC. V. 20. no. 1.
— transversum Prsl. I. 105. no. 3.
NELUMBONEAE Bartl. I. 105. V. 20.
Nematanthus Schrad. II. 716. II. 993. VI. 406.
— calycinus Prsl. VI. 739. no. 6.
— chloronema Martius. VI. 406. †
— erianthus Bth. VI. 406. no. 1.
— heterophyllus Poepp. et Endl. *II. 716. no. 1.
— heterophyllus Prsl. VI. 739. no. 4.
— longipes DC. *II. 993. no. 1.
— pereskiaefolius Prsl. VI. 739. no. 1.
— radicans Prsl. VI. 739. no. 2.
— serrulatus Prsl. VI. 739. no. 3.
Nemauchenes Cass. *II. 695.
Nemedra Adr. Juss. I. 428.
— elaeagnoidea Adr. Juss. I. 428. no. 1.
Nemesia Venten. III. 182. °III. 959. *VI. 637.
Nemesia acuminata Bth. III. 184. no. 21.
— affinis Bth. III. 184. no. 14.
γ. grandiflora.
β. latifolia.
— anisocarpa E. Mey. III. 182. no. 6.
— barbata Bth. III. 182. no. 4.
— bicornis Pers. III. 183. no. 13.
— calcarata E. Mey. III. 183. no. 9.
— chamaedryfolia Vent. III. 185. no. 23.
— Cheiranthus E. Mey. III. 182. no. 5.
— cynanchifolia Bth. III. 184. no. 15.
— dentata G. Don. III. 185. no. 28.
— diffusa Bth. III. 185. no. 22.
β. rigida.
— divergens Bth. III. 184. no. 19.
— floribunda Lehm. III. 184. no. 20.
— foetens Vent. III. 184. no. 18.
— *fruticans* Bth. III. 184. no. 18.
— gracilis Bth. III. 183. no. 12.
— ligulata E. Mey. III. 183. no. 8.
— linearis Vent. III. 184. no. 17.
— *longicornis* Pers. III. 180. no. 8.
— lucida Bth. III. 182. no. 3.
— melissaefolia Bth. III. 185. no. 24.
— parviflora Bth. III. 183. no. 10.
— patens G. Don. III. 185. no. 27.
— pinnata E. Mey. III. 183. no. 11.
— pubescens Bth. III. 185. no. 25.
— saccata E. Mey. III. 182. no. 2.
— strumosa Bth. III. 182. no. 1.
— Thunbergii G. Don. III. 185. no. 26. *III. 935.
— versicolor E. Mey. III. 183. no. 7.
β. oxyceras.
— viscosa E. Mey. III. 184. no. 16.
Nemia Cheiranthus Bergius. III. 319. no. 23.
— *rubra* Bergius. III. 318. no. 15.
Nemopanthes Raf. *I. 541.
Nemophila Nutt. VI. 524.
— atomaria Fisch. et Mey. *VI. 524. no. 1.
β. discoidalis Van Houtte.
— insignis Bth. *VI. 524. no. 2.
Neogaya Meisn. *II. 405. V. 870.
—? mucronata Schrenk. V. 870. no. 1.
Nepeta Bth. III. 774. °III. 986. VI. 676.
— acerosa B. Webb. III. 778. no. 22.
— *acinifolia* Spr. III. 783. no. 41.
— agrestis Lois. III. 783. no. 43. et in adn.
— *alba* Dsf. III. 788. no. 67. β.
— *Amboinica* Linn. III. 815. no. 5.
— *Americana* Raeusch. III. 782. no. 39.
— *amethystina* Dsf. III. 782. no. 40. α.
— *angustifolia* Vahl. III. 782. no. 40. β.
— *annua* Pall. III. 774. no. 1.
— Apuleï Ucria III. 778. no. 20.
— *argentea* Hortul. III. 784. no. 46. et 47.

Nepeta aristata Rich. III. 560. no. 167.
— *Arragonensis* Lam. III. 782. no. 40. β.
— azurea R. Br. III. 783. no. 44.
— betonicaefolia C. A. Mey. III. 784. no. 48.
— *bipinnata* Cav. III. 774. no. 1.
— botryoides Ait. III. 774. no. 1.
— brevifolia C. A. Mey. III. 786. no. 57.
— Cadmea Boiss. III. 948.
— *Calamintha* Tausch. III. 780. no. 28.
— calycina Fnzl. III. 949.
— campestris Bth. III. 776. no. 8.
— camphorata Boiss. VI. 676. no. 1.
— canescens Racusch. *III. 790. no. 76.
— Cataria Linn. III. 782. no. 39.
β. candida.
— cephalotes Boiss. III. 947.
— ciliaris Bth. III. 780. no. 31.
— circinnata Willd. III. 779. no. 25.
— *citriodora* Becker. III. 782. no. 39.
— clinopodioides Royle. III. 781. no. 34.
— *coerulea* Ait. III. 788. no. 66.
— *colorata* Willd. III. 784. no. 47.
— connata Royle. III. 775. no. 5.
— *Cretica* Dietr. III. 726. no. 41.
— crinita Montbr. et Auch. III. 780. no. 30.
— crispa Willd. III. 786. no. 58.
— *Croatica* Spr. III. 708. no. 2.
— curviflora Boiss. III. 948.
— cyanea Stev. III. 782. no. 41.
— *cyanotricha* Tausch. III. 784. no. 46.
— Daënensis Boiss. VI. 677. no. 6.
— densiflora Kar. et Kir. III. 779. no. 23.
— *diffusa* Hortul. III. 784. no. 46.
— discolor Royle. III. 776. no. 12.
— distans Royle. III. 780. no. 29.
— *disticha* Blume. III. 815. no. 5.
— elata Royle. III. 776. no. 9.
— elliptica Royle. III. 777. no. 14.
β. parviflora.
— erecta Bth. III. 785. no. 53.
— eriostachys Bth. III. 775. no. 7.
— erodiifolia Boiss. III. 949.
— *fissa* Bth. III. 777. no. 16.
— fissa C. A. Mey. III. 785. no. 55.
— floccosa Bth. III. 781. no. 36.
— *foliis serratis etc.* Plum. III. 526. no. 4.
— *foliosa* Moris. III. 778. no. 21.
— glabra Bth. III. 785. no. 54.
— Glechoma Bth. III. 787. no. 62.
β. hirsuta.
γ. parviflora.
— glomerata Montbr. et Auch. III. 781. no. 33.
— glomerulosa Boiss. III. 948.
— glutinosa Bth. III. 779. no. 26.
— Govaniana Bth. III. 785. no. 52.
— graciliflora Bth. III. 781. no. 37.
Nepeta Granatensis Boiss. III. 777. no. 17.
— grandiflora M. Bieb. III. 784. no. 47.
— *grandiflora* Lapeyr. III. 788. no. 66.
— *grandis* Hortul. III. 784. no. 47.
— grata Bth. III. 777. no. 15.
— *graveolens* Vill. III. 782. no. 40. β.
— heliotropiifolia Lam. III. 789. no. 70
— *hirsuta* Linn. III. 779. no. 24. β.
— *imbricata* Lag. III. 780. no. 28.
— *incana* Ait. III. 782. no. 40. γ.
— *incana* M. Bieb. III. 783. no. 41.
— *incana* Hortul. III. 784. no. 46. et 47.
— incana Thnbrg. III. 790. no. 73.
— *Indica* Burm. III. 872. no. 20.
— *Indica* Linn. III. 815. no. 5. β.
— Italica Linn. III. 780. no. 28.
— *Italica* Sibthrp. III. 780. no. 27.
— Ispahanica Boiss. III. 949.
— Japonica Willd. III. 789. no. 73.
— Kotschyi Boiss. VI. 676. no. 2.
— *lamiifolia* Hffm. III. 784. no. 47.
— *lamiifolia* Hortul. III. 784. no. 46.
— lamiifolia Willd. III. 787. no. 61.
— *lanata* Jacq. III. 778. no. 21.
— *lanceolata* Lam. III. 782. no. 40. β.
— latifolia DC. III. 788. no. 66.
— lavandulacea Linn. fil. III. 775. no. 3.
— *laxa* Bth. III. 786. no. 55.
— leucophylla Bth. III. 781. no. 35.
— linearis Royle. III. 775. no. 4.
— *lobata* Rudolph. III. 775. no. 3.
— longibracteata Bth. III. 787. no. 65.
— *longiflora* C. A. Mey. III. 786. no. 55.
— *longiflora* Fisch. III. 786. no. 57.
— *longiflora* Sims. III. 784. no. 46.
— *longiflora* Vent. III. 786. no. 56.
— *lophantha* Fisch. III. 774. no. 6.
— macrantha Fisch. III. 785. no. 51.
— macrosiphon Boiss. VI. 677. no. 4.
— *macrostachya* Jcq. III. 780. no. 28.
— macrura Ldb. III. 790. no. 74.
— *Madagascariensis* Lam. III. 503. no. 9.
— *Malabarica* Linn. III. 816. no. 8.
— *marifolia* Cav. III. 726. no. 41.
— *marrubioides* Willd. III. 780. no. 28.
— *maxima etc.* Sloane. III. 526. no. 4.
— *maxima flore albo, spica habiliori* Sloane. IV. 47. no. 20.
— melissaefolia Lam. III. 784. no. 50.
— *melissaefolia* Pers. III. 784. no 47.
— Meyeri Bth. III. 783. no. 42.
— micrantha Bnge. III. 782. no. 38.
— *micrantha* C. A. Mey. III. 783. no. 42.
— *minor* Mill. III. 782. no. 39.
— mollis Bth. III. 777. no. 13.
— *mollissima* Tausch. III. 783. no. 41.

Nepeta multibracteata Dsf. III. 777. no. 18.
— *multibracteata* Lnk. et Hffmnsgg. III. 777. no. 17.
— *multifida* Linn. III. 774. no. 1. III. 775. no. 3.
— Mussini Henkel. III. 784. no. 46.
— *mutabilis* Rich. III. 555. no. 147.
— Nepalensis Spr. III. 790. no. 75.
— Nepetella Linn. III. 782. no. 40.
γ. incana.
α. major.
β. humilis.
— nervosa Royle. III. 775. no. 6.
— nivalis Bth. III. 787. no. 63.
— *nuda* Jacq. III. 788. no. 67. β.
— nuda Linn. III. 788. no. 67.
α. grandiflora
β. parviflora.
— *orientalis* Mill. III. 780. no. 28.
— oxyodonta Boiss. VI. 676. no. 3.
— *paniculata* Crantz. III. 788. no. 67. α.
— *paniculata* Mill. III. 782. no. 40.
— *Pannonica* Jcq. III. 788. no. 67. α.
— *Pannonica* Linn. III. 788. no. 67. β.
— parviflora M. Bieb. III. 788. no. 68.
— *parvifolia* Hortul. III. 727. no. 41.
— Patavina Fisch. *III. 790. no. 77.
— pauciflora Spr. *III. 790. no. 78.
— *pectinata* Linn. III. 560. no. 167.
— *pinnatifida* Fisch. III. 791. no. 2.
— *polystachya* Bth. III. 777. no. 14.
— *procumbens* Mill. III. 779. no. 24. β.
— *pumila* Spr. III. 708. no. 2.
— pungens Bth. III. 789. no. 71.
— pusilla Bth. III. 789. no. 72.
— racemosa Lam. III. 783. no. 45.
— raphanorhiza Bth. III. 776. no. 11.
— *reticulata* Dsf. III. 778. no. 21.
— *rosea* Slzm. III. 778. no. 20.
— ruderalis Hamilt. III. 780. no. 32.
— *salviaefolia* Pers. III. 784. no. 46.
— salviaefolia Royle. III. 784. no. 49.
— saturejoides Boiss. III. 949.
— *scabra* Tausch. III. 778. no. 21.
— Schiraziana Boiss. VI. 677. no. 5.
— Scordotis Linn. III. 779. no. 24.
β. viridis.
— *Scordotis* Linn. III. 779. no. 24. β.
— septemcrenata Ehrenb. III. 786. no. 59.
— *serpyllifolia* M. Bieb. III. 726. no. 41.
— *Sibirica* M. Bieb. III. 789. no. 69.
— Sibthorpii Bth. III. 779. no. 27.
— sidaefolia Raeusch. *III. 790. no. 79.
— spicata Bth. III. 776. no. 10.
— suaveolens Roemer. *III. 790. no. 80.
— supina Stev. III. 777. no. 16.
Nepeta tenuifolia Bth. III. 774. no. 2.
— teucriifolia Willd. III. 786. no. 60.
— *teucrioides* Hortul. III. 784. no. 46. et 47.
— *teucrioides* Lam. III. 780. no. 28.
— Thibetica Bth. III. 787. no. 64.
— Tmolea Boiss. III. 948.
— *tomentosa* Sieb. III. 779. no. 24.
— *tuberosa* Dsf. III. 778. no. 20. III. 779. no. 22.
— tuberosa Linn. III. 778. no. 21.
— *Ucrania* M. Bieb. III. 788. no. 67. β.
— Ucranica Linn. III. 789. no. 69.
— Vaillantii Bth. III. 778. no. 19.
— *versicolor* Treviran. III. 847. no. 1.
— *violacea* Brot. III. 778. no. 21.
— *violacea* Hortul. III. 784. no. 46. et 47.
— *violacea* Vill. III. 788. no. 67. α.
— viscida Boiss. III. 948.
— *vulgaris* Lam. III. 782. no. 39.
— *Willdenowiana* Hortul. III. 784. no. 46.
Nepeteae Bth. III. 773. III. 986. VI. 676.
Nephelium Linn. I. 420. V. 364.
— *Benghalense* G. Don. I. 420. no. 4.
— Danura Wlprs. V. 365. no. 9.
— glabrum Wlprs I. 420. no. 1.
— lappaceum Linn. V. 365. no. 3.
— Litchi Wght. V. 364. no. 2.
— Longan Hook. V. 364. no. 1.
— *Longana* Cambess. V. 364. no. 1.
— longanum Cambess. *I. 420. no. 4.
— *longanum* Cambess. V. 364. no. 1.
— Noronhianum Wlprs. I. 420. no. 2.
— oppositifolium Wlprs. V. 365. no. 7.
— parviflorum Wlprs. V. 365. no. 6.
— rimosum Wlprs. V. 365. no. 4.
— Rubia Wlprs. V. 365. no. 5.
— xerocarpum Wlprs. I. 420. no. 3.
— verticillatum Wlprs. V. 365. no. 8.
Nephradenia Dene. *VI. 490.
Nephandra Coth. IV. 88. no. 30.
— *dubia* Grtnr. IV. 88. no. 30.
Nephromeria Bth. (Desmodium) V. 525. no. 10. et 11.
Nephrophylloides Turcz. V. 828.
Nephrophyllum DC. (?) II. 366. no. 35.
Neptunia Lour. I. 863. °V. 583.
— gracilis Bth. I. 863. no. 5. *V. 583. no. 5.
— lutea Bth. I. 863. no. 6.
— oleracea Lour. *I. 863. no. 1. V. 583 no. 1.
— plena Bth. *I. 863. no. 2. V. 583. no. 2.
— *polyphylla* Bth. I. 863. no. 2. V. 583. no. 2.
— pubescens Bth. I. 863. no. 7.
— *stolonifera* Guill. et Perr. I. 863. no. 1. V. 583. no. 1.

Neptunia Surinamensis Steudel. V. 583. no. 4.
— tenuis Bth. I. 863. no. 3.
— triquetra Bth. *I. 863. no. 4. V. 583. no. 3.
Neriandra Alph. DC. VI. 472.
— aurantiaca Martens et Galeotti. VI. 472. no. 1.
— hancorniaefolia Alph. DC. VI. 472. †
Nerija dichotoma Rxb. I. 536. no. 2.
Nerium Linn. VI. 472.
— Kotschyi Boiss. VI. 472. no. 1.
— *reticulatum* Rxb. VI. 474. no. 1.
— thyrsiflorum Paxton. *VI. 472. no. 2.
Nertera Bnks. II. 486. VI. 48.
—? alsinoides Cham. et Schlchtd. II. 486. no. 1.
— gracilis Raoul. VI. 48. no. 1.
Nesaea Commers. II. 103. V. 674.
Nesaea Commers. II. 103.
— Candollei Guill. et Perr. II. 103. no. 5.
— erecta Guill. et Perr. II. 103. no. 3.
— myrtifolia Dsf. *II. 103. no. 1.
— radicans Guill. et Perr. II. 103. no. 4.
— recta Steudel. VI. 674. no. 1.
— salicifolia H. B. Kth. *II. 103. no. 2. β. grandiflora Bot. Reg.
— *salicifolia* H. B. Kth. II. 916. no. 2. *a*.
— squarrosa Steud. II. 103. no. 6.
— triflora Kth. II. 103. †
Nescidia A. Rich. *II. 484.
Neslia Dsvx. I. 183.
— *erucaefolia* Noulet. I. 189. no. 1.
— paniculata Dsvx. *I. 183. no. 1.
Nestlera Spr. *II. 650.
Neudorfia Adans. VI. 549. no. 1.
Neumannia A. Rich. I. 204.
— *integrifolia* A. Rich. I. 204. no. 1.
— *theaeformis* A. Rich. I. 204. no. 2.
Neuractis Cass. *II. 623.
Neurada B. Juss. II. 52.
— procumbens L. *II. 52. no. 1.
Neuradeae DC. II. 52.
Neurocalyx Hook. II. 515. *II. 524.
— Hookerianus Wght. II. 515. no. 1.
— Wightii Arn. II. 515. no. 3.
— Zeylanicus Hook. II. 515. no. 2.
Neurocarpaea R. Br. II. 525.
— lanceolata R. Br. *II. 525. no. 1.
Neurocarpum Dsvx. I. 752. II. 900. V. 529.
—? barbatum Dsvx. I. 753. no. 10.
— bracteatum Mart. I. 752. no. 6.
— cajanifolium Prsl. I. 752. no. 3.
— densiflorum Bth. I. 753. no. 7.
— ellipticum Dsvx. *I. 752. no. 5.
— flagellare Bth. I. 753. no. 8.
Neurocarpum frigidulum Mart. I. 752. no. 2.
— *glycinoides* Dsvx. I. 753. no. 3.
— Guianense Dsvx. I. 753. no. 9.
— *laurifolium* Dsvx. I. 753. no. 1.
— longifolium Mart. I. 752. no. 1.
— Mexicanum Zucc. II. 900. no. 1.
— retusum Hsskrl. V. 529. no. 1.
— *rubiginosum* Dsvx. I. 753. no. 2.
— rufescens Bth. I. 752. no. 4.
— *villosum* Dsvx. I. 753. no. 4.
Neurolaena R. Br. *II. 650.
Neurolaeneae Lssng. II. 650. VI. 250.
Neuroloma Andr. I. 134.
— *arabidiflorum* DC. I. 134. no. 1.
— *nudicaule* DC. I. 134. no. 1.
Neuropeltis Wall. VI. 542.
— racemosa Wall. *VI. 542. no. 1.
Neurophyllum DC. (?) V. 826. no. 12. 13. 14. 15. 16.
Neurophyllum Torr. et Gr. II. 398. V. 862.
— longifolium Torr. et Gr. *II. 398. no. 1. V. 862. no. 1.
Neuroscapha Tulasne. °V. 543.
— Guilleminiana Tulasne. V. 544. no. 1.
— Martiana Tulasne. V. 544. no. 2.
— pubigera Tulasne. V. 544. no. 3.
Neurotoma scapigerum DC. I. 134. no. 4.
NHANDIROBEAE St. Hil II. 194. II. 933. V. 758.
Nibbisia G. Don. I. 59.
— Bisma G. Don. I. 59. no. 1.
— Codua G. Don. I. 59. no. 2.
— Hamiltonii G. Don. I. 59. no. 3.
Nicandra Adans. III. 22. °III. 954.
Nicandra Lnk. et Otto. III. 22.
— *anomala* Lnk. et Otto. III. 22. no. 1.
— *Indica* Roem. et Schult. III. 25. no. 15. *a*.
— physaloides Grtnr. III. 22. no. 1.
Nicolsonia DC. I. 736. V. 524.
— Caffra E. Mey. I. 736. no. 1.
— major Steudel. V. 524. no. 1.
— radicans Steudel. V. 525. no. 2.
— setigera E. Mey. I. 736. no. 2.
— *styracifolia* Dsvx. I. 736. no. 4.
— villosa Schlchtd. et Cham. I. 736. no. 3.
Nicotiana Linn. III. 7. °III. 953. VI. 572.
— acuminata Grah. III. 11. no. 25.
— acutiflora St. Hil. VI. 572. no. 1.
— *acutifolia* St. Hil. III. 12. no. 28.
— alata Lnk. et Otto. III. 13. no. 37.
— alpina Poepp. *III. 14.
— andicola Bth. III. 10. no. 17.
— *angustifolia* Ehrb. III. 8. no. 4.
— angustifolia Rz. et Pav. III. 11. no. 26.
— anisandra Vest. *III. 14.
— anisoloba Spr. *III. 14.

Nicotiana auriculata Bertero. III. 8. no. 6.
— *axillaris* Lam. III. 6. no. 1.
— Berteriana Sweet. *III. 14.
— Bonariensis Lehm. III. 12. no. 31.
— Brasila Hort. *III. 14.
— Brasiliensis Lnk. et Otto. *III. 14.
— *breviflora* Gill. VI. 569. no. 13.
— *breviflora* Poir. III. 9. no. 9.
— cerinthoides Hornem. III. 9. no. 11.
— *cerinthoides* Vitm. III. 12. no. 28.
— Chinensis Fisch. III. 8. no. 5.
— cirrhoides Miers. VI. 572. no. 3.
— commutata Fisch. et Mey. III. 12. no. 32.
— crispa Cav. III. 13. no. 36.
— *crispa* Pers. III. 12. no. 28.
— *decurrens* Agrdh. III. 11. no. 24.
— decurrens Tausch. III. 10. no. 18.
— dilatata Lnk. III. 11. no. 27.
— diversifolia N. ab E. *III. 14.
— dubia Jcquem. III. 21. no. 16.
— fastigiata N. ab E. III. 933.
— Forsteri Roem. et Schult. III. 13. no. 40.
— fragrans Bernh. *III. 14.
— *fruticosa* Forst. III. 13. no. 40.
— fruticosa Linn. III. 8. no. 4.
— *fruticosa* var. β. Mill. III. 8. no. 4.
— *fruticosa* Lour. III. 8. no. 5.
— *gigantea* Enum. pl. hort. Dorp. III. 7. no. 1. β.
— glauca Grah. III. 9. no. 12.
— glutinosa Linn. III. 9. no. 8.
— *Havanensis* Lag. III. 7. no. 1.
— *humilis* Ehrh. III. 9. no. 7.
— humilis Lnk. III. 10. no. 15.
— lancifolia Willd. III. 8. no. 3.
— Langsdorffii Weinm. III. 9. no. 13.
— *latissima* DC. III. 7. no. 1. β
— *Lehmannii* Agrdh. III. 8. no. 4.
— *linoides* Gillies. VI. 569. no. 12. β.
— longiflora Cav. III. 11. no. 22.
— Loxensis Kth. III. 8. no. 2.
— *lyrata* Kth. III. 12. no. 29.
— Marylandica Schübl. *III. 14.
— *maxima* Hffmnsgg. III. 8. no. 6.
— Mexicana Schlchtd. III. 10. no. 19.
— *militaris* Linn. III. 9. no. 8.
— *minima* Molina III. 6. no. 3.
— multivalvis Lindl. III. 13. no. 35.
— *multivalvis* Lindl. VI. 572. no. 2.
— nana Lindl. III. 13. no. 34.
— *nana* Lindl. VI. 569. no. 14.
— Nepalensis Lnk. et Otto. *III. 14.
— obtusifolia Mart. et Gal. VI. 572. no. 2.
— noctiflora Hook. III. 11. no. 23.
— *nyctaginiflora* Lehm. III. 6. no. 1.
— paniculata Linn. III. 9. no. 10.
Nicotiana parviflora Lehm. III. 7. no. 2.
— Persica Lindl. III. 11. no. 24.
— petiolata Agrdh. *III. 14.
— plumbaginifolia Vis. III. 11. no. 28.
— *pseudodecurrens* Steud. III. 10. no. 18.
— *pulmonarioides* Kth. III. 9. no. 9.
— pulmonarioides Kth. III. 10. no. 16.
— pusilla Linn. III. 8. no. 7.
β. humilis Lehm. III. 9. no. 7.
— quadrivalvis Prsh. III. 13. no. 33.
— *quadrivalvis* Prsh. VI. 572. no. 1.
— repanda Willd. III. 12. no. 29.
— rotundifolia Linn. III. 13. no. 39. III. 126. no. 28 b.
— *rotundifolia* Lindl. III. 933.
— rugosa Mill. III. 13. no. 41.
— *rugosa* Mill. III. 10. no. 14.
— ruralis Arrabida. *III. 14.
— rustica Linn. III. 10. no. 14.
β. Asiatica Schult.
— sanguinea Lnk. et Otto. *III. 14.
— *scabra* Cav. III. 10. no. 14.
— *Sibirica* Hort. Parm. III. 10. no. 14.
— silenoides Salm-Dyck. *III. 14.
— solanifolia Wlprs. III. 12. no. 33. *III. 933.
— saveolens Lehm. III. 10. no. 20.
— sordida Lehm. III. 126. no. 28. a.
— Tabacum Linn. III. 7. no. 1.
δ. alipes Schrnk. III. 8. no. 1.
α. attenuata Schrnk. III. 7. no. 1.
ζ. gracilipes Schrnk. III. 8. no. 1.
ϑ. Lingua Schrnk. III. 8. no. 1.
β. macrophylla Schrnk. III. 7. no. 1.
γ. pallescens Schrnk. III. 8. no. 1.
ε. serotina Schrnk. III. 8. no. 1.
η. Verdan Schrnk. III. 8. no. 1.
— *Tatarica* Hort. Cracov. III. 10. no. 14.
— *tenella* Cav. III. 8. no. 7.
— tenella Cav. III. 13. no. 38.
— *tomentosa* Rz. et Pav. III. 14. no. 1.
— *Turcica* Haberl. III. 8. no. 5.
— undulata Rz. et Pav. III. 9. no. 9.
— *undulata* Vent. III. 11. no. 20.
— vincaeflora Lag. III. 11. no. 21.
— *viridiflora* Cav. III. 9. no. 10.
— viscosa Lehm. III. 12. no. 30.
— *Ybarrensis* Kth. III. 8. no. 3.
Nicotianeae G. Don. III. 5. III. 953. VI. 567.
Nicotianeae Miers. VI. 566.
Nidorella Cass. *II. 587.
Nidorella DC. II. 951. no. 17.
— *diversifolia* C. H. Schultz. II. 958. no. 1.
— *hyssopifolia* DC. VI. 122. no. 5.
— *Kraussii* C. H. Schultz. II. 958. no. 5.
— *mespilifolia* DC. II. 958. no. 3.

Nidorella Natalensis C. H. Schultz. II. 958. no. 4.
— *obovata* DC. VI. 122. no. 4.
— *scandens* C. H. Schultz. II. 958. no. 2.
Niebuhria DC. I. 196. V. 53.
— *acutifolia* E. Mey. V. 54. no. 2.
— *arenaria* DC. I. 197. no. 2. *a.*
— linearis DC. *I. 196. no. 1.
— nervosa Hochstett. V. 53. no. 1.
— *oblongifolia* DC. I. 197. no. 2. *β.*
— pedunculosa Hochstett. V. 53. no. 2.
Nierembergia Rz. et Pav. III. 5. °III. 953. °VI. 567.
— angustifolia H. B. Kth. III. 6. no. 4.
— anomala Miers. VI. 569. no. 13.
— aristata Sweet. III. 6. no. 8.
— *Atkinsiana* Sweet. III. 7. no. 4. *β.*
— calycina Hook. III. 5. no. 1.
— coerulea Miers. VI. 569. no. 8.
— ericoides Miers. VI. 568. no. 3.
— filicaulis Lindl. III. 6. no. 7.
— gracilis Hook. III. 6. no. 6.
— graveolens St. Hil. III. 6. no. 5.
— *graveolens* St. Hil. VI. 569. no. 10.
— hippomanica Miers. VI. 568. no. 2. (cum varr. *a.* et *β.* ibid.)
— *intermedia* Grah. III. 7. no. 3.
— *intermedia* Paxton. III. 933.
— *linearifolia* Grah. III. 6. no. 7.
— linifolia Miers. VI. 569. no. 12. (cum varr. *a.* et *β.* ibid.
— nana Miers. *VI. 469. no. 14.
— *phoenicea* D. Don. III. 7. no. 4.
— pinifolia Miers. VI. 568. no. 6.
— pubescens Spr. III. 6. no. 5. VI. 569. no. 10.
— pulchella Miers. VI. 568. no. 7.
— *punicea* Hort. III. 7. no. 4.
— repens Rz. et Pav. III. 6. no. 3.
— rigida Miers. VI. 568. no. 5.
— rivularis Miers. VI. 568. no. 1.
— scoparia Sendtn. VI. 569. no. 9.
— spathulata H. B. Kth. III. 5. no. 2.
— staticefolia Sendtn. VI. 569. no. 11.
— stricta Miers. VI. 568. no. 4.
— *subdentata* Meyen. *III. 6. obs.
— *viscidula* H. B. Kth. VI. 571. no. 12.
Nigella Mnch. II. 741.
Nigella Tournef. II. 741.
Nigella Tourn. I. 49. II. 741.
— *amoena* Salisb. II. 741. no. 2.
— arvensis Linn. II. 741. no. 3.
β. glaucescens Guss. I. 49. no. 1.
— *coarctata* DC. II. 742. no. 6.
— *coerulea* Lam. II. 742. no. 6.
— Damascena Trag. I. 50. † II. 742. no. 6.
Nigella deserti Boiss. I. 49. no. 6.
β. Arabica I. 50.
a. Assyriaca I. 50.
— *divaricata* Beaupré. II. 742. no. 3.
— *divaricata* Beaupré. II. 743. no. 9.
— *doliata* Pall. II. 742. no. 3.
— elata Boiss. II. 743. no. 10.
— *elegans* Salisb. II. 742. no. 6.
— foeniculacea DC. II. 742. no. 4.
— Garidella Spenner. II. 742 no. 7.
— glauca Schkuhr. II. 743. no. 9.
— Hispanica Linn. II. 741. no. 2.
— *involucrata* Mnch. II. 742. no. 6.
— *multifida* Gab. II. 742. no. 6.
— orientalis Linn. II. 741. no. 1.
— oxypetala Boiss. I. 49. no. 4.
— Persica Boiss. I. 49. no. 5.
— *polygyna* Mnch. II. 741. no. 2.
— *pygmaea* Pers. II. 742. no. 6.
— sativa Linn. I. 50. † II. 742. no. 5.
— *sativa* var. *γ.* DC. II. 742. no. 5.
— *segetalis* M. B. II. 742. no. 4.
— truncata Viv. I. 49. no. 2.
— unguicularis Spenner. II. 743 no. 8.
— verrucosa C. Koch. I. 49. no. 3.
Nigellaria DC. I. 49. no. 3.
Nigellastrum Mnch. I. 49. no. 4. II. 741.
Nigrina viscosa Linn. III. 379. no. 3.
Nila Barudena Rheede. III. 81. no. 319. *a.* b.
— *Hummatu* Rheede. III. 17. no. 13. *a.*
Nima Hamilt. I. 525. *V. 399.
Nima Hamilt. V. 395.
— quassioides Adr. Juss. *I. 525. no. 1.
— *quassioides* Hamilt. I. 524. no. 1. V. 395. no. 1.
Nimmoia Wght. II. 362. V. 824.
— floribunda Wght. *II. 362. no. 1. V. 824. no. 1.
Niopa Bth. I. 860. V. 579.
Niota Lamarckiana Blume. I. 525. no. 1.
— *pentapetala* Poir. I. 525. no. 1.
— *tetrapetala* Wall. I. 525. no. 1.
Niphaea Lindl. °VI. 738.
— albo-lineata Hook. VI. 738. no. 1.
— oblonga Lindl. VI. 738. no. 2.
Nir-notsjil Rheede. IV. 112. no. 58.
Nisa Noronh. *I. 548.
Nissolia DC. I. 750. (ex p.)
Nissolia Jcq. *I. 750. II. 900.
— *aculeata* DC. I. 795. no. 5. V. 543. no. 1.
— *aculeata* Vell. I. 795. no. 13.
— *acuminata* Fl. Flum. I. 795. no. 10.
— *arborea* Jcq. I. 796. no. 28.
— *declinata* Vell. I. 795. no. 14.
— *diadelpha* DC. I. 796. no. 29.
— *ferruginea* Willd. I. 796. no. 29.

Nissolia firma Vell. I. 797. no. 49.
— fruticosa Jcq. *II. 900. no. 1.
— *fruticosa* Vell. I. 797. no. 36.
— *glabrata* Lk. I. 796. no. 28.
— *incorruptibilis* Vell. I. 797. no. 48.
— *lanceolata* Vell. I. 797. no. 36.
— *legalis* Vell. I. 797. no. 47.
— *leiophylla* DC. I. 796. no. 31.
— *nictitans* Vell. I. 795. no. 12.
— *reticulata* Vell. I. 803. no. 4.
— *spinosa* Vell. I. 785. no. 16.
— *stipitata* DC. I. 798. no. 51.
Nitidae Bth. (Calliandra) V. 603.
Nitrangium Endl. II. 705. VI. 368.
Nitraria L. *I. 542.
Nitrarieae Endl. I. 542.
Noccaea DC. I. 175.
— alpina Rchb. I. 176. †
— brevicaulis Rchb. I. 176. †
Noisettia H. B. Kth. I. 223.
— galeopsifolia St. Hil. I. 223. no. 2.
— longifolia H. B. Kth. *I. 223. no. 1.
— *longifolia* Nees et Mart. I. 223. no. 2.
— *orchidiflora* Ging. I. 223. no. 1.
— *pyrifolia* Mart. I. 223. no. 2.
—? Roquefeuilleana St. Hil. I. 223. no. 3.
Nolana Linn. °VI. 549.
— *atriplicifolia* D. Don. VI. 548. no. 2.
— Chasteneyana Gaudich. *VI. 549.
— coronata Rz. et Pav. VI. 549. no. 5.
— *crassulifolia* Knze. VI. 551. no. 2.
— *gallinacea* Pers. VI. 549. no. 1.
— inflata Rz. et Pav. VI. 549. no. 4.
— *paradoxa* Hook. VI. 549. no. 2.
— *paradoxa* Lindl. VI. 547. no. 1.
— prostrata Linn. fil. VI. 549. no. 1.
— *revoluta* Rz. et Pav. VI. 551. no. 3.
— rupicola Gaudich. *VI. 549.
— *sedifolia* Knze. VI. 550. no. 1.
— spathulata Rz. et Pav. VI. 549. no. 3.
— tenella Lindl. VI. 549. no. 2.
Nolanaceae Rchb. VI. 546.
Nolaneae Miers. VI. 547.
Nolletia Cass. *II. 594. *II. 952. no. 39.
Nomisma DC. I. 155. no. 2. et 9.
Nomismia Wght. et Arn. I. 790.
— aurea Wght. et Arn. *I. 790. no. 3.
— capitata Wght. et Arn. *I. 790. no. 2.
— nummularia Wght. et Arn. *I. 790. no. 1.
Nomimium Ging. I. 217. 218. II. 766.
Nonatella Aubl. *II. 488.
Nonnea Medik. VI. 558.
— multicolor Knze. VI. 558. no. 2.
— Persica Boiss. VI. 558. no. 1.
Nook VI. 158. no. 1.
Nopal nochetzli Hernand. II. 348. no. 29.
Nopal sylvestre Thierry-Menonv. II. 348. no. 29.
Norantea Aubl. I. 398.
— adamantium Cambess. I. 399. no. 4.
— Berterii G. Don. I. 399. no. 7.
— cacabifera G. Don. I. 399. no. 10.
— cordachida G. Don. I. 399. no. 9.
— Goyazensis Cambess. I. 399. no. 5.
— Guianensis Aubl. *I. 399. no. 3.
— Japurensis Mart. I. 398. no. 1.
— macrocarpa G. Don. I. 399. no. 11.
— obovata G. Don. I. 399. no. 8.
— Paraënsis Mart. I. 399. no. 2.
— Selloi G. Don. I. 399. no. 6.
Noronhia Stadm. *VI. 462.
Norta DC. I. 163. 165. V. 39. no. 1.
Nortenia (Torenia) Bth. VI. 643. no. 1. VI. 746.
— *Madagascariensis* Pet. Th. III. 295. no. 6.
— *Mauritiana* Pet. Th. III. 295. no. 6.
— *Thouarsii* Cham. et Schlchtd. III. 295. no. 6.
Notelaea Vent. *VI. 461.
— laurifolia Kth. VI. 742. no. 1.
Noterophila Mart. II. 125. V. 690.
— inundata Mart. II. 125. no. 1. V. 690. no. 1.
Nothites Cass. *II. 556.
Noticastrum DC. *II. 578. *II. 952. no. 6.
Notiosphace Bth. (Salvia) III. 676.
Notobasis Cass. *II. 676.
Notoceras R. Br. I. 124.
— Canariense R. Br. *I. 124. no. 1.
— canescens Boiss. I. 124. no. 3.
— *cardaminefolium?* DC. I. 124. no. 1.
— floccosum Boiss. I. 124. no. 2.
— *Hispanicum* DC. I. 124. no. 1.
— *quadricorne* DC. I. 171. no. 1.
Notochaete Bth. III. 890. °III. 990.
— hamosa Bth. III. 890. no. 1.
Notonia DC. *II. 665.
— *Wightii* Arn. I. 759. no. 1. V. 531. no. 1.
Notopterygieae Adr. Juss. V. 200.
Notorhizeae DC. I. 160. V. 38.
Nuancu Laguen I. 289. no. 21.
Nudiflorae (Acacia) Bth. I. 915.
Nuek VI. 158. no. 1.
Nupharinae Endl. I. 106.
Nuphar Sm. I. 108.
— advena Ait. *I. 108. no. 4.
  β. tomentosum.
— intermedium Ledeb. I. 108. no. 2.
— *Kalmianum* Prsl. I. 108. no. 3. β.
— luteum Sm. *I. 108. no. 3.
  β. Kalmianum.
— *minus* Dumort. I. 108. no. 1.
— pumilum Sm. *I. 108. no. 1.
— *tomentosum* Nutt. I. 108. no. 4. β.

Nuttallia Torr. et Gr. II. 51. V. 659.
— cerasiformis Torr. et Gr. *II. 51. V. 659. no. 1.
— *cordifolia* Nutt. I. 292. no. 6.
— *digitata* Bart. I. 292. no. 8.
— *digitata* Hook. I. 292. no. 7.
— *malvaeflora* Fisch. et Trautv. I. 316. no. 40.
— *Munroana* Nutt. I. 294. no. 24.
— *Papaver* Grah. I. 292. no. 6.
— *pedata* Nutt. I. 292. no. 8.
Nuxia Commers. III. 331. °III. 967. *VI. 645.
— corrugata Bth. III. 331. no. 4.
— dysophylla Bth. III. 331. no. 5.
— floribunda Bth. III. 331. no. 2.
— lobulata Bth. III. 331. no. 6.
— saligna Bth. III. 331. no. 3.
verticillata Commers.? III. 331. no. 1.
Nuytsia R. Br. II. 446. V. 940.
— floribunda R. Br. *II. 446. no. 1. V. 940. no. 1.
Nyctanthes Juss. *VI. 463.
Nycterinia D. Don. III. 306. VI. 641.
— *Africana* D. Don. III. 308. no. 11.
— *Capensis* Bth. III. 307. no. 5.
— *coriacea* Bth. III. 306. no. 1.
— *dentata* Bth. III. 307. no. 7.
— *divaricata* Bth. III. 308. no. 12.
— *longiflora* Bth. III. 307. no. 6.
— *lychnidea* D. Don. III. 307. no. 4.
— *maritima* Bth. III. 307. no. 3.
— *ovata* Bth. III. 307. no. 8.
— *peduncularis* Bth. III. 308. no. 13.
— *pumila* Bth. III. 307. no. 9.
— *pusilla* Bth. III. 308. no. 14.
— *selaginoides* Bth. III. 308. no. 10.
— *spathacea* Bth. III. 306. no. 2.
— *villosa* Bth. III. 309. no. 15.
Nycterium (Solanum) Dunal. III. 92.
— *Amazonicum* Lnk. III. 92. no. 385.
— *cardaminefolium* Vent. III. 91. no. 375.
— *cordifolium* Vent. III. 92. no. 383.
Nycterium cornutum Lnk. III. 91. no. 375.
— *Fontanesianum* G. Don. III. 91. no. 378.
— *heterodoxum* Lnk. III. 92. no. 379.
— *lobatum* Sweet. III. 91. no. 376.
— *luteum* Donn. III. 91. no. 376.
— *vespertilio* Lnk. III. 92. no. 383.
Nymphaea Neck I. 106. II. 749. V. 20.
— abbreviata Guill. et Perr. I. 107. no. 7.
— *alba* Michx. I. 108. no. 18. *α*.
— alboviridis St. Hil. I. 107. no. 12.
— Amazonum Mart. et Zucc. I. 107. no. 15.
— Basniniana Turcz. II. 749. no. 1.
— Cachemirica Cambess. I. 106. no. 4.
— *Cahlara* Donn. I. 106. no. 1.
— cyanea Rxb. I. 106. no. 1.
— dentata Schum. et Thonn. I. 107. no. 10.
— gracilis Zucc. I. 107. no. 14.
— Guineensis Schum. et Thonn. I. 107. no. 9.
— lasiophylla Mart. et Zucc. I. 107. no. 16.
— lineata St. Hil. I. 107. no. 11.
— Lotus L. I. 108. †
— maculata Schum. I. 107. no. 8.
— *maculata* Thonn? I. 107. no. 5.
— Mexicana Zuccar. I. 108. no. 17.
— micrantha Guill. et Perr I. 107. no. 6.
— *minor* DC. I. 108. no. 18. *γ*.
— nitida Sims. I. 108. †
— odorata Ait. *I. 108. no. 18. (c. var. *α*. *β*. et *γ*.)
— *odorata β. rosea* Prsh. I. 108. no. 18. *γ*.
— pauciradiata Bnge. I. 106. no. 2.
— punctata Kar. et Kir. I. 106. no. 3.
— *reniformis* Waldst. I. 108. no. 18 *β*.
— rubra Dryand. I. 108. †
— rubra Rxb. et Sims. *V. 20. no. 1.
— rufescens Guill. et Perr. I. 107. no. 5.
— speciosa Mart. et Zucc. I. 107. no. 13.
— stellata Willd. I. 108. †
— versicolor Sims. I. 108. †
NYMPHAEACEAE DC. (ex p.) I. 105. V. 20.
NYMPHAEACEAE Salisb. I. 106. II. 749. V. 20.

O

Oatopappus C. H. Schultz. VI. 201.
Obaejaceae (Senecio) DC. VI. 257. no. 1.
Obaejacoides DC. VI. 257. no. 3.
Obeliscaria Cass. II. 612. II. 979.
Obeliscaria Cass. VI. 159.
— *columnaris* DC. VI. 160. no. 2.
— *integrifolia* Dill. II. 977. no. 2. *a.*
— peduncularis Torr. et Gr. II. 979. no. 1.
— *pinnata* Cassini. VI. 159. no. 1.
— *pulcherima* DC. VI. 160. no. 2. *β.*
— Tagetes DC. *II. 612. no. 1.
— *Tagetes* DC. VI. 160. no. 2. *β.*
Obletia Rogier IV. 32. no. 79.
Oblongiflorae Mart. (Anona) I. 88.
Oblongifoliae DC. (Bacharis) II. 598.
Obolaria Linn. III. 438. °III. 973. *VI. 655.
— Virginica Linn. III. 438. no. 1.
Obstrigosae Bth. (Mimosa) I. 873.
Obtusifoliae Bth. (Albizzia) V. 596.
Ochna Schreb. I. 527. II. 826. V. 400.
— Delagoënsis Wlprs. I. 528. no. 2.
— dubia Guill. et Perr. I. 527. no. 1.
— Heyneana Wght. et Arn. I. 528. no. 6. (III. Emend. p. 3.)
— *l*[illegible]*ida* Lam. I. 528. no. 4.
— Natalitia Meisn. II. 826. no. 1.
— *nitida* Wall. I. 528. no. 4.
— *obtusata* DC. I. 528. no. 4.
— pulchra Hook. II. 826. no. 2.
— pumila Hamilt. I. 528. no. 3.
— serrulata Hochstett. V. 400. no. 1.
— squarrosa L. *I. 528. no. 4.
— Wightiana Wall. I. 528. no. 5. (III. Emend. p. 3.) V. 400. †
— *Zeylanica* Lam. I. 526. no. 2.
OCHNACEAE DC. I. 525. II. 826. V. 399.
Ochneae Bartl. I. 526.
Ochopodium Vogel. I. 732.
Ochotodium DC. *I. 159.
Ochradenus Del. II. 751.
— baccatus Del. *II. 751. no. 1.
Ochranthaceae Lindl. *I. 392.
Ochranthe Lindl. I. 392.
— arguta Lindl. *I. 392. no. 1.
Ochrocarpus Thouars. I. 392.
— *Madagascariensis* G. Don. I. 392. no. 1.
Ochroleuci (Astragalus) DC. I. 702. II. 867.
Ochroma Swrtz. *I. 331.
Ochrosia Juss. *VI. 468.
Ochtocharis Blume °V. 681.
— Javanica Blume. V. 681. no. 1.
— paniculata Krthls. V. 682. no. 2.
Ochtocosmus Bth. II. 802. °V. 135.
— Roraimae Bth. *II. 802. no. 1. V. 135. no. 1.
Ocimastrum Trag. III. 168. no. 19.
Ocimodon Bth. III. 483. VI. 657. no. 1.
Ocimoideae Bth. III. 976. VI. 657. III. 483.
(*Ocimum* cf. *Ocymum.*)
Ocimum Linn. III. 483. °III. 976. VI. 657.
— *Abyssinicum* Hort. Paris. III. 486. no. 10.
— acutum Thnbrg. III. 493. no. 38.
— adscendens Willd. III. 487. no. 12.
— Africanum Lour. III. 492. no. 33.
— *album* Linn. III. 484. no. 2. *ε.*
— *album* Rxb. III. 483. no. 1.
— *Americanum* Auct. (nec Linn.) III. 490. no. 24.
— *Americanum* Jacq. III. 484. no. 2.
— *Americanum* Linn. III. 483. no. 1.
— *anisatum* Hortul. III. 484. no. 2. *β.*
— aristatum Blume. III. 488. no. 15.
— *asperum* Roth. III. 513. no. 2.
— *Barrelieri* Roth. III. 484. no. 2. *η.*
— *Basilicum* Burm. III. 484. no. 2 *a.*
— Basilicum Linn. III. 484. no. 2.
 ε. album Bth.
 β. anisatum Bth.
 η. densiflorum Bth.
 ζ. difforme Bth.
 γ. glabratum Bth.
 δ. majus Bth.
 a. pilosum Bth.
 ϑ. purpurascens Bth.
 ι. thyrsiflorum Bth.
— *Basilicum* Linn. III. 484. no 2. *β.*
— Bojeri Bth. III. 486. no. 9.
— brachiatum Blume. III. 488. no. 16.

Ocimum bullatum Lam. III. 484. no. 2. ζ.
— *Burchellianum* Bth. III. 487. no. 11.
— Campechianum Mill. III. 490. no. 25.
— canum Sims. III. 483. no. 1.
— *capitatum* Roth. III. 497. no. 1.
— *capitellatum* Linn. III. 497. no. 1.
— carnosum Lnk. et Otto. III. 488. no. 17.
— *caryophyllatum* Rxb. III. 484. no. 2. γ.
— *ciliatum* Hornem. III. 484. no. 2 α.
— cinerum R. Br. *III. 494.
— citriodorum Visiani. III. 489. no. 23.
— *cochleatum* Hort. III. 484. no. 2. ζ.
— *cordifolium* Bojer. III. 486. no. 9.
— crispum Thnbrg. III. 493. no. 39.
— *cristatum* Rxb. III. 487. no. 12.
—? diffusum Bth. III. 491. no. 31.
— *fastigiatum* Roth. III. 676. no. 303.
— *febrifugum* Lindl. III. 486. no. 6.
— filamentosum Forsk. III. 486. no. 10.
— *fimbriatum* Hortul. III. 384. no. 2. ζ.
— *foetidum* Banks. III. 503. no. 12.
— Forskålei Bth. III. 485. no. 3.
— *frutescens* Burm. III. 488. no. 18.
— *frutescens* Müll. III. 486. no. 7.
— *frutescens* Sieb. III. 490. no. 24.
— gracile Bth. III. 489. no. 20.
— *grandiflorum* Blume. III. 500. no. 9.
— *grandiflorum* L'Hérit. III. 486. no. 10.
— *gratissimum* Forsk. III. 485. no. 3. III. 503. no. 11.
— *gratissimum* Jacq. III. 484. no. 7.
— *gratissimum* Lam. III. 486. no. 8.
— gratissimum Linn. III. 486. no. 7.
— Guineense Schum. et Thonn. III. 487. no 14.
— *Hadiense* Forsk. III. 505. no. 20.
— helianthemifolium Hochst. VI. 657. no. 3.
— *heptodon* Beauv. III. 485. no. 6.
— *hirsutum* Benth. III. 489. no. 18.
— *hirtum* Herb. Banks. III. 505. no. 21.
— *hispidulum* Schum. et Thonn. III. 483. no. 1.
— *hispidum* Lam. III. 484. no. 2. α.
— *holosericeum* Breit. III. 486. no. 8.
— *incanescens* Mart. III. 483. no. 1.
— *Indicum* Roth. III. 487. no. 12.
— *inflexum* Thnbrg. III. 511. no. 49.
— inflexum Thnbrg. III. 493. no. 42.
— *inodorum* Burm. III. 488. no. 18.
— *integerrimum* Willd. III. 484. no. 2. γ.
— *lanceolatum* Schum. et Thonn. III. 484. no. 2. γ.
— *laxum* Vahl. III. 484. no. 2. ε.
— *lanceolatum* Schum. et Thonn. III. 484. no. 2. β.
— macrostachyum Poir. III. 492. no. 36.
Ocimum majus Hortul. III. 484. no. 2. δ.
— *medium* Mill. Dict. III. 484. no. 2. ϑ.
—? membranaceum Bth. III. 492. no. 32.
— *menthoides* Heyne. III. 493. no. 37.
— micranthum Willd. III. 490. no. 24.
— *minimum* Burm. III. 484. no. 2. α.
— minimum Linn. III. 485. no. 4.
— *monachorum* Linn. III. 488. no 18.
— *monadelphum* Roth. III. 514. no. 3.
— *montanum* Hook. III. 490. no. 24.
— *nigrum* Thouin. III. 484. no. 2. ϑ.
— nudicaule Bth. III. 490. no. 26.
— obovatum E. Mey. III. 487. no. 13.
— *obovatum* E. Mey.? VI. 657. no. 1.
— obtusifolium E. Mey. III. 498. no. 22.
— ovatum Bth. III. 490. no. 26.
— *paniculatum* Pers. III. 516. no. 13.
— *peltatum* Hortul. III. 484. no. 2. ζ.
— *petiolare* Lam. III. 486. no. 7.
— *pilosum* Willd. III. 484. no. 2. α.
— *pubescens* Mill. Dict. III. 490. no. 24.
— *punctatum* Linn. III. 502. no. 7.
— *rariflorum* Hochst. VI. 657. no. 4.
— rigidum Bth. III. 491. no. 28.
— *rigidum* Hamilt. III. 499. no. 1. γ.
— rugosum Thnbrg. III. 493. no. 40.
— *salinum* Molina. III. 485. no. 4.
— *salvioides* Rth. III. 511. no. 50.
— sanctum Linn. III. 488. no. 18.
— scabrum Thnbrg. III. 493. no. 41.
— *scutellarioides* Linn. III. 515. no. 7.
— *scutellarioides crispum* Burm. III. 484. no. 2. ζ.
— Selloi Bth. III. 485. no. 5.
— serpyllifolium Forsk. III. 487. no. 11.
— *stamineum* Sims. III. 483. no. 1.
— striatum Hochstett. VI. 657. no. 1.
— suave Willd. III. 486. no. 8.
— *suffruticosum* Schum. III. 500. no. 6.
— tenellum Bth. III. 489. no. 21.
— *tenuiflorum* Lam. III. 489. no. 18.
— tenuiflorum Linn. III. 489. no. 19.
— tereticaule Poir. III. 491. no. 29.
— teucriifolium Hochst. VI. 657. no. 2.
— *Thonningii* Schum. III. 491. no. 29. III. 500. no. 6.
— *thyrsiflorum* Linn. III. 484. no. 2. ι.
— tomentosum Lam. III. 489. no. 18.
— *triste* Roth. III. 499. no. 4.
— *tuberosum* Rxb. III. 498. no. 1. β.
— *urticaefolium* Hortul. III. 484. no. 2. ζ.
— *urticaefolium* Bth. III. 486. no. 8.
— Vaalae Forsk. III. 492. no. 35.
— *villosum* Rxb. III. 489. no. 18.
— *villosum* Weinm. III. 486. no. 8.
— virgatum Thnbrg. III. 493. no. 43.

Ocimum viride Willd. III. 485. no. 6.
— *viridiflorum* Roth III. 485. no. 6.
— viscosum Roth. III. 692. no. 37.
— Zatarhendi Bth. III. 492. no. 34.
— *Zatarhendi α.* Forsk. III. 514. no. 4.
— *Zatarhendi β.* Forsk. III. 492. no. 34.
— *Zeylanicum* Burm. III. 486. no. 7.
— *Zeylanicum* Desf. III. 486. no. 8.
— *Zeylanicum annuum* etc. Burm. III. 488. no. 18.
— *Zeylanicum perenne* etc. Burm. III. 488. no. 18.
Octavia DC. *II. 488.
Octodon Thoun. *II. 464.
Octomeris Naudin. °V. 706.
— Bonplandii Naudin. *V. 707. no. 4.
— macrodon Naudin. V. 707. no. 3.
— rostrata Naudin. V. 707. no. 1.
— tuberculata Naudin. V. 707. no. 2.
Ocymoideae cf. **Ocimoideae.**
Ocymum cf. Ocimum.
Ocymum acrocephalum Blume. III. 497. no. 2.
— *Coetsa* Spr. III. 509. no. 39.
— *densiflorum* Rth. III. 510. no. 42. et in adnot.
— *dimidiatum* Schum. et Thonn. III. 498. no. 3.
— *Madagascariense* Pers. III. 505. no. 20.
— *Maypurense* Rth. III. 504. no. 13.
— *menthoides* Burm. III. 496. no. 6.
— *molle* Ait. III. 504. no. 13.
— *monostachyum* Pal. de Beauv. III. 506. no. 28.
— *polycladon* Lnk. III. 498. no. 4.
— *polystachyon* Linn. III. 497. no. 1.
— *prostratum* Linn. III. 496. no. 6.
— *punctatum* Thnbrg. III. 493. no. 41.
— *racemosum* Thnbrg. III. 505. no. 19.
— *sylvaticum* Schum. et Thonn. III. 496. no. 8.
— *ternifolium* Spr. III. 511. no. 45.
— *thymiflorum* Rth. III. 500. no. 6.
— *verticillatum* Linn. III. 505. no. 19.
Odina Rxb. I. 550. V. 412.
— acida Wlprs. V. 412. no. 3.
—? *triphylla* Hochstett. V. 413. no. 1.
— velutina Endl. *I. 550. no. 2. V. 412. no. 2.
— Wodier Rxb. *I. 550. no. 1. V. 412. no. 1.
Odonia Bertol. I. 761.
— *trinervia* Spr. I. 783. no. 1.
Odontadenia Bth. *VI. 468.
Odontarrhena C. A. Mey. II. 758. no. 2.
Odontarrhena C. A. Mey. I. 145.
— hirta Schrenk. I. 145. no. 5.
Odontarrhena microphylla C. A. Mey. I. 145. no. 4.
— obovata C. A. Mey. *I. 145. no. 2.
— obtusifolia C. A. Mey. *I. 145. no. 3.
— tortuosa C. A. Mey. *I. 145. no. 1. (cum varr. *α.* et *β.*)
Odontites Hall. III. 399. III. 456. °III. 971. VI. 653.
— aspera Boiss. III. 401. no. 12.
— Aucheri Boiss. III. 456. no. 14.
— Bocconi Wlprs. III. 400. no. 8.
— Caucasica C. Koch. III. 456. no. 15.
— Corsica G. Don. III. 401. no. 9.
— *flore luteo* Riv. III. 400. no. 3.
— Granatensis Boiss. III. 400. no. 4.
— Jaubertiana D. Dietr. III. 401. no. 11.
— ixodes Boiss. VI. 653. no. 1.
— linifolia G. Don. III. 400. no. 5.
— longiflora B. Webb. III. 401. no. 13.
— lutea Rchb. III. 399. no. 3.
— purpurea G. Don. III. 401. no. 10.
— *rubra* Pers. III. 399. no. 1.
— serotina Rchb. III. 399. no. 2.
— tenuifolia G. Don. III. 400. no. 6.
— verna Rchb. III. 399. no. 1.
— viscosa Rchb. III. 400. no. 7.
β. australis Boiss.
— *vulgaris* Stev. III. 399. no. 1.
Odontocarpha DC. *II. 541.
Odontocyclus Turczan. II. 758.
— Kurilensis Turczan. *II. 758. no. 1.
Odontoloma H. B. Kth. *II. 538.
Odontotrichum Zucc. *II. 701.
Oederia DC. *II. 633.
Oeidocarpon Putterl. I. 253. V. 71. no. 6. et 7.
Oenanthe Lam. II. 399. V. 863.
Oenanthe Linn. II. 399.
— Anatolica C. Koch. V. 863. no. 1.
— angulosa Griseb. V. 863. no. 3.
— *ferulacea* Thnbrg. II. 410. no. 12.
— filiformis Lam. *II. 399. no. 5.
γ. densa } Eckl. et Zeyh.
β. diffusa } Eckl. et Zeyh.
— filipendula Dumort. II. 399. no. 1.
— incrassata Bory et Chaub. II. 399. no. 3.
— *Indica semine cordato* Barr. II. 743. no. 8.
— *inebrians* Thnbrg. II. 399. no. 2.
— *interrupta* Thnbrg. II. 400. no. 2.
— Lisaea Moris. II. 399. no. 2.
— media Griseb. V. 863. no. 2.
— *obscura* Spr. II. 399. no. 4.
— pteridifolia Lowe. II. 399. no. 4.
— sarmentosa Nutt. II. 400. no. 6.
— stolonifera DC. *II. 400. no. 7.

Oenothera L. II. 79.
Oenothera Spach. (ex p.) II. 77. 80. 87.
— acaulis Cav. *II. 83. no. 44.
— *acaulis* Lindl. II. 83. no. 43.
— affinis Cambess. II. 81. no. 14.
— *alata* Nutt. II. 82. no. 33.
— albicans Lam. *II. 81. no. 17.
— albicaulis Nutt. II. 80. no. 5.
— *albicaulis* Prsh. II. 79. no. 1.
— *alyssoides* Hook. II. 78. no. 11.
— *ambigua* Spr. II. 84. no. 55. β.
— *amoena* Lehm. II. 87. no. 4.
— *Andina* Nutt. II. 79. no. 14.
— *anisoloba* Don. II. 83. no. 44.
— *Arnottii* Torr. et Gr. II 88. no. 8.
— *asperifolia* Nutt. II. 77. no. 4.
— Berlandieri Wlprs. II. 85. no. 63.
— Berteriana Spach. II. 80. no. 7.
— biennis L. *II. 83. no. 36.
ζ. canescens, ε. cruciata, γ. grandiflora, β. muricata, δ. parviflora, α. vulgaris } Torr. et Gr.
— bifrons Sweet. II. 81. no. 22.
— *bistorta* Nutt. II. 77. no. 2.
— *Boothii* Dougl. II. 77. no. 5.
— brachysepala Spach. II. 81. no. 13.
— breviflora Torr. et Gr. *II. 85. no. 65.
— *caesia* Nutt. II. 76. no. 4.
— *caespitosa* Gill. II. 89. no. 1.
— caespitosa Nutt. *II. 83. no. 39.
— *Canadensis* Goldie. II. 84. no. 55. β.
— *Capensis* Hortul. II. 84. no. 50.
— Catharinensis Cambess. II. 80. no. 12.
— Cavanillesii Spach. *II. 88. no. 11.
β. tenuifolia.
— centaurifolia Wlprs. II. 83. no. 45.
— *Chamissonis* Lnk. II. 78. no. 8.
— *cheiranthifolia* Hornem. II. 77. no. 3.
— chrysantha Michx. *II. 84. no. 57.
— *concinna* Don. II. 89. no. 1.
— *contorta* Lehm. II. 78. no. 10.
— coronopifolia Torr. et Gr. II. 80. no. 3.
— *corymbosa* Curt. II. 82. no. 34.
— *crassipes* Hort. Berol. II. 83. no. 35.
— *cruciata* Nutt. II. 83. no. 36.
— cuprea Schlchtd. II. 82. no. 27.
— cuspidata Wlprs. II. 83. no. 43.
— *decumbens* Dougl. II. 88. no. 14.
— *densiflora* Lindl. II. 89. no. 2.
— *dentata* Cav. II. 78. no. 7.
— *diffusa* Nutt. II. 76. no. 1.
— Drummondii Hook. II. 81. no. 19.
— Drummondii Wlprs. II. 85. no. 61.
Oenothera dubia Hortul. II. 84. no. 50.
— *elata* H. B. Kth. II. 83. no. 35.
— eminens Tausch. II. 82. no. 32.
β. parviflora.
— epilobiifolia H. B. Kth. *II. 84. no. 52.
— *epilobioides* Nutt. II. 78. no. 12.
— erosa Lehm. II. 83. no. 38.
— *Fraseri* Prsh. II. 84. no. 53. β.
— *fruticosa* Hook. II. 84. no. 55. γ.
— fruticosa Linn. *II. 84. no. 55.
β. ambigua, ε. hirsuta, δ. incana } Torr. et Gr.
ζ. Indica Lindl.
γ. phyllopus Torr. et Gr.
— *gauraeflora* Torr. et Gr. II. 78. no. 6.
— *gauroides* Hornem. II. 83. no. 36. α.
— *glabella* Nutt. II. 89. no. 3.
— glauca Michx. *II. 84. no. 53.
β. Fraseri Torr. et Gr.
— graciliflora Hook. et Arn. II. 86. no. 70.
— *gracilis* Schrad. II. 84. no. 58.
— *grandiflora* Ait. II. 83. no. 36. γ.
— *grandiflora* Rz. et Pav. II. 83. no. 44.
— Hartwegi Bth. II. 82. no. 28.
— heterantha Nutt. II. 86. no. 68.
— *heterophylla* Nutt. II. 77. no. 2.
— heterophylla Spach. II. 81. no. 20.
— *heterophylla* Spach. II. 81. no. 22.
— hirsuta Wlprs. II. 85. no. 62.
— *hirta* Lnk. II. 77. no. 4.
— holosericea Tausch. II. 82. no. 30.
— Hookeri Torr. et Gr. II. 81. no. 24.
— *humifusa* Lindl. II. 89. no. 1.
— *humifusa* Nutt. II. 81. no. 21. γ.
— *hybrida* Michx. II. 84. no. 55.
— *incana* Nutt. II. 84. no. 55. δ.
— indecora Cambess. II. 81. no. 16.
— Jamesii Torr. et Gr. II. 81. no. 23.
— *Lamarckiana* Ser. II. 83. no. 36. γ.
— lavandulaefolia Torr. et Gr. II. 85. no. 64 b.
— *lepida* Torr. et Gr. II. 88. no. 13.
— *leptophylla* Nutt. II. 80. no. 4. β.
— *leucocarpa* Comien. II. 79. no. 1. β.
— *Lindleyi* Dougl. II. 87. no. 1.
— linearis Michx. *II. 84. no. 56. (c. var. β.)
— linifolia Nutt. *II. 85. no. 60.
— *lithospermoides* Nutt. II. 78. no. 5.
— littoralis Schlchtd. II. 82. no. 26.
— longiflora Jcq. *II. 80. no. 6.
β. sericea Spach.
— *macrantha* Nutt. II. 87. no. 1.
— *macrocarpa* Prsh. II. 82. no. 33.
— malacophylla Spach. II. 80. no. 11.
— marginata Nutt. II. 83. no. 41.

Oenothera maritima Nutt. II. 77. no. 1.
— media Lnk. *II. 83. no. 37.
— Mendozinensis Gill. II. 87. no. 71.
— Mexicana Spach. II. 81. no. 18.
— micans Tausch. II. 82. no. 31.
— *micrantha* Hornem. II. 77. no. 4.
— *micrantha* Nutt. II. 77. no. 6.
— *micrantha* Prsl. II. 76. no. 2.
— micrantha Wlprs. II. 84. no. 48.
— *minima* Prsh. II. 81. no. 21. β.
— Missouriensis Sims. *II. 82. no. 33.
— mollissima Linn. *II. 81. no. 15.
— montana Nutt. II. 83. no. 40.
— *muricata* Murr. II. 83. no. 36. β.
— *nocturna* Jcq. II. 81. no. 17.
— *Nuttallii* Sweet. II. 80. no. 5.
— Nuttallii Torr. et Gr. II. 86. no. 66.
— *odorata* Hook. et Arn. II. 81. no. 24.
— odorata Jcq. *II. 80. no. 10.
— odoratissima Tausch. II. 82. no. 29.
— ovata Nutt. II. 86. no. 69.
— pallida Dougl. II. 80. no. 4.
β. leptophylla Spach.
— *parviflora* Linn. II. 83. no. 36. δ.
— *parvula* Nutt. II. 78. no. 9.
— perampla Grah. II. 87. no. 72.
— *pilosella* Raf. II. 84. no. 55. ε.
— *pinnatifida* Hort. II. 84. no. 48.
— pinnatifida H. B. Kth. *II. 84. no. 49.
— pinnatifida Nutt. *II. 79. no. 1. (c. var. β.)
— *pinnatifida* Torr. II. 80. no. 3.
— propinqua Spach. II. 80. no. 8.
— *prostrata* Rz. et Pav. II. 81. no. 17.
— pumila L. *II. 84. no. 58.
β.? pusilla Torr. et Gr.
— *purpurea* Lam. II. 84. no. 46.
— *purpurea* Willd. II. 88. no. 12.
— *Purshii* Don. II. 79. no. 1.
— *pusilla* Michx. II. 84. no. 58.
— *pygmaea* Dougl. II. 78. no. 5.
— *racemosa* Nutt. II. 76. no. 5.
— *ramosissima* Nutt. II. 76. no. 3.
— *rhizocarpa* Spr. II. 83. no. 42.
— rhombipetala Nutt. II. 81. no. 25.
— *riparia* Lehm. II. 84. no. 57.
— riparia Nutt. *II. 84. no. 54.
— *quadrivulnera* Dougl. II. 88. no. 10.
— *Romanzowii* Ldb. II. 88. no. 9.
— rosea Ait. *II. 84. no. 46.
— *roseo-alba* Bernh. II. 87. no. 4.
— *rubicunda* Torr. et Gr. II. 87. no. 2.
— rubra Cav. II. 84. no. 46.
— salicifolia Dsf. *II. 83. no. 35.
— *salicina* Nutt. II. 89. no. 2. β.
— scapoidea Torr. et Gr. II. 86. no. 67.
— *scoparia* Rz. et Pav. I. 460. no. 1.
Oenothera serotina Don. II. 84. no. 55. γ.
— *serrulata* Nutt. II. 79. no. 1. α.
— *siliquosa* Nutt. II. 79. no. 13.
— sinuata Linn. *II. 81. no. 21.
β. minima } Torr. et Gr.
γ. humifusa }
— Spachiana Torr. et Gr. II. 84. no. 59.
— speciosa Nutt. *II. 85. no. 64. (c. varr. α. β. et γ.)
— *speciosa* Nutt. II. 85. no. 62. α.
— spectabilis Hortul. II. 82. no. 34.
— *spinulosa* Nutt. II. 79. no. 1. δ.
— *spiralis* Hook. II. 77. no. 3.
— stricta Ldb. *II. 80. no. 9.
— *strigulosa* Torr. et Gr. II. 79. no. 13.
— *suaveolens* Dsf. II. 83. no. 36. γ.
— *subulata* α. Hook. II. 89. no. 1.
— *subulata* Rz. et Pav. II. 89. no. 1. V. 665. no. 1.
— *taraxacifolia* Sweet. II. 83. no. 44.
— Tarquensis H. B. Kth. *II. 84. no. 51.
— *tenella* Cav. II. 88. no. 11.
— *tenella* β. *tenuifolia* Lindl. II. 88. no. 16.
— *tenuifolia* Cav. II. 88. no. 15.
— tetraptera Cav. * II. 84. no. 50.
— trichocalyx Nutt. II. 80. no. 2.
— triloba Nutt. II. 83. no. 42.
— *viminea* Dougl. II. 87. no. 7.
— *viminea* var. Hook. II. 88. no. 8.
— *vinosa* Torr. et Gr. II 87. no. 3.
— virgata Rz. et Pav. *II. 84. no. 47.
— *viridescens* Hook. II. 77. no. 1.
OENOTHEREAE Endl. II. 72. II. 915. V. 664.
Oëpata Rheede. IV. 132. no. 1.
Ogedaea DC. *II. 615.
Ogiera Cass. *II. 609.
Oglifa Cassini. VI. 247.
— *Soyerii* Gordon. VI. 247. no. 8.
Ohlendorffia procumbens Lehm. III. 234. no. 2.
— *rosulota* N. ab E. III. 234. no. 3.
Oiospermum Less. II. 538.
— involucratum Less. II. 538. no. 1.
Oja de Queso III. 325. no. 30.
Olaceae Bth. II. 803. V. 137.
OLACINEAE Mirb. I. 377. II. 802. V. 136.
Olax L. I. 377. II. 803. V. 138.
— acuminata Wall. I. 378. no. 5.
— *Bador* Ham. I. 377. no. 2.
— Benthamiana Miquel. V. 138. no. 1.
— Gardneriana Bth. II. 803. no. 1.
— macrophylla Bth. I. 378. no. 6. V. 139. adn. ad no. 3.
— nana Wall. I. 378. no. 4.
— obtusa Blume. I. 377. no. 1.
— *obtusa* Blume. I. 377. no. 2.

Olax pauciflora Bth. I. 378. no. 7.
— *pauciflora* Bth. V. 139. no. 2.
— psittacorum Vahl. I. 377. no. 2.
— scandens Rxb. *I. 377. no. 2.
— Wightiana Wall. I. 377. no. 3.
Olbia DC. I. 290.
— *flava* Prsl. I. 291. no. 5.
— *hispida* Prsl. I. 290. no. 4.
Oldenburgia Lssng. *II. 680. *VI. 314.
Oldenlandia Linn. II. 498. VI. 55. no. 7. 8.
— *affinis* DC. II. 500. no. 70.
— *alata* Koen. II. 491. no. 1. II. 498. no. 59.
— *alata* Rxb. II. 498. no. 61.
— *aspera* DC. II. 501. no. 80.
— *asperula* DC. II. 499. no. 69.
— *biflora* Lam. II. 499. no. 66.
— *biflora* Linn. II. 498. no. 60.
— *biflora* Rth. II. 362. no. 1.
— *brachypoda* G. Don. II. 500. no. 72.
— *Caffra* Eckl. et Zeyh. II. 500. no. 78.
— *capillaris* DC. II. 500. no. 70.
— *conostyla* DC. II. 501. no. 87.
— *crystallina* Rxb. II. 499. no. 63.
— *decumbens* Spr. II. 362. no. 2.
— *Deppeana* Cham. et Schlchtd. II. 501. no. 79.
— *dichotoma* Rxb. II. 499. no. 69.
— *dichotoma* Spr. II. 362. no. 1.
— *digyna* Retz. II. 362. no. 2.
— *graminifolia* DC. II. 500. no. 71.
— *herbacea* Rxb. II. 499. no. 69.
— *hirsuta* Vell. II. 516. no. 2.
— *latifolia* Mart. et Gal. VI. no. 6.
— *linearifolia* Madr. Herb. II. 499. no. 70.
— *linifolia* DC. II. 500. no. 70.
— *maritima* Rth. III. 291. no. 1.
— *Mysorensis* G. Don. II. 500. no. 77.
— *nudicaulis* Rth. II. 499. no. 68.
— *oxyphylla* G. Don. II. 500. no. 75.
— *paniculata* Linn. II. 498. no. 61.
— *pentandra* Retz. II. 362. no. 1.
— *puberula* G. Don. II. 500. no. 73.
— *pumila* DC. II. 499. no. 63.
— *pusilla* Rottl. II. 500. no. 70.
— *racemosa* Lam. II. 498. no. 61.
— *ramosissima* Hohenack. II. 502. no. 1. VI. 56. no. 1.
— *repens* Burm. II. 499. no. 62. II. 502. no. 92.
— *stricta* Linn. II. 500. no. 71.
— *trinervia* Retz. II. 499. no. 62.
— *tubulosa* G. Don. II. 500. no. 76.
— *umbellata* Linn. II. 498. no. 58.
Olea Tournef. *VI. 461.
— *Lorentei* Hochstett. VI. 461. no. 2.
— *sylvestris Barbadensis* etc. Pluk. IV. 142. no. 1.
OLEACEAE Lindl. VI. 460.
Olearia Mnch. *II. 577. *II. 952. no. 1. VI. 718.
— affinis Hook. fil. VI. 718. no. 1.
Oleineae A. P. DC. VI. 461.
OLEINEAE Lnk. et Hffmnsgg. VI. 460.
Oligandenia Ehrnbrg. II. 115.
Oligandra Lssng. *II. 681. *VI. 320.
Oliganthae Bth. (Crotalaria) V. 444.
Oliganthae Bth. (Stachys) III. 829.
Oliganthos Barnéoud. IV. 181. VI. 695. no. 2.
Oligarrhena R. Br. *II. 732.
Oligocarpus Lssng. *II. 645. VI. 273.
— calendulaceus Lssng. VI. 273. no. 1.
Oligodora DC. *II. 650.
Oligoglossa DC. II. 638.
Oligogyne DC. II. 622.
—? synedrelloides Hook. et Arn. II. 622. no. 1.
Oligoleima (Leptinella) DC. VI. 723. no. 1.
Oligomeris Cambess. II. 754.
— glaucescens Cambess. *II. 754. no. 1.
Oligophyllae (Indigofera) DC. I. 660.
Oligosporus monospermus Dcne. VI. 217. no. 14.
Oligotrichium Nutt. (Erigeron) II. 581.
— *divaricatum* Nutt. II. 581. no. 27.
Oligothrix DC. *II. 651.
Olinia Thnbrg. II. 149.
— acuminata Kltzsch. II. 150. no. 2.
— Capensis Kltzsch. II. 149 no. 1.
— cymosa Thnbrg. II. 150. no. 3.
Olinieae Arn. II. 149.
Olisbea rhizophoraefolia DC. II. 149. no. 1.
Olisia Bth. III. 833. VI. 681. no. 14.
Oliveria Vent. *II. 424.
Olocarpha DC. II. 631. no. 1.
Omalanthus camphoratus Lssng. II. 642. no. 2.
Omalocarpus DC. I. 30. no. 69. a.
Omalophysa DC. I. 12. no. 33.
Omalotes camphoratus DC. II. 642. no. 2.
Omalotheca Cass. II. 647.
Omalotheca DC. II. 646. VI. 244.
Omphalobium DC. I. 844.
Omphalobium Gaertn. *I. 561. V. 421.
— *carneum* Zppl. I. 561. no. 4.
— *Indicum* Gaertn. I. 561. no. 1.
— *pinnatum* DC. I. 561. no. 1.
— rubrum Poepp. et Endl. V. 421. no. 1.
Omphalocarpum Palis. *VI. 456.
Omphalococca cornifolia Willd. IV. 118. no. 3.
Omphalodes Tournef. VI. 563.
— Persica Boiss. VI. 563. no. 1.
Omphalospora Besser. III. 335. VI. 648. no. 8.

Onagra Spach. II. 82.
— *chrysantha* Spach. II 83. no. 36.
— *Kunthiana* Spach. II. 83. no. 35.
— *Lehmanniana* Spach. II. 83. no. 38.
— *Linkiana* Spach. II. 83. no. 37.
— *spectabilis* Spach. II. 82. no. 34.
— *vulgaris* Spach. II. 83. no. 36.
ONAGRACEAE Meisn. V. 664. 671.
ONAGRARIAE Juss. II. 72. V. 664.
Oncinema Arn. *VI. 484.
Oncinus Loureiro. *VI. 453.
Oncoba Forsk. I. 203.
— spinosa Forsk. *I. 203. no. 1.
Oncogastra Mart. II. 715.
Oncolobium Vogel. I. 816.
Oncorhynchus Lehm. °III. 397. °III. 971.
— pinnatifidus Lehm. *III. 397. no. 1.
Oncosporum Putterl. I. 256. V. 72.
— bicolor Putterl. *I. 256. no. 1. V. 72. no. 1.
— *bicolor* Putterl. V. 72. no. 1.
— Drummondianum Putterl. V. 72. no. 2.
Oncostemum Adr. Juss. *VI. 449.
Onobroma DC. *II. 672.
— *corymbosum* Pers. VI. 731. no. 1.
Onobrychioidei (Astragalus) DC. I. 698. II. 866.
Onobrychioides Jaub. et Spach. II. 898.
Onobrychis Tournef. I. 746. II. 894.
— *Arabica* Hochst. II. 858. no. 2. V. 516. no. 2.
— *arenaria* DC. II. 894. no. 1. δ.
— argentea Boiss. I. 746. no. 1.
— Aucheri Boiss. II. 895. no. 4.
— Cadmea Boiss. II. 895. no. 7.
— *Carpathica* Turcz. II. 894. no. 1. δ.
— *conferta* DC. (ex p.) II. 894. no. 1. β.
— *cuneifolia* DC. I. 744. no. 1.
— depressa Prsl. I. 747. no. 4.
— diffusa Cambess. I. 747. no. 11.
— ebenoides Boiss. et Sprun. II. 896. no. 9.
— echinata Guss. I. 747. no. 3.
— galegifolia Boiss. II. 897. no. 15.
— *Fontanesii* DC. I. 744. no. 1. β.
— *glabra* Desvx. II. 894. no. 1. ζ.
— heliocarpa Boiss. II. 894. no. 2.
— heterophylla C. A. Mey. I. 747. no. 9.
— Hohenackeriana C. A. Mey. I. 747. no. 7.
— hypargyrea Boiss. II. 897. no. 14.
— *incana* Güldenst. II. 894. no. 1.
— Kotschyana Fnzl. II. 896. no. 12.
— lanata Boiss. II. 897. no. 17.
— lasiostachya Boiss. II. 895. no. 8.
— lunata Boiss. II. 895. no. 6.
— *Macotica* Stev. II. 894. no. 1. ε.
— Matritensis Boiss. et Reut. I. 746. no. 2.
— megalophylla Griseb. II. 896. no. 13.
Onobrychis megalaphros Boiss. II. 896. no. 10.
— micrantha Schrenk. I. 747. no. 6.
— *montana* DC. II. 894. no. 1. β.
— nitida Boiss. II. 897. no. 16.
— oxyodonta Boiss. II. 896. no. 11.
— *procumbens* Stev. II. 894. no. 1. γ.
— psoraleaefolia Boiss. II. 895. no. 3.
— pulchella Schrenk. I. 747. no. 10.
— *radiata* β. C. A. Mey. I. 747. no. 7.
— *rotundifolia* Dsvx. I. 667. no. 83.
— sativa Lam. II. 894. no. 1.
— *sativa Tatarica* Fisch. II. 894. no. 1. (c. varr. β. γ. δ. ε. ζ.)
— scrobiculata Boiss. II. 895. no. 5.
— squarrosa Viv. I. 747. no. 5.
— *Tanaïtica* Spr. II. 894. no. 1.
— vaginalis C. A. Mey. I. 747. no. 8.
— *vulgaris* Güldenst. II. 894. no. 1.
Ononis DC. (ex p.) I. 619.
Ononis L. I. 624. II. 839. V. 460.
— adenotricha Boiss. II. 839. no. 1.
— alba Poir. I. 626. †
— *anthylloides* DC. V. 456. no. 17.
— antiquorum L. I. 626. †
— *aspalathoides* DC. V. 456. no. 18.
— Aucheri Jaub. et Spach. V. 460. no. 1.
— *Baetica* Clement. *I. 625. no. 5.
— bicolor Moris. I. 626. no. 15.
— biflora Dsf. I. 626. †
— Bonaniana Prsl. I. 625. no. 13.
— *brachycarpa* DC. I. 624. no. 1. β.
— cephalotes Boiss. I. 625. no. 11.
— *cernua* L. I. 618. no. 6.
— *Cherleri* Desf. I. 625. no. 3. β.
— crassifolia Dufour. *I. 625. no. 9.
— *decumbens* Thnbrg. I. 619. no. 2. I. 622. no. 3.
— *Denhartii* Ten. I. 625. no. 5.
— Denhartii Ten. I. 625. no. 6.
— dentata Soland. I. 626. no. 19.
— diacantha Sieb. I. 626. †
— *diffusa* Ten. I. 625. no. 5.
— *elongata* Eckl. II. 845. no. 1.
— *emarginata* Bojer. V. 445. no. 130.
— *excisa* Thnbrg. I. 592. no. 85. V. 456. no. 11. β.
— filicaulis Salzm. I. 625. no. 4.
— *foetida* Schoub.? I. 624. no. 1. α.
— Gibraltarica Boiss. I. 625. no. 7.
— *glabra* Thnbrg. V. 456. no. 17.
— *glutinosa* Mart. V. 440. no. 76.
— *heterophylla* Thnbrg. I. 619. no. 5. I. 624. no. 6.
— *hirsuta* Thnbrg. I. 618. no. 1.
— *involucrata* Berg. I. 621. no. 9.

Ononis Kotschyana Fnzl. I. 626. no. 17.
— *longearistata* Prsl. I. 624. no. 1. γ.
— longearistata Prsl. I. 625. no. 12.
— Masquielliеrii Bertol. I. 626. no. 16.
— *mollis* Lag. I. 625. no. 3. β.
— peduncularis Lindl. I. 626. no. 18.
— Piccardi Boiss. I. 625. no. 8.
— polymorpha Guss. I. 625. no. 14.
— *porrigens* Slzm. I. 625. no. 1. α.
— *prostrata* L. I. 621. no. 7. V. 456. no. 11.
— *prostrata* Thnbrg. I. 619. no. 2.
— *quinata* Thnbrg. I. 621. no. 2.
— *ramosissima* Friv. II. 839. no. 2.
— reclinata L. *I. 625. no. 3. (c. var. β. ibid.)
— *secunda* Thnbrg. I. 621. no. 11. V. 456. no. 20.
— serrata Forsk. *I. 625. no. 5.
β. prostrata Boiss.
— Sicula Guss. I. 625. no. 2.
— speciosa Lag. *I. 625. no. 10.
— *tridentata β. canescens* DC. I. 625. no. 9.
— *umbellata* L. I. 821. no. 5. V. 456. no. 17.
— *villosa* Sieb. I. 790. no. 4.
— *villosa* Thnbrg. V. 456. no. 12.
— *viscosa* DC. I. 624. no. 1. α.
— viscosa L. *I. 624. no. 1.
β. brachycarpa DC.
γ. breviflora DC.
α. viscosa.
Onopix Raf. *II. 702. no. 18.
Onopordon Vaill. *II. 673. VI. 303.
— Graecum Linn. fil. VI. 303. no. 1.
Onoseris DC. (ex p.) II. 679.
Onoseris DC. VI. 318. *VI. 680.
Onoseris Endl. VI. 318.
— eriocephala Bth. VI. 318. no. 1.
Onosma Linn. VI. 559.
— dasytrichum Boiss. VI. 559. no. 1.
— Kotschyi Boiss. VI. 559. no. 2.
β. trachyanthum.
— stenosiphon Boiss. VI. 559. no. 3.
— tenuifolium Tausch. VI. 560. no. 5.
— *trachyanthum* Boiss. VI. 559. no. 2. β.
— tripartitum Hochstett. VI. 560. no. 4.
Onosmodium Michx. *VI. 560.
Onosuris Chamissonis DC. II. 78. no. 8.
Onotrophe Cass. II. 674. no. 6. VI. 306. no. 8.
Oocephalus Bth. III. 536.
Ooclinium DC. II. 552.
— clavatum Bth. II. 552. no. 1.
Oonopsis multicaulis Nutt. II. 592. no. 4.
Opercularia A. Rich. II. 454. VI. 8.
— hispidula Endl. II. 454. no. 2.
— *multicaulis* Bartl. VI. 8. no. 1.
— pauciflora Endl. II. 454. no. 1.
— purpurea Bartl. VI. 8. no. 2.
Opercularieae Juss. II. 454. VI. 8.
Ophelia G. Don. VI. 508.
— pratensis Edgwrth. VI. 508. no. 1.
Ophiocaryon Schombrgk. °V. 364. *V. 419.
— paradoxum Schombrgk. *V. 364. no. 1.
Ophiorrhiza Linn. II. 502. VI. 57.
— argentea Wall. II. 503. no. 4.
— bracteolata Wall. II. 503. no. 3.
— Brunonis Wght. et Arn. II. 502. no. 2.
— *corymbosa* Ham. II. 503. no. 5.
— cryptantha Zolling. et Moritzi. VI. 701. no. 1.
— discolor R. Br. II. 503. no. 5.
— erubescens Wall. II. 503. no. 6.
— geminata Wall. II. 503. no. 9.
— Harrissonii Heyne. II. 503. no. 8.
— hispidula Wall. II. 503. no. 7.
— Mungbos Linn. *II. 502. no. 1. (c. varr. α. β. et γ. ibid.)
— *Munghos* Wall. II. 503. no. 5.
— nana Edgwrth. VI. 701. no. 2.
— pectinata Arn. VI. 57. no. 1.
— *villosa* Wall. II. 503. no. 4.
Ophioxylon Linn. VI. 467.
— *album* Grtnr. VI. 467. no. 2.
— *Americanum foliis oblongis etc.* Pluken. III. 324. no. 25.
— majus Hsskrl. VI. 467. no. 2.
— serpentinum Linn. VI. 467. no. 1.
— *trifoliatum* Grtnr. VI. 467. no. 1.
Ophispermum Lour. I. 549.
Ophryosporus Meyen. *II. 701.
Opilia Rxb. I. 377. *II. 803.
— amentacea Rxb. *I. 377. no. 2.
— celtidifolia Endl. I. 377. no. 1.
Opilieae Bth. II. 803. V. 137.
Opoïdia Lindl. II. 426. V. 921.
— galbanifera Lindl. *II. 426. no. 1. V. 921. no. 1.
Opoponax Koch. *II. 407. V. 873.
— hispidus Griseb. V. 874. no. 2.
— orientalis Boiss. V. 873. no. 1.
Oporinia DC. II. 688.
Oporinia Don. VI. 345.
— Keretina Wlprs. VI. 345. no. 1.
— laciniata Bertoloni. VI. 732.
Oporinoides Keretinus Nylander. VI. 345. no. 1.
Oppositifoliae (Eucalyptus) Schauer. V. 744.
Opulus DC. II. 452. VI. 7. no. 1.
— *glandulosus* Mnch. II. 452. no. 20.
Opuntia Tournef. II. 346. V. 821.
— acracantha Lem. II. 354. no. 94.
— albicans S. Dyck. II. 349. no. 34.
— *alpina* Gill. II. 346. no. 8.

Opuntia altissima Plum. II. 330. no. 55.
— amyclaea Tenore. II. 350. no. 44.
— Andicola H. Angl. II. 346. no. 7.
— *arbor spinosissima, foliis Portulacae cordatis* Plum. II. 356. no. 10.
— *articulata* Otto. II. 333. no. 83.
— Auberi Pfeiff. II. 354. no. 87.
— aurantiaca Gill. II. 347. no. 13.
— Boliviana S. Dyck. V. 821. no. 2.
— *Bonplandii* Hort. II. 350. no. 51.
— Brasiliensis Haw. II. 352. no. 69.
β. spinosior H. Berol.
γ. minor S. Dyck.
— caespitosa Nutt. II. 347. no. 10.
— candelabriformis Mart. II. 350. no. 46.
— catocantha Otto. II. 352. no. 64.
— *cereiformis* Plum. II. 330. no. 55.
— clavarioides Otto. II. 353. no. 82.
— *coccinea* Hort. II. 350. no. 51.
— *coccinellifera* DC. II. 350. no. 51. II. 351. no. 60.
— coccinellifera Mill. II. 348. no. 20.
— *coerulea* Gill. II. 349. no. 35.
— corrugata H. Angl. II. 346. no. 3.
— crassa Haw. II. 348. no. 27.
β. major.
— crinifera S. Dyck. II. 349. no. 39.
β. lanigera.
— *cruciata* Hort. II. 352. no. 66.
— Curassavica Mill. II. 347. no. 16.
δ. longa Haw.
β. media Haw.
γ. minor Haw.
— cylindrica DC. II. 352. no. 70.
— Darwinii Henslow. II. 354. no. 90.
— decipiens DC. II. 353. no. 77.
β. minor S. Dyck.
— *decipiens major* H. Vindob. II. 352. no. 72.
— decumana Haw. II. 348. no. 24.
— decumbens S. Dyck. II. 349. no. 31.
— dejecta S. Dyck. II. 350. no. 45.
— diademata Lem. II. 354. no. 95.
— *diffusa* Hort. II. 350. no. 45.
— Dillenii DC. II. 351. no. 55.
— *dolabriformis* Hort. II. 352. no. 66.
— eburnea Lem. II. 355. no. 97.
— elata Otto. II. 348. no. 25.
— elatior Mill. II. 351. no. 61.
— *elongata* Haw. II. 351. no. 58.
— extensa S. Dyck. II. 347. no. 14.
— exuviata DC. II. 352. no. 72.
β. angustior DC.
γ. spinosior DC.
— ferox Haw. II. 352. no. 66.
— Ficus Indica Mill. II. 348. no. 26.
Opuntia flavicans Lem. II. 354. no. 88
— *flexibilis* Hort. II. 350. no. 51.
— floccosa S. Dyck. V. 822. no. 3.
— foliosa S. Dyck. II. 347. no. 15.
— fragilis Haw. II. 347. no. 12. II. 354. no. 91.
— fulvispina S. Dyck. II. 351. no. 58.
β. laevior S. Dyck.
— *furiosa* Wendl. II. 353. no. 73.
— Galapageia Henslow. II. 354. no. 86.
— *Gilliesii* Hort. Berol. II. 333. no. 82.
— *glaberrima* H. Berol. II. 348. no. 27. β.
— *glauca* Hort. II. 348. no. 28.
— *glaucescens* Hort. II. 349. no. 33.
— glaucescens Otto. II. 349. no. 32.
— glaucophylla Wendl. II. 351. no. 53.
— glomerata Haw. II. 346. no. 6.
— gracilis Mart. II. 353. no. 78.
— grandis H. Angl. II. 349. no. 33.
— Hernandezii DC. II. 348. no. 29.
— *horizontalis* Gill. II. 346. no. 7.
— *horizontalis* Hort. II. 350. no. 45.
— horrida S. Dyck. II. 351. no. 54.
— humifusa Nutt. II. 347. no. 11.
— *humilis* Haw. II. 351. no. 54.
— *Hystrix* Hort. II. 347. no. 15.
— imbricata DC. II. 352. no. 71.
— *inermis* DC. II. 348. no. 22.
— intermedia S. Dyck. II. 347. no. 19.
— *irrorata* Mart. II. 349. no. 31.
— *Italica* Tenore. II. 347. no. 18.
— Kleiniae DC. II. 353. no. 76.
— lanceolata Haw. II. 348. no. 23.
— lasiacantha Dieffenb. II. 350. no. 47.
— leptocaulis DC. II. 353. no. 80.
— *leucacantha* S. Dyck. II. 350. no. 47.
— leucacantha Otto. II. 352. no. 67.
— leucosticta Wendl. II. 352. no. 68.
— leucotricha DC. II. 349. no. 38.
— longispina Haw. II. 346. no. 5.
— *longispina* Hort. II. 349. no. 36.
— *maxima* Mill. II. 348. no. 24.
— *maxima* S. Dyck. II. 350. no. 44.
— media Haw. II. 350. no. 42.
— megacantha S. Dyck. II. 350. no. 48.
— mesacantha Nutt. II. 346. no. 9.
— *Mexicana* Hort. II. 348. no. 20. II. 350. no. 48.
— microdasys Lehm. II. 348. no. 30.
β. minor S. Dyck.
— *microthele* Hort. II. 353. no. 82.
— *minima Americana spinosissima* Bradl. II. 347. no. 16.
— *minima flagelliformis* Plum. II. 344. no. 14.
— Missouriensis DC. II. 349. no. 41.

Opuntia monacantha Haw. II. 351. no. 59.
— *nana* DC. II. 347. no. 18.
— nigricans Haw. II. 351. no. 60.
— oblongata Wendl. II. 350. no. 50.
— *oligacantha* H. Vindob. II. 349. no. 40.
— orbiculata S. Dyck. II. 349. no. 36.
— *ovata* H. Angl. II. 333. no. 82.
— ovata Pfeiff. II. 346. no. 2.
— Parmentieri Pfeiff. II. 354. no. 92.
— parvula S. Dyck. II. 348. no. 28.
— Pentlandii S. Dyck. V. 821. no. 1.
— *Phyllanthus* Mill. II. 342. no. 6.
— *platyacantha* H. Angl. II. 333. no. 84. II. 346. no. 8. β.
— platyacantha S. Dyck. II. 353. no. 84.
— Poeppigii Otto. II. 353. no. 83.
— *polyacantha* Haw. II. 350. no. 41.
— polyantha Haw. II. 351. no. 56.
— *polymorpha* H. Angl. II. 333. no. 83. II. 355. no. 96.
— *Prate* Sabin. II. 349. no. 34.
— Pseudo-Tuna S. Dyck. II. 350. no. 52.
β. spinosior S. Dyck.
γ. elongata S. Dyck.
— puberula Dieffenb. II. 349. no. 37.
— pubescens Wendl. II. 347. no. 17.
— pulverulenta Pfeiff. II. 354. no. 85.
— *pulvinata* DC. II. 348. no. 30.
— *pusilla* Haw. II. 347. no. 15.
— pusilla S. Dyck. II. 346. no. 4.
— ramulifera S. Dyck. II. 353. no. 81.
— retrospinosa Lem. II. 354. no. 93.
— *repens* Karw. II. 349. no. 31.
— robusta Wendl. II. 351. no. 62.
— rosea DC. II. 353. no. 74.
— rubescens S. Dyck. II. 351. no. 63.
— *salicornioides* Spr. II. 345. no. 1.
— *Sabinii* Hort. II. 347. no. 12.
— Salmiana Parm. II. 353. no. 79.
— *senilis* Parm. II. 349. no. 39.
— sericea Don. II. 349. no. 35.
— *sericea β. longispina* H. Dyck. II. 349. no. 36.
— spinosissima Mill. II. 352. no. 65.
— spinulifera S. Dyck. II. 349. no. 40.
— splendens H. Belg. II. 350. no. 43.
— Stapelia DC. II. 353. no. 75.
— streptacantha Lem. II. 354. no. 89.
— stricta Haw. II. 348. no. 22.
— *subferox* Schott. II. 352. no. 67.
— sulphurea Gill. II. 346. no. 1.
— tomentosa S. Dyck. II. 350. no. 49.
— triacantha DC. II. 351. no. 57.
— tuberculata Haw. II. 348. no. 21.
— tuberosa H. Angl. II. 346. no. 8.
β. spinosa.
Opuntia Tuna Mill. II. 350 no. 51.
β. laevior S. Dyck.
— *Tuna β.* Haw. II. 351. no. 55.
— *Tuna γ. uno latere laeviore* S. Dyck. II. 351. no. 38.
— tunicata Otto. II. 352. no. 73.
— Turpinii Lem. II. 355. no. 96.
— *undulata* Hort. II. 352. no. 72.
— vestita S. Dyck. V. 822. no. 4.
— *virgata* H. Berol. II. 353. no. 80.
— vulgaris Mill. II. 347. no. 18.
β. media S. Dyck.
— *vulgaris* Tenore. II. 348. no. 26.
— *vulgaris γ. major* S. Dyck. II. 348. no. 19.
Opuntiacei Pfeiff. (Cereus) II. 333.
Orchidocarpum arietinum Michx. I. 79. no. 51.
— *parviflorum* Michx. I. 79. no. 52.
Orchipeda Blume. *VI. 468.
Orchis abortiva Leyss. III. 460. no. 9.
Oreanthes Bth. °VI. 409.
— buxifolius Bth. VI. 410. no. 1.
Oreas involucrata Cham. et Schlchtd. I. 174. no. 1.
Orenj-Kadsura Kämpf. V. 15. no. 1.
Oreogeum Ser. II. 48. V. 656.
Oreomyrrhis Endl. *II. 422.
Oreophila Don. *II. 686.
Oreophila Nutt. I. 538.
— *apargioides* Don. VI. 335. no. 19.
— *Brasiliensis* Gardn. VI. 336. no. 24.
— *Meyeniana* Wlprs. VI. 336. no. 23.
— myrtifolia Nutt. *I. 538. no. 1.
— *odorata* Poepp. et Endl. VI. 337. no. 25.
— *picroides* Don. VI. 335. no. 19.
— *sessiliflora* Don. VI. 334. no. 16.
— *taraxacoides* Don. VI. 333. no. 13.
— *taraxacoides* Meyen et Wlprs. VI. 336. no. 22.
— *tenuifolia* Don. VI. 333. no. 14.
Oreoselinum Capense Eckl. et Zeyh. II. 411. no. 20.
— *Chabraei* M. Bieb. V. 880. no. 2.
— *uliginosum* Eckl. et Zeyh. II. 410. no. 19.
Oreoseris DC. *II. 680.
Oreoseris DC. VI. 315.
— *lanuginosa* DC. VI. 315. no. 6.
— *nivea* DC. VI. 315. no. 8.
— *pusilla* DC. VI. 315. no. 7.
Oresitrophe Bnge. II. 372. V. 828.
— rupifraga Bnge. *II. 372. no. 1. V. 828. no. 1.
Oriastrum Poepp. et Endl. II. 681. °VI. 319.
— pusillum Poepp. et Endl. *II. 681. no. 1. VI. 319. no. 1.

Oriba Adans. I. 20.
Origaneae Endl. III. 687. III. 981. VI. 670.
Origanum Linn. III. 693. °III. 982. VI. 671.
— *acinifolium* Wallrth. III. 696. no. 2.
— *Aegyptiacum* Auct. III. 696. no. 3.
— *Benghalense* Burm. III. 577. no. 2.
— *calcaratum* Juss. III. 693. no. 2.
— *clinopodioides* Walt. III. 689. no. 1.
— compactum Bth. III. 693. no. 2.
— *Creticum* Linn. III. 694. no. 3. β.
— *Creticum* Sieb. III. 694. no. 5.
— *Dictamnus* Linn. III. 692. no. 1.
— *flexuosum* Walt. III. 691. no. 12.
— *glandulosum* Dsf. III. 694. no. 5.
— *glandulosum* Slzm. III. 693. no. 2.
— *Heracleoticum* Hort. III. 696. no. 2.
— Heracleoticum Linn. III. 694. no. 5.
β. humile.
— *Heracleoticum* Rchb. III. 694. no. 3. β.
— *hirtum* Lnk. III. 694. no. 3. β.
— *humile* Poir. III. 694. no. 3. γ.
— *hybridum* Mill. III. 693. no. 1.
— *incanum* Walt. III. 689. no. 1. et 4.
— *Indicum* Rth. III. 578. no. 7.
— *Indicum Zatarhendi* Alp. et Vesl. III. 696. no. 4.
— *latifolium* Mill. III. 694. no. 3. β.
— laxiflorum Royle. III. 694. no. 6.
— Libanoticum Boiss. III. 946.
— *macrostachyum* Lnk. III. 694. no. 3. β.
— *Majorana* Linn. III. 696. no. 2.
— *majoranoides* Willd. III. 696. no. 2.
— Majoricum Cambess. III. 695. no. 7.
— *Maru* Linn. III. 696. no. 3.
— *Maru* Sibthrp. et Sm. III. 696. no. 1.
— *megastachyum* Lnk. III. 694. no. 3. β.
— *microphyllum* Sieb. III. 696. no. 1.
— normale D. Don. III. 694. no. 4.
— *oblongatum* Lnk. III. 694. no. 3. δ.
— *Onites* Lam. III. 696. no. 2.
— *Onites* Linn. III. 696. no. 5.
— *Onites* Willd. III. 697. no. 8.
— *orientale* Mill. III. 694. no. 3.
— *pallidum* Dsf. III. 696. no. 5.
— *parviflorum* d'Urv. III. 694. no. 5. β.
— punctatum Poir. III. 695. no. 8. (c. var. β. ibid.)
— salvifolium Rth. *III. 695. no. 10.
— scabrum Boiss. et Heldr. VI. 671. no. 1.
— Sipyleum Linn. III. 693. no. 1.
— *Smyrnaeum* Linn. III. 696. no. 5.
— *Smyrnaeum* Sm. III. 694. no. 5.
— *stoloniferum* Bess. III. 694. no. 3.
— *Syriacum* Linn. III. 696. no. 4.
— *thymiflorum* Rchb. III. 694. no. 3. δ.
— *Tournefortii* Ait. III. 692. no. 2.
Origanum vestitum Clarke. III. 695. no. 9.
— *vulgare* Fl. Dan. III. 591. no. 13. β.
— vulgare Linn. III. 693. no. 3.
γ. humile } Bth. III. 694.
β. prismaticum } Bth. III. 694.
δ. virens } Bth. III. 694.
— *vulgare* β. Rchb. III. 694. no. 3. δ.
— *Wallichianum* Bth. III. 696. no. 2.
Orimaria Raf. II. 398.
— filiformis Raf. II. 398. no. 1.
Orithrophium Kth. II. 571.
Orlaya Hffm. *II. 419. V. 899.
— intermedia Boiss. V. 899. no. 1.
Orleya A. Cunn. I. 436.
— xanthoxyla A. Cunn. *I. 436. no. 1.
Ormenis Cass. *II. 634.
Ormiscus DC. I. 191.
— amplexicaulis Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 12.
— pinnatus Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 15.
— pusillus Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 13.
— tenuisiliqua Eckl. et Zeyh. I. 191. no. 14.
Ormocarpum Palis. I. 725. II. 888.
— coccineum G. Don. II. 888. no. 3.
— coronilloides G. Don. II. 888. no. 1.
— elegans G. Don. II. 888. no. 2.
— sennoides DC. *I. 725. no. 1.
Ormosciadium Boiss. °V. 923.
— Aucheri Boiss. V. 924. no. 1.
Ormosia Jack. I. 807. V. 549.
— acuta Vogel. I. 807. no. 2.
— fastigiata Tulasne. V. 549. no. 2.
— glauca Wall. I. 807. no. 1.
— macrophylla Bth. I. 807. no. 5.
— minor Vogel. I. 807. no. 3.
— nitida Vogel. I. 807. no. 4.
— nobilis Tulasne. V. 549. no. 1.
— *robusta* Wght. I. 806. †
Ormosolenia Tausch. II. 417.
— Cretica Tausch. *II. 417. no. 1.
Ornithopodioides Jaub. et Spach. II. 844.
Ornithopus L. *I. 724.
— *coriandrinus* Hochst. et Steud. I. 724. no. 1. V. 519. no. 1.
Ornitropha merularia Commers. I. 250. no. 3.
Ornitrophe aporetica Rxb. I. 414. no. 5. β.
— *pinnata* Poir. I. 416. no. 1.
— *serrata* Rxb. I. 414. no. 5.
— *villosa* Rxb. V. 362. no. 2.
Orobanche Linn. III. 464. °III. 974. VI. 655.
Orobanche Linn. (ex p.) III. 480.
— *acaulis* Rxb. III. 481. no. 4.
— adenostemon Rchb. III. 468. adn. no. 1.
— *Aeginetia* Linn. III. 481. no. 1.
— *Aegyptiaca* Pers. III. 463. no. 28.
— *alba* Rchb. III. 466. no. 13.

Orobanche alba Stephan. III. 475. no. 57.
— *Alectra* D. Dietr. III. 390. no. 2.
— *Alsatica* F. W. Schultz. VI. 655. no. 1.
— *Americana* Linn. III. 464. no. 1.
— *amethystea* Maly. VI. 656. no. 3.
— amethystea Thuill. III. 473. no. 4.
— ammophila C. A. Mey. III. 474. no. 48
— amoena C. A. Meyer. III. 475. no. 55.
— angustisepala F. W. Schultz. III. 466. no. 9.
— *annulata* Griseb. III. 464. no. 1. β.
— apiculata Wllrth. III. 468. no. 19.
— arcuata F. W. Schultz. III. 472. no. 34.
— *arenaria* Borkhausen. III. 459. no. 9.
— arenaria M. Bieb. III. 475. no. 56.
— *Artemisiae campestris* Gaud. III. 470. no. 28.
— *arvensis* Dumort. III. 473. no. 39.
— Avellanae Pfund. III. 469. no. 23.
— *barbata* Broter. III. 475. no. 53.
— *barbata* Poir. III. 473. no. 40.
— Bartlingii Griseb. III. 467. no. 14.
— bicolor C. A. Meyer. III. 476. no. 60.
— *biflora* Nutt. III. 480. no. 1.
— Bipontina F. W. Schultz. III. 469. no. 21.
— borealis Turcz. III. 474. no. 49.
— brachysepala F. W. Schultz. VI. 655. no. 1.
— bracteata Vivian. III. 475. no. 52.
— *Brasiliensis* Vellozo. VI. 739. no. 6.
— breviflora F. W. Schultz. III. 465. no. 4.
— Bueckii Alb. Dietr. III. 470. adn.
— *Bueckii* Alb. Dietr. III. 470. no. 24.
— *buglossoides, radice rotunda etc.* Moris. III. 436. no. 1.
— *caesia* Rchb. III. 458. no. 1. III. 461. no. 14.
— *Californica* Cham. et Schlchtd. III. 463. no. 25.
— *Calotropidis* Edgwrth. III. 462. no. 24.
— canescens Bnge. III. 476. no. 61.
— *Capensis* Thnbrg. III. 390. no. 2.
— Caroliniana Walter. *III. 438.
— Carotae Moulins. III. 472. no. 38.
— *caryophyllacea* Rchb. III. 469. no. 21.
— *caryophyllacea* Schultz. III. 464. no. 1.
— *caryophyllacea* Sm. III. 469. no. 21.
— *caryophyllata* Vivian. III. 464. no. 1.
— *caule ramoso, floribus distantibus* Clayt. III. 457. no. 1.
— *caule simplici etc.* Loeffl. III. 476. no. 59.
— *caule simplicissimo, supra florifero* Gmelin. III. 458. no. 1.
— *caule simplicissimo ultra dimidium florifero* Gmel. III. 479. no. 1.
— cernua Linn. III. 476. no. 59.
— *cernua* Pall. III. 458. no. 3. III. 476. no. 60.
Orobanche Cervariae Suard. VI. 655. no. 1.
— citrina Alb. Dietr. III. 469. adn. no. 6.
— *coccinea* M. Bieb. III. 481. no. 4.
— *coerulea* Friv. III. 473. no. 43.
— *coerulea* Vill. III. 458. no. 3.
— coerulescens Stephan. III. 474. no. 46.
— colorata C. Koch. III. 474. no. 47.
— *comosa* Hook. III. 480. no. 2.
— *comosa* Wallrth. III. 460. no. 9.
— *compacta* Viviani. III. 461. no. 15.
— concolor Duby. III. 466. no. 10.
— condensata Moris. III. 466. no. 12.
— crassistyla F. W. Schultz. III. 467. no. 15.
— crenata Forsk. III. 477. no. 67.
— *Cretica procerior non ramosa etc.* Tournefort. III. 475. no. 56.
— crinita Viviani. III. 477. no. 66.
— cruenta Bertol. III. 464. no. 1.
β. leiostemon Griseb.
— *Cumana* Wallrth. III. 475. no. 56.
— curviflora Viviani. III. 473. no. 44.
— *Cytisi* Duby. III. 474. no. 50.
— *Delilei* Dcne. III. 459. no. 8.
— diaphana F. W. Schultz. III. 468. no. 20.
— *elatior* Flügge. III. 475. no. 51.
— *elatior* Koch et Ziz. III. 470. no. 24.
— *elatior* Schleich. III. 470. no. 28.
— *elatior* Sutton. III. 470. no. 24.
— *elatior β. microglossa* Wllrth. III. 473. no. 41.
— epithymum DC. III. 467. no. 17.
β. rubiginosa Wlprs.
— *Eryngii* Duby. III. 473. no. 41.
— *fasciculata* Nutt. III. 480. no. 3.
— ferruginea C. Koch. III. 474. no. 45.
— flava Martius. III. 471. no. 32.
— *flore obsoleto majore* Moris. III. 458. no. 3.
— *Fluminensis* Vellozo. VI. 739. no. 4.
— *foetida* DC. III. 474. no. 50.
— foetida Dsf. III. 475. no. 53.
— *fŏetida* Lapeyr. III. 475. no. 51.
— *Fraasii* F. W. Schultz. III. 460. no. 12.
— fragrans Koch. III. 473. no. 43.
— *fusca* Lam. III. 475. no. 53.
— Galii Duby. III. 468. no. 21.
— Gallica Grénier. III. 471. no. 29.
— gilva Alb. Dietr. III. 469. adn. no. 5.
— *glabra* Hook. III. 478. no. 1.
— glabrata C. A. Meyer. III. 469. no. 22.
— *gracilis* Sm. III. 464. no. 1.
— *grandiflora* Bory et Chaub. III. 465. no. 8.
— grandisepala F. W. Schultz. III. 470. no. 25.
— Grénieri C. H. Schultz. VI. 746.

Orobanche Hederae Vauch. III. 473. no. 40.
— Hispanica Boiss. III. 473. no. 42.
— *Indica* Rxb. III. 460. no. 11.
— *interrupta* Pers. III. 459. no. 7.
— Klugei Schmitz et Regel. III. 472. no. 35.
— Kochii F. W. Schultz. VI. 656. no. 3.
— Krausei Alb. Dietr. III. 468. adn. no. 2.
— *lactea* Eckl. et Zeyh. VI. 650. no. 5.
— *laevis* Ehrh. III. 460. no. 9.
— *laevis* Lam. III. 458. no. 3.
— *laxiflora* Rchb. III. 469. no. 21.
— leucantha Griseb. III. 466. no. 13.
— lilacina F. W. Schultz. III. 470. no. 27.
— *longiflora* Pers. III. 458. no. 4.
— loricata Rchb. III. 470. no. 28.
— *loricata* Rchb. III. 472. no. 33.
— lucorum Alex. Braun. III. 471. no. 33.
β. Rubi Alex. Braun. III. 472. no. 33.
— *Ludowiciana* Nutt. III. 461. no. 16.
— *lutea* Baumg. III. 470. no. 24.
— Lycica F. W. Schultz. III. 467. no. 18.
— macrantha Alb. Dietr. III. 468. adn. no. 3.
— macrosepala F. W. Schultz. VI. 655. no. 2.
— *major* Bulliard. III. 470. no. 28.
— *major* DC. III. 465. no. 5.
— *major* Lngsdrff. III. 475. no. 53.
— *major* Pollich. III. 469. no. 21.
— *major* Wolf. III. 467. no. 17.
— *major flore cucullato foetidissimo* Tournefort. III. 475. no. 53.
— *major thyrso florum specioso* Buxb. III. 476. no. 57.
— media Dsf. III. 476. no. 58.
— *Medicaginis* F. W. Schultz. III. 470. no. 24.
— *minor* Flor. Dan. III. 477. no. 65.
— minor Sutton. III. 472. no. 39.
— *minor Virginiana lignosior etc.* Moris. III. 457. no. 1.
— *montana* Rudb. III. 479. no. 1.
— *mutila* Dumort. III. 469. no. 21.
— *nuda* Koch. III. 467. no. 17.
— nudiflora Wllrth. III. 476. no. 65.
— *pallidiflora* Wimm. et Grabowsky. III. 466. no. 11.
— *paradoxa* Koch. III. 467. no. 17.
— *parviflora* E. Mey. VI. 650. no. 1.
— parviloba F. W. Schultz. III. 472. no. 36.
— *pedunculata* Rxb. III. 481. no. 2.
— *pedunculata* Viviani. III. 459. no. 6.
— *Phelipaea* M. Bieb. III. 481. no. 4.
— *Phelypaea* Wllrth. III. 462. no. 23.
— *Phelypaea* Willd. III. 462. no. 22.
— Picridis F. W. Schultz. III. 471. no. 30.
— platystigma Rchb. III. 476. no. 64.
— *pratensis* Eckl. et Zeyh. VI. 650. no. 2.
— procera Koch. III. 465. no. 7.
Orobanche pruinosa Lapeyr. III. 465. no. 8.
— punctata F. W. Schultz. III. 467. no. 16.
— *purpurascens* Gmel. III. 458. no. 3.
— *purpurea* Jcq. III. 458. no. 3.
— purpurea Linn. III. 477. no. 68.
— *ramosa* Delile. III. 459. no. 8.
— *ramosa* Linn. III. 459. no. 7.
— rapum Thuill. III. 465. no. 5.
— reticulata Wllrth. III. 474. no. 51.
— rigens Loisel. III. 476. no. 62.
— *rigens* Loisel. III. 477. no. 65.
— *robusta* Alb. Dietr. III. 460. no. 10.
— *Rossica* Cham. et Schlchtd. III. 479. no. 1.
— rubens Wllrth. III. 469. no. 24.
— *Rubi* Duby. III. 472. no. 33. *β*.
— *rubiginosa* Alb. Dietr. III. 467. no. 17. *β*.
— *rubra* Sm. III. 467. no. 17.
— Salviae F. W. Schultz. III. 472. no. 37.
— sanguinea Prsl. III. 476. no. 63.
— Scabiosae Koch. III. 466. no. 10.
— *secunda* Clus. III. 458. no. 3.
— sordida C. A. Meyer. III. 475. no. 54.
— *sparsiflora* Wllrth. III. 467. no. 17.
— speciosa DC. III. 466. no. 11.
— *spectabilis* E. Mey. VI. 650. no. 4.
— Spruneri F. W. Schultz. III. 464. no. 3.
— *squamosa* Thnbrg. III. 390. no. 1.
— *stigmatodes* Koch. VI. 656. no. 3.
— stigmatodes Wimmer. III. 471. no. 31. VI. 656. no. 4.
— *strobiligena* Rchb. III. 469. no. 2.
— subverticillata F. W. Schultz. III. 470. no. 26.
— *tertia polychonos* Clus. III. 459. no. 7.
— *tinctoria* Forsk. III. 462. no. 21.
— *tinctoria* Willd. III. 462. no. 23.
— torquata Rchb. III. 468. adn. no. 4.
— *tuberosa* Hook. III. 479. no. 2.
— *tubiflora* Alb. Dietr. III. 469. no. 21.
— *Tulbaghensis* Eckl. et Zeyh. VI. 650. no. 3.
— *Uitenhagensis* Eckl. III. 390. no. 1.
— Ulicis Moulins. III. 465. no. 6.
— *uniflora* Linn. III. 480. no. 1.
— *varia* E. Mey. VI. 650. no. 1.
— variegata Wllrth. III. 474. no. 50.
— versicolor F. W. Schultz. III. 464. no. 2.
— *violacea* Wllrth. III. 462. no. 22.
— *Virginiana* Linn. III. 457. no. 1.
— *Virginiana, radice coralloide* Moris. III. 438. no. 1.
— *vulgaris* DC. III. 469. no. 21.
— *vulgaris* Gaud. III. 464. no. 1.
OROBANCHEACEAE Lindl. VI. 655.
OROBANCHEAE L. C. Rich. III. 457. °III. 974.
OROBANCHEAE L. C. Rich. VI. 655.

Orobanchoides Endl. III. 299.
Orobella vicioides Prsl. I. 723. no. 4.
Orobus Tournef. I. 723. II. 887.
— albus Willd. I. 724. †
— atropurpureus Dsf. I. 724. †
— *atropurpureus* Fisch. I. 723. no. 4.
— aurantiacus M. B. I. 724. †
— canescens L. I. 724. †
— cyaneus Stev. I. 724. †
— *dispar* Nutt. I. 711. no. 1.
— Fischeri Sweet. I. 723. no. 4.
— hirsutus L. I. 724. †
— intermedius C. A. Mey. I. 723. no. 3.
— Jordani Ten. I. 723. no. 1.
— linifolius Wndrth. I. 723. no. 5.
— *longifolius* Nutt. I. 687. no. 28.
— luteus L. I. 724. †
— orientalis Boiss. II. 887. no. 2.
— *pellucidus* Spr. I. 683. no. 16. δ.
— Persicus Boiss. II. 887. no. 3.
— roseus Ldb. *II. 887. no. 1.
— subvillosus C. A. Mey. I. 723. no. 2.
— variegatus Ten. I. 724. †
Orollanthus suavis E. Mey. III. 521. no. 1.
Orontium arvense Pers. III. 225. no. 11.
— *Asarina* Pers. III. 221. no. 1.
— *majus* Pers. III. 223. no. 6.
— *saxatile Thymi folio, flore rubello* Barrel. III. 189. no. 3. γ. VI. 637. no. 4.
— *Siculum* β. *tortuosum* Pers. III. 224. no. 7.
— *supinum* Villem. III. 210. no. 76.
Orophaca Torr et Gr. I. 689.
Orophea Blume. I. 74. (I. 73. adn.)
— acuminata DC. I. 74. no. 4.
— enneandra Blume. I. 74. no. 2.
— *enneandra* Blume. I. 73. no. 3.
— hexandra Blume. I. 74. no. 1.
— *hexandra* Blume. I. 73. no. 1.
— polycarpa DC. I. 74. no. 3.
Orostachys Fisch. V. 794. no. 7.
Orphium E. Mey. *VI. 499.
— frutescens E. Mey. VI. 743.
Orsinia Bertol. *II. 545.
Ortegia Loefl. *I. 263.
Orthanthera Wght. *6. 493.
Orthipomaea Choisy. VI. 532.
Orthocarpaea (Helicteres) DC. I. 332.
Orthocarpus Nutt. III. 392. °III. 971. *VI. 651.
— castillejoides Bth. III. 393. no. 14.
— bracteosus Bth. III. 393. no. 12.
— densiflorus Bth. III. 392. no. 6.
— erianthus Bth. III. 392. no. 4.
— floribundus Bth. III. 392. no. 3.
— gracilis Bth. III. 392. no. 2.
— hispidus Bth. III. 392. no. 9.
Orthocarpus lithospermoides Bth. III. 293. no. 13.
— luteus Nutt. III. 393. no. 11.
— purpurascens Bth. III. 392. no. 8.
— pusillus Bth. III. 392. no. 1.
— strictus Bth. III. 392. no. 10.
—? tenuifolius Bth. III. 392. no. 5.
— Tolmici Hook. et Arn. III. 392. no. 7.
Orthocaulis Dcne. (Echites) VI. 476. no. 7.
Orthocaulos Choisy. VI. 536.
Orthocentrum DC. VI. 307. no. 12.
Orthoctenium Wallrth. II. 37.
Orthodanum E. Mey. I. 784. V. 539.
— argenteum E. Mey. I. 784. no. 3. V. 539. no. 1.
— latifolium E. Mey. I. 784. no. 1.
— Mühlenbeckii Meisn. V. 540. no. 2.
— sordidum E. Mey. I. 784. no. 2.
Ortholeucas Bth. III. 869.
Ortholoma Bth. VI. 404. 738.
Orthomeris (Aster) Torr. et Gr. II. 571.
Orthonepeta Bth. III. 788.
Orthoploceae DC. I. 184. V. 49.
Orthopodium Bth. III. 902.
Orthorrhyncha Wllrth. (Xanthium) VI. 150.
Orthoselis DC. (ex p.) I. 191.
Orthosepalae Wllrth. (Agrimonia) II. 38.
Orthosia Dcne. *VI. 485.
Orthosiphon Bth. III. 498. °III. 977.
— capitatus Bth. III. 500. no 9.
— glabratus Bth. III. 499. no. 6.
— incurvus Bth. III. 500. no. 7.
— pallidus Royle. III. 499. no. 5.
— rubicundus Bth. III. 498. no. 1.
β. canescens.
α. mollissimus.
γ. rigidus III. 499. no. 1.
— scapiger Bth. III. 500. no. 8.
— stamineus Bth. III. 500. no. 9.
— tomentosus Bth. III. 499. no. 4.
— virgatus Bth. III. 499. no. 2.
— viscosus Bth. III. 499. no. 3.
Orthospermeae DC. II. 381. V. 838.
Orthostachys (Heliotropium) DC. VI. 557. no. 3.
Orthostemon R. Br. *VI. 502.
Orthotropis Bth. I. 567.
— pungens Bth. *I. 567. no. 1.
Orvala Linn. III. 801.
— *Garganica* Linn. III. 801. no. 1. β.
— *lamioides* DC. III. 801. no. 1.
Orychophragmus Bnge. I. 187.
— sonchifolius Bnge. *I. 187. no. 1.
Orygia Forsk. II. 239. V. 788.
— decumbens Forsk. *II. 239. no. I. V. 788. no. 1.

Os leonis Caesalp. III. 223. no. 6.
Osbeckia DC. (ex p.) II. 137. V. 708.
Osbeckia Linn. II. 135. II. 918. V. 708.
— augustifolia Don. II. 137. †.
— aspera Blume. *II. 136. no. 9. V. 708. †
— buxifolia Arn. II. 136. no. 10.
— canescens Grah. II. 137. no. 17.
— *capitata* Don. II. 135. no. 3.
— Chinensis Linn. *II. 918. no. 1.
— *coronata* Don. II. 135. no. 2.
— cupularis Don. II. 136. no. 5.
— *glauca* Bth. II. 136. no. 6.
— *inappendiculata* Don. II. 135. no. 4.
— incana E. Mey. V. 708. no. 2.
— Kleinii Arn. II. 136. no. 12.
— linearis Blume. *II. 135. no. 1.
— maritima St. Hil. II. 137. no. 16.
— Nepalensis Hook. II. 137. †
— *oleaefolia* DC. II. 130. †
— parvifolia Arn. II. 136. no. 9.
— phaeotricha Hochst. V. 708. no. 1.
— *pityrophylla* DC. II. 119. no. 1.
— Royeni Blume. II. 136. no. 7.
— rubicunda Arn. II. 136. no. 11.
— Senegambiensis Guill. et Perr. II. 137. no. 15.
— ternifolia Ham. II. 137. †
— truncata Arn. II. 136. no. 8.
— truncata Don. II. 135. no. 2. V. 708. †
— *Umlaasiana* Hochst. V. 708. no. 2.
— virgata Don. II. 135. no. 4. V. 708. †
— Walkeri Arn. II. 137. no. 14.
— Wightiana Bth. II. 135. no. 3.
— *Wightiana* Bth.? II. 136. no. 5.
Osbeckieae DC. II. 128. V. 700.
Oscillatoriae Calanthae (ex p.) DC. II. 443.
— *micranthae* (ex p.) DC. II. 443.
Osmadenia Nutt. II. 633. *VI. 185.
Osmadenia Nutt. VI. 184.
— tenella Nutt. *II. 633. no. 1.
— *tenella* Nutt. II. 990. no. 1. VI. 184. no. 5.
Osmanthus Loureiro. *VI. 461.
Osmites Cass. *II. 650.
Osmitopsis Cass. *II. 650.
Osmorhiza Raf. II. 423.
— *Berterii* DC. II. 423. no. 3.
— brevistylis DC. II. 423. no. 2.
— Chilensis Hook. II. 423. no. 3.
— ? laxa Royle. II. 423. no. 4.
— longistylis DC. II. 423. no. 1.
Osmothamnus DC. *II. 729.
Osprolcon (Orobanche) Nutt. VI. 746.
Ossaea DC. *II. 143.
Osteomoles Lindl. *II. 54.
Osteospermeae DC. II. 665. VI. 273.
Osteospermum Linn. *II. 665. VI. 273.
— corymbosum Linn. *VI. 273. no. 1.
γ. lasiocaulon DC.
— *glandulosum* Spr. VI. 273. no. 1. γ.
— grandidentatum DC. *VI. 273. no. 2.
β. Natalense.
— *lanatum* Spr. VI. 273. no. 1.
Ostericum verticillare Rchb. V. 881. no. 1.
Osteriscium Hffm. * II. 406.
Οσύρις Dioscorid. III. 203. no. 54.
Osyris Plin. III. 203. no. 54.
— *alba* Lobel. III. 209. no. 72.
— *flava sylvestris* Lob. III. 214. no. 87.
— *linaria* Trag. III. 203. no. 54.
— *minor* Tabern. III. 214. no. 87.
— *purpureo-coerulea repens* Lob. III. 216. no. 89.
Otanthera Blume. II. 135. V. 707.
— bracteata Korthls. V. 707. no. 1.
— Moluccana Blume. *II. 135. no. 1. V. 708. no. 2.
Oteiza Blackw. *II. 702. no. 6.
Othonna Lssng. II. 665.
Othonna Linn. II. 665. VI. 274.
— acutiloba C. H. Schultz. *VI. 274. no. 2.
— alata C. H. Schultz. *VI. 274. no. 7.
— arbuscula C. H. Schultz. *VI. 274. no. 9.
— campanulata C. H. Schultz. *VI. 274. no. 23.
— chromochaeta C. H. Schultz. *VI. 274. no. 1.
— cluytiaefolia C. H. Schultz. *VI. 274. no. 5.
— cneorifolia C. H. Schultz. *VI. 274. no. 4.
— coronopifolia Linn. *VI. 275. no. 27.
β. fasciculata C. H. Schultz.
— digitata Linn. fil. *VI. 274. no. 11.
— diversifolia C. H. Schultz. *VI. 274. no. 19.
— eriocarpa C. H. Schultz. *VI. 274. no. 14.
— frutescens L. *II. 665. no. 1.
— gymnodiscus C. H. Schultz. *VI. 274. no. 25.
— Kraussii C. H. Schultz. VI. 274. no. 26.
— lasiocarpa C. H. Schultz. *VI. 274. no. 3.
— Laureola C. H. Schultz. *VI. 274. no. 17.
— linearifolia C. H. Schultz. *VI. 274. no. 15.
— Lingua C. H. Schultz. *VI. 274. no. 16.
— nana C. H. Schultz. *VI. 274. no. 8.
— Natalensis C. H. Schultz. VI. 275. no. 28.
— nodulosa C. H. Schultz. *VI. 274. no. 21.
— ramosa C. H. Schultz. *VI. 274. no. 18.
— retrofracta Jcq. *VI. 274. no. 16.
— rhamnoides C. H. Schultz. *VI. 274. no. 6.
— perfoliata C. H. Schultz. *VI. 274. no. 20.
— pinnatilobata C. H. Schultz. *VI. 274. no. 12.

Othonna semicalva C. H. Schultz. * VI. 274. no. 24.
— taraxacoides C. H. Schultz. * VI. 274. no. 13.
— tortuosa C. H. Schultz. * VI. 274. no. 22.
Othonneae Lssng. II. 665. VI. 274.
Otidia Lindl. I. 454.
— Burmanniana Eckl. et Zeyh. *I. 454. no. 56.
— corallina Eckl. et Zeyh. *I. 454. no. 57.
— microphylla Eckl. et Zeyh. I. 455. no. 58.
Otiophora Zucc. II. 468. VI. 34.
— scabra Zucc. *II. 468. no. 1. VI. 34. no. 1.
Otites Otth. I. 276. no. 50. I. 278. no. 66. II. 779.
Otochlamys DC. *II. 638.
Otondandra H. B. Kth. I. 435.
— acuminata H. B. Kth. *I. 435. no. 1.
Otopappus C. H. Schultz. VI. 199.
Otophylla Bth. III. 382.
Otophylla Bth. * VI. 649.
Otostegia Bth. III. 867. °III. 989. VI. 683.
— Aucheri Boiss. III. 868. no. 2.
— integrifolia Bth. III. 868. no. 3.
— Kotschyi Boiss. VI. 683. no. 1.
— microphylla Boiss. III. 867. no. 1.
— repanda Bth. III. 868. no. 5.
— scariosa Bth. III. 868. no. 4.
Ototropis Bth. I. 660.
Ototropis N. a. E. I. 736.
— microphylla Bth. *I. 660. no. 1.
— *rufescens* N. a. E. I. 736. no. 2.
— *Sambuensis* N. a. E. I. 736. no. 1.
Ottoa H. B. Kth. *II. 399.
Oudneya R. Br. I. 125.
— Africana R. Br. *I. 125. no. 1.
Ourisia Commers. III. 373. °III. 969. VI. 648.
Ourisia Commers. III. 373.
— alpina Poepp. et Endl. III. 374. no. 6.
— *antarctica* Hook. fil. VI. 648. no. 1.
— breviflora Bth. * VI. 648. no. 1.
— coccinea Pers. III. 374. no. 4.
— integrifolia R. Br. III. 374. no. 3.
— macrophylla Hook. III. 373. no. 2.
— Magellanica Grtnr. fil. III. 373. no. 1.
— microphylla Poepp. et Endl. III. 374. no. 7.
— pallens Poepp. et Endl. III. 374. no. 5.
— pinnata Wall. III. 375. no. 9.
— polyantha Poepp. et Endl. III. 375. no. 8.
Oustropis microphyllus G. Don. I. 660. no. 1.
Outea Aubl. I. 845. V. 570.
— acaciaefolia Bth. I. 845. no. 1.
— racemigera Tulasne. V. 570. no. 1.
Outreya Jaub. et Spach. ° VI. 289.
— carduiformis Jaub. et Spach. VI. 289. no. 1. β. subacaulis.
Ovatifoliae (Salvia) Bth. III. 634.
Ovieda mitis Burm. IV. 103. no. 5.
— *ovalifolia* Juss. IV. 105. no. 19.
— *spinosa* Linn. IV. 110. no. 51.
— *verticillata* Rxb. IV. 103. no. 7.
OXALIDEAE DC. I. 476. II. 821. V. 383.
Oxalis DC. V. 383.
Oxalis Linn. I. 476. II. 821. V. 383.
— adenophylla Gill. I. 484. no. 95.
— adspersa Eckl. et Zeyh. I. 480. no. 43.
— aganophylla Eckl. et Zeyh. I. 477. no. 14.
— alata Mart. et Zucc. *I. 484. no. 100.
— alba Sweet. I. 481. no. 52.
— albicans H. B. Kth. *I. 486. no. 118.
— Algoënsis Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 24.
— *aliena* DC. I. 484. no. 99.
— *aliena* Spr. I. 484. no. 99.
— alsinoides Wlprs. V. 384. no. 3.
— amara St. Hil. I. 486. no. 115.
— *ambigua* A. Rich. I. 491. no. 182.
— Americana Bigelow. *I. 483. no. 76.
— Andicola Gill. I. 490. no. 170.
— anemonoides Eckl. et Zeyh. I. 477. no. 10.
— angustifolia H. B. Kth. *I. 488. no. 141.
— arenaria Bert. I. 484. no. 94.
— argentea Eckl. et Zeyh. I. 477. no. 12.
— articulata Savign. *I. 483. no. 80.
— *autumnalis* St. Hill. I. 480. no. 48. I. 481. no. 50.
— Barrelieri Jcq. I. 489. no. 156.
— *Barrelieri* W. Hb. I. 489. no. 157.
— bifolia Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 31.
— bipartita St. Hil. I. 481. no. 55.
— *bipunctata* Hook. I. 481. no. 57.
— Blumei Zucc. I. 476. no. 4.
— Borjensis H. B. Kth. *I. 488. no. 151.
— Bowiei Lindl. I. 492. † II. 822. no. 11.
— Brasiliensis Lodd. I. 492. †.
— Brehmiana Eckl. et Zeyh. I. 477. no. 13.
— Bridgesii Bert. I. 483. no. 82.
— pupleurifolia St. Hill. I. 490. no. 167.
— caespitosa St. Hil. I. 485. no. 103.
— *cajanifolia* St. Hil. I. 489. no. 156.
— calcarea Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 34.
— campestris Mart. et Zucc. I. 488. no. 145.
— *campestris* St. Hil. I. 488. no. 153.
— candida Eckl. et Zeyh. I. 480. no. 41.
— *canescens* Jcq. I. 477. no. 15.
— carnosa Molina. I. 487. no. 127.
— casta Mart. et Zucc. I. 491. no. 181.
— cataractae A. Cunn. I. 491. no. 183.
— ciliariflora Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 38.
— *ciliata* Spr. I. 484. no. 100.
— ciliifera A. Cunn. I. 492. no. 189.
— cineracea St. Hil. I. 484. no. 102.
— *cinerea* Zucc. I. 486. no. 122.

Oxalis cognata Steudel. V. 384. no. 7.
— collina Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 25.
— Commersonii Pers. *I. 483. no. 77.
— compacta Gill. I. 485. no. 112.
— confertissima St. Hil. I. 485. no. 108.
— conorhiza Jcq. *I. 487. no. 173
— cordata St. Hil. I. 489. no. 155.
— corniculata L. *I. 486. no. 117. V. 384. †
α. corniculata
ε. frigida
δ. lupulina
γ. Lyoni
β. repens
} Zucc. 486. no. 117.
— corymbosa DC. *I. 482. no. 69.
— crassicaulis Zucc. I. 487. no. 126.
— crassifolia A. Cunn. I. 492. no. 190.
— crassifolia Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 29.
— Cratensis Hook. I. 490. no. 175.
— crenata Jcq. *I. 487. no. 138.
— Cumingii Hook. I. 483. no. 83.
— *cytisoides* Zucc. I. 489. no. 156.
— daphnaeformis Mikan. I. 490. no. 166.
— Darvalliana Knwls. et Westsc. I. 481. no. 53.
— debilis Kth. *I. 481. no. 61.
— decaphylla H. B. Kth. *I.
— dendroides H. B. Kth. *I. 491. no. 179.
— densifolia Mart. et Zucc. I. 488. no. 153.
— Deppei Lodd. I. 492. †.
— depressa Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 26.
— discolor Kltzsch. I. 482. no. 72.
— distans St. Hil. I. 488. no. 146.
— divaricata Mart. et Zucc. I. 488. no. 143.
— divergens Bth. I. 484. no. 97. II. 821. no 6.
— divergens A. Cunn. I. 492. no. 188.
— divergens Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 28.
— dormiens Mart. et Zucc. I. 491. no. 177.
— Ehrenbergii Schlchtd. I. 482. no. 74.
— elegans Kth. *I. 482. no. 64.
— enneaphylla Cav. *I. 483. no. 88.
— eriorhiza Zucc. *I. 480. no. 48.
— *eriorhiza* Zucc. I. 481. no. 50.
— erythrorhiza Gill. I. 485. no. 113.
— euphorbioides St. Hil. I. 499. no. 144.
— exilis C. Cunn. I. 491. no. 185.
— falcata Eckl. et Zeyh. I. 480. no. 45.
— filiformis H. B. Kth. *I. 485. no. 105.
— *floribunda* B. Reg. I. 487. no. 132.
— floribunda Lehm. I. 492. no. 192.
— *floribunda* Lk. et Otto. I. 481. no. 57.
— fontana Bnge. I. 476. no. 1.
— *frutescens* L. I. 488. no. 148.
— *fruticosa* Radd. I. 490. no. 165.
— *fruticosa* Willd. I. 488. no. 151.
— *fulva* St. Hil. I. 489. no. 154.
— *gemella* Willd. I. 481. no. 61.
Oxalis geminata Hook. et Arn. I. 490. no. 173.
— *geniculata* Knwls. et Westsc. I. 481. no. 50.
— glauca H. B. Kth. *I. 488. no. 150.
— goniorhiza Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 20.
— gracilicaulis Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 27.
— Grahamiana Bth. I. 482. no. 71.
— grandifolia DC. *I. 482. no. 66.
— grisea St. Hil. et Naud. II. 821. no. 7.
— gyrorhiza Bert. I. 485. no. 110.
— Haenkeana Zucc. I. 486. no. 122.
— *hedysarifolia* Raddi? I. 489. no. 159.
— hedysaroides H. B. Kth. *I. 489. no. 157.
β. undique pubescens.
— Herdandesii DC. *I. 484. no. 92.
— heterophylla Eckl. et Zeyh. I. 480. no. 44.
— hilliifolia Hook. I. 483. no. 81.
— hirsutissima Mart. et Zucc. I. 489. no. 154.
β. monophyllos Zucc.
— *hirta* Jcq. I. 477. no. 15.
— hirtella Jcq. I. 477. no. 15.
— *hispida* Zucc. I. 488. no. 146.
— hispidula Zucc. *I. 481. no. 51.
— imbricata Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 37.
— *Impatiens* Vellozo. I. 484. no. 99.
— incana Eckl. et Zeyh. I. 477. no. 11.
— inops Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 32.
— insipida St. Hil. I. 489. no. 160.
— intermedia A. Rich. II. 821. no. 5.
— Jacquiniana Kth. *I. 481. no. 58.
— Jamaicensis Macfd. I. 486. no. 121.
— Javanica Blume. I. 476. no. 2.
— lacicola A. Cunn. I. 491. no. 187.
— laciniata Cav. *I. 483. no. 90.
— lactea Hook. I. 492. no. 191.
— lacunosa Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 36.
— lasiandra Grah. I. 484. no. 96.
— lasiopetala Zucc. I. 483. no. 79. II. 822. †
— lasiophylla St. Hil. et Naud. II. 822. no. 8.
— latifolia Kth. *I. 481. no. 60.
— laxa Hook. et Arn. I. 490. no. 174.
— leptophylla Zucc. I. 489. no. 158.
— lilacina Kltzsch. I. 482. no. 73.
— lindsaeaefolia J. Hook. V. 384. no. 8.
— linearis Zucc. I. 487. no. 140.
— lineata Gill. I. 490. no. 171.
— liniflora Eckl. et Zeyh. I. 477. no. 9.
— littoralis Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 23.
— lobata Sims. I. 481. no. 50.
— Loddigesiana Eckl. et Zeyh. *I. 478. no. 18.
— longiflora L. *I. 487. no. 136.
— *longiscapa* W. Hb. I. 487. no. 124.
— lotoides H. B. Kth. *I. 486. no. 119. V. 384. †
— *Loxensis* W. I. 482. no. 64.
— lunulata Zucc. I. 481. no. 54.

Oxalis lupulina H. B. Kth. I. 486. no. 117. δ.
— *Lyoni* Prsh. I. 486. no. 117. γ.
— *macrophylla* Dougl. I. 483. no. 81.
— *macrophylla* H. B. Kth. I. 482. no. 66.
— macrorhiza Gill. I. 485. no. 111.
— *macrostylis* Jcq. I. 477. no. 15.
— Magellanica Forst. *I. 483. no. 75.
— malloloba Cav. *I. 483. no. 87.
— *mandioccana* DC. I. 484. no. 99.
— mandioccana Raddi. *I. 484. no. 99.
— *mandioccana* St. Hil. I. 484. no. 100.
— Martiana Zucc. I. 481. no. 57. II. 822. †
— medicaginea H. B. Kth. *I. 487. no. 129.
— megalorhiza Jcq. *I. 483. no. 85.
— *melilotoides* St. Hil. I. 488. no. 145.
— mellilotoides Zucc. I. 487. no. 128.
— *micrantha* Boj. I. 486. no. 117. β.
— micrantha Bertero. I. 490. no. 169.
— microcarpa Bth. V. 384. no. 4.
— *microphylla* H. B. Kth. I. 485. no. 106.
— mimosoides St. Hil. I. 491. no. 178.
— minima Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 33.
— Mirbelii Dehnh. I. 492. no. 194.
— mollis H. B. Kth. *I. 486. no. 120.
— *monadelpha* Rxb. I. 486. no. 117.
— multicaulis Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 16.
— multiflora Jcq. I. 477. no. 15.
— myriophylla St. Hil. I. 485. no. 107.
— Neaei DC. *I. 489. no. 159.
— *nematodes* Spr. I. 485. no. 105.
— nemorosa Eckl. et Zeyh. I. 480. no. 42.
— Neuwiedii Zucc. I. 489. no. 163.
— nidulans Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 30.
— nigrescens St. Hil. I. 488. no. 142.
— *nigrescens β. linearifolia* St. Hil. I. 488. no. 140.
— nubigena Wlprs. V. 384. no. 5.
— nuda Arn. I. 476. no. 5.
— nudiflora DC. *I. 482. no. 68.
— Oregana Torr. et Gr. I. 483. no. 78.
— *Ottonis* Kltzsch. I. 481. no. 50.
— ovata Zucc. I. 484. no. 98.
— pallens Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 21.
— paludosa St. Hil. I. 485. no. 104.
— palustris St. Hil. I. 482. no. 62.
— papilionacea Hffmnsgg. I. 482. no. 67.
— parvifolia DC. *I. 485. no. 106.
— patula Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 17.
— peduncularis H. B. Kth. *I. 487. no. 124.
— pentantha Jcq. *I. 488. no. 147.
— perdicaria Bertero. I. 485. no. 109.
— phellandroides E. Mey. II. 821. no. 1.
— *pilosiuscula* H. B. Kth. I. 486. no. 117. β.
— Piottae Colla I. 492. †
— Platensis St. Hil. et Naud. II. 822. no. 9.
— platypila Gill. I. 485. no. 114.
Oxalis Plumieri Sieb. I. 489. no. 157.
— Plumieri Willd. *I. 488. no. 148.
— polyantha Wlprs. V. 383. no. 2.
β. Peruviana.
— *polymorpha* Zucc. I. 489. no. 161.
— *polymorpha* b. *dolichoides* Zucc. I. 489. no. 162.
— *polymorpha* E. *polyantha* Zucc. I. 489. no. 163.
— polyphylla Jcq. β. longifolia Meisn. II. 821. no. 3.
— polyscapa Eckl. et Zeyh. I. 477. no. 7.
— praecox Lehm. I. 492. no. 193.
— pratensis Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 22.
— Preissiana Steudel. V. 381. no. 6.
— primulaefolia Raddi. *I. 480. no. 47.
— prolifera Arn. I. 477. no. 6.
— propinqua A. Cunn. I. 491. no. 184.
— psoraleoides H. B. Kth. *I. 489. no. 164.
— *puberula* Nees et Mart. I. 489. no. 159.
— pumila d'Urv. I. 483. no. 89.
— *pusilla* Salisb. I. 486. no. 117.
— *racemosa* Savign. I. 487. no. 132.
— refracta St. Hil. I. 486. no. 116.
— Reinwardtii Zucc. I. 476. no. 3.
— *repens* Thnbrg. I. 486. no. 117. β.
— rhombeo-ovata St. Hil. I. 489. no. 161.
β. cauliflora Zucc.
γ. violascens Zucc.
— rhombifolia Jcq. *I. 487. no. 135.
— *rhombifolia* St. Hil. I. 484. no. 100.
— rosacea Jcq. *I. 477. no. 15.
— rosea Jcq. I. 487. no. 132. (c. var. β.)
— *rosea* Sims. I. 487. no. 132.
— rosulata St. Hil. I. 489. no. 162.
— rubella Jcq. I. 477. no. 15.
— rubra St. Hil. I. 483. no. 84.
— rubrocincta Lindl. II. 821. no. 4.
— rupestris St. Hil. I. 482. no. 63.
— rusciformis Mikan. *I. 490. no. 165.
— saliciformis Mikan. I. 490. no. 168.
— sarmentosa Zucc. I. 487. no. 134.
— saxatilis St. Hil. I. 488. no. 152.
— scandens H. B. Kth. *I. 487. no. 130.
— Schraderiana Kth. *I. 481. no. 59.
— *secunda* Jcq. I. 477. no. 15.
— Sellowiana Zucc. I. 481. no. 49.
— semiglauca Eckl. et Zeyh. I. 478. no. 19.
— sensitiva L. *I. 491. no. 180. V. 384. †
— *sensitiva* Zucc. I. 476. no. 3.
— *sepium* St. Hil. I. 489. no. 157.
— *sexenata* Savign. I. 483. no. 77.
— Smithiana Eckl. et Zeyh. I. 480. no. 40.
β. violacea.
— somnians Mart. et Zucc. I. 491. no. 176.
— *sphacelata* Willd. I. 488. no. 150.

Oxalis spodiophylla Wlprs. V. 383. no. 1.
β. microphylla.
— squamata Zucc. I. 486. no. 123.
— stellata Eckl. et Zeyh. I. 477. no. 8.
— stenophylla Meisn. II. 821. no. 2.
— Sternbergii Zucc. I. 484. no. 101.
— stricta L. *I. 487. no. 131.
— subacaulis Gill. I. 490. no. 172.
— subcarnosa Kltzsch. II. 822. no. 10.
— *tenella* Lodd. I. 478. no. 23.
— *tenera* Lindl. I. 481. no. 50.
— tenuicaulis Cunn. I. 491. no. 186.
— *tenuifolia* Lodd. I. 478. no. 18.
— tetraphylla Cav. *I. 484. no. 91.
— thermarum Eckl. et Zeyh. I. 479. no. 35.
— tortuosa Lindl. I. 487. no. 133.
— triangularis St. Hil. I. 482. no. 65.
— tristis Eckl. et Zeyh. I. 480. no. 39.
— tuberosa Molina. I. 487. no. 125.
— *tubiflora* Jcq. I. 477. no. 15.
— umbraticola St. Hil. I. 488. no. 149.
— *umbrosa* Willd. I. 482. no. 66.
— *urbica* St. Hil. I. 481. no. 57.
— Urvillei A. Cunn. I. 491. no. 182.
— verticillata DC. *I. 487. no. 139.
— vespertilionis Torr. et Gr. I. 482. no. 70.
— *villosa* M. Bieb. I. 486. no. 117. γ.
— violacea L. *I. 481. no. 56.
— virgosa Molina. *I. 483. no. 86.
— *zonata* Dumort. I. 484. no. 91.
Oxandra A. Rich. II. 747.
— virgata A. Rich. *II. 747. no. 1.
Oxera Labill. *VI. 655.
Oxyanthus DC. *II. 520. VI. 76.
— multiflorus Hsskrl. *VI. 76. no. 1.
— versicolor Linn. VI. 702. †
Oxybelia DC. VI. 239. no. 1.
Oxycedri Schauer. (Leptospermum) II. 168.
Oxycoccos Pers. *II. 724.
Oxydendrum DC. *II. 727.
Oxydium (Lotononis) Bth. V. 457.
Oxydium Bennet. I. 747.
— oxalidifolium Bennet. *I. 747. no. 1.
Oxydon Lssng. *II. 681.
Oxygraphis Bnge. I. 46.
— glacialis Bnge. *I. 46. no. 1.
Oxylepis Bth. II. 626. °VI. 175.
— lanata Bth. *II. 626. no. 1. VI. 175. no. 1.
Oxylobium Andr. I. 566. II. 832. V. 423.
— *angustifolium* A. Cunn. I. 566. no. 1.
— batillum Hook. V. 424. no. 6.
— capitatum Bth. I. 566. no. 5. *II. 832. no. 1. *V. 423. no. 1.
β. ternifolium Bth. V. 423. no. 1.
— cuneatum Bth. I. 566. no. 7.
— *cuneatum* Bth. V. 423. no. 3.
Oxylobium dilatatum Bth. I. 567. no. 9. *V. 423. no. 2.
β. trilobum Bth. V. 423. no. 2.
— *dilatatum* Cunn. I. 574. no. 1.
— Drummondii Meisn. V. 424. no. 8.
— ellipticum R. Br. I. 567. †
— obovatum Bth. I. 567. no. 8. *V. 423. no. 3.
α. latifolium } Meisn. V. 423. no. 3.
β. angustatum } Meisn. V. 423. no. 3.
— obtusifolium Sweet. I. 566. no. 1.
— ovalifolium Meisn. V. 424. no. 4.
— parviflorum Bth. I. 566. no. 6.
—? *Pulteneae* DC. I. 566. no. 1.
— reticulatum Meisn. V. 424. no. 5.
— scandens Bth. *I. 566. no. 3.
—? sericeum Bth. *I. 566. no. 2.
— spectabile Endl. I. 566. no. 4.
— tricuspidatum Meisn. V. 424. no. 7.
Oxymeris DC. II. 147. II. 918. V. 722.
— cuneata Mart. II. 147. no. 2.
— ciliata Mart. II. 147. no. 3.
— macrophylla Bth. V. 722. no. 1.
— quinquenodis DC. *II. 147. no. 1.
— velutina Gardn. II. 918. no. 1.
Oxymitus Prsl. °VI. 515.
— argylioides Prsl. VI. 515. no. 1.
Oxymyrrhine Schauer. II. 922. *V. 736.
— gracilis Schauer. *II. 922. no. 1. *V. 736. no. 1.
Oxynepeta Bth. III. 788. VI. 677. no. 6.
Oxyodon Lssng. *VI. 320.
Oxypappus Bth. °VI. 178.
Oxypappus DC. VI. 177.
— scaber Bth. VI. 178. no. 1.
Oxypetalae Dcne. VI. 488.
Oxypetalum R. Br. VI. 488.
— coeruleum Dcne. *VI. 488. no. 1.
Oxyphlomis Bth. III. 884. VI. 683. no. 1.
Oxyramphis Wall. I. 672.*)
— macrostyla Wall. *I. 672. no. 1.
Oxyspermum asperum Eckl. et Zeyh. II. 462. no. 2.
Oxyspora DC. II. 127.
— paniculata DC. *II. 127. no. 1.
Oxystelma R. Br. *VI. 485.
Oxytona Bernh. I. 111.
Oxytripolium Torr. et Gr. II. 573.
Oxytropis DC. I. 690. II. 861. V. 517.
— aciphylla C. A. Mey. I. 691. no. 12.
— *alpicola* Turcz. II. 862. no. 11.
— *alpina* Bnge. II. 862. no. 11. γ.
— amoena Kar. et Kir. I. 691. no. 18.
— *ambigua* DC. II. 862. no. 11.
— ammophila Turcz. I. 692. no. 23.

*) Rectius legitur Oxyrhamphis.

Oxytropis approximata Less. I. 693. no. 33.
— *approximata* Lssng. II. 862. no. 9. δ.
— *arctica* R. Br. II. 862. no. 11. δ.
— argentata DC. *II. 862. no. 10.
— argyrea DC. I. 694. †
— *argyrea* DC. II. 862. no. 10. β.
— argyrophylla Ldb. I. 694. †
— *argyrophylla* Ledeb. II. 862. no. 10. β.
— Aucheri Boiss. II. 861. no. 6.
— bicolor Bnge. I. 690. no. 7.
— *borealis* DC. II. 862. no. 9. β.
— brevicaulis C. A. Mey. I. 691. no. 15.
— brevifolia Turcz. *II. 861. no. 4.
— Cachemirica Cambess. I. 691. no. 19.
— campestris DC. *I. 693. no. 34. *II. 862. no. 9.
γ. caerulea Koch. II. 862. no. 9.
δ. glabrata Hook. I. 693. no. 34.
δ. grandior Ledeb. II. 862. no. 9.
ε. melanocephala Hook. I. 693. no. 34.
β. sordida Koch. II. 862. no. 9.
β. speciosa Hook. I. 693. no. 34.
γ. spicata Hook. I. 693. no. 34.
ε. verrucosa Ledeb. II. 862. no. 9.
— *campestris var.* Cham. II. 862. no. 9. β. ε.
— *campestris γ. sulphurea* DC. II. 862. no. 10. α.
— chiliophylla Royle. I. 690. no. 8.
— chionophylla Fisch. et Mey. I. 692. no. 28.
— *chrysanthemoides* Lindl. II. 990. no. 2.
— dichroantha Fisch. et Mey. I. 693. no. 31.
— diffusa Ledeb. I. 691. no. 13.
α. elongata.
β. pumila.
— dissitiflora Ledeb. II. 862. no. 14.
— elongata Turcz. I. 692. no. 24.
— *Fischeri* DC. I. 691. no. 14.
— floribunda DC. *I. 691. no. 14.
— foliosa Hook. I. 693. no. 37.
— frigida Kar. et Kir. I. 692. no. 26.
— *glabra* DC. I. 691. no. 13.
— glandulosa Turcz. II. 861. no. 2.
— gracillima Bnge. II. 861. no. 3.
— grandiflora DC. *II. 862. no. 12.
— *grandiflora β. carnea* DC. II. 863. no. 14.
— heterotricha Turcz. II. 861. no. 1.
— hirta Bnge. I. 692. no. 20.
— Hookeriana Nutt. I. 694. no. 41.
— inaria DC. I. 694. †
— intermedia Bnge. I. 692. no. 30.
— lagopus Nutt. I. 694. no. 42.
— *Lamberti* Sims. I. 693. no. 38. γ.
— Lamberti DC. *I. 693. no. 38. (cum varr. β. γ. δ. et ε. ibid.)
— *Lambertii β. leucophylla* Nutt. I. 693. no. 38. ε.
Oxytropis leucopodia C. A. Mey. I. 691. no. 11.
— leucotriche Turcz. II. 863. no. 15.
— longebracteata Kar. et Kir. I. 692. no. 27.
— *longicuspis* Ledeb. I. 691. no. 14.
— macrocarpa Kar. et Kir. I. 692. no. 29.
— Mertensiana Turcz. I. 692. no. 25.
— mixotriche Bnge. I. 692. no. 21.
— mollis Royle. I. 693. no. 32.
— multiceps Nutt. I. 693. no. 36.
— nana Nutt. I. 694. no. 43.
— nigrescens Fisch. *I. 694. no. 44.
β. pygmaea Cham.
— nitens Turcz. II. 862. no. 13.
— ochrantha Turcz. I. 690. no. 6.
— oligantha Bnge. I. 690. no. 3.
— *oxyphylla* Richards. I. 690. no. 9. β.
— Persica Boiss. II. 861. no. 5.
— physocarpa Ledeb. I. 690. no. 1.
— Plattensis Nutt. I. 693. no. 40.
— podoloba Karel. et Kiril. I. 691. no. 17.
— polyphylla C. A. Mey. I. 691. no. 10.
— pumila DC. I. 694. †
— *pumila* Ldb. I. 690. no. 4.
— pumilio Ldb. II. 861. no. 8.
— racemosa Turcz. I. 690. no. 5.
— revoluta Ledeb. II. 861. no. 7.
— rhynchophysa Schrenk. V. 517. no. 1.
— sericea Nutt. I. 693. no. 39.
— *Soongarica* Turcz. II. 862. no. 11.
— *sordida* DC. II. 862. no. 9. β.
— splendens Dougl. I. 690. no. 9.
α. vestita Torr. et Gr..
β. Richardsonii Torr. et Gr.
— *Ssojutica* Lssng. II. 862. no. 11.
— stenophylla Bnge. I. 690. no. 4.
— subverticillaris C. A. Mey. I. 690. no. 2.
— sulphurea C. A. Mey. I. 691. no. 16.
— *sulphurea* Ldb. II. 862. no. 10. α.
— tenella DC. I. 691. no. 14.
— *teres* DC. I. 691. no. 14.
— tragacanthoides DC. I. 694. †
— Uralensis DC. *I. 692. no. 22. *II. 862. no. 11.
δ. arctica Ldb. II. 862. no. 11.
γ. minor Hook. I. 692. no. 22.
γ. pumila Ldb. II. 862. no. 11.
β. sericea DC. II. 862. no. 11.
β. subsucculenta Hook. I. 692. no. 22.
— *vaginata* DC. I. 690. no. 14.
— viscida Nutt. I. 693. no. 35.
Oxyura DC. II 631.
— *chrysanthemoides* DC. II. 631. no. 1.
— *chrysanthemoides* Lindl. II. 990. no. 2.
Ozodia Wght. et Arn. II. 423. V. 910.
— foeniculacea Wght. et Arn. *II. 423. no. 1. V. 910. no. 1.

Ozoroa Delile. °V. 415.
— insignis Delile. V. 415. no. 1.
Ozothamnus R. Br. *II. 646. VI. 238.
— ericaefolius Hook. fil. VI. 725. no. 2.
— lepidophyllus Hook. fil. VI. 725. no. 3.
Ozothamnus lepidophyllus Steetz. VI. 238. no. 2.
— lycopodioides Hook. fil. VI. 725. no. 1.
— Vauvilliersii Hombr. et Jacquinot. VI. 238. no. 1.

P

Pacaï Feuill. V. 633. no. 74.
Pachira Aubl. I. 329. II. 793. V. 95.
— alba Wlprs. *I. 329. no. 7. *II. 793. no. 10.
— arenaria St. Hil. I. 329. no. 4.
— cyathophora Casaretto. V. 96. no. 2.
— decaphylla St. Hil. et Naud. II. 794. no. 3.
— emarginata A. Rich. I. 329. no. 6.
— grandiflora Tussac. II. 794. no. 2.
— macrantha St. Hil. I. 329. no. 3.
— macrocarpa Cham. et Schlchtd. I. 329. no. 1.
— marginata St Hil. I. 329. no. 5.
— rufescens St. Hil. et Naud. II. 794. no. 4.
— sessilis Bth. V. 95. no. 1.
— stenopetala Casaretto. V. 96. no. 3.
— tomentosa Endl. I. 329. no. 2.
Pachycarpae Bth. (Mimosa) I. 879.
Pachycarpus asperifolius Meisn. VI. 486. no. 2.
Pachycentria Blume. II. 143. V. 712.
— constricta Blume. *II. 143. no. 1.
— tuberculata Krthls. V. 712. no. 1.
— varingiaefolia Blume. *II. 143. no. 2.
Pachydium Fisch. et Mey. II. 89.
Pachylaena Don. *II. 680. *VI. 318.
Pachylepis Lssng. *II. 697. *VI. 344.
Pachylobium Bth. (Dioclea) I. 764.
Pachylobus G. Don. I. 560.
— edulis G. Don. *I. 560. no. 1.
Pachyloma coriaceum DC. II. 127. no. 1.
Pachylophis Spach. II. 83.
— *Nuttallii* Spach. II. 83. no. 39.
Pachymeria Bth. °V. 677.
— rigida Bth. *V. 677. no. 1.
Pachynema R. Br. *I. 65.
Pachyneurum Bnge. II. 755.
— grandiflorum Bnge. *II. 755. no. 1.
Pachyphylla Dunal (Solanum) III. 42.
Pachyphytum Kltzsch. II. 258. V. 792.
Pachyphytum bracteosum Kltzsch. *II. 258. no. 1. V. 792. no. 1.
Pachypleureae Ldb. II. 405. V. 871.
Pachypleurum Ldb. II. 406. V. 871.
Pachypleurum Rchb. II. 405.
— alpinum Ldb. *II. 406. no. 1. V. 871. no. 1.
Pachypodium Lindl. *VI. 473.
Pachypodium Nutt. I. 172.
Pachypodium Webb. et Berth. I. 163.
— columnae Webb. *I. 163. no. 1.
— erysimoides Webb. et Berth. I. 163. no. 2.
— *integrifolium* Nutt. I. 172. no. 2.
— *laciniatum* Nutt. I. 172. no. 1.
— *sagittatum* Nutt. I. 172. no. 3.
Pachyptera A. P. DC. *VI. 511.
Pachypteris Kar. et Kir. II. 762.
— multicaulis Kar. et Kir. *II. 762. no. 1.
— *multicaulis* Kar. et Kir. V. 48. no. 2.
Pachypterum Steetz. (Helipterum) VI. 243.
Pachypterygium Bnge. V. 48.
— brevipes Bnge. V. 48. no. 3.
— lamprocarpum Bnge. V. 48. no. 1.
— multicaule Bnge. V. 48. no. 2.
Pachyrhizus A. Rich. I. 781. II. 902.
— angulatus A. Rich. *I. 781. no. 1.
— mollis Hsskrl. II. 902. no. 1.
Pachyrhynchus DC. *II. 618.
Pachysanthus Prsl. °VI. 38.
— macrophylla Prsl. VI. 38. no. 1.
Pachystigma Hochstett. II. 942. VI. 50.
Pachystigma Hook. V. 386.
— *pteleoides* Hook. *V. 387. no. 1.
— venosum Hochstett. *II. 942. no. 1. VI. 50. no. 1.
Pachystylum DC. I. 192.
— glabrum Eckl. et Zeyh. I. 192. no. 24.
Pachysurus Steetz. °VI. 230.
— angianthoides Steetz. *VI. 230. no. 1.
Pacifica Sendtner. (Solanum) VI. 583.

Pacouria Aubl. * VI. 465.
Pacourina Aubl. * II. 538.
Padavara DC. II. 486. no. 4.
Padi veri Spach. II. 10.
Padus Tournef. II. 10.
Paederia Linn. * II. 485.
Paederieae DC. II. 485.
Paederota D. Don. III. 368.
Paederota Linn. III. 368. °III. 968. * VI. 647.
— Ageria Linn. III. 369. no. 2.
β. Zannichellii.
— *Amherstiana* Wall. III. 370. no. 2.
— angustifolia Turczan. * III. 370.
— *Bonae spei* Linn. III. 180. no. 2.
— *Bonarota* Jcq. III. 369. no. 2.
— Bonarota Linn. III. 368. no. 1.
β. minor Bertol. III. 369. no. 1.
— *Bonarota* Suffr. III. 369. no. 1. β.
— *Bonarota β.* Willd. III. 369. no. 1. β.
— *Bonarota β. Zannichellii* Pall. III. 369. no. 2. β.
— *chamaedryfolia* Roem. et Schult. III 369. no. 1. β.
— *chamaedryfolia* Suffr. III. 369. no. 1.
— *coerulea* Linn. fil. III. 369. no. 1.
— humilis Willd. III. 370. no. 6.
— *lutea* Linn. fil. III. 369. no. 2.
— *minima* Koenig. III. 291. no. 1.
— *nudicaulis* Lam. III. 370. no. 1.
— *racemosa* Houtt. III. 179. no. 2.
— Sibirica Wlprs. III. 369. no. 4.
— tubiflora Wlprs. III. 370. no. 5.
— *urticaefolia* Brign. III. 369. no. 2.
— variegata Räusch. * III. 370.
— Virginica Wlprs. III. 369. no. 3.
— *Wulfenia* Lam. III. 370. no. 1.
— *Zannichellii* Brign. III. 396. no. 2. β.
Paenoë Rhede. V. 126. no. 1.
Paeonia Tournef. I. 61. II. 745. V. 7.
— albiflora Pall. * I. 61. no. 3. I. 62. †
β. trichocarpa Bnge. I. 61. no. 3.
— Bannatica Rochel. I. 62. †
— Broteri Boiss. et Reut. II. 745. no. 1.
— Brownii Dougl. I. 61. no. 6.
— Californica Nutt. I. 61. no. 7.
— corallina Retz. I. 62. †
— coriacea Boiss. I. 61. no. 1.
— Corsica Tausch. I. 61. no. 2.
— edulis var. Reewesiana Paxton. * V. 7. no. 1.
— Emodi Wall. I. 61. no. 5.
— festiva Tausch. I. 62. no. 14.
— flavescens Prsl. II. 745. no. 2.
— *foemina* H. Paris. I. 61. no. 9.
— hybrida Pall. I. 62. †
— intermedia C. A. Meyer. I. 61. no. 4.
Paeonia intermedia Wndrth. II. 745. no. 3.
— lanceolata S. Dyck. I. 61. no. 9.
— laciniata Wndrth. * II. 745. no. 3.
— lobata Dsf. I. 62. †
— microcarpa S. Dyck. I. 61. no. 10.
— Moutan L. I. 62. †
β. variegata.
γ. punicea.
— multifida Dyck. I. 62. no. 11.
— *officinalis* Brot. II. 745. no. 1.
— officinalis L. I. 62. †
β. anemonaeflora I. 62. †
— paradoxa β. fimbriata Sweet. I. 62. †
— *paradoxa β. leiocarpa* DC. I. 61. no. 2.
— promiscua Tausch. I. 62. †
— pubens Sims. I. 62. †
— Russi Biv. I. 62. †
— sessiliflora Sims. I. 62. no. 12.
— *sessiliflora* Sims. I. 62. no. 13.
— subternata Dyck. I. 61. no. 8.
— tenuifolia L. I. 62. †
— villosa Sweet. I. 62. no. 13.
Paeonieae DC. I. 59. II. 745. V. 7.
Pagaea Griseb. * VI. 503.
Pagamea Aubl. * VI. 497.
Pajanelia A. P. DC. * VI. 515.
Palafoxia Lag. * II. 548. II. 949.
— callosa Torr. et Gr. * II. 949. no. 2.
— Hookeriana Torr. et Gr. II. 949. no. 1.
— integrifolia Torr. et Gr. * II. 949. no. 3.
— *Texana* Hook. II. 949. no. 1.
Palava Cav. I. 290.
— rhombifolia Grah. I. 290. no. 1.
Paleaceo-aristatae DC. (Stevia) VI. 704. no. 1.
Paleolaria fastigiata DC. II. 949. no. 3.
Palicourea Aubl. II. 471. VI. 39.
............? Cham. II. 471. no. 3.
— calycina Bth. VI. 40. no. 6.
— densiflora Mart. II. 471. no. 1.
— Galeottiana Mart. VI. 40. no. 8.
— lineata Bth. VI. 39. no. 2.
— longepedunculata Gardn. VI. 40. no. 7.
— nigrescens Mart. et Galeotti. VI. 40. no. 9.
— parviflora Bth. VI. 39. no. 1.
— Popayanensis Bth. VI. 39. no. 4.
— riparia Bth. II. 471. no. 2.
— stipularis Bth. VI. 39. no. 5.
— vaginata Bth. VI. 39. no. 3.
Palimbia Bess. II. 409.
— *Chabraei* DC. V. 880. no. 2.
Paliuro affinis spinosa etc. Sloane. IV. 100. no. 1.
Pallenis Cass. * II. 602.
Pallenis Cass. II. 955. no. 2.
Palmstruckia Retz. * III. 437.
Palovea Aubl. * I. 855.

Palquin Feuill. III. 322. no. 6.
Pamphalea Lag. *II. 682. VI. 325.
— Tweedii Gardn. VI. 325. no. 1.
Pamphilia Alph. DC. VI. 460.
— styracifolia Alph. DC. *VI. 460. no. 1.
Pamphilieae Alph. DC. VI. 460.
Panaetia Cass. *II. 645.
Panargyrum Lag. *II. 682. VI. 322.
— abbreviatum Hook. et Arn. VI. 322. no. 2.
— Darwinii Hook. et Arn. VI. 322. no. 1.
— *Lagascae* DC. VI. 322. no. 1.
Panax Linn. II. 429. II. 939. V. 924.
Panax Rivin. V. 881. no. 1.
— anomalum Hook. II. 939. no. 1.
— arboreum Frstr. II. 430. † II. 939. †
— armatum Willd. II. 429. no. 8.
— calvum Cham. II. 429. no. 2.
— Finlaysonianum Wall. II. 429. no. 9.
— fruticosum Linn. II. 430. †
— Ginseng C. A. Mey. V. 924. no. 1.
— *Heyneanum* Willd. II. 433. no. 16.
— Heyneanum Wall. II. 429. no. 1.
— horridum Sm. *II. 429. no. 7.
— Japonicum C. A. Mey. V. 924. no. 3.
— *Lechenaultii* DC. II. 433. no. 17.
—? *Lessonii* DC. II. 430. no. 2.
—? ovatum Hook. II. 429. no. 5.
— parviflorum Mart. et Zucc. II. 429. no. 3.
—? platyphyllum Hook. II. 429. no. 6.
— pseudoginsang Wall. II. 429. no. 4. V. 924. no. 2.
— *quinquefolium* Lam. V. 925. no. 4.
— quinquefolium Linn. II. 430. † V. 925. no. 4.
— *quinquefolium β. Coreense* Siebldt. V. 924. no. 1.
— *quinquefolium* var. *Japonicum* Siebldt. V. 924. no. 3.
— *Schin-seng* var. *Coraïensis* N. ab E. V. 924. no. 1.
— *Schin-seng* var. *Japonica* N. ab E. V. 924. no. 3.
— *Schin-seng* var. *β. Nepalensis* N. ab E. V. 924. no. 2.
— simplex Forst. V. 925. †
Pancrasia DC. II. 477.
Pancratia Bth.? VI. 42.
Panetos Raf. II. 495. VI 54. no. 1.
— *rotundifolia* Raf. II. 496. no. 34.
PANGIEAE Blume. °V. 58.
Pangium Reinw. °V. 58.
— edule Reinw. V. 58 a. no. 1.
Paniculatae Bth. (Pithecolobium) V. 619.
Paniculatae DC. (Psychotria) II. 474. no. 23.
Panke sonchifolia Willd. II. 264. no. 2.
Panzeria Mnch. III. 812.
Panzeria lanata Pers. III. 812. no. 8.
— *multifida* Mnch. III. 812. no. 7.
— *tomentosa* Mnch. III. 812. no. 8.
— *tripartita* Mnch. III. 812. no. 7.
Papa III. 32. no. 19.
Papas Americanum Bauh. III. 38. no. 1
— *Peruanorum* Bessl. III. 38. no. 1.
Papaver Tournef. I. 110. II. 750.
— *aculeatum* Thnbrg. I. 114. no. 13.
— *alpinum* Auct. I. 111. no. 1. b.
— *alpinum* Baumg. I. 111. no. 1. b. ϑ.
— *alpinum* B. I. 111. no. 1. ζ.
— *alpinum α.* Koch. I. 111. no. 1. ζ.
— *alpinum β.* et *ε.* Fisch. et Mey. I. 111. no. 1. b.
— *alpinum δ.* Fisch. et Mey. I. 111. no. 1. a. δ.
— *alpinum γ.* Fisch. et Mey. I. 111. no. 1. ε.
— *alpinum ε.* Fisch. et Mey. I. 111. no. 1. b. ι.
— amoenum Lindl. I. 115. no. 22.
— Apulum Ten. I. 114. no. 16.
— *arenarium* M. B. I. 113. no. 7. γ.
— Argemone L. I. 112. no. 6.
 β. arvense.
 γ. glabrum.
— *Argemone β.* Koch. I. 112. no. 6. γ.
— argemonoides Cesati. I. 114. no. 14.
— *Armeniacum* Poir. I. 112. no. 4. δ.
— *arvense* Borkh. I. 112. no. 6. β.
— *arvense* Salisb. I. 113. no. 8. α.
— *aurantiacum* Loisel. I. 111. no. 1. ι.
— *bipinnatum* C. A. Mey. I. 113. no. 7. δ.
— bracteatum Lindl. I. 111. no. 3.
— *Burseri* Crntz. I. 111. no. 1. η.
— Caucasicum M. Bieb. I. 112. no. 4.
 δ. Armeniacum } Elkan.
 β. floribundum } Elkan.
 γ. fugax } Elkan.
 α. genuinum } Elkan.
 ε. hispidum } Elkan.
— *Caucasicum* C. A. Mey. I. 112. no. 4. γ.
— *Chinense* Hortor. I. 113. no. 8. δ.
— *clavigerum* Lam. I. 112. no. 6.
— *commutatum* Fisch. et Mey. I. 113. no. 8. ζ.
— *croceum* Ldb. I. 111. no. 1. a. δ.
— *Decaisnei* Hochst. et Steudel. I. 113 no. 7. ζ.
— *dubium* Jcq. I. 113. no. 7 α.
— *dubium β.* Koch. I. 113. no. 7. β.
— dubium L. I. 112. no. 7.
 γ. arenarium } Elkan.
 δ. bipinnatum } Elkan.
 ζ. Decaisnei } Elkan.
 α. genuinum } Elkan.
 β. laevigatum } Elkan.
 ε. obtusifolium } Elkan.

Papaver *dubium* Ten. I. 114. no. 17.
— *floribundum* Dsf. I. 112. no. 4.
— Frentanum Ten. I. 114. no. 15.
— *fugax* Poir. I. 112. no. 4. γ.
— Gariepinum Burch. I. 114. no. 13.
— *glabellum* Hortor. I. 113. no. 8. β.
— *glabellum* Stev. I. 113. no. 7. β.
— glabrum Royle. I. 115. no. 21.
— gracile Auch. I. 114. no. 18.
— *grandiflorum* Much. I. 111. no. 2.
— *hispidum* Dsf. I. 112. no. 4. ε.
— *hispidum* Lam. I. 112. no. 5.
— horridum DC. I. 114. no. 12.
— *hybridum* Kar. et Kir. II. 750. no. 1.
— hybridum L. I. 112. no. 5.
— *indehiscens* Dumort. I. 114. no. 10. γ.
— *intermedium* Becker. I. 113. no. 8. α.
— *laevigatum* M. Bieb. I. 113. no. 7. β.
— Libanoticum Boiss. I. 115. no. 19.
— *maritimum* With. I. 112. no. 6.
— *microcarpum* DC. I. 111. no. 1. ε.
— *miniatum* Rchb. I. 111. no. 1. ε.
— *nudicaule* β. DC. I. 111. no. 1. a. β.
— *nudicaule* Ldb. I. 111. no. 1. a. α.
— nudicaule L. I. 111. no. 1.
b. alpinum, a. arcticum, η. Burseri, δ. croceum, ϑ. flaviflorum, β. glabratum, ζ. Linnaeanum, ε. microcarpum, α. pilosum, ι. Pyrenaicum, γ. radiatum } Elkan.
— *obtusifolium* Dsf. I. 113. no. 7. ε.
— *officinale* Gmel. I. 114. no. 10. γ.
— orientale L. I. 111. no. 2.
— *orientale* M. B. I. 112. no. 3.
— *paniculatum* Don. I. 110. no. 1.
— *parviflorum* Lam. I. 113. no. 7. α.
— pavoninum Fisch. Lall m. II. 750. no. 1.
— *Persicum* Hort. Dij.? I. 112. no. 4.
— Persicum Lindl. I. 115. no. 20.
— pilosum Sibthrp. I. 114. no. 11.
— pinnatifidum Moris. I. 114. no. 17.
— *Pyrenaicum* DC. I. 111. no. 1. b. ι.
— *ramosissimum* H. Prag.? I. 112. no. 4.
— Rhoeas L. I. 113. no. 8.
δ. Chinense, ζ. commutatum, α. genuinum, β. glabellum, γ. Roubieai, ε. strigosum } Elkan.
Papaver Rhoeas β. et γ. Boenningh. I. 113. no. 8. ε.
— *Rhoeas* β. Gaud. I. 113. no. 8. γ.
— *Rhoeas* C. A. Mey. I. 113. no. 8. ζ.
— *Roubiaei* Vig. I. 113. no. 8. γ.
— *segetale* α. Spenn. I. 113. no. 8. α.
— *segetale* β. Spenn. I. 113. no. 7. α.
— *setigerum* DC. I. 114. no. 10.
— *simplicifolium* DC. I. 110. no. 2.
— *somniferum* α. DC. I. 114. no. 10. β.
— somniferum L. I. 113. no. 10.
γ. album, β. nigrum, α. setigerum } I. 114.
— *spectabile* Lnk. I. 114. no. 4. ε.
— *spectabile* Salisb. I. 111. no. 2.
— *suaveolens* Lapeyr. I. 111. no. 1. ι.
— *trilobum* Wllrth. I. 113. no. 8. ζ*
— turbinatum DC. I. 113. no. 9.
— *virgatum* Rees. I. 112. no. 4. β.
PAPAVERACEAE DC. I. 109. V. 20.
Papaveraceae DC. V. 20.
PAPAVERACEAE Juss. I. 109. II. 750. V. 20.
Papavereae Endl. I. 109. II. 750. V. 20.
Papavereae verae Endl. I. 109.
Papaya littorea Rmph. II. 430. no. 1.
— *sativa* Tussac. II. 205. no. 1.
PAPAYACEAE Mart. II. 205.
Papeda Hsskrl. °V. 141.
— Rumphii Hsskrl. V. 141. no. 1.
PAPILIONACEAE Endl. I. 562.
Papilionaceae Endl. et Bth. II. 831. V. 422.
PAPILIONACEAE Endl. V. 422.
Pappea Eckl. et Zeyh. I. 422.
— Capensis Eckl. et Zeyh. *I. 422. no. 1.
— *Capensis* Eckl. et Zeyh. V. 363. no. 5.
Pappochroma Nutt. II. 587.
Papularia crystallina Forsk. II. 232. no. 1.
Paquerina Cass. *II. 584.
Paracelsea amoena Zollinger. VI. 500. no. 1
Paradoxae Pfeiff. (Opuntia) II. 352.
Paramignya Wght. I. 382. V. 140.
— Blumei Hsskrl. *V. 140. no. 1.
— monophylla Wght. *I. 382. no. 1.
Paranephelius Poepp. et Endl. II. 544. °VI. 103.
— uniflorus Poepp. et Endl. *II. 544 no. 1. VI. 103. no. 1.
Parapodium E. Mey. *VI. 482.
Parastemon Alph. DC. *II. 804. °V. 139.
— urophyllus Alph. DC. V. 140. no. 1.
Parastephia vid. Parastrephia.
Parastranthus G. Don. *VI. 375.
Parastrephia Nutt. II. 595. *II. 952. no. 17. VI. 134.

Parastrephia ericoides Nutt. *II. 595. no. 1. VI. 134. no. 1.
Paratropia DC. II. 433.
— Cantoniensis Hook. et Arn. II. 433. no. 1.
— capitata Wght. et Arn. II. 433. no. 5.
— *longifolia* DC. II. 430. no. 1.
— terebinthacea Arn. II. 433. no. 2.
— venulosa Wght. et Arn. II. 433. no. 3.
— Wallichiana Wght. et Arn. II. 433. no. 4.
Parentucellia Viviani. °III. 407. °III. 972. *VI. 654.
— floribunda Viviani. III. 407. no. 1.
Parinarium Juss. II. 7. V. 647.
— brachystachyum Bth. II. 7. no. 4.
— coriaceum Bth. II. 7. no. 5.
— excelsum Sabin. *II. 7. no. 2.
— glaberrimum Hsskrl. V. 647. no. 1.
— macrophyllum G. Don. II. 7. no. 3.
— scabrum Hsskrl. V. 647. no. 2.
— Senegalense Perr. *II. 7. no. 1.
Paritium Adr. Juss. I. 311.
— abutiloides G. Don. *I. 311. no. 6.
— elatum G. Don. *I. 311. no. 3.
— Gangeticum G. Don. I. 311. no. 4.
— macrophyllum G. Don. *I. 311. no. 5.
— Pernambucense G. Don. *I. 311. no. 7.
— sterculiaefolium Guill. et Perr. I. 311. no. 9.
— tiliacum Adr. Juss. *I. 311. no. 1.
— tricuspe G. Don. *I. 311. no. 2.
— virgatum Guill. et Perr. I. 311. no. 8.
— Wrayae Wlprs. I. 311. no. 10.
Parivoa Aubl. *I. 845.
Parkia R. Br. I. 857. II. 905. °V. 576.
— Africana R. Br. *I. 857. no. 1.
— *Africana* R. Br. V. 577. no. 1.
— biglandulosa Wght. et Arn. I. 857. no. 2.
— *biglandulosa* Wght. et Arn. V. 577. no. 1.
— *biglobosa* Bth. I. 857. no. 1.
— biglobosa Bth. V. 577. no. 1.
— *Brunonis* Grah. V. 577. no. 1.
— filicina Bth. *V. 577. no. 4.
— grandis Hsskrl. II. 905. no. 2.
— pendula Bth. *V. 577. no. 3.
— platycephala Bth. I. 857. no. 3. V. 577. no. 2.
— *Roxburghii* G. Don. V. 577. no. 1.
— speciosa Hsskrl. II. 905. no. 1.
Parkieae Wght. et Arn. I. 857. II. 905. V. 576.
Parkinsonia Plum. *I. 809.
Parlatoria Boiss. I. 174.
— cakiloides Boiss. I. 174. no. 1.
— clavata Boiss. I. 174. no. 2.
Parmentiera A. P. DC. *VI. 517.
Parnassia Tournef. I. 230. II. 768.
— *Americana* Mhlnbrg. I. 231. no. 8.
Parnassia Caroliniana Michx. *I. 231. no. 8. β. Belossii DC. ibid.
— *Caroliniana* Michx. β. I. 231. no. 8.
— fimbriata Koen. *I. 231. no. 9.
— *grandifolia* DC. I. 231. no. 8. β.
— Kotzebuei Cham. et Schlchtd. I. 231. no. 7.
— Mysorensis Heyne. I. 231. no. 4.
— nubicola Wall. *I. 230. no. 3.
— ornata Wall. I. 230. no. 2.
— *ovata* Ldb. I. 231. no. 8.
— *palustris* Prsh. I. 231. no. 8.
— pusilla Wall. I. 231. no. 5.
— Schmidelii Zenker. I. 231. no. 6.
— subacaulis Kar. et Kir. II. 768. no. 1.
— *Turczaninowii* Ldb. II. 768. no. 1.
— Wightiana Wall. I. 230. no. 1.
Parnassieae Endl. I. 230.
Parochetus Hamilt. I. 651. II. 855. V. 512.
— *communis* Wall. II. 855. no. 1.
— maculatus Bennet. I. 651. no. 1.
— major Don. *V. 512. no. 1.
— *major* Wall. II. 855. no. 1.
— oxalidifolius Bth. II. 855. no. 1.
Parolinia B. Webb. I. 124.
— ornata B. Webb. I. 124. no. 1.
Paronychia DC. (ex p.) I. 261.
Paronychia (I. 523.) sub: *Acronychia.*
Paronychia Juss. I. 261. V. 74.
— Americana Fnzl. I. 262. no. 12.
— arborea Blume. I. 262. no. 4.
— *aretioides* DC. I. 262. †
— *australis* Gill. I. 260. no. 5.
— Baldwinii Fnzl. I. 262. no. 14.
— *camphorosmoides* Cambess. I. 261. no. 2.
— Canariensis B. Webb et Berthel. I. 261. no. 5.
— Chionaea Boiss. V. 75. no. 2.
— communis Cambess. I. 262. no. 11.
— desertorum Boiss. V. 75. no. 3.
— *dichotoma* DC. I. 262. no. 13.
— dichotoma Fnzl. I. 262. no. 13. β. capillacea Nutt.
— dichotoma Nutt. *I. 262. no. 10.
— Drummondii Torr. et Gr. I. 261. no. 7.
— Jamesii Torr. et Gr. I. 262. no. 9.
— Kurdica Boiss. V. 75. no. 3.
— lanuginosa Tussac. I. 261. no. 6.
— laurifolia Blume. I. 261. no. 3.
— macrosepala Boiss. V. 74. no. 1.
— *polycnemoides* Schlchtd. I. 261. no. 4.
— *pubescens* DC. I. 260. no. 1.
— *ramosissima* DC. I. 261. no. 1.
— *Rosetta* Cambess. I. 261. no. 3.
— sclerocephala Dcne. I. 261. no. 1.
— *sclerocephala* Dcne. V. 76. no. 1.
— serpyllifolia β. aretioides Boiss. I. 262. †

Paronychia sessiliflora Nutt. I. 262. †
— setacea Torr. et Gr. I. 261. no. 8.
— Sinaica Fresen. I. 261. no. 2.
— *Smithii* Chais. I. 261. no. 5.
Paronychieae St. Hil. I. 260. II. 770. V. 74.
Paropsia Noronh. *II. 218.
Paropsieae DC. II. 218. V. 770.
Parqui Feuill. III. 119. no. 38.
Parrotia C. A. Mey. II. 435. II. 940.
— Jacquemontiana Dcne. II. 940. no. 1.
— Persica DC. *II. 435. no. 1.
Parrya R. Br. I. 134. II. 757.
— arctica R. Br. I. 134. no. 2.
— exscapa C. A. Mey. I. 134. no. 5.
— integerrima Don. I. 134. no. 3.
— macrocarpa R. Br. *I. 134. no. 1.
α. aspera.
β. glabra.
— pinnatifida Kar. et Kir. II. 757. no. 1.
— scapigera Don. *I. 134. no. 4.
— stenocarpa Kar. et Kir. II. 757. no. 2.
Parsonsia R. Br. VI. 470.
— albiflora Raoul. VI. 471. no. 3.
— capsularis Raoul. VI. 470. no. 1.
— rosea Raoul. VI. 470. no. 2.
Parsonsieae Alph. DC. VI. 470.
Partheniachaeta DC. VI. 156.
Partheniastrum DC. VI. 156.
Parthenieae DC. II. 607. II. 976. VI. 156.
Parthenium Linn. *II. 607. II. 976. VI. 156.
— alpinum Torr. et Gr. VI. 156. no. 1.
— *integrifolium* Linn. II. 607. no. 1.
Parvatia Dcne. I. 99.
— Brunoniana Dcne. I. 99. no. 1.
Paryphantha Schauer. II. 920. °V. 728.
— Mitchelliana Schauer. *II. 920. no. 1. V. •728. no. 1.
Pascalia Ortega. II. 609.
— laxiflora Bth. II. 609. no. 1.
Paschanthus Burch. *II. 222.
Passerina pentandra Thnbrg. III. 126. no. 1.
Passiflora Juss. II. 218. II. 934. V. 771.
— acerifolia Schlcht. et Cham. II. 221. no. 28.
— actinia Hook. II. 934. no. 2.
— Bahiensis Kltzsch. II. 220. no. 21.
— *bilobata* Vell. II. 220. no. 15.
— Bogotensis Bth. V. 771. no. 4.
— *Chilensis* Miers. II. 222. no. 1.
— cinerea Poepp. et Endl. II. 219. no. 4.
— colubrina Poepp. et Endl. II. 219. no. 7.
— cyathophora Desx. II. 219. no. 11.
— discolor Lk. et Otto. II. 219. no. 8.
— edulis Sims. V. 772. †.
— elliptica Gardn. II. 219. no. 14.
— filipes Bth. V. 771. no. 1.
Passiflora flexuosa Gardn. II. 219. no. 3.
— *foetida* Vellozo. V. 771. no. 1.
— gossypiifolia Desvx. II. 221. no. 29.
— hastata Bertol. II. 221. no. 31.
— hispidula Knwls. et Westsc. II. 221. no. 23.
— Horsfieldii Blume. II. 221. no. 27.
— incarnata L. II. 221. †
— kermesina Lk. et Otto. II. 219. no. 10. V. 773. †
— lancifolia Dsvx. II. 219. no. 12.
— Lechenaultiana DC. II. 221. †
— ligularis Jnss. II. 221. †
— limbata Ten. II. 219. no. 9.
— lunata Juss. *II. 219. no. 5.
— lyraefolia Juss. II. 221. †
— membranacea Bth. II. 218. no. 2.
— Middletoniana Paxton. V. 772. †
— Moluccana Blume. *II. 221. no. 26.
β. Timorensis Blume.
— Mooreana Hook. II. 220. no. 19.
— Nepalensis Wall. II. 221. no. 25.
— nigelliflora Tweedie. II. 221. no. 30.
— onychina Lindl. II. 219. no. 13.
— Organensis Gardn. V. 772. no. 6.
— pallidiflora Bertoloni. II. 221. no. 24.
— phoenicea Lindl. II. 934. no. 9.
— piligera Gard. II. 220. no. 15.
— pseudo-suberosa Fisch. II. 934. no. 1.
— quadrangularis L. II. 221. †
— retusa Hook. et Arn. II. 220. no. 17.
— *sanguinea* Hort. Berol. II. 220. no. 22.
— Selloi Dehnhrdt. II. 220. no. 22.
— sicyoides Schlcht. et Cham. II. 220. no. 16.
— speciosa Gardn. V. 771. no. 2.
— Surinamensis Miquel. V. 772. no. 5.
— *tetrandra* Bnks. et Soland. V. 773. no. 1.
— *tiliaefolia* Molina. II. 222. no. 1.
— *tomentosa* Cav. II. 222 no. 1.
— Tucumanensis Hook. II. 220. no. 18.
— variolata Poepp. et Endl. II. 219. no. 6.
— Velozii Gardn. V. 771. no. 1.
— verrucifera Lindl. II. 220. no. 20.
— Walkerii Wght. II. 218. no. 1.
PASSIFLOREAE DC. (ex p.) II. 223. V. 775.
PASSIFLOREAE Juss. II. 218. II. 934. V. 770.
Passifloreae verae DC. II. 218. V. 771.
Pastinaca DC. (ex p.) V. 886.
Pastinaca Tournef. II. 414. V. 886.
— Candolleana Wght. et Arn. II. 414. no. 5.
— dasyantha C. Koch. II. 414. no. 3.
— *dasyantha* C. Koch. V. 887. no. 6.
— *dissecta* Vent. V. 887. no. 3.
— *ferulacea* Spr. II. 412. no. 28.
— Fleichmanni Hladnick. II. 414. no. 1.
— *graveolens* M. Bieb. V. 886. no. 1.
— *hispida* Fnzl. V. 874. no. 2.

Pastinaca involucrata C. Koch. II. 414. no. 2.
— ligusticifolia Wght. et Arn. II. 414. no. 6.
— Mazurevskii Kaleniczenko. V. 886. no. 1.
— *obtusifolia* DC. V. 887. no. 5.
— Opoponax Sibthrp. V. 874. no. 1.
— *pimpinellifolia* M. Bieb. V. 887. no. 2.
— *pimpinellifolia* Frivaldsk. V. 886. no. 1.
— rectistyla Cesati. II. 414. no. 4.
— *rectistyla* Cesati. V. 886. no. 1.
— *Skahul* Russell. V. 887. no. 3.
— *triquinata* Spr. II. 407. no. 3.
Patabea Aubl. II. 470. VI. 36.
— coriacea Cham. II. 470. no. 1.
— lanceolata Prsl VI. 36. no. 1.
— tenerior Cham. II. 470. no. 2.
Patagonium racemosum E. Mey. I. 729. no. 17.
Patentes Torr. et Gr. (Aster) II. 562.
Patima Aubl. II. 490.
—? laxiflora Bth. II. 490. no. 1.
Patonia Wght. II. 747.
— parvifolia Wght. II. 747. no. 2.
— Walkerii Wght. II. 747. no. 1.
Patrinia Juss. II. 526.
— *ceratophylla* Hook. II. 530. no. 12.
— heterophylla Bnge. II. 526. no. 1.
— hispida Bnge. II. 526. no. 3.
— *longifolia* Macknab. II. 530. no. 13.
— *ovata* Bnge. II. 526. no. 4.
— scabra Bnge. II. 526. no. 2.
Patrisia DC. II. 218.
Paucifoliatae Bth. (Mimosa) I. 882. V. 612.
Paulletia DC. I. 847. V. 572. no. 2. 3.
Paullinia Linn. I. 413. II. 814. V. 360.
— affinis St. Hil. I. 413. no. 6.
— alata G. Don. I. 413. no. 4.
— australis St. Hil. I. 413. no. 9.
— belangerioides Gardn. II. 814. no. 6.
— carpopodea St. Hil. I. 413. no. 5.
—? clavigera Schlchtd. I. 414. no. 16.
— coriacea Casaretto. V. 360. no. 1.
— costata Schlchtd. et Cham. I. 413. no. 2.
— discolor Gardn. II. 814. no. 7.
— diversiflora Miquel. II. 814. no. 8. *V. 361. no. 7.
— elegans St. Hil. I. 413. no. 7.
— enneaphylla G. Don. I. 414. no. 14.
— erythrocarpa Casaretto. V. 361. no. 2.
— falcata Gardn. II. 814. no. 5.
— ferruginea Casaretto. V. 361. no. 4.
— gigantea Poepp. et Endl. II. 814. no. 4.
— glabra Bertol. I. 413. no. 3.
— grandiflora St. Hil. I. 414. no. 10.
— *Guaruminea* Vellozo. I. 413. no. 19.
— *Hostmanni* Steudel. V. 361. no. 7.
— Jamaicensis Macfd. I. 414. no. 15.
Paullinia lactescens Poepp. et Endl. II. 814. no. 1.
— marginata Casaretto. V. 361. no. 3.
— Meyeniana Wlprs. V. 361. no. 5.
— micrantha St. Hil. I. 414. no. 11.
— micropterygia Miquel. II. 814. no. 9.
— multiflora St. Hil. I. 414. no. 13.
— *nitida* Steudel. V. 361. no. 7.
— nitida Steudel. V. 361. adn.
— protracta Steudel. V. 361. no. 6.
— rhizantha Poepp. et Endl. V. 814. no. 2.
— rubiginosa St. Hil. I. 413. no. 8.
— *sarmentosa* P. Br. I. 414. no. 15.
— sericea St. Hil. I. 414. no. 12.
— tenera Poepp. et Endl. II. 814. no. 3.
— uvata Schum. et Thonn. I. 413. no. 1.
— weinmanniaefolia Mart. I. 414. no. 17.
Paulo-Wilhelmia triphylla Hochstett. V. 788. no. 1.
Paulownia Siebold et Zucc. III. 262. °III. 962. *VI. 638.
— imperialis Sieb. et Zucc. III. 262. no. 1. *III. 938. *VI. 745.
Pavetta Linn. II. 480. II. 942. VI. 45.
— Abyssinica Fresen. II. 480. no. 7.
— breviflora DC. II. 482. no. 9.
— Brunonis Wall. II. 480. no. 5.
— Coffea Linn. fil. II. 481. †
— dubia Endl. *II. 481. no. 10.
— *elliptica* Hochstett. VI. 43. no. 1.
— *gracilis* A. Rich. VI. 45. no. 1.
— hispidula Wght. et Arn. II. 480. no. 2.
— Indica Linn. *II. 480. no. 1.
— lanceolata Eckl. II. 480. no. 9.
— lateriflora G. Don. II. 480. no. 8.
— Manillensis Wlprs. VI. 45. no. 1.
— *mollis* Wall. II. 480. no. 5.
— naucleaeflora R. Br. II. 480. no. 4.
— revoluta Hochstett. II. 942. no. 1.
— tomentosa Sm. *II. 480. no. 3.
— weberaefolia Wall. II. 480. no. 6.
— *Wightiana* Wall. II. 517. no. 14.
Pavia Boerh. I. 424.
— *alba* Poir. I. 424. no. 4.
— *atropurpurea* Spach. I. 424. no. 6.
— *carnea* Spach. I. 425. no. 9.
— *discolor* Spach. I. 424. no. 6. β.
— *edulis* Poir. I. 424. no. 4.
— *flava* DC. I. 425. no. 7.
— *glabra* Spach. I. 424. no. 3.
— *hybrida* DC. I. 424. no. 6. β.
— *Indica* Wall. I. 425. no. 8.
— *intermedia* Spach. I. 424. no. 6.
— *livida* Spach. I. 424. no. 6. γ.
— *lucida* Spach. I. 424. no. 6.
— *lutea* Poir. I. 425. no. 7.

Pavia macrostachya DC. I. 424. no. 4.
— *Michauxii* Spach. I. 424. no. 6.
— *mutabilis* Spach. I. 424. no. 6. δ.
— *Ohioënsis* Michx. I. 424. no. 3.
— *pallida* Spach. I. 424. no. 3.
— *rubra* Lam. I. 424. no. 6.
— *versicolor* Spach. I. 424. no. 6. ε.
— *Willdenowiana* Spach. I. 424. no. 6.
Pavonia Cav. I. 297. II. 789. V. 90.
Pavonia Nees et Mart. I. 297.
— acerifolia Lnk. et Otto. I. 300. no. 34.
— affinis St. Hil. I. 299. no. 23.
— alnifolia St. Hil. I. 301. no. 44.
— angustifolia Bth. I. 300. no. 32.
— arachnoidea Prsl. I. 299. no. 19.
— begoniaefolia Gardn. II. 789. no. 2.
— betonicaefolia Prsl. I. 299. no. 15.
— brachysepala St. Hil. et Naud. II. 789. no. 4.
— bracteosa Bth. I. 300. no. 31.
— calyculosa St. Hil. et Naud. II. 790. no. 10.
— castaneaefolia St. Hil. et Naud. II. 789. no. 3.
— cernua Spanoghe. II. 790. no. 11.
— communis St. Hil. I. 298. no. 7.
— conferta St. Hil. I. 301. no. 40.
— *crenata* Hochstett. V. 89. no. 1.
— cymbalaria St. Hil. et Naud. II. 789. no. 9.
— deltoidea Mart. I. 300. no. 36.
— distinguenda St. Hil. et Naud. II. 789. no. 7.
— diuretica St. Hil. I. 300. no. 28.
— diversifolia Hsskrl. V. 90. no. 1.
— Drummondii Torr. et Gr. I. 298. no. 13.
— flava Spring. I. 298. no. 9.
— glandulosa Prsl. I. 299. no. 16.
— glechomoides St. Hil. I. 299. no. 22.
— glomerata Casaretto. V. 90. no. 5.
— grandiflora St. Hil. I. 300. no. 27.
— grandifolia St. Hil. I. 300. no. 33.
— grisea St. Hil. et Naud. II. 789. no. 5.
— hirsuta Guill. et Perr. I. 297. no. 1.
— hirtiflora Bth. I. 301. no. 46.
— humifusa St. Hil. I. 300. no. 29.
— intermedia St. Hil. I. 298. no. 6.
— intermixta A. Rich. I. 298. no. 5.
— Kraussiana Hochstett. V. 90. no. 2.
— lanceolata Schlchtd. I. 298. no. 3.
— lappacea Casaretto. V. 90. no. 4.
— laxifolia St. Hil. I. 299. no. 21.
— linearis A. Rich. I. 298. no. 4.
— longifolia St. Hil. I. 301. no. 42.
— malvaviscoides St. Hil. I. 301. no. 39.
— microphylla Casaretto. V. 90. no. 6.
— modesta Mart. I. 300. no. 35.
— monatherica Casaretto. V. 90. no. 3.
Pavonia multiflora St. Hil. I. 301. no. 41.
— muricata St. Hil. I. 299. no. 20.
— nudicaulis St. Hil. I. 300. no. 25.
— odorata Willd. *I. 298. no. 10.
— *platanifolia* W. Hb. I. 300. no. 34.
— polymorpha St. Hil. I. 300. no. 26.
— procumbens Casaretto. V. 91. no. 7.
— procumbens Wlprs. I. 301. no. 45. (III. Emend. p. 2.)
— racemifera Hook. et Arn. I. 299. no. 17.
— rosa campestris St. Hil. I. 300. no. 30.
— rosea Moris. I. 298. no. 11.
— rosea Schlchtd. I. 298. no. 2.
— sagittata St. Hil. I. 299. no. 24.
— scabra Prsl. I. 299. no. 18.
— Schrankii Spr. I. 301. †
— sepium St. Hil. I. 298. no. 8.
— *sidoides* Horn. I. 298. no. 10.
— subrotunda St. Hil. et Naudin. II. 789. no. 6.
— Surinamensis Miquel. II. 789. no. 1.
— tricalycaris St. Hil. I. 301. no. 43.
— triloba Guill. et Perr. I. 298. no. 12.
— urticaefolia Prsl. I. 299. no. 14.
— velutina St. Hil. I. 301. no. 38.
— viscidula St. Hil. et Naud. II. 789. no. 8.
— viscosa St. Hil. I. 300. no. 37.
Payena Alph. DC. *VI. 456.
Pecten DC. V. 903. et 904. no. 1. 2. 3.
Pectideae Less. II. 544. VI. 103.
Pectidium Less. *II. 544.
Pectidopsis DC. *II. 544.
Pectinaria Bth. III. 560.
Pectinastrum DC. VI. 302.
Pectinatae Bth. (Mimosa) I. 866.
Pectis Linn. II. 544. VI. 104.
— *acicularis* D. Don. VI. 172. no. 1.
— arenaria Bth. VI. 104. no. 1.
— diffusa Hook. et Arn. II. 545. no. 2.
— Taliscana Hook. et Arn. II. 544. no. 1.
Pectocarya A. P. DC. *VI. 562.
Pectophytum H. B. Kth. *II. 386.
PEDALIACEAE Lindl. VI. 518.
Pedalineae R. Br. VI. 518.
Pedalium Royen. *VI. 519.
Pedicellaria DC. I. 193. et 194. no. 5. 8. 13. II. 764. no. 2.
Pedicellatae Bth. (Calliandra) V. 602.
Pedicellia Lour. *I. 422
Pedicularioides Bth. III. 382.
Pedicularis Rchb. III. 409.
Pedicularis Tournef. III. 409. °III. 972. VI. 654.
— abrotanifolia M. Bieb. III. 410. no. 3. β. glabrescens Ledeb.
— acaulis Wulff. III. 431. no. 104.

Pedicularis achilleaefolia Stephan. III. 425. no. 78.
— *achilleaefolia* Turczan. III. 424. no. 70.
— acmodonta Boiss. III. 424. no. 69.
— adunca M. Bieb. III. 421. no. 56.
— aequinoctialis H. B. Kth. III. 421. no. 58.
— *alopecuroides* Adams. III. 427. no. 84.
— *alpina foliis alternis pinnatis etc.* Hall. III. 429. no. 96.
— Altaica Stephan. III. 426. no. 82.
— *altissima* Pall. III. 419. no. 47.
— amoena Adams. III. 412. no. 16.
  β. albiflora.
— angustifolia Bth. III. 421. no. 57.
— *annua lutea tenuifolia viscosa, pomum redolens* Garid. III. 400. no. 7.
— *annua palustris foliis Kali Valentina* Tournef. III. 401. no. 10.
— *arctica* Adams. III. 427. no. 85.
— arctica R. Br. III. 427. no. 83.
— *arctica* R. Br. III. 427. no. 84.
— *ascendens* Gaudich. III. 417. no. 38.
— *ascendens* Hppe. et Strnbrg. III. 417. no. 39.
— *asparagoides* Lapeyr. III. 417. no. 37.
— asplenifolia Flörke. III. 416. no. 33. et in adnot.
— *asplenifolia* Wall. III. 415. no. 29.
— atropurpurea Nordm. III. 429. no. 93.
— atrorubens Schleich. III 417. no. 42.
—? Avana Wall. III. 431. no. 105.
— Barrelieri Rchb. III. 417. no. 38.
— brachystachys Ledeb. III. 418. no. 45.
— bracteosa Bth. III. 430. no. 99.
— brevifolia D. Don. III. 411. no. 12.
— *Brunoniana* Wall. III. 411. no. 7.
— *bulbosa* Pall. III. 423. no. 67.
— Cadmea Boiss. III. 428. no. 88.
— *caespitosa* B. Webb. III. 412. no. 14.
— *callosa*-Adams. III. 412. no. 14. γ.
— Canadensis Linn. III. 421. no. 59.
  β. Spica elongata.
— capitata Adams. III. 432. no. 109.
— carnosa Wall. III. 415. no. 27. III. 940.
— Caucasica M. Bieb. III. 412. no. 17.
— Cenisia Gaud. III. 416. no. 34.
— Chamissonis Stev. III. 409. no. 1.
— cheilanthifolia Schrenk. *III. 432. III. 939. *940.
— comosa Linn. III. 423. no. 67.
— *comosa* Mattuschka. III. 422. no. 62.
— *comosa* β. Stev. III. 425. no. 73.
— *comosa* var. Stev. III. 424. no. 70.
— *comosa* varr. δ. ε. ζ. η. Bnge. III. 424. no. 70.
— compacta Stephan. III. 419. no. 49.
Pedicularis condensata M. Bieb. III. 430. no. 102.
— *conica* Pallas. III. 423. no. 66.
— contorta Bth. III. 419. no. 50.
— *corymbosa* Pall. III. 422. no. 60.
— crassirostris Bnge. III. 411. no. 6.
— *Cretica maxima amplioribus foliis et floribus* Tourn. III. 409. no. 7.
— dasystachys Schrenk. III. 425. no. 77.
— densiflora Bth. III. 430. no. 100.
— *distans* Willd. III. 412. no. 14. γ.
— dolichorhiza Schrenk. III. 426. no. 81.
— *elata* Prsh. III. 430. no. 99.
— elata Willd. III. 429. no. 97.
— elephanthoides Bth. III. 413. no. 21.
— elephas Boiss. III. 414. no. 26.
— euphrasioides Stephan. III. 421. no. 60.
— exaltata D. Don. *III. 432.
— fasciculata Bellardi. III. 416. no. 37.
— *fasciculata* Bellardi. III. 425. no. 76. γ.
— *fasciculata* Pollini. III. 426. no. 79.
— *filicifolia* Adams. III. 429. no. 91.
— fissa Turczan. III. 424. no. 72.
— *flammea* Krok. III. 422. no. 62.
— flammea Linn. III. 427. no. 86.
— *flammea* Wulff. III. 428. no. 91.
— *flava* Ldb. III. 423. no. 66.
— flava Pallas. III. 423. no. 64.
— *flava* Sbthrp. et Sm. III. 424. no. 68.
— *flava β. Altaica* Bnge. III. 423. no. 66.
— *flava γ. conica* Bnge. III. 423. no. 66.
— *foliis angustissimis dentatis, floribus spicatis* Burm. IV. 144. no. 1. *a*.
— foliosa Linn. III. 429. no. 94.
— Friderici Augusti Tomassini. III. 426. no. 79.
  var. Montenegrina Ebel. III. 939.
— furfuracea Wall. III. 415. no. 28.
— *geminiflora* Portenschl. III. 416. no. 36.
— *genus montanum* Oed. III. 407. no. 1.
— *gladiata* Michx. III. 421. no. 59. β.
— gracilis Wall. III. 411. no. 7.
— Graeca Bnge. III. 424 no. 71.
— grandiflora Fischer. III. 431. no. 106.
— Groenlandica Retz. III. 420. no. 52.
— *gyroflexa* Rchb. III. 416. no. 34.
— gyroflexa Vill. III. 417. no. 40.
— *gyroflexa β.* Vill. III. 417. no. 39.
— *gyroflexa* Willd. III. 416. no. 37.
— Hacquetii Graff. III. 429. no. 95.
— *hamata* M. Bieb. III. 409. no 1.
— *heterophylla* Patrin. III. 422. no. 60.
— *hirsuta* All. III. 428. no. 87.
— hirsuta Linn. III. 427. no. 85.
— *hirsuta* Richards. III. 427. no. 84.
— Hookeriana Wall. III. 413. no. 19.

Pedicularis imbricata Pall. III. 423. no. 67. III. 424 no. 70.
— incarnata Jcq. III. 417. no. 41.
— *incarnata* Krok. III. 422. no. 62.
— *incarnata* Linn. III. 419. no. 47.
— *incarnata* Pall. III. 425. no. 73.
— *incarnata β. Groenlandica* Retz. III. 420. no. 52.
— interrupta Stephan. III. 410. no. 4.
— Jacquini Koch. III. 415. no. 31.
— labellata Jcq. III. 414. no. 25.
— *Labradorica* Linn. III. 422. no. 60.
— *laeta* Stev. III. 425. no. 73.
— *laevicaulis* Lang. III. 420. no. 54. *β.*
— *lanata* Hook. et Arn. III. 427. no. 84.
— lanceolata Michx. III. 431. no. 108.
— *lanigera* Wall. III. 411. no. 12.
— Langsdorffii Fisch. III. 427. no. 84.
β. elatior Hook. et Arn.
γ. lanata Hook. et Arn.
— Lapponica Linn. III. 419. no. 48.
— lasiostachys Ldb. III. 426. no. 80.
— leucodon Griseb. III. 425. no. 74.
— *longiflora* Rdlph. III. 413. no. 23.
— *Lusitanica* Lnk. et Hffmnsgg. III. 423. no. 63.
— Lusitanica Lnk. et Hffmnsgg. VI. 654. no. 1.
— *macrocarpos* Pall. III. 431. no. 103.
— *macrodontis* R. Br. III. 420. no. 55.
— *Mariana etc.* Pluken. III. 421. no. 59.
— megalantha D. Don. III. 413. no. 20.
— Mexicana Zucc. *III. 432.
— *minor* Riv. III. 423. no. 63.
— mollis Wall. III. 411. no. 13.
— myriophylla Pall. III. 410. no. 2.
— *mucida* C. Koch. III. 426. no. 79.
— *nasuta* Bngrd. III. 432.
— nasuta M. Bieb. III. 422. no. 61.
— *Nelsonii* R. Br. III. 432. no. 109.
— nudicaulis C. Koch. III. 432. no. 111.
— *obsoleta* Crntz. III. 429. no. 96.
— Olympica Boiss. III. 428. no. 89.
— *orientalis annua Psyllii folio, flore luteo* Tournef. III. 406. no. 22.
— *orientalis supina, folio trifido, flore magno flavescente* Tournef. III. 409. no. 1.
— Orizabae Cham. et Schlchtd. III. 430. no. 98.
— ornithorhynchus Bth. III. 415. no. 30.
— orthantha Griseb. III. 428. no. 90.
— orthostachys Griseb. *III. 432.
— *pallida* Nutt. III. 432. no. 108.
— *palustris* Hook. et Arn. III. 421. no. 55.
— palustris Linn. III. 420. no. 54.
δ. albiflora.
β. laevicaulis.
γ. minor.
Pedicularis palustris var. Willd. III. 421. no. 56.
— pectinata Wall. III. 411. no. 8.
— pedicellata Bnge. *III. 432.
— *Pennina* Gaud. III. 418. no. 42.
— *Persica* Willd. III. 413. no. 17.
— physocalyx Bnge. III. 423. no. 66.
— platyrhyncha Schrenk. *III. 432. III. 939. *III. 940.
— porrecta Wall. III. 411. no. 11.
— Portenschlagii Sauter. III. 416. no. 36.
— proboscoidea Stev. III. 418. no. 46.
— *procera* Adams. III. 424. no. 70.
— psylliifolia Poir. *III. 432.
— *punicea* Poll. III. 430. no. 97.
— punctata Dcne. III. 414. no. 24.
— *purpurascens* Cham. III. 427. no. 84.
— *purpurea* Bnge. III. 410. no. 2.
— *pyramidata* Pall. III. 424. no. 70.
— pyramidata Royle. III. 411. no. 9.
— Pyrenaica Gay. III. 416. no. 35.
— racemosa Dougl. III. 420. no. 53.
— *ramosa* Wormskiold. III. 422. no. 60.
— *recutita* Krok. III. 422. no. 62.
— recutita Linn. III. 429. no. 96.
— resupinata Linn. III. 418. no. 44.
— rhinanthoides Schrenk. III. 413. no. 22.
— *Romanzoffii* Cham. III. 409. no. 1.
— *rosea* Frivaldsk. III. 428. no. 90.
— *rosea* Ten. III. 426. no. 79.
— rosea Wulff. III. 427. no. 87.
— rostrata Gaudich. et Hall.? III. 416. no. 33.
— *rostrata* Guss. III. 426. n. 79.
— *rostrata* Jcq. III. 415. no. 31.
— rostrata Linn. III. 415. no. 32. et adn.
— *rubens* Bnge. III. 425. no. 75.
— rubens Stephan. III. 425. no. 76.
β. Alatavica Kar. et Kir.
γ. Europaea Bnge.
— *rubens γ. alpina* Bnge. III. 424. no. 72.
— *rubens β. desertorum* Bnge. III. 425. no. 73.
— *rubra* Güldenst. III. 411. no. 6.
— *rupestris* Turcz. III. 410. no. 2. *β.*
— *salina* Turcz. III. 424. no. 70.
— sceptrum Carolinum Linn. III. 431. no. 107.
— *serotina* Adams. III. 422. no. 62. *γ.*
— *serotina* Mühlnbrg. III. 432. no. 108.
— *seu Cristae galli affinis* etc. Pluken. III. 395. no. 15.
— Sibthorpii Boiss. III. 423. no. 68.
— siphonantha D. Don. III. 413. no. 18.
— Soongarica Schrenk. III. 423. no. 65.
— spicata Pall. III. 412. no. 15.

Pedicularis Stelleriana Pall. III. 432. no. 109.
— *Stevenii* Adams. III. 422. no. 62. δ.
— *Stevenii* Bnge. III. 412. no. 14. γ.
— striata Pall. III. 432. no. 110.
— *stricta* Wall. III. 411. no. 7.
— subrostrata C. A. Mey. III. 410. no. 5.
— Sudetica Willd. III. 422. no. 62.
δ. bicolor Stev.
β. macrodonta Kar. et Kir.
γ. lanata Stev.
— *sulphurea* Pall. III. 423. no. 64.
— *Summana* Pollini. III. 429. no. 94.
— surrecta Bth. III. 420. no. 51.
— sylvatica Linn. III. 422. no. 63.
— tanacetifolia Adams. III. 424. no. 73.
— *tenuifolia* Adams. III. 420. no. 54. γ.
— tenuirostris Bth. III. 411. no. 10.
— teucriifolia M. Bieberst. III. 418. no. 43.
— tripinnata Mart. et Galeotti. VI. 654. no. 2.
— tristis Linn. III. 430. no. 103.
— *tuberosa* All. III. 417. no. 37.
— tuberosa Linn. III. 417. no. 39.
— *tuberosa* Pall. III. 423. no. 67.
— *tuberosa* Pollini? III. 417. no. 38.
— *tuberosa* var. *rubriflora* Avé-Lallem. III. 416. no. 34.
— tubiflora Fisch. III. 413. no. 23.
— uliginosa Bnge. III. 425. no. 75.
— uncinata Stephan. III. 418. no. 47.
— venusta Schangin. III. 424. no. 70.
— *versicolor spicata* Tournef. III. 408. no. 6. β.
— versicolor Whlnbrg. III. 428. no. 91.
β. filicifolia Stev. III. 429. no. 91.
— verticillata Linn. III. 411. no. 14. (c. varr. α. β. et γ. p. 412.)
— *verticillata* Prsh. III. 432. no. 109.
— *verticillata* β. Willd. III. 410. no. 3.
— violascens Schrenk. *III. 432. III. 939. *III. 940.
— *Virginica* Poir. III. 432. no. 108.
— Wallichii Bnge. III. 415. no. 29.
— Wilhemsiana Stev. III. 430. no. 101.
— Wlassowiana Stev. III. 420. no. 55.
— Zeylanica Bth. III. 429. no. 92.
Pedunculares DC. (Diplopappus) II. 578.
Pedunculosae Bth. (Mimosae sect. I.) I. 868.
Pedunculosae Bth. (Mimosae sect. III.) I. 881.
Pedunculosae Bth. (Hyptis) III. 540.
Pee Inotà-Inodien Rheede. III. 26. no. 16.
Pectianga-pulpam Rheede. III. 289. no. 3.
Peganum Linn. I. 517.
— *crithmifolium* Eichwld. II. 824. no. 1. V. 394. no. 1.
— Harmala L. *I. 517. no. 2.
β. crithmifolium Retz. I. 517. no. 2.
Peganum Harmala β. DC. II. 824. no. 1. V. 394. no. 1.
— Nigellastrum Bnge. I. 517. no. 1.
Pegia Colebr. I. 550. V. 413.
— *Colebrookiana* Wght. I. 550. no. 1. V. 413. no. 1.
— nitida Colebr. *I. 550. no. 1. *V. 413. no. 1.
Pegolettia Cass. *II. 601. *II. 954. no. 1.
Pegolettia DC. (ex p.) *II. 954. no. 1.
— *baccharidifolia* Lssng. II. 974. no. 1.
Pegolettieae C. H. Schultz. II. 954.
Peixotoa Adr. Juss. °V. 249.
— cordistipula Adr. Juss. V. 251. no. 6.
— discolor Griseb. V. 254. no. 11.
— glabra Adr. Juss. V. 249. no. 1.
— hirta Mart. V. 251. no. 4.
— hispidula Adr. Juss. V. 250. no. 2.
— Jussieuana Mart. V. 252. no. 7.
— *lateritia* Adr. Juss. V. 251. no. 3.
— leptoclada Adr. Juss. V. 251. no. 5.
— macrophylla Griseb. V. 253. no. 9.
— parviflora Adr. Juss. V. 253. no. 10.
— reticulata Griseb. V. 250. no. 3.
— tomentosa Adr. Juss. V. 252. no. 8.
Pelaphia acerosa Soland. II. 463. no. 8.
Pelargonia acaulia tuberosa Autor. I. 451.
Pelargonia alchemilloidea DC. I. 457.
Pelargonia athamantoidea DC. I. 455.
Pelargonia bicolora DC. VI. 453.
Pelargonia fulgida DC. 453.
Pelargonia gibbosa I. 453.
Pelargonia pinguifolia DC. I. 457.
Pelargonia platypetala et anisopetala glaucescentia DC. I. 458.
— *tristia* DC. I. 453.
Pelargonium L'Hérit. I. 451. I. 820. V. 380.
Pelargonium L'Hérit. I. 458.
— Aloysianum Dehnh. I. 459. no. 141.
— alpinum Eckl. et Zeyh. I. 458. no. 132.
— *anceps* Ait. I. 456. no. 85.
— *anemonefolium* Jacq. I. 455. no. 75.
— *artemisiaefolium* DC. I. 456. no. 82.
— *athamanthoides* L'Hérit. I. 456. no. 78.
— Berterianum Spin. I. 459. no. 143.
— *bullatum* Jcq. I. 455. no. 73.
— Burdinii Colla. I. 459. no. 142.
— *candicans* Spreng. I. 455. no. 71.
— capitatum Eckl. et Zeyh. I. 458. no. 133.
β. sinuatum Eckl. et Zeyh. I. 459. no. 133.
— *ciliatum* L'Hérit. I. 452. no. 10.
— *columbinum* Jacq. I. 456. no. 91.
— crinitum N. ab E. V. 380. no. 2.
β. congestum.
— dichotomum Otto et Dietr. I. 459. no. 138.
— *elegantissimum* Colla. I. 450. no. 142.

Pelargonium Endlicherianum Fnzl. II. 820. no. 1.
— *eriostemon* Jacq. I. 456. no. 93.
— erodioides Hook. I. 459. no. 136.
— *foliis ferulaceis crispis* Burm. I. 454. no. 56.
— Hardenbergense Dehnh. I. 459. no. 139.
— *hirtum* Sweet. I. 455. no. 64.
— *humifusum* Willd. I. 456. no. 89.
— *incisum* Willd. I. 455. no. 60.
— *lacerum* Jacq. I. 456. no. 79.
— *laciniatum* Pers. I. 452. no. 14.
— littorale Endl. I. 459. no. 137.
— *longicaule* Jacq. I. 455. no. 74.
— meïfolium Meisn. V. 380. no. 1.
— micranthum Eckl. et Zeyh. I. 458. no. 131.
— mutabile Dehnh. I. 459. no. 140.
— *multicaule* Jcq. I. 455. no. 76.
— panduraeforme Eckl. et Zeyh. I. 459. no. 135.
— *parvulum* DC. I. 456. no. 92.
— populifolium Eckl. et Zeyh. I. 459. no. 134.
— *ramosissimum* Willd. I. 455. no. 63.
— *rapaceum* Jacq. I. 453. no. 34.
— *reniforme* Curt. I. 458. no. 121.
— Rodneyanum Lindl. II. 820. no. 2.
— Royal-George Hortul. I. 459. no. 144.
— *scandens* Ehrh. I. 457. no. 109.
— *scutatum* Sweet. I. 457. no. 101.
— *senecioides* L'Hérit. I. 456. no. 83.
— *tenuifolium* L'Hérit. I. 455. no. 65.
— *trifidum* Jacq. I. 455. no. 61.
— *triste β.* Sims. I. 454. no. 43.
Pelecynthis E. Mey. I. 579.
Pelecynthis E. Mey. II. 833.
— axillaris E. Mey. I. 580. no. 5.
— corymbosa E. Mey. I. 579. no. 2.
— dichotoma E. Mey. I. 580. no. 6.
— diffusa E. Mey. I. 580. no. 9.
— gibba E. Mey. I. 580. no. 7.
— opposita E. Mey. I. 579. no. 4.
— racemosa Wlprs. I. 579. no. 3.
— retroflexa E. Mey. I. 580. no. 8.
— rhomboidea E. Mey. I. 579. no. 1.
Pelecyphora C. Ehrnbrg. °V. 822.
— aselliformis C. Ehrnbrg. V. 822. no. 1.
Peliostomum Bth. III. 235. °III. 960. *VI. 641.
— leucorhizum E. Mey. III. 235. no. 2.
— origanoides E. Mey. III. 235. no. 5.
— virgatum E. Mey. III. 235. no. 4.
— viscosum E. Mey. III. 235. no. 3.
— scoparium E. Mey. 235. no. 1.
Pellacalyx Korthls. II. 375.
— .... Korthls. II. 375. no. 1.
Pelletiera St. Hil. *VI. 447.
Peltaria L. I. 146.
Peltaria Thunb. I. 191.
— alliacea L. *I. 146. no. 2.
— Aucheri Boiss. I. 146. no. 1.
— *Capensis* Thunb. I. 191. no. 16.
— *glastifolia* DC. I. 146. no. 1.
Peltodon Pohl. III. 522. °III. 978.
— longipes St. Hil. III. 523. no. 2.
— pusillus Pohl. III. 522. no. 1.
— radicans Pohl. III. 523. no. 3.
— tomentosus Pohl. III. 523. no. 4.
Peltogyne Vogel. I. 846.
— discolor Vogel. I. 846. no. 1.
— paniculata Bth. I. 846. no. 2.
— pubescens Bth. I. 846. no. 3.
Peltophorum Vogel. I. 811. V. 557.
— Vogelianum Wlprs. *I. 811. no. 1. V. 557. no. 1.
Peltostigma Wlprs. °V. 386.
— pteleoides Wlprs. *V. 387. no. 1.
Pemphis Forst. *II. 103.
Pennantia Forst. II. 829. V. 414.
— *corymbosa* Endl. II. 829. no. 2.
— corymbosa Forst. II. 829. no. 1.
— Endlicheri Reisseck. II. 829. no. 2.
— odorata Raoul. V. 414. no. 1.
Pennatae (Acacia) Bth. I. 916.
Pentacaena Bartl. I. 261.
— camphorosmoides Wlprs. I. 261. no. 2.
— polycnemoides Wlprs. I. 261. no. 4.
— ramosissima Bartl. *I. 261. no. 1.
— Rosetta Wlprs. I. 261. no. 3.
Pentacarya A. P. DC. *VI. 557.
Pentaceros F. W. Meyer. V. 112.
— aculeatus F. W. Meyer. V. 112. no. 1.
Pentachaeta Nutt. II. 593. *II. 952. no. 55. VI. 131.
— aurea Nutt. *II. 593. no. 1. VI. 131. no. 1.
Pentachondra R. Br. *II. 732.
Pentaclathra Bertoloni. V. 763.
— cucumerina Bertoloni. V. 763. no. 1.
Pentaclethra Bth. I. 857. °V. 577.
— brevifila Bth. I. 857. no. 2.
— filamentosa Bth. I. 857. no. 1.
— macrophylla Bth. I. 857. no. 3.
Pentacoryna DC. II. 511.
Pentacrypta Lehm. *II. 425.
Pentadesma G. Don. I. 396.
— butyracea G. Gon. *I. 396. no. 1.
Pentagonaster Kltzsch. II. 165.
— *Baxteri* Kltzsch. II. 165. no. 5. V. 741. no. 1.
Pentagonia Bth. °VI. 61.
— macrophylla Bth. VI. 61. no. 1.
Pentagonium Schauer. °VI. 488.
— flavum Schauer. VI. 488. no. 1.
Pentaloba Lour. I. 224.

Pentaloba Benghalensis Wall. I. 224. no. 2.
— lanceolata Wall. I. 224. no. 3.
— macrophylla Wall. I. 225. no. 5.
— Roxburghii Wall. I. 225. no. 6.
— sessilis Lour. I. 224. no. 4.
— Zeylanica Arn. I. 224. no. 2.
Pentalophus Alph. DC. * VI. 561.
(Pentamorpha Scheidw. * VI. 452.)
— *graveolens* Scheidw. V. 387. no. 1.
Pentanema Cass. * II. 601. * II. 953. no. 1. VI. 142.
— Aucheri Boiss. VI. 142. no. 3.
— divaricatum DC. * VI. 142. no. 1.
— multicaule Boiss. VI. 142. no. 2.
Pentanisia Harvey. II. 941. ° VI. 34.
— angustifolia Hochstett. VI. 35. no. 2.
— glaucescens Harv. * II. 941. no. 2.
— prunelloides Wlprs. * II. 941. no. 1.
  β. latifolia.
— *prunelloides* Wlprs. VI. 35. no. 1.
— variabilis Harvey. VI. 35. no. 1.
  β. latifolia.
Pentanthus Hook. et Arn. * II. 682. * VI. 322.
Pentapeltis Endl. II. 386.
Pentapeltis Endl. ° V. 842.
— peltigera Bnge. * V. 842. no. 1.
Pentapera Kltzsch. II. 728.
— Sicula Kltzsch. * II. 728. no. 1.
Pentapetes L. I. 349.
— angustifolia Blume. I. 349. no. 1.
— *suberifolia* Linn. I. 350. no. 2. V. 114. no. 1.
Pentaphragma Wall. * II. 711. * II. 713. * VI. 387.
Pentaptera Rxb. II. 62.
— abjuna Rxb. II. 62. †
— alata Bnks. II. 62. no. 2.
— angustifolia Rxb. II. 62. no. 3.
— coriacea Rxb. II. 62. no. 7.
— crenulata Rxb. II. 62. no. 4.
— *crenulata* Rth. II. 62. no. 5.
— *cuneata* DC. II. 62. no. 5.
— *cuneata* Rth. II. 62. no. 5.
— glabra Rxb. * II. 62. no. 5.
— Maradu G. Don. II. 62. no. 1.
— *obovata* DC. II. 62. no. 5.
— paniculata Rxb. II. 62. no. 8. (cum varr. α. et β. ibid.)
— tomentosa Rxb. * II. 62. no. 6.
Pentapterys Adr. Juss. V. 318.
Pentarhaphia Dcne. * VI. 734.
— albiflora Dcne. VI. 735. no. 5.
— calycosa Dcne. VI. 735. no. 1.
— catalpaeflora Dcne. VI. 735. no. 3.
— Craniolaria Dcne. VI. 735. no. 2.
— Cubensis Dcne. VI. 736. no. 14.
Pentarhaphia exserta Dcne. VI. 736. no. 9.
— florida Dcne. VI. 736. no. 11.
— Herminieri Dcne. VI. 736. no. 12.
— Lessertiana Dcne. VI. 735. no. 4.
— Lindleyana Dcne. VI. 735. no. 7.
— montana Dcne. VI. 736. no. 10.
— parviflora Dcne. VI. 735. no. 6.
— pedunculosa Dcne. VI. 736. no. 15.
— Swartzii Dcne. VI. 735. no. 8.
— verrucosa Dcne. VI. 736. no. 13.
Pentarrhinum E. Mey. VI. 486.
— Abyssinicum Dcne. * VI. 486. no. 1.
Pentas Bth. ° VI. 57.
— carnea Bth. VI. 57. no. 1.
— elatior Bth. VI. 57. no. 3.
— parviflora Bth. VI. 57. no. 2.
—? Thonningii Wlprs. VI. 58. no. 4.
Pentasachme Wall. VI. 493.
— Wallichi Wght. * VI. 493. no. 1.
Pentatropis R. Br. * VI. 485.
Penthorum Linn. * II. 264.
Pentodon Hochstett. ° VI. 53.
— Abyssinicus Hochstett. VI. 54. no. 2.
— decumbens Hochstett. VI. 54. no. 1.
Pentopetia Dcne. VI. 481.
— androsaemifolia Dcne. * VI. 481. no. 1.
Pentotis Torr. et Gr. II. 501.
Pentstemon L'Hérit. III. 241. III. 936. ° III. 961. VI. 639.
— acuminatus Dougl. III. 246. no. 27.
— albidus Nutt. III. 241. no. 3.
— alpinus Torr. III. 251. no. 59.
— *angustifolius* Lindl. III. 245. no. 24.
— argutus Paxton. III. 251. no. 58. III. 936. * 937.
— atropurpureus G. Don. III. 147. no. 34.
— attenuatus Dougl. III. 243. no. 11.
— barbatus Nutt. III. 248. no. 41. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *Bradburii* Prsh. III. 246. no. 25.
— breviflorus Lindl. III. 244. no. 17.
— campanulatus Willd. III. 247. no. 33.
— *campanulatus β. angustifolius* Hook. III. 247. no. 32.
— centranthifolius Bth. III. 248. no. 42. * III. 937.
— Cobaea Nutt. III. 246. no. 29. * III. 936.
— coeruleus Nutt. III. 241. no. 2.
— confertus Dougl. III. 242. no. 7.
— *connatus* Deppe. III. 936.
— cordatus Bth. III. 249. no. 43.
— cordatus Mart. et Gal. VI. 639. no. 1.
— cordifolius Bth. III. 244. no. 15.
— crassifolius Lindl. III. 250. no. 51. * III. 937. VI. 640. †
— cristatus Fraser. III. 241. no. 1.

Pentstemon decussatus Dougl. *III. 937.
— denticulatus Van Houtte. *III. 937.
— deustus Dougl. III. 243. no. 12.
— diffusus Dougl. III. 243. no. 13.
— Digitalis Nutt. III. 246. no. 30.
— dissectus Ell. II. 250. no. 49.
— Douglasii Hook. III. 251. no. 55.
— *elegans* G. Don. III. 245. no. 23.
— *erianthera* Nutt. III. 249. no. 45.
— formosus Thomps. *III. 938.
— frutescens Lamb. III. 250. no. 53.
— Gairdneri Hook. III. 251. no. 56.
— gentianoides Lindl. III. 247. no. 35. *III. 937.
β. diaphanus G. Don. VI. 640. †
β. splendens Paxton. III. 937.
— giganteus Morren. VI. 745. no. 2.
— glaber Prsh. III. 249. no. 45.
— glandulosus Dougl. III. 249. no. 46.
— glaucus Grab. III. 243. no. 10.
— *gracilis* Hook. III. 243. no. 10.
— gracilis Nutt. III. 244. no. 18.
— grandiflorus Fraser. III. 246. no. 25.
— Hartwegi Bth. III. 248. no. 37.
— heterophyllus Lindl. III. 249. no. 44.
— hirsutus Will. III. 245. no. 22.
— Humboldtii G. Don. III. 248. no. 40.
— Kunthii G. Don. III. 247. no. 32.
— laevigatus Ait. III. 245. no. 21.
— lanceolatus Bth. III. 248. no. 38.
— lancifolius Van Houtte. *III. 938.
— laricifolius Hook. et Arn. III. 247. no. 31.
— Mackayanus Knwls. et Westsc. III. 245. no. 20.
— Menziesii Hook. III. 250. no. 54.
— *Mexicanus* Hortul. III. 251. no. 1.
— micranthus Nutt. III. 242. no. 8.
— miniatus Lindl. VI. 746. no. 3.
— Murrayanus Hook. III. 248. no. 36. *III. 937.
— ovatus Dougl. III. 242. no. 5. *VI. 745. no. 1.
— perfoliatus A. Brogniard. III. 936.
— *perfoliatus* Brogn. VI. 639. no. 1.
— *primulinus* Van Houtte. III. 938.
— procerus Dougl. III. 242. no. 6.
— pruinosus Dougl. III. 243. no. 9.
— pubescens Ait. III. 244. no. 19.
— pubescens Van Houtte. *III. 938.
— *pubescens β. angustifolius* Martyn et Mill. III. 245. no. 22.
— pulchellus Lindl. III. 245. no. 23.
— pumilus Nutt. III. 246. no. 28.
— Richardsonii Dougl. III. 249. no. 48.
— rivularis Dougl. III. 937.
— roseus G. Don. III. 245. no. 24.
— Scouleri Dougl. III. 250. no. 50.
Pentstemon serrulatus Menzies. III. 251. no. 57.
— speciosus Dougl. III. 246. no. 26. *III. 936.
— splendens Van Houtte. *III. 938.
— staticifolius Lindl. III. 243. no. 14.
— suffruticosus Dougl. *III. 938.
— tenuifolius Bth. III. 248. no. 39.
— Tolmiei Hook. III. 250. no. 52.
— triphyllus Dougl. III. 244. no. 16.
— tubiflorus Nutt. III. 242. no. 4.
— venustus Dougl. III. 249. no. 47.
— verticillatus Mart. et Gal. VI. 640. no. 2.
Pentzia Thnbrg. *II. 642. VI. 225.
— *annua* DC. VI. 196. no. 3.
— *cotuloides γ. trifurcata* C. H. Schultz. VI. 225. no. 1.
— *dichotoma* DC. VI. 197. no. 4.
— trifurcata C. H. Schultz. VI. 225. no. 1.
Pentzioides C. H. Schultz. VI. 196.
Peplidium Delile. III. 291. °III. 965. *VI. 644.
— *Capense* Spr. III. 334. no. 1.
— humifusum Delile. III. 291. no. 1.
Peplis L. II. 101.
— alternifolia M. B. *II. 101. no. 1.
— *australis* Gay. V. 674. no. 2.
— *biflora* Salzm. V. 674. no. 2.
— *Borysthenica* M. Bieb. V. 674. no. 1.
—? *diandra* Nutt. II. 101. no. 1.
— *erecta* Auctor. V. 674. no. 2.
—? *occidentalis* Spr. II. 102. no. 10.
Peplonia Dcne. *VI. 486.
Peragu Rheede. IV. 106. no. 29. IV. 108. no. 43.
Peraltea H. B. Kth. *I. 678.
Perama Aubl. II. 467. (*IV. 134.) VI. 31.
— dichotoma Poepp. et Endl. II. 468. no. 4.
— ericoides Poepp. et Endl. II. 468. no. 5.
— galioides Poir. II. 468. no. 3.
— hirsuta Aubl. II. 467. no. 1.
— hispida Poir. II. 467. no. 2.
— humilis Bth. II. 468. no. 7.
— setulosa Miquel. VI. 31. no. 1.
— stricta Bth. II. 468. no. 6.
Peramibus Raf. *II. 613.
— *hirtus* Rafin. VI. 159. no. 1.
Peraphyllum Nutt. II. 56. V. 660.
— ramosissimum Nutt. *II. 56. no. 1. V. 660. no. 1.
Perdicium Lag. *II. 680. *VI. 319.
— *anandria* R. Br. VI. 316. no. 18.
— *lactucoides* Vahl. VI. 324. no. 5.
— *laevigatum* Bnks. et Soland. VI. 324. no. 5.
— *sinuatum* Bnks. et Soland. VI. 323. no. 1.
Pereskia Plum. II. 355.

Pereskia acardia Parm. II. 355. no. 1. γ.
— aculeata Plum. II. 355. no. 1.
δ. lanceolata Pfeiff.
γ. rotundifolia Dyck.
β. rubescens Pfeiff.
— Bleo DC. II. 256. no. 4.
— *Brasiliensis* H. Hamb. II. 356. no. 1. δ.
— crassicaulis Zucc. II. 356. no. 2.
— *cruenta* Hort. II. 356. no. 4.
— glomerata Pfeiff. II. 356. no. 12.
— *grandiflora* Hort. II. 356. no. 5.
— grandifolia Haw. II. 356. no. 5.
— horrida DC. DC. II. 356. no. 11.
— *longispina* Haw. II. 356. no. 1. δ.
— lychnidiflora DC. II. 356. no. 7.
— ochnacarpa Miquel. II. 356. no. 14.
— opuntiaeflora DC. II. 356. no. 8.
— Pititache Karw. II. 356. no. 3.
—? plantaginea Hort. Goetting. *II. 356. no. 13.
— portulacaefolia DC. II. 356. no. 10.
— rotundifolia DC. II. 356. no. 9.
— spathulata Otto. II. 356. no. 2.
— zinniaeflora DC. II. 356. no. 6.
Perezia Lag. *II. 683. II. 992. *VI. 323.
— *bidentata* Meyen. VI. 324. no. 3.
— *diversifolia* Meyen. VI. 323. no. 3.
— *glandulosa* Meyen. VI. 323. no. 2.
— *lactucoides* Lssng. VI. 324. no. 5.
— recurvata Lssng. *II. 992. no. 1.
Perforaria Choisy. II. 808. no. 21. 22. 23.
Pergularia Linn. *VI. 492.
— edulis Thnbrg. VI. 492. no. 1.
Pergulariae Dcne. VI. 491.
Periandra Mart. I. 756.
— acutifolia Bth. I. 756. no. 6.
— angulata Bth. I. 756. no. 2.
— Berteriana *I. Bth. 756. no. 8.
— coccinea Bth. *I. 756. no. 7.
— densiflora Bth. I. 756. no. 9.
— dulcis Mart. I. 756. no. 3.
β. angustifolia.
— heterophylla Bth. I. 756. no. 5.
— mucronata Mart. I. 756. no. 4.
— racemosa Bth. I. 756. no. 1.
Perianthopodus Silva Manso. °V. 764.
— Carijo Silva Manso. V. 764. no. 3.
— Espelina Silva Manso. V. 764. no. 1.
— Tomba Silva Manso. V. 764. no. 2.
Periblema A. P. DC. *VI. 516.
Pericallis B. Webb. VI. 253.
— *cruenta* B. Webb. VI. 253. no. 5.
— *echinata* B. Webb. VI. 253. no. 4.
— *multiflora* B. Webb. VI. 266. no. 55.
— *papyracea* B. Webb. VI. 253. no. 6.
— *populifolia* B. Webb. VI. 266. no. 56. β.
Pericallis Tussilaginis B. Webb. VI. 253. no. 2.
Pericalymma Endl. II. 166. V. 740.
— crassipes Lehm. V. 740. no. 1.
— ellipticum Endl. II. 166. no. 1.
— floridum Schauer. V. 740. no. 2.
Periclistia Bth. °V. 407.
— latifolia Bth. V. 407. no. 1.
— longifolia Bth. V. 407. no. 2.
Periclymeni similis myrtifolia arbor Maderaspatensis Pluken. IV. 112. no. 58.
Periclymenum Tournef. II. 448.
— *rectum Salviae folio etc.* Sloane. IV. 66. no. 36.
— *rectum humilius* Sloane. IV. 62. no. 14.
— *rectum humilius etc.* Sloane. IV. 62. no. 19.
Perideraea fuscata B. Webb. II. 634. no. 1.
Perideridia Rchb. *II. 426.
Periglossum Dcne. *VI. 483.
Perilla Linn. III. 585. °III. 979.
— *elata* D. Don. III. 582. no. 5.
— *fruticosa* D. Don. III. 581. no. 3.
— *leptostachya* D. Don. III. 582. no. 6.
— ocymoides Linn. III. 585. no. 1.
— *polystachya* D. Don. III. 577. no. 5.
Perilomia H. B. Kth. III. 762. °III. 984.
— *cordifolia* Schlchtd. VI. 673. no. 5.
— dubia Spr. III. 763. no. 5.
— fruticosa Schiede et Deppe. III. 763. no. 3.
— ocymoides H. B. Kth. III. 763. no. 2.
— scutellarioides H. B. Kth. III. 762. no. 1.
— tomentosa Bth. III. 763. no. 4.
Perim Tolassi Rheede. III. 504. no. 13.
Periphragmos foetidus Rz. et Pav. III. 123. no. 1.
Periploca Linn. *VI. 481.
— *capsularis* Forst. VI. 470. no. 1.
Periploceae R. Br. VI. 479.
Peristera DC. I. 456. V. 380.
— althaeoides Eckl. et Zeyh. I. 456. no. 84.
— anceps Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 85.
— columbina Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 91.
— grossularioides Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 86.
— humifusa Eckl. *I. 456. no. 89.
— Jocasta Eckl. et Zeyh. I. 456. no. 90.
— nummulariaefolia Eckl. et Zeyh. I. 456. no. 87.
— parvula Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 92.
— procumbens Eckl. et Zeyh. *I. 456. no. 88.
Peritoma DC. I. 194.
— *aurea* Torr. et Gr. I. 194. no. 11.
— *integrifolia* Nutt. I. 194. no. 10.
— *serrulata* Nutt. I. 194. no. 9.
Perittium ferrugineum Vogel. I. 845. no. 1. V. 570. no. 1.

Perityle Bth. °VI. 125.
— Californica Bth. VI. 125. no. 1.
— microglossa Bth. VI. 125. no. 2.
Perizoma Miers. VI. 613.'
Perlarius alter Rmph. III. 124. no. 1.
Pernettya Gaudich. III. 726. VI. 416.
— angustata Bth. VI. 416. no. 1.
— buxifolia Mart. et Gal. II. 726. no. 1.
— *empetrifolia* Gaudich. VI. 417. no. 4. β.
— mucronata Gaudich. II. 726. † *VI. 416. no. 3.
— parvifolia Bth. VI. 416. no. 2.
— pumila Hook. VI. 417. no. 4.
β. empetrifolia.
α. minor.
— *pumila* Hook. VI. 417. no. 4. α.
— *serpyllifolia* DC. VI. 417. no. 1.
Perojoani DC. VI. 427.
Peronema W. Jack. IV. 3.
— canescens W. Jack. IV. 3. no. 1.
Perotriche Cassini. *II. 648.
Perovskia Karelin. III. 772. °III. 985.
— abrotanoides Karelin. *III. 772. no. 1.
Perpauticum chaelaefide Pluk. II. 241. no. 4.
Perpensum blitispermum Burm. II. 100. no. 2.
Perreymondia Barnéoud. °V. 51.
— Brogniartii Barnéoud. V. 51. no. 4.
— dentata Barnéoud. V. 51. no. 1.
— multifida Barnéoud. V. 51. no. 3.
— rupestris Barnéoud. V. 51. no. 2.
Perrottetia H. B. Kth. I. 539.
— Quindensis H. B. Kth. *I. 539. no. 1.
Persica Tournef. II. 8.
— *amygdaloides* C. Bauh. II. 909. no. 8. δ.
— *nana* Mill. II. 907. no. 4.
Persicaria Dunal. III. 68.
Pervillaea Dcne. VI. 492.
— tomentosa Dcne. *VI. 492. no. 1.
Perymenium Schrad. *II. 619.
Peschiera Alph. DC. VI. 469.
— tenuiflora Poepp. et Endl. VI. 469. no. 1.
Petagnia Guss. *II. 387.
Petalacte Don. *II. 649. VI. 249.
— *bicolor* Don. VI. 249. no. 1. β.
— coronata Don. *VI. 249. no. 1.
γ. eriosphaeroides } C. H. Schultz.
β. bicolor }
Petalanthera hispida Nutt. II. 228. no. 1.
Petalolepis DC. VI. 238. no. 1.
Petaloma alternifolia Rxb. II. 63. no. 4.
— *Domingensis* Tussac. II. 149 no. 1.
Petalostemon L. C. Rich. I. 651.
— amethystinum Schott. I. 652. no. 11.
— *carneum* Ell. I. 652. no. 8. β.
— carneum Michx. *I. 652. no. 8.
β. carneum Torr. et Gr.
Petalostemon decumbens Nutt. I. 652. no. 9.
— emarginatum Torr. et Gr. I. 652. no. 10.
— gracile Nutt. I. 651. no. 1.
— griseum Torr. et Gr. I. 651. no. 4.
— *Jamesii* cf. *Psoralea Jamesii* Torr. et Gr.
— macrostachyum Torr. I. 651. no. 3.
— multiflorum Nutt. I. 651. no. 2.
— obovatum Torr. et Gr. I. 651. no. 6. (III. Emend. p. 3.)
— phleoides Torr. et Gr. I. 651. no. 5. (III. Emend. p. 3.)
β. microphyllum.
— *roseum* Nutt. I. 652. no. 8.
— violaceum Michx. *I. 652. no. 7.
Petalotoma DC. *II. 193.
Petasiteae DC. II. 557.
Petasites Tournef. *II. 557.
— *agrestis* Rmph. IV. 107. no. 37. IV. 108. no. 43.
Petasodes Spr. I. 30.
Petasostylis Griseb. VI. 503.
— nigrescens Griseb. *VI. 503. no. 1.
Petesia Bartl. II. 516.
— carnosa Hook. et Arn. II. 516. no. 1.
—? coriacea Hook. et Arn. II. 516. no. 3.
—? terminalis Hook. et Arn. II. 516. no. 2.
Petitia Jcq. IV. 71.
— Domingensis Jcq. IV. 71. no. 2.
— Quinduensis H. B. Kth. IV. 71. no. 1.
— *scabra* Gay. II. 403. no. 1.
— *tenuifolia* Willd. IV. 72. no. 2.
Petraea Jcq. IV. 70. VI. 690.
— arborea H. B. Kth. IV. 70. no. 2.
— bracteata Steudel. IV. 70. no. 3.
— denticulata Schrader. IV. 71. no. 8.
— Kohautiana Prsl. VI. 690. no. 3.
— macrostachya Bth. IV. 71. no. 6.
— *Mexicana* Willd. IV. 70. no. 4. β.
— obtusifolia Bth. VI. 690. no. 2.
— ovata Martens et Galeotti. VI. 690. no. 1.
— racemosa N. ab E. IV. 70. no. 5.
— rugosa H. B. Kth. IV. 70. no. 1.
— *serrata* Prsl. VI. 690. no. 4.
— *Stapelsiae* Paxton. IV. 70. no. 4. γ.
— subserrata Cham. IV. 71. no. 7. *VI. 690. no. 4.
— *volubilis* Arrabida. IV. 71. no. 7.
— volubilis Jcq. IV. 70. no. 4.
γ. Guianensis Schlchtd.
β. Mexicana Schiede.
Petrobium R. Br. *II. 603.
Petrocallis R. Br. I. 147.
— Pyrenaica R. Br. *I. 147. no. 1.
Petrocarvi Tsch. II. 425.
— Cretense Tsch. *II. 425. no. 1.
Petrocarya W. Jack. II. 7.

Petrocarya excelsa W. Jack. II. 7. no. 1.
Petrocoptis A. Braun. I. 281.
— Pyrenaica A. Braun. *I. 281. no. 1.
Petrogeton Eckl. et Zeyh. II. 252.
— *alpinum* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 6.
— *dentatum* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 5.
— *nemorosum* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 7.
— *nivale* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 8.
— *patens* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 3.
— *typicum* Eckl. et Zeyh. II. 252. no. 2.
— *Umbella* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 4.
Petromarula Alph. DC. *II. 710. * VI. 383.
Petrophyes B. Webb et Berthelot. °V. 805.
— agriostaphis B. Webb et Berthelot. V. 806. no. 3.
— brachycaulon B. Webb et Berthelot. V. 805. no. 2.
— polyphyllum B. Webb et Berthelot. V. 805. no. 1.
Petrophytum Nutt. II. 51.
Petroselinum Hffm. II. 391. II. 937. V. 848.
— dissectum Bth. V. 848. no. 1.
— humile Meisn. II. 937. no. 1.
— *prostratum* Bnge. V. 849. no. 2.
— protractum DC. *II. 391. no. 1.
— *sativum* Hook. et Gill. II. 403. no. 13.
— segetum Koch. *V. 849. no. 4.
— Thoermeri Weinm. V. 849. no. 3.
— trifoliatum Watson. V. 849. no. 2.
Petunga DC. *II. 516.
Petunia Juss. III. 6. °III. 953. °VI. 569.
— *acuminata* Grah. III. 11. no. 25.
— caesia Sendtner. VI. 570. no. 4.
— calycina Sendtner. V. 570. no. 3.
— *cirrhoides* Miers. VI. 572. no. 3.
— dichotoma Sendtner. VI. 570. no. 2.
— elegans Miers. VI. 571. no. 14. (c. var. β. ibid.)
— helianthemoides Sendtner. VI. 570. no. 6.
— heterophylla Sendtner. VI. 571. no. 10.
— intermedia G. Don. III. 7. no. 3. *III. 933.
— ledifolia Sendtner. VI. 571. no. 11.
— *linearis* Paxton. III. 933.
— linoides Sendtner. VI. 570. no. 5.
β. villosa.
— *Mendozinensis* Gill. VI. 569. no. 12. *a.*
— nyctaginiflora Juss. III. 6. no. 1. *III. 933.
— ovalifolia Miers. VI. 571. no. 13.
— parviflora Juss. III. 7. no. 2.
— propinqua Miers. VI. 570. no. 1.
— Sellowiana Sendtner. VI. 571. no. 9.
— serpyllifolia Sendtner. VI. 571. no. 7.
— thymifolia Sendtner. VI. 571. no. 8.
— violacea Lindl. III. 7. no. 4. *III. 933.
β. Atkinsiana.
— viscidula Miers. VI. 571. no. 12.
Petunia viscosa Miers. III. 126. no. 5.
Petunioides G. Don. III. 10. VI. 572. no. 3.
Peucedaneae DC. II. 407. V. 873.
Peucedanum DC. II. 409. V. 882.
Peucedanum Linn. II. 409. II. 938. V. 882.
— *album* Spr. V. 882. no. 3.
— ambiguum Nutt. II. 411. no. 24.
— Aucheri Boiss. V. 885. no. 15.
— *aureum* Bot. Reg. V. 878. no. 4.
— *aureum* Soland. V. 865. no. 1.
— Caledonicum Eckl. et Zeyh. II. 410. no. 11.
— canescens Ldb. II. 409. no. 3.
— *canescens* Ldb. V. 877. no. 2.
— Capense Eckl. et Zeyh. II. 411. no. 20.
— carvifolium Torr. et Gr. II. 412. no. 31.
— *carvifolium* Vill. V. 880. no. 2.
— cephalotes Boiss. V. 884. no. 12.
— cervariaefolium C. A. Mey. II. 410. no. 16.
— *Chabraei* Gaud. V. 880. no. 2.
— *chaerophylloides* Lssng. V. 870. no. 1.
— *Creticum* Linn. II. 413. no. 1.
— *daucifolium* Nutt. II. 412. no. 28.
— dissectum Ldb. II. 409. no. 2.
— *distans* Griseb. V. 880. no. 1.
— dubium Ldb. II. 409. no. 6.
— *dubium* Ldb. V. 878. no. 5.
— Ecklonis Wlprs. II. 410. no. 14.
— elatum Ldb. II. 409. no. 1.
— elongatum E. Mey. II. 938. no. 1.
— falcaria Turcz. II. 410. no. 15.
— ferulaceum Eckl. et Zeyh. *II. 410. no. 12.
— *feruloides* Steudel. V. 878. no. 6.
— foeniculaceum Nutt. *II. 412. no. 28.
β. daucifolium.
γ. tomentoso-pubescens.
— gracile Ldb. II. 409. no. 4.
— *gracile* Ldb. V. 878. no. 5.
— graminifolium Boiss. V. 884. no. 13.
— Hispanicum Endl. II. 411. no. 21.
— *humile* Turcz. V. 882. no. 3.
— Hystrix Bnge. II. 410. no. 17.
— laevigatum Nutt. II. 411. no. 26.
— latevittatum Fisch. Mey. et Lallem. V. 882. no. 4.
— latifolium Nutt. II. 411. no. 22.
— Ledebourii G. Don. II. 409. no. 8.
— leiocarpum Nutt. II 411. no. 23.
β. campestre.
— *leptocarpum* Nutt. II. 411. no. 25. *β.*
— *ligusticoides* Lssng. V. 870. no. 1.
— macrocarpum Nutt. II. 412. no. 29.
— macrocoleum Boiss. V. 882. no. 7.
— membranaceum Boiss. V. 884. no. 14.
— *microphyllum* Sm. V. 882. no. 3.
— *minus* All. V. 880. no. 2.
— *Morisoni* Bess. II. 405. no. 1.

Peucedanum nudicaule Nutt. II. 411. no. 27.
— Nuttallii Wlprs. *II. 411. no. 25.
β. leptocarpum.
— *obtusifolium* Sbthrp. et Sm. V. 887. no. 5.
— *officinale* Bess. V. 898. no. 1.
— *officinale* Gorter. V. 870. no. 1.
— *officinale* Ldb. II. 409. no. 8.
— orientale Boiss. V. 882. no. 6.
— paniculatum Ldb. II. 409. no. 5.
— *paniculatum* Ldb. V. 878. no. 6.
— parvifolium Nutt. II. 412. no. 30.
— petiolare Boiss. V. 883. no. 10.
— polyphyllum Ldb. II. 410. no. 18.
β. glabrum.
γ. lineare.
α. pubescens.
— polyscias Boiss. V. 884. no. 11.
— *puberulum* Turcz. V. 882. no. 2.
— *pyramidatum* Karel. et Kiril. V. 878. no. 6.
— rigidum Bnge. II. 409. no. 9.
— *rigidum* Eckl. et Zeyh. II. 410. no. 14.
— salinum Pall. *V. 882. no. 3.
— Schlechtendalii Boiss. V. 883. no. 8.
— seseloides Ldb. *V. 882. no. 1.
— *seseloides* Turczan. V. 882. no. 2.
— *Soongaricum* G. Don. II. 409. no. 5. V. 878. no. 6.
— Stadense Eckl. et Zeyh. II. 409. no. 10.
— stenocarpum Boiss. et Reuter. V. 883. no. 9.
— *Tauricum* Hort. Paris. V. 869. no. 1.
— *ternatum* Nutt. V. 862. no. 1.
— triternatum Eckl. et Zeyh. II. 410. no. 13.
— *triternatum* Nutt. II. 411. no. 25.
— uliginosum Eckl. et Zeyh. II. 410. no. 19.
β. glaucum II. 411. no. 19.
— utriculatum Nutt. II. 412. no. 32.
— vaginatum Ldb. II. 409. no. 7. *V. 882. no. 2.
β. pumilum V. 882. no. 2.
— varium Fisch. Mey. et Lallem. V. 882. no. 5.
— *verticillare* Koch. V. 881. no. 1.
— *virgatum* Cham. et Schlchtd. II. 413. no. 2.
Pevetti Rheede. III. 22. no. 1. *α.*
Peyrousea DC. II. 638.
Pfeiffera S. Dyck. °V. 821.
— cereiformis S. Dyck. V. 821. no. 1.
Phaca Linn. I. 684. II. 860. V. 517.
— abbreviata Ldb. I. 684. no. 2.
— aboriginorum Hook. I. 686. no. 23.
— argophylla Nutt. I. 689. no. 49.
— Arnottiana Gill. I. 687. no. 29.
— *australis β. Altaica* DC. I. 697. no. 27.
Phaca Baetica L. *I. 684. no. 1.
— Berteriana Moris. I. 686. no. 16.
— bisulcata Hook. I. 688. no. 40.
— brachycarpa Turczan. I. 685. no. 5.
— bracteosa Kar. et Kir. I. 685. no. 6.
— caespitosa Nutt. I. 690. †
— *campestris β. sordida* Whlnbrg. II. 862. no. 9. *β.*
— canescens Hook. et Arn. I. 687. no. 31.
— *canescens* Nutt. I. 685. no. 11.
— candidissima Bth. V. 517. no. 1.
— Chamissonis Vogel. I. 686. no. 13.
— Chilensis N. ab E. I. 686. no. 14.
— chrysantha Moris. I. 686. no. 15.
— collina Hook. I. 688. no. 33.
— Coquimbensis Hook. et Arn. I. 686. no. 18.
— Cruckschanksii Hook. et Arn. I. 688. no. 41.
— carinata Hook. et Arn. I. 688. no. 42.
— debilis Nutt. I. 686. no. 22.
— densifolia Sm. *I. 685. no. 11.
— Douglasii Torr. et Gr. I. 687. no. 26.
— elata Hook. et Arn. I. 687. no. 30.
— elegans Hook. I. 686. no. 21.
β. minor.
— elongata Hook. I. 688. no. 35.
β. minor.
— elongata Mart. et Galeotti. II. 861. no. 2. (V. 517. no. 3.)
—? flava Hook. et Arn. I. 689. no. 48.
— flexuosa Hook. I. 688. no. 36.
— frigida L. *I. 685. no. 12.
β. Americana Hook.
γ. littoralis Hook.
— glabriuscula Hook. I. 687. no. 27.
— Hookeriana Torr. et Gr. I. 685. no. 8.
— inflata Gill. I. 686. no. 17.
— *inflata* Nutt. I. 685. no. 9.
— leucophylla Hook. et Arn. I. 687. no. 25.
— longifolia Nutt. *I. 687. no. 28.
— lotiflora Hook. I. 689. no. 43.
— macrodon Hook. et Arn. I. 687. no. 24.
— macrostachys Turczan. I. 684. no. 3.
— megacarpa Nutt. I. 685. no. 7. (III. Emend. p. 3.)
— mollissima Nutt. I. 689. no. 45.
— neglecta Torr. et Gr. I. 686. no. 20.
— *nigrescens* Hook. I. 711. no. 2.
— nubigena Meyen. I. 686. no. 19.
— Nuttallii Torr. et Gr. I. 685. no. 9.
— ochroleuca Hook. et Arn. I. 689. no. 47.
α. glabriuscula.
β. tota sericeo-pilosa.
— parviflora Nutt. I. 688. no. 37. (III. Emend. p. 3.)
— parviflora Turczan. I. 685. no. 4.

Phaca parvifolia Nutt. I. 688. no. 39. (III. Emend. p. 3.)
— pauciflora Nutt. I. 688. no. 38. (III. Emend. p. 3.)
— pectinata Hook. I. 687. no. 32. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *pectinata* Hook. II. 866. no. 23.
— podocarpa Hook. I. 688. no. 34.
— pygmaea Nutt. I. 689. no. 44.
— sericea Nutt. I. 689. no. 50.
— simplicifolia Nutt. I. 689. no. 46.
— *sordida* Whlnbrg. II. 862. no. 9. β.
— trichopoda Nutt. I. 685. no. 10.
— trigonocarpa Turczan. II. 860. no. 1.
— *Uralensis* Whlnbrg. II. 862. no. 11.
— vestita Bth. V. 517. no. 2.
Phacelia Juss. VI. 525.
— distans Bth. VI. 525. no. 1.
— vitifolia Paxton. * VI. 525. no. 2.
Phacocapnos Bernh. I. 118.
— cracca Bernh. *I. 118. no. 1.
Phaecasium Rchb. II. 698.
Phaelypea erecta, foliis sessilibus angustis etc. P. Br. III. 269. no. 26.
Phaenactis Nutt. II. 580.
Phaenocoma Don. *II. 649.
Phaenopus Cass. II. 693.
Phaenopus DC. *VI. 358.
Phaeocarpus campestris Mart. et Zucc. I. 422. no. 2.
Phaeopappus Boiss. °VI. 291.
— carthamoides Boiss. VI. 291. no. 5.
— leuzeoides Boiss. VI. 291. no. 3.
— macrocephalus Boiss. VI. 291. no. 4.
— spectabilis Boiss. VI. 291. no. 2.
— Szowitsii Boiss. VI. 291. no. 1.
Phaeostoma Douglasii Spach. II. 89. no. 2.
Phagnalon Cass. *II. 595. *II. 951. no. 18. VI. 134.
— niveum Edgwrth. VI. 721.
— Persicum Boiss. VI. 134. no. 1.
β. latifolium.
— purpurascens C. H. Schultz. VI. 134. no. 2.
— umbelliforme B. Webb. *VI. 134. no. 3.
Phalacraea DC. *II. 545.
Phalacroderis DC. *II. 688.
Phalacrodiscus Lssng. °VI. 191.
— ceratophylloides Lssng. *VI. 192. no. 2.
— *graminifolius* Lssng. VI. 192. no. 1. B.
— *lanceolatus* Lssng. VI. 191. no. 1. β.
— Monspeliensis C. H. Schultz. *VI. 192. no. 3.
— montanus Lssng. VI. 191. no. 1.
α. atratus.
B. graminifolius.
Phalacrodiscus montanus Lssng. VI. 191. no. 1.
†† Bauhinianus.
† Kochianus.
A. latifolius.
β. pallidus.
Phalacroloma Cass. II. 581.
Phalacroloma Cass. *II. 583. *II. 952. no. 12.
— *acutifolium* Cass. II. 581. no. 28.
— *Beyrichii* Fisch. et Mey. II. 581. no. 29. γ.
— *obtusifolium* Cass. II. 581. no. 29.
Phalangideae Schauer. II. 927. V. 741.
Phaleria W. Jack. V. 409.
— capitata W. Jack. (vid. adnot. V. 410. ad Drymispermum Burmanni.)
Phalerieae Meisn. V. 409.
Phalerocarpus G. Don. *II. 724.
Phallaria Schum. *II. 489. II. 942.
— lucida Hochstett. II. 942. no. 1.
— *lucida* Hochstett. VI. 46. no. 1.
Phalolepis DC. VI. 293.
Phaneranthera DC. VI. 558. no. 2.
Phaneropsia Tulasne. V. 575.
Phania DC. II. 546. * VI. 107.
— *dissecta* Hook. et Arn. VI. 112. no. 23.
—? urenaefolia Hook. et Arn. II. 546. no. 1.
—? *urenifolia* Hook. et Arn. VI. 106. no. 1.
Pharbitis Choisy. VI. 530.
— cathartica Choisy. VI. 743.
— dealbata Martens et Galeotti. VI. 530. no. 2.
— Learii Hook. *VI. 531. no. 4.
— Lindeni Martens et Galeotti. VI. 530. no. 3.
— longepedunculata Martens et Galeotti. VI. 530. no. 1.
— ostrina Lindl. *VI. 531. no. 5.
Pharnaceum Linn. II. 243.
— *album* Linn. fil. II. 244. no. 4.
— *arenarium* Spr. II. 241. no. 2.
— *bellidifolium* Poir. II. 242. no. 8. β.
— *Berterianum* Spr. II. 241. no. 3.
— *brevicaule* Bartl. II. 245. no. 7. β.
— *Cerviana* Linn. II. 241. no. 4. α.
— cordifolium Linn. II. 245. no. 10.
— croceum E. Mey. II. 245. no. 8.
α. crassifolium.
β. tenuifolium.
— *depressum* L. I. 263. no. 2.
— detonsum Fnzl. II. 244. no. 5.
— dichotomum Linn. fil. II. 245. no. 7.
γ. barbatum.
β. filifolium.
α. lineare.
— *dichotomum* Thnbrg. II. 245. no. 7. β.
— *diffusum* Bartl. II. 250. no. 2.

Pharnaceum distichum Linn. II. 241. no. 5.
— distichum Thnbrg. II. 246. no. 12.
— *fluviale* Eckl. et Zeyh. II. 245. no. 7. *α.*
— *galioides* Lichtenst. II. 244. no. 4.
— *galioides* Willd. II. 250. no. 2.
— *glomeratum* Eckl. et Zeyh. II. 250. no. 5. *α.*
— *glomeratum* Linn. fil. II. 250. no. 5.
— gracile Fnzl. II. 245. no. 9.
— *hirtum* Spr. II. 242. no. 9.
— *Hoffmannseggianum* Schult. II. 241. no. 1. *γ.*
— incanum Linn. II. 243. no. 3. (c. varr. *α.* ibid. *β.* et *γ.* pag. 244.)
— *incanum* Thnbrg. II. 244. no. 3. *β.*
— lanatum Bartl. II. 243. no. 2.
— *Lichtensteinianum* Roem. et Schult. II. 250. no. 2.
— *lineare* Andr. II. 244. no. 4. *γ.*
— *lineare* Bert. II 241. no. 1. *γ.*
— lineare Linn. fil. II. 244. no. 6.
— *lineare β. fl. albo* Andr. II. 244. no. 4. *δ.*
— *marginatum* Thnbrg. II. 248. no. 3.
— maritimum Walt. II. 247. †††
— *microphyllum* Linn. fil. II. 243. no. 2.
— *Mollugo* Burm. II. 250. no. 5. *α.*
— *Mollugo* Linn. II. 240. no. 3. *β.* II. 250. no. 5.
— *Mollugo* Poir. II. 240. no. 3. *α.*
— *mucronatum* Thnbrg. II. 248. no. 5.
— *oppositifolium* Spr. II. 242. no. 10.
— *patens* Eckl. et Zeyh. II. 245. no. 7. *β.*
— *pentaphyllum* Spr. II. 242. no. 7.
— *pentagonum* Rxb. II. 239. no. 1. *β.*
— *quadrangulare* Linn. fil. II. 247. no. 1.
— quinquefidum Hook. II. 246. no. 15.
— reflexum Eckl. et Zeyh. II. 244. no. 4. (c. varr. *α. β. γ.* et *δ.* ibid.)
— *reflexum* Eckl. et Zeyh. II. 244. no. 4. *δ.*
— *rigidum* Bartl. II. 248. no. 4.
— serpyllifolium Linn. fil. II. 245. no. 11.
— *spathulatum* Swrtz. II. 242. no. 8. *β.*
— *strictum* Spr. II. 242. no. 6.
— subtile E. Mey. II. 246. no. 13. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— teretifolium Thnbrg. II. 246. no. 14.
— *teretifolium* Willd. II. 250. no. 5. *α.*
— trigonum Eckl. et Zeyh. II. 243. no. 1.
— *triphyllum* Spr. II. 242. no. 6.
— *verrucosum* Eckl. et Zeyh. II. 247. no. 1.
Phaseoleae Bth. I. 750. II. 900. V. 528.
Phaseolus L. I. 770. II. 901. V. 537.
— Abyssinicus Savi. I. 777. no. 96.
— aconitifolius Jcq. *I. 774. no. 50.
— *aconitifolius* Rxb. I. 774. no. 51. *γ.*
— adenanthus E. Mey. *I. 770. no. 6.
Phaseolus alatus L. *I. 776. no. 82.
— *alatus* Rxb. I. 771. no. 16.
— alatus Zucc. I. 776. no. 93.
— *amarus* Rxb. I. 771. no. 16.
— amplus Bth. V. 537. no. 4.
— anguinus Bnge. I. 776. no. 91.
— *angulosus* Ort. I. 774. no. 52.
— anisotrichus Schlchtd. I. 777. no. 105.
— appendiculatus Bth. I. 771. no. 15.
— asellus Molin. *I. 776. no. 83.
— asper Bth. I. 773. no. 37.
— asperrimus Zucc. I. 778. no. 109.
— atropurpureus DC. *I. 775. no. 73.
— barbulatus Bth. I. 771. no. 36.
— bracteolatus Nees et Mart. *I. 776. no. 77.
— brevipes Bth. I. 773. no. 38.
— caeduorum Mart. I. 772. no. 33.
— calcaratus Rxb. I. 773. no. 47.
— campestris Mart. I. 776. no. 76.
— canescens Mart. et Galeotti. V. 537. no. 6.
— Caracalla L. *I. 771. no. 14.
— chrysanthos Savi. I. 778. no. 112. (*I. 776. no. 84.)
— cirrhosus H. B. Kth. *I. 772. no. 35.
— citrinus Savi. I. 778. no. 111.
— clitorioides Mart. I. 772. no. 25.
— *compressus* DC. I. 772. no. 23.
— coriaceus Desvx. I. 773. no. 40.
— crassifolius Mart. I. 772. no. 29.
— crotalarioides Mart. I. 675. no. 64.
— Cummingii Bth. I. 773. no. 39.
— derosus Schrnk. *I. 776. no. 85.
— *difformis* Wall. I. 780. no. 20.
— *diversifolius* Pers. I. 774. no. 52.
— dumosus Macfd. I. 777. no. 99.
— erythroloma Mart I. 776. no. 78.
— farinosus L. *I. 774. no. 48.
— ficifolius Zucc. I. 776. no. 94.
— filiformis Bth. V. 537. no. 7.
— firmulus Mart. I. 772. no. 28.
— foecundus Macfd. I. 777. no. 102.
— formosus H. B. Kth. *I. 771. no. 8.
— fuscus Wall. I. 771. no. 17.
— gibbosifolius Ort. *I. 775. no. 75.
— glaber Schlchtd. I. 777. no. 106.
— glycinaefolius Weinm. *I. 776. no. 86.
— *glycinaeformis* DC. I. 778. no. 110.
— *gonospermus* Savi. I. 772. no. 23.
— gracilis Poepp. I. 775. no. 72.
— Grahamianus Wght. et Arn. I. 771. no. 18.
— *haematocarpus* Savi. I. 772. no. 23.
— hastaefolius Mart. I. 775. no. 69.
— helvolus L. *I. 774. no. 52. (c. varr. *α. β. γ. δ.* et *ε.* ibid.) (III. Emend. p. 4.)
— Hernandesii Savi. *I. 776. no. 87. et 92.
— heterophyllus H. B. Kth. *I. 775. no. 59.

Phascolus hirsutus Mart. I. 774. no. 57.
— *hirtus* Rtz. I. 773. no. 43.
— hispidulus Hsskrl. V. 537. no. 2.
— humifusus Savi. I. 778. no. 110.
— humilis Hsskrl. V. 537. no. 1.
—? *inamoenus* L. I. 771. no. 12.
— lanatus L. *I. 771. no. 12.
— lasiocarpus Mart. I. 775. no. 58.
— lathyroides L. *I. 775. no. 66.
— latifolius Bth. I. 773. no. 42.
— latisiliquus Macfd. I. 777. no. 101.
— leiospermus Torr et Gr. I. 774. no. 53.
— leptospermus Lag. *I. 776. no. 88.
— leptostachyus Bth. I. 770. no. 4.
— Limensis Macfd. I. 777. no. 100.
— linearis H. B. Kth. *I. 775. no. 70.
— lobatus Hook. V. 537. no. 3.
— *lobatus* Rxb. I. 774. no. 50.
— longepedunculatus Mart. I. 775. no. 74.
β. angustifolius.
α. latifolius.
γ. subcoriaceus.
— longifolius Bth. I. 774. no. 55.
— macrocarpus Bth. I. 775. no. 60.
— *macrostachyus* Ell. I. 770. no. 2.
— maritimus Bth. I. 775. no. 71.
— Martii Bth. I. 776. no. 81.
— *Max* Rxb. I. 773. no. 43.
— membranaceus Bth. I. 771. no. 22.
— micranthus Hook. et Arn. I. 778. no. 108.
— micranthus Martens et Galeotti. V. 537. no. 5.
— microspermus Ort. *I. 775. no. 65.
— *Minoomoo* Rxb. I. 773. no. 46.
— modestus Mart. I. 772. no. 26.
— monophyllus Bth. I. 775. no. 62.
— multiflorus L. *I. 771. no. 7.
— Mungo L. *I. 773. no. 43.
— *Mungo* Wall. I. 773. no. 46.
— *nanus* L. I. 772. no. 23.
— obliquaefolius Mart. I. 772. no. 24.
— *oblongus* Savi. I. 772. no. 23.
— obvallatus Schlchtd. I. 778. no. 107.
— ovatus Bth. I. 774. no. 56.
— pallor Molin. *I. 776. no. 89.
— *paniculatus* Michx. I. 770. no. 2.
— panduratus Mart. I. 776. no. 80.
— parviflorus Schlchtd. I. 777. no. 104.
— pascuorum Martius. I. 771. no. 20.
— pauciflorus Bth. I. 775. no. 61.
— pedicellatus Bth. I. 770. no. 5.
— *peduncularis* Bart. I. 770. no. 52.
— peduncularis H. K. Kth. *I. 775. no. 67.
— perennis Walt. *I. 770. no. 2.
— pilosus H. B. Kth. *I. 773. no. 41.
— pius Mart. I. 772. no. 27.
Phaseolus psoraleoides Wght. et Arn. I. 771. no. 19.
— puberulus H. B. Kth. *I. 771. no. 11.
— pubescens Blume. I. 776. no. 95.
— radiatus L. *I. 773. no. 45.
— *radiatus* Rxb. I. 773. no. 46.
— radicans Bth. I. 772. no. 34.
— retusus Bth. I. 770. no. 1.
— Riccardianus Ten. I. 778. no. 113.
— *Romanus* Savi. I. 772. no. 23.
— rostratus Wall. I. 771. no. 16.
— Roxburghii Wght. et Arn. I. 773. no. 46. (III. Emend. p. 4.)
— saccharatus Macfd. I. 777. no. 98.
— *saponaceus* Savi. I. 772. no. 23.
— Schiedeanus Schlchtd. I. 777. no. 103.
— Schottii Bth. I. 774. no. 54.
— semierectus L. *I. 775. no. 63.
— Senegalensis Guill. et Perr. I. 777. no. 97.
— sinuatus Nutt. I. 770. no. 3.
— speciosus H. B. Kth. *I. 772. no. 32.
— *sphaericus* Savi. I. 772. no. 23.
— Spixianus Mart. I. 771. no. 21.
β. Schottianus.
— stipularis Lam. *I. 775. no. 68.
— subtortus Bth. I. 772. no. 31.
— superbus Alph. DC. I. 777. no. 10.
— Surinamensis Miq. II. 901. no. 1.
— sylvestris H. B. Kth. *I. 771. no. 9.
— trilobus Ait. *I. 774. no. 51. (c. varr. α. β. et γ. ibid.)
— *trilobus* Wall. I. 774. no. 50.
— *trilobus* Willd. I. 774. no. 51. β.
— trinervius Heyne. I. 774. no. 49. (III. Emend. p. 4.)
— Truxillensis H. B. Kth. *I. 772. no. 30.
— *tumidus* Savi. I. 772. no. 23.
— Tunkinensis Lour. *I. 771. no. 13.
— vestitus Hook. I. 776. no. 79.
— *vexillatus* L.? I. 774. no. 52.
— violaceus Steud. *I. 776. no. 90.
— vulgaris L. *I. 772. no. 23.
— Wightii Grah. I. 773. no. 44. (III. Emend. p. 4.)
— *Xuaresii* Zucc. I. 771. no. 12.
Phebalium Vent. I. 505. II. 823. V. 389.
— *anceps* Sieb. I. 505. no. 4.
— aureum Cunningh. I. 505. no. 7.
— Billardierii Adr. Juss. I. 505. no. 3.
— bilobum Bartl. V. 389. no. 3.
— bilobum Lindl. II. 823. no. 1.
— correaefolium Adr. Juss. I. 505. no. 1.
— *diosmeum* Adr. Juss. I. 505. no. 6.
— elaeagnifolium Adr. Juss. I. 505. no. 4.
— *elaeagnoides* Sieb. I. 505. no. 3.
— elatum Cunningh. I. 505. no. 9.

Phebalium grandiflorum Hook. V. 389. no. 1.
— hexapetalum Adr. Juss. I. 505. no. 2.
— lachnoides Cunningh. I. 505. no. 8.
— montanum Hook. I. 505. no. 11.
— nudum Hook. II. 823. no. 2.
— *ovatum* Sieb. I. 505. no. 1.
— phylicoides Sieb. I. 505. no. 6.
— retusum Hook. I. 505. no. 10.
— rude Bartl. V. 389. no. 2.
— salicifolium Adr. Juss. I. 505. no. 5.
Phelipaea Dsf. III. 457. °III. 974.
— Aegyptiaca Wlprs. III. 463. no. 28.
— arenaria Wlprs. III. 459. no. 9.
— Armena C. Koch. III. 463. no. 26.
— *biflora* Spr. III. 480. no. 1.
— caesia Griseb. III. 461. no. 14.
— Californica G. Don. III. 463. no. 25.
— Calotropidis Wlprs. III. 462. no. 24.
— *coccinea* Pers. III. 481. no. 4.
— coerulea C. A. Mey. III. 458. no. 3.
γ. ciliaris Griseb.
β. Millefolii Rchb.
— *comosa* G. Don. III. 460. no. 9.
— compacta G. Don. III. 461. no. 15.
— Delileï Wlprs. III. 459. no. 8.
— *fasciculata* Spr. III. 480. no. 3.
— fissa C. A. Mey. III. 461. no. 17.
— flava C. A. Mey. III. 461. no. 18.
— *foliata* Lamb. III. 481. no. 4.
— Fraasii Wlprs. III. 460. no. 12.
— Indica G. Don. III. 460. no. 11.
— lanuginosa C. A. Mey. III. 457. no. 1.
— longiflora C. A. Mey. III. 458. no. 4.
— Ludowiciana Wlprs. III. 461. no. 16.
— lutea Dsf. III. 462. no. 21.
— macrantha C. Koch. III. 458. no. 2.
— pedunculata Wlprs. III. 459. no. 6.
— pulchella C. A. Mey. III. 460. no. 13.
— ramosa C. A. Mey. III. 459. no. 7.
— robusta Alb. Dietr. III. 460. no. 10.
— rufescens Griseb. III. 459. no. 5.
— salsa C. A. Mey. III. 461. no. 19.
—? subacaulis Bth. III. 463. no. 27.
— tinctoria Wlprs. III. 462. no. 23.
— *Turnefortii* Dsf. III. 481. no. 4.
— tubulosa Schenk. III. 462. no. 20.
— violacea Dsf. III. 462. no. 22.
Phellandrium ......? Wall. II. 395. no. 3.
— *aquaticum* Prsb. II. 400. no. 6.
Phelline Labill. I. 524.
— comosa Labill. *I. 524. no. 1.
Phellocarpus Bth. I. 802.
— acutus Bth. I. 802. no. 3.
— Amazonum Mart. I. 802. no. 1.
— floridus Bth. I. 802. no. 2.
— laxiflorus Bth. I. 803. no. 4.
Phellopterus Nutt. II. 418.
— *glaucus* Nutt. II. 418. no. 3.
— *montanus* Nutt. II. 418. no. 2.
— *Biebersteinii* Fisch. III. 481. no. 4.
Phelypaea Lusitanica flore luteo Tournef. III. 462. no. 23.
— *orientalis, flore coccineo* Tournef. III. 481. no. 4.
Philactis Schrad. *II. 608.
PHILADELPHEAE DC. II. 151. II. 919.
Philadelphus Linn. II. 151. II. 919.
— affinis Schlchtd. II. 151. no. 3.
— *aromaticus* Ait.? II. 167. no. 10.
— *corymbosus* Wall. II. 152. no. 5.
— *floribundus* Schrad. II. 151. no. 4. γ.
— *floribundus* Usteri. II. 167. no. 10. β.
— Gordonianus Lindl. II. 151. no. 2.
— *grandiflorus* Bot. Reg. II. 151. no. 4. γ.
— grandiflorus Willd. II. 151. no. 4.
γ. floribundus.
β. laxus.
— hirsutus DC. II. 151. †
— *laniger* Ait. II. 167. no. 4.
— *latifolius* Schrad. II. 151. no. 4. γ.
— *laxus* Schrad. II. 151. no. 4. β.
— Mexicanus Schlchtd. II. 151. no. 5. *II. 919. no. 1.
— myrtoides Bertol. II. 151. no. 6.
— *Oreganus* Nutt. II. 151. no. 2.
— *scoparius* Ait. II. 167. no. 10.
— speciosus Schrad. II. 151. †
— *stamineus* Wall. II. 152. no. 4.
— tomentosus Wall. II. 151. no. 1.
— *verrucosus* Schrad. II. 151. no. 4. γ.
— *Zeyheri* Schrad. II. 151. no. 4. γ.
Philaginopsis Torr. et Gr. cf. Filaginopsis.
Philagonia Blume. I. 523. V. 397.
— fraxinifolia Hook. V. 397. no. 1.
— sambucina Blume. I. 523. no. 1.
Philibertia flava Meyen. VI. 488. no. 1.
— *gracilis* Don. VI. 485. no. 2.
— *grandiflora* Hook. VI. 485 no. 3.
Philippia Kltzsch. *II. 728.
Philippodendreae Endl. I. 351.
Philippodendron Poit. I. 351.
— regium Poit. *I. 351. no. 1.
Phillyrea Tournef. VI. 461.
— Lorentei Wlprs VI. 461. no. 2.
— pedunculata Bory et Chaub. VI. 461. no. 1.
Philoglossa DC. *II. 613.
Philotheca Rudg. I. 505.
— Gaudichaudii G. Don. *I. 505. no. 2.
— Reichenbachiana Sieb. *I. 505. no. 1.
Phleastrum Ser. II. 851.
Phleboanthe Laxmanni Tausch. III. 929. no. 18.

Phlebochiton Wall. °V. 416.
— extensum Wall. V. 416. no. 1.
Phlojodicarpus Turczan. °V. 872.
— Davuricus Turczan. V. 872. no. 1.
— microcarpus Ldb. V. 872. no. 3.
— villosus Turczan. V. 872. no. 2.
Phlomidopsis Lnk. III. 887.
— *tuberosa* Lnk. III. 888. no. 35.
Phlomis Linn. III. 879. °III. 990. VI. 683.
— *Africana* Palis. de Beauv. III. 878. no. 3.
— agraria Bnge. III. 888. no. 38.
— *alba* Forsk. III. 866. no. 20.
— alpina Pall. III. 888. no. 39.
— angustifolia Mill. III. 883. no. 16.
— anisodonta Boiss. III. 886. no. 30.
— Armeniaca Willd. III. 881. no. 8.
— *aspera* Willd. III. 876. no. 40.
— Aucheri Boiss. III. 880. no. 3.
— bicolor Bth. III. 884. no. 21.
— *biflora* Rxb. III. 872. no. 20.
— *biflora* Vahl. III. 872. no. 21.
— biloba Desf. III. 881. no. 5.
— bracteosa Royle. III. 889. no. 41.
— breviflora Bth. III. 887. no. 33.
— breviflora Schrenk. *III. 890.
— Bruguieri Desf. III. 880. no. 2.
— *calycina* Rxb. III. 867. no. 1.
— *Caribaea* Jacq. III. 877. no. 44.
— Cashmeriana Royle. III. 886. no. 27.
— cephalotes Roth. III. 877. no. 43.
— *Cephalotis var.* Blume. III. 876. no. 40.
— *Chinensis* Blume. III. 873. no. 25.
— *Chinensis* Retz. III. 869. no. 5.
— condensata Mart. *III. 890.
— cordata Royle. III. 889. no. 44.
— *Cretica* Prsl. III. 884. no. 18. β.
— crinita Cav. III. 880. no. 4.
— cymifera Boiss. VI. 683. no. 1.
— *decemdentata* Willd. III. 871. no. 15.
— *dimidiata* Rth. III. 877. no. 42.
— *esculenta* Rxb. III. 876. no. 40.
— elliptica Bth. III. 883. no. 14.
— *ferruginea* Hortul. III. 884. no. 17.
— *ferruginea* Mill. III. 882. no. 11.
— ferruginea Ten. III. 884. no. 18.
β. Cretica Bth.
— *flavescens* Mill. III. 883. no. 16.
— floccosa D. Don. III. 884. no. 20.
— fruticosa Linn. III. 883. no. 17.
— *fruticosa* Sieb. III. 884. no. 18. β.
— *glabrata* Vahl. III. 869. no. 3.
— glandulosa Schenk. III. 885. no. 23.
— herba venti Linn. III. 886. no. 28.
β. tomentosa Bth.
— *herba venti* var. Russ. III. 885. no. 22.
— *hirta* Heyne. III. 874. no. 33.
Phlomis Indica Linn. III. 869. no. 1.
— Italica Sm. III. 882. no. 12.
— *laciniata* Linn. III. 891. no. 1.
— lanata Willd. III. 883. no. 15.
— lanceolata Boiss. et Hohenack. III. 881. no. 9.
— lamiifolia Royle. III. 889. no. 42.
— *latifolia* Mill. III. 884. no. 17.
— *latifolia* Royle. III. 889. no. 42.
— *Leonitis* Linn. III. 878. no. 4.
— *Leonurus* Linn. III. 879. no. 9.
— *linifolia* Rth. III. 877. no. 45.
— lunariaefolia Sm. III. 885. no. 24.
— *lunariaefolia β. Russeliana* Hook. III. 885. no. 22.
— Lychnitis Linn. III. 879. no. 1.
— Lycia D. Don. III. 886. no. 29.
— macrophylla Wall. III. 887. no. 34.
— *Martinicensis* Swartz. III. 877. no. 44.
— *micrantha* Burch. III. 839. no. 107.
— *microphylla* Sieb. III. 833. no. 15.
— *mollis* Schum. III. 877. no. 44.
— *Moluccana* Rxb. III. 871. no. 16.
— *moluccoides* Vahl. III. 868. no. 4.
— *montana* Rth. III. 870. no. 6.
— *nepetaefolia* Linn. III. 878. no. 1.
— Nissolii Linn. III. 882. no. 10.
— *nutans* Rth. III. 876. no. 41.
— oblongata Schrenk. III. 888. no. 36.
— Olivieri Bth. III. 881. no. 7.
— oreophila Kar. et Kir. III. 889. no. 40.
— orientalis Mill. III. 881. no. 6.
— *pallida* Schum. III. 878. no. 3.
— *parvifolia* Burch. III. 840. no. 114.
— *parvifolia* Prsl. III. 883. no. 15.
— Persica Boiss. III. 882. no. 13.
— *pilosa* Rxb. III. 871. no. 14.
— *Plukenetii* Rth. III. 876. no. 40.
— pratensis Kar. et Kir. III. 888. no. 37.
— pungens Willd. III. 886. no. 31.
— purpurea Linn. III. 882. no. 11.
— rigida Labill. III. 885. no. 26.
— *rotundifolia* Mill. III. 882. no. 12.
— rugosa Bth. III. 889. no. 45.
— Russelliana Lag. III. 885. no. 22.
— *salviaefolia* Jacq. III. 882. no. 11.
— Samia Linn. III. 885. no. 25.
— *Samia β. bicolor* Viv. III. 885. no. 21.
— scariosa Prsl. *III. 890.
— simplex Royle. III. 889. no. 43.
— tuberosa Linn. III. 887. no. 35.
— umbrosa Turczan. III. 887. no. 32.
— *urticaefolia* Vahl. III. 869. no. 2.
— *virens* DC. III. 884. no. 19.
— viscosa Poir. III. 884. no. 19.
— *Zeylanica* Linn. III. 875. no. 37.

Phlomis Zeylanica Rxb. III. 877. no. 45.
Phlomoides tuberosa Moench. III. 887. no. 35.
Phlox Linn. VI. 526.
— *cordata* Ell. VI. 526. no. 1.
— Drummondii Hook. *VI. 526. no. 2.
— Oldryana Paxton. *VI. 526. no. 3.
— paniculata Linn. *VI. 526. no. 1. var. grandiflora.
Phoberos Lour. I. 203.
— crenatus Wght. I. 203. no. 2. (III. Emend. p. 1.)
— lanceolatus Wght. I. 203. no. 3. (III. Emend. p. 1.)
— macrophyllus Wght. et Arn. I. 203. no. 5.
— rhinanthura Bennet. I. 203. no. 1.
— Wightianus Wght. et Arn. I. 203. no. 4. (III. Emend. p. 1.)
Phoenicanthemum Blume. II. 439.
Phoenicaulis Nutt. I. 134.
— cheiranthoides Nutt. *I. 134. no. 1.
— *cheiranthoides* Nutt. I. 162. no. 19.
Phoenixopus Koch. *II. 693.
Pholidia R. Br. IV. 138.
— resinosa Endl. IV. 138. no. 1.
— scoparia R. Br. IV. 138. no. 2.
Pholisma Nutt. °III. 482. °III. 975.
— arenarium Nutt. III. 482. no. 1.
Photinia Lindl. II. 56.
— arbutifolia Linn. *II. 57. no. 3.
— arguta Wall. II. 57. no. 4.
— *Benghalensis* Wall. II. 57. no. 10.
— dubia Lindl. *II. 57. no. 10.
— eugeniaefolia Lindl. II. 57. no. 7.
— integrifolia Lindl. *II. 57. no. 6.
— Lindleyana Wght. et Arn. II. 57. no. 8. (c. varr. α. et β. ibid.)
— Notoniana Wall.? II. 57. no. 9.
— prunifolia Lindl. II. 56. no. 2.
— pustulata Lindl. II. 57. no. 5.
— serrulata Lindl. II. 56. no. 1.
— *serrulata* β. Hook. et Arn. II. 56. no. 2.
Phryma Forsk. IV. 35. no. 6.
Phryma Linn. IV. 36.
— *Carolinensis* Walter. IV. 37. no. 1.
— *dehiscens* Linn. IV. 38. no. 2.
— leptostachya Linn. IV. 36. no. 1.
Phteirospermum Bnge. III. 391. °III. 971. *VI. 652.
— Chinense Bnge. III. 391. no. 1.
Phtirusa Mart. II. 443.
Phuopsis Griseb. VI. 25.
Phygelius E. Mey. III. 253. °III. 961. *VI. 638.
— Capensis E. Mey. III. 253. no. 1.
Phylacium Bennet. I. 726. V. 520.
— bracteosum Bennet. *I. 726. no. 1. V. 520. no. 2.
Phylacium scandens Hsskrl. V. 520. no. 1.
Phylica racemosa L. I. 543. no. 2.
— *radiata* L. I. 544. no. 1.
— *pinifolia* Thnbrg. I. 543. no. 3.
Phyllachne Forst. VI. 371.
— *uliginosa* Forst. VI. 371. no. 1.
Phyllagathis Blume. II. 146. V. 717.
— gymnantha Krthls. V. 717. no. 1.
— rotundifolia Blume. *II. 146. no. 1. V. 718. no. 2.
Phyllanthera Blume. *VI. 481.
Phyllanthus Miq. II. 341.
— *Americana etc.* Pluk. II. 342. no. 6.
Phyllarthron A. P. DC. VI. 517.
— Bojerianum A. P. DC. *VI. 517. no. 1.
Phyllis Linn. *II. 462.
— *Galopina* Cruse. II. 462. no. 1.
Phyllobotrys Spach. (Genista) V. 480.
Phyllocactus Lk. II. 341. V. 820.
— Ackermanni Lk. II. 341. no. 1.
— crenatus Wlprs. V. 820. no. 1.
— Hookeri Lk. II. 341. no. 5.
— latifrons Lk. II. 341. no. 4.
— oxypetalus Lk. II. 341. no. 3.
— phyllanthoides Lk. II. 341. no. 2. β. albiflorus.
— phyllanthus Lk. II. 342. no. 6.
Phyllocalymna Bth. *II. 643. VI. 229.
— filaginoides Steetz. VI. 229. no. 1.
— micropodioides Bth. VI. 229. no. 2.
Phyllocarpus Ried. I. 802. °V. 546.
— pterocarpus Riedel. *I. 802. no. 1.
— *pterocarpus* Riedel. V. 546. no. 1.
— Riedelii Tulasne. *V. 546. no. 1.
Phyllocephalum Blume. II. 948.
Phyllodiastrum Wlprs. I. 607. V. 453. no. 6.
Phyllodineae Bth. (Acacia) I. 886. II. 905. V. 588.
Phyllodium Wlprs. I. 606.
Phyllodóce Salisb. *II. 729.
Phyllolobium Fisch. *I. 683.
Phyllomalia Wght. et Arn. I. 789.
Phyllonoma ruscifolia Willd. I. 539. no. 1.
Phyllopappus Nutt. II. 588. no. 6.
Phyllopappus Wlprs. II. 688. VI. 344.
— lanceolatus Wlprs. *II. 688. no. 1. VI. 344. no. 1.
Phyllopodium Bth. III. 310. °III. 967. *VI. 641.
— bracteatum Bth. III. 310. no. 6.
— capitatum Bth. III. 310. no. 2.
— cuneifolium Bth. III. 310. no. 1.
— diffusum Bth. III. 310. no. 5
— heterophyllum Bth. III. 310. no. 3.
— pumilum Bth. III. 310. no. 4.
Phyllopoda DC. (Hieracium) VI. 364. no. 12.

Phyllopus DC. II. 145.
— Martiusii DC. II. 145. no. 1.
Phyllostegia Bth. III. 898. °III. 991.
— Chamissonis Bth. III. 898. no. 4.
— clavata Bth. III. 899. no. 9.
— dentata Bth. III. 898. no. 1.
— floribunda Bth. III. 900. no. 12.
— glabra Bth. III. 899. no. 5.
— grandiflora Bth. III. 898. no. 3.
—? hirsuta Bth. III. 900. no. 11.
— *leptostachys* Bth. III. 899. no. 7.
— macrophylla Bth. III. 899. no. 6.
— mollis Bth. III. 899. no. 8.
— parviflora Bth. III. 899. no. 7.
— racemosa Bth. III. 899. no. 10.
— vestita Bth. III. 898. no. 2.
Phyllota DC. I. 571.
Phyllota DC. I. 571.
— aspera Bth. *I. 571. no. 2.
— barbata Bth. I. 572. no. 9.
— Baueri Bth. I. 572. no. 8.
— Billardieri Bth. I. 571. no. 4.
— comosa Bth. *I. 571. no. 3.
— grandiflora Bth. I. 571. no. 5.
— phylicoides Bth. *I. 571. no. 7.
— pilosa Bth. I. 571. no. 1.
— squarrosa Bth. *I. 571. no. 6.
Phymaspermum Lssng. *II. 635.
Phymatanthus Lindl. I. 456.
— *elatus* Sweet. I. 457. no. 99.
— *tricolor* Sweet. I. 457. no. 98.
Phymatogoni Lem. (Echinocactus) II. 321. V. 816.
Phymosia abutiloides Dsvx. I. 296. no. 5.
Physa Madagascariensis Pet. Th. II. 239. no. 1. β.
Physalis Linn. III. 22. °III. 954. VI. 574.
— ...... Schlchtd. VI. 575. no. 12. 13. 14.
— *Abyssinica* Herb. Berol. III. 26. no. 16. β.
— adulterina Fisch. *III. 27.
— aequata Jcq. fil. III. 25. no. 11.
— Alkekengi Linn. III. 23. no. 5.
— *Alkekengi* Lour. III. 25. no. 15. α.
— *Alpini* Jcq. III. 23. no. 1. α.
— *angulata* Hort. III. 25. no. 12.
— *angulata* var. Hamilt. III. 26. no. 15. β.
— angulata Linn. III. 25. no. 14. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— *angulata* Rz. et Pav. III. 25. no. 13.
— *angulata* Walt. III. 27. no. 24.
— *angulata* Willd. III. 26. no. 15. α.
— *angulata* β. Linn. III. 25. no. 14. γ.
— angustifolia Nutt. III. 27. no. 23.
— arborescens Linn. III. 23. no. 2. (III. 27. no. 34.)
— *arborescens* Thnbrg. III. 23. no. 1. β.
Physalis arenaria Hort. Vratislav. III. 25. no. 12.
— *aristata* Ait. III. 104. no. 2.
— *atriplicifolia* Jcq. III. 26. no. 18.
— *Barbadensis* Jcq. III. 24. no. 9. β.
— *Barbadensis* Lam. III. 24. no. 8. β.
— Brasiliensis Sendtner. VI. 575. no. 10.
— bulbosa Hedw. *III. 27.
— chenopodiifolia Lam. III. 24. no. 6.
— *chenopodiifolia* Willd. III. 26. no. 18.
— cordata Mill. III. 27. no. 27.
— crassifolia Bth. VI. 574. no. 8.
— Curassavica Linn. III. 23. no. 4.
— *daturaefolia* Lam. III. 22. no. 1.
— *divaricata* D. Don. III. 26. no. 15. β.
— *dubia* Lnk. III. 25. no. 12.
— *edulis* Sims. III. 24. no. 8. β.
— *esculenta* Rxb. III. 24. no. 8. α.
— *esculenta* Willd. III 24. no. 8. α.
— *flexuosa* Hb. Hamilt. III. 25. no. 14.
— *flexuosa* Hb. Ross. III. 25. no. 14.
— *flexuosa* Linn. III. 22. no. 1. α.
— *flexuosa* Wall. III. 23. no. 1. α.
— foetens Poir. III. 25. no. 10.
— *foetidissima* Lag. III. 25. no. 10.
— *frutescens* DC. III. 104. no. 1.
— Galeottiana Wlprs. VI. 574. no. 7.
— glabra Bth. VI. 574. no. 9.
— *glabra* Martens et Galeotti. VI. 574. no. 7.
— glutinosa Schlchtd. VI. 574. no. 2.
— *Halicacabum* Scop. III. 24. no. 5.
— heterophylla N. ab E. III. 24. no. 7.
— hirsuta Martens et Galeotti. VI. 574. no. 5.
— hygrophila Mart. III. 27. no. 33.
— Indica Lam. III. 25. no. 15.
β. microcarpa N. ab E. III. 26. no. 15.
— *iscocarpa* Brot. III. 25. no. 11.
— *ixocarpa* Hort. Bonnens. III. 25. no. 12.
— *Jacquini* Lnk. III. 23 no. 3. β.
— laevigata Martens et Galeotti. VI. 574. no. 4.
— *Lagascae* Roem. et Schult. III. 26. no. 16.
— *lanceolata* Ell. III. 27. no. 22.
— *lanceolata* Michx. III. 25. no. 13.
— lanceolata Michx. III. 26. no. 21.
— lancifolia N. ab E. III. 25. no. 13.
— *latifolia* Lam. III. 24. no. 8. β.
— *Limensis* Retz. III. 26. no. 17.
— Linkiana N. ab E. III. 25. no. 12.
— lutea Medic. III. 27. no. 29.
— maxima Mill. III. 27. no. 28.
— *megistocarpa* Zuccagn. III. 26. no. 18.
— micrantha Lnk. III. 27. no. 32.
— minima Linn. III. 26. no. 16. (c. var. β.)
— *minima* Rxb. III. 25. no. 15. α.
— *minima* Wall. III. 25. no. 14.

Physalis mucronata Willd. III. 27. no. 36.
— Neesiana Sendtner. VI. 575. no. 11.
— nicandroides Schlchtd. VI. 574. no. 3.
— *nodosa* Lam. III. 25. no. 10.
— *nutans* Walt. III. 24. no. 7.
— nutans Walt. III. 27. no. 31.
— obscura Michx. III. 27. no. 24.
— *obscura α. glabra* Prsh. III. 25. no. 14.
— *obscura β. pubescens* Prsh. III. 24. no. 9. β. III. 27. no. 24.
— *origanifolia* Lam. III. 23. no. 4.
— Orinocensis H. B. Kth. III. 26. no. 19.
— *ovata* Poir. III. 26. no. 18.
— *parviflora* R. Br. III. 25. no. 15. α.
— *parviflora* Lag. III. 26. no. 16.
— *parviflora* Willd. III. 26. no. 16. β. III. 27. no. 32.
— patula Mill. III. 27. no. 25.
— *patula* Mill. III. 25. no. 14. β.
— pedunculata Martens et Galeotti. VI. 574. no. 6.
— *Pennsylvaniea* Linn. III. 23. no. 3. α.
— *Pennsylvanica* Willd. III. 24. no. 7.
— *Peruviana* Linn. III. 24. no. 8. β.
— *Peruviana* Mill. III. 22. no. 1.
— Peruviana N. ab E. III. 22. no. 8. (cum varr. α. et β. ibid.)
— *Peruviana* Rxb. III. 24. no. 8. α. III. 24. no. 9. α.
— *Peruviana* Wall. III. 25. no. 14. III. 26. no. 15. α. β. III. 26. no. 16.
— Philadelphica Lam. III. 26. no. 18.
— prostrata L'Hérit. III. 26. no. 17.
— *pruinosa* Linn. III. 24. no. 9. β.
— *pseudo-angulata* Blume. III. 26. no. 15. α.
— *pubescens* Linn. III. 24. no. 8. β.
— *pubescens* Willd. III. 26. no. 16.
— pubescens Linn. III. 24. no. 9. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *pubescens β.* Lam. III. 24. no. 9. β.
— *radice perenni, caule procumbente* etc. Mill. III. 23. no. 3. β.
— ramosa Forsk. III. 27. no. 30.
— *ramosa* Mill. III. 24. no. 9. α.
— *Rothiana* Hb. Berol. III. 24. no. 9. α.
— *Rothiana* Roem. et Schult. III. 26. no. 16.
— *Sagunda* Ham. III. 23. no. 1. α.
— *Schraderiana* Brnhardi. III. 29. no. 10.
— *solanacea* Mert. III. 28. no. 1.
— somnifera Lnk. III. 22. no. 1. (c. varr. α. et β.)
α. flexuosa.
— *somnifera* Linn. III. 23. no. 1. β.
— *somnifera* var. *Indica* Humb. III. 23. no. 1. α.
— *somnifera β.* Lam. III. 22. no. 1. α.
Physalis staminea Mühlnbrg. III. 24. no. 9. α.
— *stramonifolia* Walt. III. 22. no. 1.
— *suberosa* Cav. III. 104. no. 1.
— subtriflora Rz. et Pav. III. 27. no. 35.
— *Sugunda* Hb. Hamilt. III. 25. no. 14.
— *tomentosa* Act. Acad. Pal. III. 24. no. 8. α.
— *tomentosa* Sieb. III. 23. no. 1. β.
— *tomentosa* Thnbrg. III. 23. no. 1. β.
— *tomentosa* Walt. III. 24. no. 7.
— *tuberosa* Willd. III. 24. no. 6.
— *tuberosa* Zuccagn. III. 24. no. 8. β.
— villosa Mill. III. 27. no. 26.
— *villosa* Rth. III. 26. no. 16.
— *Virginiana* Mill. III. 26. no. 21.
— *viscosa* Jcq. III. 23. no. 3. β.
— viscosa Linn. III. 23. no. 3. (c. varr. α. et β. ibid.)
γ. sinuato-dentata Schlchtd. VI. 574. no. 1.
— Walteri Nutt. III. 26. no. 22.
— Xalapensis H. B. Kth. III. 26. no. 20.
Physalodendron G. Don. III. 22.
Physaloides prostrata Mnch. III. 26. no. 17.
— *somnifera* Mnch. III. 23. no. 1. β.
Physanthyllis Boiss. I. 634.
— *tetraphylla* Boiss. I. 634. no. 6.
Physaria Nutt. I. 141.
Physidium procumbens Schrad. III. 178. no. 2.
Physocalymma Pohl. *II. 113.
Physocalyx Pohl. III. 377. °III. 969. *VI. 641.
— aurantiacus Pohl. III. 378. no. 3.
— major Mart. III. 377. no. 1.
— minor Mart. III. 378. no. 2.
— *rhinanthoides* Cham. et Schlchtd. III. 379. no. 2.
Physocarpos Camb. II. 49.
Physocarpum DC. I. 11. no. 20. I. 13. no. 34.
Physochlaina G. Don. III. 19. 21.
— *orientalis* G. Don. III. 21. no. 15.
— *physaloides* G. Don. III. 21. no. 14.
Physodium Prsl. I. 343.
— corymbosum Prsl. *I. 343. no. 1.
Physoleucas Bth. III. 869. VI. 683. no. 1.
Physolepidium Schrenk. II. 762.
— repens Schrenk. *II. 762. no. 1.
Physolobium Bth. I. 758.
— carinatum Bth. I. 758. no. 1.
— elatum Bth. I. 758. no. 3.
— Stirlingi Bth. I. 758. no. 2.
Physolophium Turczan. °V. 871.
— saxatile Turczan. *V. 871. no. 1.
Physopodium Desvx. *II. 114.
Physospermum Cass. II. 426.
— *aquilegifolium* Koch. II. 426. no. 1.
— *cicutarium* Spr. V. 921. no. 1.
— nudicaule C. A. Mey. *II. 426. no. 1.

Physostegia Bth. III. 800. °III. 987.
— *imbricata* Hook. III. 800. no. 1.
— truncata Bth. III. 800. no. 2.
— Virginiana Bth. III. 800. no. 1.
Physostelma Wght. VI. 493.
— campanulata Dcne. *VI. 493. no. 1.
Physostemon Mart. et Zucc. I. 195.
— *ambiguum* Bngrd. I. 195. no. 1.
— intermedium Moric. *I. 195. no. 1.
Phyteuma Linn. *II. 710. VI. 382.
— angustifolium Ldb. VI. 382. no. 4.
— *campanuloides β. Sibthorpianum* Alph. DC. VI. 382. no. 1.
— cichoriforme Boiss. VI. 382. no. 2.
— Rumelicum Griseb. VI. 382. no. 3.
— Sibthorpianum Boiss. VI. 382. no. 1.
Phyteuoides Americanum flore albo tetrapetalo Pluk. III. 332. no. 1.
Phytocrene Wall. I. 98.
— bracteata Wall. I. 98. no. 2.
— gigantea Wall. I. 98. no. 1.
— oblonga Wall. I. 98. no. 4.
— palmata Wall. I. 98. no. 3.
Phytocreneae Endl. I. 98.
Phytoxys acidissima Molina. III. 845. no. 6.
Piaranthus R. Br. *VI. 495.
Piceonia A. P. DC. *VI. 461.
Pichonilla III. 5. no. 3.
Pickeringia Nutt. I. 562. (Genus Leguminiferum.)
— montana Nutt. *I. 562. no. 1.
Pickeringia Nutt. *II. 730. (Genus Ericaceum.)
Picnomon Lobel. *II. 674.
Picradenia Hook. *II. 628.
— *Richardsonii* Hook. VI. 179. no. 1.
Picramnia Swrtz. *I. 559. II. 830.
— ciliata Mart. II. 830. no. 1.
Picrasma Blume. °V. 395.
Picrasma Blume. V. 395.
Picrasma Lindl. V. 398.
— *excelsa* Lindl. V. 398. no. 1.
— Javanica Blume. V. 395. no. 2.
— *Javanica* Blume. I. 519. no. 1.
— Nepalensis Horsf. et Bennet. V. 396. no. 3.
— quassioides Horsf. et Bennet. V. 395. no. 1.
Picria Lour. *VI. 403. 654.
Picridium Dsf. *II. 689.
Picris Linn. II. 689. II. 993. VI. 352.
— Abyssinica C. H. Schultz. II. 689. no. 1.
— attenuata A. Cunn. II. 689. no. 3.
— barbarorum Lindl. II. 993. no. 1.
— longirostris C. H. Schultz. *II. 689. no. 2.
— Olympica Boiss. VI. 352. no. 1.
Picris rigida Ldb. VI. 352. no. 2.
— squarrosa Steetz. VI. 352. no. 3.
Picrophloeus Blume. *VI. 498.
Picrorhiza Royle. III. 373. °III. 969. *VI. 617.
— Kurroa Royle. III. 373. no. 1.
Picrosia Don. *II. 700. *VI. 366.
Picrothamnus Nutt. II. 604. VI. 154.
— desertorum Nutt. *II. 604. no. 1. VI. 154. no. 1.
Picrotus Nutt. II. 976. no. 1.
Pictetia DC. *I. 725.
Piddingtonia Alph. DC. *VI. 373.
Pieraea Webb. *II. 954. no. 1.
Pierardia Jack. V. 366.
— dulcis Jack. V. 367. no. 2.
— sapida Rxb. V. 366. no. 1.
Pieris D. Don. *II. 727.
—? *phillyreaefolia* DC. VI. 419. no. 1.
Pigea floribunda Lindl. II. 767. no. 1.
Pilaeflorae Mart. (Anona) I. 88.
Pileanthus Labill. II. 157. °V. 731.
— limacis Labill. II. 157. no. 1.
— peduncularis Endl. II. 157. no. 2.
Pilitis Lindl. *II. 733.
Pillera Endl. I. 767.
Pilocarpeae Bartl. I. 500. V. 387.
Pilocarpus Vahl. I. 501.
— *Humboldtii* Spr. I. 504. no. 1.
— spicata St. Hil. *I. 501. no. 1.
Pilocereus Lemaire. °V. 818.
— Columna Lemaire. *V. 818. no. 2.
— *Columna Trajani* Lem. II. 325. no. 2.
— Curtisii S. Dyck. *V. 818. no. 4.
— jubatus S. Dyck. *V. 818. no. 5.
— polygonus S. Dyck. V. 818. no. 6.
— polylophus S. Dyck. *V. 818. no. 3.
— *senilis* Lem. II. 325. no. 1.
— senilis Lem. *V. 818. no. 1.
Pilogyne affinis Schrad. II. 196. no. 6.
— *cuspidata* Schrad. II. 196. no. 3.
— *dilatata* Schrad. II. 196. no. 7.
— *Ecklonis* Schrad. II. 196. no. 2.
— *membranacea* Schrad. II. 196. no. 4.
— *suavis* Schrad. II. 196. no. 1.
— *velutina* Schrad. II. 196. no. 5.
Piloselloidea DC. (Hieracium) VI. 362. no. 1.
Pilosiusculae Bth. (Inga) V. 632.
Pimelandra Alph. DC. VI. 451.
— Wallichii Alph. DC. *VI. 451. no. 1.
Piminta Lindl. °V. 756.
— acris Wght. V. 756. no. 1.
— vulgaris Wght. V. 756. no. 2.
Pimpinella Linn. II. 395. V. 854.
— affinis Ldb. V. 855. no. 6.
— Arabica Boiss. V. 856. no. 12.
— barbata Boiss. V. 856. no. 10.

Pimpinella Caffra Wlprs. II. 395. no. 5.
— Candolleana Wght. et Arn. II. 395. no. 4. V. 857. †
— corymbosa Boiss. V. 851. no. 3.
— *Cretica* Hampe. V. 923. no. 1.
— crinita Boiss. V. 856. no. 13.
— dendroselinum B. Webb et Berthelot. V. 855. no. 7.
— eriocarpa Boiss. V. 856. no. 8.
—? flava C. A. Mey. II. 395. no. 2.
— *flava* C. A. Mey. V. 857. no. 1.
— glaucescens Boiss. V. 856. no. 11.
— *Heyneana* Wall. II. 392. no. 2.
—? involucrata Wght. et Arn. II. 395. no. 3.
— Kotschyana Boiss. V. 855. no. 5.
— *lutea* Dsf. II. 396. no. 3.
— *maxima Canadensis* Cornuti. II. 44. no. 4. α.
— Olivieri Boiss. V. 855. no. 4.
— peucedanifolia Fisch. V. 851. no. 2.
— puberula Boiss. V. 856. no. 9.
— *ramosissima* DC. V. 857. no. 2.
— Saxifraga L. *II. 395. no. 1. var. ternata Cesati.
— Stadensis Wlprs. II. 395. no. 6.
— tripartita Kaleniczenko. V. 854. no. 1.
Pinarda repens Vellozo. III. 291. no. 1.
Pinaria DC.? I. 124. no. 7.
Pinaropappus Lssng. II. 700. *VI. 344.
— scapiger Wlprs. II. 700. no. 1.
Pineda Rz. et Pav. *I. 205.
Pinguicula Tournef. VI. 439.
— antarctica Vahl. *VI. 439. no. 2.
— *obtusa* Bnks. et Soland. VI. 439. no. 2.
— orchidioides Alph. DC. *VI. 439. no. 1.
Pinillosia Ossa. *II. 607.
Pinkneya L. C. Rich. *II. 507.
Pinnatae (Indigofera) I. 664. 665.
Pinnatifoliae (Indigofera) I. 670.
Pinnatim-trifoliatae (Indigofera) I. 666.
Pinzona Mart. et Zucc. I. 65.
— coriacea Mart. et Zucc. *I. 65. no. 1.
Pionandra betacea Miers. VI. 577. no. 9.
— *Cajanumensis* Miers. VI. 579. no. 24.
— *capsicoides* Miers. VI. 579. no. 20.
— *ciliata* Miers. VI. 578. no. 16.
— *coriacea* Miers. VI. 579. no. 23.
— *crotonifolia* Miers. VI. 579. no. 25.
— *diploconos* Miers. VI. 577. no. 4.
— *divaricata* Miers. VI. 577. no. 8.
— *flagrans* Mixrs. VI. 579. no. 28.
— *floribunda* Miers. VI. 577. no. 4.
— *fragrans* Miers. VI. 577. no. 5.
— *Gardneri* Miers. VI. 577. no. 3.
— *Hartwegi* Miers. VI. 579. no. 22.
— *Narensis* Miers. VI. 579. no. 26.
Pionandra obliqua Miers. VI. 579. no. 18.
— *pendula* Miers. VI. 578. no. 17.
— *premnaefolia* Miers. VI. 578. no. 11.
— *pubescens* Miers. VI. 577. no. 6.
— *Tejore* Miers. VI. 579. no. 21.
— *trachyphylla* Miers. VI. 579. no. 27.
— *viridiflora* Miers. VI. 579. no. 19.
Piparea Bth.? I. 547. no. 14. 15.
Piper Aethiopicum Matthioli. I. 75. no. 11.
— *Calecuticum* Fchs. III. 36. no. 17. β.
— *caninum* Piso. VI. 585. no. 13. ε.
— *cordatum* Raj. III. 37. no. 21.
— *Indicum aureum latum* Bessl. III. 36. no. 7. γ.
— *Indicum bifurcata siliqua* Bessl. III. 33. no. 1. δ.
— *Indicum capsulis surrectis et oblongis* C. Bauh. III. 33. no. 1.
— *Indicum caule pilis albis praedito* Camerar. III. 37. no. 1.
— *Indicum caule piloso, flore majori* C. Bauh. III. 37. no. 1.
— *Indicum cordatum* Bessl. III. 37. no. 24.
— *Indicum maximum longum* Bessl. III. 36. no. 17.
— *Indicum maximum rotundum erectum* Bessl. III. 35. no. 14. δ.
— *Indicum medium longum erectum* Bessl. III. 33. no. 1. γ.
— *Indicum minimum erectum* Bessl. III. 33. no. 2.
— *Indicum rotundum aculeatum* Bessl. III. 37. no. 24. δ.
— *Indicum rotundum maximum* Bessl. III. 37. no. 25.
— *Indicum siliquis flavis* Bessl. III. 36. no. 17. δ.
— *oblongum erectum pyramidale* Raj. III. 33. no. 1.
Piperella Bth. III. 719. VI 672. no. 1.
— *filiformis* Prsl. III. 723. no. 24.
Piptadenia Bth. I. 858. °V. 578.
— biuncifera Bth. I. 859. no. 10.
— colubrina Bth. I. 860. no. 24.
— communis Bth. I. 859. no. 14.
— falcata Bth. I. 860. no. 23.
— filicoma Bth. I. 859. no. 6.
— foliosa Bth. I. 859. no. 7.
— Guianensis Bth. *I. 859. no. 3.
— inaequalis Bth. I. 860. no. 18.
— latifolia Bth. I. 858. no. 1.
— laxa Bth. I. 859. no. 2.
— leptostachya Bth. I. 860. no. 19.
— macradenia Bth. I. 859. no. 4.
— macrocarpa Bth. I. 860. no. 22.
— microphylla Bth. I. 860. no. 25.

Piptadenia moniliformis Bth. I. 860. no. 20.
— nitida Bth. I. 859. no. 5.
— paniculata Bth. I. 860. no. 17.
— patens Bth. V. 578. no. 1.
— peregrina Bth. *I. 860. no. 21.
— polystachya Miquel. V. 579. no. 3.
— psilostachya Bth. I. 859. no. 8.
— pterosperma Bth. I. 860. no. 16.
— ramosissima Bth. I. 859. no. 9.
— rigida Bth. I. 859. no. 15.
— suaveolens Miquel. V. 579. no. 2.
— subtilifolia Bth. *I. 859. no. 11.
— trisperma Bth. I. 859. no. 13.
— viridiflora Bth. *I. 859. no. 12.
Piptanthus D. Don. II. 831. °V. 422.
— Napalensis D. Don. *II. 831. no. 1. V. 422. no. 1.
Piptocarpha R. Br. *II. 701.
Piptocoma Cass. *II. 541.
Piptolaena Harvey. VI. 468.
— *Drégei* Alph. DC. VI. 468. no. 1.
Piptopogon Cass. °VI. 342.
— *decipiens* Cass. VI. 343. no. 2.
— glaucum C. H. Schultz. VI. 342. no. 1.
— laevigatum C. H. Schultz. VI. 343. no. 2.
— *macrospermum* C. A. Mey. VI. 346. no. 1.
Piqueria Cav. *II. 545. VI. 105.
— densiflora Bth. VI. 105. no. 1.
Piripea palustris Aubl. III. 301. no. 2.
Piriqueta Aubl. II. 230.
Piriquetae? nova species?? Schlchtd. II. 230. no. 27.
— lanceolata Bth. II. 230. no. 1.
Piriti III. 359. no. 118.
Piscidia L. *I. 802.
Pistacia L. I. 549.
— Chinensis Bnge. I. 549. no. 1.
— mutica Fisch. et Mey. I. 549. no. 2.
— *sativa* Prsl. I. 550. no. 3.
— *Terebinthus* M. Bieb. I. 550. no. 2.
— vera L. *I. 550. no. 3.
— *Vitex* Linn. fil. IV. 83. no. 6.
Pistorinia DC. II. 258.
— *breviflora* Boiss. II. 258. no. 1.
— Salzmanni Boiss. II. 258. no. 1.
Pisum Tournef. I. 712. II. 885.
— Abyssinicum Al. Braun. I. 712. no. 2.
— Aucheri Jaub. et Spach. II. 885. no. 1.
— *maritimum* L. I. 720. no. 22.
— variegatum Prsl. I. 712. no. 1.
Pitahayae Pfeiff. (Cereus) II. 334.
Pitavia Molina. I. 519.
— punctata Molina. *I. 519. no. 1.
Pitcheria Torr. et Gr. I. 790.
— *galactioides* Nutt. I. 790. no. 42.
Pithecolobium Mart. I. 931. °V. 608.
Pithecolobium adianthifolium Bth. V. 618. no. 60.
— angulatum Bth. V. 614. no. 32.
— Auaremotemo Mart. I. 932. no. 2. V. 612. no. 20.
— auriculatum Bth. V. 618. no. 59.
— Benthamianum Miq. V. 612. no. 23.
— Berterianum Bth. V. 620. no. 67.
— bigeminum Mart. V. 613. no. 28.
β. bubalinum Bth. V. 614. no. 28.
— candidum Bth. V. 611. no. 12.
— cataractae Bth. V. 616. no. 45.
—? cauliflorum Mart. I. 932. no. 3. V. 617. no. 50.
— cinereum Bth. V. 618. no. 54.
— circinnale Bth. V. 611. no. 11.
— clypearium Bth. V. 614. no. 33.
— cochleatum Mart. V. 612. no. 18.
—? comosum Bth. V. 620. no. 70.
— contortum Martius. V. 615. no. 35.
— corymbosum Bth. V. 620. no. 69.
— cyclocarpum Martius. V. 613. no. 25.
— divaricatum Bth. V. 616. no. 44.
— diversifolium Bth. V. 611. no. 14.
— dulce Bth. V. 610. no. 5.
— dumosum Bth. V. 621. no. 75.
— excelsum Mart. V. 611. no. 13.
— fasciculatum Bth. V. 614. no. 31.
— ferrugineum Bth. V. 618. no. 56.
— filicifolium Bth. V. 613. no. 26.
— foliolosum Bth. V. 621. no. 77.
— forfex Bth. V. 610. no. 7.
— fragrans Bth. V. 619. no. 66.
— geminatum Bth. V. 611. no. 15.
— glabratum Martius. V. 617. no. 51.
— glomeratum Bth. V. 616. no. 46.
— gummiferum Mart. I. 932. no. 4. V. 612. no. 21.
— hymenaeaefolium Bth. V. 609. no. 2.
— incuriale Bth. V. 619. no. 62.
— laetum Bth. V. 612. no. 19.
— Langsdorffii Bth. V. 613. no. 27.
— lasiopus Bth. I. 932. no. 5. V. 617. no. 49.
— latifolium Bth. V. 617. no. 47.
—? laxiflorum Bth. V. 616. no. 41.
— ligustrinum Bth. V. 616. no. 43.
— lobatum Bth. V. 614. no. 30.
— lucidum Bth. V. 614. no. 29.
— lusorium Bth. V. 613. no. 24.
— macrostachyum Bth. V. 609. no. 1.
— Martianum Bth. V. 619. no. 61.
— Mathewsi Bth. V. 621. no. 74.
— micradenium Bth. V. 618. no. 58.
— microphyllum Bth. V. 610. no. 9.
— moniliferum Bth. V. 615. no. 37.
— montanum Bth. V. 615. no. 34.

Pithecolobium multiflorum Bth. V. 620. no. 68.
— nitidum Bth. V. 611. no. 16.
— oblongum Bth. V. 609. no. 3.
— parvifolium Bth. V. 621. no. 76.
— pauciflorum Bth. V. 616. no. 40.
— pedicellare Bth. V. 619. no. 64.
— polycarpum Poepp. et Endl. V. 609. no. 4.
— polycephalum Bth. V. 619. no. 65.
— pruinosum Bth. V. 615. no. 38.
— pubescens Bth. V. 610. no. 6.
— ramiflorum Bth. V. 617. no. 52.
— rhombeum Bth. V. 618. no. 57.
— salutare Bth. V. 618. no. 55.
— Saman Bth. V. 617. no. 53.
— Schomburgkii Bth. V. 619. no. 63.
— scutiferum Bth. V. 615. no. 39.
— Selloi Bth. V. 617. no. 48.
—? spinifolium Bth. V. 610. no. 10.
— subacutum Bth. V. 615. no. 36.
— tenuiflorum Bth. V. 621. no. 73.
— tortum Mart. I. 931. no. 1. V. 620. no. 71.
— trapezifolium Bth. V. 612. no. 22.
— umbellatum Bth. V. 611. no. 17.
— unguis cati Bth. V. 610. no. 8.
— unifoliolatum Bth. V. 616. no. 42.
— Vincentis Bth. V. 620. no. 72.
Pithecoctenium Martius. VI. 513.
— Panamense Bth. VI. 513. no. 1.
Pithecoseris Mart. *II. 542.
Pithocarpha Lindl. II. 644. VI. 231.
— corymbulosa Lindl. II. 644. no. 2.
— major Steetz. VI. 231. no. 1.
— pulchella Lindl. II. 644. no. 1.
Pithyopsis Nutt. *II. 952. no. 20.
Pithyopsis Nutt. II. 959.
Pitonia DC. II. 508.
Pittonia DC. VI. 555. no. 1.
Pittosporea serrulata Wall. I. 254. no. 36.
PITTOSPOREAE R. Br. I. 250. II. 770. V. 71.
Pittosporoides umbellata Soland. I. 252. no. 14.
Pittosporum Soland. I. 250. V. 71.
— Abyssinicum Delile. V. 71. no. 2.
— acacioides A. Cunn. I. 255. no. 41.
— Andersonii Fisch. *I. 255. no. 3.
— angustifolium Lodd. I. 255. no. 4.
— *angustifolium* Lodd. I. 255. no. 41.
— *arbutifolium* Hort. I. 252. no. 15. 18.
— bicolor Hook. I. 254. no. 34.
— bracteolatum Endl. I. 253. no. 22.
— *Capense* Hort. I. 252. no. 15.
— *Chinense* Don. I. 252. no. 18.
— commutatum Putterl. I. 251. no. 13.
— cornifolium A. Cunn. I. 253. no. 25.
Pittosporum coriaceum Ait. I. 252. no. 17.
— crassifolium Soland. I. 253. no. 21.
— crenulatum Putterl. I. 253. no. 27.
— densiflorum Putterl. I. 251. no. 11.
— elegans Raoul. V. 71. no. 4.
— *enkianthoides* R. Cunn. et Hügel. I. 251. no. 5.
— eriocarpum Royle. I. 251. no. 8.
— *eugenioides* A. Cunn. I. 252. no. 14.
— expense Nois. *I. 255. no. 1. †
— ferrugineum Ait. I. 251. no. 9.
— *ferrugineum β. filarium* Sm. I. 250. no. 4.
— floribundum Wght. et Arn. I. 251. no. 10.
— *fulvum* Rdge. I. 251. no. 12.
— glabrum Hook. et Arn. I. 252. no. 16.
— *hirsutum* Lk. I. 251. no. 12.
— *hirtum* Hort. Taurin. II. 160. no. 1.
— *hirtum* Willd. I. 251. no. 12.
— Hügelianum Putterl. I. 253. no. 24.
— *Japonicum* Hortul. I. 352. no. 1. V. 116. no. 1.
— lanceolatum Putterl. I. 254. no. 35.
— *laurifolium* Willd. I. 252. no. 17.
— ligustrifolium A. Cunn. I. 254. no. 31. V. 72. no. 8.
— longifolium Putterl. I. 254. no. 29.
— *longifolium* Putterl. V. 72. no. 8.
— *Mauritianum* Lodd. I. 250. no. 3.
— microcarpum Putterl. I. 251. no. 5.
— nanum Hook. I. 255. no. 37.
— Neelgherrense Wght. et Arn. I. 251. no. 6.
— obcordatum Raoul. V. 71. no. 7.
— ochrosiaefolium Bojer. V. 71. no. 5.
— oleaefolium A. Cunn. I. 254. no. 33.
— parviflorum Putterl. V. 71. no. 1.
— pauciflorum Hook. et Arn. I. 253. no. 26.
— *phylliraeoides* A. Cunn. I. 254. no. 33.
— phylliraeoides DC. I. 254. no. 32.
— pimeleoides A. Cunn. I. 254. no. 28.
— *procumbens* Hook. I. 255. no. 3.
— radicans R. Cunn. I. 255. no. 39.
— reflexum R. Cunn. I. 255. no. 38.
— revolutum Dryandr. I. 251. no. 12.
— rhombifolium A. Cunn. V. 71. no. 3.
— Roëanum Putterl. I. 254. no. 30.
— *Roëanum* Putterl. V. 72. no. 8.
— rubiginosum R. Cunn. I. 255. no. 40.
— Rumphii Putterl. I. 250. no. 4.
— Senacia Putterl. I. 250. no. 3.
— *Sinense* Dsf. I. 252. no. 15.
— Taïtense Guill. I. 250. no. 2.
— tenuifolium Gaertn. I. 253. no. 23.
— tetraspermum Wght. et Arn. I. 251. no. 7.
— Tobira Ait. I. 252. no. 18.
— *Tobira β. foliis variegatis* Lodd. I. 252. no. 18.

Pittosporum tomentosum Bonpl. I. 251. no. 12.
— *translucens* Hook. I. 253. no. 23.
— tuberculatum Zeyh. *I. 255. no. 2.
— *umbellatum* A. Cunn. I. 251. no. 5.
— umbellatum Gaertn. I. 252. no. 14.
— undulatum Vent. I. 250. no. 1.
β. latifolium Hügel.
— uniflorum Putterl. I. 253. no. 20.
— verticillatum Bojer. V. 71. no. 6.
— *viridiflorum* Eckl. I. 252. no. 13.
— viridiflorum Sims. I. 252. no. 15.
— Wallichii Putterl. I. 254. no. 36.
— Zeylanicum Wght. I. 252. no. 19.
Pitumba Bth. I. 547. no. 18. V. 406. no. 1.
Pityopsis Nutt. II. 588.
— argentea Nutt. II. 588. no. 4.
— falcata Nutt. *II. 588. no. 2.
— graminifolia Nutt. *II. 588. no. 3.
— *oligantha* Chapm. II. 959. no. 1.
— pinifolia Nutt. *II. 588. no. 1.
Pityrocarpa Bth. I. 860. V. 579.
Pityrodia R. Br. IV. 97.
— salvifolia R. Br. IV. 97. no. 1.
Pityrosperma Siebld. et Zucc. °V. 7.
— acerinum Siebld. et Zucc. V. 7. no. 1.
— biternatum Siebld. et Zucc. V. 7. no. 3.
— obtusilobum Siebld. et Zucc. V. 7. no. 2.
Placus Lour. *II. 701. no. 9.
Pladera pusilla Rxb. VI. 502. no. 1.
Plagianthcron Putterl. I. 254.
Plagianthus Forst. I. 331.
— betulinus A. Cunn. I. 331. no. 2.
— divaricatus Forst. I. 331. †
— sidoides Hook. I. 331. no. 1.
— urticinus A. Cunn. I. 331. no. 3.
Plagiobothrys Fisch. et Mey. *VI. 562.
Plagiocheilus Arn. II. 643. VI. 226.
— frigidus Poepp. et Endl. II. 643. no. 2.
— prostratus Bth. VI. 226. no. 1.
— tanacetoides Hook. et Arn. II. 643. no. 1.
Plagiolobium Sweet. I. 577. V. 431.
— chorozemaefolium Sweet. *I. 577. no. 1.
— ilicifolium Sweet. I. 577. no. 2.
— macrocalyx Meisn. V. 434. no. 1.
Plagiophyllum Schlchtd.? II. 119. no. 1. et 2.
Plagiopteron Griffith. °V. 370.
— suaveolens Griffith. V. 370. no. 1.
Plagiostoma Bth. III. 875.
Plagiotaxis Chickrassa Wall. I. 436. no. 1.
Plagiotis Bth. III. 527.
Plagius Hérit. *II. 642.
Planarium Dsvx. °V. 522.
— latisiliquum Dsvx. V. 522. no. 1.
Planera Rxb. I. 851.
Planisiliquae (Indigofera) Wght. et Arn. I. 668.
PLANTAGINEAE Venten. IV. 177. VI. 695.
Plantagineae anomalae Barnéoud. IV. 177.
Plantagineae verae Barnéoud. IV. 178.
Plantaginella Hall. III. 331. no. 1.
— *palustris* C. Bauh. III. 334. no. 1.
Plantago Linn. IV. 178. VI. 695.
— *Abyssinica* Hochst. IV. 185. no. 51. μ.
— accedens Raf. *IV. 192.
— *Adriatica* Camp. IV. 180. no. 18.
— adspersa Brnhrdi. IV. 192. no. 115.
— *Aegyptiaca* Jcq. IV. 132. no. 114.
— *Afra* Linn. IV. 191. no. 105. α.
— *agrestis* Slzm. IV. 191. no. 105.
— albicans Linn. IV. 187. no. 66.
— *aliena* Schrad. IV. 186. no. 54. β.
— *alopecuroides* Lam. IV. 182. no. 35. β.
— alpina Linn. IV. 183. no. 42.
γ. cinerea, β. erecta, α. minima, δ. scabra — Barnéoud.
— *alpina* Vill. IV. 184. no. 45.
— *altissima* Brotero. IV. 185. no. 51. ϑ.
— *altissima* Linn. IV. 185. no. 51. λ.
— *altissima* Loisel. IV. 180. no. 18.
— *ambigua* β. Guss. IV. 185. no. 51. ζ.
— *ambigua* var. *sericea* Guss. IV. 185. no. 52.
— amplexicaulis Cavan. IV. 184. no. 49.
β. Indica.
— *Andicola* Dcne. IV. 181. no. 30. α.
— arachnoidea Schrenk. IV. 184. no. 46.
— arborescens Poir. IV. 191. no. 103.
β. compacta.
— arenaria Waldst. et Kitaib. IV. 191. no. 113.
— *argentea* Brotero. IV. 185. no. 51. ϑ.
— *argentea* Chaix. IV. 185. no. 52.
— argentea Lam. IV. 184. no. 44. (c. var. β.)
— *argentea* Sieb. IV. 187. no. 67.
— aristata Michx. IV. 189. no. 91.
— *arvensis* Prsl. IV. 185. no. 54.
— *Asiatica* Hook. et Arn. IV. 180. no. 18.
— Asiatica Linn. IV. 180. no. 14. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *atrata* Hppe. IV. 184. no. 45.
— *attenuata* Wall. IV. 185. no. 51.
— Aucklandica Hook. fil. VI. 695. no. 1. (*IV. 192.)
— australis Lam. IV. 186. no. 58.
— *Azorica* Hochstett. IV. 184. no. 44. (et diagnos. ibid. in adn.)
— *barbata* Forster. IV. 181. no. 30. β.
— barbata Forst. VI. 695. no. 2.
β. elongata, γ. imberbis — Hook. fil.

Plantago Bauphula Edgwrth. IV. 188. no. 79.
— Bellardi All. IV. 188. no. 78.
β. pygmaea.
— bellidifolia Viv. IV. 188. no. 76.
— bicarinata F. W. Meyer. IV. 187. no. 74.
— *bidentata* Murith. IV. 183. no. 42. *δ*.
— *brachypetala* Wllrth. IV. 192. no. 117.
— *brachyphylla* Roem. et Schult. IV. 183. no. 41. *α*.
— brachystachys Knze. IV. 192. no. 117.
— *bracteata* Mnch. IV. 179. no. 9. 1.
— Brasiliensis Sims. IV. 184. no. 50.
— Brogniartii Barnéoud. IV. 186. no. 62.
— *Brownei* Rapin. IV. 181. no. 31.
— *Browniana* Schult. IV. 181. no. 31.
— bullata Donn. IV. 179. no. 10.
— Bungei Steud. IV. 178. no. 1.
— *Calabrica* Gaudin. IV. 180. no. 13. *β*.
— *Canadensis* Hort. Paris. IV. 179. no. 12.
— canaliculata Hffmnsgg. *IV. 192.
— candicans Schrad. IV. 189. no. 92.
— Candollei Rapin. IV. 179. no. 7.
— *canescens* Adans. IV. 185. no. 51. *ι*.
— Capensis Thnbrg. IV. 186. no. 63. (c. var. *β*.)
— *capitata* Hppe. IV. 185. no. 52.
— capitellata Ramond. IV. 183. no. 42.
— *carinata* Mnch. IV. 188. no. 81.
— *carinata* Schrad. IV. 183. no. 41.
— *carnosa* R. Br. IV. 181. no. 31. VI. 696. no. 4.
— carnosa Lam. IV. 182. no. 38.
— Caroliniana Walt. IV. 186. no. 61.
— *Catanance* Rauwlf. IV. 185. no. 54.
— *Catananche* Clarke. IV. 187. no. 75.
— *Chilensis* Dsf. IV. 179. no. 7.
— *Chilensis* Rapin. IV. 190. no. 101.
— ciliata Dsf. IV. 188. no. 76.
— *cinerascens* Seringe. IV. 183. no. 42. *γ*.
— *Columnae* Gouan. IV. 172. no. 33. *δ*.
— Commersonia Dcne. IV. 187. no. 68.
— *congesta* Rz. et Pav. IV. 189. no. 96.
— *connivens* Mnch. IV. 178. no. 5.
— cordata Lam. IV. 179. no. 12.
— coriacea Cham. et Schlchtd. IV. 190. no. 101.
— Cornuti Gouan. IV. 180. no. 18.
— *Cornuti* Jcq. IV. 182. no. 33. *δ*.
— *Coronopus* Bertol. IV. 182. no. 34.
— Coronopus Linn. IV. 182. no. 33.
η. filiformis Barnéoud.
γ. brevifolia Barnéoud.
α. glabra Barnéoud.
β. hirsuta Barnéoud.
δ. latifolia Barnéoud.
ζ. serraefolia Barnéoud.
ϑ. Tlemceniana Barnéoud.
Plantago Coronopus var. *γ*. Lam. IV. 180. no. 18.
— *Coronopus* Linn. var. *ε*. IV. 182. no. 33.
— *Coronopus* Sauss. IV. 183. no. 40. *ε*.
— *Coronopus* var. *integralis* DC. IV. 183. no. 40. *ε*.
— *crassa* Willd. IV. 179. no. 10.
— *crassifolia* Forsk. IV. 183. no. 40. *β*.
— *crassifolia* Rth. IV. 179. no. 10.
— crassinervis Hornem. *IV. 192.
— *crenata* Man. Blanco. IV. 180. no. 17.
— Cretica Linn. IV. 187. no. 75.
β. decumbens Barnéoud.
— crispa Jacq. IV. 179. no. 10.
— *crithmoides* Dsf. IV. 182. no. 31.
— *cucullata* Lam. IV. 179. no. 11.
— *Cumingiana* Fisch. et Mey. IV. 180. no. 19.
— *Cupani* Guss. IV. 182. no. 33. *ε*.
— *curta* Engelm. IV. 189. no. 92.
— cylindrica Forsk. IV. 187. no. 67.
— *cynopidea* Schult. IV. 191. no. 105. *β*.
— cynops Linn. IV. 191. no. 111.
— *cynops* Pall. IV. 191. no. 13.
— *Dalmatica* Schott. IV. 185. no. 51. *λ*.
— *debilis* R. Br. IV. 180. no. 23.
— Decaisnei Barnéoud. IV. 190. no. 99.
— decipiens Barnéoud. IV. 181. no. 25.
— *decumbens* Bernh. IV. 185. no. 51. *ε*.
— *decumbens* Forsk. IV. 187. no. 75. *β*.
— *decumbens* Gay. IV. 189. no. 95. *β*.
— *dentata* Rth. IV. 183. no. 40. *ϑ*.
— *depressa* Willd. IV. 180. no. 14.
— *divaricata* Zuccagni. IV. 191. no. 105. *β*.
— *d'Urvillei* Delile. IV. 179. no. 7.
— *elongata* Prsh. IV. 178. no. 4.
— *eriophora* Lnk. et Hffmnsgg. IV. 185. no. 51. *ϑ*.
— eriopoda Torrey. *IV. 192.
— *eriorhiza* Willd. IV. 189. no. 94.
— *eriostachya* Tenore. IV. 185. no. 54.
— *erosa* Wall. IV. 180. no. 14.
— *Eschscholtziana* Fisch. et Mey. IV. 180. no. 19.
— Euphratica Dcne. IV. 191. no. 112.
— *exaltata* Hornem. IV. 179. no. 9. 2. *α*.
— *exigua* Murr. IV. 191. no. 106.
— Fernandezia Bertero. IV. 190. no. 103.
— firma Knze. IV. 192. no. 116.
— frigida Knze. IV. 189. no. 98.
— *frigida* Willd. IV. 189. no. 88.
— *fruticosa* Hort. Paris. IV. 186. no. 55.
— Garganica Tenore. *IV. 192.
— Gaudichaudii Barnéoud. IV. 181. no. 24.
— Gayana Dcne. IV. 190. no. 102.
— *Genevensis* DC. IV. 191. no. 111.
— gentianoides Sibthrp. et Sm. IV. 180. no. 16.

Plantago Gerardi Schult. IV. 183. no. 41.
— glabra Nutt. *IV. 192.
— glauca C. A. Mey. IV. 186. no. 57.
— gnaphaloides Nutt. IV. 189. no. 90. (c. var. β.)
— glomerata Poir. IV. 188. no. 83.
— *Gouani* Gmel. IV. 180. no. 18.
— *gracilis* Hort. IV. 180. no. 18.
— gracilis Poir. IV. 183. no. 39.
— *graminea* Lam. IV. 183. no. 40. δ.
— *graminea* Rapin. IV. 183. no. 40. δ.
— *graminea* Schleich. IV. 183. no. 42. δ.
— *graminea* Willd. IV. 189. no. 94.
— *grandiflora* Meyen. IV. 190. no. 98.
— Gunnii Hook. fil. VI. 696. no. 5.
— *hirsuta* Kitaib. IV. 191. no. 105.
— *hirsuta* Pourr. IV. 183. no. 41. γ.
— *hirsuta* Rz. et Pav. IV. 181. no. 26.
— hirsuta Thnbrg. IV. 182. no. 36. (c. varr. α. et β. ibid.)
— hirtella H. B. Kth. IV. 179. no. 8.
— hispida R. Br. IV. 180. no. 22.
— hispidula Rz. et Pav. IV. 181. no. 27.
— *holosericea* Gaud. IV. 184. no. 45.
— *holostea* Lam. IV. 188. no. 78.
— *Hookeriana* Fisch. et Mey. IV. 189. no. 90. β.
— *humifusa* Brnhrdi. IV. 185. no. 51. ε.
— *Hungarica* Waldst. et Kit. IV. 185. no. 51. ζ.
— *hybrida* Bart. IV. 178. no. 4.
— *imberbis* Hook. fil. VI. 695. no. 2. γ.
— *incana* Ramond. IV. 183. no. 42. β.
— *incurvata* Murr. IV. 183. no. 41. γ.
— incisa Hsskrl. VI. 696. no. 9.
— *Indica* Linn. IV. 191. no. 113.
— *integralis* Gaud. IV. 183. no. 40. ε.
— *intermedia* Gilib. IV. 179. no. 91. 2. γ.
— *intermedia* Lapeyr. IV. 185. no. 54.
— *interrupta* Poir. IV. 187. no. 69.
— *irrigua* Fisch. IV. 185. no. 51. λ.
— Ispaghul Rxb. IV. 187. no. 70.
— *Jaquini* Roem. et Schult. IV. 182. no. 33. δ.
— *juncoides* Lam. IV. 183. no. 40. η.
— Kamtschatica Lnk. IV. 180. no. 15.
— *Kentuckensis* Michx. IV. 180. no. 12.
— *Lagascae* Duf. IV. 183. no. 41. γ.
— *lagopodioides* Schrank. IV. 186. no. 54. γ.
— *lagopoides* Dsf. IV. 184. no. 49.
— Lagopus Linn. IV. 185. no. 54. (c. varr. α. β. γ.)
— *Lagopus* Prsh. IV. 189. no. 90.
— *Lagopus* varr. ε. et ζ. Rapin. IV. 186. no. 55.
— *lanata* Delile. IV. 189. no. 92.
— *lanata* Host. IV. 185. no. 51. ζ.
— *lanata* Lagasca. IV. 184. no. 44. β.
Plantago lanata Poir. IV. 188. no. 78.
— lanceolata Linn. IV. 185. no. 51. (c. varr. α — ω.)
λ. altissima, ι. canescens, ε. decumbens, δ. polycephala, γ. prolifera } Barnéoud.
— *lanceolata* Brotero. IV. 185. no. 51. ζ.
— *lanceolata β. alpestris* Whlnbrg. IV. 184. no. 45.
— *lanceolata β. atrata* Pers. IV. 184. no. 45.
— *lanceolata var. montana* Tenore. IV. 185. no. 51. ζ.
— *lanuginosa* Bossard. IV. 185. no. 51. ζ.
— leiopetala Lowe. IV. 185. no. 53.
— *leptostachya* E. Mey. IV. 186. no. 63. β.
— Lessingii Fisch. et Mey. IV. 188. no. 85.
— Limensis Pers. IV. 181. no. 26.
— *limosa* Kitaib. IV. 179. no. 9. 2. β.
— *linearifolia* Mühlnbrg. IV. 178. no. 4.
— *linearis* H. B. Kth. IV. 189. no. 94.
— *Linkii* Schrad. IV. 185. no. 51. ϑ.
— *Loefflingii* M. Bieberst. IV. 178. no. 3.
— *Loefflingii* Huds. IV. 183. no. 40. ϑ.
— Loefflingii Linn. IV. 188. no. 81.
β. Caspica Fisch.
— longistipes Royle. IV. 185. no. 51.
— Lourerii Roem. et Schult. IV. 180. no. 17.
— Ludowiciana Raf. *IV. 192.
— *Lusitanica* Linn. IV. 186. no. 54. γ.
— *macrantha* Dcne. IV. 190. no. 98.
— macrocarpa Cham. et Schlchtd. IV. 186. no. 61.
— macrorhiza Poir. IV. 182. no. 34.
— *Madritensis* Lagasca. IV. 186. no. 54. β.
— *major* Bertero. IV. 179. no. 8.
— major Linn. IV. 179. no. 9. (cum varr. α. β. γ. δ. ε. ζ. η. ibid.)
— *major β.* Lam. IV. 179. no. 9. 1.
— *major* Loureiro. IV. 180. no. 17.
— *major β.* Poir. IV. 179. no. 9. 2. δ.
— *major* Scopol. IV. 180. no. 18.
— *major γ. brachystachya* Wallrth. IV. 179. no. 9. 2. δ.
— *major β. leptostachys* Wallrth. IV. 179. no. 9. 2. δ.
— *major ε. phyllostachya* Mert. et Koch. IV. 179. no. 9. 1.
— *major γ. polystachya* Mert. et Koch. IV. no. 9. 2.
— *major ζ. rhodostachya* Mert. et Koch. IV. 179. no. 9. 1.
— *marina* Lobel. IV. 183. no. 40. ϑ.
— *marina* Petiv. IV. 188. no. 81.
— *maritima* Barton. IV. 178. no. 4.

Plantago maritima Linn. IV. 183. no. 40. (c. varr. α—ϑ. ibid.)
α. pubescens } Barnéoud.
η. minor }
— *maritima* Pall. IV. 183. no. 40. ζ.
— maxima Ait. IV. 179. no. 11.
— *maxima* Burch. IV. 180 no. 18.
— *media* Hook. et Arn. IV. 179. no. 7.
— media Linn. IV. 180. no. 13.
β. rosea Barnéaud.
γ. Urvilleana Rapin.
— *media* d'Urville. IV. 180. no. 13. γ.
— Mexicana Lnk. IV. 189. no. 94.
— *microcephala* Royle. IV. 185. no. 51. x.
— *minima* DC. IV. 179. no. 9. 2. δ.
— *minuta* Lnk. IV. 188. no. 78.
— *minuta* C. A. Mey. IV. 188. no. 81. β.
— minuta Pall. IV. 188. no. 80.
— mollis Hook. et Arn. IV. 189. no. 97.
— monanthos d'Urville. IV. 181. no. 31. VI. 695.
β. abbreviata Hook. fil. VI. 695. no. 3.
γ. muscoides Hook. fil. VI. 695. no. 3.
— *monosperma* Pourr. IV. 184. no. 44.
— ***Monspeliensis*** Bern. Juss. IV. 184. no. 45.
— montana Lam. IV. 184. no. 45.
β. minor. } Barnéoud.
γ. major. }
— multiceps H. B. Kth. IV. 189. no. 89.
— myosuros Lam. IV. 179. no. 6.
— nana Bertol. IV. 188. no. 86. [VI. 696. no. 7.]
— *nana* Trattin. IV. 179. no. 9. 2. δ.
— *nigricans* Auctor. IV. 184. no. 45.
— nitida Roem. et Schult. IV. 181. no. 29.
— *nivalis* Boiss. IV. 184. no. 44.
— nivea H. B. Kth. IV. 189. no. 92.
— nubigena H. B. Kth. IV. 188. no. 88.
— nutans Lam. IV. 181. no. 28.
— Nuttallii Rapin. IV. 189. no. 93.
— *oliganthos* Roem. et Schult. IV. 178. no. 4.
— Olivieri Dene. IV. 187. no. 71.
— *paludosa* Turcz. IV. 180. no. 14. α.
— parviflora Dsf. IV. 191. no. 107.
— *parviflora* Hortul. IV. 191. no. 106.
— *parvula* Roem. et Schult. IV. 188. no. 78.
— *parvula* Welden. IV. 183. no. 43.
— Patagonica Jcq. IV. 187. no. 72.
— *pauciflora* Lam. VI. 695. no. 2.
— pauciflora Lam. IV. 181. no. 30. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *pauciflora β. parva* Barnéoud. VI. 695. no. 2.
— *pauciflora* Prsh. IV. 178. no. 4.
— penicillata Fnzl. et Endl. IV. 188. no. 77.
— Perreymondii Barnéoud. VI. 190. no. 100.
Plantago Philippica Cavan. IV. 188. no. 84.
— *pilosa* Cav. IV. 188. no. 78.
— *pilosa* Lam. IV. 188. no. 78.
— *pilosa* Waldst. et Kit. IV. 185. no. 52.
— *platypetala* Wallrth. IV. 190. no. 98.
— *polymorpha* Bnks. et Soland. VI. 695. no. 2.
— polysperma Kar. et Kir. IV. 178. no. 2.
— polystachya Vivian. *IV. 192.
— praecox C. A. Mey. IV. 188. no. 82.
— *Preslii* Tenore. IV. 185. no. 52.
— *princeps* Cham. et Schlchtd. IV. 190. no. 104. α.
— *pseudo-Lusitanica* Roem. et Schult. IV. 186. no. 54. γ.
— *Pseudo-psyllium* Hort. Paris. IV. 191. no. 105.
— *Psyllium* Bulliard. IV. 191. no. 113.
— Psyllium Linn. IV. 190. no. 105.
α. Afra } Barnéoud.
β. divaricata }
— *pumila* Welden. IV. 183. no. 43.
— *pumila* Willd. IV. 191. no. 106.
— *pungens* Lapeyr. IV. 183. no. 41. α.
— purpurascens Nutt. IV. 180. no. 21.
— *Purshii* Roem. et Schult. IV. 189. no. 90.
— *pusilla* Bnge. IV. 178. no. 1.
— pusilla Nutt. IV. 179. no. 4.
— *pygmaea* Lam. IV. 188. no. 78. β.
— Queleniana Gaudich. IV. 190. no. 104.
α. major ramosa.
— *quinquenervia* Schleich. IV. 184. no. 45.
— *radicata* Hffmnsgg. et Lnk. IV. 183. no. 41.
— rectirostris Wallrth. *IV. 192.
— *recurvata* Linn. IV. 183. no. 41. γ.
— *remota* M. Bieb. IV. 183. no. 40. ζ.
— remota Lam. IV. 186. no. 60.
— rigida H. B. Kth. IV. 181. no. 32.
— *rigida* Hortul. IV. 191. no. 105.
— robusta Rxb. IV. 191. no. 110.
— *Rosettana* Poir. IV. 191. no. 106.
— rubens Hsskrl. VI. 696. no. 8.
— *rubens* Horst. IV. 185. no. 51. η.
— *salsa* Pall. IV. 183. no. 40. ζ.
— Sarda Prsl. VI. 696. no. 10.
— saxatilis M. Bieb. IV. 184. no. 47.
— *Schottii* Roem. et Schult. IV. 185. no. 51. λ.
— scirpoides Lam. IV. 184. no. 48.
— scorzoneraefolia Lam. IV. 182. no. 37.
— sericea Rz. et Pav. IV. 189. no. 96.
— *sericea* Tenore. IV. 185. no. 52.
— *sericea* Waldst. et Kitaib. IV. 185. no. 52.
— *serpentina* Lam. IV. 183. no. 41. γ.
— serraria Linn. IV. 182. no. 35. (c. varr. α. β. et γ.)
— *serrata* Haller. fil. IV. 183. no. 42. δ.

Plantago setosa Bertol. IV. 186. no. 56. VI. 696. no. 6.
— *setosa* Clarke. IV. 187. no. 67.
— *Sibirica* Fisch. IV. 180. no. 14. β.
— *Sicula* Prsl. IV. 191. no. 105.
— *sinuata* Lam. IV. 179. no. 9. 2. η.
— sparsiflora Michx. IV. 187. no. 69.
— *sphaerocephala* Poir. IV. 184. no. 45.
— *squamata* Flor. Danic. IV. 183. no. 40.
— squarrosa Murr. IV. 192. no. 114.
— *squarrosa* Nutt. IV. 189. no. 93.
— Steinbeilii Barnéoud. IV. 187. no. 73.
— stricta Schousb. IV. 191. no. 106.
— *Strutia* Tenore. IV. 180. no. 13. β.
— *subsinuata* Hornem. IV. 179. no. 9. 2. ε.
— subulata Linn. IV. 183. no. 41.
α. pungens, γ. serpentina, β. sessiliflora } Barnéoud.
— *suffruticosa* Lam. IV. 191. no. 111.
— *sylvatica* Mart. IV. 185. no. 51. λ.
— Syrtica Viv. *IV. 192.
— Tabernaemontani Baumgart. *IV. 192.
— tenuiflora Waldst. et Kit. IV. 178. no. 3.
— *tenuis* Lnk. et Hffmnsgg. IV. 188. no. 78.
— *teretifolia* Sieb. IV. 183. no. 40.
— *Thunbergii* Poir. IV. 182. no. 36.
— tomentosa Lam. IV. 180. no. 19. (c. var. β. ibid.)
— tumida Lnk. IV. 189. no. 95.
β. supina.
— *triantha* Spr. IV. 181. no. 31.
— triantha Spr. VI. 695. no. 4. (c. varr. β. et γ. pag. 696.)
— *triquetra* Pers. IV. 183. no. 41.
— truncata Cham. et Schlchtd. IV. 180. no. 20.
— uliginosa Baumgarten. IV. 186. no. 65.
— *uliginosa* Schmidt. IV. 179. no. 9. 2. ζ.
— uncialis Dcne. IV. 188. no. 87.
— *uniflora* Linn. IV. 178. no. 1. β.
— uniglumis Wllrth. IV. 192. no. 118.
— vaginata Venten. IV. 186. no. 55.
— varia R. Br. IV. 180. no. 23.
— *variabilis* Lnk. IV. 185. no. 51. ϑ.
— *vestita* Roem. et Schult. IV. 189. no. 96.
— *victorialis* Bertol. IV. 185. no. 52.
— victorialis Poir. IV. 185. no. 52.
— *villosa* Lam. IV. 188. no. 78.
— virescens Barnéoud. IV. 186. no. 59.
— Virginica Linn. IV. 178. no. 5. (c. varr. α. et β.)
— Webbii Barnéoud. IV. 191. no. 109.
— Weldenii Rchb. IV. 183. no. 43.
— *Wulfenii* Spr. IV. 183. no. 40.
— *Wulfenii* Sturm. IV. 183. no. 41.
Playtago Wulfenii Willd. IV. 183. no. 41. δ.
— *Xorullensis* H. B. Kth. IV. 189. no. 94.
Platanocarpum Endl. II. 511.
— *subditum* Korthls. II. 511. no. 1.
Platea Blume. I. 378.
— excelsa Blume. I. 378. no. 1.
— latifolia Blume. I. 378. no. 2.
Plathymenia cf. Platyhymenia.
Platonia Mart. I. 398.
— insignis Mart. *I. 398. no. 1.
Platostoma Bth. III. 496.
— *Africanum* Pal. de Beauv. III. 496. no. 8.
Platunium rubrum Juss. III. 894. no. 1.
Platycapnos DC. *I. 122. °V. 25.
Platycapnos DC. V. 25.
— spicatus Brnhardi. V. 25. no. 1.
Platycarpha Less. *II. 541.
Platycarpum Humb. et Bonpl. *VI. 515.
Platychilum Delaun. I. 577.
Platycodon Alph. DC. *II. 710. *VI. 381.
— grandiflorum Alph. DC. *VI. 734.
Platycoelae DC. (Valerianella) II. 527. VI. 80. no. 5.
Platycrater Siebld. et Zucc. II. 377. V. 836.
— arguta Siebld. et Zucc. *II. 377. no. 1. V. 836. no. 1.
Platygalium DC. II. 458. VI. 14.
Platyhymenia Bth. I. 858. °V. 578.
— foliolosa Bth. I. 858. no. 2.
— reticulata Bth. I. 858. no. 1.
Platylobium Sm. I. 577.
— formosum Rchb. I. 578. †
— Murrayanum Hook. I. 577. no. 2.
— obtusangulum Hook. I. 577. no. 1.
— *ovatum* Andrws. II. 833. no. 2.
— triangulare R. Br. I. 578. †
Platylophus Don. II. 373.
— trifoliatus Don. *II. 373. no. 1.
Platymene DC. II. 385.
Platymerium Bartl. *II. 524.
Platymiscium Vogel. I. 802.
— dichotomum Bth. I. 802. no. 4.
— floribundum Vogel. I. 802. no. 1.
— latifolium Bth. I. 802. no. 5.
— luteum Bth. I. 802. no. 3.
— praecox Mart. I. 802. no. 6.
— speciosum Vogel. I. 802. no. 2.
Platynema Wght. et Arn. °V. 357.
— laurifolium Wght. et Arn. *V. 357. no. 1
Platypetalum R. Br. I. 174.
— *capitatum* Turcz. I. 172. no. 3.
— dubium R. Br. I. 174. no. 2.
— involucratum Bnge. I. 174. no. 3.
— *nanum* Turcz. I. 172. no. 8.
— purpurascens R. Br. I. 174. no. 1.
Platypodium elegans Vogel. I. 802. no. 4.

Platypodium viride Vogel. I. 802. no. 5. V. 546. no. 1.
Platysace Bnge. °V. 841.
— cirrhosa Bnge. V. 841. no. 1.
Platysema Bth. I. 757.
— triquetrum Hffmnsgg. *I. 757. no. 1.
Platyspermum DC. V. 899. no. 1. 2. 3.
Platyspermum Hook. I. 174.
— scapigerum Hook. *I. 174. no. 1.
Platystemma Royle. *VI. 655.
Platystemma Wall. *VI. 523.
Platystemon Bth. I. 117.
— Californicum Bth. *I. 117. no. 1.
γ. leiocarpum.
β. lineare.
— *leiocarpum* Fisch. et Mey. I. 117. no. 1. γ.
Platystemoneae Bernh. I. 117.
Platystigma Bth. I. 117.
— lineare Bth. *I. 117. no. 1.
Platystylis cyanea Sweet. I. 724. †
Platytheca Steetz. °V. 70.
— crassifolia Steetz. V. 70. no. 3.
— cruciancella Steetz. V. 70. no. 2.
— galioides Steetz. V. 70. no. 1.
Platzia Rz. et Pav. *II. 701. no. 8. *VI. 320.
Plectaneia Pet. Thouars. *VI. 465.
Plectrandra ciliosa Mart. V. 61. no. 1.
Plectrantheae Endl. III. 501. III. 977. VI. 658.
Plectanthera floribunda Mart. et Zucc. I. 226. no. 4.
Plectranthes colorata D. Don. III. 495. no. 2.
— *rubicunda* D. Don. III. 498. no. 1.
— *virgata* D. Don III. 499. no. 2.
Plectranthus Hérit. III. 501. °III. 977. VI. 658.
— *Amboinensis* Spr. III. 515. no. 5.
— amethystoides Bth. III. 511. no. 47.
— *aromaticus* Rxb. III. 515. no. 5.
— *asper* Spr. III. 514. no. 2.
— australis R. Br. III. 504. no. 17.
— *australis* Lindl. III. 505. no. 17.
— *barbatus* Andrws. III. 513. no. 2.
— *Barrelieri* Spreng. III. 484. no. 2. η.
— bicolor Blume. III. 517. no. 16.
— calycinus E. Mey. III. 511. no. 46.
— canescens Bth. III. 502. no. 5.
— *caninus* Roth. III. 513. no. 1.
— *carnosus* Sm. III. 520. no. 1.
— ciliatus E. Mey. III. 501. no. 3.
— Coetsa D. Don. III. 509. no. 39.
— coloratus E. Mey. III. 506. no. 25.
— *comosus* Andrws. III. 513. no. 2.
— congestus R. Br. III. 504. no. 15.
Plectranthus cordifolius D. Don. III. 504. no. 13.
— *crassifolius* Hortul. III. 515. no. 5. III. 520. no. 1.
— *crassifolius* Vahl. III. 514. no. 4.
— *divaricatus* Weinm. III. 504. no. 13.
— *dubius* Spr. III. 520. no. 1.
— dubius Vahl. III. 511. no. 48.
— foetidus Bth. III. 503. no. 12.
— *Forskålii* Vahl. III. 505. no. 20.
— *Forskålii* Willd. III. 513. no. 2.
— Forsteri Bth. III. 506. no. 23.
— fruticosus L'Hérit. III. 501. no. 1.
— *galeatus* Vahl. III. 518. no. 20.
— Gerardianus Benth. III. 509. no. 38.
— *graveolens* R. Br. III. 505. no. 18.
— hirtus Bth. III. 505. no. 21.
— hispidus Bth. III. 509. no. 37.
— *incanus* Lnk. III. 504. no. 13.
— *Indicus* Spr. III. 487. no. 12.
— inflexus Vahl. III. 511. no. 49.
— *ingratus* Blume. III. 516. no. 9. (et diagn. in adn. ibid.)
— intermedius Zolling. et Moritzi. VI. 658. no. 1.
— Javanicus Bth. III. 512. no. 51.
— *laciniatus* Blume. III. 517. no. 19.
— lanceolatus Bojer. III. 507. no. 30.
— Lechenaultii Bth. III. 502. no. 8.
— longiflorus Bth. III. 502. no. 6.
— *macrophyllus* Blume. III. 517. no. 15.
— Macraei Bth. III. 509. no. 41.
— *maculatus* Bojer. III. 515. no. 6.
— Madagascariensis Bth. III. 505. no. 20.
— *Malabaricus* Klein. III. 518. no. 23.
— *Maypurensis* Spr. III. 504. no. 13.
— melissoides Bth. III. 506. no. 29.
— menthoides Benth. III. 509. no. 40.
— *micranthus* Spr. III. 497. no. 1.
— *mollis* Spr. III. 504. no. 13.
— *mollissimus* Wall. III. 498. no. 1. *a.*
— *monachorum* Spr. III. 489. no. 18.
— *monadelphus* Heyne. III. 514. no. 3.
— *monadelphus* Rxb. III. 514. no. 2.
—? montanus Bth. III. 510. no. 44.
— *moschatus* R. Br. III. 497. no. 2.
— moschatus R. Br. III. 506. no. 24.
— Nankinensis Spr. III. 512. no. 53.
— nigrescens Bth. III. 508. no. 35.
— nudiflorus Willd. III. 512. no. 52.
— oblongifolius Wall. III. 507. no. 32.
— ovatus Bth. III. 503. no. 11.
—? Palisotii Bth. III. 506. no. 28.
— *paniculatus* Jcq. III. 505. no. 18.
— *parviflorus* R. Br. III. 497. no. 1.
— *parviflorus* Henkel. III. 505. no. 18.
— parviflorus Willd. III. 505. no. 18.

Plectranthus petiolaris E. Mey. III. 506. no. 26.
— punctatus L'Hérit. III. 502. no. 7.
— *rariflorus* Hochst. VI. 657. no. 4.
— repens Wall. III. 510. no. 43.
— *riparius* Hochst. VI. 657. no. 1.
— rotundifolius Spr. III. 503. no. 9.
— rugosus Wall. III. 510. no. 42.
— *rugosus β. tomentosus* Bth. III. 510. no. 41.
— saccatus E. Mey. III. 501. no. 2.
— salvioides Bth. III. 511. no. 50.
— scrophularioides Wall. III. 508. no. 33.
— *scutellarioides* Blume. III. 517. no. 18.
— scutellarioides R. Br. III. 515. no. 7.
— *secundus* Rxb. III. 504. no. 13.
— Sieberi Bth. III. 505. no. 22.
— spicatus E. Mey. III. 507. no. 31.
— *spicatus* E. Mey. VI. 658. no. 1.
— striatus Bth. III. 508. no. 36.
— *strobiliferus* Rxb. III. 520. no. 1.
— subincisus Bth. III. 504. no. 14.
— ternatus Sims. III. 503. no. 10.
— ternifolius D. Don. III. 510. no. 45.
— Thunbergii Bth. III. 505. no. 19.
— *thymiflorus* Spr. III. 500. no. 6.
— tomentosus E. Mey. III. 506. no. 27.
— *tristis* Spr. III. 499. no. 4.
— *tuberosus* Blume. III. 520. no. 29.
— *tuberosus* Rxb. III. 498. no. 1. β.
— vestitus Bth. III. 501. no. 4.
— *villosus* Sieb. III. 505. no. 20.
— *viscosus* Spr. III. 493. no. 37.
— Wightii Bth. III. 508. no. 34.
— *Wightii β.* Bth. III. 508. no. 35.
— Zeylanicus Bth. III. 504. no. 16.
Plectritis Lindl. II. 528.
— brachystemon Fisch. et Mey. II. 528. no. 3.
— *capitata* Nutt. II. 528. no. 1.
— congesta DC. II. 528. no. 1.
— *congesta β.* Hook. et Arn. II. 528. no. 2.
— *longiflora* Nutt. II. 527. no. 11.
— macroceras Torr. et Gr. II. 528. no. 2.
Plectrocarpa Gill. I. 498.
— tetracantha Guill. *I. 498. no. 1.
Plectronia Linn. II. 484. *II. 942.
— citrifolia Eckl. et Zeyh. II. 484. no. 2.
— pauciflora Kltzsch. II. 484. no. 3.
— spinosa Kltzsch. II. 484. no. 1.
Plectrotropis angustifolia Schum. et Thonn. I. 756. no. 1.
— hirsuta Schum. et Thonn. I. 756. no. 2.
Pleiacanthus Nutt. II. 692.
Pleiogyne C. Koch. II. 992. °VI. 209.
— anthemoides Koch. *II. 992. no. 3.
— australis C. Koch. *II. 992. no. 1.
Pleiogyne cardiosperma Edgwrth. VI. 723.
— microcephala C. Koch. II. 992. no. 4.
— nudicaulis C. Koch. *II. 992. no. 5.
— reptans C. Koch. *II. 992. no. 2.
— villosa C. Koch. *II. 992. no. 6.
Pleiogynodes C. Koch. II. 992.
Pleiomeris Alph. DC. * VI. 451.
Plenkia setiflora Raf. II. 239. no. 1. γ.
Pleocarphus Don. *II. 682. * VI. 325.
Pleostictides A. P. DC. VI. 513.
Pleostictides Martius. VI. 513.
Pleotheca Wall. II. 525.
— bifida Wall. *II. 525. no. 1.
— cylindrica Wall. * II. 525. no. 2.
Pleroma Don. II. 132. II. 917. V. 703.
— albiflorum Gardn. II. 917. no. 1.
— arboreum Gardn. II. 917. no. 6.
— Benthamianum Gardn. II. 918. no. 7.
— corymbosum Bth. V. 703. no. 1.
— echinatum Gardn. II. 917. no. 3.
— elegans Gardn. II. 917. no. 4.
— Fontanesianum Gardn. *II. 132. no. 2.
— heteromallum Don. *II. 132. no. 1.
— Kunthianum Paxton. V. 703. †
— multiflorum Gardn. II. 917. no. 5.
— petiolatum Paxton. V. 703. †
— *vimineum* Don. II. 128. no. 1.
— virgatum Gardn. II. 917. no. 2.
Plethiosphace Bth. III. 618. VI. 662.
Pleurandra Labill. I. 64. II. 746. V. 11.
— cistiflora Rchb. I. 64. no. 4.
— cognata Steudel. V. 11. no. 6.
— densiflora Scott. I. 64. no. 1.
— diamesogenos Steudel. V. 11. no. 5.
— glaucophylla Steudel. V. 11. no. 2.
— hemignosta Steudel. V. 11. no. 3.
— hibbertioides Steudel. V. 11. no. 4.
— hirsuta Hook. I. 64. no. 3.
— incana Lindl. II. 746. no. 2.
— recurvifolia Steudel. V. 11. no. 1.
—? reticulata Scott. I. 64. no. 2.
— riparia R. Br. *II. 746. no. 1.
β. pubescens Hook.
Pleurodesmia Grahamii Arn. I. 64. no. 1.
Pleurogyne Eschscholtz. VI. 507.
— carinata Edgewrth. VI. 507. no. 1.
Pleuropetalum Hook. fil. °V. 785.
— Darwinii Hook. fil. V. 785. no. 1.
Pleurophora Don. II. 105.
— polyandra Hook. et Arn. II. 105. no. 2.
— pungens Don. II. 105. no. 1.
— pusilla Hook. et Arn. II. 105. no. 3.
—? *squarrosa* Steudel. II. 103. no. 6.
Pleurophyllum Hook. fil. ° VI. 180.
— criniferum Hook. fil. VI. 181. no. 2.
— speciosum Hook. fil. VI. 181. no. 1.

Pleuropterygieae Adr. Juss. V. 290.
Pleurorhizeae DC. I. 123. V. 34.
Pleurospermum Hffm. II. 425.
— cicutarium Lindl. II. 425. no. 1.
— *Gmelini* Bongrd. V. 920. no. 1.
— *Golaka* Rchb. II. 425. no. 1.
Pleurostylis Wght. et Arn. I. 536.
— Heynei Wght. et Arn. I. 536. no. 2.
— Wightii Wght. et Arn. I. 536. no. 1.
Plinthus Fnzl. II. 232. V. 783.
— cryptocarpus Fnzl. *II. 232. no. 1. V. 783. no. 1.
Plocama Ait. *II. 463.
Plecandra E. Mey. *VI. 499.
Ploesslea Endl. I. 422.
— floribunda Endl. *I. 422. no. 1.
— *floribunda* Endl. V. 419. no. 1.
Ploiarum Krthls. I. 376. °V. 132. *V. 136.
— elegans Krthls. *I. 376. no. 1. V. 132. no. 1.
Ploionuxia DC.? II. 437. no. 8.
Plottzia dichotoma Arn. I. 262. no. 10.
Pluchea Cass. II. 599. II. 972. VI. 138.
Pluchea Cass. II. 953. no. 1.
Pluchea DC. (ex p.) II. 953. no. 1.
— amabilis Kth. VI. 138. no. 2.
— camphorata DC. *II. 972. no. 1.
β. angustifolia Torr. et Gr.
— Indica Lssng. *II. 599. no. 1.
— *Kraussii* C. H. Schultz. II. 972. no. 3.
— longepedunculata Kth. et Bouché. VI. 138. no. 3.
— *Marylandica* DC. II. 972. no. 1.
— Organensis Gardn. VI. 138. no. 1.
Plucheïneae DC. II. 599. VI. 138.
Plumeria Tournef. *II. 470.
Plumerieae Alph. DC. VI. 467.
Plusiocoma DC. II. 600. no. 2.
Pneumonanthe Griseb VI. 506. no. 12.
Poarium Dsvx. III. 437. °III. 973. *VI. 654.
— veronicoides Dsvx. III. 437. no. 1.
Pocillum Tulasne. V. 575.
Pocockia Ser. I. 638. II. 850.
— Cretica Ser. *I. 638. no. 1. II. 850. no. 1.
— Graeca Boiss. et Spruner. II. 850. no. 2.
Podalyria Lam. I. 565. II. 831.
— *albens* E. Mey. I. 565. no. 11. ε.
— *amoena* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 3.
— argentea Salisb. *I. 565. no. 10.
δ. angustifolia, β. glabrata, γ. racemulosa } Wlprs.
— biflora Willd. *I. 565. no. 8.
— *bracteata* Rxbg. I. 566. no. 1.
— Burchellii DC. *I. 565. no. 5.
β. albida.
Podalyria buxifolia Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 9.
— *buxifolia* Lam. II. 831. no. 1.
— *buxifolia* E. Mey. I. 565. no. 13.
— buxifolia Willd. *I. 565. no. 12.
— calyptrata Willd. *I. 565. no. 1.
δ. lanceolata, γ. latifolia, β. styracifolia, α. villosa. } Wlprs.
— *calyptrata δ. lanceolata* Wlprs. II. 832. no. 3.
— *cana* Willd. I. 565. no. 5. β.
— canescens Eckl. et Zeyh. *I. 565. no. 3.
— cordata R. Br. *I. 565. no. 4.
β. minor Wlprs.
— cuneifolia Vent. *I. 565. no. 7.
β. latifolia Wlprs.
— glauca DC. *I. 565. no. 13. *II. 831. no. 1.
— *glauca* Eckl. et Zeyh. I. 565. n. 9.
— *hamata* E. Mey. I. 565. no. 11. γ.
— *hirsuta* Willd. I. 565. no. 7. et 10.
— *intermedia* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 4. β.
— Kunthii Wlprs. I. 566. no. 17.
— *laevigata* Willd. I. 564. no. 2.
— *lanceolata* Bth. I. 565. no. 1. δ.
— lanceolata Bth. II. 831. no. 3.
— *lancifolia* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 9.
— *liparioides* DC. I. 165. no. 9.
— *liparioides β. angustifolia* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 8.
— *Meyeriana* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 4.
— *microphylla* E. Mey. I. 565. no. 10.
— Mundtiana Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 15.
— *Mundtiana* Eckl. et Zeyh. II. 831. no. 1.
— myrtillifolia Willd. *I. 565. no. 9.
β. glauca Wlprs.
— *myrtillifolia* E. M. I. 565. no. 1. γ.
— orbicularis Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 2.
— *pallens* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 11. ζ.
— *parvifolia* Bth. I. 565. no. 9.
— *patens* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 11. δ.
— pedunculata Eckl. et Zeyh. *I. 565. no. 6.
— *racemulosa* DC. I. 565. no. 10. γ.
— sericea R. Br. *I. 565. no. 11.
β. nivea Wlprs.
— sparsiflora Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 14.
— *sparsiflora* Eckl. et Zeyh. II. 831. no. 1.
— speciosa Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 16.
— *splendens* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 7.
— *styracifolia* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 1. γ.
— *styracifolia* Sims. I. 565. no. 1. β.
— *subbiflora* DC. I. 565. no. 8.
— *Thunbergiana* Eckl. et Zeyh. I. 565. no. 3. β.
— *trifoliata* Willd. I. 785. no. 16.

Podalyria velutina Burch. II. 831. no. 2.
— *virgata* Willd. I. 565. no. 9.
Podalyrieae Bth. I. 562. II. 831. V. 422.
Podanthes Dcne. VI. 495. no. 1.
Podanthum DC. VI. 382. no. 1.
Podiopetalum Hochst. I. 805. V. 547.
— reticulatum Hochst. *I. 805. no. 1. V. 547. no. 1.
Podocarpus? Dieffenbachii Hook. III. 938.
Podochreati DC. (Astragalus) I. 706. II. 875.
Podocoma Cass. *II. 576. *II. 952. no. 3.
Podolepis Labill. II. 645. VI. 235.
— chrysantha Endl. II. 645. no. 1.
— filiformis Steetz. VI. 236. no. 5.
— Lucaeana Wlprs. VI. 235. no. 1.
— nutans Steetz. VI. 236. no. 3.
— rosea Steetz. VI. 236. no. 2.
β. mollissima.
— subulata Steetz. VI. 236. no. 4.
Podolobium R. Br. I. 567. V. 424.
— *humifusum* Don. I. 566. no. 3.
— *scandens* DC. I. 566. no. 3.
— *sericeum* DC. I. 566. no. 2.
— staurophyllum Sieb. *V. 424. no. 1.
— trilobatum R. Br. *I. 567. no. 1.
Podolotus Bth. I. 651.
— hosackioides Bth. *I. 651. no. 1.
PODOPHYLLEAE DC. (ex p.) I. 100. V. 18.
Podophyllum L. I. 100.
— *callicarpum* Raf. I. 100. no. 1.
— *diphyllum* L. I. 100. no. 1.
— hexandrum Royle. I. 100. no. 2.
— peltatum L. I. 100. no. 1.
Podospermum DC. II. 688. VI. 345.
— Buxbaumii C. Koch. VI. 345. no. 1.
— Cariense Boiss. VI. 346. no. 4.
— eriospermum Boiss. VI. 345. no. 3.
— heterophyllum C. Koch. VI. 345. no. 2.
— *intermedium* Juss. VI. 345. no. 1.
— laciniatum DC. *II. 688. no. 1.
δ. Soongaricum Kar. et Kir.
— *loreum* Griseb. VI. 349. no. 1.
— molle Fisch. et Mey. *II. 688. no. 2.
— phaeopappum Boiss. VI. 346. no. 5.
— *villosum* DC. II. 688. no. 2.
Podostaurus Junghun. V. 7.
— thalictroides Junghun. *V. 7. no. 1.
Podostigma Ell. VI. 483.
— pubescens Ell. *VI. 483. no. 1.
Podotheca Cass. II. 645.
— gnaphalioides Hook. II. 645. no. 1.
Podotheceae C. H. Schultz. VI. 145. adn.
Poeppigia Prsl. I. 809. V. 552.
— *cyanocarpa* Bertero. IV. 73. no. 5.
— densiflora Tulasne. V. 552. no. 3.
— ferruginea Tulasne. V. 552. no. 2.
Poeppigia procera Prsl. *I. 809. no. 1. V. 552. no. 1.
Pogogyne Bth. III. 745. °III. 984.
— Douglasii Bth. III. 745. no. 1.
— multiflora Bth. III. 745. no. 2.
— parviflora Bth. III. 745. no. 3.
Pogonandra DC. VI. 393.
Pogonanthera Blume. II. 143. V. 712.
— pulverulenta Blume. *II. 143. no. 1. V. 712. no. 1.
— reflexa Blume. II. 143. no. 2.
Pogonia aspera Hort. IV. 136. no. 9.
— *debilis* Andrws. IV. 137. no. 18.
— *glabra* Andr. IV. 136. no. 3.
— *scabra* Hort. IV. 136. no. 9. IV. 137. no. 20.
— *tetrandra* Labill. IV. 137. no. 14.
— *tuberculata* Hort. IV. 136. no. 9.
— *verrucosa* Dsvx. IV. 138. no. 25.
Pogonolepis Steetz. °VI. 230.
— stricta Steetz. *VI. 230. no. 1.
Pogonostigma Boiss. II. 858. °V. 515.
— Arabicum Boiss. II. 858. no. 1. V. 516. no. 1.
— Nubicum Boiss. II. 858. no. 2. V. 516. no. 2.
Pogonura E. Mey. *II. 683.
Pogopetalum Bth. II. 803.
— acuminatum Bth. II. 803. no. 2.
— acutum Bth. II. 803. no. 3.
— nitens Bth. II. 803. no. 4.
— orbiculatum Bth. II. 803. no. 1.
Pogostemeae Endl. III. 576. III. 979. VI. 660.
Pogostemon Dsf. III. 576. °III. 979. VI. 660.
— *Auricularia* Hsskrl. III. 940.
— sristatus Hsskrl. III. 940.
— gracilis Hsskrl. III. 940.
— glaber Bth. III. 577. no. 5.
— Heyneanus Bth. III. 577. no. 7. (c. var. β. ibid.)
— hirsutus Bth. III. 578. no. 11.
— menthoides Blume. III. 579. no. 15.
— mollis Bth. III. 578. no. 10.
— mollis Hsskrl. III. 940.
— paniculatus Bth. III. 576. no. 1. *III. 940.
— parviflorus Bth. III. 577. no. 4.
— Patchouly Pelletier-Sautelet. VI. 660. no. 2.
— plectranthoides Dsf. III. 577. no. 2.
— rotundatus Bth. III. 578. no. 9.
— rupestris Bth. III. 578. no. 12.
— speciosus Bth. III. 578. no. 13.
— tomentosus Hsskrl. VI. 660. no. 1.
— tuberculosus Bth. III. 577. no. 6.
— vestitus Bth. III. 578. no. 8.
— villosus Bth. III. 577. no. 3.

Pogostemon Wightii Bth. III. 579. no. 14.
— villosus Bth. III. 577. no. 3.
β. macrophyllus.
Pogostoma Schrad. III. 264. °III. 962. *VI. 645.
— saxifragaefolium Schrad. III. 264. no. 1.
Poinciana L. I. 809. II. 903. V. 554.
— Gilliesii Hook. I. 809. no. 1. *II. 903. no. 1. V. 554. no. 1.
— pulcherima L. I. 809. † *V. 554. no. 2.
— regia Rchb. I. 809. †
Poiretia Vent. I. 725. V. 520.
— angustifolia Vogel. I. 725. no. 3.
— coriifolia Vogel. I. 726. no. 5.
— densiflora Mart. I. 725. no. 1.
— latifolia Vogel. I. 725. no. 4.
— multiflora Mart. et Galeotti V. 520. no. 1.
— *procumbens* Gmel. II. 496. no. 34.
— pubescens Vogel. I. 725. no. 2.
Poivrea Comm. II. 64. V. 662.
— aculeata DC. *II. 64. no. 1.
— alternifolia DC. *II. 64. no. 8.
— barbata Wlprs. II. 64. no. 6.
— bracteosa Hochst. V. 662. no. 1.
— coccinea DC. *II. 64. no. 11.
— comosa Wlprs. *II. 64. no. 3.
— eriopetala DC. *II. 64. no. 10.
— grandiflora Wlprs. II. 64. no. 12.
— intermedia Wlprs. II. 64. no. 4.
— *nudiflora* Rchb. II. 64. no. 1.
— ovalis Wlprs. II. 64. no. 7.
— Pavonii Wlprs. II. 64. no. 9.
— pilosa Wght. et Arn. II. 64. no. 5.
— Roxburghii DC. *II. 64. no. 2.
— sericea Wlprs. II. 64. no. 14.
— squamosa Wlprs. II. 64. no. 13.
Poitaea Vent. *I. 680.
Polanisia Schrad. I. 195. V. 52.
— brachiata Bojer. V. 52. no. 2.
— chelidonii DC. *I. 195. no. 1. V. 53. †
— *dodecandra* DC. 193. no. 5.
— graveolens Raf. *I. 195. no. 5.
— icosandra Wght. et Arn. *I. 195. no. 2.
— *Lechenaultii* DC. I. 195. no. 1.
— micrantha Bojer. V. 53. no. 3.
— *Schraderi* DC. I. 195. no. 1.
— simplicifolia Cambess. I. 195. no. 3.
— tenuifolia Torr. et Gr. I. 196. no. 7.
— trachysperma Torr. et Gr. I. 195. no. 6.
— *viscosa* Blume. I. 195. no. 4.
— *viscosa β.* DC. I. 195. no. 2.
— *viscosa* Wall. I. 195. no. 2.
Polemannia Eckl. et Zeyh. II. 403.
— grossulariaefolia Eckl. et Zeyh. *II. 403. no. 1.
POLEMONIACEAE Ventenat. VI. 526.
Polemonium Linn. *VI. 526.
— *campanuloides* Thnbrg. III. 125. no. 2.
— *roëlloides* Thnbrg. III. 126. no. 3.
Polhymnia cf. Polymnia.
Polhymnia DC. II. 605.
Polium etc. Barr. III. 923. no. 83.
Polium Bth. III. 918. III. 923. no. 84.
— *album* Mill. III. 921. no. 75. *γ.*
— *augustifolium* Mill. III. 921. no. 75. *γ.*
— *aureum* Moench. III. 921. no. 75. *a.*
— *capitatum* Mill. III. 921. no. 75. *ζ.*
— *diffusum* Mill. III. 921. no. 75. *γ.*
— *erectum* Mill. III. 921. no. 75. *ζ.*
— *fruticosum* Mill. III. 921. no. 75.
— *integerrimum* Mill. III. 921. no. 75. *ε.*
— *latifolium* Mill. III. 921. no. 75. *γ.*
— *luteum* Mill. III. 921. no. 75. *a.*
— *montanum* Mill. III. 922. no. 79.
— *Pyrenaicum* Mill. III. 919. no. 67.
— *ramosum* Mill. III. 921. no. 75. *γ.*
— *serratum* Mill. III. 921. no. 75.
— *Smyrnaeum* Mill. III. 921. no. 75. *γ.*
— *spicatum* Mill. III. 921. no. 75. *ζ.*
Pollichia Soland. *I. 263.
— *amplexicaulis* Willd. III. 804. no. 11.
— *Galeobdolon* Roth. III. 807. no. 25.
— *montana* Pers. III. 807. no. 25.
— *vulgaris* Pers. III. 807. no. 25.
Pollichieae DC. I. 263.
Polpoda Prsl. II. 249. V. 789.
— Capensis Prsl. *II. 249. no. 1. V. 789. no. 1.
Polpodeae Fnzl. II. 249. V. 789.
Polyachyreae Endl. II. 681.
Polyachyris Lag. II. 681. VI. 321.
— glandulosus Nutt. II. 681. no. 1.
— fuscus Wlprs. VI. 321. no. 1.
Polyachyrus cf. Polyachyris.
Polyactidium DC. II. 578. *II. 952. no. 8.
Polyactium DC. I. 453.
— aconitiphyllum Eckl. et Zeyh. I. 454. no. 48.
— amatymbicum Eckl. et Zeyh. I. 454. no. 53.
— anethifolium Eckl. et Zeyh. I. 454. no. 47.
— arenarium Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 38.
— Caffrum Eckl. et Zeyh. I. 454. no. 55.
— coniophyllum Eckl. et Zeyh. I. 454. no. 46.
— daucifolium Eckl. et Zeyh. *I. 454. no. 52.
— filipendulifolium Eckl. et Zeyh. *I. 454. no. 43.
— flavum Eckl. et Zeyh. *I. 454. no. 45.
— fulgidum Eckl. et Zeyh. *I. 454. no. 50.
— gibbosum Eckl. et Zeyh. *I. 454. no. 51.
— hybridifolium Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 41.
— lobatum Eckl. et Zeyh. *I. 453. no. 36.

Polyactium papaverifolium Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 40.
— peucedanifolium Eckl. et Zeyh. I. 454. no. 49.
— primulaeforme Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 37.
— radulaefolium Eckl. et Zeyh. I. 454. no. 42.
— sphondyliifolium Eckl. et Zeyh. I. 453. no. 39.
— triste Eckl. et Zeyh. *I. 454. no. 44.
— Uitenhagense Eckl. et Zeyh. I. 454. no. 54.
Polyadenia Ehrnbrg. II. 116.
Polyalthia Blume. I. 74.
— cuneiformis Blume. *I. 74. no. 3.
— elliptica Blume. *I. 74. no. 2.
— fruticans DC. j. I. 74. no. 6.
— Kentii Blume. *I. 74. no. 4.
— macrophylla Blume. I. 74. no. 5.
— subcordata Blume. *I. 74. no. 1.
Polyanthea DC. II. 221.
Polycardia Juss. *I. 532.
Polycarena Bth. III. 309. °III. 967. *VI. 641.
— aurea Bth. III. 309. no. 3.
— Capensis Bth. III. 309. no. 1.
— capillaris Bth. III. 309. no. 5.
— gilioides Bth. III. 309. no. 2.
— intertexta Bth. III. 310. no. 8.
— *plantaginea* Bth. III. 309. no. 7.
— plantaginis Wlprs. III. 309. no. 7.
— pubescens Bth. III. 309. no. 4.
— rariflora Bth. III. 309. no. 6.
Polycarpaea Lam. I. 263. V. 76.
— aristata Chr. Sm. *I. 263. no. 2.
— atherophora Steudel. V. 76. no. 1.
— *Benthamii* Wall. I. 263. no. 2.
— Brasiliensis Cambess. I. 264. no. 11.
— candida B. Webb et Berth. I. 263. no. 3.
— carnosa Chr. Sm. *I. 263. no. 1.
— cuspidata Schlchtd. I. 264. no. 10.
— *depressa* DC. I. 263. no. 2.
— diffusa Wght. I. 264. no. 6.
— frankenioides Prsl. I. 264. no. 8.
— *lanuginosa* Wall. I. 263. no. 2.
— prostrata Dcne. I. 264. no. 9.
— Smithii Lnk. I. 264. no. 4.
— spadicea *I. 264. no. 5. (c. varr. α. β. γ. et δ. ibid.)
— spicata Wght. I. 264. no. 7.
— subulata DC.? I. 264. no. 5.
Polycarpeae DC. I. 263.
Polycarpon Loefl. I. 263.
— depressum Nutt. I. 263. no. 2.
— *pusillum* Rxb. I. 263. no. 2.
— succulentum B. Webb et Berthel. *I. 263. no. 1.
Polycenia Choisy. IV. 142.
— cordata E. Meyer. IV. 143. no. 5.
Polycenia fenestrata E. Mey. IV. 143. no. 3.
— fruticosa E. Meyer. IV. 143. no. 4.
— hebenstreitioides Choisy. IV. 142. no. 1.
— lanceolata E. Meyer. IV. 143. no. 6.
α. glabra.
β. pubescenti-hirsuta.
— tenera Wlprs. IV. 143. no. 2.
Polycephalae Bth. (Mimosa) I. 869.
Polychaete Endl. II. 548.
Polychaetia Lssng. *II. 650.
Polychlaena ramosa G. Don. I. 304. no. 27.
— *simplex* G. Don. I. 304. no. 28.
Polyclada DC VI. 351.
Polycyrtus Schlchtd. II. 939.
— cachroides Schlchtd. *II. 939. no. 1.
— *cachroides* Schlchtd. V. 883. no. 8.
Polydesmia Bth. III. 549. VI. 527.
Polydielia G. Don. III. 12.
Polydora stoechadifolia Fnzl. VI. 98 no. 54.
Polygala L. I. 231. II. 768. V. 63.
— Abyssinica R. Br. I. 232. no. 11.
— acutifolia Torr. et Gr. I. 237. no. 57.
— adenophylla St. Hil. I. 240. no. 88.
β. parvifolia.
— amatymbica Eckl. et Zeyh. I. 236. no. 52.
— *angustifolia* Heyne. I. 233. no. 14.
— aparinoides Hook. et Arn. I. 238. no. 66.
— appressa Bth. I. 241. no. 101.
— Arabica Boiss. II. 768. no. 4.
— arenaria Schum. et Thonn. I. 235. no. 35.
— arillata D. Don. I. 233. no 21.
— *arvensis* Rxb. I. 233. no. 19. β.
— *arvensis* Wall. I. 232. no. 14.
— arvensis Willd. *I. 233. no. 13.
— arvicola Bojer. V. 63. no. 2.
— atropurpurea St. Hil. I. 239. no. 79.
— attenuata Hook. I. 237. no. 64.
— *attenuata* Nutt. I. 237. no. 56.
— Beiliana Eckl. et Zeyh. I. 236. no. 49.
— *Berteriana* DC. I. 240. no. 89.
— Beyrichii Torr. et Gr. I. 237. no. 60.
— Boykinii Nutt. I. 237. no. 61.
— *brachystachya* DC. I. 233. no. 15.
— *brevifolia* Nutt. I. 236. no. 55.
— brizoides St. Hil. I. 241. no. 109.
— bryoides St. Hil. I. 241. no. 104.
— calcarea F. W. Schultz. I. 232. no. 2.
— campestris Gardn. II. 769. no. 8.
— camporum Bth. I. 242. no. 119.
— cestrifolia St. Hil. I. 242. no. 117.
— Chapmanni Torr. et Gr. I. 237. no. 62. (III. Emend. p. 1.)
— ciliata L. *I. 233. no. 19.
β. minor Wght. et Arn.
— clavipes Schlchtd. I. 238. no. 68.
— cneorum St. Hil. I. 241. no. 103.

Polygala comosa cbkubr. *I. 232. no. 8.
— conosperma Bojer. I. 235. no. 36.
— cordifolia Prsl. I. 238. no. 71.
— coriacea St. Hil. I. 240. no. 87.
— corisioides St. Hil. I. 239. no. 84.
— corymbosa Michx. *I. 237. no. 56.
— crotalarioides Hamilt. *I. 234. no. 26. I. 242. †
— *crotalloides* Rxb. I. 233. no. 13 b.
— cruciata L. *I. 236. no. 55.
— *cuspidata* DC. I. 240. no. 90.
— *cuspidata* Hook. et Arn. I. 236. no. 55.
— cyparissias St. Hil. I. 239. no. 82.
— densiflora Blume. I. 234. no. 31.
— densifolia St. Hil. I. 241. no. 106.
β. grandiflora.
— diffusa Alb. Dietr. I. 235. no. 41.
— distans St. Hil. I. 240. no. 91.
— Duarteana St. Hil. I. 240. no. 98.
— Dunaliana St. Hil. I. 240. no. 97.
β. alba.
— Eckloniana Lehm. I. 235. no. 37.
— elegans Wall. I. 234. no. 24.
— elongata Prsl. I. 232. no. 3.
— equisetoides St. Hil. I. 239. no. 77.
— *fastigiata* Nutt. I. 236 no. 55.
— filiformis St. Hil. I. 239. no. 76.
— floribunda Bth. I. 238. no. 70.
— *furcata* Royle. I. 234. no. 25.
— glaucescens Wall. I. 234. no. 25.
— *glaucoides* Wall. I. 233. no. 14.
— *glaucoides* Wght. I. 233. no. 13.
— *graminifolia* Poir. I. 237. no. 56.
— *grandiflora* Wght. I. 233. no. 13. *β*.
— grandifolia St. Hil. I. 242. no. 118.
— hebantha Bth. V. 64. no. 10.
— hebeclada DC. *I. 241. no. 108.
— herbiola St. Hil. I. 239. no. 80.
— heterophylla Scheele. V. 63. no. 7.
— Heyneana Wall. I. 233. no. 20.
— Hilariana Endl. I. 242. no. 120.
— hirsuta St. Hil. I. 241. no. 111.
— hirsutula Arn. I. 233. no. 22.
— Hohenackeriana Fisch. et Mey. I. 232. no. 7.
— humilis Spanoghe. I. 234. no. 33.
— *hybrida* DC. I. 232. no. 8.
— hydrophila Kth. *I. 240. no. 89.
— hyssopifolia Bojer. V. 63. no. 1.
— *hyssopifolia* St. Hil. I. 241. no. 108.
— incarnata L. *I. 237. no. 58.
— irregularis Boiss. II. 768. no. 3.
— Javana DC. I. 242. †
— juncea St. Hil. I. 239. no. 81.
— lanata E. Mey. II. 769. no. 6.
— lancifolia St. Hil. I. 241. no. 107.
Polygala laureola St. Hil. I. 242. no. 116.
— Lehmaninana Eckl. et Zeyh. I. 239. no. 48.
— leptocaulis Torr. et Gr. I. 237. no. 59.
— leptoclada Bojer. V. 63. no. 3.
— *ligularis* Spreng. I. 235. no. 43.
— ligustroides St. Hil. I. 242. no. 114.
— *linearifolia* Bth. I. 233. no. 17.
— *linearis* Heyne. I. 233. no. 17.
— linifolia Scheele. V. 63. no. 5.
— longifolia Alb. Dietr. I. 235. no. 39.
— Ludwigiana Eckl. et Zeyh. I. 236. no. 46.
— micrantha Guill. et Perr. I. 234. no. 34.
— *micrantha* Thnbrg. I. 244. no. 15.
— minutiflora Prsl. I. 238. no. 73.
— molluginifolia St. Hil. I. 240. no. 92.
— monopetala Cambess. I. 234. no. 29.
— Moquiniana St. Hil. I. 241. no. 100.
— muraltioides Eckl. et Zeyh. I. 236. no. 53.
— mutabilis Dumort. I. 231. no. 1.
γ. luteola.
α. paniculata.
β. tenella.
— *myrsinites* Royle. I. 234. no. 24.
— myrtifolia *β*. grandiflora Hook. I. 242. †
— *myrtifolia γ. rosmarinifolia* DC. I. 235. no. 44.
— *myurus* St. Hil. I. 239. no. 78. *β*.
— Noucherensis Cambess. I. 234. no. 28.
— obovata St. Hil. I. 241. no. 102.
— obscura Bth. I. 238. no. 69.
— Ohlendorfiana Eckl. et Zeyh. I. 235. no. 45.
— oleaefolia St. Hil. I. 242. no. 115.
— oppositifolia *β*. major Ker. I. 242. †
— pachyrrhiza Casaretto. V. 64. no. 9.
— paludosa St. Hil. I. 239. no. 78.
δ. ambigua
γ. amethystina
ζ. appendiculata
η. gigantea
ε. longespicata
β. tenuis } Cambess.
— *paniculata* Le Conte. I. 237. no. 58.
— papilionacea Boiss. II. 768. no. 2.
— Pappeana Eckl. et Zeyh. I. 236. no. 47.
— pedicellaris St. Hil. 242. no. 112.
— peduncularis A. Rich. I. 238. no. 75.
— persicariaefolia DC. I. 242. †
— *persicariaefolia* Wall. I. 234. no. 23.
— Pohliana St. Hil. I. 241. no. 110.
— polifolia Prsl. I. 234. no. 30.
— polycephala St. Hil. I. 239. no. 83.
— polygama Walt. *I. 237. no. 63.
— *procumbens α*. Roth. I. 233. no. 13 b.
— *procumbens β*. Roth. I. 233. no. 14.
— *prostrata* Bth. I. 233. no. 13. b.
— *prostrata* Willd.. I. 233. no. 19. *β*.

Polygala pruinosa Boiss. II. 768. no. 1.
— pseudoërica St. Hil. I. 241. no. 105.
— pulchella St. Hil. I. 240. no. 95.
— pulchella Scheele. V. 63. no. 6.
— pulchella Schlchtd. II. 769. no. 7.
— *pulchra* Hsskrl. V. 64. no. 2.
— quadrangula Prsl. I. 238. no. 74.
— Quartiniana Dill. et A. Rich. I. 232. no. 13.
— Raddiana St. Hil. I. 240. no. 93.
β. subaphylla.
— *ramosa* Ell. I. 237. no. 56.
— *ramosa* Wght. I. 233. no. 19.
— resedoides St. Hil. I. 240. no. 96.
— revoluta Gardn. V. 63. no. 4.
— rhombifolia Eckl. et Zeyh. I. 235. no. 42.
— rigida St. Hil. I. 240. no. 86.
— rosmarinifolia Eckl. et Zeyh. I. 235. no. 44.
— rosmarinifolia Wght. et Arn. I. 233. no. 16. (III. Emend. p. 1.)
— Rothiana Wght. et Arn. I. 233. no. 14 b. (III. Emend. p. 1.)
— Roubienna St. Hil. I. 241. no. 99.
— *rubella* W. I. 237. no. 63.
— rufa Spanoghe. I. 234. no. 32.
— sanguinea L. *I. 236. no. 54.
— *sanguinea* Torr. et Gr. I. 236. no. 55.
— serpentaria Eckl. et Zeyh. I. 236. no. 51.
— *serpyllifolia* Poir. I. 232. no. 14.
— Sibirica L. *I. 232. no. 9.
— speciosa Sims. I. 242. †
— spergulaefolia St. Hil. I. 240. no. 94.
— sphenoptera Fresen. I. 232. no. 12.
— spinescens Dcne. I. 232. no. 10.
— spinescens Gill. I. 237. no. 65.
— Sprengeliana Eckl. et Zeyh. I. 235. no. 43.
— *squarrosa* Thnbrg. I. 244. no. 11.
— Steudeliana Eckl. et Zeyh. I. 236. no. 50.
— straminea Prsl. I. 232. no. 4.
— stricta St. Hil. I. 239. no. 85.
— strigulosa Schlchtd. I. 238. no. 67.
— telephioides Willd. *I. 232. no. 14.
— *tenuifolia* Lnk. I. 235. no. 40.
— *tenuis* DC. I. 239. no. 78. β.
— tenuis Alb. Dietr. I. 235. no. 40.
— thesioides Willd. I. 242. †
— Timoutu Aubl. *I. 240. no. 90.
— Tranquebarica Mart. *I. 233. no. 15.
— *Tranquebarica* Wght. I. 233. no. 16.
— triflora L. *I. 233. no. 17.
— triphylla Hamilt. *I. 234. no. 27.
— uncinata E. Mey. II. 769. no. 5.
— velutina Prsl. I. 238. no. 72.
— *venenosa* Juss. V. 64. no. 1.
— *venosa* Heyne. I. 233. no. 20.
— venulosa Alb. Dietr. I. 235. no. 38.
— violoides St. Hil. I. 242. no. 113.
Polygala viridescens Poir. I. 236. no. 54.
— volubilis Bojer. V. 64. no. 8.
— *vulgaris* ε. *buxifolia* Schultz. I. 232. no. 2.
— *vulgaris* γ. *elata* DC. I. 232. no. 8.
— Wallichiana Wght. I. 234. no. 23.
— Wightiana Wall. 233. no. 18. (III. Emend. p. 1.)
POLYGALEAE Juss. I. 231. II. 768. V. 63.
Polygalon DC. I. 232.
Polygama (Solanum) G. Don. III. 70.
Polylepis Rz. et Pav. *II. 44.
Polylobium Eckl. et Zeyh. I. 620. *V. 460.
Polylobium Eckl. et Zeyh. V. 456.
— angustifolium Eckl. et Zeyh. I. 621. no. 10.
— *angustifolium* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 18.
— debile Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 3.
— *debile* Eckl. et Zeyh. V. 457. no. 24.
— fastigiatum Eckl. et Zeyh. I. 621. no. 11.
— *fastigiatum* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 20.
— filiforme Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 4.
— *filiforme* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 17.
— intermedium Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 2.
— *intermedium* Eckl. et Zeyh. V. 457. no. 21.
— involucratum Eckl. et Zeyh. I. 621. no. 9.
— *involucratum* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 18.
— Mundtianum Eckl. et Zeyh. I. 621. no. 12.
— *Mundtianum* Eckl. et Zeyh. V. 457. no. 20.
— pallens Eckl. et Zeyh. I. 621. no. 7.
— *pallens* Eckl. et Zeyh. V. 457. no. 27.
— sparsiflorum Eckl. et Zeyh. I. 621. no. 6.
— truncatum Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 5.
— *truncatum* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 17.
— tenuifolium Eckl. et Zeyh. I. 621. no. 8.
— *tenuifolium* Eckl. et Zeyh. V. 456. no. 18.
— typicum Eckl. et Zeyh. I. 620. no. 1.
— *typicum* Eckl. et Zeyh. V. 457. no. 21.
Polylophi Pfeiff. (Cereus) II. 332.
Polylophium Boiss. °V. 897.
— orientale Boiss. V. 897. no. 1.
Polymeria R. Br. *VI. 541.
Polymeris Dunal. III. 62. VI. 595.
Polymnia Linn. II. 605. VI. 149.
— *Caroliniana* Poir. II. 975. no. 2.
— fruticosa Bth. VI. 149. no. 1.
— sonchifolia Poepp. et Endl. II. 605. no. 1.
Polyodontia arborea Blume. II. 8. no. 1.
Polyosma Blume. II. 379. (*II. 436.) II. 937.
— Chinense Wlprs. II. 937. no. 1.
— Cunninghamii R. Br. II. 380. no. 2.
— fragrans Bennet. II. 380. no. 6.
— ilicifolia Blume. II. 380. no. 3.
— integrifolia Blume. II. 380. no. 5.
— serrulata Blume. II. 380. no. 4.

Polyosma Wallichii Bennet. II. 379. no. 1.
Polyozus Lour. *II. 480.
— *Maderaspatana* DC. II. 517. no. 4.
Polypangium Endl. II. 704.
Polypappus Lssng. *II. 595. *II. 952. no. 1.
Polyphragmon Dsf. *II. 490.
Polyphyllae (Crotalaria) Wght et Arn. I. 591. no. 74. V. 451.
Polypompholyx Lehm. VI. 439.
— latioloba Lehm. *VI. 439. no. 2.
— Endlicheri Lehm. *VI. 439. no. 1.
— tenella Lehm. *VI. 439. no. 3.
Polypremum Linn. *II. 502. VI. 56. *497. *645.
— *procumbens* Schlchtd. VI. 56. no. 1.
— Schlechtendalii Wlprs. VI. 56. no. 1.
Polypteris Nutt. *II. 627.
— *integrifolia* DC. II. 625. no. 5.
— *integrifolia* Nutt. II. 949. no. 3.
Polyscias Forst. *II. 430.
Polyspermae Barnéoud. (Plantago.) IV. 178.
Polyspora axillaris Sweet. II. 802. no. 2.
Polystemma Dene. VI. 490.
— viridiflora Dene. *VI. 490. no. 1.
Polystemon pentaphyllus D. Don. V. 834. no. 2.
— *triphyllus* D. Don. V. 834. no. 1.
Polytaenia DC. II. 416.
— Nuttallii DC. *II. 416. no. 1. (c. var. β.)
Polytaxis Bnge. °VI. 290.
— Lehmanni Bnge. *VI. 290. no. 1.
Polytropia Prsl. I. 672.
— ferulaefolia Prsl. *I. 672. no. 1.
— pinnata Eckl. et Zeyh. I. 673. no. 3.
— umbellata Eckl. et Zeyh. I. 672. no. 2.
Polyzone purpurea Endl. II. 153. no. 1.
Poma Hierochuntica Imper. III. 83. no. 326.
Pomaceae Juss. V. 660.
POMACEAE Lindl. II. 53. II. 915. V. 660.
Pomaria Cav. I. 811. V. 559.
— *glandulosa* Torr. I. 811. no. 1.
— humilis Mart. et Gal. V. 559. no. 1.
— Jamesii Wlprs. I. 811. no. 1. (III. Emend. p. 4.)
Pomatium Gaertn. fil. II. 517.
— dubium G. Don. II. 517. no. 1.
Pomax Soland. *II. 454.
Pombalea Ipecacuanha Vandell. I. 222. no. 20.
— *Iluba* Ging. I. 222. no. 20.
Pomum amoris Blackw. III. 102. no. 9.
— *de Hiericho Melongenae congener* Bauh. III. 83. no. 326.
— *Sodomae* Merian. III. 85. no. 340.
Ponceletia R. Br. *II. 733.
Pongamia Lam. I. 798. II. 902. V. 543.
— atropurpurea Wall. I. 798. no. 4.
Pongamia elliptica Wall. I. 798. no. 5. *V. 543. no. 1.
— glabra Vent. I. 798. †
— Heyneana Grah. I. 798. no. 3.
— ovalifolia Wght. et Arn. I. 798. no. 1. *II. 902. no. 1. (III. Emend. p. 4.)
— *religiosa* Wght. I. 798. no. 2.
— *triphylla* Wght. I. 798. no. 2.
— uliginosa DC. *I. 798. no. 2.
PONGATIEAE Endl. II. 722.
Pongatium Juss. *II. 711.
Pongatium Juss. II. 722.
Pontania Celsiana Lem. V. 423. no. 3.
Popowia Endl. I. 74.
— pisocarpa Endl. I. 74. no. 1.
Porana Burm. *VI. 542.
Porcelia parviflora Pers. I. 79. no. 52.
— *pygmaea* Pers. I. 79. no. 54.
— *triloba* Pers. I. 79. no. 51.
Porcellites apargioides Lssng. VI. 329. no. 3.
— *Brasiliensis* Lssng. VI. 331. no. 9.
— *Cretensis* Cassini. VI. 338. no. 1.
— *Helveticus* Cassini. VI. 332. no. 11.
— *maculatus* Cassini. VI. 331. no. 10.
— *radicatus* Cass. II. 687. no. 2. VI. 341. no. 7.
Porlieria Rz. et Pav. *I. 498.
Porophylleae DC. II. 624. II. 988. VI. 174.
Porophyllum Vaill. II. 624. VI. 174.
— caesium Casaretto. VI. 722.
— gracile Bth. VI. 174. no. 1.
— Japonicum DC. *II. 624. no. 1.
— latifolium Bth. II. 624. no. 1.
— tridentatum Bth. VI. 174. no. 2.
Porotiddia G. Don. III. 152. no. 4.
— *triandra* G. Don. III. 152. no. 4.
Porphyra dichotoma Lour. IV. 129. no. 23.
Portenschlagia integrifolia Tratt. I. 538. no. 19.
Portesia Cav. I. 433.
— *ovata* Cav. I. 433. no. 19.
Portlandia P. Br. *II. 506.
— *grandiflora* Hort. Batav. III. 18. no. 2.
Portulaca Tournef. II. 233. II. 934. V. 785.
— *Americana etc.* Pluk. II. 355. no. 1.
— *anonyma* Hook. et Arn. II. 249. no. 1. V. 789. no. 1.
— australis F. Bauer. II. 234. no. 12.
— *Caffra* Thnbrg. II. 234. no. 1.
— *cristata* Wall. II. 233. no. 2.
— *decumbens* Vahl. II. 239. no. 1. V. 788. no. 1.
— eriophora Casaretto. V. 785. no. 1.
— Gilliesii Hook. II. 234. no. 8.
— grandiflora Cambess. II. 234. no. 11.
— *grandiflora* var. *rutila* Lindl. II. 234. no. 7

Portulaca hirsutissima Cambess. II. 234. no. 10.
— Larouotteana Cambess. II. 234. no. 9.
— *meridiana* Linn. II. 233. no. 1. *β.*
— pilosissima Hook. II. 233. no. 6.
— prolifera Schum. II. 233. no. 5.
— quadrifida Linn. II. 233. no. 1.
α. major } Wght. et Arn.
β. minor }
— *repens* Rxb. II. 233. no. 1.
— rostellata Brignoli. V. 785. no. 2.
— suffruticosa Wght. II. 233. no. 3.
— Thelussonii Lindl. II. 234. no. 7. *II. 934. no. 1.
var. splendens Lindl. II. 934. no. 1.
— tuberosa Rxb. II. 233. no. 2.
— villosa Cham. II. 234. no. 13.
— Wightiana Wall. II. 233. no. 4.
Portulacaria Jcq. *II. 234.
Portulacarieae Fnzl. II. 234. V. 785.
PORTULACEAE Juss. II. 230. II. 934. V. 783.
Posoqueria Aubl. II. 520. VI. 76.
— acuminata Mart. II. 520. no. 6.
— acutifolia Mart. II. 520. no. 2.
— coriacea Mart. et Gal. VI. 76. no. 1.
— *fragrans* Rxb. II. 517. no. 1.
— intermedia Miq. VI. 76. no. 2.
— laurifolia Mart. II. 520. no. 3.
— *longiflora* Blume. VI. 76. no. 1.
— lucida Mart. II. 520. no. 1.
— macropus Mart. II. 520. no. 5.
— montana Mart. II. 520. no. 7.
— palustris Mart. II. 520. no. 4.
Possira DC. I. 842.
Potalia Aublet. *VI. 499.
Potalieae Meisn. VI. 499.
Potamopiatus Seubert. I. 284.
Potamopithys Seubert. V. 86.
Potatoë Dunal. III. 38.
Potentilla DC. II. 26. (ex p.)
Potentilla Linn. II. 26. II. 912. V. 651.
— *absynthiifolia* Dougl. II. 32. no. 60. *β.*
— adenophylla Boiss. V. 652. no. 7.
— agrimonioides M. B. II. 36. †
— Altaica Bnge. II. 26. no. 6.
— ambigua Jacquemont. II. 27. no. 14.
— ancistrifolia Bnge. II. 30. no. 37.
— Andicola Bth. V. 651. no. 2.
— anserina Linn. *II. 34. no. 84.
δ. Egedii Torr. et Gr.
β. grandis Torr. et Gr.
γ. Groenlandica Hook.
— anserinoides Raoul. V. 653. no. 11.
— approximata Bnge. II. 29. no. 30.
— arbuscula Don. II. 36. †
Potentilla argentea Linn. *II. 33. no. 70.
— *arguta* Lehm. II. 32. no. 60. *δ.*
— *arguta* Nutt. II. 35. no. 88.
— arguta Prsh. II. 35. no. 87.
— argyrophylla Wall. II. 27. no. 11.
— asperrima Turczan. V. 652. no. 3.
— astragalifolia Bnge. II. 29. no. 33.
— atrosanguinea Lodd. II. 36. †
β. Russelliana Hook. II. 36. †
— *aurea* Fl. Dan. II. 33. no. 69.
— Bannebalensis Cambess. II. 30. no. 45.
— Beniczkyi Friv. II. 29. no. 27.
— bicolor Lindl. V. 654. †
— biflora Lehm. *II. 34. no. 75.
— *bipinnatifida* Dougl. II. 32. no. 60. *δ.*
— *Brauniana* Hppe. II. 33. no. 71.
— brevifolia Nutt. II. 34. no. 77.
— campestris Nutt. II. 33. no. 64.
— Canadensis Linn. *II. 34. no. 80.
β. pumila Torr. et Gr.
γ. simplex Torr. et Gr.
— Cantleyana Royle. II. 27. no. 16.
— Cappadocica Boiss. V. 653. no. 8.
— *Caroliniana* Poir. II. 34. no. 80. *γ.*
— cathaclines Lehm. II. 31. no. 51.
— *chrysantha* Lehm. II. 33. no. 68.
— chrysantha Trevir. II. 36. †
— Cilicia Boiss. V. 653. no. 9.
— commutata Lehm. II. 30. no. 43.
— concinna Richards. II. 24. no. 78.
— conferta Bnge. II. 29. no. 29.
— *confertiflora* Torr. II. 35. no. 87.
— *crocea* Hall. fil. II. 33. no. 69.
— cuneata Wall. II. 27. no. 9.
— dasyphylla Bnge. II. 29. no. 31.
— *dasyphylla* Ldb. II. 32. no. 58.
— Davurica Lehm. II. 31. no. 52.
— dealbata Bnge. II. 29. no. 34.
— *dealbata* Dougl. II. 32. no. 60.
— desertorum Bnge. II. 28. no. 21.
— discolor Bnge. II. 30. no. 38.
— discolor Jacqem. II. 30. no. 46.
— *dissecta* Nutt. II. 33. no. 64.
— dissecta Prsh. *II. 35. no. 91.
— diversifolia Lehm. II. 33. no. 64.
— Doubjouneana Cambess. II. 27. no. 13.
— Drummondii Lehm. II. 32. no. 62.
— Durandii Torr. et Gr. II. 34. no. 81.
— effusa Dougl. II. 32. no. 59.
β. filicaulis Nutt.
γ. gossypina Nutt.
— *Egedii* Wormsk. II. 34. no. 84.
— Ehrenbergiana Schlchtd. II. 31. no. 54.
— elegans Cham. et Schlchtd. II. 27. no. 12.
— emarginata Prsh. *II. 35. no. 90.
— eriocarpa Wall. II. 27. no. 10.

Potentilla exaltata Bnge. II. 29. no. 36.
— fastigiata Nutt. II. 33. no. 67.
β. major.
— ferruginea Paxton. V. 654. †
— fissa Nutt. II. 35. no. 88. (c. var. β. ibid.)
— flabellifolia Hook. II. 34. no. 76.
— *flabelliformis* Lehm. II. 33. no. 66.
— *fragaria* β. DC. II. 35. no. 90.
— *frigida* Grev. II. 33. no. 73. β.
— fruticosa Linn. *II. 35. no. 85.
— fusca Schlchtd. II. 28. no. 26.
— gelida C. A. Mey. II. 26. no. 5.
— Gerardiana Lindl. II. 30. no. 42.
— glabra Lodd. II. 31. no. 49. II. 36. †
— glandulosa Lindl. II. 35. no. 89.
β. incisa.
— glauca Cambess. II. 30. no. 47.
— glauca Moris. II. 26. no. 3.
— *glaucophylla* Lehm. II. 33. no. 64. (et diagn. ibid. in adn.)
— *glutinosa* Nutt. II. 35. no. 88.
— gracilis Dougl. II. 33. no. 66.
β. flabelliformis Torr. et Gr.
— *Grahamiana* Wall. II. 30. no. 44.
— *Groenlandica* G. Br. II. 33. no. 73. β.
— haematochrus Lehm. II. 31. no. 53. II. 36. †
— *Heynei* Rth. II. 29. no. 28.
— *hiemalis* Schlchtd. II. 28. no. 25.
— hiemalis Schlchtd. II. 913. no. 4.
— *Hippiana* Lehm. II. 32. no. 60. ε.
— *hirsuta* Michx. II. 31. no. 55. β.
— *hirsuta* Vahl. II. 34. no. 73. γ.
— hirta Linn. *II. 912. no. 2.
β. pinnatifida Griseb.
γ. subsericea Griseb.
— holosericea Griseb. II. 912. no. 3.
— *holosericea* Nutt. II. 32. no. 60. β.
— Hopwordiana Sweet. V. 654. †
— humifusa Nutt. *II. 34. no. 79.
— imbricata Kar. et Kir. II. 29. no. 35.
— Inglisii Royle. II. 27. no. 18.
— insignis Royle. II. 28. no. 23.
— intermedia Linn. II. 36. †
— Jacquemontiana Cambess. II. 27. no. 15.
— *Jamesoniana* Greville. II. 34. no. 73. γ.
— Kleiniana Wght. et Arn. II. 28. no. 24.
— Kotschyana Fnzl. II. 28. no. 20.
— Kurdica Boiss. et Hohenack. V. 652. no. 6.
— laciniosa Kit. II. 36. †
— leptopetala Lehm. II. 28. no. 25.
— Leebenaultiana Ser. *II. 30. no. 44. (c. var. β. ibid.)
— *leucophylla* Torr. II. 32. no. 60. ε.
— Libanotica Boiss. V. 654. no. 14.
— lineata Trev. II. 36. †
Potentilla lucida Willd. II. 34. no. 74.
— Mackayana Sweet. II. 35. no. 94.
— *macrantha* Ldb. II. 26. no. 1. γ.
— macrantha Ldb. II. 36. †
— *maculata* Pourret et E. Mey. II. 33. no. 69.
— megalontodon Lehm. II. 26. no. 2.
— Meyeri Boiss. V. 653. no. 10.
— *microphylla* var. *latifolia* Wall. II. 30. no. 43.
— minima Hall. fil. *II. 33. no. 71. (c. var. β.)
— *Missourica* Horn. II. 32. no. 60. α.
— monanthes Wall. II. 27. no. 8.
— *Monspeliensis* L. II. 31. no. 55. β.
— Moorcroftii Wall. II. 30. no. 40.
— *Morisoni* DC. II. 31. no. 55.
— multicaulis Bnge. II. 30. no. 39.
— nana Lehm. *II. 33. no. 72.
— nemoralis Nestl. *II. 34. no. 82.
— Nepalensis Hook. II. 31. no. 50.
— Nevadensis Boiss. II. 26. no. 4.
β. condensata.
— *nivalis* Torr. II. 48. no. 17.
— nivea Linn. *II. 26. no. 1. *II. 33. no. 73. (c. var. β. ibid. var. γ. pag. 34. no. 73.)
α. Lapponica } Cham. et Schlchtd. II. 26. no. 1.
γ. Camtschatica }
δ. arctica }
β. vulgaris }
— *nivea* β. R. Br. II. 26. no. 1. δ.
— Norvegica Linn. *II. 31. no. 55. (c. var. β. ibid.)
— olopetala Turczan. V. 652. no. 4.
— opaca L. *II. 34. no. 83.
— paradoxa Nutt. II. 32. no. 57.
— *pectinata* Fisch. II. 32. no. 60. β.
— *Pennsylvanica* Lehm. II. 32. no. 60. α.
— Pennsylvanica Linn. *II. 32. no. 60.
δ. bipinnatifida } Torr. et Gr.
α. communis }
ε. Hippiana }
γ. pulcherrima }
β. strigosa Prsh.
— *Pennsylvanica* β. *arguta* Torr. II. 35. no. 87.
— pentandra Engelm. II. 35. no. 92.
— pilosa Willd. II. 36. †
— Plattensis Nutt. II. 32. no. 63.
— poëtarum Boiss. et Sprun. V. 654. no. 13.
— polyphylla Wall. II. 30. no. 41.
— Pontica C. Koch. V. 652. no. 5.
— pteropoda Royle. II. 28. no. 19.
— pulchella R. Br. II. 33. no. 65.
— *pulcherrima* Lehm. II. 32. no. 60. γ.
— pulvinaris Fnzl. II. 31. no. 48.
— *pumila* Poir. II. 34. no. 80. β.
— recta Linn. II. 36. †

Potentilla retusa Retz. II. 35. no. 86.
— rigida Nutt. II. 33. no. 68.
— rigida Wall. II. 27. no. 7.
— rivalis Nutt. II. 31. no. 56.
— *Robinsiana* Oakes. II. 33. no. 71.
— rubricaulis Lehm. II. 32. no. 61.
— *Salesowii* Steph. II. 26. no. 1.
— Salisburgensis Hnke. *II. 33. no. 69.
— *sarmentosa* Willd. II. 34. no. 80.
— Saudersiana Royle. II. 27. no. 17.
— *sericea* Leville. II. 33. no. 65.
— sericea Linn. *II. 32. no. 58. II. 36. †
β. glabrata Lehm. II. 32. no. 58.
— *simplex* Michx. II. 34. no. 80. γ.
— Soongarica Bnge. II. 29. no. 32.
— splendens Wall. II. 36. †
— subpedata C. Koch. II. 912. no. 1.
— supina Linn. *II. 29. no. 28.
β. Aegyptiaca Viv.
— *supina* Michx. II. 32. no. 57.
— tenella Turczan. V. 654. no. 12.
— ternata C. Koch. V. 651. no. 1.
— Tomasii DC. II. 36. †
— *Tommasii* C. A. Mey. V. 653. no. 10.
— *Tormentilla* var. *nemoralis*, Ser. II. 34. no. 82.
— tridentata Ait. *II. 35. no. 86.
— *Vahliana* Lehm. II. 34. no. 73. γ.
— *verna* Hook. II. 34. no. 73. β.
— villosa Pall. *II. 34. no. 74.
— Wallichiana Del. II. 28. no. 22.
— *Wallichiana* Ser. II. 26. no. 5.
— Wrangeliana Fisch. et Lallem. II. 35. no. 93.
Potentillastrum Ser. II. 26. V. 651.
Poteranthera Bngrd. II. 124. V. 689.
— pusilla Bngrd. *II. 124. no. 1. V. 689. no. 1.
Poterium Linn. II. 44.
— *annuum* Nutt. II. 44. no. 3.
— Garganicum Ten. II. 44. no. 2.
— Mauritanicum Boiss. *II. 44. no. 1. (c. var. β. ibid.)
— verrucosum Ehrnbrg. II. 44. no. 3.
Pottsia Hook. et Arn. * VI. 474.
Pouchetia A. Rich. *II. 517.
—? *Saxifraga* Hochstett. VI. 43. no. 1.
Poupartia Commers. *I. 556. V. 418.
— dulcis Blume. V. 418. no. 2.
— *mangifera* Blume. I. 556. no. 1.
— mangifera Blume. V. 418. no. 1.
Pouteria Aubl. *VI. 454.
Porana Burm. *VI. 542.
Pozoa Lag. II. 387. V. 843.
— coriacea Lag. *II. 387. no. 1. *V. 843. no. 1.
— *denticulata* Meyen. V. 843. no. 1.
Pozoa hydrocotylifolia Gardn. V. 843. no. 2.
— incisa Meyen. V. 844. no. 3.
— reniformis Hook. fil. V. 844. no. 4.
Prangos Lindl. II. 424. V. 915.
— *anisoptera* DC. V. 919. no. 3.
— Aucheri Boiss. V. 917. no. 12.
— cinerea Boiss. V. 916. no. 8.
— cheilanthifolia Boiss. V. 916. no. 6.
— corymbosa Boiss. V. 917. no. 9.
— foeniculacea C. A. Mey. II. 424. no. 2.
— lophoptera Boiss. V. 917. no. 11.
— macrocarpa Boiss. V. 915. no. 1.
— meliocarpoides Boiss. V. 917. no. 10.
— microcarpa Boiss. V. 918. no. 13.
— odontoptera Boiss. V. 915. no. 3.
— ovatifolia Boiss. V. 916. no. 7.
— peucedanifolia Fnzl. V. 916. no. 4.
— pabularia Lindl. *II. 424. no. 1.
— pumila Boiss. V. 915. no. 2.
— Szowitsii Boiss. V. 916. no. 5.
Prasieae Bth. III. 896. III. 991. VI. 684.
Prasium Linn. III. 901. °III. 991.
— *coccineum* Walt. III. 800. no. 1.
— *glabrum* Gaudich. III. 898. no. 4.
— *grandiflorum* Gaudich. III. 898. no. 3.
— *hirsutum* Poir. III. 819. no. 13.
— *incarnatum* Walt. III. 800. no. 1.
— *Javanicum* Blume. III. 898. no. 14.
— *macrophyllum* Gaudich. III. 899. no. 6.
— majus Linn. III. 901. no. 1.
— *melissaefolium* Rxb. III. 898. no. 11.
— *minus* Linn. III. 901. no. 1.
— *minus* Vahl. III. 819. no. 13.
— *parviflorum* Gaudich. III. 899. no. 7.
— *phlomoides* Reinw. III. 898. no. 13.
— *purpureum* Walt. III. 800. no. 1.
Pratia Gaudich. *II. 708. VI. 372.
— angulata Hook. fil. VI. 373. no. 7.
— arenaria Hook. fil. VI. 372. no. 1.
—? Boliviensis DC. jun. *VI. 373. no. 8.
— Cunninghamii Hook. fil. VI. 372. no. 2.
β. longipes.
— elliptica Hook. fil. VI. 373. no. 6.
— *erecta* Gaudich. VI. 372. no. 2.
— hederacea Chamisso. VI. 372. no. 5.
— *hederacea β. elliptica* Alph. DC. VI. 373. no. 6.
— longiflora Hook. fil. VI. 372. no. 4.
— repens Gaud. VI. 372. no. 3.
— montana Hsskrl. VI. 373. no. 9.
Preauxia C. H. Schultz. °VI. 197.
— Canariensis C. H. Schultz. VI. 197. no. 2.
β. gracilis } VI. 198. no. 2.
α. major }
— jacobaeifolia C. H. Schultz. VI. 197. no. 1.
Premna Linn. IV. 93.

Premna acuminata R. Br. IV. 95. no. 21.
— arborea Rth. IV. 94. no. 14.
— attenuata R. Br. IV. 93. no. 1.
— cordata Blanco. IV. 96. no. 30.
— cordata R. Br. IV. 94. no. 12.
— cordifolia Rxb. IV. 94. no. 10.
— esculenta Rxb. IV. 96. no. 26.
— flavescens Juss. IV. 95. no. 18.
— foetida Reinwrdt. IV. 96. no. 22.
— herbacea Rxb. IV. 96. no. 25.
— integrifolia Linn. IV. 93. no. 4.
— latifolia Rxb. IV. 94. no. 9.
— longifolia Rxb. IV. 93. no. 7.
— media R. Br. IV. 93. no. 2.
— mollissima Rth. IV. 95. no. 15.
— mucronata Rxb. IV. 95. no. 16.
— nauseosa Blanco. IV. 96. no. 29.
— obtusifolia R. Br. IV. 93. no. 5.
— odorata M. Blanco. IV. 96. no. 28.
— ovata R. Br. IV. 94. no. 13.
— parasitica Blume. IV. 95. no. 20.
— parvifolia Rth. IV. 93. no. 6.
— *parvifolia* Rth. IV. 98. no. 3.
— pubescens Blume. IV. 96. no. 23.
— quadrifolia Schum. et Thonn. IV. 96. no. 27.
— reticulata Juss. IV. 95. no. 19.
— *salvifolia* Spr. IV. 97. no. 1.
— scandens Rxb. IV. 95. no. 17.
— serratifolia Linn. IV. 96. no. 24.
— spinosa Rxb. IV. 93. no. 8.
— Timoriana Dcne. IV. 93. no. 3.
— tomentosa Willd. IV. 94. no. 11.
Prenanthes Endl. (ex p.) II. 691. 692. 693.
Prenanthes Vaill. II. 691. * VI. 361.
— *alba* Linn. II. 691. no. 1.
— *aphylla* Nutt. II. 693. no. 4.
— *cordata* Willd. II. 692. no. 2. γ.
— *crepidina* Ell. II. 692. no. 3. γ.
— glomerata Dcne. II. 691. no. 1.
— *Miamensis* Riddel. II. 691. no. 1.
— *ovata* Riddel. II. 691. no. 1.
— *parviflora* Riddel. II. 692. no. 2.
— *polymorpha β. flaccida* Ldb. VI. 361. no. 6. β.
— *polymorpha γ. flexuosa* Ldb. VI. 361. no. 5.
— *polymorpha α. pygmaea †† lyrata* Ldb. VI. 361. no. 6. δ.
— *polymorpha α. pygmaea † integrifolia* Ldb. VI. 361. no. 6. α.
— *proteophylla* Riddel. II. 691. no. 1.
— *pumila* Baldw. II. 693. no. 4.
— *pygmaea* Ldb. VI. 361. no. 6. α.
— *pygmaea* var. *angustifolia caule elongato* Ldb. VI. 361. no. 6. β.
Prenanthes pygmaea var. *foliis radicalibus lyratis* Ldb. VI. 361. no. 6. δ.
— *repens* Linn. VI. 365. no. 1.
— *rubicunda* Prsh. II. 692. no. 3.
— *rubicunda* Willd. II. 691. no. 1.
— *runcinata* James. VI. 349. no. 2.
— *serpentaria* Prsh. II. 692. no. 1. β.
— *suavis* Salisb. II. 691. no. 1.
— *tenuifolia* Torr. VI. 349. no. 1.
— violaefolia Dcne. II. 691. no. 2.
Preonanthus Ehrnbrg. I. 19.
Prevostea Choisy. VI. 542.
— velutina Martens et Galeotti. VI. 542. no. 1.
Prepusa Martius. * VI. 504.
Preslia Opitz. III. 585. ° III. 980.
— cervina Fresen. III. 585. no. 1.
— *glabriflora* Opitz. III. 585. no. 1.
— *villiflora* Opitz. III. 585. no. 1.
Prestinaria C. H. Schultz. ° VI. 162.
— bidentoides C. H. Schultz. VI. 163. no. 1.
— involucrata C. H. Schultz. VI. 163. no. 3.
— macrantha C. H. Schultz. VI. 163. no. 2.
Prestonia R. Br. VI. 473.
— latifolia Bth. VI. 474. †
— sericea Martens et Galeotti. VI. 473. no. 1.
Pretrea Gay. * VI. 519.
Prieurea DC. II. 72.
— Senegalensis DC. * II. 72. no. 1.
Primula Linn. VI. 439.
— Allionii Loisel. * VI. 442. no. 14.
— *alpina* Rchb. VI. 441. no. 7.
— *aretioides* Lehm. VI. 444. no. 7.
— Auricula Linn. VI. 440. no. 6.
β. ciliata VI. 441. no. 6.
— *Balbisii* Lehm. VI. 441. no. 6.
— borealis Duby. VI. 442. †
— *calycina* Rchb. VI. 441. no. 11. β.
— *Candolleana* Rchb. VI. 442. no. 12.
— capitellata Boiss. VI. 442. no. 16.
— *ciliata* Moretti. VI. 441. no. 6.
— *ciliata* Schrnk. VI. 441. no. 9.
— *Clusiana* Tausch. VI. 441. no. 11. α.
— *Columnae* Ten. VI. 440. no. 4.
— *decipiens* Duby. VI. 742. no. 17.
— decipiens Duby. VI. 442. †
— Dinyana Lagger. VI. 442. no. 13.
— elegans Duby. VI. 442. †
— farinosa β. Magellanica Hook. fil. VI. 742. no. 17.
— *Floerkeana* Schrader. VI. 442. no. 15.
— *graveolens* Hegetschw. VI. 441. no. 10.
— *Helvetica* Schleich. VI. 441. no. 6.
— *hirsuta* All. VI. 441. no. 10.
— *hirsuta* DC. VI. 441. no. 9.
— imperialis Junghun. VI. 439. no. 1.

Primula integrifolia Jcq. VI. 441. no. 11. *a.*
— integrifolia Linn. VI. 442. no. 12.
— *integrifolia* Tausch. VI. 441. no. 11. *β.*
— involucrata Wall. VI. 442. †
— latifolia Lapeyr. VI. 441. no. 10.
— *longiflora* Auch. VI. 444. no. 5.
— *lutea* Vill. VI. 440. no. 6.
— *Magellanica* Duby. VI. 742. no. 17.
— minima Linn. *VI. 442. no. 15.
— minutissima Jacquem. VI. 442. †
— Munroi Lindl. VI. 742.
— *Mureti* Charpentier. VI. 442. no. 13.
— *Muretiana* Moritzi. VI. 442. no. 13.
— *nivea* Hortor. VI. 441. no. 9. *β.*
— officinalis Jcq. VI. 440. no. 3.
— Pedemontana Tomassini. VI. 441. no. 8.
— pubescens Jcq. VI. 441. no. 6 b.
— pusilla Wall. VI. 442. †
— Rhaetica Gaudin. VI. 441. no. 7.
— Simensis Hochst. VI. 440. no. 2.
— spectabilis Trattin. VI. 441. no. 11.
a. ciliata Koch.
β. denticulata Koch.
— suaveolens Bertoloni. VI. 440. no. 4.
— venusta Horst. VI. 440. no. 5.
— *veris* Lehm. VI. 440. no. 3.
a. officinalis Linn. ibid.
— villosa Jcq. VI. 441. no. 9.
— *villosa* Mertens et Koch. VI. 441. no. 10.
— *viscosa* DC. VI. 441. no. 10.
— *viscosa* Gaud. VI. 441. no. 9.
PRIMULACEAE Vent. VI. 439.
Primulastrum Duby. VI. 440. no. 3.
Primuleae Endl. VI. 439.
Primulopsis Torr. et Gr. II. 86.
Prinos L. I. 541.
— asprellus Hook. et Arn. I. 541. no. 1.
— coriaceus Bth. I. 541. no. 4.
— Godajam Hamilt. I. 541. no. 3.
— integer Hook. et Arn. I. 541. no. 2.
— *lanceolatus* Mcfd. I. 541. no. 5.
— Macfadyenii Wlprs. I. 541. no. 5.
Prinsepia Royle. II. 7.
— utilis Royle. *II. 7. no. 1.
Printzia Cass. *II. 680. II. 954. no. 1. * VI. 314.
Printzieae C. H. Schultz. II. 954.
Prionanthea DC. II. 682. no. 2.
Prionolepis Poepp. et Endl. °VI. 169.
— silphioides Poepp. et Endl. VI. 169. no. 1.
Prionopsis Nutt. II. 592. *II. 952. no. 46. II. 967.
— Chapmanni Torr. et Gr. II. 967. no. 2.
— ciliata Nutt. *II. 592. no. 1. *II. 967. no. 1.
Prionotes R. Br. *II. 733.
Prionotes Americana Hook. II. 733. no. 1. VI. 432. no. 1.
— *secunda* Spr. VI. 434. no. 1.
Prismatanthus Hook. et Arn. III. 407.
— *bartsioides* Hook. et Arn. III. 407. no. 1.
Prismatocarpeae Endl. II. 710.
Prismatocarpus Alph. DC. *II. 710. *VI. 382.
Pristleya DC. I. 580. II. 834.
— *angustifolia* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 8. *β.*
— axillaris DC. *I. 581. no. 5.
— *axillaris* E. Mey. II. 835. no. 1.
— *capitata* DC. I. 581. no. 7.
— cephalotes E. Mey. I. 581. no. 8.
β. angustifolia.
— *elliptica* E. Mey. II. 835. no. 2.
— *ericaefolia* DC. I. 581. no. 5.
— hirsuta DC. *II. 834. no. 3.
β. subenervia Meisn.
a. trinervia Meisn.
— laevigata DC. *I. 581. no. 7.
— lanceolata E. Meyer. I. 581. no. 6.
— latifolia Bth. II. 834. no. 2.
— *Meyeri* Meisn. II. 835. no. 2.
— rotundifolia Wlprs. I. 580. no. 1.
— sericea DC. *I. 581. no. 4.
— Sieberi Tausch. II. 834. no. 4.
— Thunbergii Bth. II. 834. no. 1.
— tomentosa DC. *I. 581. no. 2.
— *umbellifera* Wlprs. II. 834. no. 1.
— villosa DC. *I. 581. no. 3.
Pritzelia Wlprs. °II. 428.
— didiscoides Wlprs. *II. 428. no. 1.
— *didiscoides* Wlprs. V. 840. no. 1.
— *obovata* Schauer. II. 922. no. 1. V. 736. no. 1.
Priva Adans. IV. 34. VI. 687.
— aspera H. B. Kth. IV. 34. no. 3.
— crenata Schrader. IV. 34. no. 2.
— *dentata* Juss. IV. 35. no. 6.
— echinata Juss. IV. 34. no. 1.
— *Forskâlii* E. Mey. IV. 35. no. 5.
— Forskâlii E. Mey. IV. 35. no. 6.
— hispida Juss. IV. 35. no. 4.
— laevis Juss. IV. 36. no. 7.
— lamiifolia Martens et Galeotti. VI. 687. no. 2.
— *lappulacea* Pers. IV. 34. no. 1.
— leptostachya Pers. IV. 35. no. 5.
— *Mexicana* Pers. IV. 35. no. 4.
— orchioides Wlprs. IV. 36. no. 8.
— trachelioides Martens et Galeotti. VI. 687. no. 1.
— *virgata* Spr. IV. 42. no. 7.
Proboscoideae Bth. (Pedicularis) III. 415.

Prockia R. Brown. I. 204. V. 56.
Prockia DC. (ex p.) I. 204.
— completa Hook. I. 204. no. 1.
— *integrifolia* Willd. I. 204. no. 1.
— Luzoniensis Prsl. I. 204. no. 3.
— obovata Prsl. I. 204. no. 2.
— *serrata* Willd. I. 204. no. 1.
— *theaeformis* Willd. I. 204. no. 2.
— tomentosa A. Rich. V. 56. no. 1.
Prockieae Endl. I. 203. V. 55.
Prolongoa Boiss. II. 636. VI. 193. VI. 722.
— pectinata Boiss. *II. 636. no. 1. VI. 193. no. 1.
— pseudanthemis Knze. VI. 722. no. 2.
Pronacron Cass. *II. 604.
Pronaya Hügel. I. 257. II. 770. V. 73.
— elegans Hügel. I. 257. no. 1. V. 73. †
— ericoides Lindl. II. 770. no. 1.
— Hügeliana Putterl. V. 73. no. 1.
— speciosa Endl. I. 257. no. 2.
Proserpinaca L. *II. 98.
Prosopia Rchb. III. 431.
Prosopis Linn. I. 861. °V 581.
— abbreviata Bth. I. 862. no. 19.
— adstringens Gill. I. 862. no. 17.
— *adstringens* Gill. I. 909. no. 235.
— *affinis* Spr. I. 862. no. 11. γ.
— *bracteolata* DC. I. 862. no. 11. β.
— *Cumanensis* Kth. I. 862. no. 11. β.
— denudans Bth. I. 862. no. 14.
— *Domingensis* DC. I. 862. no. 11. β.
—? dubia Guill. et Perr. I. 862. no. 22.
— dulcis Kth. *I. 862. no. 11.
γ. australis Bth.
β. Domingensis Bth.
— *elephantina* E. Mey. I. 861. no. 1. V. 581. no. 1.
— *elephantorhiza* Spr. I. 861. no. 1. V. 581. no. 1.
—? *ephedroides* Gill. I. 882. no. 194.
— flexuosa DC. *I. 861. no. 8.
— fruticosa Meyen. I. 862. no. 10.
— glandulosa Torr. I. 861. no. 5.
— *globosa* Gill. I. 882. no. 193.
— horrida H. B. Kth. *I. 862. no. 9.
— humilis Gill. I. 862. no. 15.
— inermis H. B. Kth. *I. 862. no. 12.
— juliflora DC. *I. 861. no. 6.
—? lanceolata Bth. I. 861. no. 3.
— Limensis Bth. I. 862. no. 13.
—? oblonga Bth. I. 861. no. 4.
— reptans Bth. I. 862. no. 20.
— sericantha Gill. I. 862. no. 16.
— siliquastrum DC. *I. 861. no. 7.
— spicigera Linn. *I. 861. no. 1 V. 582. no. 1.
Prosopis Stephaniana Kth. *I. 861. no. 2. V. 582. no. 2.
— strombulifera Bth. *I. 862. no. 21.
— torquata DC. *I. 862. no. 18.
Prososperma Vogel. I. 817.
Prostanthera Labill. III. 764. °III. 985.
— aspalathoides A. Cunn. III. 767. no. 16.
— atriplicifolia C. Cunn. III. 765. no. 7.
— Baxteri A. Cunn. III. 766. no. 12.
— Caleyi Bth. III. 767. no. 17.
— coerulea R. Br. III. 764. no. 2.
— cotinifolia C. Cunn. III. 766. no. 8.
— cryptandroides A. Cunn. III. 767. no. 15.
— denticulata R. Br. III. 767. no 14.
— *empetrifolia* Sieb. III. 764. no. 1.
— incana A. Cunn. III. 768. no. 23.
— incisa R. Br. III. 765. no. 3.
— *incisa* Sieb. III. 765. no. 4.
— lasianthos Labill. III. 764. no. 1.
— linearis R. Br. III. 766. no. 13.
— *linearis* Sieb. III. 771. no. 8.
— marifolia R. Br. III. 768. no. 20.
— microphylla A. Cunn. III. 767. no. 18.
— nivea A. Cunn. III. 766. no. 11.
— ovalifolia R. Br. III. 765. no. 6.
— prunelloides R. Br. III. 765. no. 5.
— retusa R. Br. III. 766. no. 9.
— *retusa* Sieb. III. 768. no. 21.
— rhombea R. Br. III. 759. no. 25.
— rotundifolia R. Br. III. 766. no. 10.
— rugosa A. Cunn. III. 769. no. 24.
— saxicola R. Br. III. 767. no. 19.
— Sieberi Bth. III. 765. no. 4.
— thymifolia A. Cunn. III. 768. no. 21.
— violacea R. Br. III. 768. no. 22.
β. glabrior Bth.
Prostanthereae Bth. III. 764. III. 985. VI. 674.
Prostea Cambess. I. 416.
— pinnata Cambess. *I. 416. no. 1.
Protium Burm. I. 557.
— caudatum Wght. et Arn. I. 557. no. 1.
— *Gileadense* Wght. et Arn. I. 558. no. 1.
— pubescens Wght. et Arn. I. 558. no. 3. (III. Emend. p. 3.)
— Roxburghianum Wght. et Arn. I. 557. no. 2. (III. Emend. p. 3.)
Protracti Pfeiff. (Cereus) II. 333.
Proustia Lag. *II. 679. *VI. 318.
Prunella Linn. III. 745. °III. 984.
— *alba* Pall. III. 747. no. 3. ζ.
— *angustifolia* Wndrth. III. 747. no. 3. γ.
— *Caroliniana* Mill. III. 746. no. 3. β.
— *dissecta* Wndrth. III. 747. no. 3. ε.
— *elongata* Dougl. III. 746. no. 3. γ.
— grandiflora Mnch. III. 746. no. 2.

Prunella hastaefolia Brot. III. 746. no. 2.
— *hirsuta* Wndrth. III. 746. no. 3. *α.*
— *hirta* Bernh. III. 746. no. 3. *α.*
— *hispida* Bth. III. 746. no. 3. *α.*
— hyssopifolia Lam. III. 745. no. 1.
— *incisa* Lnk. III. 747. no. 3. *ε.*
— *Indica* Burm. III. 497. no. 1.
— *intermedia* Brot. III. 746. no. 3. *β.*
— *intermedia* Rchb. III. 747. no. 1.
— *laciniata* Linn. III. 747. no. 3. *ζ*
— *latifolia* Donn. III. 746. no. 3. *β.*
— *longifolia* Pers. III. 747. no. 3. *ε.*
— *ovata* Pers. III. 746. no. 3. *β.*
— *pinnatifida* Pers. III. 747. no. 3. *ε.*
— *reptans* Dumort. III. 746. no. 3. *β.*
— *speciosa* Wndrth. III. 746. no. 2.
— *surrecta* Dumort. III. 746. no. 3. *β.*
— vulgaris Linn. III. 746. no. 3.
γ. elongata } Bth. III. 746.
α. hispida }
ζ. laciniata }
δ. parviflora } Bth. III. 747.
ε. pinnatifida }
β. vulgaris }
— *vulgaris* var. *pinnatifida* Rchb. III. 747. no. 3. *ε.*
Prunus L. II. 8. II. 910. V. 648.
Prunus Tournef. II. 8. V. 648.
— acuminata Wall. II. 10. no. 23.
— *amygdalina* B. Webb. II. 8. no. 1.
— Brasiliensis Cham. et Schlchtd. II. 10. no. 27.
— Bungei Wlprs. II. 9. no. 12.
α. glabrata.
β. villosula.
— candicans Willd. II. 10. †
— *cartilaginea* Lehm. II. 10. no. 20.
— Chinensis Blume. II. 9. no. 13.
— Cocumilio Ten. II. 8. no. 2.
— cornuta Wall. II. 9. no. 14.
— dasycarpa Ehrh. II. 10. †
— demissa Wlprs. II. 10. no. 21.
— divaricata Ldb. II. 8. no. 3.
— Duërinckii Martens. II. 10. no. 19.
— emarginata Dougl. II. 9. no. 16.
— *humilis* Bnge. II. 9. no. 10. et 12.
— humilis Moris. II. 9. no. 15.
— ilicifolia Nutt. II. 10. no. 25.
— incana Stev. II. 911. no. 2.
β. angustifolia }
γ. latifolia } Spach.
δ. viridis }
α. vulgaris }
— Japonica Thnbrg. *II. 9. no. 10.
— laurifolia Dcne. II. 10. no. 24.
— mollis Dougl. II. 9. no. 17.
Prunus Mume Sieb. et Zucc. II. 9. no. 6.
— *nana* Du Roi. II. 10. no. 18. *β.*
— opaca Bth. V. 648. no. 1.
— orientalis Spach. II. 911. no. 5.
— pauciflora Bnge. II. 9. no. 9.
— pectinata Spach. II. 911. no. 4.
β. glabra.
— *prostrata* Hohenack. II. 911. no. 2.
— prostrata Labill. II. 911. no. 3.
β. angustifolia } Spach.
α. latifolia }
— Pseudo-Cerasus Lindl. II. 10. no. 22.
— Puddum Rxb. *II. 9. no. 11.
— Ramburei Boiss. II. 8. no. 1.
— reflexa Gardn. II. 910. no. 1.
— *rubra* Ait. II. 10. no. 18.
— salicina Lindl. II. 9. no. 5.
— samydoides Schlchtd. II. 10. no. 26.
— serotina Ehrh. II. 10. no. 20.
— serrulata Lindl. II. 8. no. 4.
— sphaerocarpa Swrtz. II. 10. †
— *sylvatica* Rxb. II. 9. no. 11.
— tomentosa Thnbrg. *II. 9. no. 7. (c. var. *β.* ibid.)
— *trichocarpa* Bnge. II. 9. no. 7.
— trichocarpa Bnge. II. 9. no. 8.
— Virginiana Linn. II. 10. no. 18.
β. humilis.
Psacalium DC. *II. 653.
— *glabratum* DC. VI. 325. no. 4.
— *vaccinioides* DC. VI. 325. no. 3.
Psammostachys Prsl. VI. 650.
— varia Prsl. *VI. 650. no. 1.
Psammotropha Eckl. et Zeyh. II. 247.
— androsacea Fnzl. II. 247. no. 2.
β. linearifolia.
α. marginata.
— mucronata Fnzl. II. 248. no. 5.
— parvifolia Eckl. et Zeyh. II. 247. no. 3.
— quadrangularis Fnzl. II. 247. no. 1.
α. mucronata.
β. subulifolia.
— rigida Fnzl. II. 248. no. 4.
Psanacetum C. H. Schultz. VI. 220.
Psathura Commers. II. 488.
— obovata Tussac. II. 488. no. 1.
Psaturochaeta DC. *II. 619.
— *Drégei* DC. VI. 157. no. 1.
Psectra Endl. II. 667. VI. 281.
Pselium Lour. *I. 93.
Psephellus DC. VI. 294.
— *carthamoides* Fisch. et Mey. VI. 291. no. 5.
— *phaeopappus* Fisch. et Mey. VI. 291. no. 1.
— *spectabilis* Fisch. et Mey. VI. 291. no. 2.
Pseudaïs Dcne. °V. 410.
— coccinea Dcne. V. 410. no. 1.

Pseudaleia Thouars. *I. 378.
Pseudaleoides Thouars. *I. 378.
Pseudanisomeles Bth. III. 930.
Pseudarabis DC. II. 756. no. 4. et 5.
Pseudarthria Wght. et Arn. I. 783. V. 539.
— Hookeri Wght. et Arn. I. 783. no. 2.
— viscida Wght. et Arn. *I. 783. no. 1. *V. 539. no. 1.
Pseudelephantopus Rohr. II. 543.
Pseuderigeron Torr. et Gr. II. 582.
Pseudinga Bth. V. 628.
Pseudiosma Adr. Juss. I. 523.
— Asiatica Adr. Juss. *I. 523. no. 1.
Pseudocapsica Dunal. (Solanum) III. 45.
Pseudocapsicum Dodon. III. 46. no. 64.
— *torulosum* Mnch. III. 46. no. 60.
— *undulatifolium* Mnch. III. 46. no. 64.
Pseudocodon Alph. DC. VI. 382. no. 3.
Pseudo-Cotula C. Koch. II. 991.
Pseudodictamnus acutus Mnch. III. 865. no. 13.
— *emarginatus* Mnch. III. 863. no. 1.
Pseudo-Evax Cosson et Germain. VI. 247.
Pseudoharveya Prsl. VI. 650. no. 2.
Pseudo-Helenium Torr. et Gr. II. 988.
Pseudolinum DC. I. 173.
Pseudomelissa Bth. III. 726.
Pseudostemma DC. II. 508. VI. 63. no. 1.
Pseudothapsus Bth. III. 147. III. 446.
Pseudothymbra Bth. III. 704.
Pseudotunica Fnzl. II. 773.
Psiadia Jcq. *II. 587. *II. 952. no. 25.
Psiadieae DC. II. 587.
Psidium Linn. II. 170. V. 750.
— Adamantium Cambess. II. 171. no. 22.
— albidum Cambess. II. 171. no. 10.
—? amygdalinum Hook. et Arn. II. 170. no. 2.
— aquaticum Bth. II. 172. no. 25.
— australe Cambess. II. 171. no. 11.
— campestre Cambess. II. 171. no. 18.
— cerasoides Cambess. II. 171. no. 20.
— ciliatum Bth. II. 171. no. 23.
— corymbosum Cambess. II. 171. no. 15.
— cuneatum Cambess. II. 171. no. 13.
— dichotomum Weinm. II. 170. no. 3.
— erianthum Cambess. II. 170. no. 6.
— eugenioides Cambess. II. 171. no. 19.
— guazumaefolium Cambess. II. 171. no. 7.
β. griseum.
— Laruotteanum Cambess. II. 171. no. 9.
— longifolium Schumach. II. 170. no. 1.
— Mengahiense Cambess. II. 171. no. 14.
— microcarpum Cambess. II. 171. no. 12.
— molle Bertol. II. 170. no. 4.
— multiflorum Cambess. II. 171. no. 8. (II. 171. no. 16. Spec. divers.)
Psidium parviflorum Bth. II. 172. no. 24.
— pomiferum L. II. 172. †
— sericiflorum Bth. V. 750. no. 1.
— suaveolens Cambess. II. 171. no. 21.
— ternatifolium Cambess. II. 170. no. 5.
— velutinum Cambess. II. 171. no. 17.
Psilobium W. Jack. *II. 524.
Psilocarpaea DC. VI. 167. no. 1.
Psilocarphus Nutt. *II. 955. no. 2.
— *brevissimus* Nutt. II. 600. no. 3.
— *globiferus* Nutt. II. 600. no. 2.
— *Oregonus* Nutt. II. 600. no. 4.
— *tenellus* Nutt. II. 600. no. 5.
Psilochaena Nutt. II. 697.
— *occidentalis* Nutt. II. 698. no. 7.
Psilocoelae DC. II. 527. VI. 79. no. 1.
Psilonema C. A. Mey. I. 142.
— dasycarpum C. A. Mey. *I. 142. no. 1.
— homalocarpum Fisch. et Mey. I. 142. no. 2.
Psilorhegma Vogel. I. 827.
Psilostachyi Steetz. (Leucopogon) VI. 426.
Psilostemon A. P. DC. VI. 558.
— orientale A. P. DC. *VI. 558. no. 1.
Psilostoma Kltzsch. II. 484.
— ciliata Kltzsch. II. 484. no. 1.
Psilostrophe DC. *II. 701.
Psilothamnus DC. *II. 635.
Psiodia cf. Psiadia.
Psittacanthus Mart. II. 443. II. 940. V. 939. no. 13.
Psolanum Neck. III. 100.
Psophocarpus Neck. I. 781. II. 902.
— longepedunculatus Hsskrl. II. 902. no. 1.
— palmettorum Guill. et Perr. I. 781. no. 2.
— palustris Dsvx. I. 781. no. 1.
— tetragonolobus DC. *I. 781. no. 3.
Psoralea L. I. 655. II. 856. V. 513.
— aculeata L. *I. 657. no. 20.
— *acuminata* Lam. I. 657. no. 20.
— affinis Eckl. et Zeyh. I. 655. no. 5.
— albicans Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 30.
— Algoënsis Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 23.
— aphylla L. *I. 656. no. 12.
β. unifoliolata E. Mey.
— *Arabica* Hochst. et Steud. II. 858. no. 1. V. 516. no. 1.
— *arborea* Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 5.
— arborea Sims. *I. 655. no. 3.
— *arenaria* Nutt. I. 658. no. 41.
— argophylla Prsh. *I. 659. no. 47.
— axillaris L. *I. 656. no. 11.
— brachiata Dougl. I. 659. no. 50.
— bracteata L. *I. 657. no. 21.
β. Jacquiniana E. Mey.
— *bracteolata* Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 21.

Psoralea Caffra Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 33.
— campestris Nutt. I. 659. no. 48. (III. Emend. p. 3.)
— candicans Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 29.
— *carnea* E. Mey. I. 657. no. 19.
— *cephalotes* Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 24. β.
— cinerea Lindl. II. 856. no. 4.
— cryptocarpa Torr. et Gr. I. 659. no. 49.
— *decidua* Sieb. I. 655. no. 4.
— *decumbens* Willd. I. 657. no. 19.
— *densa* E. Mey. I. 657. no. 22.
— *diffusa* Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 15.
— digitata Nutt. I. 658. no. 44.
— *Ecklonis* Hort. Viadr. I. 657. no. 32.
— *elliptica* Prsh. I. 658. no. 41.
— exigua Eckl. et Zeyh. *I. 657. no. 27.
— *filifolia* Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 12. β.
— filiformis Poir. *I. 656. no. 6.
— floribunda Nutt. I. 658. no. 45.
— Gaudichaudiana Dcne. I. 655. no. 2.
— glabra E. Mey. I. 656. no. 8.
— *glaucescens* Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 14. β.
— *gracilis* Chapm. I. 659. no. 54. β.
— Higuerilla Gill. I. 660. no. 61.
— hilaris Eckl. et Zeyh. I. 658. no. 34.
— hirta L. *I. 657. no. 28.
— *hirta* Thnbrg. I. 658. no. 36.
— *hirta* Willd. I. 657. no. 30.
— hypogaea Nutt. I. 659. no. 51.
— *incana* Nutt. I. 659. no. 47.
— *Jacquiniana* Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 12
— *Jamesii* Torr. et Gr. I. 624. no. 25.*)
— Jaubertiana Fnzl. V. 513. no. 1.
— Kraussiana Meisn. II. 856. no. 1.
— *Krebsii* Vogel. I. 656. no. 5.
— *laevigata* Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 9.
— lanceolata Prsh. *I. 758. no. 41.
— lasiostachys Vogel. I. 660. no. 62.
— *latifolia* Torr. I. 659. no. 57.
— laxiflora Nutt. I. 658. no. 40. (III. Emend. p. 3.)
— linearifolia Torr. et Gr. I. 658. no. 42.
— *linearis* Thnbrg. I. 656. no. 11.
— *longifolia* Prsh. I. 687. no. 28.
— macrostachya DC. I. 660. †
— *macrostachya* β. Torr. et Gr. I. 660. no. 59.
— marginata Meyen. I. 660 no. 63.
— melilotoides Michx. *I. 659. no. 54. β. gracilis.
— Mundtiana Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 19.
— obliqua E. Mey. I. 656. no. 17.
— obtusiloba Torr. et Gr. I. 658. no. 46.

*) Ubi false legitur: *Petalostemon Jamesii.*

Psoralea oligophylla Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 14.
β. glaucescens.
— Onobrychis Nutt. *I. 659. no. 57.
— orbicularis Lindl. I. 660. no. 60.
— *parviflora* E. Mey. I. 657. no. 23.
— patens Lind. II. 856. no. 2.
— physodes Hook. I. 659. no. 58. (cum var. β. ibid.)
— pinnata L. *I. 655. no. 4.
— *pinnata γ. quinquejuga* Eckl. et Zeyh. I. 655. no. 3.
— plicaefolia Eckl. et Zeyh. *I. 657. no. 26.
— polyphylla Eckl. et Zeyh. *I. 656. no. 16.
— *prostrata* L. I. 672. no. 1.
— punctata Desvx. I. 658. no. 39.
— racemosa Thnbrg. *I. 657. no. 25.
— repens L. *I. 656. no. 15.
— restioides Eckl. et Zeyh. I. 558. no. 37.
— rhombifolia Torr. et Gr. I. 659. no. 56.
— *rupicola* Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 32.
— scabra Nutt. I. 658. no. 43.
— simplex Nutt. I. 659. no. 55.
— *simplicifolia* Baldw. I. 659. no. 53.
— *sinuata* Sieb. I. 656. no. 6.
— spathulata E. Mey. I. 656. no. 18.
— speciosa Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 7.
— spicata L. *I. 657. no. 24.
β. cephalotes. Wlprs.
— *spicata* Willd. I. 657. no. 21.
— *stachydis* Willd. I. 666. no. 75.
— stachyera Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 22.
— *stachyos* Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 28.
— stipulacea Dcne. I. 655. no. 1.
— striata Thnbrg. *I. 657. no. 32.
— *striata* Willd. I. 657. no. 25.
— strobilina Hook. et Arn. I. 660. no. 59.
— subacaulis Torr. et Gr. I. 659. no. 52. (III. Emend. p. 3.)
— tenax Lindl. II. 856. no. 3.
— tenuifolia L. *I. 656. no. 9.
— *tenuifolia* Willd. I. 656. no. 10.
— tenuissima E. Mey. I. 656. no. 13.
— triantha E. Mey. I. 658. no. 36.
— *triflora* Eckl. et Zeyh. I. 656. no. 10.
— *triflora* Poir. I. 658. no. 36.
— uncinata Eckl. et Zeyh. I. 657. no. 31.
— velutina E. Mey. I. 658. no. 38.
— venusta Eckl. et Zeyh. I. 658. no. 35.
— verrucosa Willd. *I. 656. no. 10.
— virgata Nutt. *I. 659. no. 53.
Psorospermum Spach. I. 391.
— Senegalense Spach. *I. 391. no. 1.
Psychine Desf. *I. 188.
Psychineae DC. I. 188.
Psychopsis Nutt. I. 650.

Psychotria Linn. II. 471. VI. 40.
Psychotria ......? Drège. I. 252. no. 15.
— acuminata Bth. VI. 42. no. 9.
— ambigua Wght. et Arn. II. 471. no. 4.
— amplectens Bth. II. 474. no. 31.
— arcuata Bth. II. 474. no. 28.
— *aurantiaca* Wall. II. 472. no. 9.
— barbata Spanoghe. II. 471. no 3.
— bisulcata Wght. et Arn. 472. no. 7.
— ? bracteata Wght. et Arn. II. 472. no. 6.
— bracteolata Mart. et Gal. VI. 40. no. 2.
— chlorantha Bth. II. 473. no. 21.
— conferta Bth. VI. 42. no. 8.
— cornigera Bth. II. 474. no. 24.
— crassa Bth. II. 474. no. 25.
— daphnoides A. Cunn. II. 475. no. 35.
— erythrocarpa Cham. II. 472. no. 10.
— *excelsa* H. B. Kth. II. 506. no. 3.
— febrifuga Poepp. et Endl. II. 473. no. 15.
— fimbriata Bth. II. 473. no. 22.
— Fockeana Miquel. VI. 42. no. 10.
— *herbacea* Linn. II. 469. no. 1.
— Hookeri G. Don. II. 473. no. 13.
— hyptoides Bth. II. 475. no. 34.
— intermedia Gardn. II. 473. no. 16.
— inundata Bth. II. 474. no. 27.
— justicioides Schlchtd. II. 472. no. 11.
— laevigata Wght. et Arn. II. 471. no. 5.
— leucophaea Poepp. et Endl. II. 473. no. 18.
— longistipula Bth. II. 474. no. 23.
— lupulina Bth. II. 474. no. 30.
— Malayana W. Jack. II. 472. no. 9.
— *megalosperma* Vahl. II. 487. no. 1.
— nemorosa Gardn. VI. 42. no. 7.
— nervosa Bth. II. 474. no. 29.
— nicotianaefolia Mart. et Galeotti. VI. 41. no. 4.
— ? nudiflora Wght. et Arn. II. 472. no. 8.
— obtusifolia E. Mey. II. 475. no. 1. VI. 46. no. 1.
— palicureoides Mart. II. 473. no. 17.
— pallens Gardn. VI. 41. no. 6.
— ? parviflora Spanoghe. II. 471. no. 2.
— polycephala Bth. II. 474. no. 32.
— pyrifolia Hook. et Arn. II. 473. no. 14.
— remota Bth. II. 473. no. 20.
— scandens Hook. et Arn. II. 471. no. 1.
— Schomburgkii Bth. II. 474. no. 33.
— sessilifolia Mart. et Gal. VI. 41. no. 3.
— setifera Bth. II. 474. no. 26.
— *terminalis* Arrabida. VI. 36. no. 1.
— trichocephala Poepp. et Endl. II. 472. no. 12.
— trichotoma Mart. et Gal. VI. 40. no. 1.
— *triflora* Hook. et Arn. II. 473. no. 13.
— vestita Prsl. VI. 41. no. 5.
Psychotria virens Poepp. et Endl. II. 473. no. 19.
Psychotrieae Endl. II. 469. II. 941. VI. 36.
Psydrax DC. II. 484. VI. 47.
— *dicoccos* Gaertn. II. 484. no. 1.
Psyllium Tournef. IV. 190.
— *Aegyptiacum* Mirbel. IV. 192. no. 114.
— *annuum* Mirbel. IV. 191. no. 105.
— *annuum* Thuill. IV. 191. no. 113.
— *erectum* St. Hil. IV. 191. no. 105.
— *Indicum* Dumer. IV. 191. no. 113.
— *squarrosum* Dumer. IV. 192. no. 114.
Psyllocarpus Mart. *II. 468.
Ptaeroxylon Eckl. et Zeyh. I. 422.
— utile Eckl. et Zeyh. *I. 422. no. 1.
Ptarmica Tournef. *II. 634. VI. 190.
— acuminata Ldb. VI. 190. no. 2.
— *Aizoon* Griseb. VI. 187. no. 11.
— cartilaginea Ldb. VI. 190. no. 3.
— *Fraasii* C. H. Schultz. II. 991. no. 1.
— *Mongholica* DC. VI. 190. no. 1.
— Sibirica Ldb. *VI. 190. no. 1.
Ptelea L. I. 523.
— angustifolia Bth. I. 523. no. 1.
— Baldwinii Torr. et Gr. I. 523. no. 2.
Ptelidium Thouars. *I. 536.
Pterandra Adr. Juss. °V. 180.
Pterandra Adr. Juss. V. 180.
— latifolia Adr. Juss. V. 181. no. 3.
— psidiifolia Adr. Juss. V. 180. no. 1.
— pyroidea Adr. Juss. V. 180. no. 2.
Pterantheae R. Br. I. 262.
Pteranthus Forsk. I. 262.
— echinatus Dsf. *I. 262. no. 1.
— *Forskâlii* Mirb. I. 262. no. 1.
Pteridophyllum Siebold et Zuccarini. °V. 21.
— racemosum Siebold et Zuccarini. *V. 22. no. 1.
Pterisanthes Blume. I. 444. °V. 377.
— cissoides Blume. *I. 444. no. 1. *V. 378. no. 1.
Pternandra W. Jack. V. 724.
— *appendiculata* Jack. II. 148. no. 1. V. 724. no. 1.
— *capitellata* W. Jack. V. 724. no. 2.
— *coerulescens* W. Jack. V. 724. no. 6.
— *echinata* Wlprs. V. 724. no. 7.
Pterocarpus L. (ex p.) I. 792. 793. 789.
Pterocarpus Linn. I. 793.
— *Adansonii* DC. I. 793. no. 1.
— *Amphynemium* DC. I. 793. no. 3.
— australis Endl. I. 793. no. 5.
— *bilobus* Rxb. I. 793. no. 1.
— *crispatus* Moç. et Sess. I. 792. no. 2.
— *cultratus* Vell. I. 803. no. 4.
— dalbergioides Rxb. I. 793. †

Pterocarpus dalbergioides Wall. I. 793. no. 2.
— *Draco* L. I. 792. no. 1.
— *erinaceus* Lam. I. 793. no. 1.
— esculentus Schum. et Thonn. I. 793. no. 4.
— lucens Leprieur. I. 793. no. 3.
— *luteus* Vell. I. 802. no. 3.
— Marsupium Rxb. *I. 793. no. 1.
— *niger* Vellozo. I. 801. no. 1.
— *orbiculatus* DC. I. 793. no. 2.
— *pterocarpus* DC. V. 546. no. 1.
— *quercinus* Vellozo. I. 792. no. 3.
— *Rohrii* Vahl. I. 793. no. 1.
— *uliginosus* Rxb. I. 798. no. 2.
— Wallichii Wght. et Arn. I. 793. no. 2.
Pterocaulon Ell. *II. 599. *II. 953. no. 2.
Pterocelastrus Meisn. I. 535.
— arboreus Wlprs. I. 535. no. 5.
— Burmanni Wlprs. I. 535. no. 3.
— littoralis Wlprs. I. 535. no. 2.
— nervosus Wlprs. I. 535. no. 4.
— rostratus Wlprs. I. 535. no. 8.
— stenopterus Wlprs. I. 535. no. 6.
— tetrapterus Wlprs. I. 535. no. 7.
— tricuspidatus Wlprs. *I. 535. no. 9.
— typicus Wlprs. I. 535. no. 1.
Pterocephalus Vaill. II. 534. VI. 85.
— bellidifolius Boiss. II. 534. no. 2.
— Broussonetii Coult. II. 534. †
— Cyprius Boiss. et Hohenack. II. 534. no. 5.
— dumetorum Coult. VI. 86. †
— multiflorus Poech. VI. 85. no. 3.
— Persicus Boiss. VI. 85. no. 2.
— Pinardi Boiss. VI. 85. no. 1.
— pyrethrifolius Boiss. et Hohenack. II. 534. no. 3.
— sanctus Dcne. II. 534. no. 1.
— spathulatus Coult. II. 534. †
— strictus Boiss. et Hohenack. II. 534. no. 4.
— virens B. Webb et Berthel. VI. 86. no. 4.
Pterochaeta Steetz. °VI. 234.
— paniculata Steetz. *VI. 234. no. 1.
Pterochaete Boiss. °VI. 142.
— Aucheri Boiss. VI. 143. no. 2.
— glaucescens Boiss. VI. 143. no. 4.
— glutinosa Boiss. VI. 142. no. 1.
— mucronifolia Boiss. VI. 143. no. 3.
Pterocymbium Horsf. et Bennet. °V. 104.
— Javanicum Horsf. et Bennet. V. 105. no. 1.
Pterodiscus Hoook. °VI. 519.
— speciosus Hook. VI. 519. no. 1.
Pterodon Vogel. I. 805. V. 547.
— emarginatus Vogel. *I. 805. no. 1. V. 547. no. 1.
Pterogyne Tulasne. °V. 557.
— nitens Tulasne. *V. 558. no. 1.
Pteroidea Dunal. (Solanum) III. 40.
Pterolepis DC. II. 137. V. 708.
— *callichaeta* Bth. II. 130. no. 4.
— capitata Miquel. II. 137. no. 1.
— Hostmanni Steudel. V. 708. no. 2.
— pusilla Miquel. V. 708. no. 1.
Pterolobium R. Br. I. 811.
— lacerans R. Br. *I. 811. no. 1.
Pteroneurum DC. I. 138. V. 36.
— decurrens Blume. V. 36. no. 2.
— *Graecum* DC. *I. 138. no. 1.
— Javanicum Blume. V. 36. no. 1.
Pteronia Linn. *II. 593. *II. 953. no. 15. II. 970.
— acerosa DC. *II. 970. no. 1.
β. Kraussii C. H. Schultz.
— *Caroliniana* Walt. II. 549. no. 2.
— elegans C. H. Schultz. II. 970. no. 2.
Pterophylla D. Don. II. 374. V. 834.
— fraxinea D. Don. *II. 374. no. 1. V. 834. no. 1.
Pteropodae DC. (Inga) I. 928.
Pteropodium A. P. DC. *VI. 516.
Pteropogon DC. *II. 647. VI. 245.
— spicatus Steetz. VI. 245. no. 1.
Pterospartum Spach. (Genista) V. 499.
Pterospermum Schreb. I. 350. V. 114.
— acerifolium Willd. V. 114. †
— *canescens* Rxb. I. 350. no. 2. V. 114. no. 1.
— diversifolium Blume. I. 350. no. 7.
— Donianum Wlprs. I. 350. no. 9.
— glabrescens Wght. et Arn. I. 350. no. 5.
— *Heyneanum* G. Don. I. 350. no. 9.
— Heyneanum Wall. *I. 350. no. 3. V. 114. no. 2.
— *Heyneanum* Wall. I. 350. no. 5.
— Javanicum Jungh. I. 350. no. 6.
— *paniculatum* Rxb. V. 119. no. 1.
— reticulatum Wght. et Arn. I. 350. no. 4. (III. Emend. p. 2.)
— rubiginosum Heyne. I. 350. no. 8. (I. 350. no. 1.) (III. Emend. p. 2.)
— suberifolium Lam. *I. 350. no. 2. V. 114. no. 1.
— suberifolium Willd. I. 350. no. 3.
— *suberifolium* Willd. V. 114. no. 2.
Pterospora Nutt. *II. 734.
Pterostelma Wght. *VI. 493.
Pterostephus Jaub. et Spach. VI. 33.
Pterostigma Bth. III. 264. °III. 963. VI. 642.
— capitatum Bth. III. 265. no. 6.
— grandiflorum Bth. III. 265. no. 2. *VI. 642. no. 1.
— macrophyllum Bth. III. 265. no. 4.
— rubiginosum Wlprs. III. 264. no. 1.
— spicatum Bth. III. 265. no. 5.
— villosum Bth. III. 265. no. 3.

Pterostoechas Ging. III. 574.
Pterostyrax Sieb. et Zucc. * VI. 459.
Pterota Bth.? V. 396. no. 1.
Pterotheca Cass. II. 697.
Pterotheca Cass. * VI. 359.
Pterothrix DC. * II. 650.
Pterotropis DC. I. 155. no. 4? 5? 6? II. 758. no. 1. 759. no. 2. V. 37. no. 1.
Pterygocarpum Wlprs. IV. 39.
Pterygocarpus Hochstett. ° VI. 491.
— Abyssinicus Hochstett. VI. 491. no. 1.
Pterygopappus Hook. fil. ° VI. 726.
— Lawrencii Hook. fil. VI. 726. no. 1.
Pterygota Schott et Endl. I. 335. ° V. 103.
— *alata* Horsf. et Bennet. V. 103. no. 1.
— Roxburghii Schott et Endl. * I. 335. no. 1. * V. 103. no. 1.
Pteryxia Nutt. II. 418.
— *albiflora* Nutt. II. 418. no. 7.
— *foeniculacea* Nutt. II. 418. no. 6.
— *terebinthacea* Nutt. II. 418. no. 5.
— *thapsoides* Nutt. II. 418. no. 8.
Ptilina aquatica Nutt. II. 101. no. 1.
Ptilochaeta Turczan. ° V. 655.
— Bahiensis Turczan. * V. 656. no. 1.
Ptilomeris Nutt. II. 628. * VI. 178.
Ptilomeris Nutt. II. 989.
— anthemoides Nutt. II. 628. no. 4.
— *anthemoides* Nutt. VI. 177. no. 3.
— aristata Nutt. II. 628. no. 1.
— *aristata* Nutt. VI. 177. no. 1.
— coronaria Nutt. II. 628. no. 2.
— *coronaria* Nutt. VI. 177. no. 1. β.
— mutica Nutt. II. 628. no. 3.
— *mutica* Nutt. VI. 177. no. 2.
Ptilonella scabra Nutt. II. 630. no. 1.
Ptilopsis Nutt. II. 628. VI. 177.
Ptilostephium H. B. Kth. * II. 630.
Ptilostephus Jaub. et Spach. VI. 34.
Ptilotrichum C. A. Mey. I. 145.
— canescens C. A. Mey. I. 145. no. 1.
— cyclocarpum Boiss. I. 146. no. 3.
— elongatum C. A. Mey. * I. 146. no. 2.
— emarginatum Boiss. I. 146. no. 4.
— *longicaule* Boiss. I. 142. no. 2.
— *purpureum* Boiss. I. 142. no. 1.
— *spinosum* Boiss. I. 142. no. 3.
Ptilurus Don. * II. 682. * VI. 322.
Ptycanthera Dcne. VI. 491.
— Berterii Dcne. * VI. 491. no. 1.
Ptychocentrum Wght. et Arn. I. 790.
Ptychodon Kltzsch. II. 113.
Ptychopetalum Bth. II. 803. ° V. 138.
— olacoides Bth. * II. 803. no. 1. V. 138. no. 1.
Ptychostigma saxifragum Hochstett. II. 43. no. 1.
Ptychotis Koch. II. 392.
— Asowan DC. * II. 392. no. 1.
— *puberula* DC. V. 856. no. 9.
— *Roxburghiana* DC. II. 395. no. 3.
Pubifoliae Adr. Juss. (Tetrapterys) V. 305.
Pubipetalae Adr. Juss. (Tetrapterys) V. 308.
Pudicae Bth. (Mimosa) I. 867.
Pueraria DC. * I. 750. II. 900.
— tuberosa DC. * II. 900. no. 1.
Pugionium Gaertn. * I. 159. * II. 759.
Pukateria Raoul. ° V. 927.
— littoralis Raoul. V. 927. no. 1.
Pulassarie lalakki VI. 465. no. 2.
Pulch pandack VI. 467. no. 1.
Pulchellae (Acacia) Bth. I. 907. V. 590.
Pulegium angustifolium Riv. III. 585. no. 1.
— *cervinum* Mill. III. 585. no. 1.
— *erectum* Mill. III. 594. no. 20.
— *latifolium* Bauh. III. 594. no. 20.
— *tomentellum* Prsl. III. 594. no. 20. β.
— *vulgare* Mill. III. 594. no. 20.
Pulicaria Gaertn. * II. 601. * II. 954. no. 1. VI. 144.
— gnaphalodes Boiss. VI. 144. no. 2.
— pratensis Scheele. VI. 144. no. 1.
Pulicaricae C. H. Schultz. II. 954.
Pulmonaria Tournef. * VI. 561.
Pulmonaroidea DC. (Hierarium) VI. 363. no. 4.
Pulsatilla DC. I. 14.
Pulsatilla ......? Chesn. * I. 32. no. 20. et 21.
— *affinis* Lasch. I. 18. no. 9. × 1.
— *Africana* Spreng. I. 20. no. 16.
— *alba* Lobel. I. 19. no. 15.
— *Albana* I. 18. no. 10.
— *alpina* Spreng. I. 19. no. 15.
— *ambigua* Turcz. I. 18. no. 10.
— *angustifolia* Turczan. I. 16. no. 5. *a.*
— *apiifolia* Scopoli? I. 19. no. 15.
— *Bauhini* Tausch. I. 16. no. 4.
— *Bogenhardina* Rchb. I. 17. no. 7.
— *Bungeana* C. A. Meyer. I. 18. no. 11.
— *Caffra* Eckl. et Zeyh. I. 20. no. 18.
— *cernua* Spreng. I. 16. no. 3.
— *Davurica* Spr. I. 19. no. 13.
— *grandiflora* Rchb. I. 19. no. 15.
— *Halleri* Prsl. I. 15. no. 2. β.
— *intermedia* Hope et Hornsch. I. 17. no. 8.
— *intermedia* Lasch. I. 15. no. 1. var. 2. ×
— *lutea* C. Bauh. I. 19. no. 15.
— *lutea* Rchb. I. 19. no. 15.
— *media* Bogenh. I. 17. no. 7.
— *montana* Rchb. I. 17. no. 8.
— *nigricans* Störck. I. 17. no. 9.
— *Nuttalliana* Spr. I. 16. no. 4.
— *patenti-pratensis* Lasch. I. 16. no. 1. ×

Pulsatilla patenti-vernalis Lasch. I. 15. no. 2. ×
— *pratensi-patens* Lasch. *β. angustisecta* Rchb. I. 16. no. 1. ×
— *pratensis* Mill. I. 17. no. 9.
— *vernali-pratensis* Lasch. I. 15. no. 3. ×
— *vernalis* Mill. I. 14. no. 1.
— *vulgari-vernalis* (?) Rchb. I. 14. no. 1. ×
Pulsatilloides DC. I. 19.
Pultenaea DC. I. 571. I. 574.
Pultenaea Sm. I. 574. II. 832. V. 432.
— aciphylla Bth. I. 574. no. 2.
— aspalathoides Meisn. V. 432. no. 2.
— *aspera* DC. I. 571. no. 2.
— baeckeoides Bth. I. 575. no. 16.
— brachytropis Bth. I. 575. no. 9.
— Brunonis Bth. I. 574. no. 1.
— *comosa* DC. I. 571. no. 3.
— cordata Grah. I. 575. no. 5.
— cuneata Bth. I. 575. no. 15.
— empetrifolia Meisn. V. 432. no. 5.
— *euchila* DC. I. 574. no. 2.
— fasciculata Bth. I. 575. no. 13.
— flexilis Sm. I. 576. †
— foliosa A. Cunn. I. 576. no. 17.
— genistoides Meisn. V. 432. no. 1.
— Gunnii Bth. I. 574. no. 4.
— hypoleuca Sieb. I. 576. †
— lanata A. Cunn. I. 576. no. 18.
— laxa Knze. I. 575. no. 10.
— mollis Lindl. II. 832. no. 2.
— montana Lindl. II. 832. no. 1.
— myrtoides Cunn. I. 574. no. 3.
— ochreata Meisn. V. 432. no. 3.
— petiolaris Cunn. I. 575. no. 11.
— *phylicoides* DC. I. 571. no. 7.
— polygalaefolia Rdge. I. 576. †
— retusa Sm. I. 576. †
— rosmarinifolia Endl. I. 575. no. 8.
— rosmarinifolia Lindl. I. 575. no. 7.
— setigera Cunn. I. 575. no. 12.
— *squarrosa* DC. I. 571. no. 6.
— strobilifera Meisn. V. 432. no. 4.
— subumbellata Hook. I. 575. no. 6.
— uncinata Bth. I. 575. no. 14.
— villosa Willd. I. 576. †
Pultenaeae Bth. V. 426.
Pungentes (Acacia) Bth. I. 890. V. 589.
Punica Tournef. II. 194.
— Granatum Linn. *II. 194. no. 1.
Purdiaea Planchon. °VI. 422.
— nutans Planchon. *VI. 422. no. 1.
Purga de Caiapo V. 765. no. 2.
— *de Carijo* V. 764. no. 3.
Purkinjia Prsl. *VI. 452.
Purpurascentes (Astragalus) DC. I. 694. II. 863.
Purpureae (Crotalaria) Bth. V. 450.
Purshia DC. II. 45.
— *humilis* Raf. II. 98. no. 6. *γ*.
— tridentata DC. *II. 45. no. 1.
Putoria Pers. *II. 463.
— *Indica* DC. II. 495. no. 29.
Putorieae DC. II. 463. VI. 27.
Putterlickia Endl. I. 529.
— pyracantha Endl. *I. 529. no. 1.
Pycnanthemum Michx. III. 688. °III. 982.
— albescens Torr. et Gr. III. 689. no. 3.
— aristatum Michx. III. 688. no. 1.
— *aristatum* Prsh. III. 689. no. 2.
— clinopodioides Torr. et Gr. III. 689. no. 7.
— dubium Gray. III. 689. no. 6.
— incanum Michx. III. 689. no. 4.
— hyssopifolium Bth. III. 689. no. 2.
— lanceolatum Prsh. III. 690. no. 11.
— linifolium Prsh. III. 691. no. 12.
— *Loomisii* Nutt. III. 689. no. 4. (c. diagn. in adn.)
— *Monardella* Michx. III. 692. no. 2.
— montanum Michx. III. 691. no. 14.
— *muticum* Bth. III. 690. no. 9.
— muticum Pers. III. 690. no. 10.
— nudum Nutt. III. 691. no. 13.
— pilosum Nutt. III. 690. no. 9.
β. leptodon Bth.
— *pilosum* Nutt. III. 690. no. 10.
— setosum Nutt. III. 689. no. 1.
— *tenuifolium* Schrad. III. 691. no. 12.
— Torreyi Bth. III. 690. no. 8.
— Tullia Bth. III. 689. no. 5.
— *verticillatum* Prsh. III. 689. no. 1.
— *Virginicum* Nutt. III. 690. no. 8. et 11.
Pycnobotrys Bth. III. 908.
Pycnocephalum DC. II. 542. 543. VI. 102.
Pycnocephalum DC. *II. 542.
Pycnocephalum Gardn. VI. 102.
— *plantaginifolium* DC II. 543. no. 9.
— *scapigerum* DC. II. 543. no. 8.
— *spathulaefolium* DC. II. 543. no. 7.
Pycnocycla Royle. II. 424. V. 911.
— Aucheriana Boiss. V. 912. no. 2.
— glauca Royle. II. 424. no. 2.
—? *macrocarpa* Dcne. V. 914. no. 2.
— nodiflora Dcne. V. 912. no. 3.
— spinosa Dcne. II. 424. no. 3. V. 911. no. 1.
— tomentosa Dcne. II. 424. no. 1.
Pycnonepeta Bth. II. 775.
Pycnoneurum Dcne. VI. 485.
— sessiliflorum Dcne. *VI. 485. no. 1.
Pycnosorus Bth. *II. 644.
Pycnosphace Bth. III. 671.
Pycnospora R. Br. I. 660.
— nervosa Wght. et Arn. *I. 660. no. 1.

Pycnostachys Hook. III. 521. °III. 977.
— coerulea Hook. III. 521. no. 1.
Pycnostelma Bnge. * VI. 482.
Pycnothymus Bth. III. 709.
Pygeum Gaertn. II. 8.
— acuminatum Colebr. II. 8. no. 1.
Pyramia Cham. II. 119.
— salviaefolia Cham. II. 119. no. 2.
— pityrophylla Cham. II. 119. no. 1.
Pyramidium Bth. III. 510.
Pyramidostigma (nec *Pyramistigma*) Elkan. I. 112.
Pyrenaria Blume. I. 376. * V. 136.
— lasiocarpa Krthls. I. 376. no. 5.
— masocarpa Krthls. I. 376. no. 4.
— oïdocarpa Krthls. I. 376. no. 3.
— serrata Blume. I. 376. no. 1. et 2.
Pyrethrum Gaertn. II. 636. VI. 202.
— abrotanifolium Bnge. VI. 202. no. 1.
— *Achilleae* DC. VI. 222. no. 36.
— *achilleaefolium* M. Bieb. VI. 221. no. 9.
— *adauctum* Link. VI. 199. no. 1. et 2.
— *alpestre* Clairv. VI. 224. no. 49.
— *alpinum* Gesner. VI. 223. no. 48.
— *anethifolium* Lnk. VI. 200. no. 3.
— *anethifolium* Willd. VI. 201. no. 5.
— Armenum C. Koch. II. 637 no. 5.
— *Armenum* C. Koch. VI. 221. no. 15.
— Arundanum Boiss. II. 636. no. 1.
— *Aucherianum* DC. VI. 222. no. 34.
— *Balsamita* Willd. VI. 219. no. 2.
— *bipinnatum* Willd. VI. 221. no. 21.
— *Bocconi* Willd. VI. 221. no. 27.
— *breviradiatum* Schweinitz. II. 639. no. 1.
— *Broussonetii β.* Choisy. VI. 199. no. 2. VI. 202. no. 2. et 3.
— Cadmeum Boiss. VI. 203. no. 7.
— *Cappadocicum* DC. VI. 221. no. 25.
— *carneum* M. Bieb. VI. 222. no. 39.
— *Caucasicum* Willd. VI. 223. no. 46.
— *caule unifloro foliis glabris etc.* Hall. VI. 224. no. 49.
— *chiliophyllum* Fisch. et Mey. VI. 221. no. 11.
— cinereum Griseb. VI. 203. no. 6.
— *cinerariaefolium* Trevir. VI. 222. no. 37.
— *coronopifolium* Willd. VI. 202. no. 2.
— *corymbiferum* Schrank. VI. 222. no. 35.
— *corymbosum* Willd. VI. 222. no. 35.
— *crithmifolium* Willd. VI. 201. no. 4.
— daucifolium Ledeb. * VI. 202. no. 2.
— *decipiens* Fisch. et Mey. VI. 221. no. 13.
— *densum* Labill. VI. 221. no. 17.
— discoideum Ldb. VI. 220. no. 6.
— *elongatum* Fisch. et Mey. VI. 224. no. 50.
— *exaltatum* Griseb. VI. 195. no. 8.
Pyrethrum ferulaceum B. Webb. VI. 225. no. 55.
— *foeniculaceum* Lnk. VI. 200. no. 2.
— *foeniculaceum* Willd. VI. 200. no. 3.
— *frutescens* Mnch. VI. 201. no. 4.
— *glabratum* Lessng. VI. 208. no. 1.
— *grandiflorum* Holl. VI. 199. no. 1.
— *grandiflorum* Willd. VI. 201. no. 4. *β.*
— *Halleri* Willd. VI. 224. no. 49.
— *Indicum* Cassini. VI. 225. no. 56.
— *inodorum* Linn. II. 636. adn. no. 3.
— *inodorum* Sm. VI. 196. no. 1.
— *Kirilowii* DC. VI. 208. no. 1.
— Kotschyi Boiss. VI. 203. no. 4.
— *leptophyllum* Steven. VI. 221. no. 19.
— *macrophyllum* Willd. VI. 221. no. 30.
— microcephalum Hsskrl. VI. 203. no. 8.
— *millefoliatum* Willd. VI. 221. no. 18.
— *minimum* DC. VI. 223. no. 44.
— *multicaule* Willd. VI. 221. no. 28.
— *multifidum* DC. VI. 222. no. 38.
— *Myconi* Spr. VI. 206. no. 1.
— *Myconis* Mnch. VI. 206. no. 1.
— *myriophyllum* C. A. Meyer. VI. 221. no. 10.
— *nivale* C. H. Schultz. VI. 223. no. 43.
— *niveum* Lagasca. VI. 222. no. 33.
— *oligocephalum* DC. VI. 221. no. 20.
— *palmatifidum* DC. VI. 223. no. 45.
— *palustre* Willd. VI. 224. no. 52.
— *parthenifolium* Willd. VI. 222. no. 32.
— *Parthenium* Smith. VI. 222. no. 31.
— Persicum Boiss. VI. 203. no. 5.
— *pinnatifidum* Choisy. VI. 199. no. 1.
— *pinnatifidum* Willd. VI. 222. no. 38.
— *polycephalum* C. H. Schultz. VI. 221. no. 16.
— poteriifolium Ldb. VI. 202. no. 3.
— praecox M. B. II. 636. adn. no. 4. VI. 195. no. 1.
— *ptarmicaeflorum* B. Webb. VI. 224. no. 54.
— *pulchellum* Turcz. VI. 223. no. 47.
— *pulchrum* Ldb. VI. 224. no. 53.
— *pulverulentum* Lagasca. VI. 221. no. 24.
— radicans Cav. * II. 636. no. 2.
— *radicans* Cavan. VI. 221. no. 23.
— *roseum* M. Bieb. VI. 222. no. 40.
— *Roylei* DC. II. 637. no. 2.
— *santolinoides* DC. VI. 220. no. 5.
— *saxatile* Kar. et Kir. VI. 221. no. 14.
— saxatile Kar. et Kir. II. 637. no. 4.
— *segetum* Mnch. VI. 207. no. 1.
— *sericeum* M. Bieb. VI. 222. no. 41.
— *serotinum* Willd. VI. 192. no. 1.
— *silaifolium* Steven. VI. 224. no. 51.
— *Sinense* Sabine. VI. 225. no. 57.

Pyrethrum speciosum Willd. VI. 201. no. 4. *β.*
— sulphureum Boiss. et Reut. II. 636. no. 3. *β.* alpinum II. 637. no. 3.
— *sulphureum* Boiss. et Reut. VI. no. 26.
— *tanacetoides* DC. VI. 221. no. 12.
— *Tanacetum* DC. VI. 219. no. 1.
— *tenuifolium* Willd. VI. 222. no. 36.
— *tomentosum* DC. VI. 223. no. 44.
— *trichophyllum* Griseb. VI. 195. no. 8.
— *trifurcatum* Willd. V. 221. no. 29.
— *uliginosum* W. K. VI. 192. no. 1.
— *uniflorum* Fisch. et Mey. VI. 221. no. 22.
Pyrgosea Sweet. II. 254.
— *corymbulosa* Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 31
— *sediflora* Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 30.
Pyrola Salisb. *II. 734.
PYROLACEAE Lindl. II. 734. VI. 437.
Pyroleae DC. II. 734.
Pyroleae Meisn. VI. 437.
Pyronium Bth. II. 728. no. 1. VI. 419. no. 1.
Pyrophorum Ser. II. 53.
Pyrostegia Prsl. °VI. 512.
— ignea Prsl. VI. 512. no. 1.
Pyrostoma F. W. Meyer. IV. 81.
— ternata F. W. Meyer. IV. 81. no. 1.
Pyrostria Commers. *II. 488.
— *hexaspera* Rxb. II. 488. no. 2.
Pyrrhanthus albus Wall. II. 63. no. 4.
Pyrrhocoma Hook. II. 593. *II. 952. no. 34. II. 969.
— arguta Torr. et Gr. *II. 969. no. 5.
— carthamoides Hook. *II. 969. no. 1.
— glomerata Torr. et Gr. II. 969. no. 6.
— *grindelioides* DC. II. 968. no. 8.
— Menziesii Hook. et Arn. II. 593. no. 2.
— *Menziesii* Hook. et Arn. II. 968. no. 7.
— paniculata Torr. et Gr. *II. 969. no. 4.
— racemosa Torr. et Gr. *II. 969. no. 3.
— radiata Nutt. II. 593. no. 1. *II. 969. no. 2.
Pyrrhopappus DC. *VI. 356.
Pyrrocoma Hook. II. 593.
Pyrus Lindl. II. 53.
— angustifolia Dcne. II. 53. no. 2.
— angustifolia Willd. II. 54. †
— arbutifolia Auct. II. 54. †
— Bartramiana Tausch. II. 54. no. 13.
— betulaefolia Bnge. II. 53. no. 6.
— Bollwylleriana DC. II. 54. †
— *Botryapium* L. fil. II. 55. no. 2.
— *Botryapium* Wangenh. II. 54. no. 12.
— *Botryapium* Willd. II. 55. no. 2. *α.*
— cerasifera Tausch. II. 53. no. 11.
β. calvillea.
α. xanthocarpa.
— crenata Don. II. 54. †
— cuneifolia Guss. II. 53. no. 1.
— depressa Lindl. II. 54. no. 15.
— *diversifolia* Bngrd. II. 55. no. 7.
— Florentina Tozetti. II. 53. no. 10.
— floribunda Lindl. II. 54. no. 14.
— foliolosa Wall. II. 53. no. 5.
— grandifolia Lindl. II. 54. no. 17.
— Indica Wall. II. 53. no. 4.
— *ovalis* Willd. II. 55. no. 2. *γ.*
— pubens Lindl. II. 54. no. 16.
— rivalis Linn. II. 54. †
— rivularis Dougl. II. 53. no. 7.
— salvifolia DC. II. 54. †
— sambucifolia Cham. et Schlchtd. II. 55. no. 8.
— *sanguinea* Prsh. II. 55. no. 2. *γ. ζ.*
— Sieversii Ldb. II. 53. no. 3.
— Sinensis Lindl. II. 54. †
— spuria DC. II. 54. †
— suaveolens Wndrth. II. 53. no. 9.
— Wangenheimiana Tausch. II. 54. no. 12.
Pyxidanthera spathulata Mühlnbrg. II. 368. no. 1.
Pyxidaria repens annua, flosculis monopetalis etc. Lindern. III. 297. no. 1.
Pyxipoma Fnzl. II. 233.
— polyandrum Fnzl. *II. 233. no. 1.

Q

Qualea Aubl. *II. 68.
— *ecalcarata* Mart. II. 68. no. 1. V. 664. no. 1.
Quamoclit Tournef. VI. 529.
— pedata Mart. et Gal. VI. 529. no. 2.
— russelliaeflora Mart. et Gal. VI. 529. no. 3.
— tubulosa Mart. et Gal. VI. 529. no. 1.
Quanhtomate VI. 575. no. 1.
Quapoya Aubl. I. 393.
— acuminata Wlprs. I. 393. no. 1.
— laxiflora Poepp. et Endl. I. 393. no. 2.
— sulphurea Poepp. et Endl. I. 393. no. 3.
Quartinia Endl. V. 673.
— *Abyssinica* A. Rich. I. 811. no. 1.
— repens Endl. V. 673. no. 1.
Quassia DC. *I. 524.
— *excelsa* Swrtz. V. 398. no. 1.
— *polygama* Wrght. V. 398. no. 1.
Queria Canadensis L. I. 262. no. 13. *α.*
Quilesia Blanco. I. 379.
— sericea Blanco. *I. 379. no. 1.
Quillaja Molina. II. 52. *V. 397. V. 659.
— lancifolia D. Don. II. 52. no. 2.
— petiolaris D. Don. II. 52. no. 1.
— Poeppigii Wlprs. II. 52. no. 3.
— Sellowiana Wlprs. II. 52. no. 4.
— *Smegmadermos* Poepp. II. 52. no. 3.
Quillajeae Endl. II. 52. V. 659.
Quina naranjada VI. 504. no. 5.
Quinaquina VI. 67. no. 1.
Quinetia Cass. *II. 644.
Quintilia Endl. *VI. 523.
Quintinia Alph. DC. II. 379. II. 937.
— serrata A. Cunn. II. 379. no. 1. *II. 937. no. 1.
Quisqualis Rmph. II. 68. V. 663.
— *glabra* Burm. II. 68. no. 1.
— Indica Linn. *II. 68. no. 1.
— *Indica* Lour. V. 663. no. 1.
— *Loureiri* G. Don. II. 68. no. 1.
— *pubescens* Burm. II. 68. no. 1.
— Sinensis Lindl. V. 663. no. 1.
— *villosa* Rxb. II. 68. no. 1.
Quivisia Commers. I. 426.
— decandra Cav. *I. 426. no. 3.
— heterophylla Cav. *I. 426. no. 1.
— oppositifolia Cav. *I. 426. no. 4.
— ovata Cav. *I. 426. no. 2.
— *ramosa* Pers. I. 426 no. 3.
Quiya sive Piper Brasiliense Piso. III. 33. no. 1. *ε.* III. 37. no. 24. *γ.*
Quiya-uca Marcgrav. III. 33. no. 1.
Quoya Gaudich. IV. 37.
— cuneata Gaudich. IV. 37. no. 1.

R

Racamea Adr. Juss. V. 350.
Racaria Aubl. *I. 422.
Racemosae (Diascia) Bth. III. 181.
Racemosae Bth. (Calliandra) V. 607.
Rack Bruce. IV. 132. no. 1.
Radamaea Bth.* VI. 649.
Raddisia Leandro. I. 400.
Radiciflori DC. (Astragalus) I. 710. II. 879.
Radiola Dill. *I. 289.
Radix deipara Rmph. IV. 98. no. 5.
Raetam B. Webb. V. 507.
Rafinesquia Nutt. II. 689. VI. 348.
— Californica Nutt. *II. 689. no. 1. VI. 348. no. 1.
Rafnia DC. I. 578. 579. II. 833.
Rafnia Thnbrg. I. 578. II. 833.
— alpina Eckl. et Zeyh. I. 579. no. 13.
— amplexicaulis Thnbrg. *I. 579. no. 2.
— angulata Thnbrg. *I. 579. no. 10.
β. angustifolia E. Mey.
γ. filifolia E. Mey.
— *angustifolia* Thnbrg. I. 579. no. 10. β.
— *axillaris* Thnbrg. I. 580. no. 5.
— *axillaris* Willd. I. 618. no. 1.
— cordata Mart. I. 579. no. 12.
— corymbosa E. Mey. I. 579. no. 2.
— *cuneifolia* Eckl. et Zeyh. I. 579. no. 1.
— *cuneifolia* E. Mey. II. 833. no. 1.
— cuneifolia Thnbrg. *I. 579. no. 7.
— *cuneifolia* Willd. I. 579. no. 3.
— *dichotoma* Eckl. et Zeyh. I. 580. no. 7.
— *diffusa* Eckl. et Zeyh. I. 579. no. 5.
— *diffusa* Thnbrg. I. 580. no. 9.
— Ecklonis E. Mey. I. 579. no. 11.
— elliptica Thnbrg. *I. 579. no. 6.
— *erecta* Eckl. et Zeyh. II. 833. no. 1.
— erecta Thnbrg. *I. 579. no. 8.
— fastigiata Eckl. et Zeyh. I. 579. no. 4.
— *filifolia* Thnbrg. I. 579. no. 10. γ.
— humilis Eckl. et Zeyh. I. 579. no. 11.
— *intermedia* Vogel. I. 579. no. 5. et 8.
— intermedia Vogel. II. 833. no. 1.
— lancea DC. *I. 579. no. 9.
— *opposita* Thnbrg. I. 579. no. 4.
Rafinia ovata E. Mey. I. 579. no. 4.
— *pauciflora* Eckl. et Zeyh. I. 580. no. 6.
— perfoliata E. Mey. *I. 579. no. 3.
β. acuminata Wlprs.
— *racemosa* Eckl. et Zeyh. I. 579. no. 3.
— *reflexa* Eckl. et Zeyh. II. 833. no. 1.
— *retroflexa* Eckl. et Zeyh. I. 579. no. 8.
— *retroflexa* Thnbrg. I. 580. no. 8.
— *rhomboidea* Wlprs. I. 579. no. 1.
— *spicata* Thnbrg. I. 579. no. 2.
— *spicata* Willd. I. 579. no. 2.
— triflora Thnbrg. *I. 579. no. 5.
— virens E. Mey. I. 578. no. 1.
Raillarda Gaudich. *II. 664.
Raiz de Mongo rubra Rmph. VI. 467. no. 1.
Rajania hexaphylla Thnbrg. I. 99. no. 1.
— *quinata* Thnbrg. I. 98. no. 1.
Raleighia Gardner. °V. 834.
— Americana Gardn. V. 835. no. 1.
Ramantuella H. B. Kth. *II. 63.
Ramirezia A. Rich. V. 552.
Ramondia L. C. Rich. III. 438. °III. 973. *VI. 522. *VI. 655.
— *Myconi* Rchb. III. 438. no. 1.
— Pyrenaica L. C. Rich. III. 438. no. 1.
— *scapigera* Jeaum. III. 438. no. 1.
Ramondieae A. P. DC. VI. 522.
Ramontchi Endl. I. 205.
Ranaria monnierioides Cham. et Schlchtd. III. 281. no. 19.
Rancagua Poepp. et Endl. *II. 629. °VI. 180.
— *Bridgesii* Poepp. et Endl. II. 635. no. 1.
— Bridgesii Poepp. et Endl. VI. 180. no. 3.
— Fevillei Poepp. et Endl. VI. 180. no. 2.
— glaberrima Endl. VI. 180. no. 1.
Randia Houst. II. 518. II. 943. VI. 73.
— Bowieana A. Cunn. II. 519. no. 11.
— calycina Cham. II. 518. no. 5.
— Candolleana Wght. et Arn. II. 519. no. 10.
— corymbosa Wght. et Arn. II. 519. no. 9.
— dumetorum Lam. VI. 73. †
— floribunda Wght. VI. 73. †
— foliolosa Wght. et Arn. II. 518. no. 3.

Randia glomerata Bth. VI. 73. no. 1.
— hebecarpa Bth. II. 518. no. 6.
— *longiflora* Lam. VI. 76. no. 1.
— longissima DC. VI. 73. †
— maculata Spanoghe. II. 518. no. 4.
— *Malabarica* Lam. II. 518. no. 1.
— monantha Bth. II. 518. no. 7.
— nutans DC. VI. 73. †
— oxypetala Lindl. II. 943. no. 1.
— propinqua G. Don. II. 518. no. 8.
— Rottleri Wght. et Arn. *II. 518. no. 1.
— *stricta* Rxb. II. 518. no. 1.
— tomentosa Wght. et Arn. II. 518. no. 2.
— *uliginosa* DC.? II. 518. no. 4.
— uliginosa DC. VI. 73. †
— Xalapensis Martens et Galeotti. VI. 73. no. 2.
Ranunculaceae Juss. I. 3. II. 737. V. 3.
Ranunculastrum DC. I. 36. no. 37. 40. 41. I. 39. no. 66. 67. II. 739. no. 19. 20. 21.
Ranunculeae DC. I. 33. II. 738. V. 4.
Ranunculus Hall. I. 33. II. 738. V. 4.
— acaulis Bnks. et Soland. V. 5. no. 9.
— acetosellaefolius Boiss. I. 34. no. 2.
— aconitifolius L. I. 45. †
β. platanifolius Rchb. I. 45. †
— acris L. *I. 43. no. 112. I. 46. †
γ. Marylandicus } Torr. et Gr. I. 43. no. 112.
β. pilosus } Torr. et Gr. I. 43. no. 112.
— acutilobus Ldb. I. 38. no. 58.
— affinis R. Br. *I. 42. no. 101.
— affinis F. W. Schultz. *II. 738. no. 3.
— alismoides Bory. I. 34. no. 3.
— alpestris L. I. 45. †
— Amarillo Bertol. I. 44. no. 130.
— amoenus Ldb. I. 38. no. 52.
— angulatus Prsl. II. 738. no. 7.
— angustifolius *β.* uniflorus Boiss. *I. 34. no. 4.
— *apiifolius* Pers. I. 33. no. 1.
— aquatilis L. *I. 36. no. 33. *I. 42. no. 97. I. 45. †
β. capillaceus DC. I. 42. no. 97.
— arachnoides C. A. Meyer. I. 39. no. 63.
— *arcticus* Richard. I. 42. no. 101.
— argyreus Boiss. I. 37. no. 42.
— arvensis L. I. 46. †
— *arvensis g. inermis* Koch. I. 34. no. 11.
— *Asiaticus* Bory et Chaub. I. 34. no. 7. *a.*
— Asiaticus L. *I. 36. no. 31. I. 45. †
— attenuatus Royle. I. 40. no. 72.
— Aucheri Boiss. I. 36. no. 40.
— aureus Schleich. I. 46. †
— auricomus L. (c. variett.) I. 45. †
var. alliariaefolius Rchb. I. 45. †
— Balbisii Moris. *V. 4. no. 1.
Ranunculus Baudatii Godron. I. 34. no. 9.
— Bauhini Tausch. I. 35. no. 14.
— Beckii G. Don. I. 44. no. 135.
— Belgicus Stoffels. *II. 739. no. 10.
— *Belvisii* DC. I. 43. no. 112.
— biternatus Smith. II. 740. †
— blepharicarpos Boiss. I. 34. no. 1.
— *Bonariensis* Pers. I. 33. no. 2.
— *Bonariensis* Poir. I. 38. no. 3. *β.* I. 36. no. 34.
— brachiatus Schleich. I. 46. †
— brevicaulis Hook. I. 42. no. 103.
— Breyninus Crntz. I. 45. †
— bulbosus Linn. I. 46. †
— Cadmicus Boiss. II. 740. no. 21.
— *Camtschaticus* DC. I. 46. no. 1.
— *Canadensis* Jcq. I. 43. no. 114.
— cardiophyllus Hook. I. 42. no. 105.
— Carolinianus DC. *I. 43. no. 116.
— Carpaticus Herbich. I. 34. no. 12.
— Carpetanus Boiss. et Reut. II. 738. no. 1. *β.* alpinus.
— Cassius Boiss. I. 37. no. 43.
— Cassubicus L. I. 45. †
— *chaerophyllos* DC. I. 36. no. 31.
— chaerophyllos Linn. *I. 34. no. 7.
β. flabellatus Desf.
a. vulgaris Desf.
— Chilensis DC. I. 45. †
— Chinensis Bnge. I. 39. no. 67.
— Choorensis Royle. I. 40. no. 74.
— circinnatus Sibthrp. I. 45. †
— cochlearifolius Hornem. I. 36. no. 34.
— colonorum Endl. I. 42. no. 96.
— *Constantinopolitanus* C. A. Meyer. I. 39. no. 64.
— *Constantinopolitanus* d'Urv. I. 36. no. 29.
— cordigerus Viv. II. 739. no. 14.
— cortusaefolius Willd. *I. 36. no. 35.
— crenatus W. K. I. 45. †
— Creticus *β.* macrophyllus DC. I. 45. †
— cuneatus Hook. I. 41. no. 88.
— Cymbalaria Prsh. *I. 42. no. 100.
β. alpinus Torr. et Gr.
— cymbalariaefolius Moris. I. 35. no. 19.
— *cymbalariaefolius* Moris. V. 4. no. 1.
— delphinifolius H. B. Kth. *I. 43. no. 120.
— *delphinifolius* Torr. I. 42. no. 109. *a.*
— demissus DC. *I. 34. no. 6.
β. Hispanicus Boiss.
— *Deppei* Nutt. I. 43. no. 112. *β.*
— *dichotomus* Moç. et Sess. I. 43. no. 120.
— *dimorphorhizus* Brot. I. 34. no. 7. *β.*
— discolor Steudel. V. 5. no. 5.
— *dissectus* Hook. et Arn. I. 43. no. 120.
— dissectus Hook. et Arn. I. 43. no. 123.

Ranunculus distans Royle. I. 39. no. 69.
— dolosus Fisch. et Mey. I. 38. no. 57.
— Donianus Pritzel. *II. 740. no. 25.
— elegans C. Koch. I. 39. no. 64.
— erinifolius Bocc. I. 35. no. 18.
— eriocarpus Boiss. I. 37. no. 41.
— *fascicularis* Schlchtd. I. 43. no. 118.
— *Ficaria* Walt.? I. 47. no. 4. γ.
— ficarioides Bory et Chaub. I. 36. no. 28.
— *fistulosus* Brignoli. I. 36. no. 34.
— *flabellatus* Desf. I. 36. no. 31.
— flabellatus Heuff. I. 45. †
— flabellifolius Heuff. II. 739. no. 1.
— Flammula L. *I. 40. no. 79. *I. 42. no. 98.
β. reptans Rchb. I. 45. †
— *Flammula* Sibthrp. I. 36. no. 27.
— fluitans Lam. I. 45. †
— *fluviatilis* Bigel. I. 42. no. 109. α.
— *foliis inferioribus multifidis etc.* Burm. IV. 148. no. 2. γ.
— fontanus Prsl. II. 738. no. 6.
— fraternus Schrenk. I. 39. no. 62.
— Garganicus Ten. I. 35. no. 22.
— gelidus Kar. et Kir. II. 740. no. 22.
— geranioides Blume. I. 41. no. 86.
— glabellus Royle. I. 39. no. 68.
— glaberrimus Hook. I. 42. no. 107. (III. Emend. p. 1.)
— glabrifolius Hook. I. 41. no. 92.
— glacialis L. α. gelidus Rchb. β. genuinus Rchb. γ. crithmifolius Rchb. I. 45. †
— glandulifer Poepp. I. 44. no. 128.
— *Gmelini* DC. I. 42. no. 109. δ.
— Gouani W. I. 46. †
— *gracilis* Bory et Chaub. II. 739. no. 18.
— gracilis Schleich. I. 46. †
— gramineus L. I. 45. †
β. luzulaefolius Boiss. *I. 34. no. 5.
— *grandifolius* Lowe. I. 36. no. 35.
— grandifolius Lowe. I. 36. no. 37.
— grandifolius C. A. Meyer. I. 38. no. 54.
— *gregarius* Brot. I. 34. no. 7. β. I. 36. no. 31.
— Gunnianus Hook. I. 41. no. 95.
— Haarbachii Not. II. 739. no. 12.
— *halophyllus* Schlchtd. I. 42. no. 100.
— hastatus Walker. I. 40. no. 82.
— *hebecarpus* Hook. et Arn. I. 43. no. 121. γ.
— hebecarpus Hook. et Arn. I. 43. no. 122.
— hederaceus L. I. 45. †
— *heterophyllus* Sm. I. 33. no. 2.
— heucheraefolius Prsb. I. 36. no. 25.
— hirsutus Ait. I. 46. †
— *hirsutus* Sm. I. 36. no. 30.
— hirtellus Royle. I. 40. no. 71.
— *hispidus* Michx. I. 43. no. 112.
Ranunculus hispidus Prsh. I. 43. no. 114.
— Hollianus Rchb. II. 738. no. 4.
— humilis Coll. I. 43. no. 124.
— humilis D. Don I. 44. no. 132.
— *humilis* G. Don. II. 740. no. 25.
— hydrophilus Bnge. I. 39. no. 65.
— Illyricus L. I. 45. †
— Insubricus Cesati. I. 35. no. 15.
— insularis Viv. I. 35. no. 21.
— *intermedius* Poir. I. 36. no. 30.
— Javanicus Blume. I. 41. no. 87.
— *Kochii* Ldb. II. 740. no. 1.
— lacerus Bell. I. 45. †
— *lacustris* Beck et Tracy. I. 42. no. 109. α.
— laetus Wall. I. 39. no. 70.
— *Langsdorffii* DC. I. 42. no. 109. δ.
— lanuginosus L. *I. 36. no. 29. I. 46. †
— *lanuginosus* Prsh. I. 43. no. 116.
— *lappaceus* DC. I. 41. no. 91.
— lappaceus Sm. *I. 41. no. 90.
— lasiocarpus C. A. Meyer. I. 38. no. 53.
— lasiostemon Fnzl. II. 739. no. 17.
— Lenormandii F. W. Schultz. I. 34. no. 8.
— leptocaulis Hook. I. 41. no. 93.
— limosus Nutt. I. 42. no. 110.
— lingua L. I. 45. †
— Llaweanus Schlchtd. I. 44. no. 131.
— lobatus Jacquem. I. 40. no. 80.
— lomatocarpus Fisch. et Mey. I. 39. no. 60.
— longicaulis C. A. Meyer. I. 38. no. 50.
— longirostris Godron. I. 44. no. 136.
— Lorentei Hochstett. V. 4. no. 2.
— Maclovianus d'Urv. I. 44. no. 137.
— macrophyllus Ldb. I. 38. no. 59.
— macropus Hook. fil. V. 5. no. 7.
— major Dumort. I. 34. no. 10.
— Marsicus Ten. et Guss. I. 35. no. 23.
— *Marylandicus* Poir. I. 43. no. 112.
— membranaceus Fresen. I. 37. no. 47.
— membranaceus Royle. I. 40. no. 78.
— micranthus Nutt. I. 42. no. 106. (III. Emend. p. 1.)
β. Californicus Torr. et Gr.
— microcarpus Prsl. I. 44. no. 127.
— millefoliatus L. I. 45. †
β. grandiflorus Sweet. I. 45. †
— mollis Wall. I. 40. no. 76.
— Monspeliacus DC. I. 45. †
— Monspeliacus L. I. 45. †
— montanus Willd. I. 45. †
— *Moorcroftianus* Wall. I. 40. no. 79.
— multicaulis D. Don. I. 44. no. 133.
— muricatus L. I. 46. †
— nanus Hook. I. 41. no. 89.
— natans C. A. Meyer. I. 37. no. 49.
— Neapolitanus Ten. I. 35. no. 17.

Ranunculus Nendtwichii Frivaldsk. I. 36. no. 26.
— nervosus Royle. I. 40. no. 73.
— *nitidus* Mühlnbrg. I. 43. no. 112.
— *nivalis* Lag. I. 34. no. 6.
— nivicola Hook. V. 5. no. 6.
— nodiflorus L. I. 46. †
— *oblongifolius* Ell. I. 42. no. 99. δ.
— occidentalis Nutt. I. 43. no. 113. (III. Emend. p. 1.)
— ophioglossifolius Vill. *I. 36. no. 27. et 34. I. 46. †.
— *ophioglossoides* Willd. I. 36. no. 34.
— ornithorhynchus Hook. I. 43. no. 119. (III. Emend. p. 1.)
— orthophytus Delile. V. 5. no. 3.
— oryzetorum Bnge. I. 39. no. 66.
— ovalis Hook. I. 42. no. 102.
— *pantothrix* Brot. I. 36. no. 33.
— *pantothrix* DC. I. 42. no. 97.
— parnassifolius L. α. parviflorus Rchb. I. 45. † β. grandiflorus Rchb. I. 45. †
— parviflorus L. *I. 36. no. 32. I. 43. no. 121. I. 46. †
— *parviflorus* γ. Torr. et Gr. I. 43. no. 122.
— parvulus Clairv. I. 46. †
— *parvulus* L. I. 36. no. 30.
— Patagonicus Poepp. I. 44. no. 129.
— paucistamineus Tausch I 34. no. 13.
— pedatus W. et K. I. 45. †
— pedunculaɾis Sm. *I. 44. 125.
— pedunculatus Viv. II. 739. no. 13.
— Peloponnesiacus Boiss. II. 739. no. 18.
— Pennsylvanicus L. *I. 43. no. 114.
— *Pennsylvanicus* Prsh. I. 43. no. 112.
— Peruvianus Pers. V. 6. †
— philonotis Retz. *I. 36. no. 30.
— pimpinellifolius Hook. I. 41. no. 91.
α. laxe pilosus.
β. vestitus.
— pimpinelloides D. Don. I. 40. no. 77.
— pinguis Hook. fil. V. 5. no. 8.
β. pilosus.
γ. rhombifolius.
— platyspermus DC. I. 45. †
— plebejus R. Br. I. 41. no. 90.
— polyanthemo-bulbosus Lasch. II. 739. no. 16.
— polyanthemos L. I. 46. †
— *polypetalus* Gill. I. 44. no. 125.
— *polypetalus* Royle. I. 33. no. 3.
— polyphyllos W. et K. I. 45. †
— pratensis Prsl. II. 739. no. 9.
— procerus Moris. I. 35. no. 20.
— procumbens Boiss. I. 37. no. 44.
— propinquus C. A. Meyer. I. 38. no. 55.
Ranunculus Phtora Crntz. I. 45. †
— Pthora L. I. 45. †
— pulchellus C. A. Meyer. I. 38. no. 56.
— Pursbii Richards. *I. 42. no. 109.
β. multifidus Torr. et Gr.
— *pusillus* Poir. I. 36. no. 34.
— pusillus Poir. *I. 42. no. 99.
β. denticulatus, γ. muticus, δ. oblongifolius } Torr. et Gr.
— Pyrenaeus L. I. 45. †
β. plantagineus All. I. 45. †
— radicans C. A. Mey. I. 38. no. 51.
— *recurvatus* Bngrd. I. 43. no. 113.
— recurvatus Poir. *I. 43. no. 115. (c. varr. β. γ. δ.)
— reniformis Wall. I. 40. no. 81.
— repens L. I. 46. †
— reticulatus Schmitz et Regel. I. 34. no. 11.
— Reuterianus Boiss. II. 740. no. 20.
— *rhoeadifolius* DC. I. 36. no. 36.
— rhomboideus Goldie. I. 42. no. 104.
— rhynchocarpus Boiss. I. 37. no. 45.
— rigidus Godron. I. 36. no. 38.
— *Robini* Raf. I. 42. no. 98.
— *rutaefolius* Linn. I. 33. no. 1.
— Sabinii R. Br. I. 43. no. 111.
— sagittaefolius Hook. I. 41. no. 85.
— saniculaefolius Viv. II. 740. no. 23.
— saniculaeformis Bigelow. *II. 740. no. 24.
— scaber Prsl. I. 35. no. 24.
— scapigerus Hook. I. 41. no. 94.
— sceleratus L. *I. 42. no. 108. I. 45. †
β. multifidus Nutt. I. 42. no. 108.
— Schlechtendalii Hook. I. 43. no. 118. (III. Emend. p 1.)
— Schraderianus Fisch. et Mey. I. 45. no. 138.
— Seguieri Vill. I. 45. †.
— *sericeus* Tenore. I. 36. no. 29.
— Siculus Prsl. II. 738. no. 8.
— Simensis Fresen. I. 37. no. 46.
— Sprunerianus Boiss. II. 739. no. 19.
— stenopetalus Hook. V. 5. no. 4.
— Steveni Andrz. I. 46. †
— *subapetalus* Vict. I. 36. no. 32.
— subpinnatus Wght. et Arn. I. 40. no. 83.
— subscaposus Hook. fil. V. 6. no. 10.
— Tembensis Fresen. I. 37. no. 48.
— tenellus Nutt. I. 43. no. 117.
— tenellus Viv. I. 36. no. 39.
— *Teneriffae* Pers. I. 36. no. 35.
— *tenuirostris* Steudel. V. 5. no. 3.
— *Thomasii* Ten. I. 35. no. 22.
— Thora L. I. 45. †
— trachycarpus Fisch. et Mey. I. 39. no. 61.
— *trachyspermus* Ell. I. 43. no. 121.

Ranunculus Traunfellneri Hppe. I. 45. †
— trichophyllus Chaix. I. 36. no. 33.
— triphyllos Wallr. II. 738. no. 2.
— tridentatus DC. I. 45. †
— trilobus Desf. *I. 36. no. 36.
— *trilobus* Desf. β. I. 36. no. 30.
— trilobus Desf. *I. 36. no. 36.
β. rhoeadifolius B. Webb et Berth.
— tripartitus DC. I. 45. †
— trisepalus Gill. I. 44. no. 126.
— *tuberculatus* C. A. Meyer. I. 39. no. 60.
— *uliginosus* Willd. I. 36. no. 34.
— velutinus Ten. I. 35. no. 16.
— *velutinus* Ten. I. 36. no. 29.
— verrucosus Prsl. I. 46. † *II. 739. no. 15.
— vitifolius Royle. I. 40. no. 75.
— Wallichianus Wght. et Arn. I. 40. no. 84. (III. Emend. p. 1.)
— Xartardi Lapeyr. II. 738. no. 5.
Raoulia Hook. fil. °VI. 238.
— australis Hook. fil. VI. 238. no. 1.
Raphaneae DC. I. 189.
Raphanistrum Tournef. I. 189.
— Gayanum Fisch. et Mey. I. 189. no. 2.
— Landra Morett. I. 189. †
— maritimum Sm. I. 189. †
— Odessanum Andr. I. 189. no. 1.
— segetum Baumg. I. 189. †
Raphanus DC. I. 189. (ex p.)
Raphanus Tournef. I. 189.
— albifrons Prsl. I. 189. no. 2.
— fugax Prsl. I. 189. no. 1.
— *maritimus* Bess. I. 189. no. 1.
— *pilosus* Willd. II. 230. no. 1. V. 782. no. 2.
— sativus L. *I. 189. no. 3.
— *sativus* var. Webb et Berth. I. 189. no. 2.
Raphidophyllum Hochst. °III. 389. °III. 970.
— simplex Hochst. III. 389. no. 1.
Raphisanthe lateritia Lilja. V. 781. no. 1.
Rapistrum Bauh. I. 189. II. 763.
— glabrum Host. I. 189. †
— *Hispanicum* Boiss. II. 763. no. 1.
— *hypogaeum* Dub. I. 184. no. 1.
— Linnaeanum Boiss. et Reut. II. 763. no. 1.
— perenne All. I. 189. †
— rugosum All. I. 189. †
Rapunculus foliis augustissimis dentatis etc. Burm. IV. 156. no. 22.
Rapuntium DC. II. 706. VI. 375. no. 1.
Raspailia Brogn. I. 544.
— microphylla Brogn. *I. 544. no. 1.
Rata III. 404. no. 6.
Rathkea Schum. et Thonn. I. 732. V. 521.
— glabra Schum. et Thonn. *I. 732. no. 1. 521. no. 1.
Ratibida Torr. et Gr. VI. 160.
Ratibida sulcata Rafin. VI. 160. no. 2.
Ratonia DC. I. 418.
— *Domingensis* DC. I. 418. no. 9.
Rauwolfia Blume. VI. 467.
— *dentata* Tafalla. IV. 73. no. 6.
— *flexuosa* Rz. et Pav. IV. 72. no. 1.
— *macrophylla* Rz. et Pav. IV. 72. no. 2.
— Sumatrana Jack. *VI. 467. no. 1.
Razumovia Tranquebarica Spr. III. 391. no 4.
Rea Bertero. *VI. 365.
Rea Bertero. II. 700.
Reaumuria Hasselqu. *II. 268.
REAUMURIACEAE Lindl. II. 268. V. 808.
Reaumurieae Meisn. V. 808.
Rebis discolor Spach. II. 360. no. 41.
— *ebracteolata* Spach. II. 360. no. 35.
— *frigida* Spach. II. 360. no. 42.
— *Gayana* Spach. II. 360. no. 36.
— *macrobotrys* Spach. II. 360. no. 40.
— *punctata* Spach. II. 360. no. 43.
Recchia Sess. et Moc. *I. 68.
Rectembryeae Endl. **(Solanaceae)** III. 114. III. 955. VI. 566. VI. 620.
Redoutea Vent. I. 307.
Redowskia Cham. et Schlchtd. I. 192.
— sophiaefolia Cham. et Schlchtd. *I. 192. no. 1.
Regelia Schauer. II. 928. °V. 748.
— ciliata Schauer. *II. 928. no. 1. V. 748. no. 1.
Rehmannia Liboschitz. III. 254. °III. 962. *VI. 523. *VI. 655.
— Chinensis Fisch. et Mey. III. 254. no. 1.
— *glutinosa* Librosch. III. 254. no. 1.
Reichardia decapetala Rth. I. 810. no. 1.
— *hexapetala* Bth. I. 811. no. 1.
Richelia Montevidensis Spr. I. 460. no. 3.
Reifferscheidia Prsl. I. 63.
— speciosa Prsl. *I. 63. no. 1.
Reineria Mnch. I. 673. V. 515. no. 6. 7.
Reinwardtia Krthls. V. 129.
— elongata Krthls. V. 130. no. 2.
— patens Krthls. V. 129. no. 1.
Relbunium Endl. II. 459. VI. 17.
Relhania Hérit. *II. 650.
Relhanieae Lssng. II. 650.
Remijia DC. II. 509. *VI. 64.
— densiflora Bth. II. 509. no. 1
— *densiflora* Bth. VI. 68. no. 16.
— tenuiflora Bth. II. 509. no. 2.
— *tenuiflora* Bth. VI. 68. no. 15.
Renggeria Meisn. I. 393. II. 811.
— comata Meisn. *I. 393. no. 1.
— Guianensis Splitgrbr. II. 811. no. 1.
— littoralis Poepp. et Endl. I. 393. no. 2.

Rengifa Poepp. et Endl. I. 393.
— Peruviana Poepp. et Endl. *I. 393. no. 1.
Reptonia Alph. DC. *VI. 454.
— *buxifolia* Alph. DC. VI. 453. no. 2.
Requienia DC. *I. 583.
Reseda Linn. II. 751.
Reseda Tournef. II. 751.
Reseda ......? Drége. V. 33. no. 1.
— *Abyssinica* Fresen. II. 754. no. 2.
— alba Linn. II. 752. no. 21.
— *alba* var. Del. II. 752. no. 20.
— amblycarpia Fresen. II. 753. no. 32.
— Arabica Boiss. II. 754. no. 41.
— Armena Boiss. II. 754. no. 40.
— Aucheri Boiss. II. 754. no. 38.
— *bipinnata* Willd. II. 752. no. 20.
— *calycinalis* Lam. II. 752. no. 14.
— *canescens* Fresen. II. 753. no. 31.
— *canescens* Linn. II. 754. no. 1.
— *Capensis* Thunb. II. 751. no. 6.
— Chinensis Lour. II. 751. no. 8.
— Cochinchinensis Lour. II. 751. no. 10.
— complicata Bory. *II. 751. no. 3.
— *crispa* Mill. II. 752. no. 19.
— crystallina B. Webb et Berth. II. 753. no. 33.
— crispata Link. II. 751. no. 9.
— *difformis* Mnch. II. 751. no. 12.
— dipetala Ait. II. 751. no. 6.
— *decussiva* Forsk. II. 752. no. 20.
— fruticulosa Linn. II. 752. no. 22.
— Gayana Boiss. II. 752. no. 25.
— glauca Linn. II. 751. no. 2.
— *glauca* Sieb. II. 751. no. 6.
— globulosa Fisch. et Mey. II. 753. no. 25.
— gracilis Ten. II. 753. no. 27.
— *hexagyna* Forsk. II. 753. no. 31.
— incisa Ten. II. 753. no. 29.
— inodora Rchb. II. 752. no. 23.
β. macrocarpa Fisch. et Mey.
— laevigata G. Don. II. 752. no. 17.
— *lanceolata* Lag. II. 751. no. 9.
— linifolia Horn. II. 751. no. 4.
— lutea Linn. II. 752. no. 19.
— luteola Linn. II. 751. no. 1.
β. australis B. Webb. et Berth.
— macrosperma Rchb. II. 752. no. 24.
— *macrosperma β. Natolica* Fisch. et Mey. II. 752. no. 23.
— *media* Lag. II. 752. no. 14.
— *mediterranea* Jcq. II. 751. no. 12.
— mediterranea Linn. II. 751. no. 12.
— myriophylla Ten. II. 753. no. 28.
— *ochracea* Mnch. II. 752. no. 19.
— odorata Linn. II. 751. no. 13.
β. frutescens Ker. II. 752.
Reseda oligandra Edgew. II. 753. no. 34.
— orthostyla C. Koch. II. 751. no. 4.
— *Phyteuma* Forsk.? II. 752. no. 18.
— Phyteuma Linn. II. 752. no. 14.
— podocarpos Viv. II. 753. no. 31.
— pruinosa Del. II. 752. no. 18.
— *purpurascens* Linn. II. 754. no. 2.
— *quadragyna* Torsk. II. 751. no. 12.
— ramosissima Pourr. II. 752. no. 15.
— *sesamoides* Linn. II. 754. no. 1.
— scoparia Brouss. II. 751. no. 11.
— *stellata* Lam. II. 754. no. 1.
— stenostachya Boiss. II. 754. no. 39.
— *stricta* Pers. II. 752. no. 15.
— *subulata* Delile. II. 754. no. 1.
— tomentosa Boiss. II. 753. no. 37.
— tridens Viv. II. 753. no. 30.
— truncata Fisch. et Mey. II. 753. no. 36.
— *undata* Habl. II. 752. no. 19.
— undata Linn. II. 752. no. 20.
— *undulata* DC. II. 752. no. 21.
— virescens Hornem. II. 751. no. 7.
— virgata Boiss. et Reut. II. 752. no. 26.
— *vulgaris* Mill. II. 752. no. 19.
RESEDACEAE DC. II. 751. V. 33.
Resedella dipetala Webb et Berth. II. 754. no. 1.
Resupinaria Bth. III. 774.
Retama Boiss. I. 629. II. 842. °V. 506.
Retama Boiss. II. 839.
— angulata Griseb. II. 842. no. 1.
— *angulata* Griseb. V. 506. no. 1.
— Duriaei B. Webb. V. 508. no. 3.
— Gussonei B. Webb. V. 508. no. 4.
— microcarpa B. Webb. V. 508. no. 5.
— monosperma Boiss. *I. 629. no. 1. V. 507. no. 1.
β. Bovei B. Webb. V. 507. no. 1.
— *monosperma* Boiss. II. 839. no. 3.
— *monósperma* B. Webb. II. 839. no. 2. II. 840. no. 4.
— *Raetam* B. Webb. II. 839. no. 1.
— Raetam B. Webb. V. 508. no. 2.
— *rhodorhizoides* B. Webb. II. 840. no. 6. V. 508. no. 5. V. 509. no. 6.
— rhodorhizoides B. Webb. V. 509. no. 7.
— *rhodorhizos* B. Webb. II. 840. no. 5.
— Spachii B. Webb. V. 508. no. 6.
— sphaerocarpa Boiss. *I. 630. no. 2. V. 509. no. 8.
Retiniphyllum H. B. Kth. II. 488.
— scabrum Bth. II. 488. no. 1.
Retinodendron Krthls. V. 126.
— *pauciflorum* Krthls. V. 127. no. 6.
— *Rassak* Krthls. V. 126. no. 5.
Retzia Thnbrg. III. 125. °III. 956.

Retzia campanuloides Spr. III. 125. no. 2.
— roëlloides Spr. III. 126. no. 3.
— spicata Thnbrg. III. 125. no. 1.
Retziaceae Bartl. III. 125. III. 956.
Reutera Boiss. II. 395. V. 857.
— cervariaefolia Boiss. V. 857. no. 2.
— deverreoides Boiss. V. 858. no. 6.
— flabellifolia Boiss. V. 858. no. 5.
— flava Boiss. V. 857. no. 1.
— Fontanesii Boiss. II. 396. no. 3.
— gracilis Boiss. II. 395. no. 1.
— pastinacaefolia Boiss. V. 857. no. 3.
— procumbens Boiss. II. 396. no. 2.
— tragioides Boiss. V. 857. no. 4.
Reveesia Lindl. I. 334.
— thyrsoidea Lindl. *I. 334. no. 1.
Reveesieae Schott. et Endl. I. 334.
Rhabdia Martius. *VI. 555.
Rhabdocaulis Nutt. (ex. p.) II. 614. II. 982.
Rhabdocaulon Bth. III. 743.
Rhabdosciadium Boiss. °V. 909.
— Aucheri Boiss. V. 909. no. 1.
Rhabdothamnus A. Cunn. *VI. 523.
Rhachicallis DC. II. 501. VI. 56. no. 13.
— *capitata* Bth. VI. 56. no. 13.
Rhadinocarpus Vogel. I. 750.
— acutifolius Vogel. I. 750. no. 3.
— Brasiliensis Vogel. I. 750. no. 2.
— multiflorus Vogel. I. 750. no. 1.
Rhagadiolus Tournef. *II. 684. *VI. 327.
RHAMNEAE R. Br. *I. 542.
Rhamnus Nerija Spr. I. 536. no. 2.
Rhamphicarpa Bth. III. 305. °III. 966. *VI. 648.
— curviflora Bth. III. 306. no. 3.
— longiflora Bth. III. 305. no. 1.
— tubulosa Bth. III. 306. no. 2.
Rhanterium Dsf. *II. 600. *II. 955. no. 1.
Rhaphiodon Schauer. °III. 524. °III. 978.
— echinus Schauer. III. 524. no. 1.
Rhaphiolepis Lindl. II. 57.
—? integerrima Hook. et Arn. II. 57. no 4.
— Japonica Sieb. et Zucc. II. 57. no. 2.
— Mertensii Sieb. et Zucc. II. 57. no. 3.
— rubra Lindl. II. 57. †
— spiralis G. Don. *II. 57. no. 1.
Rhaphionacme Harvey. °VI. 480.
— divaricata Harvey. VI. 480. no. 2.
— pubescens Hochst. VI. 480. no. 3.
— Zeyheri Harvey. VI. 480. no. 1.
Rhaphispermum Bth. *VI. 649.
Rhaphistemma Wall. *VI. 483.
— pulchellum Wall. VI. 742.
Rhapidacantha Sendtner. (Solanum) VI. 597.
Rhaponticum DC. *II. 677.
Rhaptostylum H. B. I. 541.
Rhaptostylum acuminatum H. B. *I. 541. no. 1.
Rhazya Dcne. *VI. 470.
Rheedia L. I. 397.
— lateriflora L. *I. 397. no. 1.
Rheitrophyllum Hsskrl. VI. 475.
— subverticillatum Hsskrl. VI. 475. no. 1.
Rhesa Hamilt. I. 538.
— Moja Hamilt. I. 538. no. 1.
— paniculata Arn. I. 538. no. 2.
Rhexantha Torr. et Gr. II. 126.
Rhexia R. Br. II. 126.
— *angustifolia* Nutt. II. 126. no. 2.
— aspera Voigt. II. 127. no. 13.
— *capitata* A. Rich. II. 137. no. 1.
— ciliosa Michx. *II. 126. no. 6.
cognata Weinm. II. 127. no. 12.
— *cordata* Spr. II. 125. no. 9.
— fragilis Bertol. II. 127. no. 11.
— *fulva* Spr. II. 125. no. 11.
— glabella Michx. *II. 126. no. 5.
— glandulosa Bertol. II. 127. no. 10.
— *grandifolia* Schlchtd. II. 119. no. 2.
— heterophylla Hook. et Arn. II. 127. no. 9.
— *inaequilateralis* Cham. et Schlchtd. II. 118. no. 1.
— *juniperina* Willld. Hb. II. 127. no. 2.
— lanceolata Walt. *II. 126. no. 2.
— *linifolia* Mart. II. 126. no. 15.
— lutea Walt. *II. 126. no. 8.
— Mariana L. *II. 126. no. 1.
— *Mariana* var. *exalbida* Lam. II. 126. no. 2.
— *obvallata* Sieb. II. 137. no. 1.
— *parvifolia* Schlchtd. II. 119. no. 1.
— *Radula* Bonpl. II. 130. no. 5.
— *Schiedeana* var. *β.* Cham. et Schlchtd. II. 130. no. 2.
— serrulata Nutt. *II. 126. no. 7.
— stricta Prsh. *II. 126. no. 4.
— *taxifolia* St. Hil. II. 127. no. 2.
— *thymifolia* Hb. Monac. II. 125. no. 11.
— *venusta* Mart. II. 125. no. 9.
— *viminea* Bot. Reg. II. 128. no. 1.
— Virginica L. *II. 126. no. 3.
Rhexieae DC. II. 124. V. 687.
Rhigiophyllum Hochst. °VI. 388.
— squarrosum Hochst. VI. 388. no. 1.
Rhigozum Burchell. *VI. 515.
Rhinactina Less. *II. 578. *II. 952. no. 5.
Rhinantheae Bth. III. 392. III. 971. VI. 653.
Rhinanthera Blume. *I. 203.
Rhinanthera ...... Blume. I. 203. no. 1.
Rhinanthideae Bth. VI. 644.
Rhinanthus Linn. (ex p.) III. 434.
Rhinanthus Linn. *VI. 653.

Rhinanthus M. Bieb. III. 433. °III. 972.
Rhinanthus M. Bieb. VI. 653.
— *Alectorolophus* Pollich. III. 434. no. 3.
— *alpinus* Bmgrtnr. III. 434. no. 5.
— *angustifolius* Gmel. III. 434. no. 4.
— *bifidus* D. Don. III. 415. no. 27.
— bifidus D. Don. III. 940.
— *crista galli* α. Linn. III. 434. no. 1.
— *crista galli* Poll. III. 434. no. 1.
— *crista galli* β. Linn. III. 434. no. 2. et 4.
— Elephas Linn. III. 433. no. 2.
β. parviflorus.
— *hirsutus* Lam. III. 434. no. 3.
— *Indicus* Burm. III. 495. no. 4.
— *major* Ehrb. III. 434. no. 2.
— *minor* Ehrb. III. 434. no. 1.
— *minor β. alpinus* Gaud. III. 434. no. 1. γ.
— *orientalis* Friv. III. 433. no. 2.
— orientalis Linn. III. 433. no. 1.
— *pulcher* Schummel. III. 434. no. 5.
— *scaber* Thnbrg. III. 391. no. 3.
— *trifidus* Vahl. III. 409. no. 1.
— *Trixago* Linn. III. 408. no. 6.
— *versicolor* Dsf. III. 408. no. 6. β.
— *versicolor* Lam. III. 409. no. 7.
— *villosus* Pers. III. 434. no. 3.
— *viscosus* Sm. III. 408. no. 5.
Rhipsalis Pfeiff. II. 342. II. 936. °V. 821.
— *brachiata* Hook. II. 936. no. 1.
— *calamiformis* Hort. II. 343. no. 12.
— Cassytha Gärtn. II. 343. no. 10.
δ. dichotoma DC.
β. Hookeriana DC.
γ. Moçiniana DC.
ε. Mauritiana DC.
ζ. pendula S. Dyck.
α. Swartziana DC.
— *Cassytha β. major* Hort. Dyck. II. 343. no 11.
— *Cassytha δ. pilosiuscula* S. Dyck. II. 343. no. 12.
— cereuscula Haw. II. 344. no. 16.
— crispata Pfeiff. II. 342. no. 1.
β. latior S. Dyck.
— *echinata* Hort. II. 344. no. 15.
— fasciculata Haw. II. 343. no. 13.
— floccosa S. Dyck. II. 343. no. 11.
— funalis S. Dyck. II. 343. no. 12.
β. minor.
— *grandiflora* Haw. II. 343. no. 12.
— macrocarpa Miq. II. 344. no. 17.
— mesembrianthemoides Haw. II. 344. no. 15.
— micrantha DC. II. 343. no. 9.
— pachyptera Pfeiff. II. 342. no. 6.
β. crassior S. Dyck.
— *parasitica* DC. II. 344. no. 14.
Rhipsalis parasitica Haw. II. 344. no. 13.
— *pendula* Hort. II. 343. no. 10.
— pentaptera Pfeiff. II. 343. no. 7.
— platycarpa Pfeiff. II. 342. no. 4.
— ramulosa Pfeiff. II. 342. no. 3.
— rhombea Pfeiff. II. 342. no. 2.
— Saglionis Otto. *II. 936. no. 1.
— *salicornioides* Haw. II. 345. no. 1.
— *salicornioides β.* Haw. II. 344. no. 15.
— sarmentacea Otto et Dietr. II. 344. no. 18.
— Swartziana Pfeiff. II. 342. no. 5.
— trigona Pfeiff. II. 343. no. 8.
— undulata Pfeiff. II. 344. no. 14.
RHIZOBOLEAE DC. I. 410. V. 358.
Rhizobotrya alpina Tsch. I. 153. no. 2.
Rhizophora L. II. 70.
— *apiculata* Blume. II. 70. no. 4.
— *candelaria* DC. II. 70. no. 4.
— *candelaria* Wall. II. 70. no. 3.
— *caryophylloides* Burm. II. 71. no. 6.
— conjugata L. *II. 70. no. 4.
— *cylindrica* L. II. 70. no. 2.
— *decandra* Rxb. II. 70. no. 2.
— *gymnorhiza* L. II. 70. no. 1.
— *Kandel* L. II. 70. no. 1.
— macrorhiza Griff. II. 70. no. 1.
— Mangle L. *II. 70. no. 2.
— *Mangle* Rxb. II. 70. no. 1.
— mucronata Lam. *II. 70. no. 3.
— *racemosa* Meyer. II. 70. no. 2. β
— *sexangula* Lour. II. 71. no. 8.
— *Timoriensis* DC. II. 70. no. 1.
RHIZOPHOREAE R. Br. II. 70. V. 664.
Rhodamnia Jack. II. 194. V. 757.
— cinerea Jack. *II. 194. no. 1. V. 757. no. 1.
Rhodanthe Lindl. *II. 645.
Rhodiola algida Fisch. et Mey. II. 262. no. 3. adn.
— elongata Fisch. et Mey. II. 262. no. 1. adn.
— *elongata* Fisch. et Mey. V. 795. no. 6.
— *gelida* Schrenk. II. 262. no. 21.
— quadrifida Fisch. et Mey. II. 262. no. 2. adn.
— *Sibirica* Hort. II. 261. no. 16.
— *Sibirica* Sweet. II. 262. no. 1. adn.
Rhodochiton Zucc. III. 231. °III. 959. *VI. 638.
— volubile Zucc. III. 231. no. 1. III. 935.
Rhododendreae DC. II. 729.
Rhododendron Linn. II. 730. VI. 420.
— anthopogon DC. *II. 730. no. 1.
— arboreum Sm. *VI. 420. no. 2.
— Caucasico-arboreum Hort. *II. 730. no. 2.
— chamaecistus Linn. *VI. 420. no. 3.
— citrinum Hsskrl. VI. 420. no. 1.

Rhododendron fragrans Hortor. *VI. 420. no. 4.
— Gibsonii Hortor. *VI. 420. no. 5.
— Indicum L. *II. 730. no. 3.
β. lateritium Hort.
— pulchrum Sweet. *VI. 420. no. 6.
— Smithii var. aureum Hortor. *VI. 420. no. 7.
Rhodolaena Thouars. *I. 366.
Rhodora Duham. *II. 730.
Rhodoreae D. Don. II. 729. VI. 420.
Rhodostachya Bth. I. 883. V. 586. no. 1.
Rhodostoma Scheidw. II. 944. °VI. 78.
— gardenioides Scheidw. *II. 944. no. 1. *VI. 78. no. 1.
Rhodotypus Sieb. et Zucc. II. 51. V. 658.
— kerrioides Sieb. et Zucc. *II. 51. no. 1. V. 658. no. 1.
Rhoeades Bernh. I. 112.
Rhoeas DC. II. 750. no. 1.
Rhus L. I. 551. II. 829. V. 414.
— ailanthoides Bnge. I. 554. no. 27.
— *alata* Thnbrg. I. 423. no. 1.
— aglaophylla Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 13.
— argentea Eckl. et Zeyh. I. 553. no. 17.
β. brevifolia.
— Aucheri Boiss. II. 829. no. 1.
— Bucki-Amela Rxb. V. 414. †
— *calycina* Steud. I. 555. no. 1.
— *caustica* Hook. I. 551. no. 1.
— *cirrhiflora* Thnbrg. I. 440. no. 34.
— copallina L. *I. 554. no. 33. (c. varr. α. β. et γ. ibid.)
— crenatifolia Schlchtd. II. 830. no. 4.
— decipiens Wght. et Arn. I. 553. no. 23. (III. Emend. p. 3.)
— *dimidiata* Ehrnbrg. I. 440. no. 36.
— divaricata Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 8.
— diversiloba Torr. et Gr. I. 554. no. 35. V. 414. no. 3.
— fastigiata Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 9.
— *fraxinifolia* D. Don. V. 397. no. 1.
— horrida Eckl. et Zeyh. I. 553. no. 20.
— humilis Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 10.
— laevis Wall. I. 553. no. 21.
— *laurina* Nutt. I. 551. no. 2.
— *lobata* Hook. I. 554. no. 35. V. 414. no. 3.
— longispina Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 12.
— macrophylla Hook. et Arn. I. 554. no. 29.
— Mysorensis Heyne. I. 553. no. 24.
— Natalensis Brnhrdi. V. 414. no. 2.
— nodosa Blume. I. 553. no. 25.
— pallens Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 11.
— picaefolia Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 14.
— polyantha Bth. I. 554. no. 30.
— puberula Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 6.
Rhus pubigera Blume. I. 554. no. 26.
— *radicans* L. I. 554. no. 34. (β.)
— refracta Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 5.
— rimosa Eckl. et Zeyh. I. 553. no. 19.
— rosmarinifolia Vahl. *I. 551. no. 2.
γ. Caledonica } Eckl. et Zeyh.
α. Capensis } Eckl. et Zeyh.
δ. Swellendamensis } Eckl. et Zeyh.
β. Uitenhagensis } Eckl. et Zeyh.
— rufescens Desvx. I. 554. no. 31.
— rufescens Eckl. et Zeyh. I. 551. no. 3.
— Schiedeana Schlchtd. II. 829. no. 2.
— schmidelioides Schlchtd. II. 830. no. 3.
— scoparia Eckl. et Zeyh. I. 553. no. 15.
— scytophylla Eckl. et Zeyh. I. 553. no. 18.
— *semialata* var. γ. *Roxburghii* DC. V. 414. (†)
— sericea Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 7.
— spathulata Eckl. et Zeyh. I. 553. no. 16.
— stenophylla Eckl. et Zeyh. I. 552. no. 4.
— succedanea Linn. V. 414. no. 1.
β. discolor Hsskrl.
— Sumac Targioni. I. 554. no. 38.
— Taitensis Guillem. I. 554. no. 37.
— terebinthifolia Schlchtd. et Cham. I. 554. no. 28.
— Thunbergii Hook. II. 830. no. 5.
— Toxicodendron L. *I. 554. no. 34. (cum varr. α. β. γ.)
— *Toxicodendron* γ. *microcarpon* Michx. I. 554. no. 34. γ.
— *tridentata* Thnbrg. I. 440. no. 35.
— trilobata Nutt. I. 554. no. 36.
— typhina L. *I. 554. no. 32.
— velutina Wall. I. 553. no. 22.
— *vernicis* Auctor. I. 554. no. 26.
— *viridiflora* Poir. I. 554. no. 32.
— Wildingii Dehnhardt. I. 551. no. 1.
Rhyacophila Hochstett. V. 673.
— *repens* Hochstett. V. 673. no. 1.
Rhydidantha scabra Bth. VI. 232. no. 7.
Rhyditospermum C. H. Schultz. VI. 196.
— *inodorum* C. H. Schultz. VI. 196. no. 1.
Rhynchanthera DC. II. 120. V. 682.
— adenophora Miquel. II. 120. no. 4. *V. 682. no. 1.
— *adenophora* Miquel. V. 692. no. 10.
— brachyrhyncha Cham. II. 120. no. 3.
— cordata DC. II. 120. †
— cordifolia Bth. II. 120. no. 5.
— *Fothergillae* DC. II. 129. no. 7.
— *pentanthéra* DC. II. 120. no. 1.
— Schrankiana DC. II. 120. no. 1.
— verbenoides Cham. II. 120. no. 2.
Rhynchocarpa Schrad. II. 197.
— foetidissima Schrad. *II. 197. no. 1.

Rhynchocorys Griseb. * VI. 653.
Rhynchocorys Griseb. III. 433.
— *Elephas* Griseb. III. 433. no. 2.
Rhynchoglossum Blume. VI. 522. (* VI. 655.)
— Zeylanicum Hook. VI. 522. no. 1.
Rhyncholepis DC. II. 599. no. 1.
— *angustifolia* Nutt. II. 973. no. 1. β.
Rhyncholopha Bnge. III. 415.
Rhynchopetalum Fresen. * II. 703. * VI. 378.
Rhynchopsidium DC. * II. 650.
Rhynchosia DC. I. 785. V. 540.
Rhynchosia DC. (ex p.) I. 784. V. 540.
— acuminata Eckl. et Zeyh. I. 787. no. 15.
— adenodes Eckl. et Zeyh. I. 786. no. 11.
— anatymbica Eckl. et Zeyh. I. 786. no. 10.
— argentea Dsvx. I. 788. no. 24.
— *aurea* DC. I. 790. no. 3.
— *biflora* DC. I. 783. no. 1.
— cajanoides Guill. et Perr. I. 788. no. 26.
— calycina Guill. et Perr. I. 788. no. 25.
— cana DC. * I. 790. no. 41.
— *capitata* DC. I. 790. no. 2.
— *crinita* DC. II. 902. no. 4.
— *crotalarioides* DC. I. 791. no. 2.
— densiflora DC. * I. 786. no. 3.
— *difformis* DC. I. 789. no. 36. γ.
— *diffusa* DC. II. 902. no. 3.
— discolor Mart. et Galeotti. V. 540. no. 3.
— *elongata* DC. I. 790. no. 3.
— *erecta* DC. I. 789. no. 36. δ.
— *ervoidea* DC. I. 786. no. 2. β.
— erythrinoides Schlchtd. et Cham. I. 788. no. 30.
— faginea Guill. et Perr. I. 789. no. 35.
— *falcata* E. Mey. I. 787. no. 15.
— galactioides Endl. I. 790. no. 42. (c. varr. α. et β. ibid.)
— gibba E. Mey. I. 787. no. 17.
— glabra DC. * I. 786. no. 9.
— glandulosa DC. I. 786. no. 5.
— glomerata Guill. et Perr. I. 788. no. 27.
— grandifolia Wlprs. I. 787. no. 19.
— Heynei Wght. et Arn. I. 789. no. 39. (III. Emend. p. 4.)
— hirsuta Eckl. et Zeyh. I. 786. no. 13.
β. rhombifolia I. 787.
— hirsuta Mart. et Galeotti. V. 540. no. 1.
— humilis Eckl. et Zeyh. I. 786. no. 8.
— latifolia Nutt. I. 789. no. 37.
β. glabriuscula Torr. et Gr.
— laxiflora Cambess. I. 788. no. 22.
— lobata Desvx. I. 789. no. 33.
— longeracemosa Mart. et Galeotti. V. 540. no. 2.
— Luschnatiana Wlprs. I. 789. no. 34.
— macrocarpa Bth. I. 788. no. 31.
Rhynchosia medicaginea DC. * I. 785. no. 2. (c. varr. α. β. ibid.)
— Mendozinensis Gill. I. 788. no. 28.
— Mexicana Hook. et Arn. I. 788. no. 32.
— nitida Wlprs. I. 787. no. 16.
— *nuda* Wall. I. 785. no. 2. α.
— *nummularia* DC. I. 790. no. 1.
— paniculata Wlprs. I. 786. no. 7.
— pilosa Wlprs. I. 786. no. 6.
β. Caffra.
— pseudo-cajan Cambess. I. 787. no. 21.
— *psoraleoides* DC. II. 902. no. 6.
— *pulchella* DC. II. 902. no. 5.
— *reniformis* DC. I. 789. no. 36. α.
— *rhombifolia* DC. I. 785. no. 2.
— *rigidula* Eckl. et Zeyh. I. 786. no. 7.
— rotundifolia Wlprs. I. 787. no. 18.
— *rufa* DC. II. 902. no. 1.
— rufescens DC. * I. 789. no. 38.
— *scarabaeoides* DC. I. 783. no. 1.
— secunda Eckl. et Zeyh. I. 786. no. 12.
—? Senna Gill. I. 788. no. 29.
— sericea Spanoghe. I. 788. no. 23.
— *sessiliflora* DC. I. 785. no. 15. II. 902. no. 8.
— *simplicifolia* DC. II. 902. no. 7.
— simplicifolia Wlprs. I. 787. no. 20.
— suaveolens DC. * I. 790. no. 40.
— tenuis Wlprs. I. 787. no. 14.
— tomentosa Torr. et Gr. I. 789. no. 36. (III. Emend. p. 4.)
δ. erecta.
β. intermedia.
ε.? mollissima.
α. monophylla.
γ. volubilis.
— Totta DC. * I. 786. no. 4.
—? *velutina* Grah. I. 783. no. 3.
— velutina Wght. et Arn. I. 785. no. 1. (III. Emend. p. 4.)
— *violacea* DC. II. 902. no. 2.
— *viscida* DC. I. 783. no. 1. V. 539. no. 1.
— *viscosa* DC. I. 780. no. 15.
— *Wightiana* Grah. I. 783. no. 1.
Rhynchosieae Bth. I. 784. II. 902. V. 539.
Rhynchospermum Reinw. * II. 583.
Rhynchotechum Blume. * VI. 523.
Rhynchotheca Rz. et Pav. * I. 460.
Rhyncospermum Alph. DC. * VI. 474.
Rhynea DC. * II. 644.
Rhyssocarpus Endl. II. 943. ° VI. 53.
— pubescens Endl. * II. 943. no. 1. * VI. 53. no. 1.
Rhyssolobium E. Mey. * VI. 493.
Rhyssostelma Dcne. VI. 488.
— nigricans Dcne. * VI. 488. no. 1.

Ribes Linn. II. 357. V. 822.
Ribes DC. (ex p.) II. 361.
— aciculare Sm. II. 361. †
— acuminatum Wall. II. 359. no. 24.
— affine H. B. Kth. *II. 360. no. 38.
— albifolium Rz. et Pav. *II. 360. no. 41.
— *alceaefolium* Knze. V. 822. no. 1.
— alpestre Wall. II. 359. no. 21.
— alpinoides Dombey. II. 360. no. 35.
— *Americanum* Pall. V. 823. no. 4.
— atropurpureum C. A. Mey. II. 358. no. 16.
— aureum Prsh. *II. 361. no. 50. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— bracteosum Dougl. II. 359. no. 28.
— bullatum Otto et Dietr. II. 361. no. 48.
— Californicum Hook. et Arn. II. 358. no. 11.
— *campanulatum* Willd. II. 360. no. 38.
— cereum Dougl. II. 359. no. 29.
— ciliatum C. Koch. II 358. no. 15.
— cucullatum Hook. et Arn. II. 360. no. 34.
— cuneatum Kar. et Kir. II. 358. no. 19.
— cynosbati Linn. *II. 357. no. 3.
— *cynosbati γ.* Hook. II. 357. no. 4. *γ.*
— *dependens* Dombey. II. 360. no. 40.
— Dikuscha Fisch. V. 823. no. 4.
— divaricatum Dougl. II. 357. no. 7.
— *echinatum* Dougl. II. 358. no. 14.
— *ferox* Sm. II. 357. no. 1.
— *flavum* Colla. II. 361. no. 50. *β.*
— floridum Hérit. *II. 359. no. 26.
— *fragrans* Lodd. II. 361. no. 50. *β.*
— frigidum H. B. Kth. *II. 360. no. 42.
— Gayanum Wlprs. II. 360. no. 36.
— *glaciale* Wall. II. 359. no. 21.
— glutinosum Bth. II. 360. no. 31.
— *glutinosum* Bth. V. 822. no. 1.
— *glutinosum* Jacquem. II. 359. no. 22.
— *gracile* Prsh. II. 357. no. 6.
— *gracile* Torr. II. 357. no. 3.
— graveolens Bnge. II. 359. no. 20.
— heterotrichum C. A. Mey. II. 358. no. 17.
— Himalayense Royle. II. 359. no. 23.
— hirtellum Michx. *II. 357. no. 5.
— *hirtum* Humb. et Bonpl. II. 360. no. 42.
— holosericeum Otto et Dietr. II. 361. no. 47.
— Hudsonianum Richards. II. 359. no. 27.
— inebrians Lindl. II. 360. no. 29.
— intermedium Tausch. II. 361. no. 45.
— irriguum Dougl. II. 358. no. 9.
— Kunthii Bert. *II. 360. no. 37.
— lacustre Poir. *II. 358. no. 14.
— leptostachyum Bth. V. 823. no. 3.
— leptostachyum Dcne. II. 359. no. 22.
— *longiflorum* Nutt. II. 361. no. 50.
— macrobotrys Rz. et Pav. *II. 360. no. 40.
Ribes malvaceum Sm. *II. 360. no. 33. *V. 822. no. 1.
— Menziesii Prsh. *II. 357. no. 1.
— Missouriense Nutt. II. 358. no. 10.
— niveum Lindl. II. 358. no. 13.
— occidentale Hook. et Arn. II. 358. no. 12.
— oxyacanthoides L. *II. 357. no. 4.
— *oxyacanthoïdes* Michx. II. 358. no. 14.
— pallidum Otto et Dietr. II. 361. no. 49.
— *palmatum* Dsf. II. 361. no. 50. *α.*
— *petiolare* Dougl. II. 359. no. 27. *β.*
— pulchellum Turczan. II. 358. no. 18. V. 823. †
— *pumilum* Nutt. II. 360. no. 29.
— punctatum Rz. et Pav. *II. 360. no. 43.
— *recurvatum* Michx. II. 359. no. 26.
— rotundifolium Michx. *II. 357. no. 6.
— sanguineum Prsh. *II. 360. no. 32.
— *saxosum* Hook. II. 357. no. 5.
— *scabrum* Dombey. II. 360. no. 39.
— Schmidtianum Tausch. II. 360. no. 44.
— *setosum* Lindl. II. 357. no. 4. *β.*
— *stamineum* Sm. II. 361. no. 1.
— subvestitum Hook. et Arn. II. 357. no. 2.
— tenuiflorum Lindl. II. 361. no. 51.
— tortuosum Bth. V. 822. no. 2.
— *triflorum* Bigel. II. 357. no. 5.
— *triflorum* Willd. II. 357. no. 6.
— *trilobum* Meyen. V. 822. no. 1.
— *tubiflorum* Meyen. II. 360. no. 33.
— *tubulosum* Eschschltz. II. 360. no. 33.
— urceolatum Tausch. II. 361. no. 46.
— villosum Nutt. II. 357. no. 8.
— villosum Wall. II. 359. no. 25.
— viscosum Rz. et Pav. *II. 360. no. 39.
— viscosissimum Prsh. *II. 360. no. 30.
Ribesia DC. II. 358. V. 822. no. 2.
RIBESIACEAE Endl. II. 357. V. 822.
Richardsonia Kth. *II. 467. VI. 31.
— sericea Wlprs. VI. 31. no. 1.
Richea R. Br. *II. 733. VI. 433.
— pandanifolia Hook. fil. VI. 433. no. 1.
Richteria Kar. et Kir. II. 626. °VI. 176.
— pyrethroides Kar. et Kir. *II. 626. no. 1. VI. 176. no. 1.
Ricotia Linn. I. 139.
— Lunaria DC. I. 139. no. 1. †
Riddellia Nutt. II. 623. VI. 172.
— Tagetinae Nutt. *II. 623. no. 1. VI. 172. no. 1.
Ridelia lippioides Chamisso. IV. 50. no. 35.
Ridleia Vent. I. 343. II. 797. V. 112.
—? *arenosa* Bth. I. 342. no. 16.
— *concatenata* DC. I. 343. no. 1.
— elongata Prsl. I. 343. no. 5.
— interrupta Schlchtd. II. 797. no. 1.

Ridleia Jamaicensis Bert. I. 343. no. 9.
— littoralis Poepp. et Endl. V. 112. no. 1.
— melissaefolia Prsl. I. 343. no. 7.
— multiflora Prsl. I. 343. no. 3.
— radiata Blume. I. 343. no. 1.
— serrata Vent. *I. 343. no. 4.
β. glabrescens Prsl.
— setulosa Miquel. II. 797. no. 2.
— thymifolia Prsl. I. 343. no. 8.
— tomentella Prsl. I. 343. no. 6.
— *venosa* DC. I. 343. no. 9.
— villosissima Prsl. I. 343. no. 2.
— virgultosa Mcfd. I. 343. no. 9.
Ridolfia Moris. II. 396.
— segetum Moris. *II. 396. no. 1.
Riencourtia Cass. *II. 603.
Riesenbachia Prsl. II. 96. V. 669.
— racemosa Prsl. *II. 96. no. 1. V. 669. no. 1.
Rigidi DC. (Senecio) VI. 264.
Rindera Pallas. VI. 564.
— Graeca Boiss. et Heldreich. VI. 564. no. 1.
Rinorea Guyanensis Aubl. I. 224. no. 3.
Rinzia Schauer. II. 922. °V. 735.
— fumana Schauer. *II. 922. no. 1. V. 735. no. 1.
Riocreuxia Dcne. VI. 494.
— torulosa Dcne. VI. 494. no. 1.
Rissoa Arn. I. 381.
— Zeylanica Arn. *I. 381. no. 1.
Ritchiea R. Br. I. 201.
— fragrans R. Br. *I. 201. no. 1.
Ritro Endl. II. 667. VI. 280.
Rivea Choisy. *VI. 528.
Rizoa ovatifolia Cav. III. 735. no. 3.
Robbia Alph. DC. VI. 475.
— cestroides Alph. DC. *VI. 475. no. 1.
Robertia DC. *II. 688.
— *pinnatifida* Spr. VI. 330. no. 6.
— *taraxacoides* DC. VI. 336. no. 20.
Robinia L. I. 679.
— acuminata Schlchtd. I. 679. no. 9.
— *Altagana* Pall. II. 858. no. 1. et 2. *a.*
— argentiflora Schum. et Thonn. I. 679. no. 4.
— *Caragana* Linn. II. 858. no. 2. *a.*
— cyanescens Schum. et Thonn. I. 679. no. 3.
— Ehrenbergii Schlchtd. I. 679. no. 6.
— *filiformis* Rxb. I. 761. no. 1.
— *fruticosa* Georgi. II. 858. no. 3.
— *Galega* Rxb. I. 677. no. 47.
— *Heynei* Wall. I. 807. no. 2.
— *Javanica* Burm. I. 818. no. 60.
— *maculata* Kth. I. 679. no. 2.
— melanocarpa Schlchtd. I. 679. no. 7.
Robinia microphylla Pall. II. 858. no. 1.
— *mollis* M. B. II. 858. no. 3. *β.*
— multiflora Schum. et Thonn. I. 679. no. 2.
— *racemosa* Rxb. I. 677. no. 47.
— Schiedeana Schlchtd. I. 679. no. 8.
— *sepium* Jcq. I. 679. no. 1.
— *sericea* Sieb. V. 516. no. 1.
— squamata Vahl. V. 521. no. 1. adn.
— *subdecandra* L'Hérit. I. 807. no. 2.
— Thonningii Schumacher. I. 679. no. 1.
— *tomentosa* Fisch. II. 858. no. 3. *β.*
— *tragacanthoides* Pall. II. 858. no. 4. *a.*
— *triflora* L'Hérit. II. 859. no. 2.
— *uliginosa* Willd. I. 798. no. 2.
— variegata Schlchtd. I. 679. no. 5.
Robinsonia DC. *II. 665.
— *Guianensis* Räusch. II. 434. no. 1.
— *melanthifolia* Willd. II. 434. no. 1.
Robsonia Berl. II. 361.
— *fuchsioides* Berl. II. 361. no. 1.
— speciosa Wlprs. *II. 361. no. 1.
Robynsia Mart. et Gal. °V. 534.
— lobata Mart. et Gal. V. 534. no. 2.
— macrophylla Mart. et Gal. V. 534. no. 1.
Rochea DC. *II. 256.
— *albiflora* DC. II. 256. no. 1.
— *flava* DC. II. 256. no. 2.
Rocheae Endl. II. 256. V. 792.
Rochefortia Swrtz. *VI. 566.
Rochelia Rchb. VI. 564.
— peduncularis Boiss. VI. 564. no. 1.
Rochelieae Alph. DC. VI. 564.
Rochonia DC. *II. 952. no. 32.
Rodigia Spr. *II. 697. *VI. 344.
— *laevigata* Spr. VI. 342. no. 1.
Rodigieae DC. VI. 344.
Rodschiedia Miquel. °V. 571.
— Surinamensis Miquel. V. 571. no. 1.
Roëa Hügel. I. 571. V. 429.
— linophylla Hügel. *I. 571. no. 1. V. 429. no. 2.
— nudiflora Meisn. V. 429. no. 1.
Roemeria Eckl. et Zeyh. I. 557.
Roemeria Medik. I. 115.
Roemeria Thnbrg. V. 414.
— *argentea* Thnbrg. I. 557. no. 1. II. 830. no. 5. V. 414. no. 1.
— orientalis Boiss. I. 115. no. 1.
— pinnatifida Belang. *I. 115. no. 2.
Roëlla Linn. *II. 710. VI. 382.
— elegans Scheidw. *VI. 382.
Roepera Adr. Juss. I. 494. II. 823.
— aurantiaca Lindl. II. 823. no. 1.
— Billardieri Adr. Juss. *I. 494. no. 2.
— fruticulosa Adr. Juss. *I. 494. no. 1.
Rogeria Gay. *VI. 519.

Rohbergia hirsuta Rxb. V. 417. no. 1.
Roioc DC.? II. 486. no. 5. 6. 7.
Rolandra Rottl. *II. 543.
Rolandreae Cass. II. 543. VI. 102.
Rollandia Gaudich. *II. 708. VI. 373.
— Delessertiana Gaudich. *VI. 373. no. 1.
— Humboldtiana Gaudich. *VI. 373. no. 2.
Rollinia St. Hil. I. 90. II. 748.
— cuspidata Mart. I. 91. no. 8.
— *dolabripetala* DC. I. 90. no. 1.
— emarginata Schlchtd. I. 91. no. 11.
— exalbida Mart. I. 90. no. 5.
— exsucca DC. fil. *I. 91. no. 13.
— fagifolia St. Hil. I. 90. no. 6.
— *fagifolia?* Schlchtd. I. 90. no. 7. *a.*
— laurifolia Schlchtd. I. 90. no. 2.
— longifolia St. Hil. *I. 90. no. 1.
— multiflora Splitg. II. 748. no. I.
— orthopetala DC. fil. I. 90. no. 4.
— parviflora St. Hil. I. 80. no. 7.
β. angustifolia Mart.
a. latifolia Mart.
— Poeppigii Mart. I. 91. no. 12.
— puberula DC. fil. I. 91. no. 14.
— pulchrinervia DC. fil. I. 91. no. 16.
— rugulosa Schlchtd. I. 91. no. 9.
— salicifolia Schlchtd. I. 91. no. 10.
— Sieberi DC. I. 91. no. 15.
— sylvatica Mart. I. 90. no. 3.
Romana campestris Arrabida III. 330. no. 66.
Romanzoffia Cham. *VI. 655. *VI. 566.
Romneya Harvey. *V. 21.
— Coulteri Harvey. V. 21. no. 1.
Ronabea Aubl. *II. 475.
Rondeletia Blume. II. 505. II. 943. VI. 59.
— *Asiatica* Linn. II. 517. no. 4.
— brevipes Bth. VI. 59. no. 1.
— buddleioides Bth. II. 505. no. 1.
— capitata Bth. II. 505. no. 4.
— cordata Bth. II. 505. no. 3.
— *cornifolia* Bth. II. 506. no. 2.
— *corymbosa* Jack. II. 504. no. 1.
— *cymosa* Poir. II. 484. no. 1.
— eriantha Bth. VI. 59. no. 2.
— febrifuga Afzel. II. 506. no. 6.
— floribunda G. Don. II. 506. no. 7.
— laniflora Bth. II. 505. no. 2.
— longiflora Cham. II. 506. no. 5. et † II. 943. no. 1.
— *longiflora* Chamisso. VI. 61. no. 2.
— *longifolia* Wall. II. 505. no. 1.
— loniceroides G. Don. II. 506. no. 8.
— *lutea* Mackoy. VI. 692. no. 1.
— odorata DC. II. 506. †
— reflexa Bth. VI. 59. no. 3.
— scandens Rxb. II. 505. no. 11.
Rondeletia speciosa Paxton. VI. 59. †
— *spicata* Wall. II. 504. no. 1.
— *stricta* Rth. II. 518. no. 1.
Rondeletieae DC. II. 502. VI. 57.
Rorella DC. V. 61.
Roridula L. *I. 230.
Roripa amphibia Besser. I. 154. no. 11.
Rosa Tournef II. 11. II. 912. V. 649.
— alpina L. II. 12. †
— Banksiae R. Br. II. 13. †
— Beggeriana Schrenk. II. 11. no. 7.
— *berberifolia* Pall. II. 13. no. 1.
— Brunonis Lindl. *II. 912. no. 1.
— Californica Cham. et Schlchtd. II. 12. no. 14.
— campestris Dumort. II. 11. no. 1.
— Camschatica Vent. II. 13. †
— *Camtschatica β. ferox* Ser. II. 12. no. 11.
— cinerascens Dumort. II. 11. no. 2.
— Devoniensis Hort. V. 649. †
— Dicksoni Lindl. II. 12. no. 17.
— *echinata* Dupont. II. 12. no. 11.
— *ferox* Lour. II. 12. no. 11.
— flavescens Hsskrl. V. 649. no. 3.
— foliolosa Nutt. II. 12. no. 15.
— Gebleriana Schrenk. V. 649. no. 2.
— glaberrima Dumort. II. 11. no. 3.
— Gmelini Bnge. II. 11. no. 6.
— gymnocarpa Nutt. II. 12. no. 16.
— Hardii Hort. V. 649. †
— involucrata Braam. II. 12. no. 13.
— involucrata Rxb. *II. 912. no. 2.
— Lechenaultiana Redouté et Thor. *II. 912. no. 3.
— Linkii Dehnhrdt. II. 12. no. 10.
— macrophylla Lindl. *β.* minor Wall. II. 13. †
— microcarpa Braam. II. 12. no. 12.
— multiflora *a.* platyphyllos Lindl. II. 13. †
— *Persica* Juss. II. 13. no. 1.
— pimpinellifolia L. *II. 11. no. 5.
β. grandiflora Ldb.
γ. subalpina Ldb.
— rugosa Thnbrg *II. 12. no. 11.
— Serrae Dehnhrdt. II. 11. no. 9.
β. hispida.
a. subuniflora.
— Silverhielmii Schrenk. V. 649. no. 1.
— *simplicifolia* Salisb. II. 13. no. 1.
— Sinica Ait. II. 13. †
— Soongarica Bnge. II. 11. no. 4.
— Webbiana Wall. II. 11. no. 8.
— Zeyheriana Dehnhrdt. II. 12. no. 18.
ROSACEAE DC. (ex p.) II. 3. II. 11. V. 649. V. 646.
ROSACEAE Juss. (ex p.) II. 8. II. 53. V. 648. V. 660.

ROSACEAE Juss. II. 11. II. 912. V. 649.
Rosalesia Llaw. et Lexarz. *II. 701. no. 5.
Roscoëa pentandra Rxb. IV. 117. no. 5, 118. no. 6.
— *tomentosa* Rxb. IV. 117. no. 2.
— *villosa* Rxb. IV. 116. no. 1.
Roscyna Americana Spach. I. 386. no. 28.
Roseae DC. II. 11. V. 649.
Rosenia Thnbrg. *II. 650.
Rosilla Lssng. *II. 629.
Rosmarineae Endl. III. 680. III. 980.
Rosmarinus Linn. III. 680. °III. 980.
— *Chilensis* Molina. III. 845. no. 6.
— *latifolius* Mill. III. 681. no. 1.
— officinalis Linn. III. 680. no. 669.
Rospidios Alph. DC. *VI. 457.
Rostellaria Grtnr. *VI. 456.
Rosularia DC. II. 258. V. 792. no. 1.
Rotala Linn. II. 101.
— fimbriata Wght. II. 101. no. 2.
— Mexicana Schlchtd. et Cham. II. 101. no. 1.
— Roxburghiana Wght. II. 101. no. 4.
— verticillaris L. *II. 101. no. 3.
Rotheria lanceolata Mey. II. 469. no. 2.
Rothia Pers. I. 606.
Rothia Schreb. *II. 698.
Rothia Schreb. II. 698.
— *Carolinensis* Lam. VI. 176. no. 1.
— trifoliata Pers. *I. 606. no. 1.
Rotula Lour. *VI. 556.
Rouhamon Aublet. *VI. 497.
Roulinia Dcne. VI. 483.
— corymbosa Dcne. *VI. 483. no. 1.
Roumea Poit. *I. 205.
Rourea santaloides Wght. et Arn. I. 561. no. 2.
Roussea Sm. II. 380.
— *salicifolia* Spr. VI. 454. no. 1.
— simplex Sm. *II. 380. no. 1.
ROUSSEACEAE DC. II. 714.
Rousseaceae Endl. II. 380.
Rousseauxia DC. *II. 137.
— articulata DC. II. 137. no. 1.
Roxburghia baccata Koen. I. 377. no. 2.
Roydsia Rxb. I. 202.
— suaveolens Rxb. *I. 202. no. 1.
Royena Linn. VI. 457.
— lucida Linn. *VI. 457. no. 2.
— sericea Brnhrdi. *VI. 457. no. 1.
Roylea Wall. III. 867. °III. 989.
— elegans Wall. III. 867. no. 1.
Rubeola Mnch. VI. 23. VI. 699. no. 1.
Rubia DC. (ex p.) II. 454. II. 459.
Rubia Tournef. II. 460. VI. 18.
— *acuminata* Mart. et Galeotti. VI. 17. no. 48.
Rubia albicaulis Boiss. VI. 18. no. 4.
— augustissima Wall. II. 460. no. 2.
— Aucheri Boiss. VI. 18. no. 6.
— *Brownei* Michx. II. 459. no. 48.
— charaefolia Wall. II. 460. no. 3.
— Dalmatica Scheele. VI. 18. no. 2.
— dolichophylla Schrenk. VI. 18. no. 3.
— Doniettii Griseb. VI. 18. no. 1.
— florida Boiss. VI. 699. no. 3.
— *glabra* Gardn. VI. 17. no. 46.
— *Haenkeana* Gill. II. 459. no. 51.
— *intricata* Hook. et Arn. II. 459. no. 49.
— Kotschyi Boiss. VI. 699. no. 2.
— *Mungista* Rxb. II. 482. no. 20.
— *mucronata* Hook. et Arn. II. 459. no. 53.
— pauciflora Boiss. VI. 18. no. 5.
— purpurea Dcne. II. 460. no. 1.
— *pusilla* Gill. II. 459. no. 52.
— *Richardiana* Gill. II. 459. no. 50.
— *rupestris* Gardn. VI. 17. no. 45.
— scandens Zolling. et Moritzi. VI. 699. no. 1.
— *Sellowiana* Cham. II. 460. no. 54.
— *tuberculosa* Bth. VI. 17. no. 47.
— *Walteri* DC. II. 459. no. 48.
RUBIACEAE Juss. II. 454. II. 941. VI. 8.
Rubricaules Bth. (Mimosa) I. 877.
Rubus Linn. II. 13. II. 912. V. 649.
— *acaulis* Michx. II. 23. no. 56. β.
— Acheruntinus Ten. II. 19. no. 20.
— acuminatissimus Hsskrl. V. 649. no. 1.
— adenotrichus Schlchtd. II. 24. no. 69.
— *aegopodioides* Ser. II. 23. no. 58.
— affinis W. et N. ab E. II. 15. no. 6.
— *agrestris* Waldst. et Kit. II. 17. no. 12. β.
— *albescens* Rxb. II. 19. no. 28.
— *alceaefolius* Poir. II. 21. no. 40.
— alpestris Blume. II. 19. no. 29.
— *althaeaefolius* Trattin. II. 17. no. 12. β.
— arcticus L. II. 18. no. 16. *II. 23. no. 56.
— *arcticus* var. β. *castoreus* Svensk Bot. II. 18. no. 15.
— *Bellardi* Weihe et Nees ab E. II. 16. no. 10.
— *Bergii* Cham. et Schlchtd. II. 21. no. 46.
— *bifrons* Bot. II. 17. no. 12. β.
— caesius Linn. II. 17. no. 13.
β. agrestis } Arrh.
δ. paniculatus } Arrh.
γ. vestitus } Arrh.
— *caesius* var. β. Hook. II. 17. no. 12.
— *caesius* var. β. *agrestis* Weihe et N. ab E. II. 17. no. 13. β.
— *caesius* α. *aquaticus* Weihe et N. ab E. II. 17. no. 13. α.
— *caesius* var. β. *arvalis* Rchb. II. 17. no. 13. β.

Rubus caesius var. *β. paniculatus* Whlnbrg. II. 17. no. 13. *δ*.
— *caesius a. umbrosus* Rchb. II. 17. no. 13. *a*.
— *caesius* var. *vestitus* Wimm. et Grab. II. 17. no. 13. *γ*.
— *caesius* var. *candicans* Lilja. II. 16. no. 8. *β*.
— *Canadensis* Torr. II. 23. no. 58.
— *candicans* Fries. II. 16. no. 8. *β*.
— *candicans* Whe. II. 15. no. 7.
— *candicans β. discolor* Hartm. II. 16. no. 8. *β*.
— *candicans a. Smithii* Hartm. II. 15. no. 7.
— castoreus Fr. II. 18. no. 15.
β. hybridus.
— *caule aculeato, foliis ternatis etc.* Linn. II. 17. no. 13.
— *caule aculeato reflexo perenni etc.* Linn. II. 17. no. 13.
— *caule bifolio et unifloro, foliis simplicibus* Linn. II. 18. no. 17.
— *caule repente annuo, foliis ternatis* Linn. II. 18. no. 14.
— *caule unifloro, foliis ternatis* Linn. II. 18. no. 16.
— Celebicus Blume. II. 19. no. 25.
— *chamaemorus* Fl. Suec. II. 18. no. 17.
— chamaemorus Linn. II. 18. no. 17.
— chrysocarpus Mundt. II. 22. no. 47.
— cissoides A. Cunn. II. 25. no. 77.
— compactus Bth. V. 650. no. 5.
— *corylifolius* Hartm. II. 16. no. 11. (nec *cordylifolius*.)
— *corylifolio-idaeus* Meyer. II. 14. no. 4.
— *corylifolius* Rchb. II. 16. no. 12.
— corylifolius Sm. II. 14. no. 3.
β. eriocarpus Arrh.
a. fructibus glabris Arrh.
— *corylifolius* Whlnbrg. II. 14. no. 3. *β*.
— *corylifolius* var. *β. intermedius* Whlnbrg. II. 16. no. 11.
— *corylifolius* var. *sublittoralis* Fries. II. 14. no. 3.
— *corylifolius a. sylvaticus* Fries. II. 14. no. 4.
— crataegifolius Bnge. II. 21. no. 39.
— deliciosus Torr. II. 22. no. 51.
— *discolor* W. et N. ab E. II. 15. no. 8. *β*.
— dissectus Ten. II. 19. no. 21.
— dumetorum Schlchtd. II. 24. no. 68.
— *dumetorum* W. et N. ab E. II. 16. no. 12.
— *dumetorum* var. *ferox* W. et N. ab E. II. 17. no. 12. *γ*.
— *dumetorum* var. *β. glabratus* Bluff et Fingerh. II. 17. no. 12. *a*.
— *dumetorum* var. *tomentosus* W. et N. ab E. II. 17. no. 12. *β*.
Rubus Enslenii Tratt. II. 23. no. 62.
— *erectus major fructu nigro* Brom. II. 14. no. 5.
— fagifolius Schlchtd. et Cham. II. 24. no. 67.
— fastigiatus Weihe et Nees. II. 21. no. 46.
— *ferox* Boenningh. II. 17. no. 12. *γ*.
— ferrugineus Wickstr. II. 24. no. 66.
— *flagellaris* E. Mey. II. 23. no. 58.
— *floridus* Tratt. II. 23. no. 62.
— *foliis quinato-digitatis ternatisque etc.* Linn. II. 14. no. 5.
— *foliis simplicibus, caule unifloro* Linn. II. 18. no. 17.
— *foliis ternatis, caule inermi unifloro* Linn. II. 18. no. 16.
— *foliis ternatis, flagellis repentibus herbaceis* Linn. II. 18. no. 14.
— *frondosus* Bigel. II. 23. no. 62.
— fruticosus L. II. 14. no. 5.
— *fruticosus* Linn. II. 15. no. 5.
— *fruticosus* Sm. II. 16. no. 8. *β*.
— *fruticosus* Walt. II. 23. no. 62.
— *fruticosus* W. et N. ab E. II. 15. no. 7.
— *fruticosus vel affinis* Bluff et Fingerh. II. 15. no. 6.
— *fruticosus* var. *canus* Whlnbrg. II. 15. no. 7.
— *fruticosus β. elegans* Myrin. II. 14. no. 4.
— *fruticosus ε. glandulosus* Wllrth. II. 16. no. 8. *γ*.
— *fruticosus* var. *intermedius* Whlnbrg. II. 16. no. 11.
— *fruticosus vel plicatus* Hartm. II. 15. no. 5.
— *fruticosus β. suberectus* Hartm. II. 14. no. 4.
— *geoides* Pers. II. 13. no. 4.
— glabriusculus Hsskrl. V. 651. no. 10.
— glandulosus Bell. II. 16. no. 10.
— glaucus Bth. V. 651. no. 8.
— glomeratus Blume. II. 20. no. 37.
— Gowreephul Rxb. II. 20. no. 33.
— *grandiflorus* Lowe. V. 650. no. 3.
— *Hamiltonianus* Ser. II. 21. no. 40.
— hexagynus Rxb. *II. 21. no. 41.
— *hirtus* Aspegren. II. 17. no. 13. *γ*.
— *hirtus* Rxb. II. 20. no. 32.
— Hochstetterorum Seubert. V. 650. no. 3.
— horridus Hartm. II. 16. no. 9.
β. canus.
a. viridis.
— *horridus* Schultz. II. 17. no. 12. *γ*.
— humifusus Schlchtd. II. 24. no. 72.
— *hybridus* Wllrth. II. 16. no. 10.
— idaeus Linn. II. 13. no. 1.
— *idaeus* Linn. II. 13. no. 1. *a*.

Rubus idaeus β. Americanus Torr. II. 23. no. 59.
— *idaeus anomalus* Arrh. II. 14. no. 1. γ.
— *idaeus maritimus* Arrh. II. 14. no. 1. β.
— *idaeus vulgatus* Arrh. II. 13. no. 1. α.
— imperialis Cham. et Schlchtd. II. 24. no. 73.
— *Indicus* Lechen. II. 21. no. 41.
— *inermis* Willd. II. 23. no. 62. β.
— *infestus* Hartm. II. 16. no. 9.
— Javanicus Blume. II. 19. no. 26.
— lasiocarpus Sm. *II. 19. no. 28.
— leucocarpus Arn. II. 19. no. 27.
— leucodermis Dougl. II. 23. no. 60.
— lineatus Reinw. II. 20. no. 30.
— Lobbianus Hook. V. 651. no. 9.
— Loxensis Bth. V. 650. no. 4.
— Ludwigii Eckl. et Zeyh. II. 21. no. 44.
— macilentus Jcq. II. 21. no. 43.
— macrocarpus Bth. V. 650. no. 6.
— *maritimus* Linn. II. 15. no. 5.
— *maximus* L. II. 14. no. 3.
— *Menziesii* Hook. et Arn. II. 23. no. 63.
— macropetalus Dougl. II. 23. no. 64.
— *Moluccanus* Rxb. II. 21. no. 40.
— *Moluccus parvifolius* Rmph. V. 650. no. 1.
— *mucronatus* Ser. II. 23. no. 58.
— Mundtii Cham. et Schlchtd. II. 22. no. 48.
— myriacanthus Dougl. II. 24. no. 64.
— *Mysorensis* Heyne. II. 19. no. 28.
— nemorosus Hayne. II. 16. no. 12.
γ. ferox, α. glabratus, β. tomentosus } Arrhen. II. 17. no. 12.
— *nemorosus* var. *ferox* Wimm. et Grab. II. 17. no. 12. γ.
— *nemorosus* var. *tomentosus* Wimm. et Grab. II. 17. no. 12. β.
— *Nessensis* W. Hall. II. 14. no. 4.
— *nitidus* Smith. II. 15. no. 5.
— nivalis Dougl. II. 23. no. 55.
— Nutkanus Moç. *II. 22. no. 50.
β. Nuttallii Torr. et Gr.
— *occidentalis β.* Hook. II. 23. no. 60.
— occidentalis Linn. *II. 23. no. 59..
— *occidentalis* Schlchtd.? V. 651. no. 8.
— Organensis Gardn. II. 912. no. 2.
— *paniculatus* Moon. II. 20. no. 33.
— Pappei Eckl. et Zeyh. II. 21. no. 45.
— *parviflorus* Nutt. II. 22. no. 50.
— *parvifolius* Moon. II. 19. no. 28.
— pedatus Sm. *II. 23. no. 57.
— petraeus Tausch. II. 19. no. 23.
— *pistillatus* Sm. II. 23. no. 56. β.
— platyphyllus C. Koch. II. 912. no. 1.
Rubus plicatus Whe. II. 15. no. 5.
— *propinquus* Richards. II. 23. no. 56. γ.
— pruinosus Arrh. II. 14. no. 2.
— *pubescens* Vest. II. 17. no. 12. β.
— pubinervis Blume. II. 20. no. 36.
— pulcherrimus Hook. V. 650. no. 2.
— pungens Cambess. II. 21. no. 42.
— purpureus Bnge. II. 20. no. 34.
— *pyrifolius* Sm. II. 13. no. 1.
— *racemosus* Rxb. II. 19. no. 28.
— *Radula* W. et N. ab E. II. 16. no. 8. γ.
— *reflexus* Ker. II. 21. no. 40.
— *repens, fructu caesio* Bauh. II. 17. no. 13.
— roridus Lindl. II. 22. no. 49.
— rosaeflorus Hook. II. 24. no. 65.
— rosaefolius DC. II. 25. †
— *rotundifolius* Wall. II. 20. no. 33.
— rugosus Smith. *II. 21. no. 40.
— sanguineus Friv. II. 19. no. 22.
— sapidus Schlchtd. II. 24. no. 71.
— saxatilis Linn. II. 18. no. 14.
— *saxatilis β. Americanus* DC. II. 23. no. 58.
— *saxatilis β. Canadensis* Michx. II. 23. no. 58.
— *saxatilis* var. *β. castoreus* Laest. II. 18. no. 15.
— *saxatilis* var. *β. hybridus* Hartm. II. 18. no. 15.
— schmidelioides A. Cunn. II. 25. no. 76.
— Sellowii Cham. et Schlchtd. II. 74. no. 74.
— Siculus Prsl. II. 18. no. 19.
— Sieboldii Blume. II. 20. no. 35.
— spectabilis Prsh. *II. 23. no. 61.
— stellatus Sm. II. 23. no. 54.
— *stenopetalus* Fisch. II. 23. no. 61.
— stipularis Bth. V. 650. no. 7.
— suberectus Anders. II. 14. no. 4. (II. 18. no. 18.)
β. mitis Arrh. II. 14. no. 4.
— Sundaicus Blume. II. 20. no. 38.
— Tagallus Cham. et Schlchtd. II. 19. no. 24.
— Thunbergii Blume. II. 20. no. 31.
— thyrsoideus Wimm. II. 15. no. 7.
— trichomallus Schlchtd. II. 24. no. 70.
— triflorus Richards. *II. 23. no. 58.
— *umbrosus* Whe. II. 15. no. 8.
— ursinus Cham. et Schlchtd. II. 23. no. 63.
— velutinus Hook. et Arn. II. 22. no. 52.
— *villicaulis* Wimm. II. 15. no. 8.
— *villicaulis δ. glandulosus* Wimm. et Grab. II. 16. no. 8. γ.
— villosus Ait. *II. 23. no. 62.
β. frondosus, γ. humifusus } Torr. et Gr.
— vitifolius Cham. et Schlchtd. II. 22. no. 53.

Rubus vulgaris Whe. II. 15. no. 8.
β. discolor.
γ. Radula.
— *vulgaris β. umbrosus* Whe. et N. ab E. II. 15. no. 8.
— *vulgaris* Wimmer. II. 15. no. 8.
— Wahlbergii Arrh. II. 16. no. 11.
— Wallichianus Wght. et Arn. II. 20. no. 32.
Ruckeria DC. *II. 665.
Rudbeckia Linn. II. 611. II. 977. VI. 159.
— alismaefolia Torr. et Gr. II. 978. no. 9.
— *apetala* Yates et Torrey. II. 611. no. 1. II. 983. no. 8.
— *aristata* Prsh. VI. 159. no. 1.
— *aspera* Pers. II. 977. no. 3.
— *atrorubens* Nutt. II. 977. no. 2.
— bicolor Nutt. II. 977. no. 1.
— *biennis* Chapman. II. 978. no. 5. β. VI. 159. no. 1.
— *chrysomela* Michx. II. 977. no. 3.
— *columnaris* D. Don. VI. 160. no. 2.
— *columnaris* Torr. VI. 160. no. 2. β.
— *columnifera* Nutt. VI. 160. no. 2.
— *digitata* Mill. II. 978. no. 11. γ.
— *digitata* Willd. VI. 159. no. 1.
— *discolor* Ell. II. 978. no. 3. β.
— fulgida Ait. *II. 977. no. 3.
— *fulgida* Nutt. II. 978. no. 4.
— *glabra* DC. II. 979. no. 14.
— *globosa* Nutt. II. 612. no. 1. VI. 160. no. 2. β.
— *gracilis* Nutt. II. 978. no. 3. β.
— grandiflora DC. *II. 978. no. 10.
— heliopsidis Torr. et Gr. II. 978. no. 8.
β. glabriuscula.
— heterophylla Torr. et Gr. II. 978. no. 12.
— hirta Linn. *II. 977. no. 2.
— *hispida* Hffm. VI. 159. no. 1. γ.
— laciniata Linn. *II. 978. no. 11.
— *laevigata* Prsh. II. 978. no. 11. β.
— maxima Nutt. II. 612. no. 2. *II. 979. no. 13.
— mollis Ell. *II. 978. no. 6.
— nitida Nutt. *II. 979. no. 14.
— *nudicaulis* Nutt. II. 978. no. 10.
— occidentalis Nutt. II. 612. no. 3. *II. 979. no. 15.
— *odorata* Nutt. II. 978. no. 6.
— *pallida* Nutt. II. 977. no. 1.
— *pinnata* Vent. VI. 159. no. 1.
— *purpurea* Linn. VI. 159. no. 1.
— *purpurea β. serotina* Nutt. VI. 159. no. 1. γ.
— *radula* Prsh. II. 983. no. 8.
— *serotina* Nutt. II. 977. no. 2.
— *serotina* Sweet. VI. 159. no. 1. γ.
— *spathulata* Michx. II. 978. no. 3. γ.
Rudbeckia spathulata Nutt. II. 978. no. 3. β. VI. 159. no. 1.
— *spathulata* Prsh. II. 977. no. 3.
— *speciosa* Lnk. VI. 159. no. 1. γ.
— speciosa Wndrth. *II. 978. no. 4.
— strigosa Nutt. II. 611. no. 1.
— *strigosa* Nutt. II. 977. no. 2. β.
— subtomentosa Prsh. *II. 978. no. 6.
— *subtomentosa* Prsh. VI. 159. no. 1.
— *Tagetes* James. VI. 160. no. 2. β.
— *tomentosa* Ell. II. 978. no. 6. VI. 159. no. 1.
— triloba Linn. *II. 978. no. 5. *VI. 159. no. 1.
β. pinnatiloba Torr. et Gr. l.l. c.c.
— *triloba* Prsh. VI. 159. no. 1.
Rudbeckieae Lssng. II. 611. II. 977. VI. 159.
Ruderales Bth. (Stachys) III. 826.
Rudgea Salisb. *II. 475.
Rudolphia Willd. I. 769.
— *dubia* H. B. Kth. I. 756. no. 30.
—? elliptica Dsvx. I. 769. no. 1.
Ruellia antipoda Linn. III. 288. no. 1.
Ruizia Cav. *I. 348. II. 797.
— diversifolia Voigt. II. 797. no. 1.
Rulingia R. Br. I. 337.
— corylifolia Grah. I. 337. no. 4.
— grandiflora Endl. I. 337. no. 2.
— pannosa R. Br. *I. 337. no. 1.
— parviflora Endl. I. 337. no. 3.
Rumfordia DC. *II. 610.
Rumia Hffm. II. 391. V. 848.
— *athamanthoides* DC. V. 871. no. 3.
— depressa Boiss. V. 848. no. 1.
— leiogona C. A. Meyer. II. 391. no. 1.
— *microcarpa* Hffm. II. 424. no. 3. V. 915. no. 1.
— multiflora Ldb. V. 848. no. 2.
— *seseloides* Hffm. II. 392. no. 1.
Rumphia L. *I. 557.
Rupifraga Otth. I. 275. no. 34. 35. II. 780.
Russellia Jcq. III. 251. °III. 961. VI. 640.
— *depressa* Thnbrg. III. 234. no. 2.
— elata Cham. et Schlchtd. III. 252. no. 6.
— ephedroides Bth. III. 253. no. 11.
— equisetiformis Cham. et Schlchtd. III. 253. no. 10.
— floribunda H. B. Kth. III. 252. no. 5.
— juncea Zuccar. III. 252. no. 7. III. 938.
— multiflora Sims. III. 251. no. 2.
— paniculata Martens et Galeotti. VI. 640. no. 1.
— polyedra Zucc. *III. 253.
— rotundifolia Cavan. III. 252. no. 3.
— sarmentosa Jcq. III. 251. no. 1.

Russellia syringaefolia Cham. et Schlchtd. III. 252. no. 4.
— teruifolia H. B. Kth. III. 252. no. 8.
— verticillata H. B. Kth. III. 253. no. 9.
Rustia Kltzsch. ° VI. 68.
— formosa Kltzsch. * VI. 68. no. 3.
— Pohliana Kltzsch. VI. 68. no. 1.
— Sellowiana Kltzsch. * VI. 68. no. 2.
Rustica G. Don. (Nicotiana) III. 8. VI. 572. no. 1.
Ruta DC. (ex p.) I. 518.
Ruta Tournef. I. 517.
— *acutifolia* DC. I. 518. no. 11.
— *albiflora* Hook. I. 517. no. 1.
— angustifolia Pers. I. 518. †
— bracteosa DC. I. 518. †
— *Buxbaumii* DC. I. 518. no. 10.
— *Buxbaumii* Friv. II. 825. no. 4.
— *canina* Dalech. III. 175. no. 61.
— cordata D. Don. I. 517. no. 2.
— *cordata* D. Don. I. 518. no. 4.
— Corsica DC. I. 518. †
— *Dahurica* DC. I. 518. no. 14.
— *Dampatis* Ham. I. 517. no. 1.
— *dichotoma* DC. I. 518. no. 2.
— divaricata Ten. I. 518. †
— Fernandesia Colla. I. 518. no. 6.
— *frutescens* Siev. II. 821. no. 1.
— *fruticulosa* Rxb. I. 518. no. 5.
— *glabra* DC. I. 518. no. 7.
— graveolens L. I. 518. †
— *linearis* DC. I. 518. no. 12.
— *linifolia* L. I. 518. no. 9.
— Monbretii Viv. I. 518. no. 3.
— montana Clus. I. 518. †
— obtusifolia Ldb. I. 517. no. 1.
— oreojasme B. Webb et Berth. I. 518. no. 5.
— *Patavina* L. I. 518. no. 1.
— pinnata L. * I. 518. no. 4.
— *pubescens* Willd. I. 518. no. 3.
— *rosmarinifolia* Pers. I. 518. no. 15.
Ruta suaveolens DC. I. 518. no. 3.
— thesioides Fisch. I. 518. no. 13.
— *tuberculata* Forsk. I. 518. no. 6.
— *tuberculata β. Montbretii* DC. I. 518. no. 3.
— *villosa* M. Bieb. I. 518. no. 8.
RUTACEAE Bartl. I. 517. II. 824. V. 394.
RUTACEAE DC. (ex p.) I. 499. I. 519.
RUTACEAE Juss. (ex p.) I. 517.
Ruyschia Jcq. I. 398. II. 811. V. 145.
— Amazonica Mart. I. 398. no. 2.
— Bahiensis Mart. I. 398. no. 5.
— bicolor Bth. V. 145. no. 1.
— corallina Mart. I. 398. no. 4.
— lepidota Miquel. II. 811. no. 1.
— Pavonii G. Don. I. 398. no. 1.
— Spixiana Mart. I. 398. no. 3.
— subsessilis Bth. V. 146. no. 2.
Ruyschiana Bth. III. 796.
— *laciniata* Mill. III. 797. no. 27.
— *spicata* Mill. III. 796. no. 26.
— *verticillata* Mill. III. 795. no. 18.
Ryanea DC. II. 218.
Ryania Vahl. II. 218.
— tomentosa Miq. II. 218. no. 1.
Ryditea DC. * II. 479.
Ryditophyllum Mart. II. 721. * VI. 395.
— *floribundum* Van Houtte. VI. 737.
— Melastoma Poepp. et Endl. II. 721. no. 2.
— purpureum Poepp. et Endl. II. 721. no. 1.
Ryditostylis Hook. et Arn. * II. 204. V. 762.
— gracilis Hook. et Arn. V. 762. no. 1.
Ryssopterys Blume. ° V. 220.
— abutilifolia Adr. Juss. V. 221. no. 3.
— Cumingiana Adr. Juss. V. 222. no. 5.
— dealbata Adr. Juss. V. 221. no. 4.
— microstemma Adr. Juss. V. 221. no. 1.
— *tiliaefolia* Blume. V. 221. no. 2.
— tiliaefolia Adr. Juss. V. 221. no. 1.
— Timorensis Adr. Juss. V. 222. no. 6.
— *tomentosa* Blume. V. 299. no. 11.
Rytidosis DC. * II. 644.

S

Sabazia Cass. *II. 603.
Sabbatia Adans. *VI. 500.
— *corymbosa* Mnch. III. 720. no. 9.
Sabbatieae Griseb. VI. 500.
Sabdariffa DC.? I. 306. no. 50.
Sabia Colebr. I. 557.
— campanulata Wall. I. 557. no. 3.
— lanceolata Colebr. I. 557. no. 1.
— parviflora Wall. I. 557. no. 2.
Sabicea Aubl. II. 489.
— cana Hook. II. 490. no. 3.
— glabrescens Bth. II. 489. no. 1.
— velutina Bth. II. 490. no. 2.
Sabinaea DC. *I. 680.
Saccellium Humb. et Bonpl. *VI. 554.
Saccoglottis Mart. I. 425. V. 372.
— Amazonica Mart. *I. 425. no. 1. V 372. no. 1.
Sacconia Endl. II. 487.
— glabra Endl. *II. 487. no. 1.
Saccopetalum Bennet. I. 74.
— Horsfieldii Bennet. *I. 74. no. 1.
Sachaperexil V. 849. no. 1.
Sacharracacha seu Arracacha sylvestris V. 920. no. 2.
Sagina crassifolia d'Urv. II. 249. no. 3.
— *Magellanica* Willd. II. 249. no. 1.
— *muscosa β. squarrosa* et *γ. laricifolia* Hb. Mus. Brit. V. 789. no. 2.
— *procumbens* Hook. II. 249. no. 1. *β.*
— *Quitensis* H. B. Kth. II. 249. no. 1.
— *subulata* d'Urville. II. 249. no. 4.
Sagraea DC. *II. 143. V. 713.
— cognata Steudel. V. 713. no. 1.
— *columneaefolia* DC. II. 140. no. 17.
— *sessilifolia* DC. II. 140. no. 17.
Saintmorysia Endl. *II. 638. VI. 211.
— pachyphylla C. H. Schultz. VI. 211. no. 1.
Sairanthus Hook. *VI. 573.
— *glutinosus* G. Don. III. 9. no. 8.
Salacia L. I. 401. V. 146.
— Brunoniana Wght. et Arn. I. 401. no. 7.
— Calypso DC. *I. 402. no. 9.
— *calypsoides* Cambess. I. 400. no. 4.
Salacia campestris Cambess. I. 402. no. 17.
— *Chinensis* L. I. 401. no. 6.
— *Cochinchinensis* Lour.? I. 401. no. 6.
— debilis Wlprs. I. 402. no. 15.
— ducis Würtembergiae Hochstett. V. 146. no. 1.
— erecta Wlprs. I. 402. no. 16.
— *erythroxyloides* Cambess. I. 400. no. 2.
— floribunda Wght. I. 402. no. 10.
— Javanensis Blume. I. 401. no. 1.
— Kraussii Hochstett. V. 147. no. 2.
— *laevigata* Wght. I. 400. no. 1.
— longifolia Wall. I. 402. †
— macrophylla Blume. I. 401. no. 4.
— melittocarpa Blume. I. 401. no. 3.
— *multiflora* Cambess. I. 401. no. 6.
— multiflora Wght. I. 402. no. 11.
— oblonga Wall. I. 401. no. 9.
— oblongifolia Blume. I. 401. no. 2.
— *obtusifolia* Endl. I. 400. no. 1.
— *oppositifolia* Rottl. I. 402. no. 9.
— pomifera Wall. I. 401. no. 8. (III. Emend. p. 2.)
— prinoides Blume. I. 401. no. 5.
— pyriformis Wlprs. I. 402. no. 14.
— reticulata Wght. I. 402. no. 13.
— Roxburghii Wall. *I. 401. no. 6.
— Senegalensis DC. I. 402. †
— *serrata* Cambess. I. 401. no. 7.
— sylvestris Mart. I. 402. no. 18.
— *undulata* Cambess. I. 400. no. 3.
— *velutina* Cambess. I. 401. no. 5.
— verrucosa Wght. I. 402. no. 12.
Salaxideae Bth. II. 729.
Salaxis Salisb. *II. 729.
Saldinia A. Rich. *II. 483.
Salicifolii Torr. et Gr. (Aster) II. 568.
Salivaria DC. II. 622.
Salloa trinervis Hsskrl. V. 17. no. 1.
Salmalia Schott et Endl. I. 330.
— insignis Schott et Endl. I. 330. no. 2.
— Malabarica Endl. et Schott. *I. 330. no. 1.
Salmea DC. *II. 602. VI. 145.
— angustifolia Bth. VI. 145. no. 1.

Salomonia Loureiro. I. 231.
—? *ciliata* DC. I. 233. no. 19. *a.*
— cordata Arnott. I. 231. no. 2.
— obovata Wght. I. 231. no. 1.
Salpichora Miers. °VI. 612.
— ciliata Miers. VI. 613. no. 6.
— dependens Miers. VI. 613. no. 2.
— glandulosa Miers. VI. 613. no. 1.
— hirsuta Miers. VI. 613. no. 3.
— ramosissima Miers. VI. 613. no. 4.
— rhomboidea Miers. VI. 613. no. 5.
β. divaricata.
γ. pubescens.
Salpiglosseae Bth. VI. 633.
Salpiglossideae Bth. III. 232. III. 960. VI. 633.
Salpiglossis Rz. et Pav. III. 233. °III. 960. *VI. 634.
— *atropurpurea* Hook. III. 234. no. 1.
— *Barcleyana* Penny. III. 234. no. 1. *δ.*
— intermedia Sweet. III. 234. no. 1. *δ.*
— *linearis* Hook. III. 7. no. 3.
— *picta* Sweet. III. 234. no. 1. *β.*
—? prostrata Hook. et Arn. III. 234. no. 2.
— sinuata Rz. et Pav. III. 233. no. 1.
δ. Barcleyana, *β.* picta, *γ.* straminea } G. Don. III. 234. no. 1.
— *straminea* Hook. III. 234. no. 1. *γ.*
— *straminea β. picta* Hook. III. 234. no. 1. *β.*
Salpiglottis integrifolia Hook. III. 7. no. 4.
Salpinga Mart. II. 121.
— secunda Schrnk. et Mart. *II. 121. no. 1.
Salpingia Torr. et Gr. II. 85.
Saltia Abyssinica R. Br. I. 263. no. 2.
Salvertia St. Hil. II. 69.
— thyrsiflora Pohl. II. 69. no. 1.
Salvia Linn. III. 599. °III. 980. VI. 661.
Salvia etc. Ard. III. 621. no. 80.
— *Abyssinica* R. Br. III. 598. no. 2.
— *Abyssinica* Jacq. III. 672. no. 284.
— *Abyssinica* Linn. fil. III. 614. no. 56. III. 625. no. 94.
— acaulis Vahl. III. 675. no. 297.
— acetabulosa Vahl. III. 605. no. 23.
— *acuminata* Pers. III. 632. no. 119.
— acuminata Rz. et Pav. III. 663. no. 253.
— *acuminatissima* Vent. III. 632. no. 119.
— *acutata* Lnk. et Brot. III. 626. no. 96.
— *acutifolia* Lam. III. 624. no. 91.
— acutifolia Rz. et Pav. III. 670. no. 279.
— *Aegyptiaca* Linn. III. 614. no. 56.
— Aegyptiaca Linn. III. 677. no. 305.
— *Aethiopis* Brot. III. 615. no. 62.
— *Aethiopis* Jacq. III. 615. no. 60.
— Aethiopis Linn. III. 614. no. 60.
Salvia affinis Cham. et Schlchtd. III. 669. no. 273.
— *affinis* Spr. III. 622. no. 84.
— *Africana* Commelin. III. 608. no. 36.
— *Africana etc.* Commel. III. 606. no. 31.
— Africana Linn. III. 607. no. 36.
— agglutinans Lag. III. 659. no. 235.
— *agrestis* Linn. III. 621. no. 81. et no. 82.
— albicaulis Bth. III. 607. no. 35.
— *albida* Jacq. III. 613. no. 53.
— albiflora Mart. et Galeotti. VI. 663. no. 14.
— Algeriensis Dsf. III. 619. no. 74.
— *alpestris* Hortul. III. 624. no. 89.
— altissima Pohl. III. 657. no. 224.
— *amara* Jacq. III. 641. no. 160.
— amarissima Ort. III. 641. no. 160.
— amethystina Smith. III. 666. no 263.
— *amoena* Sims. III. 669. no. 272.
— *amplexicaulis* Hortul. III. 623. no. 88.
— *amplexicaulis* Lam. III. 622. no. 84. III. 624. no. 89.
— angulata Bth. III 639. no. 153.
— *angustifolia* Bot. Reg. III. 631. no. 117.
— angustifolia Cav. III. 631. no. 117.
— *angustifolia* Michx. III. 632. no. 119.
— antirrhiniflora Dehnhrdt. III. 678. no. 310.
— *applanata* Willd. III. 672. no. 284.
— arenaria St. Hil. III. 636. no. 136.
— *argentea* Hortul. III. 613. no. 53.
— *argentea* Jacq. III. 615. no. 62.
— argentea Linn. III. 615. no. 62.
— *arguta* Bth. III. 655. no. 215.
— aristulata Martens et Galeotti. VI. 669. no. 46.
— aspera Martens et Galeotti. V. 664. no. 19.
— asperifolia Bth. III. 654. no. 210.
— *asperula* Hortul. III. 624. no. 89.
— *aspidophylla* Roem. et Schult. III. 631. no. 115.
— assurgens H. B. Kth. III. 634. no. 128.
— *Atlantica* Pers. III. 615. no. 62.
— Aucheri Bth. III. 601. no. 8.
— aurea Linn. III. 606. no. 31.
— *auriculata* Mill.? III. 601. no. 7. III. 602. no. 11.
— *aurita* Schultes. III. 601. no. 7.
— aurita Thnbrg. III. 673. no. 287.
— *Austriaca* Jcq. III. 620. no. 78.
— Austriaca Linn. III. 620. no. 78.
— axillaris Moç. et Sess. III. 645. no. 175.
— Ayavacensis H. B. Kth. III. 663. no. 251.
— *azurea* Bot. Mag. III. 632. no. 119.
— *azurea* Hortul. III. 669. no. 272.
— azurea Lam. III. 632. no. 119.
— *baccifera* Ettl. III. 602. no. 11.
— Baetica Boiss. III. 625. no. 93.

Salvia balaustina Pohl. III. 654. no. 209.
— ballotaeflora Bth. III. 646. no. 178.
— *barbata* Lam. III. 508. no. 36.
— Barrelieri Ettl. III. 627. no. 101.
— *Barrelieri* Hortul. III. 622. no. 84. III. 623. no. 88.
— *Barrelieri* Ten. III. 621. no. 81.
— *Bauhini* Hortul. III. 622. no. 84.
— *Benghalensis* Rxb. III. 598. no. 2.
— Benthamiana Gardn. *III. 679. III. 944.
— *Betonica* Roem. et Schult. III. 633. no. 126.
— *betonicaefolia* Ettl. III. 624. no. 90. no. 91.
— *betonicaefolia* Lam. III. 626. no. 95. *β.*
— bicolor Desf. III. 618. no. 73.
— *bifida* Forsk. III. 611. no. 48.
— *biflora* Rz. et Pav. III. 653. no. 206.
— biserrata Mart. et Galeotti. VI. 669. no. 45.
— *Bonplandiana* Dietr. et Gaertn. III. 670. no. 78.
— *Boosiana* Jacq. fil. III. 669. no. 272.
— *Bossii* Tratt. III. 669. no. 272.
— Boucheana Kth. VI. 665. no. 25.
— *bracheata* Rxb. III. 676. no. 303.
— *bracteata* Poir. III. 647. no. 182.
— bracteata Russ. III. 604. no. 20.
— *bracteata* Sims. III. 613. no. 55.
— *Brasiliensis* Spr. III. 659. no. 231.
— breviflora Moç. et Bess. III. 648. no. 189.
— *Breynitica* Hortor. III. 640. no. 154.
— Broussonetii Bth. III. 616. no. 64.
— *bullata* Ort. III. 629. no. 108.
— *bullata* Schousboe. III. 625. no. 92.
— bupleuroides Prsl. III. 646. no. 179.
— *Byzantina* Hortul. III. 626. no. 95.
— Byzantina Russ. *III. 679.
— Cadmica Boiss. III. 941.
— *caduca* Horn. III. 622. no. 84.
— caespitosa Montbr. et Auch. III. 603. no. 15.
— *caesia* H. B. Kth. III. 640. no. 154.
— calaminthaefolia Vahl. III. 645. no. 177.
— calycina Sibth. et Sm. III. 606. no. 26.
— *calycinflata* Moç. et Sess. III. 659. no. 233.
— campanulata Wall. III. 610. no. 45.
— *campestris* M. Bieb. III. 623. no. 88.
— *cana* Wall. III. 617. no. 66.
— Canariensis Linn. III. 609. no. 41.
— Candelabrum Boiss. III. 601. no. 9.
— candicans Martens et Galeotti. VI. 664. no. 18.
— *candidissima* M. Bieb. III. 616. no. 63.
— *candidissima* Guss. III. 615. no. 62.
— candidissima Vahl. III. 613. no. 54.
— *canescens* Bth. III. 631. no. 118.
— canescens C. A. Mey. III. 617. no. 67.
Salvia cardinalis H. B. Kth. III. 663. no. 250.
— cardiophylla Bth. III. 642. no. 162.
— carduacea Bth. III. 671. no. 281.
— carnea H. B. Kth. III. 642. no. 165.
— *Caucasia* Hortul. III. 623. no. 88.
— *Caucasica* Schrank. III. 622. no. 84.
— Cedronella Boiss. III. 941.
— ceratophylla Linn. III. 618. no. 70.
— *ceratophylla* C. A. Mey. III. 626. no. 26. *β*
— *ceratophylla* Ten. III. 621. no. 80.
— *ceratophylla* Sieb. VI. 662. no. 5.
— ceratophylloides Linn. III. 620. no. 80.
— *ceratophylloides* Willd. III. 626. no. 96. *β.*
— *chamaedryfolia* Andr. III. 635. no. 131.
— chamaedryoides Cav. III. 634. no. 131.
— *chamaedrys* Willd. III. 635. no. 131.
— *chamae-elaeagnea* Berg. III. 608. no. 38.
— Chinensis Bth. III. 675. no. 299.
— chionantha Boiss. III. 943.
— *chromatica* Hffmnsgg. III. 600. no. 3.
— chrysantha Mart. et Galeotti. VI. 665. no. 23.
— ciliata Bth. III. 658. no. 228.
— *ciliata* Poir.? III. 647. no. 182.
— cinnabarina Mart. et Galeotti. VI. 667. no. 30.
— *circinnata* Cav. III. 641. no. 160.
— clandestina Linn. III. 626. no. 96. *β.* multifida Bth.
— *clandestina* Linn. III. 627. no. 98.
— *clandestina* Vahl. III. 626. no. 96. *β.*
— *clandestinoides* Lnk. III. 626. no. 96.
— Claytoni Elliott. III. 676. no. 302.
— clinopodioides H. B. Kth. III. 647. no. 183.
— *Clusii* Jacq. III. 602. no. 11.
— *coarctata* Vahl. III. 614. no. 58.
— coccinea Linn. III. 661. no. 241.
— coerulea Bth. III. 668. no. 269.
— *coerulea* Hortul. III. 669. no. 272.
— collina H. B. Kth. III. 649. no. 190.
— *collina* Lowe. III. 626. no. 96.
— *colorans* Hortul. III. 659. no. 231.
— *colorata* Linn. III. 607. no. 31.
— *colorata* Thore. III. 611. no. 47.
— *colorata* Vahl. III. 608. no. 36.
— columbariae Bth. III. 671. no. 282.
— commutata Bth. III. 612. no. 51.
— compressa Vahl. III. 615. no. 61.
— *compressa* Vent. III. 615. no. 61.
— concolor Lambert. III. 668. no. 268.
— confertiflora Pohl. III. 650. no. 197.
— confusa Bth. III. 601. no. 7.
— controversa Ten. III. 626. no. 98. *β.* grandiflora Bth. III. 627.
— cordata Bth. III. 644. no. 171.
— corrugata Vahl. III. 633. no. 127.

Salvia crassifolia Cav. III. 619. no. 73.
— crassifolia Desf. III. 600. no. 5.
— *crassifolia* Sibthrp. et Sm. III. 613. no. 54.
— *Cremenecensis* Bess. III. 624. no. 90.
— crenata Mart. et Galeotti. VI. 668. no. 36.
— Cretica Linn. III. 599. no. 1.
— *Cretica* Schreb. III. 599. no. 1.
— *crispa* Rivin. III. 605. no. 25.
— crispula E. Mey. III. 608. no. 37.
— Cruikshanksii Bth. III. 638. no. 148.
— cryptantha Montbr. et Auch. III. 606. no. 27.
— *cryptanthos* Schult. III. 647. no. 182.
— cuneifolia Bth. III. 645. no. 176.
— cupheaefolia H. B. Kth. III. 669. no. 275.
— curviflora Bth. III. 656. no. 221.
— cuspidata Rz. et Pav. III. 642. no. 161.
— cyanea Bth. III. 667. no. 265.
— *cyanea* Fisch. III. 669. no. 272.
— decipiens Martens et Galeotti. VI. 669. no. 43.
— *deltoidea* Pers. III. 660. no. 236.
— densiflora Bth. III. 640. no. 155.
— dentata Ait. III. 608. no. 39.
— derasa Bth. VI. 666. no. 28.
— *deserta* Schangin. III. 624. no. 89.
— deserti Dcne. III. 627. no. 99.
— *dianthera* Roth. III. 598. no. 2.
— discolor H. B. Kth. III. 670. no. 278.
— disermas Linn. III. 623. no. 87.
— *distans* Pohl. III. 620. no. 78.
— divaricata Montbr. et Auch. III. 602. no. 10.
— *doliostachys* Lag. III. 662. no. 248.
— *Dominica* Linn. III. 612. no. 51.
— *Dominica* Vahl. III. 629. no. 109.
— dracocephaloides Boiss. III. 941.
— Drégeana E. Mey. III. 607. no. 34.
— dumetorum Andrz. III. 621. no. 82.
— *elata* Host. III. 624. no. 89.
— *elata* Poir. III. 632. no. 119.
— elegans Vahl. III. 658. no. 229.
— elongata H. B. Kth. III. 633. no. 126.
— elongata Mart. et Galeotti. VI. 663. no. 9.
— *elongata* Spr. III. 625. no. 92.
— *eremitica* Hortor. III. 640. no. 154.
— eremophila Boiss. III. 945.
— eriocalyx Bertero. III. 650. no. 196.
— *erosa* Desf. III. 626. no. 96. *β.* III. 674. no. 290.
— Euphratica Bth. III. 606. no. 28.
— *exasperata* Cav. III. 618. no. 70.
— excelsa Bth. III. 661. no. 242.
— *excisa* Rz. et Pav. III. 653. no. 206. *β.*
— farinacea Bth. III. 649. no. 192.
— farinosa Martens et Galeotti. VI. 665. no. 21.
— *fimbriata* H. B. Kth. III. 630. no. 113.
Salvia flexuosa Prsl. III. 630. no. 114.
— flocculosa Bth. VI. 663. no. 10.
— *foetida* Lam. III. 614. no. 58.
— *foliis cordato-ovatis etc.* Ard. III. 629. no. 108.
— *foliosa* Bth. III. 637. no. 143.
— *formosa* L'Hérit. III. 653. no. 207.
— *Forskålei* Bot. Mag. III. 611. no. 48.
— Forskålei Linn. III. 611. no. 48.
— frigida Boiss. III. 943.
— *frugifera* Ettl. III. 605. no. 25.
— fruticetorum Bth. 657. no. 223.
— *fruticosa* Mill. III. 602. no. 11.
— fruticulosa Bth. III. 641. no. 158.
— fulgens Cav. III. 663. no. 250.
— galeata Rz. et Pav. III. 639. no. 149.
— Galeottii Martens. VI. 668. no. 37.
— *Garganica* Ten. III. 622. no. 84.
— Garipensis E. Mey. III. 607. no. 32.
— Gilliesii Bth. III. 642. no. 163.
— glabra Mart. et Galeotti. VI. 664. no. 17.
— glabrata H. B. Kth. III. 667. no. 267.
— glandulifera Cav. III. 638. no. 147.
— *glaucescens* Pohl. III. 661. no. 241.
— glechomaefolia H. B. Kth. III. 635. no. 133.
— glumacea H. B. Kth. III. 660. no. 239.
— glutinosa Linn. III. 609. no. 42.
— graciliflora Martens et Galeotti. VI. 667. no. 35.
— gracilis Bth. III. 637. no. 140.
— Grahami Bth. III. 660. no. 237.
— grandiflora Ettling. III. 600. no. 6.
β. minor Bth. III. 601. no. 6.
— *grandiflora* Jacq. fil. III. 601. no. 6.
— *grandiflora* Nee. III. 666. no. 261.
— *grandiflora* Ten. III. 600. no. 3.
— granitica Hochstett. VI. 670. no. 49.
— grata Vahl. III. 652. no. 204.
— graveolens Vahl. III 618. no. 71.
— Guaranitica St. Hil. III. 668. no. 271.
— *Habliziana* Willd. III. 604. no. 21.
— *haematodes* Linn. III. 621. no. 81.
— Haenkei Bth. III. 655. no. 216.
— Halleri Fisch. *III. 679.
— hastaefolia E. Mey. III. 607. no. 33.
— *hastata* Ettling. III. 624. no. 91.
— helianthemifolia Bth. III. 634. no. 129. (c. var. *β.* ibid.)
— herbacea Bth. III. 638. no. 144.
— *heterophylla* Hortul. III. 626. no. 95.
— hians Royle. III. 610. no. 44.
— Hilarii Bth. III. 655. no. 214.
— hirta H. B. Kth. III. 656. no. 217.
— *hirta* Schrank. III. 641. no. 159.
— hirtella Vahl. III. 657. no. 226.
— hirsuta Jacq. III. 646. no. 182.

Salvia Hispanica Linn. III. 639. no. 152.
— *Hispanica etc.* Besl. III. 600. no. 3.
— *Hispanorum* Lag. III. 599. no. 2.
— *horminoides* Pourr. III. 626. no. 95.
— Horminum Linn. III. 611. no. 47.
— *Horminum* Sbthrp. et Sm. III. 611. no. 47.
— *Humboldtiana* D. Dietr. III. 649. no. 191.
— *Humboldtiana* Roem. et Schult. III. 633. no. 124.
— *Humboldtii* Spr. III. 649. no. 191.
— humilis Bth. III. 629. no. 110.
— hydrangea DC. III. 605. no. 24.
— *hyemalis* Boosc. III. 669. no. 272.
— *hypanica* Andrz. III. 623. no. 88.
— hypochionaea Boiss. III. 943.
— hyptoides Martens et Galeotti. VI. 662. no. 7.
— *Illyrica* Schult. III. 626. no. 95.
— inamoena Vahl. III. 619. no. 76.
— incana Mart. et Galeotti. VI. 667. no. 32.
— *incarnata* Cav. III. 658. no. 229.
— incarnata Vahl. III. 603. no. 18.
— incurvata Rz. et Pav. III. 639. no. 151.
— inconspicua Bth. III. 630. no. 111.
— *Indica* Jacq. III. 612. no. 50.
— Indica Linn. III. 612. no. 50.
— *integerrima* Mill. III. 608. no. 36.
— *integrifolia* Hardw. III. 617. no. 66.
— integrifolia Rz. et Pav. III. 652. no. 203.
— *intermedia* Schult. III. 672. no. 284.
— *interrupta* Jacq. III. 602. no. 12.
— interrupta Schousb. III. 602. no. 12.
— involucrata Cav. III. 659. no. 232.
— Japonica Thunb. III. 675. no. 298.
— Karwinskii Bth. III. 666. no. 264.
— Keerlii Bth. III. 640. no. 156.
— Kotschyi Boiss. VI. 661. no. 2.
— lachnostachys Bth. III. 643. no. 169.
— *laciniata* Willd. III. 626. no. 96. *β.*
— *laevigata* H. B. Kth. III. 659. no. 232.
— laevis Bth. III. 632. no. 121.
— lamiifolia Jacq. III. 669. no. 272.
— lanata Rxb. III. 616. no. 66.
— *lanceaefolia* Poir. III. 630. no. 115.
— *lanceolata* Jacq. fil. III. 631. no. 115.
— *lanceolata* Lam. III. 609. no. 40.
— lanceolata Willd. III. 630. no. 115.
— *lanigera* Poir. III. 627. no. 98.
— lantanaefolia Mart. et Galeotti. VI. 665. no. 22.
— lasiantha Bth. III. 650. no. 198.
— lasiocephala Hook. et Arn. III. 646. no. 180.
— latens Bth. VI. 666. no. 27.
— *latifolia* Anders. III. 669. no. 272.
— latifolia Vahl. III. 619. no. 75.
— *lavandulaefolia* Spreng. III. 633. no. 124.
Salvia lavandulaefolia Vahl. III. 599. no. 2.
— lavanduloides H. B. Kth. III. 633. no. 124.
— Leonia Bth. III. 671. no. 283.
— leonuroides Glox. III. 653. no. 207.
— leptophylla Bth. III. 631. no. 116.
— leptostachys Bth. III. 637. no. 141.
— leucantha Cav. III. 649. no. 194.
— leucanthera Visiani. III. 620. no. 77.
— leucocephala H. B. Kth. III. 648. no. 188.
— limbata C. A. Mey. III. 620. no. 79.
— linarioides Paxton. * III. 679.
— lineata Bth. III. 661. no. 243.
— *lineatifolia* Lag. III. 640. no. 154.
— linifolia Martens et Galeotti. VI. 662. no. 8.
— Linkiana Roem. et Schult. III. 604. no. 22.
— Littae Visiani. VI. 668. no. 41.
— longespicata Mart. et Galeotti. VI. 663. no. 13.
— longiflora Rz. et Pav. III. 664. no. 254.
— *longiflora* Willd. III. 668. no. 270.
— *longifolia* Nutt. III. 632. no. 119.
— longistyla Bth. III. 666. no. 262.
— Lorentei Hochst. VI. 662. no. 4.
— Loxensis Bth. VI. 668. no. 40.
— Lusitanica Jcq. fil. III. 621. no. 83.
— *Lusitanica* Poir. III. 625. no. 92.
— lutea H. B. Kth. III. 651. no. 200.
— lyrata Linn. III. 674. no. 294.
— macilenta Boiss. III. 945.
— macrocalyx Gardn. VI. 665. no. 24.
— macrophylla Bth. III. 665. no. 259.
— macrosiphon Boiss. III. 942.
— macrostachya H. B. Kth. III. 648. no. 187.
— *major etc.* Besl. III. 601. no. 6.
— marginata E. Mey. III. 673. no. 289.
— Mariana Mart. III. 655. no. 213.
— *marrubioides* Vahl. III. 602. no. 11.
— Martensii Galeotti. VI. 668. no. 39.
— Mathewsii Bth. III. 647. no. 185.
— *melissaefolia* Dsf. III. 667. no. 266.
— *melissodora* Lag. III. 641. no. 159.
— membranacea Bth. III. 637. no. 142.
β. acuminata.
γ. villosula.
— mentiens Pohl. III. 658. no. 230.
— *merjamie* Forsk. III. 625. no. 94.
— Mexicana Linn. III. 667. no. 266.
β. major Bth.
— *Mexicana* Walt. III. 632. no. 119.
— *micrantha* Dsf. III. 626. no. 95. et 96.
— micrantha Vahl. III. 629. no. 108.
— *microcaulis* Pohl. III. 658. no. 229.
— microphylla H. B. Kth. III. 660. no. 238.
— miltiorhiza Bnge. III. 611. no. 49.
— *minor etc.* Breyn. III. 608. no. 38.
— *minutiflora* Bnge. III. 676. no. 303.

Salvia misella H. B. Kth. III. 628. no. 104.
— mitis Rz. et Pav. III. 639. no. 150.
— Moçinni Bth. III. 646. no. 181.
— *mollis* Donn. III. 678. no. 307. *β.*
— *mollis* Jcq. fil. III. 623. no. 88.
— mollissima Martens et Galeotti. VI. 667. no. 33.
— Moluccellae Bth. III. 606. no. 30.
— montana Gardn. *III. 679. III. 944.
— *Montbretii* Bth. III. 617. no. 69. (et ibid. in adn.)
— Moorkroftiana Wall. III. 616. no. 65.
— moschata H. B. Kth. III. 657. no. 225.
— multicaulis Vahl. III. 606. no. 29.
— *multifida* Sbthrp. et Sm. III. 626. no. 96.
— nana H. B. Kth. III. 635. no. 134.
— *napifolia* Auct. III. 672. no. 284.
— napifolia Jcq. III. 678. no. 308.
— *nemorosa* Linn. III. 624. no. 89.
— Neovidensis Bth. III. 657. no. 222.
— *nepetaefolia* Poir. III. 647. no. 182.
— *nepetoides* H. B. Kth. III. 641. no. 160.
— nervata Mart. et Galeotti. VI. 668. no. 38.
— nervosa Bth. III. 644. no. 172.
— Nilotica Vahl. III. 672. no. 284.
— *nitidifolia* Ort. III. 667. no. 266. *β.*
— nivea Thnbrg. III. 608. no. 40.
— *nodosa* Rz. et Pav. III. 653. no. 207.
— Nubia Ait. III. 627. no. 100.
— *Nubia* Murr. III. 672. no. 284.
— nubicola Wall. III. 609. no. 43.
— nudicaulis Vahl. III. 625. no. 94.
— nutans Linn. III. 624. no. 91.
— *nutans* Waldst. et Kit. III. 624. no. 91.
— oblonga C. Koch. VI. 662. no. 6.
— *oblongata* Rchb. III. 626. no. 96.
— *oblongata* Vahl. III. 626. no. 95. *β.*
— oblongifolia Martens et Galeotti. VI. 664. no. 16.
— obovata Elliott. III. 675. no. 296.
— obscura Bth. III. 628. no. 105.
— obtusa Mart. et Galeotti. VI. 667. no. 34.
— *obtusata* Lnk. et Brot. III. 626. no. 96.
— obtusata Thnbrg. III. 676. no. 301.
— occidentalis Swrtz. III. 628. no. 103.
— *ocymoides* Rxb. III. 675. no. 297.
— *odorata* Jcq. fil. III. 613. no. 53.
— odorata Willd. III. 612. no. 53.
— officinalis Linn. III. 600. no. 3.
— *officinalis* Pall. III. 601. no. 6.
— *officinalis* var. *angustifolia* Lnk. III. 599. no. 1.
— *officinalis* var. *Hispanica* Boiss. III. 599. no. 2.
— oligostachya Gasparini. III. 662. no. 249.
— oppositiflora Rz. et Pav. III. 652. no. 204.
Salvia orientalis Mill. III. 604. no. 19.
— ovalifolia St. Hil. III. 643. no. 168. *β.* villosa Bth.
— Palaestina Bth. III. 614. no. 57.
— paleaefolia H. B. Kth. III. 630. no. 112.
— pallida Bth. III. 631. no. 118.
— *pallidiflora* St. Am. III. 626. no. 96.
— paniculata Linn. III. 608. no. 38.
— *papilionacea* Cav. III. 667. no. 266. *β.*
— *papillosa* Hffmnsgg. III. 600. no. 3.
— Parquerensis Moç. et Sess. III. 647. no. 186.
— *parviflora* Lnk. III. 628. no. 96.
— *parviflora* Rxb. III. 676. no. 303.
— parviflora Vahl. III. 627. no. 102.
— patens Cav. III. 665. no. 261.
— *patula* Dsf. III. 615. no. 62.
— pauciflora H. B. Kth. III. 670. no. 280.
— pauciserrata Bth. VI. 666. no. 26.
— Pavonii Bth. III. 652. no. 202.
— Peloponnesiaca Boiss. VI. 670. no. 48.
— *pendula* Bess. III. 624. no. 91.
— pendula Vahl. III. 624. no. 90.
— *peregrina Rauwolfii* Gesner. III. 606. no. 26.
— persicifolia St. Hil. III. 654. no. 212.
— petiolaris H. B. Kth. III. 664. no. 256.
— phlomoides Asso. III. 617. no. 69.
— *phlomoides* Cav. III. 647. no. 182.
— phoenicea H. B. Kth. III. 662. no. 247.
— Pichinchensis Bth. VI. 666. no. 29.
— *pilantha* Link. III. 605. no. 22.
— pilifera Montbr. et Auch. III. 603. no. 17.
— *pilosa* Vahl. III. 637. no. 143.
— *pinifolia* Pall. III. 604. no. 21.
— pinnata Linn. III. 603. no. 14.
— Pitcheri Torrey. III. 632. no. 120.
— plebeja R. Br. III. 676. no. 303.
— plumosa Rz. et Pav. III. 653. no. 208.
— polyadenia Boiss. III. 942.
— polyctonos Boiss. VI. 662. no. 3.
— *polymorpha* Hffmnsgg. et Link. III. 626. no. 96.
— polystachya Ort. III. 640. no. 154.
— pomifera Linn. III. 605. no. 25.
— praecox Vahl. III. 614. no. 59.
— *praecox* Savi. III. 626. no. 96.
— pratensis Linn. III. 621. no. 81.
— *pratensis* Sm. III. 621. no. 81.
— *prismatica* Cav. III. 639. no. 152.
— *procumbens* Rz. et Pav. III. 628. no. 103.
— procurrens Bth. III. 643. no. 166.
— propinqua Bth. III. 643. no. 167.
— proxima Mart. et Galeotti. VI. 669. no. 42.
— prunelloides H. B. Kth. III. 635. no. 135.
— pseudococcinea Jcq. III. 661. no. 244.
— pubescens Bth. III. 659. no. 234.

Salvia pulchella DC. III. 662. no. 248.
— *pulchella* H B. Kth. III. 649. no. 191.
— pumila R. Br. III. 677. no. 304.
— punctata Rz. et Pav. III. 651. no. 201.
— punicea Mart. et Galeotti. VI. 667. no. 31.
— purpurascens Mart. et Galeotti. VI. 663. no. 12.
— purpurea Cav. III. 669. no. 274.
— *pyramidalis* Petagna. III. 615. no. 62.
— *pyrifolia* Dombey. III. 653. no. 207.
— *quercifolia* Hortul. III. 622. no. 84.
— *quinquefolia* Riv. III. 602. no. 11.
— racemosa Rz. et Pav. III. 642. no. 164.
— *radicans* Poir. III. 628. no. 103.
— raphanifolia E. Mey. III. 674. no. 294.
— *Real* Incolar. III. 665. no. 258.
— rectiflora Vis. III. 663. no. 252.
— *reflexa* Horn. III. 630. no. 115.
— Regla Cav. III. 660. no. 236.
— *repens* Bth. III. 643. no. 168.
— repens Burch. III. 674. no. 293.
— *reptans* Jacq. III. 631. no. 117.
— reticulata Mart. et Gal. VI. 663. no. 11.
— Reuteriana Boiss. III. 942.
— revoluta Rz. et Pav. III. 649. no. 193.
— rhombifolia Rz. et Pav. III. 637. no. 143. β. glabrior Bth.
— *rhombifolia β.* Hook. III. 638. no. 148.
— rigida Bth. III. 645. no. 173.
— *rigida* Thnbrg. III. 608. no. 39.
— ringens Sibth. III. 602. no. 13.
— riparia H. B. Kth. III. 628. no. 106.
— rivularis Gardn. III. 944. (*III. 679.)
— rosaefolia Sm. III. 603. no. 19.
— *rosea* Vahl. III. 661. no. 241.
— *rosmarinifolia* Hortul. III. 599. no. 2.
— rosmarinoides St. Hil. III. 645. no. 174.
— rostrata Schmidt. *III. 679.
— rotundifolia Visiani. III. 600. no. 4.
— rubescens H. B. Kth. III. 656. no. 218.
— *rubicunda* Wndrth. III. 621. no. 81.
— *rubra* Spr. III. 622. no. 84.
— rufula H. B. Kth. III. 670. no. 276.
— rugosa Thnbrg. III. 622. no. 86.
— rugosissima Zuccarini. III. 626. no. 97.
— rumicifolia H. B. Kth. III. 664. no. 255.
— runcinata Linn. III. 673. no. 290.
— Russellii Bth. III. 678. no. 309.
— Ruthenica Weinm. III. 945.
— sagittata Rz. et Pav. III. 665. no. 258.
— salicifolia Pohl. III. 655. no. 215.
— *saligna* Willd. III. 649. no. 191.
— santolinaefolia Boiss. III. 945.
— saxicola Bth. III. 677. no. 306.
— *Scabiosa* Pers. III. 604. no. 21.
— scabiosaefolia Lam. III. 604. no. 21.
Salvia scabra Thnbrg. III. 673. no. 288.
— scabrida Pohl. III. 654. no. 211.
— *Sclarea* Crantz. III. 620. no. 78.
— Sclarea Linn. III. 613. no. 55.
— *Sclarea* Sbthrp. et Sm. III. 613. no. 55.
— sclareoides Brot. III. 625. no. 92.
— Scorodonia Poir. III. 641. no. 159.
— scorbiculata Meyen. III. 944.
— scutellarioides H. B. Kth. III. 665. no. 260.
— secunda Bth. III. 658. no. 227.
— semiatrata Zuccar. III. 640. no. 157.
— *serotina* Jacq. III. 629. no. 109.
— serotina Linn. III. 629. no. 109.
— *serotina* Vahl. III. 629. no. 108.
— serrata Bth. III. 636. no. 137.
— Sessei Bth. III. 659. no. 233.
— Schiedii Boiss. VI. 661. no. 1.
— Sibthorpii Sm. III. 623. no. 88.
— sidaefolia Mart. et Gal. VI. 670. no. 47.
— sideritidis Prsl. III. 634. no. 130.
— *sideritis* Vahl. III. 647. no. 182.
— Sieberi Prsl. VI. 662. no. 5.
— *simplex* Spreng. III. 633. no. 126.
— *Simsiana* Roem. et Schult. III. 613. no. 55.
— *Sinaïca* Delile. III. 614. no. 57.
— *Sipylea* Lam. III. 602. no. 11.
— Smyrnaea Boiss. III. 940.
— sordida Bth. VI. 664. no. 20.
— speciosa Prsl. III. 647. no. 184.
— *spectabilis* H. B. Kth. III. 666. no. 261.
— *spicata* Hort. III. 640. no. 154.
— spicata Roem. et Schult. III. 649. no. 191.
— *Spielmanniana* M. Bieb. III. 626. no. 95.
— *Spielmanni* Scop. III. 610. no. 46.
— *Spielmanni* Willd. III. 626. no. 95.
— *spinosa* Jacq. III. 614. no. 56.
— spinosa Linn. III. 613. no. 56.
— spiraeifolia Boiss. III. 941.
— splendens Sello. III. 658. no. 231.
— squalens H. B. Kth. III. 656. no. 219.
— stachyoides H. B. Kth. III. 633. no. 125.
— staminea Mart. et Gal. VI. 669. no. 44.
— staminea Montbr. et Auch. III. 617. no. 68.
— stenophylla Burch. III. 674. no. 292.
— stolonifera Bth. III. 662. no. 246.
— strictiflora Hook. III. 652. no. 205.
— subincisa Bth. III. 632. no. 122.
— subrotunda St. Hil. III. 660. no. 240.
— subsessilis E. Mey. III. 675. no. 295.
— *subtriloba* Schrank. III. 602. no. 11.
— suffruticosa Montbr. et Auch. III. 603. no. 16.
— *sylvestris* Jacq. III. 624. no. 89.
— sylvestris Linn. III. 623. no. 89.
— sylvicola Burch. III. 672. no. 285.
— *Syriaca* Gouan. III. 612. no. 51.

Salva Syriaca Linn. III. 612. no. 52.
— Tafallae Bth. III. 638. no. 145.
— *Taurica* Habl. III. 604. no. 21.
— *Taurica* Hortul. III. 622. no. 84. III. 623. no. 88.
— *Taurina* Hortul. III. 622. no. 84. III. 624. no. 89.
— tenella Swartz. III. 629. no. 107.
— *Tenorei* Spr. III.621. no. 81.
— tenuifolia Burch. III. 672. no. 286.
— *tenuifolia* Riv. III. 599. no. 1.
— *tenuior* Desf. III. 599. no. 2.
— *tetragona* Hort. III. 640. no. 154.
— *tetragona* Mnch. III. 639. no. 152.
— *thymiflora* Willd. III. 669. no. 272.
— thymoides Bth. III. 635. no. 132.
— *Tiberina* Mauri. III. 622. no. 84.
— tiliaefolia Vahl. III. 630. no. 113.
— Tingitana Ettl. III. 614. no. 58.
— Tmolea Boiss. III. 943.
— Tolimensis H. B. Kth. III. 670. no. 277.
— tomentella Pohl. III. 651. no. 199.
— *tomentosa* Mill. III. 601. no. 6.
— tortuosa H. B. Kth. III. 656. no. 220.
— triangularis Thnbrg. III. 676. no. 300.
— *trichostemmoides* Prsh. III. 631. no. 115.
— *tricolor* Hortul. III. 621. no. 81.
— tricuspidata Mart. et Gal. VI. 664. no. 15.
— triloba Linn. fil. III. 602. no. 11.
— *triloba* Sm. et Sbthrp. III. 602. no. 11.
— *truncata* Willd. III. 610. no. 46.
— tubifera Cav. III. 668. no. 270.
— tubiflora Sm. III. 653. no. 206.
  β. glabrata Bth.
— tubiformis Kltzsch. III. 662. no. 245.
— uliginosa Bth. III. 632. no. 123.
  β. rufescens.
— urticaefolia Linn. III. 636. no. 139.
— Uruguayensis St. Hil. III. 636. no. 138.
— *Valentina* Vahl. III. 624. no. 89.
— *variegata* Waldst. et Kit. III. 621. no. 81.
— varia Vahl. III. 618. no. 72.
— *variabilis* var. Loisel. III. 626. no. 96.
— velutina Bth. III. 650. no. 195.
— *venusta* H. B. Kth. III. 666. no. 263.
— verbascifolia M. Bieb. III. 616. no. 63.
— Verbenaca Linn. III. 625. no. 95.
  γ? incisa Bth. III. 626.
  β. oblongifolia Bth. III. 626.
— *verbenaca* Vahl. III. 626. no. 96.
— *verbanacoides* Brot. III. 626. no. 96.
— *verticillata* Fl. Gr. VI. 670. no. 48.
— verticillata Linn. III. 678. no. 307.
  β. mollis Bth.
  γ. pallida Bth.
— *verticillata* var. d'Urv. III. 678. no. 308.
Salvia violacea D. Don. III. 669. no. 272.
— violacea Rz. et Pav. III. 638. no. 146.
— virgata Ait. III. 622. no. 84.
— *virgata* Hortul. III. 623. no. 88.
— *virgata* Jacq. III. 622. no. 84.
— *virgata* Ort. III. 631. no. 117.
— *virgata* Savi. III. 621. no. 81.
— *viridis* Jacq. III. 610. no. 46.
— viridis Linn. III. 610. no. 46.
  β. floribus violaceis Bth.
— viscida St. Hil. III. 644. no. 170.
— viscosa Jacq. III. 622. no. 85.
— vitifolia Bth. III. 664. no. 257.
— *Vivianii* Spr. III. 626. no. 96.
— *vulnerariaefolia* Willd. III. 604. no. 21.
Salvieae Endl. III. 599. 980. VI. 661.
Salzmannia DC. *II. 470.
Salzwedelia sagittalis Flor. Wetter. V. 490. no. 67.
Samadera Gaertn. I. 525.
— glandulifera Prsl. I. 525. no. 2.
— Indica Gaertn. *I. 525. no. 1.
— Madagascariensis A. Juss. I. 525. no. 3.
— *tetrapetala* G. Don. I. 525. no. 3.
Samaneae DC. (Inga) I. 930. V. 617.
Sambuceae Kth. II. 450.
Sambucus Tournef. II. 453.
— *arborescens* Nutt. II. 453. no. 2. γ.
— bipinnata Cham. et Schlchtd. II. 453. no. 4.
— glauca Nutt. II. 453. no. 3.
— hirta Tausch. II. 453. no. 6.
— *Japonica* Thnbrg. II. 826. no. 1.
— lucida Tausch. II. 453. no. 5.
— pubens Michx. *II. 453. no. 2.
  γ. arborescens Torr. et Gr.
  β. leucocarpa Torr. et Gr.
— *racemosa* Hook. II. 453. no. 2.
— Wightiana Wall. II. 453. no. 1.
Sameraria DC. I. 182.
Sameraria Dsvx. °V. 44.
— Armena Dsvx. V. 44. no. 1.
Samoleae Endl. VI. 447.
Samoloides Boerh. III. 331. no. 1.
Samolus Linn. VI. 447.
— parviflorus N. ab E. VI. 447. no. 1.
Sampacca montana Rmph. I. 69. no. 4.
Samyda Linn. I. 546. V. 405.
— *parviflora* Linn. I. 547. no. 13.
— procera Poepp. et Endl. V. 406. no. 2.
— pubescens Desv. I. 546. no. 1.
— *serrulata* Mart. I. 546. no. 8.
— suaveolens Poepp. et Endl. V. 405. no. 1.
SAMYDEAE Gaertn. I. 546. II. 818. V. 405.
Sanchezia Rz. et Pav. III. 436. °III. 973. *VI. 654.

Sanchezia ovata Rz. et Pav. III. 436. no. 1.
Sandoricum Cav. I. 431.
— Indicum Cav. *I. 431. no. 1.
Sáne vel Orenj Kadsura Kämpf. V. 15. no. 1.
Sanguinaria L. I. 109.
— Canadensis L. *I. 109. no. 1.
— *grandiflora* Bosc. I. 109. no. 1.
Sanguisorba Linn. II. 44.
— alpina Bnge. II. 44. no. 2.
— annua Nutt. II. 44. no. 3.
— *Canadensis* Michx. II. 44. no. 4. *α.*
— Canadensis Linn. *II. 44. no. 4. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— *Canadensis β. latifolia* Hook. II. 44. no. 4. *β.*
— dodecandra Moretti. II. 44. no. 1.
— *Mauritanica* Dsf. II. 44. no. 1.
— *media* DC. II. 44. no. 4. *β.*
— *media* Linn. II. 44. no. 4.
Sanguisorbeae Torr. et Gr. II. 37. V. 655.
Sanicula Tournef. II. 387. V. 845.
— arctopoides Hook. et Arn. II. 388. no. 8.
— Azorica Guthnick. V. 845. no. 1.
— bipinnata Hook. et Arn. II. 388. no. 7.
— bipinnatifida Dougl. II. 388. no. 5.
— Chinensis Bnge. II. 387. no. 1.
— elata Hamilt. *V. 845. no. 2.
— laciniata Hook. et Arn. II. 388. no. 4.
— *Liberta* Cham. et Schlchtd. II. 388. no. 3.
— macrorhiza Colla. II. 387. no. 2.
— Menziesii Hook. et Arn. II. 387. no. 3.
— nudicaulis Hook. et Arn. II. 388. no. 6.
Saniculeae Koch. II. 387. V. 844.
Santia Wght. et Arn. II. 488. VI. 49.
— venulosa Wght. et Arn. *II. 488. no. 1. VI. 49. no. 1.
Santolina Tournef. II. 634.
— elegans Boiss. *II. 634. no. 2.
— *montana* Sbthrp. et Sm. VI. 187. no. 10.
— rosmarinifolia Mill. *II. 634. no. 1.
β. canescens Boiss.
α. vulgaris Boiss.
— *Sinaïca* Fresen. VI. 220. no. 5.
— *suaveolens* Prsh. II. 639. no. 1. II. 642. no. 1. VI. 194. no. 4.
Sanvitalia Gualt. *II. 622.
SAPINDACEAE Juss. I. 411. II. 813. V. 358.
Sapindeae Cambess. I. 411. V. 358.
Sapindus Linn. I. 416. V. 362.
— Abyssinicus Fresen. I. 417. no. 7.
— acuminatus Wall. I. 416. no. 6.
— *acutus* Rxb. I. 416. no. 1.
— *alternifolius* Hamilt. I. 416. no. 4.
— *Benghalensis* Rxb. I. 420. no. 4.
— Capensis Hochstett. V. 363. no. 5.
Sapindus? deficiens Wght. et Arn. I. 416. no. 3. (III. Emend. p. 2.)
— detergens Rxb. V. 362. no. 1.
— divaricatus Willd. I. 417. no. 14.
— Drummondii Hook. et Arn. I. 417. no. 12. (cum var. *β.* ibid.)
— *edulis* Ait. V. 364. no. 2.
— *edulis* Blume. I. 417. no. 1.
— esculentus St. Hil. Juss. et Cambess. I. 417. no. 15.
— *fraxinifolius* DC. I. 416. no. 4. I. 418. no. 1.
— fruticosus Rxb. V. 362. no. 3.
— glabrescens Hook. et Arn. I. 417. no. 11.
— Guineensis G. Don. I. 417. no. 8.
— *inaequalis* Schlchtd. I. 417. no. 12. *β.*
— juglandifolius Cambess. I. 417. no. 13.
— laurifolius Vahl. *I. 416. no. 1.
— *longifolius* Hamilt. I. 416. no. 4.
— *longifolius* Vahl. I. 417. no. 10.
— lucidus Desvx. I. 417. no. 10.
— microcarpus Rz. et Pav. I. 417. no. 9.
—? microcarpus Wght. et Arn. I. 416. no. 5. (III. Emend. p. 2.)
— *microcarpus* Wght. et Arn. I. 423. no. 3.
— obovatus Wght. et Arn. I. 416. no. 2. (III. Emend. p. 2.)
— Peruvianus Wlprs. V. 363. no. 6.
β. Dombeyanus.
α. Meyenianus.
— rubiginosus Rxb. *I. 416. no. 4.
— *salicifolius* DC. I. 418. no. 2.
— serratus Rxb. V. 362. no. 4.
— squamosus Rxb. V. 362. no. 2.
— *tetraphyllus* Vahl. I. 418. no. 1.
— trifoliatus Linn. I. 416. no. 1.
Saponaria Fnzl. (ex p.) II. 779.
Saponaria Linn. *I. 272.
—? *Honigbergeri* Fnzl. I. 277. no. 53.
— *inclusa* C. Koch. I. 268. no. 19.
—? *lutea* Pall. II. 777. no. 5.
— *pungens* Ldb. I. 282. no. 2.
— *Vaccaria* Linn. I. 272. no. 1.
Sapota Plum. VI. 455.
— ferruginea Casaretto. VI. 455. no. 1.
SAPOTACEAE Juss. VI. 454.
Sapoteae Meisn. VI. 454.
Saprosma Blume. *II. 480. VI. 45.
— dispar Hsskrl. VI. 45. no. 1.
Sarcanthemum Cass. *II. 594. *II. 952. no. 40.
Sarcocalyx Wlprs. I. 617.
— Capensis Wlprs. I. 617. no. 1.
Sarcocapnos DC. *I. 122. °V. 24.
— crassifolia DC. V. 25. no. 2.
— *enneaphylla* Boiss. V. 33. no. 1.
— enneaphylla DC. V. 24. no. 1.

Sarcocarpaea G. Don. VI. 390.
Sarcocarpum scandens Blume. I. 92. no. 2.
Sarcocephaleae DC. II. 513.
Sarcocephalus Afzel. *II. 513.
Sarcolaena Thouars. *I. 366.
Sarcolipes Eckl. et Zeyh. II. 252.
— *pubescens* Eckl. et Zeyh. II. 252. no. 1.
Sarcolippia Chamisso. IV. 44. no. 9.
Sarcolobus R. Br. * VI. 492.
Sarcophyllum Thnbrg. I. 627.
— *carnosum* Willd. I. 582. no. 1.
— *gnidioides* Willd. I. 582. no. 2.
— grandiflorum E. Mey. I. 627. no. 1.
— *grandiflorum* E. Mey. V. 453. no. 6.
Sarcoplacuntia Blume. II. 142.
Sarcopyramis Wall. *II. 148. °V. 687.
— lanceolata Wall. V. 687. no. 2.
— Nepalensis Wall. V. 687. no. 1.
Sarcostemma R. Br. VI. 485.
— arenarium Bth. VI. 485. no. 1.
— Donianum Dcne. * VI. 485. no. 2.
— grandiflorum Dcne. * VI. 485. no. 3.
Sarcostemmae Dcne. V. 485.
Sarcostyles Peruviana Prsl. II. 377. no. 2.
Sarcozygium Bnge. II. 823. ° V. 385.
— xanthoxylum Bnge. *II. 823. no. 1. V. 385. no. 1.
Sarmienta Rz. et Pav. *II. 714. * VI. 407. * VI. 655.
Sarosanthera Krthls. V. 130.
— excelsa Krthls. V. 130. no. 1.
Sarotes Lindl. I. 337.
— ledifolia Endl. *I. 337. no. 1.
Sarothamnus Wimm. I. 627.
— affinis Boiss. I. 627. no. 5.
— arboreus B. Webb. *I. 627. no. 4.
— Baeticus B. Webb. I. 627. no. 2.
— eriocarpus Boiss. et Reut. I. 628. no. 8.
— Gaditanus Boiss. et Reut. I. 628. no. 7.
— Malacitanus Boiss. I. 627. no. 6.
— patens B. Webb. I. 627. no. 1.
— virgatus B. Webb. I. 627. no. 3.
Sarothra Linn. I. 384. no. 5. I. 387.
— *Drummondii* Grev. et Hook. I. 388. no. 46.
— *gentianoides* Linn. I. 387. no. 45.
— *hypericoides* Nutt. I. 387. no. 45.
Sarracenia Linn. I. 108. V. 20.
— *adunca* Sm. I. 109. no. 5.
— *calceolata* Nutt. I. 107. no. 4.
— *Catesbaei* Ell. I. 109. no. 6.
— Drummondii Croom. I. 108. no. 3.
— flava L. *I. 109. no. 6.
— *heterophylla* Eaton. I. 108. no. 1.
— *minor* Walt.? I. 109. no. 5.
— psittacina Michx. I. 108. no. 4.
— *pulchella* Croom. I. 109. no. 4.
Sarracenia purpurea Linn. *I. 108. no. 1. *V. 20. no. 1.
— rubra Walt. *I. 108. no. 2.
— variolaris Michx. *I. 109. no. 5.
Sarraceniaceae Endl. I. 108.
Sarracenici DC. (Senecio) VI. 258. no. 6.
Sarracha Rz. et Pav. III. 28. °III. 954. VI. 575.
— biflora Rz. et Pav. III. 29. no. 9.
— Brasiliensis Kltzsch. *III. 29.
— contorta Rz. et Pav. III. 28. no. 3.
— dentata Rz. et Pav. III. 29. no. 8.
— geniculata Mart. et Gal. VI. 575. no. 1.
— Jaltomata Schlchtd. III. 28. no. 4.
— micrantha DC. *III. 29.
— Peruviana D. Dietr. *III. 29.
— procumbens Rz. et Pav. III. 28. no. 1.
— pubescens Willd. III. 29. no. 11.
— punctata Rz. et Pav. III. 28. no. 5.
— *solanacea* Pers. III. 58. no. 157.
— umbellata DC. III. 28. no. 2.
— villosa G. Don. III. 29. no. 7.
— viscosa Schrad. III. 29. no. 10.
— Zuccagniana Roem. et Schult. III. 29. no. 6.
Sassa Bruce. V. 598. no. 3.
Sassia perdicaria Molina. I. 485. no. 109.
— *tinctoria* Molina. I. 481. no. 56.
Satureineae Bth. III. 687. III. 981. VI. 670.
Satureja Bth. III. 707.
Satureja Linn. III. 707. °III. 982.
— *Americana* Poir. III. 561. no. 174.
— angustifolia Prsl. III. 710. no. 17.
— *approximata* Biv. III. 721. no. 16.
— *approximata* Frivalsk. III. 708. no. 5.
— campanella Ehrenb. III. 709. no. 11.
— *canescens* Guss. III. 722. no. 20.
— *capitata* Linn. III. 703. no. 31.
— *condaea* Juss. III. 561. no. 174.
— *congesta* Horn. III. 720. no. 10. γ.
— *consentina* Ten. III. 720. no. 10. β.
— *cuneifolia* Ten. III. 708. no. 3.
— *fasciculata* Rafin. III. 721. no. 16.
— *fasciculata* Tausch. III. 708. no. 4.
— *filiformis* Desf. III. 723. no. 22. β.
— *filiformis* Ten. III. 722. no. 21.
— globifera Desf. *III. 710.
— *Graeca* Linn. III. 720. no. 10.
— hirsuta Prsl. III. 710. no. 15.
— *hirsuta* Prsl. III. 720. no. 9. β.
— hortensis Linn. III. 707. no. 1.
— *hirta* Host. III. 720. no. 10. γ.
— *hyssopifolia* Bert. III. 708. no. 3 .
— *Illyrica* Host. III. 708. no. 3.
— *incana* Spr. III. 725. no. 36.

Satureja inodora Host. III. 720. no. 11.
— inodora Salzm. III. 708. no. 6.
— intermedia C. A. Mey. III. 709. no. 13.
— *Juliana* Linn. III. 720. no. 9.
— *Juliana* var. *canescens* Guss. III. 720. no. 9. *β*.
— longiflora Prsl. III. 710. no. 18.
— *micrantha* Hoffmnsgg. et Lnk. III. 720. no. 10.
— *microphylla α*. Guss. III. 723. no. 22. *α*.
— *microphylla β. γ. δ*. Guss. III. 723. no. 22. *β*.
— montana Linn. III. 708. no. 3.
— mutica Fisch. et Mey. III. 708. no. 7.
— *nervosa* Desf. III. 722. no. 21.
— *obovata* Lag. III. 708. no. 3.
— olla Ehrnbrg. III. 709. no. 12.
— *origanoides* Linn. III. 713. no. 1.
— *ovata* R. Br. III. 723. no. 23.
— parviflora Prsl. III. 710. no. 16.
— *parviflora* Visiani. III. 720. no. 11.
— pachyphylla C. Koch. III. 709. no. 8.
— *punctata* R. Br. III. 723. no. 25.
— *pygmaea* Sieb. III. 708. no. 3.
— rigida Bartr. III. 709 no. 10.
— rupestris Wulf. III. 707. no. 2.
— scabra Prsl. *III. 710.
— sessiliflora Prsl. III. 710. no. 14.
— *spicata* Vis. III. 708. no. 4.
— spinosa Linn. III. 708. no. 5.
— *stricta* Russ. III. 789. no. 70.
— *subspicata* Vis. III. 708. no. 3.
— *Teneriffae* Lnk. III. 723. no. 22. *α*.
— *tenuifolia* Ten. III. 720. no. 10. *γ*.
— *tenuis* Lnk. III. 721. no. 13.
— Thymbra Linn. III. 709. no. 9.
— *thymifolia* Scop. III. 707. no. 2. III. 727. no. 3.
— *thymoides* Lowe. III. 721. no. 15.
— *Tragoriganum* Tausch. III. 709. no. 9.
— *trifida* Mnch. III. 708. no. 3.
— *varia* Berth. III. 721. no. 15.
— *variegata* Host. III. 708. no. 3.
— *viminea* Burm. III. 707. no. 1.
— *viminea* Linn. III. 725. no. 36.
— virgata Visiani. III. 708. no. 4.
— *Virginiana* Linn. III. 690. no. 10.
Sauarja VI. 448. no. 1.
Saul Ilarea Rxb. V. 127. no. 1.
— *Tumbugaja* Rxb. V. 127. no. 2.
Saurauja Willd. I. 370. II. 801. V. 131.
— barbigera Hook. I. 372. no. 25.
— Blumeana Horsf. et Benn. I. 372. no. 23.
— bacteosa DC. I. 372. †
— cuneata Blume. I. 371. no. 3.
— distatosa Krthls. I. 371. no. 15.
Saurauja excavata Krthls. I. 371. no. 13.
— fasciculata Wall. I. 372. no. 21.
— ferox Krthls. I. 371. no. 16.
— hirsuta Blume. I. 371. no. 10.
— Jackiana Krthls. *I. 371. no. 8.
— leprosa Krthls. I. 371. no. 14.
— leucocarpa Schlchtd. I. 372. no. 24.
— leucophloia Krthls. I. 371. no. 6.
— media Krthls. I. 371. no. 7.
— micrantha Blume. I. 371. no. 4.
— mollis Hsskrl. V. 131. no. 1.
— Nepalensis DC. I. 372. †
— nigrescens Krthls. I. 371. no. 11.
— Noronhiana Blume. I. 370. no. 1.
— paniculata Wall. II. 801. no. 2.
— pedunculata Hook. I. 372. no. 26.
— pendula Blume. I. 370. no. 2.
— Punduana Wall. I. 372. no. 22.
— Reinwardtiana Blume. I. 371. no. 9.
— Sakoëmbagensis Krthls. I. 371. no. 19.
— setigera Krthls. I. 371. no. 17.
— Singalangensis Krthls. I. 372. no. 20.
— spectabilis Hook. II. 801. no. 1.
— subcordata Krthls. I. 371. no. 5.
— Tewensis Krthls. I. 371. no. 18.
— Vulcani Krthls. I. 371. no. 12.
Saurauјeae Endl. I. 370. V. 131.
Saussurea DC. II. 668. VI. 282.
— amoena Kar. et Kir. II. 668. no. 3.
— bracteata Dcne. II. 668. no. 7.
— ceratocarpa Dcne. II. 668. no. 6.
— fruticulosa Kar. et Kir. II. 668. no. 4.
— macrophylla Sauter. II. 668. no. 1.
— nivea Turcz. II. 668. no. 2.
— obvallata Edgeworth. *VI. 282. no. 2.
— *pinnatifida* Mnch. III. 775. no. 3.
— piptaptera Edgeworth. *VI. 282. no. 1.
— pterocaulon Dcne. II. 668. no. 8.
— pulchella DC. II. 668. †
— sacra Edgeworth. VI. 282. no. 3.
— sordida Kar. et Kir. II. 668. no. 5.
SAUVAGEAE Ging. I. 225. V. 60.
Sauvagesia L. I. 225. II. 767.
— deflexifolia Gardn. II. 767. no. 1.
— elata Bth. I. 225. no. 5.
— *elegantissima* St. Hil. I. 226. no. 2.
— *erecta* Spr. I. 225. no. 2.
— *laxa* Mart. I. 225. no. 3.
— linearifolia St. Hil. I. 225. no. 4.
— *pusilla* Mart. I. 225. no. 4.
— racemosa St. Hil. I. 225. no. 1.
— rubiginosa St. Hil. I. 225. no. 3.
— *serpyllifolia* Mart. I. 225. no. 2.
— Sprengelii St. Hil. I. 225. no. 2.
SAUVAGESIEAE Bartl. I. 225. II. 767. V. 60.
Savignya DC. *I. 188.

Saviniona acerifolia B. Webb et Berthel. I. 290. no. 2.
— *brachyfolia* B. Webb et Berthel. I. 291. no. 6.
Saxifraga L. II. 362. II. 936. V. 824.
— adenophora C. Koch. V. 825. no. 8.
— aestivalis Fisch. et Mey. II. 364. no. 18.
— *amplexifolia* Strnbrg. V. 827. no. 1.
— *Andicola* H. B. Kth. II. 367. no. 43. β.
— Arundana Boiss. II. 363. no. 9.
— *aspera* M. Bieb. II. 365. no. 4. *a.* adn.
— bimaculata Turcz. II. 364. no. 17.
— biternata Boiss. II. 363. no. 8.
— Boussignaultii A. Brogn. II. 368. no. 44.
— Brunoniana Wall. II. 365. no. 26.
— *caesia* Scop. II. 363. no. 3.
— caespitosa L. *II. 365. no. 6. adn.
— *Californica* Nutt. II. 372. no. 6.
— Candollei Tausch. II. 363. no. 4.
— Carpetana Boiss. et Reut. II. 363. no. 6.
— *Chamissonis* Strnbrg. II. 365. no. 5. β. adn.
— chrysosplenifolia Boiss. V. 825. no. 10.
— ciliata Royle.*) II. 365. no. 23. V. 827. †
— *Clusii a.* Ser. II. 365. no. 9. adn.
— cochleariaefolia Schrad. II. 368. no. 45.
— Cordillerarum Prsl. II. 367. no. 43.
δ. laxa II. 368. no. 43.
β. Bonplandi II. 367. no. 43.
γ. Haenkei II. 367. no. 43.
— *coriacea* Fisch. V. 827. no. 1.
— coriophylla Griseb. V. 825. no. 5.
— corymbosa Boiss. V. 824. no. 1.
— *Cretica annua minima hederaceo folio* Tournef. V. 826. no. 12.
— cymbalaria Linn. V. 826. no. 13.
— *cymbalaria* Sbthrp. V. 826. no. 14.
— diversifolia Wall. V. 827. †
— elata Nutt. II. 367. no. 38.
— elegans Mackay. II. 364. no. 13.
— elegans Nutt. II. 366. no. 35.
— Eschscholtzii Strnbrg. *II. 365. no. 2. adn.
— exarata Vill. *II. 365. no. 7. adn.
— excavata Knze. II. 364. no. 19.
— Facchinii Koch. V. 825. no. 7.
— *ferruginea* Grah. II. 366. no. 9. β. adn.
— *fimbriata* Don. II. 365. no. 2. adn.
— *Fischeri* Ser. II. 365. no. 8. adn.
— Friderici Augusti Biasoletto. II. 936. no. 1.
— flabellifolia R. Br. II. 366. no. 32.
— *flagellaris* R. Br. II. 365. no. 4. β. adn.
— flagellaris Willd. *II. 365. no. 4. adn.
— foliolosa R. Br. II. 367. no. 42.
— gemmulosa Boiss. II. 363. no. 5.
— *Geum* var. δ. Hook. II. 361. no. 13.

*) Cf. Saxifragam imbricatam Royle.

Saxifraga Geum Sibthrp. V. 826. no. 11.
— glabella Bertol. II. 363. no. 11.
— granigera C. Koch. V. 827. no. 16.
— *Groenlandica* L. II. 365. no. 6. adn.
— Haenseleri Boiss. et Reut. II. 363. no. 7.
— *hederacea* M. Bieb. V. 826. no. 13.
— hederacea Linn. V. 826. no. 12.
— hieracifolia Wldst. et Kit. *II. 366. no. 11. adn.
— hirculoides Dcne. II. 364. no. 20.
— hirculus DC. *II. 365. no. 3. adn.
— *hirsuta β.* Ser. II. 364. no. 18.
— *hirsuto-Aizoon* Rchb. V. 825. no. 9.
— Hostii Tausch. II. 362. no. 2.
— *hyperborea* R. Br. II. 366. no. 12. adn.
— *hypnoides β. condensata* Ser. II. 367. no. 41.
— imbricata Bertoloni. II. 363. no. 10.
— imbricata Royle.*) II. 365. no. 24.
— integrifolia Hook. II. 366. no. 34.
— Jacquemontiana Dcne. II. 364. no. 21.
— Jamesiana Torr. II. 367. no. 36.
— lactea Turcz. II. 364. no. 16.
— *lanuginosa* Jacquem. II. 364. no. 20.
— *leucanthemifolia* Hook. II. 366. no. 9. β. adn.
— leucanthemifolia Lapeyr. *II. 365. no. 9. adn.
— *leucanthemifolia* Michx. II. 366. no. 9. *a.* adn.
— ligulata Wall. II. 368. †
— Maderensis Don. II. 368. †
— Martensiana Bngrd. II. 366. no. 30.
— *marginata* Bory et Chaub. V. 824. no. 3.
— *micrantha* Fisch. V. 827. no. 1.
— mucronulata Royle. II. 365. no. 25.
— multiflora Ldb. II. 361. no. 14.
— *myosotidifolia* Pall. II. 365. no. 4. *a.* adn.
— *Nelsoniana* Hook. et Arn. II. 367. no. 37.
— *nervosa* Lapeyr. II. 365. no. 7. adn.
— *Nootkana* Moç. II. 366. no. 9. δ. adn.
— odontophylla Wall. II. 365. no. 27.
— Olympica Boiss. V. 826. no. 11.
— oppositifolia L. *II. 365. no. 1. adn.
— *orientalis* Jcq. V. 826. no. 13.
— *paradoxa* Strnbrg. II. 362. no. 1.
— *parvicalyx* Jcquem. II. 364. no. 21.
— *parviflora* Bivona. V. 826. no. 12.
— Pavonii Don. II. 368. †
— *pectinata* Prsh. II. 51. no. 22.
— Pensylvanica L. *II. 366. no. 10. adn.
— Peruviana Strnbrg. II. 368. †
— petraea L. *II. 366. no. 13. adn.
— *planifolia* Strnbrg. II. 365. no. 8. adn.
— *plantaginifolia* Hook. II. 366. no. 11. adn.

*) Nec ciliata, quae est no. 23.

Saxifraga Ponae Strnbrg. II. 366. no. 13. adn.
— *propinqua* R. Br. II. 365. no. 3. adn.
— pseudo-Burseriana Fisch. II. 365. no. 28.
— *pubescens* Strnbrg. II. 365. no. 7. adn.
— *punctata* Strnbrg. II. 364. no. 18.
— *pyrolifolia* Don. V. 827. no. 1.
— ramulosa Wall. II. 368. †
— ranunculifolia Hook. II. 367. no. 39.
— reflexa Hook. II. 366. no. 31.
— *reticulata* Willd. V. 826. no. 13.
— *retusa* Strnbrg. II. 365. no. 1. adn.
— Richardsonii Hook. II. 367. no. 37.
— rivularis L. *II. 366. no. 12. adn.
— *rotundifolia* Bory et Chaub. V. 825. no. 10.
— *rupestris* Willd. II. 366. no. 13. adn.
— sancta Griseb. V. 825. no. 6.
— Scardica Griseb. V. 824. no. 2.
— scotophila Boiss. V. 827. no. 15.
— *semidodecandra* Wormsk. II. 364. no. 18.
— *semipubescens* Don. II. 366. no. 10. adn.
— Sempervivum C. Koch. V. 824. no. 4.
— serpyllifolia Prsh. *II. 365. no. 8. adn.
— setigera Prsh. II. 365. no. 4. adn.
— Sibthorpii Boiss. et Sprun. V. 826. no. 14.
— sileniflora Cham. II. 367. no. 41.
γ. minor Prsl.
β. uniflora Hook.
— *spinulosa* Royle. II. 365. no. 25.
— Spruneri Boiss. V. 824. no. 3.
— squarrosa Sieb. II. 363. no. 3.
— *squarrosa* Sieb. II. 363. no. 10.
— Stabiana Ten. II. 364. no. 12.
— *stellaris β. Brunoniana* Bngrd. II. 366. no. 9. δ. adn.
— *stellaris* var. *comosa* Willd. II. 367. no. 42.
— stenophylla Royle. II. 364. no. 22.
— Sullivantii Torr. et Gr. II. 367. no. 40.
— Terektensis Bnge. II. 364. no. 15.
— thyrsoidea Tausch. II. 362. no. 1.
— Tolmiaei Torr. et Gr. II. 366. no. 29.
— tricuspidata Rtz. *II. 365. no. 5. adn.
— Wildiana Knze. V. 825. no. 9.
— Wolleana Torr. et Gr. II. 366. no. 33.
SAXIFRAGACEAE DC. II. 362. II. 936. V. 823.
Saxifrageae DC. II. 362. V. 823.
Scabiosa Roem. et Schult. II. 534. VI. 86.
— ambigua Friv. II. 537. no. 22.
— *ambrosioides* Fl. Graec. II. 533. no. 2.
— anthemifolia Eckl. et Zeyh. II. 536. no. 17.
— arenaria Forsk. II. 536. no. 12.
— Aucheri Boiss. II. 535. no. 5.
— Baetica Boiss. II. 537. no. 20.
— *Bellidis folio humilis etc.* Moris. IV. 176. no. 7. *α.*
Scabiosa Bellidis folio humilis, caule nudo, radice non repente Moris. IV. 174. no. 1.
— *Bellidis folio minima Pyrenaica* Moris. IV. 176. no. 7. *β.*
— bipinnata C. Koch. II. 534. no. 2. *VI. 86. no. 1.
— *Bisnagarica seu Globularia frutescens etc.* Pluk. IV. 177. no. 11.
— brachycarpa Boiss. et Hohenack. III. 536. no. 9.
— breviscapa Boiss. VI. 86. no. 2.
— *Brunoniana* Wall. II. 532. no. 3.
— Buëkiana Eckl. et Zeyh. II. 536. no. 16.
— *Columbaria γ.* Pollin. II. 536. no. 15.
— cosmoides Boiss. II. 535. no. 8.
— *Cretica β. trifoliolata* Bory et Chaub. II. 535. no. 4.
— diffusa Rchb. II. 536. no. 13.
— *Gramuntia β.* Seb. II. 536. no. 15.
— hispidula Boiss. II. 535. no. 7.
— Hymettia Boiss. et Spruner. II. 535. no. 4.
— Joppensis Rchb. II. 537. no. 18.
— linifolia C. Koch. II. 535. no. 3.
— *pilosa* Roem. et Schult. II. 535. no. 7.
— pulsatilloides Boiss. II. 537. no. 19.
— Reuteriana Boiss. II. 535. no. 6.
— rhodantha Kar. et Kir. II. 536. no. 11.
— *Salcedi* Lag. II. 533. no. 3.
— Saviana Rchb. *II. 536. no. 15.
— semipapposa Slzm. *II. 536. no. 14.
β. gracilis Boiss.
— Soongarica Schrenk. II. 536. no. 10.
— speciosa Royle. II. 537. no. 21.
— Taygetia Boiss. VI. 86. no. 3.
— *tenuifolia β. coerulea* Savi. II. 536. no. 15.
— tenuis Spruner. II. 534. no. 1.
— *tomentosa* E. Mey. II. 536. no. 16.
— *tomentosa* Sbthrp. et Sm.? VI. 86. no. 2.
— triniaefolia Friv. II. 537. no. 23.
— *uniseta* Savi. II. 536. no. 15.
— *urceolata* Dsf. *β. bipinnatisecta* Boiss. II. 537. no. 20.
Scabioseae DC. II. 532.
Scaevola Linn. II. 712. VI. 390.
— Benthamiana Vriese. VI. 392. no. 21.
— Candollei Vriese. VI. 391. no. 4.
— depressa Vriese. VI. 392. no. 20.
— fastigiata Vriese. VI. 391. no. 7.
— flaccida Vriese. VI. 391. no. 9.
— geniculata Vriese. VI. 390. no. 1.
— glabra Hook. et Arn. VI. 393. †
— glaucescens Vriese. VI. 392. no. 18.
— holosericea Vriese. VI. 391. no. 11.
— humifusa Vriese. VI. 392. no. 19.
— longifolia Vriese. VI. 392. no. 17.
— lyratifolia Vriese. VI. 391. no. 3.

Scaevola multiflora Lindl. II. 712. no. 1.
— paniculata Vriese. VI. 391. no. 10.
— platyphylla Lindl. II. 712. no. 3.
— prostrata Vriese. VI. 391. no. 5.
— pterosperma Vriese. VI. 392. no. 13.
— pusilla Vriese. VI. 393. no. 23.
— Reinwardtii Vriese. VI. 392. no. 14.
— repens Vriese. VI. 391. no. 6.
β. angustifolia.
— rufa Vriese. VI. 390. no. 2.
— sphaerocarpa Vriese. VI. 392. no. 16.
— squarrosa Lindl. II. 712. no. 2.
— stricta Vriese. VI. 391. no. 12.
— tenera Vriese. VI. 392. no. 15.
β. pauciflora.
— trinervia Vriese. VI. 391. no. 8.
— umbellata Vriese. VI. 39. no. 22.
β. denticulata.
α. procumbens.
γ. spathulata.
Scaevoleae R. Br. II. 712. VI. 389.
Scalesia Arn. *II. 611.
Scalia DC. VI. 235. no. 1.
Scaligeria DC. *II. 427. V. 923.
— Tournefortii Boiss. V. 923. no. 1.
β. juncea.
Scaliopsis Wlprs. II. 645.
— Lucaeana Wlprs. *II. 645. no. 1.
— *Lucaeana* Wlprs. VI. 235. no. 1.
Scandicineae Koch. II. 421. V. 903.
Scandicium C. Koch. II. 421.
Scandix Gaertn. II. 421. V. 903.
— Aucheri Boiss. V. 903. no. 2.
— *grandiflora β. glabrata* DC. V. 904. no. 4.
— Hispanica Boiss. V. 904. no. 3.
— hispidula Bertoloni. V. 903. no. 1.
— orientalis Griseb. V. 904. no. 4.
— Persica Mart. II. 421. no. 1.
— pinnatifida Vent. *II. 421. no. 2.
γ. hirsuta C. Koch.
β. Soongarica Schrenk.
Scaphium Schott et Endl. °V. 104.
— Wallichii Schott et Endl. *V. 104. no. 1.
Scapiflora Rchb. (Papaver) I. 110.
Scapigera DC. (Stylidium) VI. 368.
Scariola DC. VI. 352. no. 1.
Scepseothamnus Schlchtd. II. 523.
— gardenioloides Cham. II. 523. no. 1.
— ?rotunda Cham. II. 523. no. 3.
— vinosa Cham. II. 523. no. 2.
Sceura marina Forsk. IV. 132. no. 1. IV. 133. no. 1. *ε.*
Schelveria arguta Nees et Mart. III. 178. no. 2.
Schepperia Hook. I. 196.
— aphylla Eckl. et Zeyh. *I. 196. no. 1.
Scheru-Schunda Rheede. III. 89. no. 365.
Scheru-valli Caniram Rheede. V. 137. no. 1.
Schidiomyrtus Schauer. II. 920. °V. 734.
— crenulata Schauer. *II. 920. no. 1. *V. 734. no. 1.
— diosmifolia Schauer. *II. 920. no. 3. *V. 734. no. 3.
— micrantha Schauer. *II. 920. no. 5. *V. 934. no. 5.
— Sieberi Schauer. *II. 920. no. 2. *V. 734. no. 2.
— tenella Schauer. *II. 920. no. 4. *V. 734. no. 4.
Schiedea Cham. et Schlchtd. II. 249. V. 788.
— ligustrina Cham. et Schlchtd. *II. 249. no. 1. V. 788. no. 1.
— Menziesii Hook. V. 789. no. 3.
— Nutallii Hook. V. 789. no. 2.
Schima Reinwardt. °V. 135.
— antherisosa Krthls. V. 135. no. 3.
— crenata Krthls. V. 135. no. 2.
— Noronhae Reinwardt. V. 135. no. 1.
Schimpera Steud. et Hochstett. *I. 192.
— Arabica Steud. et Hochstett. *I. 192. no. 1.
Schinus Linn. I. 550. V. 413.
— Aroeira Vellozo. I. 550. no. 2.
— *Benghalensis* Ham. I. 558. no. 1.
— ?discolor Bth. V. 413. no. 1.
— mollis Linn. 550. †
— *Niara* Ham. I. 558. no. 1.
— rhoifolia Mart. I. 550. no. 3.
— *Saheria* Ham. I. 558. no. 1.
— *terebinthifolia* Raddi. I. 560. no. 3.
— ternifolia Gill. I. 550. no. 1.
Schistanthe Knze. III. 151. °III. 958. *VI. 636.
— peduncularis Knze. III. 151. no. 1.
Schistocarpha Lssng. *VI. 250.
— bicolor Lssng. VI. 250. no. 1.
Schistocodon Schauer. °VI. 479.
— Meyenii Schauer. VI. 479. no. 1.
Schistogyne Hook. et Arn. VI. 488.
— sylvestris Hook. et Arn. *VI. 488. no. 1.
Schistophragma Bth. III. 270. °III. 963. *VI. 643.
— Mexicana Bth. III. 270. no. 1.
Schistostephium Krbs. *II. 637.
Schiwereckia Andrz. I. 142.
— Podolica DC. I. 142. no. 1. †
Schizandra Michx. *I. 92.
SCHIZANDREAE Blume. I. 92. II. 748. V. 15.
Schizandreae Blume. (ex p.) I. 92.
Schizanthus Rz. et Pav. III. 232. °III. 960. *VI. 634.
— candidus Lindl. III. 233. no. 6.
— Ewansianus Paxton. III. 936.
— Grahami Hook. III. 233. no. 7.

Schizanthus Hookeri Gillies. III. 233. no. 5.
— pinnatifidus Lindl. III. 233. no. 3.
— pinnatus Rz. et Pav. III. 232. no. 1.
β. humilis Lindl. III. 232. no. 1. III. 936.
— porrigens Grah. III. 233. no. 2.
— Priestii Paxton. III. 936.
— retusus Hook. III. 233. no. 4. III. 936.
Schizeilema Hook. fil. V. 844.
Schizocalyx Hochstett. °V. 375.
— coriaceus Hochstett. V. 375. no. 1.
Schizocarpum Schrader. II. 203.
— filiforme Schrader. *II. 203. no. 1.
Schizocarya Spach. II. 97.
—? *crispa* Spach. II. 97. no. 12.
— *Drummondii* Spach. II. 97. no. 10.
— *Kunthii* Spach. II. 97. no. 11.
— *micrantha* Spach. II. 97. no. 9.
Schizochiton Spr. I. 429.
— divergens Spr. I. 429. no. 2.
— patens Spr. I. 429. no. 1.
Schizoglossum E. Mey. *VI. 486.
Schizogyne Cass. *II. 601. *II. 953. no. 6. VI. 141.
— *glaberrima* DC. VI. 141. no. 1.
— *sericea* DC. VI. 141. no. 1.
— sericea C. H. Schultz. VI. 141. no. 1.
β. glabra.
γ. intermedia.
α. tomentosa.
Schizolaena Thouars. *I. 366.
Schizolobium Vogel. I. 811. V. 557.
— excelsum Vogel. *I. 811. no. 1. V. 557. no. 2.
— glutinosum Tulasne. V. 557. no. 1.
Schizomeria Don. II. 373. V. 829.
— ovata Don. *II. 373. no. 1. V. 829. no. 1.
Schizonepeta Bth. III. 774.
Schizopetaleae Endl. I. 192.
Schizopetalon Hook. I. 192. °V. 51.
— maritimum Barnéoud. V. 51. no. 2.
— Walkerii Hook. *I. 192. no. 1. V. 51. no. 1.
Schizophragma Siebld. et Zucc. II. 377. V. 836.
— hydrangeoides Siebld. et Zucc. *II. 377. no. 1. V. 836. no. 1.
Schizophyllum Nutt. II. 620. VI. 170.
— *micranthum* Nutt. II. 620. no. 1. VI. 170. no. 1.
Schizopleura Lindl. II. 162. II. 929.
— Dampieri Cunn. II. 162. no. 1.
— *Dampieri* Cunn. II. 929. no. 8.
— macrostemon Lindl. II. 162. no. 2.
— *macrostemon* Lindl. II. 929. no. 4.
— purpurea Lindl. II. 162. no. 3.
— *purpurea* Lindl. II. 929. no. 6.
Schizostigma Arn. (Genus Cucurbitaceum) II. 199.
— asperatum Arn. *II. 199. no. 1.
— *asperatum* Arn. VI. 50. no. 1. adn.
Schizostigma Arn. (Genus Rubiaceum) II. 490. VI. 50.
— hirsutum Arn. *II. 490. no. 1. VI. 50. no. 1.
Schkuhria Bth. II. 625. VI. 175.
— *abrotanoides* Don. II. 625. no. 2.
— Bonariensis Hook. et Arn. II. 625. no. 2.
— isopappa Bth. VI. 175. no. 1.
— multiflora Hook. et Arn. II. 625. no. 1.
Schlechtendalia Lssng. *II. 678. *VI. 312.
Schlegelia Miquel. *VI. 517.
Schleichera Willd. I. 421. V. 366.
— amoena Wlprs. V. 366. no. 1.
— *pentapetala* Rxb. V. 363. no. 2.
— trijuga Willd. *I. 421. no. 1.
Schleidenia Endl. *VI. 557.
Schmidelia L. I. 414. II. 814. V. 361.
— Abyssinica Hochstett. II. 815. no. 5. V. 361. no. 1.
— affinis Guill. et Perr. I. 415. no. 7.
— Africana DC. *I. 415. no. 6.
— Amazonica Mart. I. 415. no. 14.
— Bantamensis Blume. I. 414. no. 1.
— Bojeriana Cambess. I. 415. no. 8.
— dioica Mart. I. 415. no. 13.
— edulis Juss. St. Hil. et Cambess. I. 415. no. 10.
— floribunda Poepp. et Endl. II. 815. no. 4.
— fulvinervis Blume. I. 414. no. 2.
— inaequilatera Mart. I. 415. no. 15.
— Javensis Blume. I. 414. no. 3.
— laevis Cambess. I. 415. no. 12.
— littoralis Blume. I. 414. no. 4.
— macrocarpa A. Rich. II. 815. no. 7.
— marginata Vahl. I. 415. †
— nervosa A. Rich. II. 815. no. 6.
— paniculata Poepp. et Endl. II. 814. no. 2.
—? *pinnata* DC. I. 416. no. 1.
— puberula Cambess. I. 415. no. 11.
— punctata Poepp. et Endl. II. 814. no. 1.
— quercifolia Mart. I. 415. no. 16.
— scrobiculata Poepp. et Endl. II. 815. no. 3.
— *Senegalensis* Rchb. I. 415. no. 6.
— sericea Cambess. I. 415. no. 9.
— serrata DC. *I. 414. no. 5.
— villosa Wght. V. 362. no. 2.
Schmidtia Mnch. *II. 685.
Schnella Raddi. I. 853. V. 572.
Schnella Raddi. I. 851.
— *brachystachya* Bth. I. 852. no. 71.
— flexuosa Wlprs. V. 572. no. 2.
— *longipetala* Bth. I. 852. no. 72.

Schnella rosea Wlprs. V. 572. no. 3.
— *splendens* Bth. I. 851. no. 64.
— vestita Bth. V. 572. no. 1.
Schnittspahnia C. H. Schultz. °VI. 276.
— Rüppellii C. H. Schultz. VI. 276. no. 1.
— Schimperi C. H. Schultz. VI. 276. no. 2.
Schönia Steetz. °VI. 243.
— Cassiniana Steetz. VI. 244. no. 2.
—? Humboldtiana Steetz. *VI. 244. no. 3.
— oppositifolia Steetz. VI. 243. no. 1.
Schoenleinia Kltzsch. °VI. 70.
— barbinervis Kltzsch. VI. 70. no. 2.
— cuspidata Kltzsch. *VI. 70. no. 1.
Schoenolaena Bnge. °V. 841.
— juncea Bnge. V. 841. no. 1.
— tenuior Bnge. V. 841. no. 2.
Schoepfia Linn. *II. 803.
Scholtzia Schauer. II. 922. °V. 736.
— obovata Schauer. II. 922. no. 1. *V. 736. no. 1.
Schomburgkia DC. II. 629. VI. 180.
— *caleoides* DC. VI. 180. no. 1.
Schotia Jcq. I. 844.
— angustifolia E. Mey. I. 844. no. 2.
— diversifolia Wlprs. I. 844. no. 6.
— *latifolia* Eckl. et Zeyh. I. 844. no. 6.
— latifolia Jcq. I. 844. no. 5.
— parvifolia Dehnbrdt. I. 844. no. 4.
— speciosa Jcq. *I. 844. no. 1.
— stipulata Ait. *I. 844. no. 3.
— *tamarindifolia* Afz. I. 844. no. 1.
Schousboea cordifolia Schum. et Thonn. II. 68. no. 1.
Schouwia DC. I. 188.
— Arabica DC. *I. 188. no. 1.
Schraderia Vahl. *II. 490. VI. 51.
— *hastata* Mnch. III. 609. no. 41.
— stellata Bth. VI. 52. no. 2.
— umbellata Prsl. VI. 51. no. 1.
Schranckia Willd. I. 883. °V. 585.
— aculeata Willd. *I. 884. no. 6.
— angustata Torr. et Gr. I. 884. no. 8.
— brachycarpa Bth. I. 884. no. 3.
— elata Mart. et Galeotti. V. 586. no. 1.
— leptocarpa DC. *I. 884. no. 5.
— macrostachya Bth. I. 883. no. 1.
— rhodostachya Bth. I. 883. no. 2.
— Selloi Bth. I. 884. no. 4.
— uncinata Willd. *I. 884. no. 7.
Schrebera Rxb. *VI. 464.
Schreibersia Pohl. *II. 506.
Schrenkia Fisch. et Mey. II. 427.
— vaginata Fisch. et Mey. II. 427. no. 1.
Schubertia Martius et Zucc. VI. 485.
— graveolens Lindl. *VI. 485. no. 1. VI. 742.
Schudia Chilensis Molin. II. 423. no. 3.
Schuebleria Martius. *VI. 501.
Schuechia Endl. II. 68. V. 663.
— Brasiliensis Endl. *II. 68. no. 1. V. 663. no. 1.
Schufia Spach. II. 95.
Schuguolo ambassa II. 945. no. 5.
Schultesia Martius VI. 502.
— heterophylla Miquel. VI. 502. no. 1.
Schultzia Spr. *II. 392. V. 850.
— compacta Ldb. *V. 850. no. 1.
β. laciniata.
— *crinita* Spr. II. 404. no. 1.
Schumacheria Vahl. I. 64.
— castaneaefolia Vahl. *I. 64. no. 1.
β. Grahamii Arn.
α. Vahlii Arn.
Schwalbea Linn. III. 397. °III. 971. *VI. 652.
— Americana Linn. *III. 397. no. 1.
Schwalbeae Bth. VI. 652.
Schwannia Adr. Juss. V. 355.
Schwannia Endl. °V. 353.
— anisandra Adr. Juss. V. 354. no. 3.
— caudata Adr. Juss. V. 353. no. 2.
— crassistipula Adr. Juss. V. 355. no. 5.
— elegans Adr. Juss. V. 355. no. 6.
— janusioides Adr. Juss. V. 353. no. 1.
— muricata Adr. Juss. V. 354. no. 4.
Schweiggera Mart. I. 393.
— *comata* Mart. I. 393. no. 1.
Schweiggeria Spr. I. 223. II. 767.
— floribunda St. Hil. *I. 223. no. 1.
— Mexicana Schlchtd. I. 223. no. 3.
— pauciflora Mart. I. 223. no. 2. *II. 767. no. 1.
Schweinitzia Ell. *II. 734.
Schwenkia Linn. *VI. 633.
Sciadophyllum P. Browne. II. 431. II. 939. V. 926.
— anomalum G. Don. II. 431. no. 2.
— *longifolium* Blume. II. 430. no. 1.
— macrostachyum Bth. II. 939. no. 1.
— sphaerocoma Bth. V. 926. no. 1.
— verticillatum Spanoghe. II. 431. no. 1.
Sciothamnus Endl. II. 412.
— Capensis Endl. *II. 412. no. 1.
β. angustifolius.
— collinus Endl. II. 413. no. 4.
— montanus Endl. II. 413. no. 3.
— virgatus Endl. *II. 413. no. 2.
Sclarea Aethiopis Mill. III. 615. no. 60.
— *argentea* Mill. III. 615. no. 62.
— *ceratophylla* Mill. III. 618. no. 70.
— *decidua* Mnch. III. 626. no. 96.
— *distans* Mnch. III. 620. no. 78.
— *glutinosa* Mill. III. 609. no. 42.

Sclarea Indica Mill. III. 612. no. 50.
— *lanata* Mnch. III. 615. no. 60.
— *Lusitanica* Mill. III. 622. no. 83.
— *Mexicana* Dill. III. 667. no. 266.
— *nemorosa* Mill. III. 624. no. 89.
— *pratensis* Mill. III. 621. no. 81.
— *punctata* Mnch. III. 624. no. 89.
— *sylvestris* Mill. III. 624. no. 89.
— *Syriaca* Mill. III. 624. no. 89.
— *tomentosa* Mill. III. 609. no. 41.
— *tuberosa* Mill. III. 621. no. 81.
— *vulgaris* Mill. III. 613. no. 55.
Sclerantheae Lnk. I. 266. II. 770. V. 76.
Scleranthus Linn. I. 266.
— divaricatus Dumort. I. 266. no. 1.
Sclerocarpus Jcq. fil. *II. 612.
— *exiguus* Smith. VI. 183. no. 1.
— *gracilis* Smith. VI. 182. no. 1.
Sclerocarya Hochstett. °V. 418.
— birrea Hochstett. V. 418. no. 1.
Sclerocephalus Boiss. °V. 75.
— Aucheri Boiss. V. 75. no. 1.
Sclerolepis Cass. *II. 546.
Scleroleima Hook. °VI. 227.
— forsteroides Hook. VI. 228. no. 1.
Sclerolobium Vogel. I. 809. V. 551.
— chrysophyllum Poepp. et Endl. V. 552. no. 3.
— denudatum Vogel. I. 809. no. 1.
— macrophyllum Vogel. I. 809. no. 2.
—? paniculatum Vogel. I. 809. no. 3.
— rubiginosum Martius. V. 551. no. 1.
— sericeum Tulasne. V. 552. no. 2.
Scleromitrion Wght. et Arn. II. 497.
Scleroon Bth. °VI. 692.
— oleinum Bth. * VI. 692. no. 1.
Sclerosciadium Koch. *II. 401.
Sclerostemma Koch. II. 534.
Sclerostylis Blume. I. 380. II. 804.
— Arnottiana Wght. II. 804. no. 1.
— atalantioides Wght. et Arn. I. 380. no. 6.
— lanceolata Blume. I. 380. no. 2.
— macrophylla Blume. I. 380. no. 5.
— ovalifolia Wght. I. 380. no. 7.
— parvifolia Wght. I. 381. no. 10.
— pentaphylla Blume. I. 380. no. 4.
— racemosa Wght. I. 381. no. 9.
— Roxburghii Wght. *I. 381. no. 11.
— spinosa Blume. I. 380. no. 1.
— trifoliata Blume. I. 380. no. 3.
— Zeylanica Wght. I. 380. no. 8.
Sclerothamnus R. Br. *I. 576.
Sclerotheca DC. jun. *V. 375.
Sclerothrix Prsl. II. 225. V. 777.
— fasciculata Prsl. *II. 225. no. 1. V. 777. no. 1.
Scolosanthus Vahl. *II. 483.
Scolospermum Lssng. *II. 604.
Scolymeae Lssng. II. 683. VI. 326.
Scolymus Cass. *II. 683. *VI. 326.
Scolymus DC. (ex p.) II. 683.
Scoparia Schauer. (Leptospermum) II. 167.
Scoparia Linn. III. 331. °III. 968. *VI. 645.
— annua Cham. et Schlchtd. III. 332. no. 3.
— *arborea* Linn. III. 332. no. 1. β.
— *arborea* Thnbrg. III. 331. no. 3.
— *australis* Sieb. III. 905. no. 9.
— australis Sieb. *III. 333.
— dulcis Linn. III. 331. no. 1.
β. arborea } Wlprs. III. 332.
α. procumbens }
— elliptica Cham. et Schlchld. III. 332. no. 6.
— ericacea Cham. et Schlchtd. III. 332. no. 4.
— flava Cham. et Schlchtd. III. 332. no. 2.
—? gypsophiloides Wlprs. III. 333. no. 8.
— pinnatifida Cham. et Schlchtd. III. 333. no. 7.
— plebeja Cham. et Schlchtd. III. 332. no. 5.
— *procumbens* Jcq. III. 332. no. 1.
— *ternata* Forsk. III. 331. no. 1.
Scopolia Jcq. III. 22. °III. 954.
— Carniolica Jcq. III. 22. no. 1.
— *inermis* Sm. I. 523. no. 2.
— *lanceolata* Spr. I. 523. no. 1.
— *lucida* Forst. V. 927. adn.
— *Megapotamica* Spr. I. 523. no. 3.
— *paniculata* Spr. I. 523. no. 2.
— *venosa* Spr. I. 523. no. 4.
Scopolina Schult. III. 22.
— *atropoides* Schult. III. 22. no. 1.
Scordium Bth. III. 913.
— *maritimum fruticosum procumbens* Sloan. III. 269. no. 25.
— *spinosum* Cav. III. 913. no. 45.
Scorodonia Bth. III. 911.
Scorodonia G. Don. III. 165. III. 447.
— *Arduini* Rchb. III. 910. no. 29.
— *betonicaefolia* Link. III. 904. no. 3.
— *botrys* Ser. III. 915. no. 49.
— *cordata* Moench. III. 913. no. 42.
— *floribus spicatis etc.* Sloane. IV. 34. no. 1.
— *Fontanesiana* Ser. III. 912. no. 40.
— *heteromalla* Moench. III. 912. no. 39.
— *lancifolia* Moench. III. 913. no. 43.
— *Massiliensis* Linn. III. 913. no. 42.
— *Salviastrum* Link. III. 912. no. 40.
— *spicata* Mnch. III. 910. no. 28.
— *spinosa* Link. III. 914. no. 45.
— *sylvestris* Link. III. 912. no. 39.
Scorpioides Spach. (Genista) V. 481.
Scorpium Erinaceae facie luteum etc. Tournef. V. 473. no. 28.

Scorpiurus Bth. (Desmodium) V. 525.
Scorpiurus L. *I. 724.
Scorpius Spach. II. 910.
— *spinosus* Mnch. V. 472. no. 25.
Scorzonella Nutt. II. 684. *VI. 328.
— glauca Nutt. II. 684. no. 3.
— laciniata Nutt. II. 684. no. 1.
— leptosepala Nutt. II. 684. no. 2.
Scorzonera DC. (ex p.) II. 689. VI. 346.
Scorzonera Linn. II. 689. VI. 349.
— argyrea Boiss. VI. 350. no. 4.
— *Aucheriana* DC. VI. 347. no. 7.
— Baetica Boiss. II. 689. no. 1.
— Cariensis Boiss. VI. 350. no. 5.
— *Cretica* Willd. VI 346. no. 3.
— *divaricata* Auch. VI. 347. no. 7.
— elata Boiss. VI. 350. no. 6.
— *ensifolia* M. Bieb. VI. 346. no. 4.
— *eriophora* DC. VI. 347. no. 8.
— *hirsuta* Linn. VI. 346. no. 1.
— intricata Boiss. VI. 351. no. 10.
— *Ispahanica* Boiss. VI. 347. no. 11.
— *lanata* M. Bieb. VI. 346. no. 5. *β.*
— *lasiosperma* M. Bieb. VI. 346. no. 2.
— *latifolia* DC. VI. 346. no. 6.
— Lawrencii Hook. fil. VI. 733.
— limnophila Boiss. VI. 351. no. 8.
— lorea Griseb. VI. 349. no. 1.
— macrophylla Fisch. et Mey. II. 689. no. 2.
— *macrophylla* Schrenk. VI. 347. no. 9.
— *macrosperma* Turczan. VI. 346. no. 1.
— *mollis* M. Bieb. II. 688. no. 2.
— *montana β. Baetica* DC. II. 689. no. 1.
— *nervosa* Treviran. VI. 346. no. 6.
— *nova* Dsf. VI. 340. no. 3.
— *paniculata* Boiss. VI. 347. no. 12.
— picridioides Boiss. VI. 350. no. 2.
— *Quitensis* Humb. VI. 334. no. 16.
— *sessilis* Humb. VI. 334. no. 16.
— stenocephala Boiss. VI. 350. no. 3.
— subaphylla Boiss. VI. 351. no. 9.
— *taraxacifolia* Jcq. VI. 342. no. 7.
— tuberosa C. Koch. VI. 351. no. 7.
— *tuberosa* Pall. VI. 346. no. 5. *a.*
— vaginata Bertoloni. VI. 733.
— *veratrifolia* Fnzl. VI. 347. no. 13.
Scorzonereae Lssng. II. 688. VI. 344.
Scottia R. Br. I. 578. II. 833.
— angustifolia Lindl. II. 833. no. 1.
— dentata R. Br. I. 578. †
— laevis Lindl. I. 578. no. 1.
Scovitsia vid. Szovitsia.
Scrofularia Matth. III. 168. no. 19.
Scrophularia Dod. III. 168. no. 19.
Scrophularia Tournef. III. 164. III. 447. °III. 958. VI. 638.
Scrophularia aestivalis Griseb. III. 447. no. 85.
— Altaica Murr. III. 169. no. 25.
— *altera Ruta canina dicta* Park. III. 175. no. 61.
— *Americana densiori scabro folio etc.* Raj. III. 177. no. 7.
— *annua Catalonica montis Serrati* Raj. III. 177. no. 5.
— *annua folio Lamii luteo* Moris. III. 165. no. 1.
— *annua Senecionis folio* Moris. III. 177. no. 3.
— *appendiculata* Balbis. III. 171. no. 34.
— *appendiculata* Jcq. III. 170. no. 30.
— *appendiculata* Lnk. III. 170. no. 30. *β.*
— aquatica Linn. III. 170. no. 33. (c. varr. *β.* et *γ.*)
— *aquatica major* C. Bauh. III. 171. no. 33.
— *aquatica major, caule fimbriato* Loisel. III. 171. no. 33.
— *aquatica montana mollior* Barr. III. 168. no. 21. III. 169. no. 23.
— *arguta* Ait. III. 166. no. 9.
— *Armena minimo folio subrotundo* Tournef. III. 172. no. 46.
— ascendens Willd. III. 176. no. 73.
— *atropurpurea* Moretti. III. 175. no. 61.
— Aui C. Koch. III. 173. no. 47.
— auriculata Linn. III. 170. no. 32.
— *auriculata* L.? III. 167. no. 16. *β.*
— *auriculata* Scop. III. 168. no. 21.
— Balbisii Hornem. III. 171. no. 34.
— *betonicaefolia* DC. III. 169. no. 27. *β.*
— betonicaefolia Tournef. III. 169. no. 23.
β. glabra Wydler.
γ. thyrso folioso Wydler.
— bicolor Sibthrp. III. 173. no. 50.
— *bicolor* Sm. III. 175. adn.
— biserrata Willd. III. 169. no. 28.
— caesia Sm. III. 175. no. 66.
— Californica Cham. et Schlchtd. III. 168 no. 22.
— calycina Bth. III. 175. no. 64.
— canescens Bongrd. III. 449. no. 93.
— canina Linn. III. 174. no. 61.
— *canina* Hoppe. III. 175. no. 62.
— *canina β.* Willd. III. 175. adn.
— *canina β.* et *δ.* Wydler. III. 175. no. 62.
— Castagneana Wydler. III. 167. no. 11.
— *caule alato* Riv. III. 171. no. 33.
— Chinensis Sm. III. 176. no. 71.
— *chrysanthemifolia* M. Bieb. III. 175. adn. et no. 61.
— *coccinea* Linn. III. 150. no. 2.
— coccinea Linn. III. 176. no. 72.
— *cordata* Waldst. et Kit. III. 165. no. 1.

Scrophularia crenophila Boiss. VI. 638. no. 2.
— cretacea Fisch. III. 176. no. 68.
— *Cretica* Rivin. III. 174. no. 54.
— *Cretica frutescens, folio vario crassiore* Tournef. III. 174. no. 60.
— *Cretica latifolia* Park. III. 173. no. 52.
— *Cretica prima* Clus. III. 173. no. 52.
— *Cretica secunda* Clus. III. 166. no. 9.
— crithmifolia Boiss. III. 165. no. 2.
β. alpina.
— decomposita Royle. III. 174. no. 55.
— decora Fisch. Mey. et Lallem. III. 935.
— dentata Royle. III. 176. no. 67.
— depauperata Boiss. III. 448. no. 90.
— deserti Delile. III. 174. no. 56.
— divaricata Ledeb. III. 172. no. 43.
— *ebulifolia* M. Bieb. III. 165. no. 3.
— ebulifolia Lnk. et Hffmnsgg. III. 171. no. 36. (c. var. β. ibid.)
— elatior Wall. III. 167. no. 15.
— farinosa Boiss. VI. 638. no. 1.
— filicifolia Sm. III. 173. no. 54.
β. minor Boiss. III. 449. no. 54.
— *flore luteo* C. Bauh. III. 164. no. 1.
— *flore rubro Camerarii* J. Bauh. III. 166. no. 9.
— *Fluminensis* Arrabida. III. 391. no. 2.
— *foemina* Cam. III. 171. no. 33.
— foetida Wydler. III. 169. no. 29.
— *foliis difformibus etc.* Miller. III. 935.
— *foliis filicis modo laciniatis etc.* C. Bauh. III. 173. no. 52.
— *foliis laciniatis* C. Bauh. III. 166. no. 8.
— *foliis linearibus ex pinnato dentatis etc.* Gmel. III. 177. no. 11.
— frigida Boiss. VI. 639. no. 4.
— *frutescens* DC. III. 175. no. 65.
— frutescens Linn. III. 174. no. 57.
— *frutescens* var. β. Sm. III. 174. no. 60.
— *geminiflora* Lam. III. 166. no. 9.
— *glabrata* Spr. III. 176. no. 76.
— glabrata Ait. III. 169. no. 27.
β. pubescens.
— glandulifera Clarke. III. 450. no. 96.
— *glandulosa* Waldst. et Kit. III. 168. no. 21.
— *glauco folio in amplas lacinias diviso* Tournef. III. 173. no. 52.
— *grandidentata* Tenore III. 168. no. 21.
— grandiflora DC. III. 166. no. 7.
— *grandiflora* Rchb. III. 166. no. 8. β. III. 935.
— hastata Raf. III. 176. no. 74.
— Herminii Lnk. et Hffmnsgg. III. 169. no. 24.
— heterophylla Willd. III. 174. no. 60.
— heucheriaeflora Schrenk. III. 167. no. 17.
— Himalayensis Royle. III. 167. no. 13.
Scrophularia hirsuta Schott. *III. 178.
— hirta Lowe. III. 165. no. 5.
— *Hispanica Sambuci folio glabro* Tournef. III. 166. no. 8.
— hispida Dsf. III. 170. no. 31.
— Hoppei Koch. III. 175. no. 62.
— hypericifolia Wydler. III. 176. no. 69.
— Ilwensis C. Koch. III. 172. no. 40.
β. minor.
— incisa Weinm. III. 172. no. 42.
— *Indica* Ger. III. 170. no. 30. III. 173. no. 52.
— *Indica capitulis maximis* J. Bauh. III. 170. no. 30.
— *Juratensis* Schleich. III. 175. no. 62.
— laciniata Waldst. et Kit. III. 171. no. 38.
— *laevigata* Vahl. III. 170. no. 30.
— lanceolata Prsh. III. 168. no. 18.
— lancifolia Prsl. III. 177. no. 84.
— *latifolia* Host. III. 165. no. 1.
— lepidota Boiss. III. 450. no. 94.
— *lucida* M. Bieb. III. 171. no. 38.
— lucida Linn. III. 173. no. 52. (c. var. β. ibid.)
— livida Smith. III. 173. no. 49.
— luridiflora Fisch. et Mey. III. 165. no. 6.
— *Lusitanica frutescens, Verbenae folio* Raj. III. 174. no. 57.
— *Lusitanica maximo flore, foliis dissectis* Raj. 166. no. 8. β. III. 935.
— *lutea* Tabern. III. 165. no. 1.
— *lutea magna amplis foliis* J. Bauh. III. 165. no. 1.
— lyrata Willd. 171. no. 35.
— *major* Brunf. III. 168. no. 19.
— *major altera elegans* Park. III. 166. no. 9.
— *major hirsuta* Tournef. III. 168. no. 21.
— *major vulgaris* Park. III. 168. no. 19.
— marginata Boiss. III. 450. no. 95.
— *Mariana Ebuli folio singulari* Pluk. III. 177. no. 6.
— Marylandica Linn. III. 168. no. 20.
— *Marylandica longo profunde serrato Urticae folio* Ray. III. 168. no. 20.
— *maxima Lusitanica folio Sambuci lanuginoso* Tournef. III. 166. no. 8. β. III. 935.
— *maxima radice fibrosa* J. Bauh. III. 171. no. 33.
— *maxima strumosa* Chabr. III. 171. no. 33
— *melissaefolia* Tournef. III. 167. no. 10.
— melissaefolia d'Urville. III. 176. no. 75.
— *mellifera* Ait. III. 935. no. 8. β.
— *mellifera* Boiss. III. 935. no. 8.
— *mellifera* Vahl. III. 166. no. 8.
— *meridionalis* Mutis. III. 151. no. 8.
— meridionalis Prsl. III. 177. no. 83.

Scrophularia micrantha d'Urville. III. 172. no. 44.
— minima M. Bieb. III. 176. no. 70.
— *minor Ruta canina dicta* Moris. III. 177. no. 2.
— *minore* Savi. III. 166. no. 9.
— *montana humilis angusto serrato crassiusculo folio* Messerschm. III. 177. no. 10.
— *montana maxima latifolia* Barrel. III. 165. no. 1.
— *montanae aut venenatae species tertia* C. Gesn. III. 173. no. 52. III. 175. no. 61.
— multicaulis Turczan. III. 173. no. 53.
— *multifida* Lam. III. 175. no. 61.
— multifida Willd. III. 173. no. 51.
— nepetaefolia Prsl. III. 176. no. 76.
— *nepetifolia* Sm. III. 168. no. 21.
— nodosa Linn. III. 168. no. 19. (c. var. β. et γ. ibid.)
— *nodosa β. Americana* Michx. III. 168. no. 20.
— *nodosa foetida* C. Bauh. III. 168. no. 19.
— *Noveboracensis flore viridi rubente etc.* Raj. III. 177. no. 8.
— nudicaulis Wydler. III. 177. no. 78.
— oblongifolia Loisel. III. 177. no. 79.
— Olivieriana Wydler. III. 172. no. 41.
— Olympica Boiss. III. 449. no. 91.
— *orientalis* Habl. III. 173. no. 48.
— orientalis Linn. III. 165. no. 3.
— *orientalis Chrysanthemi folio* Tournef. III. 175. adn.
— *orientalis foliis cannabinis* Tournef. III. 165. no. 3.
— *orientalis minima, folio subrotundo* Tournef. III. 176. no. 70.
— *orientalis minor Melissae folio* Tournef. III. 176. no. 66
— *palustris non foetida sive aquatica minor* C. Bauh. III. 177. no. 1.
— Patriniana Wydler. III. 171. no. 39.
— pauciflora Bth. III. 165. no. 4.
— peregrina Linn. III. 166. no. 9.
— *peregrina altera* Park. III. 170. no. 30.
— *peregrina frutescens* Breyn. III. 174. no. 57.
— *peregrina Telephii folio non descripta* Raj. III. 177. no. 4.
— *physaloides* Moç. et Sess. III. 230. no. 3. III. 452. no. 1.
— Pinardi Boiss. III. 449. no. 92.
— *pinnata* Mill. III. 175. adn.
— pinnata Karel. et Kiril. III. 174. no. 59.
— pinnatifida Brot. III. 174. no. 58.
— polyantha Royle. III. 167. no. 14.
— procumbens Arrabida. *III. 178.
Scrophularia pyramidalis Wydler. III. 175. no. 63.
— racemosa Lowe. III. 167. no. 16.
α. longifolia.
β. puberula.
— *radice fibrosa, Betonicae foliis* Moris. III. 171. no. 33.
— *radice fibrosa* Morand. III. 171. no. 33.
— *radice nodosa* Moris. III. 168. no. 19.
— ramosissima Loiss. III. 175. no. 65.
— rivularis Moris. III. 177. no. 81.
— *rugosa* Hort. Lugd. III. 169. no. 23.
— *rugosa* Willd. III. 168. no. 21.
— rupestris M. Bieb. III. 173. no. 48.
— *Ruta canina dicta* C. Bauh. III. 175. no. 61.
— sambucifolia Alp. III. 166. no. 8. III. 935.
α. acuminata Fisch. Mey. et Lallem. III. 935.
[β. hirsuta Wydler. III. 166. no. 8.]
β. mellifera Fisch. Mey. et Lallem. III. 935.
γ. thyrso aphyllo Wydler. III. 166. no. 8.
— *sambucifolia* Kniphf. III. 935.
— *sambucifolia* Lnk. III. 935.
— *sambucifolia* Willd. III. 166. no. 8. β.
— *Sambuci foliis, capsulis maximis* Moris. III. 166. no. 8. III. 935.
— *Sambuci folio, flore rubro* etc. Pluk. III. 170. no. 30.
— *saxatilis lucida Laserpitii Massiliensis folio* Bocc. III. 173. no. 52.
— scariosa Boiss. III. 448. no. 88.
— Scopolii Hoppe. III. 168. no. 21. (c. var. β.)
— *scordiifolia* Grisl. III. 167. no. 10.
— *Scorodonia* Dsf. III. 167. no. 10.
— *Scorodonia* Host. III. 168. no. 21.
— Scorodonia Linn. III. 166. no. 10.
— *scorodoniaefolia* Moris. III. 167. no. 10.
— *Scorodoniae folio maximo etc.* Raj. III. 177. no. 9.
— *sexangularis* Much. III. 166. no. 9.
— *Sibthorpiana* Spr. III. 174. no. 60.
— *silaifolia* Clarke. III. 173. no. 51.
— Skellii Spr. III. 177. no. 77.
— Smithii Hornem. III. 169. no. 26.
— Smyrnaea Boiss. III. 447. no. 86.
— Stelleriana Steud. *III. 178.
— subaphylla Boiss. VI. 639. no. 3.
— subhastata Arrabida. *III. 178.
— *subrotundo crasso et nigricante folio etc.* Bocc. III. 170. no. 30.
— subverticillata Moris. III. 177. no. 82.
— tanacetifolia Willd. III. 171. no. 37.
— Taygetea Boiss. III. 448. no. 89.
— Tmolea Boiss. III. 447. no. 87.
— trifoliata Linn. III. 170. no. 30. (c. var. β.)

Scrophularia umbrosa Dumort. III 177. no. 80.
— *urticaefolia* C. Bauh. III. 166. no. 9.
— urticaefolia Wall. III. 167. no. 12.
— Urvilleana Wydler. III. 172. no. 45. (c. var. *β*.)
— variegata M. Bieb. III. 172. no. 46.
— *verbenaefolia* Dsf. III. 171. no. 38.
— vernalis Linn. III. 164. no. 1.
— *viridiflora* Poir. III. 166. no. 8.
— *vulgaris et major* J. Bauh. III. 168. no. 19.
SCROPHULARIACEAE Lindl. VI. 633.
SCROPHULARINAE R. Br. III. 127. III. 957.
SCROPHULARINEAE R. Br. VI. 633.
Scutellaria Linn. III. 747. °III. 984. VI. 673.
Scutellaria etc. Gmel. III. 749. no. 7. III. 757. no. 46.
— *Adamsii* Spr. III. 757. no. 46.
— agrestris St. Hil. III. 751. no. 18.
— albida Linn. III. 753. no. 31.
— alpina Linn. III. 749. no. 7.
β. floribus flavis Bth.
— *Altaica* Fisch. III. 749. no. 7.
— *altissima* Hamilt. III. 753. no. 27.
— *altissima* Linn. III. 753. no. 29.
— *ambigua* Nutt. III. 759. no. 55.
— *angulosa* Bth. III. 762. no. 68.
— angustifolia Pursh. III. 757. no. 45.
— antirrhinoides Bth. III. 760. no. 57.
— atriplicifolia Bth. III. 749. no. 10.
— *barbata* D. Don. III. 758. no. 49.
— bicolor Hochstett. VI. 673. no. 2.
— breviflora Bth. III. 750. no. 16.
— *breviflora* Turczan. III. 758. no. 51.
— *cana* Wall. III. 762. no. 67.
— canescens Nutt. III. 754. no. 35.
— *Caroliniana* Lam. III. 756. no. 40.
— *Caroliniana* Walt. III. 755. no. 38.
— *Caucasica* Hamilt. III. 748. no. 1.
— *celtidifolia* Hamilt. III. 762. no. 68.
— coccinea H. B. Kth. III. 750. no. 12.
— Colebrookiana Wall. III. 752. no. 22.
— Columnae All. III. 762. no. 27.
— commutata Guss. III. 753. no. 29.
— *compressa* Hamilt. III. 749. no. 7.
— coerulea Moç. et Sessé. III. 760. no. 62. (c. var. *β*. pag. 761.)
— cordifolia Fisch. III. 757. no. 46. * VI. 673. no. 5.
β. Adamsii Bth. III. 757. no. 46.
— *cordifolia* Mühlenb. III. 754. no. 34.
— *Cretica* Linn. III. 910. no. 29.
— *Cretica* Mill. III. 754. no. 31.
— Cumanensis H. B. Kth. III. 761. no. 65.
— *decumbens* Sieb. III. 754. no. 32.
— discolor Colebr. III. 751. no. 19.
— Drummondii Bth. III. 760. no. 59.
Scutellaria elliptica Mhlnbrg. III. 755. no. 38.
— *epilobiifolia* Hamilt. III. 757. no. 47.
— *Felisperti* Nees et Mart. III. 751. no. 17.
— ? fruticosa Desf. III. 748. no. 5.
— galericulata Linn. III. 757. no. 47.
γ. glaberrima }
α. pubescens } Bth.
β. vulgaris }
— *gracilis* Nutt. III. 760. no. 58.
— *grandiflora* Adams. III. 756. no. 43.
— grandiflora Sims. III. 748. no. 3.
— grossa Wall. III. 762. no. 26.
— Hartwegi Bth. VI. 673. no. 4.
— hastaefolia Linn. III. 758. no. 48.
— Havanensis Jacq. III. 758. no. 52.
— hederacea Kth. et Bouché. VI. 674. no. 7.
— heterophylla Montbr. et Auch. III. 756. no. 44.
— hirta Sibthrp. et Sm. III. 754. no. 32.
— humilis R. Br. III. 759. no. 54.
— *hyssopifolia* Linn. III. 756. no. 40.
— incarnata Vent. III. 750. no. 13. VI. 674. †
β. minor. Bth. III. 750. no. 13.
— incurva Wall. III. 752. no. 25.
— *Indica* D. Don. III. 751. no. 19.
— Indica Linn. III. 751. no. 20.
— *Indica* Roxb. III. 752. no. 23.
— integrifolia Linn. III. 755. no. 40.
β. hispida Bth. III. 756.
— *Japonica* Burm. III. 509. no. 39. III. 733. no. 23.
— *Japonica* Hort. Lips. VI. 674. no. 7.
— Japonica Morren et Dcne. III. 751. no. 21.
— lateriflora Linn. III. 762. no. 69.
— ? linearis Bth. III. 756. no. 41.
— longifolia Bth. III. 749. no. 8.
— *lupulina* Linn. III. 749. no. 7. *β*.
— macrantha Fisch. III. 756. no. 43.
— malvaefolia H. B. Kth. III. 761. no. 64.
— microphylla Moç. et Sess. III. 759. no. 53.
— minor Linn. III. 758. no. 51.
— Moçiniana Bth. III. 761. no. 63.
— mollis R. Br. III. 760. no. 60.
— multicaulis Boiss. VI. 673. no. 3.
— multiflora Bth. III. 749. no. 9.
— nervosa Prsh. III. 760. no. 58.
— *nigrescens* Spr. III. 754. no. 31. adn.
— *nodulosa* Hamilt. III. 752. no. 23.
— nummulariaefolia Hook. fil. VI. 673. no. 6.
— oblonga Bth. III. 752. no. 24.
— orientalis Linn. III. 747. no. 1.
β. pinnatifida Bth. III. 748.
— *ovalifolia* Pers. III. 755. no. 38. *β*. III. 756. no. 40.
— *pallida* M. Bieb. III. 754. no. 31.
— *pallida* Guss. III. 753. no. 27.

Scutellaria parviflora Rafin. III. 760. no. 58.
— parvula Michx. III. 759. no. 55.
— pectinata Montbr. et Auch. III. 748. no. 4.
— peregrina Linn. III. 753. no. 30.
— *peregrina* Rxb. III. 758. no. 49.
— *peregrina* Sibthrp. et Sm. III. 753. no. 27.
— *peregrina* Waldst. et Kit. III. 753. no. 29.
— pilosa Michx. III. 755. no. 38. (cum var. β. ibid.)
—? pinnatifida Hamilt. III. 748. no. 6.
— *polymorpha* Hamilt. III. 756. no. 40.
— prostrata Jcquem. III. 748. no. 2.
— *pubescens* Mühlnbrg. III. 755. no. 35.
— *pulchella* Bnge. III. 748. no. 3.
— purpurascens Swrtz. III. 750. no. 17.
— *racemosa* Pers. III. 758. no. 50.
— repens Hamilt. III. 762. no. 67.
— resinosa Torrey. III. 759. no. 56.
— rivularis Wall. III. 758. no. 49.
— *rubicunda* Hornem. III. 753. no. 30.
— rumicifolia H. B. Kth. III. 758. no. 50.
— rupestris Boiss. et Heldr. VI. 674. no. 8.
— salviaefolia Bth. III. 754. no. 33.
— saxatilis Riddel. III. 755. no. 37.
— scandens D. Don. III. 762. no. 68.
— *serrata* Andrws. III. 755. no. 36.
— *serrata* Spr. III. 754. no. 35.
— *Sieversii* Bnge. III. 748. no. 1.
— splendens Kltzsch. III. 749. no. 11.
— *splendens* Kltzsch. VI. 673. no. 5.
— *squamulosa* Hamilt. III. 758. no. 49.
— *teucriifolia* Sm. III. 760. no. 58.
— tomentosa Bertoloni. VI. 673. no. 1.
— Tournefortii Bth. III. 753. no. 28.
— tuberosa Bth. III. 760. no. 61.
— tubiflora Bth. III. 750. no. 14.
— uliginosa St. Hil. III. 750. no. 15.
— *utriculata* Labill. III. 754. no. 32.
— *variegata* Spr. fil. III. 749. no. 7.
— *verna* Besser. III. 749. no. 7. β.
— versicolor Nutt. III. 754. no. 34. β. bracteata Bth.
—? viscidula Bnge. III. 756. no. 42.
— volubilis H. B. Kth. III. 761. no. 66.
— villosa Elliot. III. 755. no. 39.
— violacea Heyne. III. 752. no. 23. β. hispidior.
— *Wallichiana* Hamilt. III. 762. no. 67.
— *Wightiana* Bth. III. 752. no. 23. β.
Scutellarineae Bth. III. 745. III. 984. VI. 673.
Scyphanthus elegans Don. II. 225. no. 1. V. 779. no. 1.
Scyphiphora Gaertn. *II. 463.
Scyphogyne Ad. Brogn. *II. 729.
Scytalia Chinensis Grtnr. V. 361. no. 2.
Scytalia Danura Rxb. V. 365. no. 9.
— *Litchi* Rxb. V. 364. no. 2.
— *Longan* Rxb. I. 420. no. 4. *a.*
— *oppositifolia* Rxb. V. 365. no. 7.
— *parviflora* Rxb. V. 365. no. 6.
— *Ramboutan* Rxb. V. 365. no. 3.
— *rimosa* Rxb. V. 365. no. 4.
— *rubia* Rxb. V. 365. no. 5.
— *verticillata* Rxb. V. 365. no. 8.
Scytalis anomala Vogel. I. 779. no. 8.
— *Catjang* E. Mey. I. 778. no. 1.
— *heliocopus* E. Mey. I. 779. no. 6.
— *hispida* E. Mey. I. 778. no. 3.
— *protracta* E. Mey. I. 778. no. 4.
— *retusa* E. Mey. I. 778. no. 5.
— *tenuis* E. Mey. I. 778. no. 2.
Scytophyllum Eck. et Zeyh. I. 536.
— laurinum Eckl. et Zeyh. *I. 537. no. 5.
— obtusum Eckl. et Zeyh. *I. 537. no. 4.
— oleoides Eckl. et Zeyh. *I. 537. no. 6.
Scytorium Vogel? I. 845. adn. no. 2.
Sebaea R. Br. *VI. 500.
Sebipira ferruginea Vogel. I. 808 no. 1.
— *major* Mart. I. 808. no. 2.
Secamone R. Br. *VI. 481.
Secamoneae R. Br. VI. 481.
Sechium P. Br. II. 204.
— Amazonicum Poepp. et Endl. II. 204. no. 2.
— Peruvianum Poepp. et Endl. II. 204. no. 1.
Secondatia Alph. DC. VI. 475.
— Peruviana Poepp. et Endl. VI. 475. no. 1.
Secundiflorae Torr. et Gr. (Solidago) II. 963. VI. 129.
Securidaca Linn. I. 246. V. 67.
—? *acuminata* Schlchtd. I. 246. no. 2.
— acuminata St. Hil. I. 246. no. 7.
— coriacea Bth. I. 247. no. 10.
— deçora Poepp. et Endl. V. 67. no. 2.
— floribunda Bth. I. 247. no. 12.
— inappendiculata Hsskrl. V. 67. no. 1.
— lanceolata St. Hil. I. 246. no. 6.
— latifolia Bth. I. 247. no. 15.
—? longepedunculata Fresen. I. 246. no. 1.
— *longepedunculata* Fresen. V. 67. no. 2.
— longifolia Bth. I. 247. no. 11.
— longifolia Poepp. et Endl. V. 67. no. 3.
— macrophylla Bth. I. 247. no. 13.
— marginata Bth. I. 247. no. 14.
— ovalifolia St. Hil. I. 246. no. 4.
— parvifolia Bth. I. 246. no. 9.
— pubiflora Bth. I. 247. no. 16.
— rivinaefolia St. Hil. I. 246. no. 5.
—? Schlechtendaliana Wlprs. I. 246. no. 2
— sylvestris Schlchtd. I. 246. no. 3.

Securidaca tomentosa St. Hil. I. 246. no. 8.
— virgata Swrtz. I. 247. †
Securigera DC. I. 725.
— *grandiflora* Boiss. V. 519. n 1.
Seddera Hochstett. * VI. 542.
Sedeae Endl. II. 260. V. 795.
Sedgwickia Griffith. II. 435. V. 930.
— cerasifolia Griffith. * II. 435. no. 1. V. 930. no. 1.
Sedum L. II. 260. II. 935. V. 795.
Sedum ......? Torr. II. 263. no. 37.
— aizoides S. Dyck. II. 263. no. 38.
— algidum Ledeb. II. 261. no. 19.
— *algidum* Ledeb. II. 262. no. 3. adn.
— Altaicum G. Don. II. 261. no. 16.
— altissimum Poir. II. 263. †
— Anatolicum C. Koch. V. 795. no. 3.
— Anglicum L. * II. 260. no. 2.
β. rivulare Boiss.
— anopetalum DC. II. 263. †
— *Asiaticum* Wall. V. 795. no. 7.
— atropurpureum Turcz. II. 262. no. 22.
β. caespitosum.
— azureum Royle. II. 262. no. 24.
— Botoniense Lois. II. 263. †
— *caespitosum* DC. V. 797. no. 2.
— Cariense Jaub. et Spach. II. 261. no. 15.
— Cepaea Linn. II. 263. †
— coccineum Royle. II. 262. no. 25.
— confertiflorum Boiss. V. 796. no. 10.
— Cotyledon Jcq. II. 263. †
— *dasyphyllum β. gracile* DC. II. 260. no. 6.
— Douglasii Hook. II. 262. no. 31.
— edule Nutt. II. 263. no. 35.
— elongatum Ldb. II. 261. no. 18. V. 795. no. 6.
α. majus } Turcz. V. 795. no. 6.
β. minus }
— *elongatum* Ledeb. II. 262. adn. no. 1.
— *elongatum* Turcz. V. 795. no. 6. β.
— Ewersii Ledeb. II. 261. no. 17.
— farinosum Lowe. II. 261. no. 10.
— fragile Dumort. II. 260. no. 1.
— fusiforme Lowe. II. 260. no. 9.
— gelidum Wlprs. II. 262. no. 21.
— *Gerardianum* Royle. II. 262. no. 24.
— glandulosum Bertoloni. V. 795. no. 2.
— glaucum W. K. II. 263. †
— gracile C. A. Mey. II. 261. no. 11.
γ. elongatum } C. Koch. II. 935. no. 1.
β. micranthum }
— gypsicolum Boiss. et Reut. II. 260. no. 4.
— Hispanicum Linn. II. 263. †
— Kamtschaticum Fisch. et Mey. II. 262. no. 28.
— lineariſolium Royle. II. 262. no. 23.
— *linifolium* Nutt. II. 263. no. 33. β.
Sedum Listoniae Vis. II. 261. no. 14.
— littoreum Guss. II. 260. no. 7.
— Lydium Boiss. V. 796. no. 9.
— maximum Linn. II. 263. †
— Monregalense Balb. II. 263. †
— miserum Lindl. II. 263. no. 36.
— multicaule Wall. II. 261. no. 12.
— Neapolitanum Ten. II. 260. no. 6.
— Nebrodense Gasparini. V. 795. no. 5.
— neglectum Ten. II. 260. no. 5.
— obtusifolium C. A. Mey. II. 261. no. 20.
— Olympicum Boiss. V. 795. no. 8.
— Oreganum Nutt. II. 262. no. 30.
— pedicellatum Boiss. et Reut. II. 260. no. 3.
— pulchellum Michx. * II. 263. no. 33. (c. var. β. ibid.)
— *pulchrum* DC. II. 263. no. 33.
— *quadrifidum* Pall. II. 262. adn. no. 2.
— reflexum Linn. II. 263. †
— repens Schlchtd. II. 263. †
— *Rhodiola* Ledeb. II. 261. no. 16.
— *Rhodiola* Turczan. V. 795. no. 6. α.
— *rivulare* Boiss. II. 260. no. 2. β.
— *rubens* Linn. V. 796. no. 1.
— rubens β. pentandrum DC. * II. 260. no. 8.
— rupestre Linn. II. 263. †
— sarmentosum Bnge. II. 262. no. 26.
— sempervivoides Ledeb. II. 263. †
— sparsiflorum Nutt. II. 262. no. 29.
— spathulifolium Hook. II. 263. no. 32.
— Stephani Cham. II. 263. no. 34.
— strictum C. Koch. V. 795. no. 4.
— *Telephium β. purpureum* L. II. 263. †
— Thirkeanum C. Koch. V. 795. no. 1.
— Torreyi G. Don. II. 263. no. 37.
— uniflorum Hook. et Arn. II. 261. no. 13.
— verticillatum Bngrd. II. 262. no. 27.
— Wallichianum Hook. V. 795. no. 7.
Seetzenia R. Br. I. 498.
— Africana R. Br. * I. 498. no. 1.
— orientalis Dcne. I. 498. no. 2.
— *prostrata* Eckl. et Zeyh. I. 498. no. 1.
SELAGINEAE Juss. IV. 142. VI. 694.
Selaginoideae Wlprs. (Verbena) IV. 15.
Selago Linn. IV. 150. VI. 694.
Selago ......? Eckl. IV. 155. no. 19.
— adpressa Choisy. IV. 161. no. 40.
— *angustifolia* Sieb. IV. 165. no. 53.
— *angustifolia* Thnbrg. IV. 170. no. 4.
— apiculata E. Mey. IV. 151. no. 8.
— arguta E. Mey. IV. 155. no. 20.
— ascendens E. Mey. IV. 154. no. 16.
— bracteata Thnbrg. IV. 167. no. 64.
— Burmanni Choisy. IV. 156. no. 21.
— canescens Thnbrg. IV. 160. no. 35.

Selago capitata Bergius. IV. 169. no. 2.
— *capitata* Hort. Berol. IV. 163. no. 46.
— cephalophora Thnbrg. IV. 152. no. 9.
— Choisyana E. Mey. IV. 163. no. 46.
— ciliata Thnbrg. IV. 165. no. 54.
— cinerascens E. Mey. IV. 165. no. 52. (c varr. α. et β. ibid.)
— cinerea Thnbrg. IV. 158. no. 31.
— coccinea Linn. IV. 157. no. 25.
— coerulea Brnhrdi. * IV. 168. no. 66.
— comosa E. Mey. IV. 150. no. 3.
— cordata Thnbrg. IV. 152. no. 10.
— corymbosa Linn. IV. 158. no. 30.
β. polystachya E. Mey.
— decipiens E. Mey. IV. 165. no. 53.
— decumbens Thnbrg. IV. 167. no. 61.
— densifolia Hochstett. IV. 156. no. 23.
— *diffusa* Sieb. IV. 150. no. 1.
— distans E. Mey. IV. 160. no. 37. * VI. 694. no. 1.
— *divaricata* Choisy. IV. 150. no. 1.
— *dubia* Linn. IV. 170. no. 4.
— ericina E. Mey. IV. 150. no. 2.
— *ericoides* Linn. IV. 171. no. 1.
— fasciculata Linn. IV. 154. no. 19.
α. glabra }
γ. hirta } Wlprs.
β. lanceolata }
δ. minor }
— fruticosa Linn. IV. 164. no. 49.
— *fulvo-maculata* Lnk. IV. 154. no. 19.
— geniculata Thnbrg. IV. 162. no. 43.
— *geniculata* Thnbrg. IV. 164. no. 48.
— *Gillii* Lindl. IV. 166. no. 57.
— glabrata Choisy. IV. 166. no. 58.
— glomerata Thnbrg. IV. 159 no. 32.
— glutinosa E. Mey. IV. 151. no. 4.
— guttata E. Mey. IV. 154. no. 18.
— hamulosa E. Mey. IV. 152. no. 11.
— herbacea Choisy. IV. 153. no. 15.
— hermannioides E. Mey. IV. 162. no. 44.
— heterophylla Thnbrg. IV. 151. no. 7.
— *hirta* Choisy. IV. 155. no. 19. γ.
— hirta Thnbrg. IV. 152. no. 12.
— *hispida* Sieb. IV. 149. no. 7.
— hyssopifolia E. Mey. IV. 158. no. 29.
β. elliptica.
γ. lanceolata.
— incisa Hochstett. IV. 162. no. 41.
— leptostachya E. Mey. IV. 161. no. 38.
— lobeliacea Hochstett. IV. 153. no. 14.
— *lucida* Venten. IV. 168. no. 1.
— micrantha Choisy. IV. 164. no. 48.
— minutissima Choisy. IV. 163. no. 45.
— myrtifolia Rchb. IV. 166. no. 57.
— Ohlendorffiana Lehm. IV. 167. no. 59.
Selago ovata Ait. IV. 168. no. 2.
— *paniculata* Thnbrg. IV. 162. no. 42. et diagn. ibid. in adn.
— peduncularis E. Mey. IV. 157. no. 28.
— *Pinastra* Linn. IV. 173. no. 3.
— pinea Lnk. IV. 251. no. 5.
— pinguicula E. Mey. IV. 151. no. 6.
— polycephala Otto. IV. 164. no. 50.
— *polygaloides* Linn. fil. IV. 170. no. 4.
— *polygaloides* Sieb. IV. 166. no. 57.
— polygaloides Thnbrg. IV. 167. no. 60.
— *polystachya* Linn. IV. 158. no. 30. β.
— pterophylla Otto. *IV. 168. no. 67.
— purpurea Cels. *IV. 168. no. 68.
—? pusilla Thnbrg. IV. 167. no. 65.
— racemosa Brnhrdi. IV. 157. no. 27.
— ramulosa Lnk. IV. 167. no. 63.
— ramulosa E. Mey. IV. 160. no. 34.
— *rapunculoides* Eckl. IV. 156. no. 24.
— rapunculoides Linn. IV. 156. no. 22.
— recurva E. Mey. IV. 166. no. 56.
— *rotundifolia* Linn. fil. IV. 168. no. 1.
— rotundifolia Thnbrg. IV. 166. no. 55.
— saxatilis E. Mey. IV. 163. no. 47.
— scabrida Thnbrg. IV. 160. no. 36. IV. 167. no. 62.
— *serrata* Bergius. IV. 154. no. 19.
— *spicata* Lnk. IV. 169. no. 3.
— *spuria* Jcq. IV. 156. no. 22.
— spuria Linn. IV. 156. no. 24.
— *spuria* Sieb. IV. 154. no. 19.
— stricta Bergius. IV. 162. no. 42.
— *stricta* Choisy. IV. 159. no. 33.
— tenuis E. Mey. IV. 161. no. 39.
— tephrodes E. Mey. IV. 159. no. 33.
— teretifolia Lnk. IV. 154. no. 17.
— *tomentosa* Linn. III. 319. no. 17.
— trinervia E. Mey. IV. 157. no. 26.
— triquetra Thnbrg. IV. 150. no. 1.
— verbenacea Thnbrg. IV. 153. no. 13.
— Witbergensis E. Mey. IV. 165. no. 51.
Selenia Nutt. I. 154.
— aurea Nutt. *I. 154. no. 1. (c. var. β. ibid.)
Selineae Nutt. I. 154.
Selenocarpaea DC. I. 191.
— diffusa Eckl. et Zeyh. *I. 191. no. 18.
— peltaria Eckl. et Zeyh. *I. 191. no. 16.
— pinnata Eckl. et Zeyh. *I. 191. no. 17.
Selenocera Zippel. II. 502. °VI. 57.
— secundiflora Zippel. II. 502. no. 1. * VI. 57. no. 1.
Selenocoelae DC. (Valerianella) II. 526.
Selinoides DC. II. 410.
Selinum Hffm. II. 406.
— *acaule* Cav. II. 387. no. 1.
— *acaule* Prsh. II. 417. no. 1.

Selinum Canadense Michx. II. 405. no. 3.
— *carvifolium* Crntz. V. 880. no. 2.
— *Chabraei* Jcq. V. 880. no. 2.
—? cnidiifolium Turcz. II. 406. no. 1.
— *dubium* Turcz. V. 870. no. 1.
— *Gmelini* Bray. V. 870. no. 1.
— *humile* Turcz. V. 882. no. 3.
— *lactescens* Lam. V. 880. no. 2.
— *palustre* Thuill. V. 880. no. 2.
— *Sibiricum* Retz. V. 866. no. 1.
— *stellatum* Don. II. 426. no. 3.
— *terebinthinum* Hook. II. 418. no. 5.
Selliera Cav. *II. 713.
Selloa H. B. Kth. *II. 620.
— *nudata* Nutt. II. 987. no. 1.
Sellowia uliginosa Rth. II. 101. no. 2. *a.*
Selva III. 651. no. 199.
Semarillaria alata Rz. et Pav. I. 413. no. 4.
— *enneaphylla* Rz. et Pav. I. 414. no. 14.
Semecarpus L. *I. 556. V. 416.
— Grahami Wght. *V. 416. no. 1.
Semeiandra Hook. et Arn. II. 95. V. 669.
— grandiflora Hook. et Arn. *II. 95. no. 1. V. 669. no. 1.
Sempervivum L. II. 263. II. 935.
— acuminatum Jacquemont. II. 264. no. 8.
— *annuum* Chr. Sm. II. 264. no. 2. V. 797. no. 1.
— *aureum* Chr. Sm. V. 805. no. 1.
— *balsamiferum* B. Webb. V. 801. no. 8.
— *barbatum* Hornem. V. 801. no. 7.
— *barbatum* C. Smith. V. 800. no. 4.
— *caespitosum* Chr. Smith. V. 801. no. 7.
— *calyciforme* Haw. V. 805. no. 1.
— *Canariense* Linn. V. 803. no. 13.
— *ciliare* Haw. V. 801. no. 7.
— *ciliatum* Sims. V. 801. no. 7.
— ciliatum Willd. II. 264. †
— *ciliatum* Willd. V. 803. no. 12.
— *cruentum* B. Webb. V. 799. no. 1.
— *cuneatum* B. Webb et Berthelot. V. 804. no. 16.
— dichotomum DC. *II. 263. no. 2. V. 797. no. 1.
— *dodrantale* DC. V. 805. no. 1.
— *dodrantale* Willd. V. 805. no. 2.
— *foliosum* Chr. Smith. V. 800. no. 3.
— *frutescens* Haw. V. 804. no. 17.
— Funkii Braun. II. 264. †
— glaucum Tenore. II. 263. no. 1.
— *Goochiae* B. Webb. V. 801. no. 6.
— *Haworthii* S. Dyck. V. 802. no. 10.
— *holochrysum* B. Webb. V. 802. no. 9.
— *laxum* Haw. V. 804. no. 18.
— *Lindleyi* B. Webb. V. 800. no. 5.
— *lineolare* Haw. V. 800. no. 4.
Sempervivum molle Vis. II. 264. no. 7. II. 935. no. 1.
— *monanthes* Ait. V. 806. no. 1.
— *mucronatum* Jcquem. II. 264. no. 8.
— *multiflorum* Jcquem. II. 254. no. 23.
— pulchellum C. A. Mey. II. 935. no. 2.
— punctatum Chr. Smith. *II. 264. no. 3. V. 797. no. 2.
— *pygmaeum* Chr. Smith. V. 799. no. 5.
— pygmaeum Wlprs. II. 264. no. 6.
— sedoides Jacquem. II. 264. no. 9.
— *Smithii* Sims. V. 800. no. 3.
— *spathulatum* Hornem. V. 800. no. 4.
— *strepsicladum* B. Webb. V. 799. no. 2.
— tortuosum Ait. II. 264. no. 5.
— *tortuosum* Ait. V. 798. no. 4.
— *undulatum* B. Webb. V. 804. no. 14.
— urbicum Hornem. II. 264. †
— *urbicum* Lindl. V. 802. no. 9.
— *urbicum* Chr. Smith. V. 803. no. 11.
— villosum Haw. *II. 264. no. 4.
— *villosum* Haw. V. 798. no. 3.
— *villosum* Lindl. V. 801. no. 5.
— *Youngianum* B. Webb. V. 804. no. 15.
Senacia lanceolata Lam. I. 254. no. 35.
— *Nepaulensis* DC. I. 251. no. 10.
— *undulata* Lam. I. 250. no. 3.
Senaria cf. *Senacia.*
Senebiera DC. I. 190. II. 764. V. 50.
— coronopus Poir. I. 190. †
— didyma Poir. I. 190. †
— Figariana Parlatore. V. 50. no. 1.
— Mexicana Hook. et Arn. I. 190. no. 1.
— Nilotica Raddi. II. 764. no. 2.
— Raddii Savi. II. 764. no. 1.
Senebiereae Meisn. I. 190. V. 50.
Senecillis Gaertn. II. 651. VI. 251.
— Jacquemontiana Dcne. II. 651. no. 1. VI. 251. no. 1.
Senecio Lssng. II. 653. VI. 257.
— acanthifolius Hombr. et Jacquinot. VI. 269. no. 74.
— aconitifolius Turcz. II. 654. no. 9.
— Adamantinus Bngrd. II. 656. no. 30.
— adenophyllus Meyen et Wlprs. VI. 271. no. 85.
— adnatus DC. *VI. 263. no. 33.
β. monactis C. H. Schultz.
— albicaulis Hook. et Arn. II. 659. no. 54.
β. Gilliesii.
— alcicornis Hook. et Arn. II. 656. no. 24.
— Andersonii Hook. fil. VI. 267. no. 59. (c. varr. *a.* et *β.* ibid.)
— Andinus Nutt. II. 662. no. 83.
— Antisanae Bth. VI. 271. no. 87.
— apargiaefolius Wlprs. II. 654. no. 11.

Senecio appendiculatus C. H. Schultz. VI. 266. no. 56.
β. lacteus.
γ. Preauxianus.
α. purpurascens.
— *arcticus* Ruprecht. VI. 261. no. 23. β.
— Arnottii Hook. fil. VI. 267. no. 65.
— aureus Linn. *II. 662. no. 85.
ε. Balsamitae } Torr et Gr.
γ. borealis
δ. discoideus
ζ. lanceolatus Oakes. II. 663. no. 85.
β. obovatus Torr. et Gr.
— *aureus γ. gracilis* Hook. II. 662. no. 85. β.
— bahioides Hook. et Arn. II. 656. no. 29.
β. glaber.
α. lanosus.
— *Balsamita* Mühlnbrg. II. 663. no. 85. ε.
— barbatus Don. II. 656. no. 25.
— Boissieri DC. II. 664. †
— Bonariensis Hook. et Arn. II. 658. no. 46.
— bracteolatus Hook. II. 660. no. 69.
— Brunonianus Hook. et Arn. II. 657. no. 36.
— bupleuriformis C. H. Schultz. VI. 263. no. 32.
— bupleuroides DC. *VI. 263. no. 31.
β. falcatus C. H. Schultz.
— bullatus Bth. VI. 271. no. 88.
— calamifolius Hook. II. 654. no. 12.
— calcicola Meyen et Wlprs. VI. 272. no. 90.
— calocephalus Poepp. et Endl. VI. 270. no. 80.
— calvescens Moris et Notaris. II. 653. no. 4.
— candicans DC. *VI. 266. no. 57.
— Candolleanus Hook. et Arn. II. 659. no. 57.
— cannabinaefolius Hook. et Arn. II. 658. no. 47. (c. var. β. ibid.)
— canus Hook. *II. 663. no. 87.
— capillifolius Hook. fil. VI. 728. no. 4.
— caricifolius Hook. et Arn. II. 659. no. 56.
— ceratophyllus Don. II. 655. no. 18.
β. major.
— Chilensis Lssng. *II. 655. no. 16.
— chrysocomoides Hook. et Arn. II. 660. no. 64.
— cladobotrys Ldb. VI. 261. no. 21.
— colpodes Bngrd. II. 657. no. 32.
— *congestus* DC. II. 661. no. 71. β. VI. 261. no. 23. β.
— cordatus Nutt. II. 661. no. 77.
— coronopifolius Dsf. VI. 272. †
— coronopus Nutt. II. 660. no. 70.
— crassifolius Willd. VI. 272. †
— crassiusculus DC. *VI. 264. no. 42.
β. crassuloides C. H. Schultz.
— crenatus Thnbrg. *VI. 264. no. 37.
Senecio crispatus DC. VI. 261. no. 20.
— crithmoides Hook. et Arn. II. 660. no. 67.
— *croceus* DC. VI. 261. no. 20.
— cruentus DC. II. 664. †
— *cruentus* DC. VI. 253. no. 5.
— Cumingii Hook. et Arn. II. 657. no. 40.
— cuneatus Hook. fil. VI. 269. no. 75.
— cuneifolius Gardn. VI. 270. no. 81.
— *cuspidatus* DC. II. 655. no. 16.
— cygnorum Steetz. VI. 262. no. 27.
— *cymbalarioides* Nutt. II. 662. no. 85. γ.
— Danyausii Hombr. et Jacquinot. VI. 267. no. 60.
— Darwinii Hook. et Arn. II. 655. no. 21. *VI. 268. no. 70.
β. laxus Hook. et Arn. II. 655. no. 21.
— *Decaisnei* DC. VI. 266. no. 53. β.
— densiflorus Martens. II. 663. no. 91.
— depressus Hook. et Arn. II. 658. no. 49.
— dictyophyllus Bth. II. 657. no. 38. VI. 272. †
— diversifolius Dumort. II. 653. no. 2.
— *Dombeyanus* DC. II. 658. no. 44.
— Donianus Hook. et Arn. II. 655. no. 19.
— doratophyllus Bth. II. 659. no. 60.
— *Doria* Kickx. II. 653. no. 2.
— doroniciflorus Hook. et Arn. II. 658. no. 42.
— dryophyllus Meyen et Wlprs. VI. 271. no. 86.
— Dunensis Dumort. II. 653. no. 1.
— Duriaei Gay. II. 664. †
— *echinatus* DC. VI 253. no. 4.
— Eightsii Hook. et Arn. II. 655. no. 20. *VI. 268. no. 71. (c. var. β.)
— *elegans* Lssng. VI. 265. no. 51.
— elegans Linn. VI. 265. no. 52.
— Elliottii Torr. et Gr. II. 663. no. 86.
— elodes Boiss. II. 664. †
— eremophilus Richards. II. 663. no. 90.
— ericaefolius Bth. VI. 272. no. 92.
— exaltatus Nutt. II. 661. no. 76.
— exilis Hombr. et Jacquinot. *VI. 267. no. 62
— Falklandicus Hook. fil. VI. 268. no. 69.
— farinifer Hook. et Arn. II. 655. no. 15.
— fasciculatus Hook. et Arn. II. 659. no. 53.
— *fasciculatus β. minor* C. H. Schultz. VI. 264. no. 40.
— fastigiatus Nutt. II. 661. no. 78.
— *fastigiatus* Schweinitz. II. 662. no. 85.
— filifolius Nutt. II. 663. no. 88.
β. Fremontii } Torr. et Gr.
α. Jamesii
— *fistulosus* Poepp. II. 658. no. 44.
— flaccidus Hombr. et Jacquinot. VI. 267. no. 61.

Senecio flavus C. H. Schultz. VI. 265. no. 53.
α. Decaisnei.
β. sonchoides.
— flexicaulis Edgwrth. VI. 727. no. 3.
— *fragrans* Riddell. II. 663. no. 89.
— Fremontii Torr. et Gr. II. 663. no. 93.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 659. no. 52.
— *glaber* Lssng. II. 656. no. 28. *β*.
— glandulosus Don. II. 656. no. 26.
— Gmelini Ldb. VI. 261. no. 22.
— *gracilis* Prsh. II. 662. no. 85.
— Grahami Bth. II. 659. no. 58.
— *graminicolus* C. H. Schultz. VI. 264. no. 37.
— grandidentatus Ldb. VI. 257. no. 5.
— *gummifer* Hook. et Arn. II. 655. no. 17.
— hackeaefolius Bert. II. 656. no. 28.
γ. adenophyllus } Hook. et Arn.
β. viscidus }
— Hartwegi Bth. II. 656. no. 22.
— hastatus Bngrd. II. 657. no. 33.
— Heldreichii Boiss. VI. 260. no. 19.
— helodes Bth. II. 659. no. 59.
— Hindsii Bth. II. 654. no. 10.
— Hookeri Torr. et Gr. II. 661. no. 72.
— *Hookeri* Hombr. et Jacquinot. VI. 267. no. 58. *β*.
— Hualtata Bert. *II. 658. no. 44.
— hydrophilus Nutt. II. 662. no. 80.
— hypochionaeus Boiss. VI. 260. no. 18.
— ilicifolius Thnbrg. *VI. 263. no. 36.
β. compactus C. H. Schultz.
— immunis Wllrth. VI. 258. no. 6.
— integerrimus Nutt. *II. 662. no. 79. (cum var. *β*. ibid.)
— *integrifolius* Hook. II. 661. no. 72.
— *Kaempferi* DC. II. 651. no. 1.
— *Kalmii* Hook. et Arn. II. 661. no. 75.
— *Kalmii* Nutt. VI. 261. no. 23. *γ*.
— Kingii Hook. fil VI. 267. no. 64.
— Kleinia C. H. Schultz. *VI. 266. no. 54.
— Kochii Ldb. VI. 261. no. 20.
β. Schkuhrii.
— Kotschyanus Boiss. VI. 257. no. 2.
— Kraussii C. H. Schultz. VI. 264. no. 38.
— laetus Edgwrth. VI. 727. no. 2.
— lagopus Raoul. VI. 262. no. 26.
— lanceolatus Torr. et Gr. II. 662. no. 81.
— *lanuginosus* Don. II. 655. no. 19.
— Laseguei Hombr. et Jacquinot. *VI. 267. no. 63.
— lasiorhizus DC. *VI. 263. no. 30.
β. lasiorhizoides C. H. Schultz.
— leptophyllus Hook. et Arn. II. 660. no. 62.
— leptoschizus Bngrd. II. 660. no. 61.
— limbardioides Hook. et Arn. II. 656. no. 23. (et var. *β*. ibid.)
Senecio limbardioides Hook. et Arn. II. 660. no. 68. (Species diversa!)
— *limbardioides* Hook. et Arn. VI. 268. no. 65.
— linearilobus Bngrd. II. 657. no. 34.
— linearilobus Hook. et Arn. II. 660. no. 63. (et var. *β*. ibid.)
— linifolius *β*. frigidus Boiss. II. 664. †
— littoralis Gaudich. *II. 269. no. 76.
— *littoralis α. lanatus* Gaudich. VI. 268. no. 69.
— littoreus Thnbrg. VI. 262. no. 28.
— *longidentatus* DC. II. 662. no. 82.
— longifolius Linn. *VI. 264. no. 41.
— longilobus Bth. II. 657. no. 37.
— longipes Hook. fil. VI. 268. no. 66.
— Lopezii Boiss. II. 653. no. 3.
— Lorentei Hochstett. VI. 259. no. 14.
— *lugens* Nutt. II. 661. no. 76.
— lugens Richards. *II. 661. no. 75.
— Macedonicus Griseb. VI. 259. no. 15.
— macrotus Knze. VI. 269. no. 77.
— Magellanicus Hook. et Arn. II. 659. no. 51.
— *Magellanicus* Hook. et Arn. VI. 255. no. 3.
— *malvaefolius* DC. VI. 253. no. 7.
— megacephalus Nutt. II. 661. no. 74.
— *micropifolius β. monocephalus* DC. II. 659. no. 50.
— mikaniaeformis DC. *VI. 265. no. 47.
β. octosquamosus C. H. Schultz.
— mikanioides Otto. VI. 264. no. 43.
— millefolium Torr. et Gr. II. 663. no 92.
— miser Hook. fil. VI. 268. no. 67.
— mucronulatus C. H. Schultz. VI. 265. no. 49.
— multicaulis Poepp. et Endl. VI. 269. no. 78.
— *multiflorus* DC. VI. 253. no. 3.
— multiflorus C. H. Schultz. VI. 266. no. 55.
— munitus Wllrth. VI. 258. no. 7.
— *myosotidifolius* Bth. VI. 234. no. 1.
— Natalensis C. H. Schultz. VI. 264. no. 44.
— *obovatus* Ell. II. 663. no. 86.
— *obovatus* Mühlnbrg. II. 662. no. 85. *β*.
— obscurus Fisch. VI. 259. no. 11.
— ochroleucus Hook. et Arn. II. 658. no. 45.
— oliganthus DC. *VI. 263. no. 34.
β. dodecanthus C. H. Schultz.
— oligolepis Boiss. VI. 258. no. 9.
— Olympicus Boiss. VI. 260. no. 17.
— Organensis Casaretto. VI. 728. no. 5.
— Organensis Gardn. VI. 270. no. 82.
— *orientalis* Friv. VI. 260. no. 15.
— othonnaeflorus DC. VI. 263. no. 29.
α. major } C. H. Schultz.
β. minor }

Senecio paludosus Auctor. VI. 258. no. 6. 7. et 8.
— *paludosus β.* DC. VI. 258. no. 8.
— palustris DC. *II. 661. no. 71. *VI. 261. no. 23.
β. congestus Hook. II. 661. no. 71. VI. 261. no. 23.
γ. laceratus Ldb. VI. 261. no. 23.
— pandurifolius C. Koch. II. 654. no. 6.
— *papyraceus* DC. VI. 253. no. 6.
— Patagonicus Hook. et Arn. II. 659. no. 55. VI. 266. no. 58. (c. varr. α. et β.)
— Paullensis Bngrd. II. 657. no. 31.
— peduncularis Griseb. VI. 257. no. 3.
— pedunculatus Edgwrth. VI. 727. no. 1.
— Persicus Boiss. VI. 258. no. 10.
— phagnaloides DC. *II. 655. no. 17.
— platanifolius Bth. II. 657. no. 39. VI. 272. †
— *Plattensis* Nutt. II. 663. no. 85. ε.
— Poeppigii Hook. et Arn. II. 658. no. 50.
— polyanthemoides C. H. Schultz. VI. 263. no. 35.
— polycephalus Ldb. VI. 257. no. 4.
— *populifolius* DC. VI. 266. no. 56. α.
— populifolius β. lacteus Lindl. II. 664. †
— *populifolius* var. *leucanthus* DC. VI. 266. no. 56. β.
— *procerus* Griseb. VI. 251. no. 2.
— *pseudo-elegans* Lssng. VI. 265. no. 52.
— *pseudolongifolius* C. H. Schultz. VI. 264. no. 41.
— pubigerus Linn. *VI. 264. no. 39.
β. glabrescens C. H. Schultz.
— *pulchellus* DC. VI. 325. no. 5.
— pulcher Hook. et Arn. II. 657. no. 35.
— *Purshianus* Nutt. II. 663. no. 87.
— pyroglossus Kar. et Kir. II. 654. no. 7.
— quinquelobus DC. *VI. 265. no. 46.
β. helminthioides C. H. Schultz.
— quinqueradiatus Boiss. II. 664. †
— rapifolius Nutt. II. 662. no. 84.
— rariflorus C. Koch. II. 654. no. 5.
— *regularis* C. H. Schultz. VI. 262. no. 28.
— Riddellii Torr. et Gr. II. 663. no. 89.
— riparius Wllrth. VI. 258. no. 8.
— *rivularis* DC. VI. 261. no. 20.
— rudbeckiaefolius Meyen et Wlprs. VI. 271. no. 91.
— *Sadleri* Lang. VI. 258. no. 8.
— Saltensis Hook. et Arn. II. 658. no. 41.
— *Schkuhrii* DC. VI. 261. no. 20.
— Schultesii Hochstett. VI. 259. no. 12.
— sciadophilus Raoul. VI. 262. no. 25.
— scopulorum Poepp. et Endl. VI. 270. no. 79.
— scorzoneraefolius Meyen et Wlprs. VI. 270. no. 84.
Senecio Serra Hook. *II. 662. no. 82.
— sessilifolius C. H. Schultz. VI. 252. no. 2.
— Smithii DC. *VI. 268. no. 68.
— Soongaricus Schrenk. II. 654. no. 8.
— spartioides Torr. et Gr. II. 661. no. 73.
— subulatus Don. II. 655. no. 13.
β. elatior, γ. erectus, δ. macranthus, α. prostratus } Hook. et Arn.
— *Sudeticus* DC. VI. 261. no. 20.
— tanacetoides Kth. et Bouché. VI. 261. no. 24.
— Taygeteus Boiss. et Hldrch. VI. 259. no. 13.
— theaefolius Bth. VI. 271. no. 89.
— Tmoleus Boiss. VI. 260. no. 16.
— tredecimsquamosus C. H. Schultz. VI. 265. no. 45.
— *tricuspidatus* Bnks. et Soland. VI. 268. no. 70.
— tricuspidatus Hook. et Arn. II. 660. no. 66.
— trifidus Hook. et Arn. II. 660. no. 65.
— trifurcatus Lssng. *VI. 269. no. 73.
— *Tussilaginis* Lssng. VI. 253. no. 2.
— *tussilaginoides* Walt. II. 662. no. 85.
— Tweediei Hook. et Arn. II. 658. no. 43.
— Uspallatensis Hook. et Arn. II. 656. no. 27.
γ. retroflexus.
β. tenuior.
— vaginatus Hook. et Arn. II. 655. no. 14.
— *vaginatus* Hook. et Arn. VI. 269. no. 76.
— valerianaefolius Gardn. VI. 270. no. 83.
— variabilis C. H. Schultz. VI. 265. no. 48.
— *variabilis β. aureus graminicolus* C. H. Schultz. VI. 265. no. 48.
— *verbascifolius* Hombr. et Jacquinot. VI. 268. no. 68.
— vernonioides C. H. Schultz. VI. 265. no. 50.
— vimineus DC. *VI. 264. no. 40.
— viscidulus Scheele. VI. 257. no. 1.
— *viscosissimus* Colla. II. 656. no. 28. β.
— *viscoso-sylvaticus* var. *intermedius* Lasch. VI. 257. no. 1.
— Volkameri C. H. Schultz. *VI. 265. no. 51.
— Websteri Hook. fil. VI. 268. no. 72.
— zosteraefolius Hook. et Arn. II. 658. no. 48
Senecioneae Cass. II. 650. VI. 250.
Senecionideae Lssng. II. 603. II. 974. VI. 147.
Senega DC. I. 238. no. 67. 68. 71. 72. 73.
Senna Tournef. I. 822. V. 560. no. 10.
— *Absus* Rxb. I. 829. no. 182.
— *alata* Rxb. I. 816. no. 38.
— *arborescens* Rxb. I. 818. no. 60.
— *aurata* Rxb. I. 815. no. 30.

Senna auriculata Rxb. I. 820. no. 79.
— *bicapsularis* Rxb. I. 815. no. 31.
— *esculenta* Rxb. I. 816. no. 39. *α.*
— *glauca* Rxb. I. 822. no. 101.
— *Meccae Lohafae* Forsk. I. 822. no. 109.
— *obtusa* Rxb. I. 822. no. 106.
— *officinalis* Gaertn. I. 822. no. 108.
— *orientalis* Rxb. I. 816. no. 39.
— *prostrata* Rxb. I 836. no. 253.
— *purpurea* Rxb. I. 816. no. 39. *α.*
— *sensitiva* Rxb. I. 838. no. 270. *β.*
— *Sophera* Rxb. I. 816. no. 39. *α.*
— *speciosa* Rxb. I. 820. no. 75.
— *Sumatrana* Rxb. I. 822. no. 100.
— *tenella* Rxb. I. 838. no. 270. *β.*
— *toroides* Rxb. I. 817. no. no. 48. *β.*
Sensitivae Bth. (Mimosa) I. 865.
Seo-Kusitc Kaempf. IV. 102. no. 2.
Septas Linn. *II. 252.
— *Umbella* DC. II. 253. no. 4.
Sergilae DC. (Baccharis) VI. 137.
Serianthes Bth. °V. 622.
— grandiflora Bth. V. 622. no. 1.
Sericei Torr. et Gr. (Aster) II. 561.
Sericocarpus N. ab E. II. 576. *II. 952. no. 6.
— conyzoides N. ab E. *II. 576. no. 1.
— Oregonensis Nutt. II. 576. no. 4.
— rigidus Lindl. *II. 576. no. 5.
 β. laevicaulis.
— solidagineus N. ab E. *II. 576. no. 2.
— tortifolius N. ab E. *II. 576. no. 3.
 β. Collinsii.
Seridia DC. VI. 302.
Seridieae DC. (Centaurea) VI. 302.
Seringia Gay. *I. 336.
Serinia Raf. *II. 702. no. 19.
— *caespitosa* Raf. II. 683. no. 1.
Seriola Linn. *II. 688. ° VI. 343.
— Aetnensis Linn. VI. 343. no. 1.
— *albicans* Tineo. VI. 342. no. 1.
— *alliata* Bivona. VI. 342. no. 1.
— *Andina* Poepp. VI. 330. no. 5.
— *apargioides* Hook. et Arn. VI. 335. no. 19.
— *apargioides* Lssng. VI. 330. no. 3.
— *Brasiliensis* Lssng. VI. 331. no. 9.
— *Cretensis* Dsf. VI. 338. no. 1.
— *Cretensis* Linn. VI. 338. no. 2.
— *depressa* Viv. VI. 343. no. 1.
— *glauca* Tineo. VI. 342. no. 1.
— *hispida* Moch. VI. 343. no. 1.
— *incana* Hook. et Arn. VI. 330. no. 4.
— *laevigata* Dsf. VI. 343. no. 2.
— *laevigata* Linn. VI. 342. no. 1.
— *petiolaris* Hook. et Arn. VI. 334. no. 17.
— *rubescens* Tineo. VI. 343. no. 1.
— *taraxacifolia* Slzm. VI. 330. no. 6.
Seriola taraxacoides Loisel. VI. 336. no. 20.
— *tenuifolia* Hook. et Arn. VI. 333. no. 14.
— *Tweediei* Hook. et Arn. VI. 331. no. 9.
— *uniflora* Bivona. VI. 336. no. 20.
Seriphidium Bess. II. 640. VI. 217.
Seriphieae DC. II. 648. VI. 249.
Seriphioideae Wlprs. (Verbena) IV. 14.
Seriphium Lssng. *II. 648. VI. 249.
— capitatum Lssng. *VI. 249. no. 2.
 β. Kraussii C. H. Schultz.
— fuscum Linn. *VI. 249. no. 1.
 β. oligocephalum C. H. Schultz.
Seris Lssng. *II. 679. II. 992. *VI. 317.
— polymorpha Lssng. *II. 992. no. 1.
Serissa Commers. *II. 463.
Serjania Plum. I. 411. II. 813. V. 359.
— Arnottiana Cambess. I. 412. no. 17.
— brevipes Bth. V. 360. no. 7.
— Cambessedeana Schlchtd. et Cham. I. 411. no. 2.
— cardiospermoides Cham. et Schlchtd. I. 411. no. 1.
— clematidifolia Cambess. I. 412. no. 10.
— communis Cambess. I. 412. no. 11.
— cuspidata Cambess. I. 412. no. 4.
— deflexa Gardn. II. 813. no. 1.
— dibotrya Poepp. et Endl II. 813. no. 3.
— Dombeyana Juss. I. 412. no. 13.
— elegans Cambess. I. 412. no. 7.
— *elegans* Mart. V. 359. no. 4.
— equestris Macfd. I. 412. no. 3.
— grandiflora Cambess. I. 412. no. 9.
— Grosii Schlchdl. V. 359. no. 3.
— Guaruminea Mart. I. 413. no. 19.
— hirsuta Cambess. I. 412. no. 16.
— inflata Poepp. et Endl. II. 814. no. 5.
— lanceolata Cambess. I. 412. no. 5.
— Mansiana Mart. I. 413. no. 20.
— marginata Casaretto. V. 359. no. 6.
— membranacea Splitgrbr. II. 813. no. 2.
— meridionalis Cambess. I. 412. no. 15.
— monogyna Hffmnsgg. V. 359. no. 1.
— multiflora Cambess. I. 412. no. 14.
— noxia Cambess. I. 412. no. 12.
— nutans Poepp. et Endl. II. 813. no. 4.
— paludosa Cambess. I. 412. no. 18.
— Regnellii Schlchtd. V. 359. no. 2.
— reticulata Cambess. I. 412. no. 8.
— rubens Schlchtd. V. 359. no. 5.
— Salzmanniana Schlchtd. V. 359. no. 3.
— velutina Cambess. I. 412. no. 6.
 β foll. pellucido-punctatis.
Serpicula Linn. II. 98.
Serpicula ...... Wall. II. 98. no. 2.
— Brasiliensis Cambess. II. 98. no. 1.
— brevipes Wght. et Arn. II. 98. no. 2.

Serpicula hirsuta Wght. et Arn. II. 98. no. 3. (c. varr. α. et β. ibid.)
Serpyllum Bth. III. 697.
— *Armeniacum* Gundelsh. III. 684. no. 2.
Serraea Cav. I. 307.
— incana Cav. *I. 307. no. 1.
Serratula DC. II. 677. VI. 308.
— *amara* Rmpb. III. 284. no. 1.
— angulata Kar. et Kir. II. 677. no. 1.
— *foliis linearibus, floribus solitariis sessilibus* Gronov. II. 550. no. 10. β.
— lyratifolia Schrenk. II. 677. no. 2. (VI. 308. no. 1.)
— *Picris* Bieb. II. 676. no. 1.
— tenuifolia Bngrd. VI. 308. no. 2.
Serratuleae Lsssng. II. 676. VI. 308.
SESAMEAE A. P. DC. VI. 518.
Sesameae Endl. VI. 518.
Sersalisia R. Br. VI. 455.
Sesamei DC. (Astragalus) DC. I. 701. II. 866.
Sesamella spathulata Rchb. II. 754. no. 2.
Sesamopteris A. P. DC. * VI. 518.
Sesamum Linn. *VI. 518.
— *Javanicum* Burm. III. 296. no. 5.
Sesbania Pers. I. 680. II. 858.
— aculeata Pers. *I. 680. no. 1.
— Aegyptiaca Pers. I. 680. †
— cassioides G. Don. II. 858. no. 1.
— *ferruginea* Hochstett. V. 645. no. 1.
— muricata Mcfd. I. 680. no. 6.
— pachycarpa DC. I. 680. †
— Peruviana G. Don. II. 858. no. 2.
— procumbens Wght. et Arn. I. 680. no. 2.
— pubescens DC. *I. 680. no. 3.
— tomentosa Hook. et Arn. I. 680. no. 5.
— stricta Schrad. I. 680. no. 4.
Seseli Linn. II. 401. II. 938. V. 864.
— *alpinum* M. Bieb. II. 393. no. 1. V. 852. no. 1.
— *athamanthoides* Ldb. II. 403. no. 1.
— *biternatum* Prsh. II. 411. no. 25.
— Caffrum Meisn. II. 938. no. 1.
— *cervariaefolium* DC. V. 868. no. 1.
— connatum Ldb. II. 402. no. 6.
— defoliatum Ldb. II. 402. no. 10.
— denudatum Boiss. V. 864. no. 2.
— *divaricatum* Hook. II. 427. no. 1. β.
— *divaricatum* Prsh. II. 427. no. 1.
— Gilliesii Hook. et Arn. II. 402. no. 13.
— globiferum Vis. II. 401. no. 1.
— graveolens Ldb. II. 402. no. 9.
— *graveolens* Ldb. V. 866. no. 2.
— *gummiferum* Less. II. 401. no. 2.
— *Hippromarathrum* Ldb. II. 402. no. 3.
— Indicum Wght. et Arn. II. 402. no. 12.
— intricatum Boiss. II. 402. no. 4.
Seseli Ledebourii G. Don. II. 402. no. 3.
— *leiocarpum* Hook. II. 411. no. 23.
— Lessingianum Turcz. II. 401. no. 2.
— *Libanotis* δ. M. et Koch. II. 403. no. 1.
— oligophyllum Griseb. V. 864. no. 3.
— Olivieri Boiss. V. 864. no. 1.
— scariosum Karel. et Kiril. II. 402. no. 11.
— strictum Ldb. II. 402. no. 8.
— tenuifolium Ldb. II. 402. no. 5.
— *tortuosum* Sibthrp. et Sm. V. 893. no. 2.
— vaginatum Ldb. II. 402. no. 7.
— *Zeylanicum* Hb. Madr. II. 392. no. 2.
Seselineae Koch. II. 399. V. 863.
Sessea Rz. et Pav. III. 123. °III. 956. °VI. 630.
— corymbosa Miers. VI. 631. no. 1.
— dependens Rz. et Pav. III. 123. no. 2.
— *petiolaris* Spr. III. 115. no. 12.
— stipulata Rz. et Pav. III. 123. no. 1.
— vestita Miers. VI. 631. no. 2.
Sessiliflorae Wght. et Arn. (Indigofera) I. 669.
Sessilifoliae Bth. (Salvia) III. 643.
Sestinia Boiss. °III. 894. °III. 990.
— calycina Boiss. III. 894. no. 1.
— *ligustroides* Boiss. et Hohenack. VI. 59. no. 1.
Sesuvieae Fnzl. II. 232. V. 784.
Sesuvium Linn. II. 233. V. 784.
— acutifolium Miquel. V. 784. no. 1.
— brevifolium Schum. II. 233. no. 2.
— *parviflorum* DC. II. 233. no. 1. β.
— *Portulacastrum* DC. II. 233. no. 1.
— Portulacastrum Linn. *II. 233. no. 1.
α. pedunculatum St. Hil.
β. subsessile St. Hil.
— repens Willd. *II. 233. no. 3.
Sethia Kth. I. 407. no. 35. et 36.
Seubertia Azorica Watson. VI. 125. no. 1.
Seutera Rchb. *VI. 488.
Severinia Ten. II. 805.
— buxifolia Ten. II. 805. no. 1.
Seymeria Prsh. III. 381. °III. 970. *VI. 640.
— *auriculata* Spr. III. 382. no. 5.
— *macrophylla* Nutt. III. 381. no. 4.
— pectinata Prsh. III. 381. no. 2.
— tenuifolia Prsh. III. 381. no. 1.
Seymouria asarifolia Sweet. I. 465. †
Shawia Forst. II. 542. °VI. 702.
— avicenniaefolia Raoul. VI. 703. no. 2.
— paniculata Forst. VI. 703. no. 1.
Sherardia Dill. *II. 461.
— *nodiflora Stoechadis serratifolii folio* Vaill. IV. 47. no. 21.
— *pusilla* Bory et Chaub. II. 454. no. 1. VI. 12. no. 14.

Sherardia Urticae folio subtus incano etc. Ehret. IV. 7. no. 17.
Sherardianae DC. (Asperula) VI. 23.
Sherardiastrum Boiss. et Hohenak. VI. 12.
Shorea laccifera Heyne. V. 127. no. 1.
— *robusta* Rth. V. 127. no. 1.
— *Roxburghii* G. Don. V. 127. no. 1.
— *Talura* Rxb. V. 127. no. 1.
— *Tumbugaja* Rxb. V. 127. no. 2.
Shortia Torr. et Gr. °VI. 437.
— galacifolia Torr. et Gr. *VI. 437. no. 1.
Shoutwellia versicolor Wght. V. 98. no. 4.
Shutereia Choisy. *VI. 541.
Shuteria Wght. et Arn. I. 761.
— glabrata Wght. et Arn. I. 761. no. 2.
— involucrata Wght. et Arn. I. 761. no. 3.
— vestita Wght. et Arn. I. 761. no. 1.
Shuttleworthia Meisn. IV. 12.
— Berterii Meisn. *IV. 13. no. 7.
— diceras Meisn. *IV. 13. no. 6.
— dissecta Wlprs. IV. 12. no. 3.
— *pulchella* Meisn. IV. 13. no. 4.
— Ruiziana Wlprs. IV. 12. no. 1.
— Selloi Wlprs. IV. 13. no. 5.
— sulphurea Meisn. IV. 12. no. 2.
— tenera Wlprs. IV. 13. no. 4.
Siagonarrhen Mart. III. 564.
Sialodes glauca Eckl. et Zeyh. II. 232. no. 5.
Sibbaldia Linn. II. 37.
— adpressa Bnge. II. 37. no. 1.
— *Altaica* L. II. 37. no. 1. II. 913. no. 3.
— *erecta* L. II. 37. no. 2. II. 913. no. 4.
— *grandiflora* Pall. II. 37. no. 3.
— potentilloides Cambess. II. 37. no. 3.
— purpurea Royle. II. 37. no. 2.
— *tetrandra* Bnge. II. 37. no. 1.
Sibthorpia Kth. III. 333. °III. 968. VI. 644.
Sibthorpia Linn. III. 333.
— Africana Linn. III. 334. no. 5.
— Europaea Linn. III. 333. no. 1.
— parvifolia Martens et Galeotti. VI. 644. no. 1.
— peregrina Linn. III. 334. no. 4.
— Pichinchensis H. B. Kth. III. 334. no. 2.
— *prostrata* Salisb. III. 334. no. 1.
— retusa H. B. Kth. III. 334. no. 3.
Sibthorpieae Bth. VI. 644.
Sickingia Willd. *II. 525.
Sicklera Sendtner. °VI. 616.
— solanacea Sendtner. VI. 616. no. 1.
Sicydium Schlchtd. II. 196. V. 759.
— Schiedeanum Schlchtd. *II. 196. no. 1. V. 759. no. 1.
Sicyoideae cf. **Sycioideae.**
Sicyos cf. Sycios.
Sida DC. (ex p.) I. 313. 321. 322. 327. V. 93. 95.
Sida Kth. I. 313. II. 792. V. 93.
— *acerifolia* Zuccagni. II. 791. no. 2.
— acuta Burm. I. 321. †
— aggregata Prsl. I. 319. no. 73.
— alba Linn. *I. 314. no. 3.
— *albida* Willd. I. 323. no. 12. I. 335. no. 29.
— alpestris St. Hil. I. 317. no. 54.
— angustifolia Lam. *I. 320. no. 85. β. major Prsl.
— angustissima St. Hil. I. 317. no. 44.
— anomala St. Hil. I. 317. no. 42.
— arguta Prsl. I. 319. no. 74.
— ascendens St. Hil. I. 317. no. 48.
— *Asiatica* Linn. I. 323. no. 5.
— aurantiaca St. Hil. I. 317. no. 53.
— aurita Hornem. I. 314. no. 9.
— *Belocre* L'Hérit. I. 323. no. 4. β.
— betulaefolia Zucc. I. 318. no. 68.
— bihamata Ht. Hil. et Naud. II. 792. no. 11.
— Borussica Meyen. V. 93. no. 1.
— *bracteolata* DC. I. 317. no. 50.
— byssina Zucc. I. 318. no. 64.
— Californica Nutt. I. 316. no. 34.
— *Canariensis* DC. I. 317. no. 46.
— *carpinifolia* St. Hil. I. 319. no. 82.
— carpinifolia Linn. *I. 317. no. 50.
— *carpinoides* DC. I. 319. no. 82.
— caudata St. Hil. et Naud. II. 792. no. 9.
— *centrata* Spr. II. 791. no. 2.
— *Chinensis* Retz. I. 314. no. 2.
— cistiflora Blume. I. 314. no. 14.
— collina Schlchtd. I. 320. no. 91.
— compacta St. Hil. et Naud. II. 793. no. 13.
— cordifolia Linn. *I. 314. no. 4.
— corrugata Lindl. II. 793. no. 15.
— costata Schlchtd. *I. 320. no. 92.
— crenata G. Don. I. 315. no. 20.
— *crenatiflora* Willd. II. 791. no. 4.
— *crispa* Linn. I. 322. no. 3.
— *cristata* Linn. II. 791. no. 1. et 2.
— decagyna Schum. et Thonn. I. 315. no. 26.
— decipiens St. Hil. et Naud. II. 792. no. 12.
— decumbens St. Hil. et Naud. II. 792. no. 8.
— delphiniifolia Nutt. I. 316. no. 39.
— *deltoidea* Hornem. II. 791. no. 3.
— denticulata Fresen. I. 314. no. 12.
— depressa Bth. V. 94. no. 6.
— diploscypha Torr. et Gr. I. 316. no. 36.
— discolor Hook. I. 321. no. 98.
— dissecta Nutt. I. 316. no. 38.
— *disticha* Cav. I. 321. no. 1.
— divergens Bth. V. 93. no. 4.
— *diversifolia* Spr. I. 327. no. 1.
— Dombeyana DC. I. 321. †
— dubia St. Hil. et Naud. II. 792. no. 4.
— *dumosa* Hook. V. 94. no. 5.

Sida elata Macf. I. 319. no. 81.
— *elegans* Colla. I. 325. no. 28.
— Elliottii Torr. et Gr. I. 315. no. 29.
— elongata Blume. I. 314. no. 13.
β. diversifolia Spanoghe.
— Endlicheriana Prsl. I. 320. no. 90.
— *eleromischos* Cav. I. 323. no. 4. β.
— *excelsior* Cav. I. 328. no. 3.
— fallax Wlprs. V. 94. no. 8.
— fasciculata Torr. et Gr. I. 315. no. 28.
— fibulifera Lindl. II. 793. no. 16.
— filicaulis Torr. et Gr. I. 316. no. 31.
— filiformis Moric. I. 321. no. 93.
— fulva St. Hil. I. 316. no. 41.
— *gigantea* Jcq. I. 319. no. 81. I. 325. no. 34.
— glabra Nutt. I. 316. no. 30. (cum. varr. α. et β, III. Emend. p. 2.)
— glanduligera Bth. V. 94. no. 5.
— *glandulosa* Rxb. I. 314. no. 3. γ.
— *glauca* Cav. I. 323. no. 5.
— *glutinosa* Rxb. I. 314. no. 5.
— *gracilis* Ell. I. 316. no. 29.
— *graveolens* Rxb. I. 323. no. 7.
— graveolens Rxb. *V. 95. no. 14.
— grewioides Guill. et Perr. I. 315. no. 27.
— grossulariaefolia Hook. et Arn. I. 316. no. 37.
— Guineensis Schum. et Thonn. I. 315. no. 25.
— Haenkeana Prsl. I. 318. no. 69.
—? hastata St. Hil. I. 318. no. 58.
— *herbacea* Cav. I. 314. no. 4.
— *heterophylla* Cav. I. 313. no. 3.
— *heterophylla* Heyne. I. 327. no. 1.
— heterosperma Visiani. I. 315. no. 17. II. 792. no. 1.
— hibisciformis Bertol. I. 319. no. 79.
— Hilariana Prsl. I. 319. no. 76.
— Hilariana Wlprs. I. 317. no. 57.
— hirta Lam. I. 321. †
— *hirta* Rchb. V. 95. no. 14.
— *hirta* Wall. I. 314. no. 5.
— *Hoheri* Hook. V. 97. no. 1.
— Hookeriana Miquel. V. 94. no. 13.
— Hülseana Torr. et Gr. I. 316. no. 32.
— humilis Willd. *I. 314. no. 7.
— hyssopifolia Prsl. I. 320. no. 88.
— inaequalis Lk. et Otto. I. 318. no. 60.
— *incarnata* Spr. II. 791. no. 3.
— incerta St. Hil. et Naud. II. 792. no. 7.
— *Indica* Linn. I. 322. no. 4.
— intermedia St. Hil. I. 317. no. 56.
— interrupta Balb. I. 320. no. 86.
— involucrata A. Rich. I. 321. no. 97.
— Kohautiana Prsl. I. 320. no. 84.
— Kunthiana Prsl. I. 319. no. 75.
Sida lanceolata A. Rich. I. 321. no. 95.
— leiophloia Miquel. V. 94. no. 11.
— linearifolia St. Hil. I. 317. no. 45.
— linearifolia Schum. et Thonn. I. 315. no. 21.
— Lonchitis St. Hil. et Naud. II. 792. no. 5
— longicuspis Hochstett. *V. 95.
— *macrorhiza* James. I. 293. no. 8.
— Maderensis Lowe. I. 321. no. 94.
— *malacophylla* Lk. et Otto. I. 301. no. 38.
— malacophylla Lk. et Otto. II. 792. no. 2.
— malvaeflora DC. *I. 316. no. 40.
— maritima Miquel. II. 793. no. 14.
— Martiana St. Hil. I. 317. no. 55.
— Meyeniana Wlprs. V. 94. no. 9.
— micrantha Zucc. I. 318. no. 66.
— mollis Ort. I. 321. †
— *montana* Rxb. I. 322. no. 3.
— *multicaulis* Cav. I. 314. no. 7.
— mutica Delile. I. 323. no. 5.
— Mysorensis Hrb. Madr. I. 314. no. 5. (III. Emend. p. 2.)
— *nervosa* Wall. I. 314. no. 6. et 7.
— nubigena Wlprs. V. 93. no. 3.
— (?) obliqua Nutt. I. 316. no. 33. (III. Emend. p. 2.)
— obtusa A. Rich. I. 321. no. 96.
— *olens* Ham. I. 314. no. 5.
— Oregana Nutt. I. 316. no. 35.
— ovata G. Don. I. 315. no. 19.
— parnassiaefolia Hook. I. 319. no. 78.
— *parviflora* Willd. II. 791. no. 4.
— pedicularifolia Meyen. V. 93. no. 2.
— *periplocifolia* Linn. I. 322. no. 2.
— *permutata* Hochst. V. no. 15.
— *Persica* Burm. I. 322. no. 1.
— Philippica DC. *I. 314. no. 2.
— physalodes Prsl. I. 318. no. 71.
— *pilosa* Retz. I. 314. no. 7.
— Pohliana Prsl. I. 320. no. 87.
— *polyandra* Rxb. I. 322. no. 1.
— *populifolia* Lam. I. 322. no. 4. β.
— potentilloides St. Hil. I. 317. no. 43.
— *Pow* Rheede. V. 294. no. 1.
— prostrata G. Don. I. 315. no. 18.
— quaternata Zucc. I. 318. no. 67.
— radiciflora Prsl. I. 318. no. 70.
— reclinans Knze. V. 94. no. 7.
— *reflexa* Cav. I. 324. no. 20.
— reticulata Zucc. I. 318. no. 65.
— *retrorsa* l'Hérit. I. 324. no. 20.
— rhombifolia Linn. *I. 317. no. 46.
— *retusa* Wght. I. 314. no. 3. β.
— rosea Lk. et Otto. I. 318. no. 59.
— rostrata Schum. et Thonn. I. 315. no. 24.
— *rostrata* Schum. et Thonn. I. 323. no. 13.
— *rotundifolia* Cav. I. 314. no. 4.

Sida rubifolia St. Hil I. 317. no. 49.
— rufescens St. Hil. I. 317. no. 52.
— rugosa Schum. et Thonn. I. 315. no. 22.
— rupestris Miquel. V. 94. no. 12.
— salviaefolia Prsl. I. 320. no. 89.
— scabra Schum. et Thonn. I. 315. no. 23.
— scabrida Wght. et Arn. I. 313. no. 1. (III. Emend. p. 2.)
— Sellowiana Kltzch. I. 318. no. 62.
— semidentata St. Hil. et Naud. II. 792. no. 6.
— sessiliflora Hook. I. 319. no. 80.
— setifera Prsl. I. 319. no. 72.
— *spiciflora* DC. I. 327. no. 1.
— *spinosa* Linn. I. 314. no. 3. *α*.
— spiraeaefolia Willd. *I. 312. no. 82. I. 321. †
— *stellata* Torr. I. 296. no. 1.
— subcordata Spanoghe. I. 314. no. 11.
— subcuneata St. Hil. I. 317. no. 51.
— subdistans St. Hil. et Naud. II. 792. no. 3.
— *suberosa* Hortul. II. 791. no. 3.
— suborbicularis St. Hil. et Naud. II. 792. no. 10.
— Sundaica Blume. I. 315. no. 15.
— Tassmanniana Hook. I. 321. no. 99.
— *tenax* Ham. I. 314. no. 5.
— *terminalis* Cav. I. 326. no. 48.
— *Timoriensis* DC. I. 323. no. 10.
— *tomentosa* Rxb. I. 323. no. 8.
— *tomentosa* Wall. I. 323. no. 7. V. 95. no. 14.
— *triangularis* Willd. II. 791. no. 3.
— triloba Cavan. *V. 95. no. 15.
— *triquetra* Linn. I. 325. no. 35.
— tristis Schlchtd. I. 320. no. 83.
— truncatula? Blanco. V. 94. no. 10.
— *unilocularis* l'Hérit. I. 314. no. 7.
— *urens* Hort. Ultraject.. V. 94. no. 7.
— urticaefolia St. Hil. I. 318. no. 57.
— urticaefolia Wght. et Arn. I. 314. no. 6. (III. Emend. p. 2.)
— velutina Zucc. I. 318. no. 63.
— venosa Alb. Dietr. I. 318. no. 61.
— venusta Schlchtd. I. 319. no. 77.
— viarum St. Hil. I. 317. no. 47.
— viscidula Blume. I. 314. no. 8.
— vitellina Hffmnsgg. I. 315. no. 16.
— vitifolia Cav. I. 325. no. 36.
— *Zuccagnii* Spr. 791. no. 2.
Sideae Endl. I. 313. V. 93.
Sideranthus Nutt. II. 587.
Σιδηρίτις ἕτερα Dioscorid. III. 175. no. 61.
— *τρίτη* Dioscorid. III. 173. no. 52.
Sideritis Linn. III. 847. °III. 988. VI. 682.
— Aegyptiaca Pers. III. 850. no. 16.
Sideritis Alopecuros Scop. III. 816. no. 1.
— *angustifolia* Lam. III. 853. no. 28.
— *approximata* Gasparini. III. 854. no. 39.
— arborescens Salzm. III. 852. no. 24.
— *Bruttia* Ten. III. 849. no. 8.
— *bullata* H. B. Kth. III. 844. no. 2.
— *calyantha* M. Bieb. III. 841. no. 117.
— Canariensis Linn. III. 847. no. 4.
— candicans Ait. III. 847. no. 2.
— Cavanillesii Lag. III. 852. no. 25.
— chamaedryfolia Cav. III. 853. no. 27.
— ciliata Thnbrg. III. 855. no. 44.
— *crenata* Lapeyr. III. 852. no. 21. *δ*.
— *Cretica* Linn. III. 847. no. 2.
— *Cretica maxima Ocimi Valentini facie* Tournef. III. 854. no. 37.
— crispata Willd. III. 854. no. 35.
— *decumbens* Moench. III. 849. no. 8.
— *decumbens* Thnbrg. III. 840. no. 111.
— distans Willd. III. 850. no. 14.
— dura Bth. III. 849. no. 12.
— *elegans* Murr. III. 854. no. 36.
— *errata* Lag. III. 851. no. 19.
— foetens Lag. III. 853. no. 33.
— *foetida* Poir. III. 851. no. 21. *γ*.
— *fruticulosa* Pourr. III. 851. no. 21. *γ*.
— glauca Cavan. III. 853. no. 32.
— grandiflora Salzm. III. 850. no. 17.
— *Heraclea* Col. III. 818. no. 9.
— *hirsuta* Gouan. III. 836. no. 86.
— hirsuta Linn. III. 852. no. 26.
— *hirsuta* Sieb. III. 820. no. 16. *β*.
— *hirta* Roth. III. 851. no. 21. *γ*.
— *hirtella* Brot. III. 851. no. 21. *γ*.
— *Hispanica* Mill. III. 852. no. 26.
— *Hispanica foetidissima* etc. Tournef. III. 854. no. 34.
— *hyssopifolia* Auct. plur. III. 851. no. 21. *γ*. *ε*.
— *hyssopifolia* Linn. III. 852. no. 21. *ζ*.
— ilicifolia Willd. III. 851. no. 20.
— *incana* Cavan. III. 853. no. 28.
— *incana* Habl. III. 848. no. 6.
— incana Linn. III. 853. no. 30.
— *lanata* Hochst. et Steud. III. 855. no. 41.
— lanata Linn. III. 854. no. 36.
— lasiantha Pers. III. 854. no. 34.
— leucantha Cav. III. 852. no. 22.
— Libanotica Labill. III. 849. no. 9.
— *linearifolia* Lag. III. 853. no. 28.
— macrostachys Poir. III. 847. no. 3.
— Massoniana Bth. III. 847. no. 1.
— montana Linn. III. 855. no. 40.
— *montana* Sibthrp. et Sm. III. 855. no. 41.
— *nigricans* Pers. III. 854. no. 36.
— *Ocymastrum* Gou. III. 833. no. 75.

Sideritis ovata Cav. III. 850. no. 18.
— *pallida* Thnbrg. III. 838. no. 100.
— *paniculata* H. B. Kth. III. 844. no. 3.
— parvifolia Lam. *III. 855. no. 45.
— perfoliata Linn. III. 849. no. 13.
— *plumosa* Thnbrg. III. 840. no. 114.
— prostrata Zuccar. *III. 855. no. 46.
— pullulans Vent. III. 849. no. 11.
— pungens Bth. III. 852. no. 23.
— purpurea H. F. Talbot. III. 854. no. 37.
— *Pyrenaica* Endress. III. 852. no. 21. η.
— *Pyrenaica* Poir. III. 852. no. 21. δ.
— remota d'Urv. III. 855. no. 41.
— *rhytidea* Spreng. III. 850. no. 15.
— Romana Linn. III. 854. no. 38.
— rosea Desf. III. 855. no. 42.
— rugosa Poir. III. 850 no. 15.
— *rugosa* Thnbrg. III. 839. no. 107.
— *salviaefolia* H. B. Kth. III. 844. no. 1.
— *Sambuci folio* Prosp. III. 935.
— Scardica Griseb. III. 848. no. 7.
— *scordioides* Cav. III. 852. no. 25.
— scordioides Linn. III. 851. no. 21.
δ. alpina
ζ. angustifolia
β. communis
γ. elongata } Bth.
ε. glabrata
α. grandiflora
η. incana
— *scordioides var. lanata et latifolia* Bth. III. 852. no. 26.
— sericea Pers. III. 853. no. 31.
— Sicula Ucria. III. 848. no. 8.
— Sipylea Boiss. III. 849. no. 10.
— *spathulata* Lam. III. 854. no. 38.
— *spinosa* Bth. III. 651. no. 21. α.
— spinosa Lam. III. 851. no. 19.
— *subspinosa* Cav. III. 851. no. 21. α.
— *suffruticosa* Mill. III. 853. no. 29.
— Syriaca Linn. III. 848. no. 5.
— *Syriaca* Pall. III. 848. no. 6.
— Taurica M. Bieb. III. 848. no. 6.
— teucriifolia Juss. *III. 855. no. 47.
— theezans Boiss. et Hldrch. VI. 682. no. 1.
— *tomentosa* Pourr. III. 852. no. 26.
— tomentosa Ucria. III. 855. no. 43.
— Tragoriganum Lag. III. 853. no. 29.
— virgata Desfont. III. 853. no. 28.
Siderodendron Schreb. II. 484.
— laxiflorum Bth. II. 484. no. 2.
— macrophyllum Bth. II. 484. no. 1.
Sideroxylon Linn. VI. 455.
— *argenteum* Spr. V. 414. no. 1.
— *argenteum* Thnbrg. II. 830. no. 5.
— Borbonicum Alph. DC. VI. 455. †
Sideroxylon cylindrocarpum Poepp. et Endl. VI. 455. no. 2.
— elegans Alph. DC. VI. 455. no. 1.
— Guianense Alph. DC. VI. 455. †
Siebera Gay. *II. 668.
Siegesbeckia Linn. II. 603. VI. 145.
— agrestis Poepp. et Endl. II. 603. no. 1.
— Caspia Fisch. et Mey. VI. 145. no. 1.
Siemssenia Steetz. °VI. 236.
— capillaris Steetz. *VI. 236. no. 1.
Sieversia R. Br. II. 46.
Siversia Willd. *II. 46. V. 656.
Siversia Willd. II. 48.
— albiflora Hook. fil. V. 656. no. 1.
— *calthifolia* D. Don. II. 48. no. 19. α.
— *congesta* R. Br. II. 48. no. 19. γ.
— *dilatata* R. Br. II. 48. no. 19. α.
— *elata* Royle. II. 48. no. 14.
— *geoides* Spr. II. 49. no. 1.
— *glacialis* R. Br. II. 48. no. 15.
— *humilis* R. Br. II. 48. no. 17.
— *humilis* Royle. II. 48. no. 14.
— *paradoxa* G. Don. II. 46. no. 1.
— paradoxa G. Don. V. 656. no. 2.
— *radiata* R. Br. II. 48. no. 18. et no. 19.
— *rosea* Grah. II. 48. no. 16.
— *rotundifolia* Cham. et Schlchtd. II. 48. no. 19.
— *rotundifolia* D. Don. II. 48. no. 19. β.
Sigmodostyles Meisn. °V. 540.
— villosa Meisn. V. 541. no. 1.
Silaus Bess. II. 404. V. 869.
— carvifolium C. A. Mey. *II. 405. no. 2.
— *longifolium* Ldb. *II. 404. no. 1.
— virescens Boiss. V. 869. no. 1.
Silene Linn. I. 272. II. 776. V. 81.
— agrostemma Boiss. et Reut. I. 274. no. 24.
— albescens Boiss. II. 781. no. 41.
— alpestris Jcq. *II. 780. no. 31.
— alpestris Willd. I. 279. †
— *alpina* Pall. II. 777. no. 5.
— Altaica Pers. I. 279. †
— ampullata Boiss. II. 778. no. 13.
— Andicola Gill. I. 279. no. 77.
— anisoloba Schrenk. V. 81. no. 3.
— aprica Turcz. I. 277. no. 52. *II. 780. no. 29.
— arenicola Prsl. I. 272. no. 10.
— arenosa C. Koch. I. 276. no. 44.
— argentea Ldb. II. 779. no. 21.
— arguta Fnzl. I. 275. no. 34.
— Armena Boiss. II. 781. no. 43.
— atocioides Boiss. V. 81. no. 2.
— Aucheriana Boiss. II. 780. no. 38.
— axillaris Leavenw. I. 279. no. 74.
— *Baikalensis* Turcz. II. 777. no. 6. β.

Silene bicolor Phorc. I. 279. †
— Boryi Boiss. I. 273. no. 19.
— brevicaulis Boiss. II. 783. no. 54.
— *bupleuroides* Schang. II. 777. no. 6. γ.
— calycina Prsl. I. 272. no. 12.
— Canariensis Spr. I. 279. †
— *canescens* Ten. I. 272. no. 3.
— capitellata Boiss. II. 777. no. 11.
— Cariensis Boiss. II. 784. no. 60.
— *Caroliniana* Walt. I. 278. no. 69.
— Caspica Pers. I. 279. †
— *Catesbaei* Walt. I. 278. no. 69.
— catholica Ait. I. 279. †
— chaetodonta Boiss. II. 783. no. 58.
— chloraefolia Sm. I. 279. †
— *ciliata* Moretti. I. 273. no. 15.
— Cisplatensis Cambess. I. 279. no. 79.
— colorata Friv. I. 274. no. 27.
— commelinaefolia Boiss. II. 784. no. 63.
— compacta Fisch. I. 279. †
— Constantia Eckl. et Zeyh. I. 277. no. 61.
— *Corsica* DC. I. 272. no. 4. β.
— *crassifolia* Thnbrg. I. 278. no. 63.
— *crassifolia β. angustifolia* Bartl. I. 277. no. 61.
— crassipes Fnzl. I. 274. no. 32.
— Cretacea Fisch. II. 780. no. 37.
— *dasyphylla* Turcz. II. 777. no. 6. β.
— delicatula Boiss. II. 784. no. 64.
— *densiflora* d'Urv. II. 779. no. 19.
— *dichotoma* Gilib. II. 779. no. 26.
— *diffusa* Otto. I. 272. no. 3.
— dioica Fisch. et Mey. I. 274. no. 29.
— diurniflora Knze. V. 81. no. 1.
— *diversifolia* Ott. I. 272. no. 6.
— Douglasii Hook. I. 278. no. 65.
— Drummondii Hook. I. 278. no. 67.
— *echinata* Jaub. et Spach. II. 783. no. 56.
— *effusa* Oth. II. 779. no. 19.
— Elisabethae Jan. I. 279. † V. 82. no. 6.
— eriocalycina Boiss. II. 781. no. 40.
— exaltata Friv. I. 274. no. 25.
— Falconeriana Royle. I. 277. no. 56.
— *Frivaldzkyana* Hmpe. I. 274. no. 27.
— furcata Lk. *I. 272. no. 7.
— Geblcriana Schrenk. I. 276. no. 50.
— Gibraltarica Boiss. I. 273. no. 21.
— goniocaula Boiss. II. 782. no. 48.
— gonocalyx Boiss. II. 783. no. 55.
— Graeca Boiss. et Sprun. II. 778. no. 15.
— Graefferi Guss. I. 273. no. 15. I. 279. †
— graminifolia Oth. I. 279. † *II. 777. no. 6.
α. grandiflora, γ. parviflora, β. unguibus glabris } Ldb. II. 777. no. 6.
— *Gypsophila* Dsf. II. 777. no. 7.
Silene Haenkeana Prsl. I. 279. no. 76.
— hispida Dsf. *I. 272. no. 5.
— Hoeftiana C. A. Mey. I. 275. no. 41. *II. 780. no. 33.
— holopetala Bnge. I. 276. no. 46. *II. 779. no. 20.
— Honigbergeri Fnzl. I. 277. no. 53.
— Hookeri Nutt. I. 278. no. 70.
— humilis C. A. Mey. I. 275. no. 40. *II. 780. no. 34.
— incurvifolia Karel. et Kiril. I. 276. no. 47. II. 780. no. 36.
— *Indica var.* Wall. I. 277. no. 54.
— infracta W. K. I. 279. †
— integripetala Bory et Chaub. I. 272. no. 1.
— intrusa Wght. et Arn. I. 277. no. 54. (III. Emend. p. 2.)
— Italica Pers. *I. 272. no. 8. I. 279. †
— *Italica β. Nevadensis* Boiss. I. 273. no. 22.
— *Jenisea* Poir. II. 777. no. 6. β.
— *Jeniseensis* Willd. II. 777. no. 6. β.
— Kotschyi Boiss. II. 783. no. 59.
— Kunawurensis Royle. I. 277. no. 55.
— laciniata Cav. I. 279. † V. 82. †
— lasiantha C. Koch. I. 276. no. 45.
— lasiopetala Fnzl. I. 274. no. 33.
— Lazica Boiss. II. 784. no. 62.
— leptopetala Schrenk. V. 81. no. 4.
— leucophylla Boiss. II. 781. no. 42.
— leysseroides Boiss. II. 784. no. 61.
— linearis Dene. I. 274. no. 30.
— lithophila Kar. et Kir. II. 779. no. 22.
— litigiosa Schrenk. V. 82. no. 5.
— livida Willd. I. 280. †
— *longiflora* Bory. I. 273. no. 19.
— lychnidea C. A. Mey. I. 275. no. 39.
— Lydia Boiss. II. 778. no. 17.
— macrodonta Boiss. II. 779. no. 18.
— macrophylla Boiss. II. 782. no. 51.
— Mandralisci Parlatore. II. 780. no. 32.
— maritima Wither. II. 776. no. 3.
— Marschallii C. A. Mey. *I. 276. no. 43.
— matutina Prsl. I. 272. no. 9.
— melanophylla Boiss. II. 777. no. 10.
— mellifera Boiss. et Reut. I. 274. no. 23.
— Menziesii Hook. I. 278. no. 72.
— micropetala DC. I. 280. †
— microsperma Fnzl. I. 275. no. 36.
— Montbretiana Boiss. II. 778. no. 14.
— Moorcroftiana Wall. I. 277. no. 57.
— multicaulis Guss. I. 273. no. 16.
— *multicaulis* Nutt. I. 278. no. 67.
— Mundtiana Eckl. et Zeyh. I. 278. no. 62.
— nana Kar. et Kir. II. 779. no. 27.
— neglecta Ten. I. 273. no. 18. (cum variett. α. β. et γ.)

Silene nemoralis W. K. I. 280. †
— *Nicaeensis* Cham. et Schlchtd. I. 278. no. 67.
— nocteolens B. Webb et Berth. I. 277. no. 59.
— noctiflora Linn. *II. 779. no. 26.
— nodulosa Boiss. II. 782. no. 47.
— *nodulosa* Viv. I. 272. no. 8.
— Notarisii Cesati. I. 272. no. 14.
— *oblongifolia* Oth. I. 272. no. 6.
— odontopetala Fnzl. I. 275. no. 37.
— odoratissima Bngc. I. 276. no. 49.
— Olympica Boiss. II. 777. no. 9.
— otites Sm. *II. 779. no. 19.
— papillosa Boiss. II. 783. no. 57.
— paradoxa Linn. I. 280. †
— *parviflora* Pers. 779. no. 19. *β*.
— *pauciflora* Slzm. I. 272. no. 8.
— paucifolia Ldb. II. 777. no. 5.
— peduncularis Boiss. II. 781. no. 45.
— pelidna Rchb. I. 280. †
— Pennsylvanica Michx. *I. 278. no. 68.
— Persica Boiss. II. 781. no. 39.
— pharnacifolia Fnzl. I. 275. no. 35.
— physocalyx Ldb. II. 780. no. 35.
— picta Pers. I. 280. †
— pilosa Spr. I. 280. †
— *platypetala* Oth. I. 278. no. 68.
— primulaeflora Eckl. et Zeyh. I. 278. no. 64.
— pruinosa Boiss. II. 777. no. 8.
— pseudo-behen Boiss. II. 778. no. 16.
— *pseudo-otites* Bess. II. 779. no. 19.
— *pubescens* Short. I. 272. no. 3.
— pudibunda Hffmnsgg. I. 280. †
— pulchra Torr. et Gr. I. 278. no. 71.
— pungens Boiss. II. 782. no. 50.
— *purpurea* W. et K. I. 279. †
— pusilla W. et Kit. I. 280. †
— quadrifida Linn. I. 280. †
— quadriloba Turcz. II. 779. no. 23.
— radians Kar. et Kir. II. 779. no. 25.
— *Rambourei* B. Webb. I. 273. no. 19.
— recta Bartl. I. 277. no. 60.
— regia Sims. I. 280. †
— repens Patr. I. 280. † *II. 777. no. 7.
— rhynchocarpa Boiss. II. 783. no. 52.
— Roemeri Friv. I. 274. no. 28.
— rubella L. *I. 272. no. 6.
β. brachypetala Moris.
— rubicunda Alb. Dietr. I. 279. no. 75.
— *Sajanensis* Lssng. II. 777. no. 6. *α*.
— saponariaefolia Schult. jun. II. 776. no. 2.
— schafta S. G. Gmel. I. 276. no. 51.
— Schimperiana Boiss. II. 782. no. 46.
— sericea All. *I. 272. no. 3.
— Sicula Prsl. I. 272. no. 11.
Silene Sieberi Fnzl. I. 274. no. 31.
— Sinaica Boiss. II. 778. no. 12.
— Skouleri Hook. I. 278. no. 66.
— sobolifera Schott. II. 777. no. 7.
— speciosa Hortor.? V. 82. †
— squamigera Boiss. II. 783. no. 56.
— *Ssojutica* Lssng. II. 777. no. 7.
— stellarioides Nutt. I. 279. no. 73.
— stellata Ait. I. 280. †
— stenophylla Ldb. II. 776. no. 4.
— stentoria Fnzl. I. 275. no. 38.
— stylosa Bnge. I. 276. no. 48.
— *stylosa α*. Ldb. II. 777. no. 6. *γ*.
— *stylosa β. alpicola* Ldb. II. 777. no. 6. *α*.
— suaveolens Turcz. II. 779. no. 24.
— subconica Friv. I. 274. no. 26.
— subulata Boiss. II. 783. no. 53.
— subvinosa Delile. I. 272. no. 13.
— succulenta Del. *I. 272. no. 4.
β. minor Moris.
— supina M. B. I. 280. †
— swertiaefolia Boiss. II. 782. no. 49.
— Tejedensis Boiss. I. 273. no. 20.
— tenella C. A. Mey. I. 276. no. 42. *II. 780. no. 28.
— tenuiflora Guss. I. 273. no. 17.
— *tenuis* Poir. II. 777. no. 6. *γ*.
— *tenuis* Turcz. II. 777. no. 6. *β*.
— Thunbergiana Eckl. et Zeyh. I. 278. no. 63.
— thysanodes Fnzl. I. 279. no. 78.
— tunicoides Boiss. II. 780. no. 30.
— undulatifolia Moris. I. 272. no. 2.
— *undulatifolia* Otto. I. 272. no. 7.
— vespertina Linn. I. 280. †
— *vespertina* Retz. I. 272. no. 3.
— Virginica Linn. *I. 278. no. 69. (c. varr. *α*. et *β*. ibid.)
— *viscaginoides* Hornem. II. 777. no. 6. *β*.
— viscariaefolia Boiss. II. 781. no. 44.
— Webbiana Wall. I. 277. no. 58.
— *Wolgensis* Spr. II. 779. no. 19.
— Zawadzkii Lall. II. 776. no. 1.
Sileneae DC. I. 266. II. 771. V. 77.
Siler Scop. *II. 417.
Silerineae Koch. II. 417.
Siliquaria DC. I. 193. no. 2. 3. I. 194. no. 14. 16. II. 764. no. 1. V. 52. no. 1.
Siliquastrum quartum Fchs. III. 37. no. 24.
— *rotundum angustifolium* Tabernaemont. III. 34. no. 8.
Siliquosae Bth. (Bonnaya) III. 288.
Siliquosae Bth. (Vandellia) III. 293.
Siloxerus humifusus Labill. VI. 228. no. 3.
Silphiastrum DC. II. 605. no. 2.
Silphidium Torr. et Gr. II. 980.

Silphieae DC. II. 604. II. 975. VI. 149.
Silphiosperma Steetz. ° VI. 185.
— glandulosum Steetz. VI. 185. no. 1.
— perpusillum Steetz. VI. 185. no. 2.
Silphium Linn. II. 604. II. 975. VI. 721.
— *betonicaefolium* Hook. II. 975. no. 1.
— compositum Michx. * II. 775. no. 2.
γ. ovatifolium } Torr. et Gr.
β. reniforme }
— dentatum Ell. II. 975. no. 3. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— doronicifolium Knze. VI. 721. no. 1.
— integrifolium Michx. * II. 975. no. 5.
β. laeve Torr. et Gr.
— laciniatum Linn. * II. 975. no. 1. (c. var. β.)
— *laevigatum* Prsh. II. 975. no. 5. β.
— lanceolatum Nutt. II. 604. no. 3.
— *lanceolatum* Nutt. II. 975. no. 3. γ.
— *nudicaule* Curtis. II. 975. no. 2.
— *Nuttallianum* Torr. II. 975. no. 3.
— *pumilum* DC. II. 975. no. 2. α.
— *pumilum* Michx. II. 605. no. 3.
— *quercifolium* DC. II. 975. no. 3.
— Radula Nutt. II. 604. no. 1.
— *Radula* Nutt. II. 975. no. 4. γ.
— reniforme Raf. II. 605. no. 4.
— *reniforme* Raf. II. 975. no. 2. β.
— *reticulatum* Prsh. II. 605. no. 2. II. 975. no. 2.
— scaberrimum Ell. * II. 975. no. 4. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— speciosum Nutt. II. 604. no. 2.
— *speciosum* Nutt. II. 975. no. 5. β.
— *subacaule* Nutt. II. 605. no. 5. II. 975. no. 4.
— *tomentosum* Prsh. II. 605. no. 4.
— *trifoliatum* DC. II. 975. no. 3. (ex p.)
Silvia Bth. * VI. 649.
— *curialis* Arrabida. III. 377. no. 1.
Silybeae Lssng. II. 673.
Silybum Vaill. * II. 673.
— *cernuum* Ldb. II. 677. no. 1.
Simaba St. Hil. I. 524. II. 826. V. 397.
— Bahiensis Moric. I. 524. no. 4.
— bicolor Zucc. I. 524. no. 3.
— cuneata St. Hil. et Tul. I. 525. no. 8.
— glandulifera Gardn. I. 524. no. 5. (II. 826. no. 1.)
— insignis St. Hil. et Tulasne. I. 525. no. 6.
— laevis Casaretto. V. 398. no. 2.
— longifolia Casaretto. V. 397. no. 1.
— Majana Casaretto. V. 398. no. 3.
— quassioides G. Don. I. 524. no. 1.
— *quassioides* G. Don. I. 525. no. 1. V. 395. no. 1.
— subcymosa St. Hil. et Tul. I. 525. no. 7.
Simaba? undulata Guill. et Perr. I. 524. no. 2.
Simaruba Aubl. I. 524.
— *excelsa* DC. V. 398. no. 1.
— versicolor St. Hil. I. 524. no. 1.
SIMARUBEAE Rich. I. 524. II. 826. V. 397.
Simblocline DC. * II. 583. * II. 952. no. 11.
Simbuleta Forsk. III. 186. no. 1.
Simocheilus Bth. * II. 729.
Simplicifoliae Bth. (Crotalaria) V. 435.
Simplicifoliae DC. (Indigofera) I. 661. 670.
Simsia Pers. * II. 615.
Sinapidendron Lowe. I. 184.
— frutescens Lowe. * I. 184. no. 1.
— salicifolium Lowe. I. 184. no. 2.
β. chaetocalyx.
α. gymnocalyx.
Sinapis Tournef. I. 186.
— alba Linn. * I. 186. no. 3. I. 187. †
— *alba* Linn. I. 185. no. 14. adn.
— *Apula* DC. I. 187. no. 1.
— arvensis Linn. * I. 186. no. 2. I. 187. †
— *arvensis* Linn. I. 185. no. 13. adn.
— *Baetica* Boiss. * I. 185. no. 12. adn.
— *dissecta* Lag. I. 185. no. 16. adn.
— dissecta Lag. * I. 186. no. 4.
— *frutescens* Ait. I. 184. no. 1.
— *Hispanica* Lam. I. 185. no. 6.
— *hispida* Schousb. I. 185. no. 15. adn.
— incana Linn. I. 186. no. 5. I. 187. †
— *incana* Linn. I. 185. no. 11. adn.
— inflexa Wlprs. I. 186. no. 6.
— integrifolia Wlprs. I. 187. no. 7.
— *integrifolia* Willd. I. 186. no. 14.
— nigra Linn. * I. 186. no. 1. I. 187. †
— *oleracea* Prsl. I. 187. no. 2.
— orientalis Linn. I. 187. †
— *orientalis* Linn. I. 185. no. 13. β. adn.
— Schkuhriana Rchb. I. 187. † et diagn.
— *virgata* Prsl. I. 187. no. 3.
Sinclairia Hook. et Arn. II. 544. VI. 103.
— discolor Hook. et Arn. * II. 544. no. 1. VI. 103. no. 1.
Singana Aubl. * I. 202.
Sinningia guttata Lindl. VI. 402.
— *velutina* Lindl. VI. 402.
— *Youngeana* Paxton. VI. 401.
Sipanea Aubl. II. 503. VI. 58.
— *carnea* Hortor. VI. 57. no. 1.
— *elatior* Bth. VI. 57. no. 3.
—? erythraeoides Cham. II. 504. no. 2.
— radicans Endl. II. 503. no. 1.
— trichantha Miquel. VI. 58. no. 1.
Siphanthera Pohl. * II. 121.
Siphocalyx DC. II. 361.
Siphocampylus Pohl. II. 708. VI. 378.

Siphocampylus asper Bth. VI. 379. no. 10.
— Benthamianus Wlprs. VI. 379. no. 11.
— betulaefolius DC. II. 708. † VI. 380. †
— bicolor G. Don. II. 708. † VI. 380. †
— coccineus Hook. VI. 378. no. 3.
— *cordifolius* Bth. VI. 379. no. 11.
— cordifolius Otto et Dietr. VI. 378. no. 2.
— divaricatus Bth. VI. 378. no. 4.
— erianthus Bth. VI. 379. no. 7.
— giganteus Don. VI. 380. †
— Hartwegi Bth. VI. 378. no. 6.
— hispidus Bth. VI. 380. no. 13.
— lantanifolius DC. *VI. 378. no. 1. VI. 734. †
β. glabriusculus Hook. VI. 378. no. 1.
— lanatus Bth. VI. 380. no. 12.
— longepedunculatus Pohl. VI. 380. †
— microstoma Hook. VI. 733. no. 1.
— nitidus Morren. VI. 734.
— Popayanensis Bth. VI. 379. no. 9.
— pubescens Bth. VI. 379. no. 8.
— revolutus Grah. II. 708. no. 1.
— subcarnosus Bth. VI. 378. no. 5.
Siphonanthae Bth. (Pedicularis) III. 413.
Siphonanthus angustifolia Willd. IV. 103. no. 5.
— *hastata* Rxb. IV. 102. no. 4.
— *Indica* Willd. IV. 103. no. 5.
Siphonella Torr. et Gr. II. 527.
Siphonodon Griffith. °V. 404.
— celastrinus Griffith. V. 404. no. 1.
Siphonomorpha Oth. I. 274. no. 31. 32. 33. 36. 38. II. 780. V. 81. no. 1.
Siphonostegia Bth. III. 407. °III. 972. *VI. 652.
— Chinensis Bth. III. 407. no. 1.
Siphonychia Torr. et Gr. I. 262. no. 12.
Sipholaxis rosea Bojer. III. 895. no. 3.
Siso s. c. Purpura, vulgo Murassakki s. e. nobilis Kaempf. III. 493. no. 39.
Sison Lag. *II. 392.
— *Sieberianum* DC. II. 417. no. 1.
— *Thomasii* Tenore. V. 854. no. 1.
Sisymbrieae DC. I. 160. V. 38.
Sisymbrium Linn. I. 163. II. 760. V. 39.
— aculeolatum Boiss. I. 165. no. 19.
— acutangulum DC. I. 167. †
— *album* Pall. I. 171. no. 1. I. 175. no. 3.
— *arabidoides* Hook. I. 133. no. 30.
—? Arnottianum Hook. et Arn. I. 166. no. 32.
— Arundanum Boiss. I. 163. no. 4.
— asperum Hochst. et Steud. I. 165. no. 19.
— *asperum* Linn. I. 125. no. 1.
— Austriacum Jcq. I. 167. †
— binerve C. A. Mey. I. 161. no. 11.
— *brachycarpum* Richards. I. 166. no. 27. δ.
Sisymbrium brachypetalum C. A. Mey. II. 760. no. 2.
— brassicaeforme C. A. Mey. I. 163. no. 5.
— brevipes Kar. et Kir. II. 760. no. 1.
— canescens Nutt. I. 166. no. 27. (c. varr. γ. d.)
ζ. brevipes } Torr. et Gr.
ε. Californicum } Torr. et Gr.
β. canescens } Torr. et Gr.
— Columnae Jcq. I. 167. †
— *Columnae* Linn. I. 163. no. 1.
— *contortuplicatum β. rectisiliquum* DC. I. 165. no. 16.
— *crassifolium* Cav. I. 184. no. 10. adn.
— crassifolium Cav. II. 760. no. 3.
— Cumingianum Fisch. et Mey. I. 166. no. 31.
— *curvisiliquum* Hook. I. 127. no. 16.
— decipiens Bnge. V. 39. no. 1.
— *dentatum* Torr. I. 133. no. 29.
— *Erucastrum* Poll. I. 185. no. 5.
— *Erucastrum* Vill. I. 185. no. 6.
— *erysimoides* Desf. I. 163. no. 2.
— flavissimum Kar. et Kir. I. 164. no. 10.
— frutescens Gill. I. 166. no. 36.
— *Gallicum* Schleich. I. 185. no. 5.
— glaucum Nutt. I. 166. no. 28.
— halophilum C. A. Mey. I. 174. no. 15.
— heteromallum C. A. Mey. I. 164. no. 8.
— *heterophyllum* Forst. I. 136. no. 15.
— humile C. A. Mey. I. 164. no. 12. (c. varr. β. et γ.)
— Irio Linn. *I. 163. no. 2. I. 167. †
— irioides Boiss. I. 165. no. 21.
— junceum M. B. (c. var. α.—ε.) I. 164. no. 6. I. 167. †
— leptocarpum Hook. et Arn. I. 166. no. 35.
— linifolium Nutt. I. 165. no. 24. (III. Emend. p. 1.)
— Loeselii Linn. I. 167. †
— *Ludowicianum* Nutt. I. 137. no. 21.
— Meyeri Ldb. I. 165. no. 16.
— *micranthum* Rth. I. 126. no. 9.
— millefolium Ait. I. 165. no. 22.
— *monanthos* Viv. I. 184. no. 1.
— mollissimum C. A. Mey. I. 164. no. 13.
— multisiliquosum Hffm. I. 167. †
— *nitidum* Zea. I. 163. no. 2.
— *obtusangulum* Schleicher. I. 185. no. 8.
— officinale Linn. *I. 163. no. 1. I. 167. †
— Pannonicum Jcq. I. 167. †
— *Pannonicum* C. A. Mey. II. 760. no. 2.
— pauciflorum Nutt. I. 166. no. 30.
— *pendulum* Dsf. I. 184. no. 7. adn.
— perfoliatum C. A. Mey. I. 164. no. 7.
— *perfoliatum* C. A. Mey. I. 169. no. 23.

Sisymbrium pinnatifidum DC. *I. 163. no. 3. I. 167. †
— polyceratium Linn. I. 167. †
— *polystachyum* Hort. I. 167. no. 1.
— Preauxianum Webb. I. 165. no. 23.
— pygmaeum Nutt. I. 165. no. 25.
— rigidulum Dcne. I. 165. no. 17.
— *rigidulum* Lag. I. 163. no. 2.
— sagittatum Hook. et Arn. I. 166. no. 34.
— Schimperi Boiss. I. 165. no. 20.
— scorpiuroides Boiss. I. 165. no. 18.
— *Sophia* Cham. et Schlchtd. I. 166. no. 26.
— Sophia Linn. I. 167. †
— sophioides Fisch. I. 165. no. 26.
— stenophyllum Gill. I. 166. no. 33.
— strictissimum Linn. I. 167. †
— supinum Linn. I. 167. †
— *tanacetifolium* Walt. I. 126. no. 12.
— tenuissimum Kar. et Kir. I. 164. no. 9.
— Titicacense Wlprs. V. 39. no. 2.
— toxophyllum C. A. Mey. *I. 164. no. 14.
— virgatum Nutt. I. 166. no. 29.
— *Walteri* Ell. I. 126. no. 12.
Sisyranthus E. Mey. *VI. 495.
Sisyrocarpum Ohlendorffii Kltzsch. VI. 401. no. 1.
Sium Fchs. III. 350. no. 78.
Sium Koch. II. 396.
— *luteum* Spr. V. 853. no. 1.
— pusillum Nutt. II. 396. no. 1.
Skimmia Thnbrg. I. 541. °V. 404.
— Japonica Thnbrg. *I. 541. no. 1. V. 405. no. 1.
— Laureola Sieb. et Zucc. V. 405. no. 2.
Skinnneria Choisy. *VI. 541.
Skirrhophorus DC. *II. 643. VI. 229.
— Cunninghami DC. VI. 229. no. 1.
— Preissianus Steetz. VI. 230. no. 2.
Skytalanthus Schauer. °VI. 478.
— acutus Schauer. VI. 478. no. 1.
Skytanthus acutus Meyen. VI. 478. no. 1.
Slevogtia Rchb. *VI. 502.
Sloanea Linn. *I. 352. V. 116.
— *cuneifolia* Mart. I. 352. no. 3.
— *alnifolia* Mart. I. 352. no. 2.
— Jamaicensis Hook. V. 116. no. 1.
Sloaneae Endl. I. 352. V. 115.
Smeathmannia Sol. II. 218. V. 770.
— illustris Endl. *II. 218. no. 1. V. 770. no. 3.
— laevigata Soland. V. 770. no. 1.
— media R. Br. V. 770. no. 2
Smelowskia C. A. Mey. (I. 164. no. 10?) I. 171. II. 761.
— asplenifolia Turcz. II. 761. no. 1.
— *bifurcata* Turcz. I. 175. no. 2.
Smelowskia calycina C. A. Mey. *I. 171. no. 2.
— cinerea C. A. Mey. *I. 171. no. 1.
— *cinerea* C. A. Mey. I. 175. no. 3.
— cordifolia Turcz. II. 761. no. 3.
— *integrifolia* C. A. Mey. I. 171. no. 1.
— parviflora Turcz. II. 761. no. 2.
Smithia Ait. I. 735.
— blanda Wall. I. 735. no. 3.
— ciliata Bth. I. 735. no. 5.
— cristata Wght. I. 726. no. 1.
— *geminiflora* Rth. I. 735. no. 1.
— paniculata Arn. I. 735. no. 4.
— racemosa Heyne. I. 735. no. 2.
— sensitiva Ait. *I. 735. no. 1. (c. var. β.)
Smyrneae Koch. II. 423. V. 910.
Smyrniopsis Boiss. °V. 922.
— Aucheri Boiss. V. 922. no. 1.
Smyrnium Linn. II. 426.
— *apiifolium* Willd. II. 426. no. 1.
— *atropurpureum* Lam. II. 403. no. 1.
— *cicutarium* M. Bieb. V. 921. no. 1.
— *cordatum* Walt. II. 403. no. 1.
—? lineare Bth II. 426. no. 1.
— *nudicaule* M. Bieb. II. 426. no. 1.
— *nudicaule* Prsh. II. 411. no. 27.
— *trifoliatum* Nutt. II. 403. no. 1.
Soala Blanco. I. 398.
— littoralis Blanco. *I. 398. no. 1.
Sobolewskia M. B. *I. 183.
Socconcha III. 652. no. 203. III. 670. no. 279.
Soemmeringia Mart. I. 735.
— semperflorens Mart. *I. 735. no. 1.
Sogalgina Cas. *II. 630.
Soja Javanica Grah. I. 759. no. 2.
— *Wightii* Grah. I. 759. no. 1.
Soladi Tirtava Rheede. III. 484. no. 2. β.
SOLANACEAE Bartl. III. 5. °III. 953. VI. 566.
Solanaceae Miers. VI. 566.
Solanastrum Heist. III. 83. no. 323.
Solandra Swrtz. III. 18. °III. 954. VI. 573.
— grandiflora Swrtz. III. 18. no. 1.
— guttata D. Don. III. 19. no. 4.
— longipes Sendtner. VI. 573. no. 1.
— nitida Zuccagn. III. 18. no. 2.
— oppositifolia Loud. III. 19. no. 5.
— *oppositifolia* Loud. VI. 701. no. 1.
— *scandens* Willd. III. 18. no. 1.
— viridiflora Sims. III. 19. no. 3.
Solaneae Endl. III. 22. III. 954. VI. 574.
Solaneae Miers. VI. 567.
Solanecio C. H. Schultz. *VI. 273.
Solani pubescentis var. Wall. III. 92. no. 382.
Solanum Linn. III. 100.
Solanum Tournef. III. 38. °III. 954. VI. 583.
— ...... *novum? volubile* Schlchtd. VI. 584. no. 3.

Solanum Abyssinicum Jcq. III. 84. no. 330.
— *acanthifolium* Dsf. III. 79. no. 302. VI. 605. no. 152.
— *acanthifolium* Hortor. III. 73. no. 264.
— *acanthifolium* Mill. III. 84. no. 331.
— acerifolium Dunal. III. 85. no. 335.
— acerosum Sendtner. VI. 598. no. 106.
— *acetosaefolium* Lam. III. 88. no. 359.
— aciculare Swrtz. III. 85. no. 341.
— aculeatissimum Jcq. III. 85. no. 337. VI. 597. no. 101.
— aculeolatum Martens et Galeotti. VI. 609. no. 173.
— acuminatum Rz. et Pav. III. 59. no. 163.
— acutifolium Rz. et Pav. III. 66. no. 220.
— acutilobum Dunal. III. 80. no. 312.
— *acutilobum* Dunal. VI. 602. no. 131. *β*.
— adenotrichum Dunal. III. 93. no. 393.
— *adenotrichum* Vandelli. VI. 590. no. 49.
— *adhaerens* Willd. III. 72. no. 263. VI. 608. no. 170.
— adscendens Sendtner. VI. 586. no. 16.
— Aethiopicum Linn. III. 46. no. 60.
γ. aculeatum } Dunal.
β. violaceum }
— Adoënse Hochst. *III. 98.
— Aegyptiacum Forsk. III. 50. no. 90.
— *Aegyptiacum β*. Forsk. III. 50. no. 91.
— *Aethiopicum* Lour. III. 46. no. 60.
— aethiopioides Cav. *III. 98.
— affine Sendtner. VI. 598. no. 108.
— Africanum Tournef. III. 95. no. 418.
— aggregatum Jcq. III. 58. no. 157.
— agrarium Sendtner. VI. 599. no. 116.
— agreste Brouss. *III. 98.
— *agreste* Rth. III. 83. no. 324. *γ*.
— *alatum* Mnch. III. 49. no. 82.
— alatum Seemann et J. Schmidt. III. 952 b.
— *alatum* Seemann et J. Schmidt. VI. 600. no. 123.
— albicaule Kotschy. *III. 98.
— albidum Dunal. III. 80. no. 313.
— album Lour. III. 84. no. 334.
— aligerum Schlchtd. VI. 590. no. 54.
— allogonum Bernh. III. 48. no. 76.
— *alternato-pinnatum* Steud. VI. 609. no. 172.
— Amazonicum Ker. III. 92. no. 385.
— ambiguum Dunal. III. 73. no. 269.
— *ambiguum* Dunal. VI. 608. no. 170.
— amblophyllum Hook. *III. 98.
— ambrosiacum Vellozo. III. 100. † VI. 599. no. 114.
— *Americanum* Dalech. III. 46. no. 64.
— Americanum Mill. III. 94. no. 402.
— *Americanum molle etc.* Tournef. III. 85. no. 340.
Solanum Americanum vulgari simile etc. Rand. III. 94. no. 402.
— amoenum Joghn. III. 75. no. 281.
— amplexicaule Sendtner. VI. 584. no. 9.
— amygdalifolium Steudel. VI. 594. no. 82.
— anceps Rz. et Pav. III. 57. no. 147.
— anguivi Lam. III. 88. no. 362.
— *angulatum* Rz. et Pav. III. 44. no. 50.
— *angulosum* Madr. Herb. III. 62. no. 183.
— angurium Dunal. III. 98. no. 446.
— angustiflorum Martius. VI. 608. no. 169.
— angustifolium Lam. III. 52. no. 103.
— *angustifolium* Mill. III. 98. no. 446.
— *angustifolium* Rz. et Pav. III. 51. no. 100.
— anoacanthum Sendtner. VI. 599. no. 112.
— anomalum Thonn. III. 75. no. 280.
— anonaefolium Dunal. III. 51. no. 98.
— apiculatum Sendtner. VI. 602. no. 135.
— appendiculatum Dunal. III. 39. no. 10.
— Aquartia Dunal. III. 70. no. 245.
— aquaticum Dsf. III. 98. no. 450.
— Arabicum Dunal. III. 97. no. 437.
— Arakatscha Besser. *III. 98.
— *arborescens* Caesalp. III. 46. no. 64.
— arboreum Dunal. III. 59. no. 161.
— arcuatum Sendtner. VI. 698. no. 104.
— ardisioides Blume. III. 93. no. 388.
— arenarium Sendtner. VI. 587. no. 27.
— argenteum Dunal. III. 56. no. 141. *VI. 588. no. 35.
γ. angustifolium } Sendtner VI. 588.
β. luridum } no. 35.
— *argenteum* Heyne. III. 78. no. 301.
— *argenteum* Martius. VI. 588. no. 36.
— *argyracantha* Dum. III. 82. no. 319. *β*.
— *armatum* Forsk. III. 97. no. 437.
— armatum R. Br. III. 87. no. 351.
— Arrebenta Vellozo. III. 100. †
— *Arrebenta* Vellozo. VI. 597. no. 101.
— asarifolium Ktb. et Bouché. VI. 595. no. 85.
— *aspero-lanatum* Rz. et Pav. III. 80. no. 310. VI. 605. no. 152.
— *asperum* Hornem. III. 49. no. 79. *α*.
— *asperum* Martius. VI. 591. no. 56. *β*.
— *asperum* Rich. III. 53. no. 114.
— *asperum* Sieber. VI. 591. no. 58.
— asperum Vahl. III. 53. no. 113. VI. 591. no. 56.
β. angustifolium Sndtnr. VI. 591. no. 56.
— *assimile* Friv. III. 44. no. 45.
— assimile Friv. III. 54. no. 122.
— asterophorum Mart. III. 75. no. 284. *VI. 606. no. 154.
β. tomentosum Sndtnr. VI. 606. no. 154.
— astroites Jcq. III. 77. no. 294.
— *astrophorum* Jan. III. 83. no. 323.

Solanum atriplicifolium Desportes. III. 48. no. 75. δ.
— atriplicifolium Gillies. III. 47. no. 74.
β. minus.
— *atriplicifolium* Gillies. VI. 585. no. 13. ζ.
— Atropae Schum. III. 47. no. 67.
— atropurpureum Schrank. VI. 598. no. 107.
— atrovirens Dunal. III. 97. no. 443.
— Aturense Dunal. III. 73. no. 265.
— *Aturense* Dunal. VI. 608. no. 170.
— aurantiacum Sendtner. VI. 595. no. 86.
— aureum Dunal. III. 52. no. 107.
— *aureum* Swrtz. III. 55. no. 137. VI. 588. no. 36.
— auriculatum Ait. III. 54. no. 119. VI. 591. no. 57.
γ. angustifolium } Sendtner. VI. 591.
β. pulverulentum } no. 57.
— aviculare Forsk. III. 95. no. 421.
— *aviculare* Pers. III. 41. no. 22.
— axilliflorum Dunal. III. 94. no. 403.
— *bacciferum vulgari simile Africanum etc.* Tournef. III. 95. no. 418.
— *Bahamense* Forsk. III. 97. no. 436.
— *Bahamense* Hortor. III. 69. no. 237.
— Bahamense Linn. HI. 69. no. 239.
— *Bahamense* Mill. III. 54. no. 121.
— Balbisii Dunal. III. 91. no. 373. VI. 601. no. 127.
β. oligospermum Sendtner. VI. 601. no. 127.
β. purpureum Hook. III. 91. no. 373.
— *Balbisii β. purpureum* Hook. VI. 601. no. 128. β.
— *Balbisii* Ker. III. 91. no. 373. β.
— Banksianum Vandelli. III. 97. no. 442.
— *Banksianum* Vandelli. VI. 597. no. 101.
— barbisetum N. ab E. III. 86. no. 344.
— Bassovia Rich. III. 57. no. 148.
— Bauerianum Endl. III. 45. no. 58.
— *Belfort* Vandelli. HI. 97. no. 441. VI. 602. no. 131.
— Belfortianum Dunal. III. 97. no. 441.
— *Belfortianum* Dunal. VI. 602. no. 131.
— Berterii Dsf. *III. 98.
— Besseri Weinm. III. 50. no. 93.
— betaceum Cav. III. 43. no. 38. VI. 578. no. 9.
— *bicolor* Martius. VI. 588. no. 35.
— *bicolor* Willd. III. 53. no. 118. VI. 591. no. 56.
— bifissum Vellozo. III. 99. † III. 100. †
— *bifissum* Vellozo. VI. 596. no. 97. VI. 599. no. 110.
— *biflorum* R. Br. III. 68. no. 230.
— *biflorum* D. Don. III. 64. no. 200.
Solanum biflorum Lour. III. 65. no. 206.
— biformifolium Rz. et Pav. III. 66. no. 219.
— bifurcum Hochst. *III. 98.
— bigeminatum N. ab E. III. 62. no. 183.
— Blumei N. ab E. III. 62. no. 185.
— boerhaviaefolium Sndtnr. VI. 593. no. 76.
— Bombense Jcq. III. 52. no. 110.
— Bonariense Linn. III. 76. no. 287.
— *Botelhianum* Dunal. III. 96. no. 428.
— Botelho Vandelli. III. 96. no. 428.
— brachyacanthum Dunal. III. 73. no. 270.
— *brachyacanthum* Dunal. VI. 608. no. 170.
— bracteatum Thnbrg. III. 50. no. 87.
— *brancaefolium* Jcq. VI. 601. no. 127.
— Brasilianum Dunal. III. 96. no. 429.
— *Brasilianum, folio integro mucronato glabro etc.* Pluk. III. 96. no. 429.
— *brassicaefolium* Jcq. III. 91. no. 373.
— brevifolium Dunal. III. 57. no. 149.
— brevipilum Dunal. III. 71. no. 256.
— Brownii Dunal. III. 78. no. 299.
— buddleiaefolium Sendtner. VI. 602. no. 133.
— bulbocastanum Moç. et Sess. III. 42. no. 33.
— bullatum Vellozo. III. 99. † VI. 592. no. 62.
— Caavurana Vellozo. III. 59. no. 162.
— Cajanumense H. B. Kth. III. 93. no. 392.
— *Cajanumense* H. B. Kth. VI. 579. no. 24.
— Caldasii Dunal. III. 40. no. 13.
— callicarpaefolium Kth. et Bouché. VI. 591. no. 58.
— calycinum Moç. et Sess. III. 45. no. 57.
— *calycinum* N. ab E. III. 92. no. 382.
— *calygnaphalium* Rz. et Pav. III. 56. no. 138.
— campaniforme Roem. et Schult. III. 95. no. 411. VI. 609. †
— campanulatum R. Br. III. 87. no. 350.
— *campanulatum* Willd. III. 95. no. 411.
— Campechiense Linn. III. 84. no. 331.
— *Campechiense β. fuscatum* Linn. III. 82. no. 322.
— campylacanthum Hochst. *III. 98.
— candicans Dunal. III. 62. no. 182.
— candidum Lindl. III. 89. no. 364.
— *canescens* Blume. III. 83. no. 324. *a.*
— Capense Thnbrg. III. 97. no. 444.
— *capsicastrum* Lnk. III. 46. no. 64. β.
— capsicastrum Lnk. VI. 589. no. 41.
— *capsicoides* Hort. Paris. III. 86. no. 342. VI. 597. no. 101.
—? capsicoides Mart. III. 58. no. 154.
— *capsicoides* Mart. VI. 579. no. 20.
— *Capsicum dictum perenne minus erectum* Weinm. III. 35. no. 11.

Solanum Capsicum fructu erecto rubro rotundo Weinm. III. 33. no. 1. η.
— Caracasanum Roem. et Schult. III. 96. no. 425.
—? Cari Molina. III. 39. no. 7.
— Caripense Dunal. III. 42. no. 32.
— Carolinense Linn. III. 89. no. 363. VI. 609. †
— celastroides Sendtner. III. 54. no. 125.
— *celastroides* Sendtner. VI. 583. no. 2. β.
— cerinum cf. S. cernuum.
— cernuum Vellozo. III. 99. † VI. 592. no. 61.
— *Cervantesii* Lag. III. 53. no. 111.
— cestrifolium Fisch. *III. 98.
— *chenopodioides* Lam. III. 49. no. 79. α. *VI. 585. no. 13. γ.
— Chinense Dunal. III. 96. no. 435.
— *chloranthum* DC. VI. 597. no. 101.
— *chloranthum* Poepp. VI. 607. no. 162.
— chloranthon Spr. III. 55. no. 128.
— chloropetalon Schlchtd. VI. 597. no. 102.
— *chrysobotrys* Hort. Berol. III. 100. no. 2. β.
— chrysophyllum Dunal. II. 66. no. 215.
— chrysotrichum Schlchtd. VI. 605. no. 151.
— *ciliare* Willd. III. 86. no. 342. VI. 597. no. 101.
— ciliatum Lam. III. 86. no. 342.
— *ciliatum* Lam. VI. 597. no. 101.
— ciliolatum Martens et Galeotti. VI. 595. no. 92.
— cinereum R. Br. III. 87. no. 353. *III. 98.
— cinnamomeum Sendtner. VI. 592. no. 66.
— cirrhosum Dunal. III. 43. no. 42.
— citrifolium Willd. III. 94. no. 407.
— cladotrichum Dunal. III. 93. no. 395.
— *cladotrichum* Martius. VI. 607. no. 165.
— *cladotrichum* Vandelli. VI. 590. no. 50.
— *cladotrichum* Vellozo. III. 54. no. 123.
— clathratum Sendtner. VI. 590. no. 46.
— coagulans Forsk. III. 83. no. 325.
— Coarense Sendtner. VI. 586. no. 18.
— *coccineum* Hort. Paris. III. 77. no. 293. β. III. 83. no. 326.
— coccineum Jcq. III. 71. no. 255.
— coeruleum Vellozo. III. 99. † VI. 586. no. 19.
— Commersonii Poir. III. 39. no. 9.
δ. glabratum; α. glabriusculum; γ. glanduloso-pubescens; β. pilosiusculum } Hook. fil. VI. 584. no. 2.
— *commutatum* Spr. III. 100. no. 2. β.
— concavum Lindl. III. 93. no. 391.
— concinnum Schott. VI. 590. no. 49.
— Congense Lnk. III. 83. no. 328.
— congestum Vellozo. III. 99. † VI. 596. no. 99.
Solanum conicum Rz. et Pav. III. 40. no. 18.
— conicum Vellozo. III. 99. †
— *conicum* Vellozo. VI. 577. no. 6.
— conocarpum Rich. III. 58. no. 153.
— Convolvulus Sendtner. VI. 593. no. 75.
— cordatum Forsk. III. 96. no. 430.
— cordifolium Dunal. III. 71. no. 251. VI. 609. †
— coriaceum Dunal. III. 75. no. 278.
— *coriaceum* Hook. III. 57. no. 152.
— cormanthum Vellozo. III. 99. † VI. 586. no. 22.
— cornifolium Dunal. III. 60. no. 167.
— cornutum Lam. III. 91. no. 375.
— coronatum Vellozo. III. 99. †
— *coronatum* Vellozo. VI. 590. no. 52.
— *corymbiferum* Gmel. III. 43. no. 41.
— corymbosum Jcq. III. 43. no. 41.
— *corymbosum* Wght. III. 54. no. 126.
— *crassifolium* Ortega. III. 43. no. 38. VI. 578. no. 9.
— crassipetalum Wall. III. 64. no. 200.
— *crassipetalum* Wall. III. 65. no. 211.
— crinitum Lam. III. 87. no. 355.
— crispum Rz. et Pav. III. 52. no. 106. III. 933.
— *croceum* Dunal. III. 72. no. 259.
— crotonifolium Dunal. III. 60. no. 171.
— *crotonifolium* Dunal. VI. 579. no. 25.
— crotonoides Lam. III. 70. no. 246.
— *crotonoides* Sieb. VI. 608. no. 167. VI. 608. no. 170.
— Cumanense Roem. et Schult. III. 94. no. 409.
— *cuneatum* Mnch. III. 89. no. 365.
— cuneifolium Dunal. III. 72. no. 259. VI. 609. †
— *cuneifolium* Willd. III. 72. no. 261.
— Cutacense H. B. Kth. III. 64. no. 197.
— cyanocarphium Blume. III. 96. no. 434.
— cylindricum Vellozo. III. 99. †
— *cylindricum* Vellozo. VI. 578. no. 14.
— *cymosum* Ortega. III. 76. no. 290.
— dasyphyllum Thonn. III. 75. no. 279.
— *dealbatum* Lindl. III. 67. no. 222.
— decemdentatum Rxb. III. 64. no. 199.
— decompositiflorum Sendtner. VI. 604. no. 141.
— decorticans Sendtner. VI. 593. no. 74.
— decorum Sendtner. VI. 602. no. 134. β. lanuginosum.
— *decurrens* Balbis. III. 91. no. 373. VI. 601. no. 127.
— decurrens Vellozo. III. 100. † VI. 609. no. 174.
— densiflorum Martens et Galeotti. VI. 592. no. 63.

Solanum densiflorum Sendtner. VI. 605. no. 148.
— *denticulatum* α. Blume. III. 64. no. 200.
— denticulatum Blume. III. 65. no. 211. (c. varr. α. et β. ibid.)
— Desvauxii Hamilt. III. 47. no. 70.
— diantherum Vellozo. III. 99. †
— *diantherum* Vellozo. VI. 590. no. 49.
— dianthophorum Dunal. III. 68. no. 230.
— dichotomum Lour. III. 55. no. 130.
— dichotomum Martens et Galeotti. VI. 588. no. 37.
— *dichotomum* Rich. III. 62. no. 187.
— *dichotomum* Rz. et Pav. III. 53. no. 117.
— *dichotomum* Vandelli. III. 97. no. 439.
— dictyoticum Roem. et Schult. III. 94. no. 406.
— didymum Dunal. III. 93. no. 394.
— *diffusum* Lnk. III. 55. no. 134.
— *diffusum* Rxb. III. 90. no. 368. α.
— diffusum Rz. et Pav. III. 40. no. 19.
— diffusum Vellozo. III. 99. †
— *diffusum* Vellozo. VI. 585. no. 13. ε.
— *diffusum* Wall. III. 90. no. 368. β.
— diflorum Vellozo. III. 99. †
— *diflorum* Vellozo. VI. 589. no. 41.
— Dillenii Schult. III. 47. no. 71.
— dimidiatum Sendtner. VI. 607. no. 159.
— *diphyllum* Forsk. III. 46. no. 63.
— diphyllum Linn. III. 59. no. 106. VI. 609. †
— discolor R. Br. III. 68. no. 229.
— distichophyllum Sendtuer. VI. 589. no. 45. β. gracile.
— distichum Schum. III. 93. no. 390.
— divaricatum Martens et Galeotti. VI. 592. no. 67.
— diversifolium Dunal. III. 42. no. 31.
— diversifolium Schlchtd. VI. 605. no. 150.
— Domingense Willd. III. 96. no. 433.
— Donianum Wlprs. III. 54. no. 121.
— *dubium* Dunal. III. 72. no. 259.
— dubium Fresen. III. 83. no. 327.
— Dulcamara Linn. III. 44. no. 43.
γ. rupestre } Koch.
β. tomentosum } Koch.
— *Dulcamara* Patrin. III. 44. no. 45.
— *dulcamaroides* Poir. III. 52. no. 108.
— dumetorum Willd. III. 95. no. 410.
— Dunalianum Gaudich. III. 69. no. 241.
— echinatum R. Br. III. 68. no. 233.
— echinocarpum Bredem. *III. 98.
— Eduardi Kth. VI. 745. no. 58 a.
— edule Schum. III. 47. no. 68.
— edule Vellozo. III. 99. †
— *edule* Vellozo. VI. 601. no. 127.
— elaeagnifolium Cav. III. 67. no. 222.
Solanum elatum Lnk. III. 77. no. 292.
— elegans Dunal. III. 78. no. 300.
— elegans Vellozo. III. 99. †
— *elegans* Vellozo. VI. 578. no. 11.
— ellipticum R. Br. III. 68. no. 231.
— ellipticum Vellozo. III. 99. †
— *ellipticum* Vellozo. VI. 578. no. 13.
— *erianthum* D. Don. III. 53. no. 118.
— eriocalyx Dunal. III. 94. no. 400.
— eriophyllum Dunal. III. 71. no. 252.
— *erythraeum* Dunal. III. 48. no. 77.
— erythrocarpum Meyer. III. 49. no. 80.
— *esculentum* Dunal. III. 81. no. 319. a. b.
— *esculentum* Neck. III. 38. no. 1.
— esuriale Lindl. VI. 609. no. 175.
— Esenbeckii Steud. III. 92. no. 382.
— etuberosum Lindl. III. 39. no. 8.
— evonymoides Sendtner. III. 51. no. 94. VI. 609. †
— *farinosum* Wall. III. 78. no. 301. β.
— *fasciculatum* Martius. VI. 583. no. 2. β.
— fasciculatum Vellozo. III. 99. †
— *fasciculatum* Vellozo. VI. 583. no. 3.
— fastigiatum Willd. III. 76. no. 288. VI. 609. †
— ferocissimum Lindl. VI. 609. no. 176.
— ferox Linn. III. 86. no. 347.
— *ferox β. flavescens* N. ab E. III. 86. no. 346.
— ferrugineum Jcq. III. 79. no. 304.
— *ferrugineum* Jcq. VI. 606. no. 152. δ.
— *ferrugineum* Sieb. VI. 605. no. 152.
— *ficifolium* Ortega. III. 79. no. 302. VI. 605. no. 152.
— filiforme Rz. et Pav. III. 55. no. 131.
— fistulosum Rich. III. 48. no. 77. β. baccis rubris.
— flaccidum Vellozo. III. 99. † VI. 593. no. 77.
— flagellare Sendtner. VI. 599. no. 115.
— flagrans Tenore. III. 60. no. 170.
— *flagrans* Tenore. VI. 579. no. 28.
— flavescens Dunal. III. 86. no. 346.
— *flavescens* Dunal. VI. 606. no. 155.
— flavidum Torrey. III. 67. no. 224.
— *flavum* Kit. III. 48. no. 78. α.
— flavum Kit. III. 50. no. 89.
— flexicaule Bth. VI. 608. no. 168.
— *flexuosum* Vahl. III. 73. no. 268. β.
— flexuosum Willd. III. 95. no. 414.
— *flexuosum* Hb. Madr. III. 62. no. 183.
— floccosum Martens et Galeotti. VI. 588. no. 34.
— *floccosum* Martens et Galeotti. VI. 606. no. 152. ζ.
— floribundum Sendtner. VI. 589. no. 109.
— *Fluminense* Steudel. VI. 577. no. 6.

Solanum foetidum Rottb. III. 98. no. 448.
— foetidum Rz. et Pav. III. 59. no. 164.
— Fontanesianum Dunal. III. 91. no. 378.
— formosum Dunal. III. 77. no. 298.
— *formosum* Hort. Dorpat. III. 91. no. 373. VI. 601. no. 127.
— Forskålii Dunal. III. 94. no. 397.
— fragrans Hook. III. 60. no. 172.
— *fragrans* Hook. VI. 577. no. 5.
— *fragrans* Tenore. VI. 587. no. 26.
— *fruticosum* Mill. III. 69. no. 239.
— *fruticosum bacciferum* Tournef. III. 46. no. 64.
— *fruticosum Indicum fructu rubro* Tournefort. III. 89. no. 365.
— *fruticosum Lauri foliis aculeatum* Plum. III. 69. no. 236.
— *fructu tecto* Cav. III. 91. no. 374.
— fugax Jcq. III. 64. no. 203.
— fultum Schrank. VI. 594. no. 78.
— furcatum Poir. III. 49. no. 81.
α. acutedentatum, *β*. obtusedentatum, *γ*. subdentatum, *δ*. subintegerrimum } N. ab E.
— furfuraceum R. Br. III. 67. no. 225.
— *fuscatum* Jcq. III. 82. no. 322. *β*.
— fuscatum Linn. III. 82. no. 322. (c. varr. *α*. et *β*. ibid.)
— fuscatum Roem. et Schult. III. 96. no. 426
— *fuscum* Heyne. III. 88. no. 359.
— Gardneri Sendtner. VI. 600. no. 118.
β. oligacanthum.
— Garipense cf. Solanum Caripense.
— gemellum Martius. VI. 587. no. 29.
— geminatum Vahl. III. 65. no. 205.
— geminiflorum Martens et Galeotti. VI. 594. no. 84.
— *geminiflorum* Schlchtd. III. 61. no. 177.
— *geminifolium* Schlchtd. III. 61. no. 177.
— geminifolium Thonn. III. 61. no. 176.
— giganteum Jcq. III. 78. no. 301. (c. varr. *β*. et *γ*. ibid.)
— Gilo Raddi. III. 93. no. 386.
— glaberrimum Dunal. III. 41. no. 26.
— glabratum Dunal. III. 96. no. 436.
— *glabrescens* Schrank. VI. 591. no. 55. *β*.
— glandulosum Rz. et Pav. III. 63. no. 196.
— glaucescens Zuccar. *III. 98. VI. 608. no. 171.
glaucophyllum Dsf. *III. 98.
— glomuliflorum Sendtner. VI. 586. no. 23.
— glutinosum Dunal. III. 77. no. 297.
— gnaphalioides Pers. III. 50. no. 138.
— gnaphalocarpum Vellozo. III. 99. † VI. 587. no. 28.
Solanum gracile Otto. *III. 98.
— gracile Sendtner. VI. 584. no. 6.
— graciliflorum Dunal. III. 69. no. 240.
— gracilipes Dcne. III. 47. no. 66.
— gracillimum Sendtner. VI. 590. no. 47.
— *grandiflorum* Dsf. III. 76. no. 290.
— grandiflorum Rz. et Pav. III. 41. no. 49. VI. 603. no. 139.
γ. angustifolium, *α*. Peruvianum, *β*. pulverulentum, *δ*. setosum } Sendtner. VI. 603. no. 139.
— Guaraniticum St. Hil. VI. 601. no. 124.
— Guineense Lam. III. 47. no. 73.
— *Guineense* Lam. VI. 585. no. 13. *δ*.
— *Guineense* Linn. III. 58. no. 157.
— *Guineense fructu magno instar Cerasi* Dill. III. 47. no. 73.
— Gula Hamilt. *III. 98.
— Hartwegi Bth. III. 45. no. 52.
— hastatum Martius. VI. 598. no. 105.
— hastifolium Hochst. *III. 98.
— Havanense Jcq. III. 57. no. 150.
— Havanense Vellozo. VI. 596. no. 100. (III. 99. †)
— *hebecarpum* Slzm. VI. 591. no. 57. *γ*.
— hebephorum Dunal. III. 42. no. 29.
— Herbertianum Paxt. *III. 98.
— *Hermanni* Dunal. III. 83. no. 323.
— Hernandesii Moç. et Sess. III. 79. no. 305.
— heteracanthum Dunal. III. 82. no. 320.
— *heterandrum* Juss. III. 91. no. 375.
— heterandrum Prsh. III. 91. no. 376.
— *heteranthera* Willd. III. 31. no. 13.
— heteroclitum Sendtner. VI. 596. no. 96.
— heterodoxum DC. III. 92. no. 379.
— heterophyllum Lam. III. 72. no. 264.
— *heterophyllum* Willd. III. 96. no. 425.
— heterotrichum Dunal. III. 72. no. 260.
— hexandrum Vellozo. VI. 600. no. 122. (III. 99. †)
β. minax Sendtner. VI. 600. no. 122.
— *Heynei* Roem. et Schult. III. 83. no. 324. *β*.
— Hindsianum Bth. VI. 600. no. 119.
— hirsutum Dunal. III. 50. no. 91.
— *hirsutum* Rxb. III. 86. no. 347.
— hirtum Vahl. III. 70. no. 250.
— hispidum Pers. III. 80. no. 309.
— Hoffmannseggii Sendtner. VI. 585. no. 14.
— Hookerianum Ant. Spreng. III. 57. no. 152.
— *horridissimum* Hort. Paris. VI. 597. no. 101.
— horridum Dunal. III. 68. no. 232.
— *hortense* Blackw. III. 48. no. 75.
— Houstoni Dunal. III. 97. no. 445.

Solanum Humboldtii Willd. III. 101. no. 4.
— humile Bernhardi. III. 50. no. 88.
— *humile* Lam. III. 88. no. 361.
— hybridum Jcq. III. 71. no. 254.
— hygrophilum Schlchtd. III. 58. no. 158.
— hystrix R. Br. III. 90. no. 370.
— igneum Linn. III. 69. no. 236.
β. parvifolium Vahl.
— impediens Weinm. III. 72. no. 262.
— inaequale Prsl. VI. 608. no. 167.
— *inaequale* Prsl. VI. 608. no. 170.
— inaequale Vellozo. III. 56. no. 145. (III. 99. †) VI. 587. no. 26.
— *incanum* Forsk. III. 83. no. 326.
— *incanum* Kit. III. 50. no 92.
— *incanum* Linn. III. 82. no. 319. *β.*
— *incanum* Rz. et Pav. III. 80. no. 313.
— *incanum Chinense minus spinosum etc.* Pluk. III. 96. no. 435.
— *incanum* var. *Zeylanicum* Pers. III. 82. no. 319. *β.*
— incarceratum Rz. et Pav. III. 85. no. 339. VI. 609. †
— incertum Dunal. III. 48. no. 78. (c. varr. *a. β.* ibid.)
— incurvum Rz. et Pav. III. 57. no. 146.
— *Indicum* Hort. Calcutt. III. 82. no. 320.
— *Indicum* Lam. III. 89. no. 465.
— Indicum Linn. III. 83. no. 324. (c. varr. *a. β. γ.* et *δ.* ibid.)
— *Indicum* Wall. III. 82. no. 319. *β.*
— *Indicum frutescens maximum etc.* Burm. III. 86. no. 347.
— *Indicum laurinis angustioribus foliis etc.* Pluk. III. 94. no. 399.
— *Indicum spinosum atrovirens etc.* Pluken. III. 97. no. 443.
— *inflatum* Hornem. III. 91. no. 373. VI. 601. no. 127.
— inodorum Vellozo. III. 99. †
— *inodorum* Vellozo. VI. 593. no. 74.
— *insanum* Linn. III. 81. no. 319. *a.* b.
— *insanum* Rxb. III. 82. no. 319. *β.*
— insidiosum Mart. III. 75. no. 285.
γ. armatissimum } Sendtn. VI. 604. no. 142.
β. pubescens }
— integerrimum Dunal. III. 93. no. 396.
— *integrifolium* Lam. III. 46. no. 60. *γ.*
— integrifolium Poir. III. 70. no. 249.
— intermedium Sendtner. VI. 586. no. 21.
— *involucratum* Blume. III. 86. no. 347.
— Ipomoea Sendtner. VI. 594. no. 81.
— isodynamum Sendtner. VI. 589. no. 43.
— Jacquini Willd. III. 89. no. 368. (c. varr. *a.* et *β.* III. 90.)
— *Jamaicense* Mill. III. 72. no. 259.
Solanum Jamaicense Swrtz. III. 71. no. 257.
— Jamesii Torrey. III. 40. no. 14.
— jasminifolium Sendtner. VI. 584. no. 7.
— jasminoides Paxton. III. 934.
— Javitense H. B. Kth. III. 74. no. 273.
— *Javitense* H. B. Kth. VI. 606. no. 153.
— jubatum Willd. III. 98. no. 452.
— *jubatum* Willd. VI. 603. no. 139. *δ.*
— Jubeba Vellozo. III. 99. †
— *Jubeba* Vellozo. VI. 604. no. 142.
— Juciri Martius. VI. 609. no. 172.
— Judaicum Schult. III. 49. no. 83.
— juglandifolium Dunal. III. 40. no. 16.
— Juripeba Rich. III. 74. no. 275. (c. var. *β.*) * VI. 606. no. 153.
β. repandum Sendtner. VI. 606. no. 153.
— *Juripeda posterior* Pis. III. 72. no. 258.
— Jussieui Dunal. III. 74. no. 272.
— Kieserilzkii C. A. Mey. III. 44. no. 44.
— Kitaibelii Schultes. III. 50. no. 92.
— laciniatum Ait. III. 41. no. 22. (c. varr. *a.* et *β.* ibid.)
— *laciniatum* Dunal. III. 41. no. 27.
— *laciniatum* Rz. et Pav. III. 73. no. 266.
— lacteum Vellozo. III. 99. † VI. 588. no. 38.
— laeve Dunal. III. 58. no. 156.
— laevigatum Dunal. III. 56. no. 143.
— laetum Knze. III. 51. no. 95.
— Lantana Sendtner. VI. 590. no. 48.
— lanatum Dunal. III. 80. no. 310.
— lanceaefolium Jcq. III. 73. no. 268. VI. 608. no. 170.
β. tetrandrum Dunal. III. 73. no. 268.
γ. volubile Sendtner. VI. 608. no. 170.
— lanceolatum Cav. III. 77. no. 296.
— *lanceolatum* Rz. et Pav. III. 51. no. 99.
— laniflorum Sendtner. VI. 600. no. 120.
— lanuginosum Dunal. III. 66. no. 214.
— *lasiocarpum* Dunal. III. 86. no. 347.
— lasiophyllum Dunal. III. 66. no. 217.
— *lasiophyllum* Poir. III. 71. no. 252.
— latifolium Poir. III. 87. no. 354.
— *latifolium* Poir. VI. 600. no. 122.
— *laurifolium* Hort. III. 43. no. 40. III. 77. no. 292.
— laurifolium Linn. fil. III. 53. no. 116.
— *laurifolium* Mill. III. 77. no. 291.
— laxiflorum Sendtner. VI. 586. no. 20.
— laxum Spr. III. 55. no. 129.
— leiophyllum Bth. VI. 592. no. 68.
— lentum Cav. III. 65. no. 210.
— Leontopodium Sendtner. VI. 590. no. 53.
— lepidotum Dunal. III. 53. no. 115.
— *lepidotum* Dunal. VI. 588. no. 36.
— *leprosum* Ortega. III 67. no. 222. adn.

Solanum leptanthum Moç. et Sess. III. 43. no. 39.
β. parvifolium H. B. Kth.
— *lethale* Clus. III. 103. no. 10.
— leucocarpum Dunal. III. 60. no. 168.
— leucodendron Sendtner. VI. 592. no. 64.
— Lichtensteinii Willd. III. 81. no. 318.
— ligustrinum Lodd. III. 99. †
— lineatum Rz. et Pav. III. 66. no. 218.
— Linkianum Roem. et Schult. III. 55. no. 134.
— Linkii G. Don. III: 43. no. 40.
— *littorale* Raab. III. 44. no. 43. *β.*
— lividum Willd. III. 86. no. 343.
— longiflorum Vahl. III. 51. no. 101.
— *longifolium* Dunal. III. 51. no. 101.
— Loxense Dunal. III. 52. no. 105.
— lucidum Martens et Galeotti. VI. 588. no. 33.
— *lucidum* Moricand. VI. 583. no. 2. *β.*
— lucidum Moric. *III. 99.
— Lusitanicum Dunal. III. 95. no. 419.
— *Lusitanicum perenne etc.* Tournef. III. 95. no. 419.
— luteo-album Pers. III. 54. no. 127.
— *luteum* Gmel. III. 50. no. 90.
— *luteo-virescens* Gmel. III. 50. no. 88.
— lycioides Linn. III. 61. no. 181. (c. var. *β.* ibid.) VI. 609. †
— *lycioides* Rz. et Pav. III. 62. no. 182.
β. tomentosum Dunal. ibid.
Lycopersicum Linn. III. 101. no. 9.
— *Lycopersicum β.* Linn. III. 101. no. 8.
— *Lycopersicum* Wall. III. 101. no. 4.
— lyratum Thnbrg. III. 44. no. 47.
— lysimachioides Wall. III. 63. no. 194.
— Maccai Rich. III. 79. no. 307.
— macrantherum Moç. et Sess. III. 52. no. 108.
— macranthum Dunal. III. 88. no. 356. VI. 609. †
— macranthum Martens et Galeotti. VI. 597. no. 103.
— macrocarpum Linn. III. 45. no. 55.
— macrodon Wall. III. 64. no. 198.
— macronema Sendtner. VI. 603. no. 140.
— *macrophyllum* DC. III. 76. no. 290.
— Maglia Molina. III. 38. no. 5.
— malacoxylon Sendtner. VI. 594. no. 83.
— mammosum Linn. III. 85. no. 340.
— *mammosum* Lour. III. 86. no. 347.
— Manoëlii Moric. *III. 99.
— *Manoëlii* Moric. VI. 602. no. 131.
— marginatum Linn. III. 84. no. 330.
— *marginatum* var. *argyracanthum* Pers. III. 82. no. 319. *β.*
Solanum maritimum Moyen. III. 39. no. 11.
— *Marsilianum* Tenore. VI. 587. no. 26.
— Martii Sendtner. VI. 592. no. 60.
— *Mauritianum* Scop. III. 54. no. 119.
— *Mauritianum* Velins. III. 91. no. 373. VI. 601. no. 127.
— megalochiton Mart. III. 54. no. 123. VI. 609. †
— megalonyx Sendtner. VI. 604. no. 145.
— *melanocerasum* Willd. III. 48. no. 75. *γ.*
— *melanocerasus* Bauh. III. 103. no. 10.
— melanoxylon Lnk. III. 82. no. 321.
— *Melongena* Linn. III. 81. no. 319. *α.* a. b.
— *Melongena* Wall. III. 86. no. 344. III. 88. no. 360.
— *Melongena* var. N. ab E. III. 84. no. 332. III. 84. no. 334.
— Melongena Linn. III. 81. no. 319. (c. varr. *α.* et *β.* ibid. p. 81. et 82.)
α. b. esculentum.
α. a. ovigerum.
— *Melongena* var. *ovigerum* Lam. III. 81. no. 319. *α.* a.
— *Melongenae* var. N. ab E. III. 84. no. 333.
— membranaceum Wall. III. 58. no. 155.
— *membranaceum* Wall. III. 58. no. 156.
— *Memphiticum* Gmel. III. 50. no. 91.
— *Memphiticum* Mart. III. 47. no. 73.
— Memphiticum Mart. III. 94. no. 405.
— Mexicanum Moç. et Sess. III. 77. no. 295. VI. 609. †
— *Mexicanum* Willd. III. 95. no. 416.
— micracanthum Lam. III. 74. no. 271. VI. 609. †
— micranthum Willd. III. 95. no. 415. VI. 610. †
— *microcarpum* Lag. III. 53. no. 111.
— microcarpum Vahl. III. 46. no. 63.
— microphyllum Dunal. III. 70. no. 244.
— microspermum Dunal. III. 47. no. 72.
— Milleri Jcq. III. 88. no. 358.
— *miniatum* Bernh. III. 48. no. 78. *β.*
— *minax* Martius. VI. 600. no. 122. *β.*
— mite Rz. et Pav. III. 40. no. 17.
— Moçinianum Dunal. III. 64. no. 202.
— *Moçinianum* Dunal. VI. 596. no. 94.
— modestum Roem. et Schult. III. 95. no. 416.
— Moenchii Dunal. III. 97. no. 440.
— molle Dunal. III. 69. no. 242.
— *molle* Schrank. VI. 597. no. 101.
— mollissimum Blume. III. 64. no. 201.
— *monachophyllum* Dunal. III. 74. no. 273. VI. 606. no. 153.
— monanthum Roem. et Schult. III. 62. no. 188.

Solanum monodynamum Visiani. III. 65. no. 209.
— *montanum* Linn. III. 32. no. 19.
— *montanum* Rz. et Pav. III. 32. no. 19. β.
— Montevidense Spr. III. 57. no. 151.
— *mordens bifurcata siliqua* Weinm. III. 33. no. 1. δ.
— *mordens fructu aureo lato* Weinm. III. 36. no. 7. γ.
— *mordens fructu erecto cordiformi etc.* Weinm. III. 35. no. 14. β.
— *mordens fructu longo erecto* Weinm. III. 33. no. 1.
— *mordens fructu propendente etc.* Weinm. III. 36. no. 17. β.
— *mordens fructu rotundo* Weinm. III. 35. no. 14. γ.
— *mordens minus erectum* Weinm. III. 33. no. 2.
— *mordens seu Capsicum fructu flavescente* Weinm. III. 36. no. 19.
— *mordens seu Piper Indicum etc.* Weinm. III. 37. no. 25.
— *mordens fructu aureo lato* Weinm. III. 36. no. 7. γ.
— *mordens siliquis flavis* Weinm. III. 36. no. 17. δ.
— *mordens siliquis oblongis recurvis* Weinm. III. 36. no. 17.
— *moschatum* Prsl. III. 48. no. 75. β.
— multiangulatum Vellozo. VI. 599. no. 111. (III. 100. †)
— *multifidum* Rz. et Pav. III. 32. no. 22.
— *multiflorum* Rth. III. 79. no. 302. β.
— multiflorum Rth. *III. 99.
— muricatum Ait. III. 42. no. 30.
β. parvifolium.
— murinum Sendtner. VI. 587. no. 30.
— myriacanthum Dunal. III. 85. no. 336.
— *myriacanthum* Dunal. VI. 597. no. 101.
— myrtifolium Lodd. III. 99. †
— *Naratida* Hamilt. III. 59. no. 1. 166.
— Narense Dunal. III. 60. no. 173.
— *Narense* Dunal. VI. 579. no. 26.
— *Neesianum* Dietr. III. 92. no. 382.
— Neesianum Wall. III. 62. no. 184.
— neglectum Dunal. III. 63. no. 190.
— nematopus Sendtner. VI. 604. no. 147.
— nemorense Dunal. III. 73. no. 266.
— nicotianaefolium Lag. III. 96. no. 431.
— nigrescens Martens et Galeotti. VI. 585. no. 15.
— nigricans Martens et Galeotti. VI. 587. no. 32.
— *nigrum* Forsk. III. 48. no. 78. β. adn.
Solanum nigrum Linn. III. 47. no. 75. VI. 585. no. 13.
ε. Aguaraquiya Sendtner. VI. 585. no. 13.
δ. angulosum Sendtner. VI. 585. no. 13.
γ. aspergilliflorum Sendtner. VI. 585. no. 13.
δ. atriciplicifolium Dunal. III. 48. no. 75. VI. 585. no. 13.
α. genuinum Sendtner. VI. 585. no. 13.
γ. melanocerasum Dunal. III. 48. no. 75.
β. nodiflorum Sendtner. VI. 585. no. 13.
β. perennans Dunal. III. 48. no. 75.
— *nigrum fructu nigro e Kurigong* Hamilt. III. 48. no. 77.
— *nigrum fructo rubro* Hamilt. III. 48. no. 77.
— *nigrum δ. Guineense* Linn. III. 47. no. 73.
— *nigrum δ. hirsutum* Vahl. III. 50. no. 91.
— *nigrum* var. *melanocerasum* Wall. III. 48. no. 7. β.
— *nigrum β. patulum* Linn. III. 47. no. 69.
— *nigrum β. patulum* Willd. III. 47. no. 71.
— *nigrum γ. rubrum* Willd. III. 49. no. 79. α.
— *nigrum γ. villosum* Linn. III. 50. no. 90.
— *nigrum ε. Virginicum* Linn. III. 49. no. 82.
— *nigrum δ.* Mert. et Koch. III. 50. no. 88.
— nigrum Vellozo. III. 99. †
— *nigrum* Vellozo. VI. 585. no. 13. δ.
— *nigrum* Wall. III. 48. no. 78. α.
— nitidum Rz. et Pav. III. 51. no. 102.
— *niveum* Vahl. III. 78. no. 301.
— *nodiflorum* Dsvx. III. 47. no. 70.
— nodiflorum Jcq. III. 47. no. 69.
— *nodiflorum* Jcq. VI. 585. no. 13. β.
— nudum Dunal. III. 58. no. 159.
— nudum H. B. Kth. VI. 610. †
— nutans Rz. et Pav. III. 55. no. 13[illegible].
— obliquum Rz. et Pav. III. 42. no. 36.
— *obliquum* Rz. et Pav. VI. 579. no. 18.
— oblongifolium Dunal. III. 61. no. 179.
— *oblongum* Rz. et Pav. III. 59. no. 165.
— obovatum Dunal. III. 56. no. 144.
— *obscurum* Sieber. VI. 608. no. 170.
— *obscurum* Vahl. III. 74. no. 275.
— obtusifolium Dunal. III. 67. no. 223.
— *obtusifolium* Hartw. VI. 606. no. 152. ε.
— *obtusifolium* Willd. III. 46. no. 61. III. 94. no. 404.
— obtusilobum Martens et Galeotti. VI. 602. no. 130.
— ochranthum Dunal. III. 40. no. 15.
— *ochroleucum* Bast. III. 50. no. 89.
— ochroneurum Lnk. III. 77. no. 293. (c. var. β. ibid.) VI. 607. no. 164.

Solanum odoriferum Vellozo. VI. 594. no. 79. (III. 99. †)
— *officinarum* Cup. III. 48. no. 75. β.
— *officinarum* Zannich. III. 48. no. 75.
— *officinarum acinis nigricantibus et luteis* Tournef. III. 48. no. 75.
— *officinarum acinis puniceis* Sabb. III. 48. no. 78. β.
— *oleraceum* Dunal. VI. 585. no. 13. ε.
— *oleraceum* Rich. III. 49. no. 79. β.
— oleraceum Vellozo. III. 100. †
— *oleraceum* Vellozo. VI. 609. no. 172.
— oliganthum Dunal. III. 42. no. 34.
— *oliganthum* Lnk. III. 43. no. 40.
— oocarpum Sendtner. VI. 607. no. 166.
— oporinum Willd. III. 76. no. 290.
— *opuliflorum* Portenschl. VI. 601. no. 127.
— orbiculatum Dunal. III. 67. no. 227.
— Orbignyanum Sendtner. VI. 589. no. 44.
— Orinocense Dunal. III. 87. no. 348.
— ovalifolium Dunal. III. 79. no. 308.
— *ovigerum* Dunal. III. 81. no. 319. α. a.
— oxycarpum Schiede. III. 38. no. 3.
— *pachypetalum* Spr. III. 64. no. 200.
— *paleatum* Schott. VI. 592. no. 61.
— padulosum Moric. *III. 99. VI. 604. no. 146.
— palustre Poepp. III. 39. no. 6.
β. glabrescens Poepp.
— paniculatum Linn. III. 80. no. 311. *VI. 602. no. 131.
β. acutilobum Sendtn. VI. 602. no. 131.
— *papilionaceum* Dumont de Courset. III. 78. no. 301.
— papillosum Sendtner. VI. 590. no. 50.
β. floccosum.
— *paradoxum* Schott. VI. 581. no. 6.
— parasiticum Blume. III. 62. no. 186.
— Paratyense Vellozo. VI. 607. no. 165. (III. 100. †)
— *Parmentieri* Molina. III. 38. no. 1.
— *parviflorum* Cav. III. 70. no 243.
— *parviflorum* Moretti. III. 48. no. 75. β.
— *parviflorum* Nocca. III. 43. no. 41.
— parvifolium R. Br. III. 67. no. 226.
— patulum Pers. III. 51. no. 99.
— pauciflorum Vahl. III. 63. no. 192.
— pauciflorum Sendtner. VI. 607. no. 163.
— pedunculare Schlchtd. VI. 596. no. 94.
— pedunculatum Willd. III. 95. no. 412.
— pelliceum Sendtner. VI. 602. no. 132.
— *pendulum* Lnk. III. 31. no. 14. VI. 594. no. 80.
— pendulum Rz. et Pav. III. 42. no. 35.
— *pendulum* Rz. et Pav. VI. 579. no. 17.
— *pendulum* Schott. VI. 594. no. 79.
Solanum pensile Sendtner. VI. 594. no. 80.
— pentadactylum G. Don. III. 45. no. 56.
— *perianthomega* Vellozo. III. 54. no. 123.
— perianthomega Vellozo. VI. 609. † †
— persicaefolium Dunal. III. 69. no. 238.
— persicaefolium Mart. III. 51. no. 96.
— *persicaefolium* Martius. VI. 594. no. 82.
— Persicum Willd. III. 44. no. 45.
— *Peruvianum* Jcq. III. 100. no. 2. α.
— *Peruvianum* Linn. III. 100. no. 2.
— phillyreoides Dunal. III. 65. no. 207.
— phyllanthum Cavan. III. 32. no. 20.
— piliferum Bth. III. 66. no. 216.
— pilosissimum Mart. et Galeotti. VI. 596. no. 93.
— pilosiusculum Mart. et Galeotti. VI. 595. no. 91.
— *pimpinellifolium* Linn. III. 100. no. 1.
— *pinnatifidum* Lam. III. 41. no. 22. et no. 27.
— *pinnatifidum* Rth. III. 83. no. 324. β.
— *pinnatifidum* Rz. et Pav. III. 32. no. 21.
— pinnatum Cav. III. 39. no. 12.
— *pinnatum* Willd. III. 96. no. 426.
— platanifolium Hook. III. 85. no. 338. VI. 610. †
— platyphyllum Dunal. III. 80. no. 315.
— Plukenetii Dunal. III. 94. no. 399.
— Pöppigianum Sendtner. VI. 607. no. 162.
— pogogenum Moric. *III. 99.
— *pogogenum* Moric. VI. 580. no. 2.
— Pohlii Sendtner. VI. 595. no. 87.
— Poka Dunal. III. 76. no. 289.
— polyacanthum Lam. III. 70. no. 243.
— polygamum Vahl. III. 70. no. 248.
— polytrichum Moric. *III. 99. VI. 600. no. 121.
β. grandifolium Sendtn. VI. 600. no. 121.
— *pomiferum* Cav. III. 101. no. 3.
— *pomiferum fructu incurvo* Pluk. III. 82. no. 319. α. b.
— *pomiferum, fructu spinoso nigro* Moris. III. 82. no. 319. α. b.
— *pomiferum herbariorum* Lob. III. 46. no. 60. γ.
— *pomiferum Indicum etc.* Moris. III. 86. no. 347.
— *pomiferum spinosum Indicum* Breyn. III. 97. no. 443.
— *pomo spinoso oblongo, flore calathoide etc.* Raj. III. 16. no. 7.
— praealtum Sendtner. VI. 592. no. 65.
— pressum Dunal. III. 84. no. 333.
— *procerius patulum vulgari fructu* Dill. III. 47. no. 71.
— *procumbens* DC. III. 28. no. 1.

Solanum procumbens Lour. III. 81. no. 317.
— *procumbens* Poir. III. 102. no. 10.
— propinquum Mart. et Galeotti. VI. 601. no. 129.
— prunifolium Willd. III. 95. no. 413. VI. 585. no. 12.
— Pseudocapsicum Linn. III. 46. no. 64.
— *Pseudo-Lycopersicum* Murr. III. 101. no. 8.
— *Pseudocapsicum β. microcarpum* Pers. III. 46. no. 63.
— Pseudoquina St. Hil. et Cambess. III. 46. no. 65.
— *pseudo-saponaceum* Blume. III. 79. no. 302.
— *pseudo-undatum* Blume. III. 81. no. 319. *a.* a.
— psychotrioides Dunal. III. 60. no. 169.
— pteleaefolium Sendt. VI. 585. no. 11.
— pterocaulon Dunal. III. 49. no. 82.
— *pterocaulon* Rchb. III. 48. no. 75.
— pteropodum Dunal. III. 61. no. 178.
— *pubescens* Heyne. III. 83. no. 324. *δ.*
— *pubescens* Madr. Hb. III. 81. no. 319. *a.* a.
— pubescens Rxb. III. 53. no. 118.
— *pubescens* Rz. et Pav. III. 55. no. 127.
— pubescens Willd. III. 92. no. 381.
— pubigerum Dunal. III. 52. no. 111.
— pulchrum Dunal. III. 61. no. 180. VI. 610. †
— pulverulentum Pers. III. 51. no. 100.
— *pulverulentum* Pers. III. 52. no. 104.
— Pungetium R. Br. III. 87. no. 353.
— pycnanthemum Mart. III. 75. no. 283. VI. 610. †
— pygmaeum Cav. III. 44. no. 48.
— *pyracantha* Sm. III. 89. no. 366.
— *pyracanthon* Jcq. III. 89. no. 366.
— pyracanthum Lam. III. 89. no. 366. *β.* inerme Sims.
— pyrifolium Lam. II. 52. no. 109.
— quadrangulare Thnbrg. III. 50. no. 85. (c. var. *β.* ibid.)
— *quadrangulare* var. *triangulare* Pers. III. 50. no. 86.
— quadriflorum Martens et Galeotti. VI. 596. no. 95.
— quercifolium Linn. III. 41. no. 23.
— *quercifolium* Miller. III. 98. no. 445.
— quinquangulare Willd. III. 98. no. 451.
— Quitense H. B. Kth. III. 44. no. 50.
— *Quittoënse* Lam. III. 44. no. 50.
— racemiflorum Dunal. III. 45. no. 59.
— racemosum Jcq. III. 68. no. 235.
— *racemosum Cerasorum forma, fructu luteo* Tournef. III. 101. no. 8. *β.*
Solanum radiatum Sendtner. VI. 596. no. 98.
— radicans Linn. fil. III. 41. no. 25.
— *radicans* Rz. et Pav. III. 41. no. 25.
— *Radula* Vahl. III. 53. no. 114.
— *Radula* Vahl. VI. 591. no. 56. *β.*
— ramulosum Sendtner. VI. 593. no. 69.
— reclinatum l'Hérit. III. 41. no. 27.
— *reclinatum* Hortor. III. 41. no. 22.
— *recurvum* Poir. III. 57. no. 146.
— *reflexum* Schrank. VI. 597. no. 101.
— refractifolium Sendtner. VI. 588. no. 39.
— refractum Hook. et Arn. III. 90. no. 372.
— repandum Forst. III. 94. no. 398.
— repandum Vellozo. III. 99. †
— *repandum* Vellozo. III. 76. no. 286.
— *repens* Dunal. III. 95. no. 422.
— *reticulatum* Willd. III. 94. no. 406.
— reticulatum Dunal. III. 70. no. 247.
— retrofractum Vahl. III. 63. no. 195.
— *Rhinocerotis* Blume. III. 48. no. 77. et in adn.
— rhyditoandrum Sendtner. VI. 603. no. 137.
— Richardi Dunal. III. 90. no. 369.
— rigescens Jcq. III. 88. no. 361.
— rigidum Lam. III. 98. no. 449.
— riparium Pers. III. 53. no. 117.
— rivulare Martius. VI. 586. no. 24.
— robustum Wendland. *VI. 600. no. 123.
— Rodschiedii Meyer. III. 68. no. 234.
— Rossi Knwls. et Westsc. III. 79. no. 303.
— rostratum Dunal. III. 91. no. 377.
— Rottboellianum Roem. et Schult. *III. 98. no. 448.
— rubiginosum Vahl. III. 74. no. 276.
— *rubrum* Gmel. III. 48. no. 77.
— *rubrum* Linn. III. 49. no. 80.
— rubrum Mill. III. 48. no. 79.
— *rubrum* Ucria. III. 48. no. 78. *β.**
— *rubrum* Rxb. III. 49. no. 79. *a.**
— rufescens Sendtner. VI. 591. no. 55. *β.* glabrescens.
— rufum Sendtner. VI. 604. no. 144.
— *rugosum* Rich. III. 57. no. 148.
— *Rumphii* Blume. III. 49. no. 79. *a.***
— *Rumphii* Dunal. III. 49. no. 79. *a.**
— runcinatum Rz. et Pav. III. 95. no. 417.
— *runcinatum* Wendl. III. 89. no. 366.
— *rupestre* Schmidt. III. 44. no. 43. *γ.*
— rupincola Sendtner. VI. 606. no. 157. (c. var. *β.* ibid.)
— *salignum* Willd. III. 43. no. 42.
— *salvifolium* Lam. III. 53. no. 114.
— sambuciflorum Sendtner. VI. 590. no. 52.
— *sanctum* Hochstett. et Steudel. III. 83. no. 327.
— sanctum Linn. III. 83. no. 326.

Solanum Sandwicense Hook. et Arn. III. 45. no. 53.
— saponaceum Dunal. III. 80. no. 314.
— *saponaceum* Hook. III. 67. no. 222.
— *sarmentosum* Lam. III. 73. no. 268. VI. 608. no. 170.
— sarmentosum N. ab E. III. 88. no. 360.
— sarrachoides Sendtner. VI. 586. no. 17.
— *scabrum* Jcq. III. 46. no. 59.
— *scabrum* Lam. III. 42. no. 30.
— *scabrum* Mill. III. 49. no. 82.
— *scabrum* Rz. et Pav. III. 79. no. 302. III. 80. no. 314.
— scabrum Vahl. III. 72. no. 263.
— *scabrum* Vahl. VI. 608. no. 170. β.
— *scabrum* Zuccagn. III. 46. no. 61.
— *scandens* Lam. III. 44. no. 43.
— scandens Linn. III. 66. no. 212.
— *scandens* Mill. III. 94. no. 403.
— *scandens* Neck. III. 44. no. 43.
— *scandens* Schmbrgk. VI. 594. no. 80.
— *scandens* Swrtz. III. 73. no. 267. VI. 608. no. 170. β.
— *scandens foliis tomentosis* Plum. III. 65. no. 210.
— *scandens seu Dulcamara* Tournef. III. 44. no. 43.
— Schiedeanum Schlchtd. VI. 605. no. 149.
— Schimperianum Hochstett. *III. 99.
— schizandrum Sendtner. VI. 603. no. 138.
— schizopodium Sendtner. VI. 593. no. 73.
— Schiruschuna Mill. *III. 99.
— *Schiru-Schura* Mill. III. 88. no. 358.
— Schlechtendalianum Wlprs. III. 61. no. 177.
— Schomburgkii Sendtner. VI. 595. no. 89.
— Schrankianum Steudel. VI. 606. no. 156.
— Schreberianum Sendtner. VI. 603. no. 136.
— Schüchii Sendtner. VI. 606. no. 158.
— Seaforthianum Andrws. III. 40. no. 20.
— Sellowianum Sendtner. VI. 590. no. 51.
— *sempervirens* Mill. III. 58. no. 157.
— septemlobum Bnge. III. 41. no. 28.
— sericeum Rz. et Pav. III. 55. no. 133.
— sericeum Vellozo. III. 99. †
— *sericeum* Vellozo. VI. 592. no. 66.
— sessile Rz. et Pav. III. 51. no. 97.
— sessiliflorum Dunal. III. 88. no. 357.
— sideroxyloides Schlchtd. III. 66. no. 213.
— *Silarium* Hamilt. III. 79. no. 302. β.
— sinuatifolium Vellozo. III. 100. †
— *sinuatifolium* Vellozo. VI. 597. no. 101.
— sinuatum Ait. *III. 99.
— *sinuatum* Willd. III. 91. no. 374.
— *sisymbriifolium* Lam. III. 91. no. 373.
— sisymbriifolium Lam. VI. 601. no. 128. β. heracleifolium Sendtner.
Solanum Sodomeum Linn. III. 82. no. 323.
— *Sodomeum* Russel. III. 83. no. 324. α.
— somniculentum Knze. VI. 589. no. 40.
— *somniferum bacciferum* Cast. III. 103. no. 10.
— *somniferum verticillatum* C. Bauh. III. 23. no. 1. β.
— sordidum Sendtner. VI. 596. no. 97. β. fulvum.
— speciosum Dunal. III. 63. no. 189.
— spectabile Steudel. VI. 598. no. 110.
β. echinaceum, δ. fissum, γ. subhastatum } Sendtn. VI. 599.
— sphaerocarpum Moric. *III. 99.
— *sphaerocarpum* Moric. VI. 597. no. 101.
— spinosissimum Lodd. *III. 99.
— *spinosum Jamaicense glabrum* etc. Pluk. III. 88. no. 359.
— spirale Rxb. III. 59. no. 166.
— spissifolium Sendtner. VI. 589. no. 42.
— *spurium* Balb. III 101. no. 3.
— *spurium* Gmel. III. 101. no. 8.
— squamulosum Martens et Galeotti. VI. 584. no. 4.
— stagnale Moric. *III. 99. VI. 601. no. 125.
— stamineum Steudel. III. 934. β. subinerme.
— stellatum Jcq. III. 64. no. 204.
— *stellatum* Mnch. III. 97. no. 440.
— stelligerum R. Br. III. 68. no. 228. (cum varr. α. et β. ibid.)
— *stelligerum* Sm. III. 68. no. 228. α.
— stenandrum Sendtner. VI. 600. no. 117. (c. var. β. ibid.)
— stenophyllum Dunal. III. 52. no. 104.
— stephanodes Schlchtd. VI. 584. no. 3.
— stipulaceum Brouss. *III. 99.
— stipulaceum Willd. III. 94. no. 408.
— *stipulaceum* Willd. VI. 591. no. 57. γ.
— stipulatum Vellozo. III. 99. †
— *stipulatum* Vellozo. VI. 586. no. 24.
— stoloniferum Schlchtd. III. 38. no. 4.
— *stramonifolium* Ait. III. 79. no. 302.
— stramonifolium Jcq. III. 86. no. 345.
— *stramonifolium* Lam. VI. 605. no. 152.
— *strictum* Zuccagn. III. 47. no. 69.
— strigosum Vandelli. III. 97. no. 402.
— *strigosum* Vandelli. VI. 606. no. 155.
— *styracifolium* Willd. III. 74. no. 275.
— subarmatum Willd. III. 69. no. 237.
— *subbiflorum* Ortega. III. 88. no. 358.
— subcordatum Sendtner. VI. 607. no. 160.
— *subinerme* Jcq.? III. 51. no. 101.
— subinerme Jcq. III. 76. no. 291.
— sublobatum Willd. III. 96. no. 424.

Solanum subscandens Vellozo. (III. 100. †) VI. 604. no. 143.
— subspathulatum Sendtner. VI. 593. no. 70.
— *subtruncatum* Wall. III. 65. no. 211. *α.*
— subumbellatum Vellozo. (III. 99. †) VI. 595. no. 88.
— subviscidum Schrank. *III. 99.
— suffruticosum Schousb. III. 49. no. 84.
— sulcatum Raeusch..*III. 99.
— Surinamense Sendtner. VI. 607. no. 161.
— Surinamense Steudel. III. 933.
— Swartzianum Roem. et Schult. III. 55. no. 137. *VI. 588. no. 36.
β. sordidum, γ. tomentosum } Sendtn. VI. 588. no. 36.
— sycocarpum Mart. et Sendtner. III. 54. no. 124.
— *sycocarpum* Mart. et Sendtner. VI. 576. no. 1.
— sylvaticum Dunal. III. 63. no. 193.
— synantherum Sendtner. VI. 587. no. 25.
— syringaefolium Kth. et Bouché. VI. 591. no. 59.
— tabacifolium Vellozo. III. 56. no. 140.
— *tabacifolium* Vellozo. VI. 591. no. 57.
— tectum Pers. III. 91. no. 374.
— Tejore Aublet. III. 44. no. 46.
— *Tejore* Aublet. VI. 579. no. 21.
— tenue Sendtner. VI. 584. no. 5.
— tenuissimum Sendtner. VI. 599. no. 113.
— terminale Forsk. III. 53. no. 112.
— terminale Vellozo. III. 99. †
— *terminale* Vellozo. VI. 589. no. 43. VI. 595. no. 88.
— ternatum Rz. et Pav. III. 40. no. 21.
— *tetrandrum* Blume. III. 93. no. 388.
— tetrandrum R. Br. III. 61. no. 175.
— thelopodium Sendtner. VI. 593. no. 71.
— thomasiaefolium Sendtner. VI. 601. no. 126.
β. calycinum.
γ. lobatum.
— Thonningianum Jcq. *III. 99.
— *Thouini* Gmel. III. 91. no. 373. VI. 601. no. 127.
— thymifolium Willd. III. 96. no. 427.
— tomentosum Linn. III. 71. no. 253.
— *tomentosum β. coccineum* Willd. III. 71. no. 255.
— Topira Dunal. III. 45. no. 54.
— *torvum* Schlchtd. VI. 606. no. 152. ζ.
— torvum Swrtz. III. 78. no. 302. VI. 605. no. 152.
ϑ. Brasiliense Sendtner. VI. 606. no. 152.
δ. ferrugineum Sendtner. VI. 606. no. 152.
η. fructipendulum Sendtner. VI. 606. no. 152.

Solanum torvum Swrtz.
α. genuinum Sendtner. VI. 605. no. 152.
ε. Hartwegianum Sendtner. VI. 606. no. 152.
β. inerme N. ab E. III. 79. no. 302.
γ. lanatum Sendtner. VI. 606. no. 152.
ι. lanuginosum Sendtner. VI. 606. no. 152.
β. rubiginosum Sendtner. VI. 606. no. 152.
ζ. Schiedeanum Sendtner. VI. 606. no. 152.
— toxicarium Lam. III. 72. no. 258. *VI. 606. no. 155.
— trachyphyllum Dunal. III. 60. no. 174.
— *trachyphyllum* Dunal. VI. 579. no. 27.
— triangulare Lam. III. 50. no. 86.
— tricolor Moç. et Sess. III. 63. no. 191.
— tricuspidatum Rich. III. 79. no. 306.
— tridynamum Moç. et Sess. III. 92. no. 384.
— triflorum Nutt. III. 41. no. 24.
— trifoliatum Burm. III. 96. no. 432.
— *trilobatum* Linn. III. 88. no. 358. et 359.
— triphyllum Vellozo. III. 99. †
— *triphyllum* Vellozo. VI. 585. no. 12.
— triquetrum Cav. III. 46. no. 62.
— triste Jcq. III. 59. no. 165.
— Trongum Poir. III. 84. no. 332.
— *tuberosum* Bert. III. 39. no. 8.
— tuberosum Linn. III. 38. no. 1.
β. macranthum, δ. multijugum, ε. polemoniifolium, γ. puberulum, α. vulgare } Hook. fil. VI. 583. no. 1.
— *tuberosum* Poepp. III. 39. no. 5.
— *tuberosum esculentum* Bauh. III. 38. no. 1.
— *tuberosum minus Atriplicis folio, vulgo Papa montana* Feuill. Peruv. III. 32. no. 19.
— Tweedianum Hook. III. 45. no. 51.
— uliginosum Blume. III. 93. no. 389.
— umbellatum Mill. III. 94. no. 401.
— *umbellatum* Willd. III. 94. no. 409.
— umbelliferum Eschscholtz. III. 54. no. 120.
— umbrosum Dunal. III. 74. no. 274.
— *umbrosum* Dunal. VI. 608. no. 170.
— uncinatum R. Br. *III. 99.
— *uncinatum* Schrank. VI. 606. no. 156.
— uncinellum Lindl. III. 92. no. 380.
— *undecimangulare* Willd. III. 80. no. 315.
— *undulatum* Lam. III. 82. no. 319.
— unguens Weinm. *III. 99.
— uniflorum Dunal. III. 62. no. 187.
— *uniflorum* Lag. III. 63. no. 188.
— *uniflorum* Meyen. III. 67. no. 222.
— uniflorum Vellozo. III. 99. †

Solanum urceolatum Pers. III. 56. no. 142.
— *urens seu Capsicum* Moris. III. 36. no. 17.
— vagum Heyne. III. 54. no. 126.
— Vaillantii Dunal. III. 80. no. 316.
— Valadares Vandelli. III. 98. no. 447.
— *Valadares* Vandelli. VI. 599. no. 110.
— Valenzuelae Palacio. III. 95. no. 423.
— Vandellianum Dunal. III. 97. no. 439.
— variabile Mart. III. 76. no. 286. VI. 610. †
— *variegatum* Rz. et Pav. III. 42. no. 30.
— vellereum Schlchtd. VI. 587. no. 31.
— velleum Swrtz. III. 84. no. 329. VI. 610. †
— Vellozianum Don. VI. 610. †
— Vellozianum Dunal. III. 56. no. 139.
— velutinum Dunal. III. 75. no. 277.
— venosum Dunal. III. 55. no. 136.
— venustum Kth. VI. 584. no. 10.
— verbascifolium Linn. III. 53. no. 118.
  β. adulterinum Hamilt.
— *verbascifolium* Linn. VI. 591. no. 57.
— vernicatum Lindl. III. 90. no. 371.
— verrucosum Schlchtd. III. 38. no. 2.
— *vesicarium Americanum* etc. Moris. III. 25. no. 14.
— *vesicarium Curassavicum* etc. Moris. III. 23. no. 4.
— *vesicarium Indicum* Herm. III. 25. no. 15. α.
— *vesicarium Indicum erectum* etc. Moris. III. 25. no. 12.
— *vesicarium radice crassa Mexicanum* etc. Moris. III. 24. no. 8. β.
— *vesicarium Virginianum procumbens* etc. Moris. III. 24. no. 9. α.
— Vespertilio Ait. III. 92. no. 383.
— vestitum Bth. III. 75. no. 282.
— viliflorum Sendtner. VI. 593. no. 72.
— *villosissimum* Zucc. III. 85. no. 340.
— villosum D. Dietr. III. 91. no. 374.
— *villosum* Forsk. III. 94. no. 397.
— villosum Lam. III. 50. no. 90.
— *villosum* Lag. VI. 601. no. 127.
— *villosum* Re. III. 48. no. 78. β.*
— *violaceum* Blume. III. 62. no. 185.
— *violaceum* R. Br. III. 78. no. 299.
— *violaceum* Jcq. III. 83. no. 324. α.
— violaceum Jcq. III. 89. no. 365.
— violaefolium Schott. III. 93. no. 387. VI. 595. no. 90.
— virgatum Lam. III. 65. no. 208.
— *Virginianum* Jcq. III. 90. no. 368. β.
— Virginianum Linn. III. 89. no. 367.
— viride R. Br. III. 55. no. no. 132.
— *viridescens* Hort. III. 50. no. 88.
— viridiflorum Rz. et Pav. III. 43. no. 37.
— *viridiflorum* Rz. et Pav. VI. 579. no. 19.
Solanum viridiflorum Schlchtd. VI. 597. no. 101.
— *viscidum* Schweigg. III. 91. no. 373. VI. 601. no. 127.
— viscosissimum Sendtner. VI. 584. no. 8.
— *viscosum* Lag. III. 91. no. 373.
— viscosum Mnch. III. 95. no. 420.
— volubile Swrtz. III. 73. no. 267.
— *volubile* Swrtz. VI. 608. no. 170. β.
— *vulgatum* Willd. III. 48. no. 75.
— Wightii N. ab E. III. 87. no. 349.
— Wildianum Wndrth. *III. 99.
— Willdenowianum G. Don. III. 72. no. 261.
— *Willdenowii* Roem. et Schult. III. 46. no. 61.
— Willdenowii Roem. et Schult. III. 94. no. 404.
— *xanthacanthum* Willd. VI. 601. no. 127. β.
— *xanthocarpum* Schrad. et Wendl. III. 90. no. 368. α.
— *Zeylanicum* Scop. III. 82. no. 319. β.
— Zuccagnianum Dunal. III. 46. no. 61.
Soldanella Linn. VI. 445.
— alpina Linn. VI. 445. no. 2.
— *alpina* Schm. VI. 445. no. 1.
— *Clusii* Schm. VI. 445. no. 2.
— montana Willd. VI. 445. no. 1.
Soldevilla Lag. (ex p.) II. 683.
Solenanthus Ldb. * VI. 563.
Solenscia DC. *II. 731. VI. 741.
— *elegans* DC. VI. 423. no. 1.
— elegans DC. * VI. 741. no. 1.
Solenocarpus Wght. et Arn. I. 550.
— Indica Wght. et Arn. *I. 550. no. 1.
Solenogyne Cassini. II. 951.
Solenogyne DC. *II. 594. *II. 951. no. 1.
Solenogyneae DC. II. 594. VI. 131.
Solenophora Bth. ° VI. 401.
— coccinea Bth. VI. 401. no. 1.
Solenostemma Hayne. * VI. 485.
Solenostemon Bth. III. 515.
— *ocymoides* Schum. et Thonn. III. 516. no. 11.
Solenostigma Kltzsch. (*IV. 174.)
— *Kraussii* Kltzsch. III. 125. no. 1.
Solenotheca Nutt. II. 624. VI 172.
— tenella Nutt. *II. 624. no 1. VI. 172. no. 1.
Solenotinus DC. II. 450.
Solidagineae DC. II. 589. II. 960. VI. 128.
Solidago Linn. II. 589. *II. 952. no. 28. II. 960. VI. 129.
— altissima Linn. *II. 961. no. 46. (c. var. δ.)
  ε. aspera Ait.
  β. humilis Dsf.
  γ. rugosa Willd.

Solidago altissima Michx. II. 965. no. 52.
— ambigua Ait. *II. 961. no. 10.
β. lancifolia.
— amplexicaulis Martens. II. 589. no. 1. *II. 964. no. 49.
— *angulata* Schrad. II. 964. no. 40.
— angusta Torr. et Gr. II. 961. no. 18.
— angustifolia Ell. *II. 963. no. 36.
— arguta Ait. *II. 964. no. 41.
β. juncea Ait.
γ. scabrella Torr. et Gr.
— *arguta* Mühlnbrg. II. 964. no. 42.
— *aspera* DC. II. 964. no. 46.
— *asperata* Prsh. II. 964. no. 40.
— *axillaris* Prsh. II. 961. no. 8.
— bicolor Linn. *II. 960. no. 3.
β. concolor Torr. et Gr.
— Boottii Hook. II. 964. no. 43. (c. varr. *α.* β. γ. δ. et ε. ibid.)
— *Bosciana* Moretti. II. 965. no. 52.
— brachyphylla Chapman. II. 965. no. 50.
— Buckleyi Torr. et Gr. II. 961. no. 6.
— caesia Linn. *II. 961. no. 8.
— Californica Nutt. II. 590. no. 9. *II. 961. no. 16.
— Canadensis Linn. *II. 966. no. 64.
— Chilensis Meyen. VI. 129. no. 2.
— *ciliaris* Mühlnbrg. II. 964. no. 41.
— *cinerascens* Schweinitz. II. 965. no. 55.
— compacta Turcz. II. 590. no. 12.
— *compacta* Turcz.? II. 961. no. 14.
— confertiflora DC. *II. 961. no. 14.
— *confertiflora* Fisch. et Mey. II. 962. no. 23.
— *confertiflora* Nutt. II. 960. no. 2.
— *cordata* Short. II. 960. no. 1. VI. 129. no. 1.
— corymbosa Ell. *II. 963. no. 29.
— corymbosa Nutt. II. 590. no. 11.
— *corymbosa* Nutt. II. 962. no. 24.
— Curtisii Torr. et Gr. II. 961. no. 9.
β. monticola.
— discoidea Torr. et Gr. *II. 960. no. 1.
— Drummondii Torr. et Gr. II. 964. no. 48.
— *dubia* Scop. II. 963. no. 38.
— *elata* Ell. II. 961. no. 17.
— Elliottii Torr. et Gr. II. 965. no. 51.
— elliptica Ait. *II. 963. no. 38.
— *elliptica* Ell. II. 965. no. 51.
— elongata Nutt. II. 590. no. 4. (c. var. β. ibid.) *II. 966. no. 63.
— *erecta* Ell. II. 962. no. 20. β.
— *erecta* Nutt. II. 961. no. 17.
— *foliis longissime mucronatis* Gmel. VI. 258. no. 8.
— *foliis obverse ovatis petiolatis etc.* Gmel. VI. 261. no. 22.
Solidago gigantea Ait. *II. 966. no. 66.
β. Pitcheri Torr. et Gr.
— *gigantea* Darl. II. 966. no. 65.
— glaberrima Martens. II. 589. no. 2.
— *glaberrima* Martens. II. 966. no. 61.
— glomerata Michx. *II. 962. no. 26.
— glutinosa Nutt. II. 590. no. 10.
— *glutinosa* Nutt. II. 961. no. 14.
— gracillima Torr. et Gr. II. 964. no. 44.
— *graminifolia* Ell. II. 966. no. 69.
— *grandiflora* Raf. II. 962. no. 28.
— hirsuta Nutt. *II. 590. no. 7.
— *hirsuta* Nutt. II. 960. no. 3. β.
— *hispida* Mühlnbrg. II. 965. no. 55.
— *humilis* DC. II. 964. no. 46.
— humilis Prsh. *II. 962. no. 23.
— incana Torr. et Gr. II. 965. no. 59.
— *integerrima* Nutt. II. 963. no. 35. δ.
— integrifolia Dsf. *II. 963. no. 37.
— *juncea* Ell. II. 964. no. 43. δ.
— lanata Hook. II. 960. no. 4.
— *lanceolata* Cham. et Schlchtd. II. 966. no. 72.
— lanceolata Linn. *II. 966. no. 69.
— latifolia Linn. *II. 961. no. 7.
— Leavenworthii Torr. et Gr. II. 966. no. 62.
— *leiocarpa* DC. II. 962. no. 25.
— leptocephala Torr. et Gr. II. 966. no. 71.
— *limonifolia* Pers. II. 963. no. 34.
— linoides Soland. *II. 964. no. 45.
— *livida* Willd. II. 961. no. 8.
— *macrophylla* Bigel. II. 961. no. 7.
— *macrophylla* Prsh.? II. 960. no. 2.
— Mexicana Linn. *II. 963. no. 34.
— *Mexicana* β. Hook. II. 963. no. 31.
— Missouriensis Nutt. II. 590. no. 5. *II. 966. no. 61. (c. varr. β. γ.)
— Mühlenbergii Torr. et Gr. II. 964. no. 42.
— *multiradiata* Ait. II. 962. no. 24.
— nana Nutt. II. 590. no. 8. *II. 965. no. 58.
— neglecta Torr. et Gr. II. 963. no. 39.
— nemoralis Ait. *II. 965. no. 55. (c. varr. β. et γ. ibid.)
— nitida Torr. et Gr. II. 963. no. 32.
— *nutans* Dsf. II. 966. no. 64.
— occidentalis Torr. et Gr. II. 966. no. 72.
— odora Ait. *II. 965. no. 53. (c. var. β. ibid.)
— Ohioënsis Riddel. II. 963. no. 30.
— patula Mühlnbrg. *II. 964. no. 40.
β. strictula Torr. et Gr.
— pauciflosculosa Michx. *II. 966. no. 68.
— petiolaris Ait. *II. 961. no. 17.
— *petiolaris* Hook. et Arn. II. 961. no. 16. β.
— petiolaris Lssng. II. 961. no. 15.
β. squarrulosa Torr. et Gr.
— *petiolaris* Mühlnbrg. II. 962. no. 20

Solidago pilosa Walt. *II. 965. no. 52.
— *Pitcheri* Nutt. II. 966. no. 66. β.
— Pitcheri Nutt. II. 590. no. 3.
— *procera* Ait. II. 966. no. 64. γ.
— puberula Nutt. *II. 961. no. 13.
— pubescens M. A. Curtis. II. 960. no. 5.
— *pubescens* Ell. II. 961. no. 13.
— pulverulenta Nutt. *II. 961. no. 12. (c. var. β. ibid.)
— pumila Torr. et Gr. *II. 963. no. 33.
— *pyramidata* Prsh. II. 965. no. 52.
— radula Nutt. II. 590. no. 6. *II. 965. no. 56.
— *retrorsa* Michx. II. 965. no. 53.
— Riddellii Frank. II. 963. no. 31.
— rigida Linn. *II. 962. no. 28.
— *rugosa* DC. II. 964. no. 46.
— rupestris Raf. II. 966. no. 67.
— *salicina* Ell. II. 964. no. 40. β.
— *Sarracenica* Gerard. VI. 258. no. 6.
— scaberrima Torr. et Gr. II. 965. no. 57.
— *scabra* Hook. II. 964. no. 40. β.
— *scabra* Mühlnbrg. II. 966. no. 64. δ.
— *scabra* Nutt. II. 964. no. 46. ε.
— *semiflosculosa* Michx. II. 589. no. 1.
— *sempervirens* Ait. II. 963. no. 35. γ.
— sempervirens Linn. *II. 963. no. 35. (cum varr. γ. δ.)
β. laevigata Ait.
— *sempervirens* Michx. II. 962. no. 20.
— serotina Ait. *II. 966. no. 65.
— *serotina* Hook. II. 966. no. 61.
— *serotina* Willd. II. 966. no. 66.
— Shortii Torr. et Gr. II. 965. no. 60. (cum varr. β. et γ. ibid.)
— *spathulata* DC. II. 591. no. 4.
— speciosa Nutt. *II. 962. no. 20.
β. angustata } Torr. et Gr.
γ. rigidiuscula } Torr. et Gr.
— *sphacelata* Raf. II. 960. no. 1. VI. 129. no. 1.
— spiciformis Torr. et Gr. II. 961. no. 15.
— spithamea Curtis. II. 962. no. 27.
— squarrosa Mühlnbrg. *II. 960. no. 2.
— stricta Ait. *II. 962. no. 19.
— *stricta* Hook. II. 962. no. 23. β.
— *stricta* Lssng. II. 966. no. 63. β.
— tenuifolia Prsh. *II. 966. no. 70.
— terrae novae Torr. et Gr. II. 962. no. 22.
— thyrsoidea E. Mey. *II. 962. no. 25.
— tortifolia Ell. *II. 965. no. 54.
— *uliginosa* Nutt. II. 962. no. 19.
— *ulmifolia* Ell.? II. 964. no. 48.
— ulmifolia Mühlnbrg. *II. 964. no. 47.
— verna M. A. Curtis. II. 962. no. 21.
— *villosa* Ell. II. 965. no. 52.
— *viminea* Ait. II. 963. no. 35. δ.
Solidago virga aurea Linn. *II. 962. no. 24.
β. alpina } Torr. et Gr.
γ. multiradiata } Torr. et Gr.
— virgata Michx. *II. 961. no. 11.
— *virgaurea* var. *arctica* DC. II. 962. no. 24.
Soliva Rz. et Pav. II. 643. II. 992.
— acaulis Hook. et Arn. II. 992. no. 1.
— daucifolia Nutt. II. 643. no. 1.
Sollya Lindl. I. 257. V. 73.
— *angustifolia* Lindl. I. 257. no. 1.
— heterophylla Lindl. *I. 257. no. 1. *V. 73. no. 1.
— linearis Lindl. I. 257. no. 2.
— *linearis* Lindl. V. 73. no. 1.
Sommera Schlchtd. II. 523. VI. 77.
— arborescens Schlchtd. *II. 523. no. 1. VI. 77. no. 1.
Sommerfeldia Lssng. *II. 583. *II. 952. no. 23.
Sommerfeldtia obovata Schum. et Thonn. I. 794. no. 7. et 8.
Somniantes Bth. (Mimosa) I. 877.
Sonchus Cass. II. 690. VI. 359.
— asper Vill. *II. 690. no. 2.
— *Brasiliensis* Wlprs. II. 651. no. 1. VI. 251. no. 2.
—? *Californicus* Hook. et Arn. II. 691. no. 5.
— *Carolinianus* Walt. II. 690. no. 2.
— *Chuquitensis* Meyen. VI. 359. no. 1.
— *congestus* Willd. VI. 359. no. 1.
— *cyaneus* Don. VI. 355. no. 7.
— *elatus* Pluk. II. 692. no. 2.
— *erythropappus* Wlprs. II. 651. no. 2. VI. 251. no. 3.
— *fallax* Wllrth. II. 690. no. 2.
— *fallax β. Californicus* Nutt. II. 690. no. 2. β.
— *foliis lanceolatis sessilibus denticulatis etc.* Gmel. VI. 366. no. 3.
— *hastatus* Lssng. II. 692. no. 10.
— Jacquini DC. *VI. 359. no. 1.
— melanolepis Fresen. VI. 359. no. 2.
— *oleraceus* var. *spinulosus* Oakes. II. 690. no. 2.
— *pectinatus* DC. II. 690. no. 1.
— *pulchellus* Prsh. II. 699. no. 1.
— *racemosus* Lam. II. 700. no. 3. β.
— *Sibiricus* Richards. II. 699. no. 1.
— tenerrimus Linn. *II. 690. no. 1.
— *tenuifolius* Nutt. II. 690. no. 1.
Sondera Lehm. °V. 62.
— macrantha Lehm. V. 62. no. 1.
— Preissii Lehm. V. 62. no. 2.
Soneri-ila Rheede. V. 685. no. 4. *a.*
Sonerila Rxb. I. 122. V. 684.
— affinis Arn. II. 122. no. 3.

Sonerila angustifolia Rxb. II. 123. no. 9. V. 685. no. 7.
— *angustifolia* Wall. II. 514. no. 10.
— arguta R. Br. V. 686. no. 15.
— begoniaefolia Blume. II. 123. no. 14. V. 684. no. 1.
— Brunonis Wght. et Arn. II. 123. no. 17. V. 685. no. 11.
— *emaculata* Rxb. V. 685. no. 4. β.
— erecta Jack. II. 123. no. 12. II. 124. no. 20. V. 686. no. 16.
— *erecta* W. Jack. II. 514. no. 2.
— glaberrima Arn. II. 122. no. 4. * V. 687. no. 18.
— grandiflora R. Br. II. 123. no. 18. V. 685. no. 10.
— heterophylla Jack. II. 123. no. 11. V. 686. no. 13.
— hirsutula Arn. II. 122. no. 5. * V. 687. no. 19.
— Hookeriana Arn. II. 122. no. 7. V. 687. no. 21.
— maculata Rxb. II. 123. no. 16. V. 685. no. 4.
β. emaculata, α. maculata } Horsf. et Bennet. V. 685. no. 4.
— *maculata* Wall. V. 685. no. 4. β.
— *maculata* Wght. et Arn. V. 685. no. 6.
— *Moluccana* Rxb. V. 684. no. 1.
— obliqua Krthls. V. 684. no. 3.
— pauciflora Blume. II. 123. no. 15.
— *pauciflora* Blume. V. 686. no. 13.
— picta Krthls. V. 684. no. 2.
— Rheedei Wall. II. 122. no. 1.
— *Rheedei* Wall. V. 685. no. 5.
— robusta Arn. II. 122. no. 8. * V. 687. no. 22.
— *Rottleri* Wall. II. 123. no. 16.
— Rottleri Wall. V. 685. no. 6.
— secunda Wall. V. 685. no. 8.
— speciosa Zenk. II. 123. no. 13. * V. 687. no. 23.
— *squarrosa* D. Don. II. 514. no. 10.
— squarrosa Rxb. II. 123. no. 10.
— squarrosa Wall. V. 686. no. 14.
— tenera Royle. II. 124. no. 19. V. 685. no. 9.
— tenuifolia Blume. II. 124. no. 21. V. 685. no. 12.
— Wallichii Horsf. et Bennet. V. 685. no. 5.
— Wightiana Arn. II. 122. no. 6. * V. 687. no. 20.
— Zeylanica Arnott. II. 122. no. 2. * V. 687. no. 17.
Sonneratia Linn. II. 170.
— acida Linn. * II. 170. no. 1.
Sonninia Rchb. * VI. 488.
Sono-ige Thnbrg. V. 57. no. 2.
Sophora Linn. I. 806. II. 903.
— acuminata Dsvx. I. 806. no. 3.
— *affinis* Torr. et Gr. I. 807. no. 2.
— alopecuroides Linn. I. 806. †
— *alpina* Pall. I. 562. no. 3.
— *Houghiana* Wall. I. 806. no. 1.
— *Japonica* Linn. I. 807. no. 1.
— *macrocarpa* Sm. I. 806. no. 2.
— *microphylla* Meyen. I. 809. no. 2.
— *mollis* Wall. I. 806. no. 1.
— pachycarpa C. A. Meyen. II. 903. no. 1.
— pentaphylla Dsvx. I. 806. no. 2.
— pubescens Tausch. I. 806. no. 4.
— *robinioides* Wlprs. I. 806. no. 1.
— robusta Rxb. I. 806. †
— tomentosa Linn. I. 806. †
— *trifoliata* Thnbrg. I. 785. no. 16.
— velutina Lindl. I. 806. no. 1.
— *violacea* Zipp. I. 734. no. 25.
Sophoreae DC. I. 805. II. 903. V. 549.
Sophronanthe Bth. III. 298. °III. 966.
— Floridana Bth. * III. 298. no. 1.
Sopubia Bth. III. 388.
Sopubia Hamilt. III. 388. °III. 970. VI. 650.
— delphiniifolia G. Don. III. 388. no. 3.
β. parviflora G. Don. III. 389.
— Drégeana Bth. * VI. 650. no. 1.
— filiformis G. Don. III. 389. no. 6.
— obtusifolia G. Don. III. 389. no. 5.
— scabra G. Don. III. 389. no. 4.
— *scabra* G. Don. VI. 650. no. 1.
— stricta G. Don. III. 388. no. 2.
— trifida Hamilt. III. 388. no. 1.
Sopubieae Bth. VI. 650.
Soranthus Ldb. * II. 401.
Sorbus Tournef. II. 53. no. 8.
Sorema Lindl. ° VI. 547.
— acuminata Miers. VI. 548. no. 4.
— atriplicifolia Lindl. VI. 548. no. 2.
— lanceolata Miers. VI. 548. no. 5.
— linearis Miers. VI. 548. no. 7.
— littoralis Miers. VI. 548. no. 3.
— longifolia Miers. VI. 548. no. 6.
— paradoxa Lindl. VI. 547. no. 1.
Sorindeja Thouars. I. 550. V. 412.
— glaberrima Hsskrl. V. 412. no. 1.
— Madagascariensis DC. * I. 550. no. 1.
Souari I. 410. no. 1. et 2.
Soulamea Lam. I. 248.
— amara Lam. * I. 248. no. 1.
Southwellia nobilis Salisb. V. 100. no. 30.
Soya Mnch. * I. 759.
Soyeria Monn. * II. 700.
Soymida Adr. Juss. I. 436.
— febrifuga Adr. Juss. * I. 436. no. 1.

Spachea Adr. Juss. °V. 187.
— elegans Adr. Juss. V. 187. no. 1.
— littoralis Adr. Juss. V. 188. no. 4.
— Ossana Adr. Juss. V. 187. no. 3.
— parviflora Adr. Juss. V. 187. no. 2.
— perforata Adr. Juss. V. 188. no. 5.
— tricarpa Adr. Juss. V. 188. no. 6.
Spadostyles Bth. I. 574.
— Benthamii Endl. I. 574. no. 4.
— concolor Endl. I. 574. no. 6.
— Cunninghamii Bth. I. 574. no. 1.
— Hügelii Endl. I. 574. no. 3.
— ramulosa Endl. I. 574. no. 5.
— Sieberi Bth. I. 574. no. 2.
Spalanthus W. Jack. II. 68. V. 663.
— confertus W. Jack. *II. 68. no. 1. V. 663. no. 1.
Spallanzania DC. *II. 506.
— *agrimonoides* Pollin. II. 37. no. 1.
Spananthe Jcq. *II. 387.
Spanioptilon Lssng. *II. 673.
Sparattosperma Martius. *VI. 513.
Sparganophorus Vaill. *II. 538.
Sparmannia Thnbrg. *I. 353.
Sparsifoliae Rchb. (Pedicularis) III. 413.
Spartioides Spach. (Amygdalus) II. 907.
Spartioides Spach. (Genista) V. 485.
Spartium DC. I. 627.
Spartium Spach. (ex p.) V. 506.
Spartium Tournef. II. 839.
— *acutifolium* Lindl. I. 627. no. 2. γ.
— Aetnense Bivona. *I. 627. no. 3.
— *Aetnense* Bivona. V. 505. no. 1.
— affine Spach. II. 840. no. 10.
— *affine* Spach. V. 509. no. 7.
— *albicans* Cav. V. 502. no. 97.
— *alterum Hispanicum* Clus. V. 507. no. 1. V. 509. no. 8.
— ambiguum Spach. II. 840. no. 8.
— *ambiguum* Spach. V. 509. no. 6.
— *angulatum* Linn. II. 842. no. 1. V. 506. no. 1.
— *aphyllum* Pall. II. 860. no. 1.
— *arboreum* Dsf. I. 627. no. 4.
— *aspalathoides* Dsf. V. 483. no. 52.
— Bovei Spach. II. 840. no. 11.
— *Bovei* Spach. V. 507. no. 1. β.
— *capitatum* Cav. V. 499. no. 89.
— *cinereum* Villars. V. 486. no. 56.
— Clusii Spach. II. 839. no. 3.
— *Clusii* Spach. V. 507. no. 1. V. 509. no. 8.
— *congestum* Willd. V. 502. no. 100.
— *Corsicum* Lois. V. 483. no. 50.
— dubium Spach. II. 840. no. 9.
— *dubium* Spach. V. 509. no. 7.
Spartium Durieui Spach. II. 839. no. 2.
— *Durieui* Spach. V. 508. no. 3.
— *erinaceoides* Loisel. V. 484. no. 53.
— *ferox* Desf. V. 482. no. 47.
— *filifolium* Willd. I. 571. no. 1.
— Gasparinii Guss. I. 627. no. 1.
— *gymnopterum* Viv. I. 627. no. 1. V. 465. no. 8.
— *heterophyllum* l'Hérit. V. 482. no. 47.
— *Hispanicum Equiseti facie* Tournef. V. 499. no. 88.
— *horridum* Sibthrp. I. 628. no. 2. V. 465. no. 9.
— *horridum* Vahl. V. 468. no. 14.
— junceum Linn. I. 627. no. 2.
γ. acutifolium Linn.
β. odoratissimum Sweet.
— *linifolium* Dsf. V. 502. no. 101.
— microcarpum Spach. II. 840. no. 5.
— *microcarpum?* Spach. II. 840. no. 8. V. 508. no. 5.
— *monospermum* Ait. V. 507. no. 1.
— *monospermum* Dsf. II. 839. no. 2. V. 508. no. 3.
— *monospermum* Linn. I. 629. no. 1. II. 839. no. 3. V. 509. no. 8.
— *monospermum β.* Linn. V. 507. no. 1.
— *parviflorum* Vent. II. 845. no. 3. V. 506. no. 1.
— *pilosum* Rth. V. 497. no. 86.
— *primum Hispanicum* Clus. V. 509. no. 8.
— *radiatum* Linn. V. 462. no. 1.
— Raetam Spach. II. 839. no. 1.
— *Raetam* Spach. V. 508. no. 2.
— *rhodorhizoides* B. Webb. II. 840. no. 7.
— rostratum Spach. II. 840. no. 6.
α. macrorhynchum.
γ. microrhynchum.
β. podocarpum.
— *rostratum* Spach.? II. 840. no. 9. et no. 10.
— *rostratum α.* et *β.* Spach. V. 509. no. 6.
— *rostratum γ.* Spach. V. 509. no. 7.
— *sagittale* Rth. V. 490. no. 67.
— *Scorpius* Linn. V. 482. no. 49.
— semperflorens Spach. II. 840. no. 7.
— *semperflorens* Spach. V. 509. no. 7.
— *sericeum* Prsl. V. 503.
— *sericeum* Vent. V. 499. no. 89.
— *sphaerocarpum* Dsf. V. 464. no. 6.
— *sphaerocarpum* Linn. I. 630. no. 2.
— *tertium Hispanicum* Clus. II. 839. no. 3. V. 507. no. 1.
— *triphyllon etc.* Cupan. V. 465. no. 7.
— *trispermum* Sm. V. 505. no. 1.
— *umbellatum* Dsf. V. 498. no. 87.

Spartium Valentinum Willd. V. 503.
— Webbii Spach. II. 840. no. 4.
— *Webbii* Spach. V. 507. no. 1.
Spartocarpus (Genista) Spach. V. 462.
Spartothamnus A. Cunn. IV. 142. ° VI. 694.
— junceus A. Cuningh. * IV. 142. no. 1. * VI. 694. no. 1.
Spathandra Guill. et Perr. II. 148. V. 725.
— caerulea Guill. et Perr. * II. 148. no. 1. V. 725. no. 1.
Spathelia Linn. * I. 523.
Spathestigma glutinosum Hook. et Arn. III. 265. no. 2.
Spathodea Palis. Beauv. VI. 513.
— Fenzliana Miquel. VI. 513. no. 2.
— Kohautiana Prsl. VI. 513. no. 1.
Spatholobus Hasskarl. II. 903. V. 545.
— littoralis Hasskarl. * II. 903. no. 1. V. 545. no. 1.
Spathularia longifolia Mart. I. 224. no. 1.
Speciosae (Veronica) Bth. VI. 647. no. 6.
Specularia Heist. * II. 711. * VI. 387.
Spennera Mart. II. 124. V. 689.
— acutiflora Mart. II. 124. no. 6.
—? anomala Miquel. V. 689. no. 3.
— dichotoma Bth. II. 124. no. 2.
— dysophylla Bth. II. 124. no. 3.
— grandifolia Miquel. V. 689. no. 2.
— hydrophila Miquel. II. 124. no. 8.
—? latifolia Bth. II. 124. no. 4.
— rubricaulis Mart. * II. 124. no. 1.
— Sieberi Steudel. V. 689. no. 1.
— tetraptera Miquel. II. 124. no. 7.
— viscida Bth. II. 124. no. 5.
Spergula Linn. I. 265.
— *aestivosa* König. I. 285. no. 3.
— affinis Hook. I. 265. no. 3.
— *apetala* Labill. II. 249. no. 3. β.
— humifusa Cambess. I. 265. no. 2.
— micrantha Bnge. I. 265. no. 1.
— *perpusilla foliis lanceolatis* Loes. III. 334. no. 1.
— *rubra* Torr. et Gr. I. 265. no. 5.
Spergularia Pers. I. 264.
— grandis Prsl. I. 265. no. 6.
— laevis Cambess. I. 264. no. 2.
— *macrocarpa* Prsl. I. 265. no. 6.
— Platensis Endl. I. 265. no. 4.
— ramosa Cambess. I. 264. no. 3.
— rubra Cambess. * I. 265. no. 5.
  α. campestris.
  β. marina.
— rupestris Cambess. I. 265. no. 1.
Spermacoce Linn. II. 465. VI. 29.
— asperifolia Marteus et Galeotti. VI. 29. no. 2.
Spermacoce Avana R. Br. II. 465. no. 5.
— Brunonis Wall. II. 465. no. 3.
— calyptera Dcne. II. 465. no. 1.
— *calycoptera* Dcne. VI. 33. no. 8.
— Chapmannii Torr. et Gr. II. 465. no. 9.
— compressa R. Br. II. 465. no. 7.
— *compressa* Wall. II. 494. no. 25.
—? denticulata Wlprs. VI. 29. no. 4.
— *exserta* Rxb. II. 468. no. 1.
— *hedyotidea* DC. II. 492. no. 5.
— *hirta* Rottb. II. 465. no. 2.
— hispida Linn. * II. 465. no. 2.
  β. rubricaulis Spanoghe.
— *lanceolata* Frank. VI. 54. no. 1.
— *lasiocarpa* R. Br. II. 464. no. 1.
— longicaulis R. Br. II. 465. no. 4.
— *longiflora* H. B. Kth. II. 466. no. 2.
— Meyeniana Wlprs. VI. 29. no. 3.
— Natalensis Hochstett. VI. 29. no. 5.
— *ocymoides* Heyne. II. 465. no. 6.
— *ocymoides* Madr. Herb. II. 464. no. 3.
— polygonifolia St. Hil. II. 465. no. 8.
— *prostrata* Aubl. II. 467. no. 4.
— *Roxburghiana* Wall. II. 464. no. 2.
— *rubra* Jcq. II. 466. no. 2.
— *scabra* Willd. II. 465. no. 2.
— *stricta* Rxb. II. 464. no. 1.
— *strigosa* Bot. Mag. II. 466. no. 2.
— *Sumatrensis* Retz. II. 468. no. 1.
— tenera R. Br. II. 465. no. 6.
— *teres* Rxb. II. 468. no. 1.
— tetracocca Mart. et Galeotti. VI. 29. no. 1.
— *Virginiana* A. Rich. II. 466. no. 1. α.
Spermacoceae Cham. et Schlchtd. II. 463. II. 941. VI. 27.
Sphacele Bth. III. 844. ° III. 988.
— bullata Bth. III. 844. no. 2.
— calycina Bth. III. 844. no. 4.
— campanulata Bth. III. 845. no. 6.
— lamiifolia Bth. III. 845. no. 9.
— Lindleyi Bth. III. 845. no. 8.
— paniculata Bth. III. 844. no. 3.
— salviaefolia Bth. III. 844. no. 1.
— speciosa St. Hil. III. 845. no. 10.
— subhastata Bth. III. 845. no. 7.
— tomentosa Bth. III. 845. no. 5.
Sphaeralcea St. Hil. I. 296. II. 789.
— abutiloides Wlprs. * I. 296. no. 5.
— acerifolia Nutt. I. 296. no. 2. (III. Emend. p. 2.)
— Cisplatina St. Hil. I. 296. no. 4.
— floribunda Wlprs. II. 789. no. 1.
— stellata Torr. et Gr. I. 296. no. 1.
— velutina Prsl. I. 296. no. 3.
Sphaerantheae DC. II. 594. II. 955. II. 970. VI. 131.

Sphaeranthus Vahl. *II. 594. *II. 955. no. 1.
Sphaeridiophorum Desvx. I. 667. no. 85.
Sphaeritis Eckl. et Zeyh. II. 255. °V. 792.
— biconvexa Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 9.
— incana Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 8.
— margaritifera Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 4.
— muricata Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 3.
— paucifolia Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 5.
— puberula Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 10.
— setigera Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 12.
— stenophylla Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 2.
— subaphylla Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 7.
— tomentosa Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 11.
— trachysantha Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 6.
— typica Eckl. et Zeyh. II. 255. no. 1.
Sphaerocarpae Bth. (Bonnaya) III. 290.
Sphaerocarpae (Crotalaria) Bth. V. 446.
Sphaerocephala (Helichrysum) DC. VI. 239. no. 3.
Sphaerocephali Boiss. (Echinops) VI. 280.
Sphaeroclinium C. H. Schulz. ° VI. 207.
— nigellaefolium C. H. Schultz. * VI. 207. no. 1.
α. robustum.
β. tenuius.
Sphaerolobium Linn. I. 571. V. 429.
— acuminatum Bth. I. 571. no. 4.
— alatum Bth. I. 571. no. 1.
— fornicatum Bth. I. 571. no. 3.
— grandiflorum Bth. I. 571. no. 2.
— stenopternm Meisn. V. 429. no. 1.
Sphaeroma DC. I. 296. (ex p.)
— *acerifolia* Nutt. I. 296. no. 2.
— *floribunda* Schlchtd. II. 789. no. 1.
Sphaeromeria Nutt. *II. 642.
Sphaeromeria Nutt. II. 642.
— *argentea* Nutt. II. 642. no. 4.
— *capitata* Nutt. II. 642. no. 3.
Sphaeromorphaea DC. *II. 643.
Sphaerophysa DC. *I. 684. II. 860.
— microphylla Jaub. et Spach. II. 860. no. 1.
Sphaerosacme Rohituka Wall. I. 428. no. 1.
— *spicata* Wall. I. 428. no. 1.
Sphaerosparton B. Webb. V. 509.
Sphaerostemma Blume. I. 92.
— axillare Blume. I. 92. no. 1.
— elongatum Blume. I. 92. no. 3.
— pyrifolium Blume. I. 92. no. 2.
Sphaerostigma Ser. II. 77.
— alyssoides Wlprs. II. 78. no. 11.
— Andinum Wlprs. II. 79. no. 14.
— bistortum Wlprs. II. 77. no. 2. (c. var. β. ibid.)
— Boothii Wlprs. II. 77. no. 5.
β. pygmaeum II. 78.
— Chamissonis Fisch. et Mey. *II. 78. no. 8.
Sphaerostigma cheiranthifolium Fisch. et Mey. II. 77. no. 3.
— contortum Wlprs. II. 78. no. 10.
— dentatum Wlprs. *II. 78. no. 7.
— epilobioides Wlprs. II. 78. no. 12.
— gauraeflorum Wlprs. II. 78. no. 6.
— *hirtum* Fisch. et Mey. II. 77. no. 4.
— micranthum Wlprs. II. 77. no. 4.
— *minutiflorum* Fisch. et Mey. II. 78. no. 10.
— parvulum Wlprs. II. 78. no. 9.
— *spirale* Fisch. et Mey. II. 77. no. 3.
— strigulosum Fisch. et Mey. II. 79. no. 13.
— viridescens Wlprs. II. 77. no. 1.
Sphaerotheca Cham. III. 278. °III. 964.
— scoparioides Cham. III. 278. no. 1.
Sphallerocarpus Bess. *II. 422.
— *longilobus* Kar. et Kir. II. 422. no. 3.
Sphenandra Bth. III. 310. °III. 967. *VI. 641.
— viscosa Bth. III. 310. no. 1.
Sphenantha Schrad. II. 204. V. 762.
— scabra Schrad. *II. 204. no. 1. V. 762. no. 1.
Sphenismelia C. H. Schultz. VI. 202.
Sphenoclea Grtnr. II. 711.
Sphenoclea Grtnr. *II. 722.
SPHENOCLEACEAE Mart. II. 722.
Sphenodesme pentandra Jack. IV. 118. no. 6.
Sphenogyne R. Br. II. 630. VI. 182.
— Natalensis C. H. Schultz. VI. 182. no. 1.
— *speciosa* Hort. II. 630. no. 1.
— versicolor DC. *II. 630. no. 1.
Sphenogyneae DC. II. 630. VI. 182.
Sphenostylis E. Mey. I. 781.
— marginata E. Mey. *I. 781. no. 1.
Sphenotoma Sweet. *II. 733. VI. 436.
— dracophylloides Sonder. VI. 436. no. 1.
Sphinctanthus Bth. II. 520.
Sphinctanthus Bth. VI. 75.
— rupestris Bth. *II. 520. no. 1.
— *rupestris* Bth. VI. 76. no. 2.
Sphinctolobium Vogel. I. 798.
— floribundum Vogel. I. 799. no. 3.
— nitidum Vogel. I. 798. no. 2.
— virgilioides Vogel. I. 798. no. 1.
Sphingium canaliculatum E. Mey. I. 619. no. 9.
— *canescens* E. Mey. I. 618. no. 3. V. 454. no. 2.
— *decumbens* E. Mey. I. 618. no. 4. V. 454. no. 4.
— *lampolobum* E. Mey. I. 618. no. 5.
— *microphyllum* E. Mey. I. 618. no. 2.
— *spicatum* E. Mey. I. 618. no. 7. γ.
— *velutinum* E. Mey. I. 618. no. 1.
— *viscidulum* E. Mey. I. 618. no. 6.

Sphondylantha Prsl. II. 97. °V. 671. adn.
— aphylla Prsl. *II. 97. no. 1. *V. 671. adn.
Sphondylia Duby. VI. 439. no. 1.
Sphondylium DC. II. 415.
Sphondylococcus Mitch. IV. 127. no. 8.
Sphyrospermum Poepp. et Endl. VI. 414.
— buxifolium Poepp. et Endl. VI. 414. no. 1.
— cordifolium Bth. VI. 414. no. 4.
— longifolium Poepp. et Endl. VI. 414. no. 2.
— myrtifolium Hook. VI. 414. no. 3.
Spica Bth. III. 574.
Spicaeformes DC. (Cordia) VI. 553. no. 2.
Spicaria Bth. III. 525. VI. 659. no. 1.
Spiciflorae Bth. (Albizzia) V. 595.
— *armatae* Bth. (Acacia) V. 591.
Spiciformes DC. (Mikania) DC. 713. no. 7.
Spielmannia Medicus. IV. 58.
— Africana Willd. IV. 58. no. 1.
— *desertorum* Eckl. et Zeyh. IV. 59. no. 2.
— revoluta E. Mey. IV. 59. no. 2.
Spiegelia Linn. VI. 496.
— anthelmia Linn. VI. 496. †
— longiflora Martens et Galeotti. VI. 496. no. 1.
— pauciflora Martens et Galeotti. VI. 496. no. 2.
SPIGELIACEAE Martius. VI. 496.
Spigelieae Meisn. VI. 496.
Spilanthes Jcq. II. 621. II. 987.
— affinis Hook. et Arn. II. 621. no. 2.
— diffusa Poepp. et Endl. II. 622. no. 6.
— helenioides Hook. et Arn. II. 621. no. 1.
— Macraei Hook. et Arn. II. 622. no. 7.
— Nuttallii Torr. et Gr. II. 987. no. 1.
— pusilla Hook. et Arn. II. 622. no. 8.
— sessilis Poepp. et Endl. II. 622. no. 5.
— stenophylla Hook. et Arn. II. 621. no. 3.
— wedelioides Hook. et Arn. II. 621. no. 4.
Spinna vaccarum Rmph. I. 81. no. 3.
Spiracantha H. B. Kth. *II. 543.
Spiradiclis Blume. *II. 502.
Spiraea Linn. II. 49. II. 914. V. 657.
— angustifolia Otto et Alb. Dietr. V. 657. no. 2.
— *angustiloba* Turcz. V. 658. no. 3. β.
— barbata Wall. II. 50. no. 18.
— Belgica Dumort. II. 49. no. 2.
— betulaefolia Pall. *II. 50. no. 11.
— *betulaefolia* Wats. II. 50. no. 12.
— caespitosa Nutt. II. 51. no. 23.
— *capitata* Prsh. II. 49. no. 1. β.
— carpinifolia Willd. II. 51. †
— *ceanothifolia* Hornem. II. 50. no. 12.
— chamaedryfolia Linn. II. 51. †
— *chamaedryfolia β.* Hook. II. 50. no. 11.
— *chamaedryfolia* Ten. II. 49. no. 3.
Spiraea corymbosa Raf. *II. 50. no. 12.
— *corymbosa* Rxb. V. 658. no. 5.
— *crataegifolia* Lk. II. 50. no. 12.
— *crenata* Thnbrg. II. 50. no. 10.
— *crenata α. Uralensis* DC. II. 49. no. 4.
— cuneifolia Wall. II. 50. no. 7.
— dasyantha Bnge. II. 49. no. 6.
— *denudata* Prsl. II. 50. no. 19. β.
— Douglasii Hook. II. 50. no. 13.
— fissa Lindl. II. 50. no. 15.
— flabellata Bertol. II. 49. no. 3.
— hypericifolia Linn. *II. 49. no. 4.
γ. brevifolia, α. latifolia, β. longifolia } Ldb.
— *hypericifolia γ. acuta* DC. II. 49. no. 3.
— *hypericifolia ε. Savranica* DC. II. 49. no. 4. β.
— *Japonica* Hort. II. 50. no. 18.
— *Japonica* Mackoy. II. 372. no. 1.
— Kamtschatica DC. var. Himalayensis Linn. II. 50. no. 20.
— lancifolia Hffmnsgg. II. 50. no. 17.
— laxiflora Lindl. II. 50. no. 8.
— lobata Murr. V. 657. no. 3.
β. angustiloba, α. latiloba } Turcz. V. 658.
— Menziesii Hook. II. 50. no. 14.
— *monogyna* Torr. II. 49. no. 1. γ.
— opulifolia Linn. *II. 49. no. 1.
δ. ferruginea, β. mollis, γ. pauciflora } Torr. et Gr.
— *palmata* Linn. V. 658. no. 3. α.
— parvifolia Bth. II. 50. no. 16.
— *pauciflora* Nutt. II. 49. no. 1. γ.
— pectinata Torr. et Gr. II. 51. no. 22.
— pinnata Blume. II. 51. no. 21.
— pinnifolia Sieb. et Zucc. II. 50. no. 9.
— pubescens Turcz. II. 49. no. 5.
— Reevesiana Lindl. V. 658. no. 5.
— *ribifolia* Nutt. II. 49. no. 1. β.
— Schrenkiana C. A. Mey. II. 914. no. 1.
— sericea Turczan. V. 657. no. 1.
— Thunbergii Sieb. et Zucc. II. 50. no. 10.
— Ulmaria Linn. II. 50. no. 19.
β. denudata, α. tomentosa } Torr. et Gr.
— vacciniifolia Don. II. 51. †
— venusta Otto et A. Dietr. V. 658. no. 4.
Spiraeaceae DC. II. 49. V. 657.
Spiraeaceae verae Endl. II. 49. V. 657.
Spiraeae congener spinosa etc. Sloan. IV. 57. no. 58.
Spiraeanthus C. A. Mey. II. 914. no. 1.
Spiranthera St. Hil. I. 499.

Spiranthera Fraseri Hook. I. 257. no. 1.
— odoratissima St. Hil. * I. 499. no. 1.
Spiraria DC. V. 657. no. 2.
Spiridanthus Fnzl. II. 635.
— ......? Fnzl. * II. 635. no. 1.
Spirocarpaea DC. (Helicteres) I. 332.
Spirocarpos Ser. I. 635. II. 847.
Spiroceras Jaub. et Spach. II. 884.
Spirodiclis cf. Spiradiclis.
Spirodiclis secundiflora Blume? II. 502. no. 1.
— *secundiflora* Zippel. VI. 57. no. 1.
Spiroloheae DC. (Cruciferae) I. 189.
Spironema myricoides Hochstett. IV. 101. no. 1.
Spirorhynchus Kar. et Kir. II. 762.
— sabulosus Kar. et Kir. * II. 762. no. 1.
Spirospermum Thouars. * I. 95.
Spirostylis Prsl. II. 444.
Spirotropis Tulasne. ° V. 548.
— Candollei Tulasne. V. 548. no. 1.
Spondiaceae Endl. I. 556. V. 418.
Spondias Linn. I. 556. V. 418.
— acuminata Rxb. I. 556. no. 2.
— *amara* Ham. I. 556. no. 1.
— *amara* Lam. I. 556. no. 1.
— birrea A. Rich. I. 556. no. 4.
— Cirouella Tussac. I. 556. no. 8.
— *Cytheraea* Sonn. I. 556. †
— *diffusa* P. Br. I. 556. no. 8.
—? dubia A. Rich. I. 556. no. 5.
— dulcis Forst. I. 556. †
—? falcata Meisn. V. 418. no. 1.
— *graveolens* Mcfd. I. 556. no. 6.
— lutea Linn. * I. 556. no. 6.
— mangifera Pers. * I. 556. no. 1.
— microcarpa A. Rich. I. 556. no. 3.
— *Monbin* Linn. I. 556. no. 8.
— *paniculata* Rxb. I. 556. no. 1.
— pseudo-myrobalanus Tussac. I. 556. no. 7.
Spongotrichum DC. (Eurybia) VI. 120. no. 2. VI. 717. no. 6.
Sporledera Brnhrdi. * VI. 518.
Sporodantha Martius. I. 403.
Sprengelia Sm. * II. 733.
Sprunera C. H. Schultz. * II. 954.
Squamaria Orobanche Scopol. III. 479. no. 1.
Squamulosae DC. (Crassula) V. 791. no. 1.
Staavia Thnbrg. I. 544.
— adenandraefolia Eckl. et Zeyh. I. 544. no. 5.
— ciliata Brogn. I. 544. no. 4.
— glutinosa Thnbrg. I. 544. no. 2.
— nuda Brogn. I. 544. no. 3.
— radiata Thnbrg. I. 544. no. 1.
— rupestris Eckl. et Zeyh. I. 544. no. 6.
Stachyanthus DC. * II. 542.
Stachydeae Bth. III. 799. III. 987. VI. 678.
Stachymacris Hamilt. III. 751. VI. 674. no. 8.
Stachymorpha Ser. I. 278. no. 67. 70. 71. II. 780. V. 81. no. 3.
Stachyobotrys Bth. III. 909.
Stachyotypus Bth. III. 824. VI. 680. no. 5.
Stachys Bth. III. 816. ° III. 988. VI. 679.
— acerosa Boiss. VI. 681. no. 17.
— *acutifolia* Bory et Chaub. III. 820. no. 17.
— Aegyptiaca Pers. III. 839. no. 108.
— Aethiopica Linn. III. 829. no. 57.
— *affinis* Bnge. III. 824. no. 34.
— agraria Cham. et Schlchtd. III. 831. no. 66.
— ajugoides Bth. III. 826. no. 41.
— *alba* Mill. III. 820. no. 17.
— albicaulis Lindl. III. 826. no. 39.
— Alopecuros Bth. III. 816. no. 1.
— alpina Linn. III. 821. no. 19.
β. intermedia Bth.
— *ambigua* Sm. III. 825. no. 34. *γ*.
— angustifolia M. Bieb. III. 837. no. 94.
— *angustifolia* Pall. III. 825. no. 35.
— annua Linn. III. 833. no. 77.
— *annua* Sm. III. 836. no. 86.
— Arabica Hornem. III. 828. no. 51.
— arenaria Vahl. III. 636. no. 91.
— *argentea* Tausch. III. 820. no. 17.
— *Artemisiae* Lour. III. 812. no. 7.
— arvensis Linn. III. 831. no. 65.
— *arvensis* Walt. III. 825. no. 36.
— *arvensis γ. purpurea* Poir. III. 830. no. 62. et no. 63.
— aspera Michx. III. 825. no. 36.
β. glabrata Bth.
— *aspera* Nutt. III. 825. no. 36. *β*.
— Baikalensis Fisch. III. 825. no. 35.
— *Balbisii* Lnk. III. 834. no. 78.
— *barbata* Lapeyr. III. 818. no. 9.
— barbigera Viv. III. 843. no. 133.
— betaefolia Pers. III. 843. no. 132.
— Betonica Bth. III. 817. no. 3.
β. major.
— *Betonica* Crantz. III. 834. no. 77. III. 836. no. 86.
— betonicaefolia Desf. III. 842. no. 122.
— *betonicaefolia* Pers. III. 834. no. 80.
— *biennis* Roth. III. 820 no. 17.
— biflora Hook. * III. 843. no. 138.
— Bithynica Boiss. III. 951.
— Bogotensis H. B. Kth. III. 832. no. 71.
— borraginoides Cham. et Schlchtd. III. 823. no. 28.
— brachiata Boj. III. 828. no. 53.
— *Brasiliensis* Hortul. III. 831. no. 65.
— Bridgesii Bth. III. 827. no. 47.

Stachys bufonia Thuill. III. 836. no. 86.
— bullata Bth. III. 828. no. 52.
— Burchellii Bth. III. 839. no. 107.
— *Canariensis* Jacq. III. 824. no. 33.
— candida Bth. III. 829. no. 54.
— candida Bory et Chaub. III. 843. no. 129.
— *candida* Bory et Chaub. III. 859. no. 18.
— *canescens* Bory et Chaub. III. 837. no. 91.
— canescens Bory et Chaub. III. 843. no. 128.
— Capensis Prsl. VI. 681. no. 15.
— cardinalis Knze. VI. 679. no. 4.
— Chamissonis Bth. III. 823. no. 29.
— *Chamissonis* Hook. et Arn. III. 827. no. 44.
— Chinensis Bnge. III. 826. no. 38.
— Chonotica Hook. fil. VI. 680. no. 7.
— chrysantha Boiss. et Hldrch. VI. 680. no. 5.
— ciliata Dougl. III. 822. no. 26.
— *cinerea* Hortul. III. 820 no. 17.
— circinnata l'Hérit. III. 828. no. 49.
— coccinnea Jacq. III. 822. no. 25. III. 951.
— coerulea Burch. III. 837. no. 97.
— *congesta* d'Urville. III. 837. no. 91. III. 843. no. 128.
— Corsica Pers. III. 830. no. 61.
— *Cretica* Forsk. III. 818. no. 9. *β*.
— *Cretica* Linn. III. 820. no. 17. III. 821. no. 19. *β*.
— *Cretica latifolia* Tournef. III. 842. no. 126.
— cuneata Banks. III. 839. no. 104.
— *curviflora* Tausch. III. 821. no. 19. *β*.
— *dasyantha* Rafin. III. 820. no. 17.
— debilis H. B. Kth. III. 832. no. 73.
— *decemdentata* Forst. III. 871. no. 15.
— decumbens Pers. III. 843. no. 130.
— *decumbens* Rchb. III. 836. no. 86.
— *decumbens* Willd. III. 834. no. 78.
— densiflora Bth. III. 816. no. 2.
— denticulata Burch. III. 838. no. 103.
— discolor Bth. III. 818. no. 7.
— *divaricata* Viv. III. 833. no. 75.
— Drégeana E. Mey. III. 838. no. 102.
— Drummondii Bth. III. 832. no. 71.
— elliptica H. B. Kth. III. 833. no. 74.
— *elongata* Hortul. III. 820. no. 17.
— eriantha Bth. III. 831. no. 64.
— *excelsa* Hortul. III. 820. no. 17.
— excelsa Mart. et Galeotti. VI. 680. no. 9.
— floccosa Bth. III. 821. no. 18.
— floribunda Montbr. et Auch. III. 840. no. 115.
— *Foeniculum* Pursh. III. 773. no. 3.
— fragilis Visiani. III. 834. no. 79.
— fruticulosa M. Bieb. III. 841. no. 121.
— *fusca* Moench. III. 821. no. 19. *β*.
— Galeottii Martens. VI. 680. no. 8.
Stachys Germamica Linn. III. 820. no. 17.
β. subalpina Griseb.
— Gilliesii Bth. III. 827. no. 48.
— glaucescens Mussin. III. 843. no. 137.
— glutinosa Linn. III. 841. no. 120.
— *glutinosa* Sm. III. 836. no. 86.
— graciliflora Prsl. VI. 681. no. 14.
— Graeca Wlprs. III. 951.
— Grahami Bth. III. 832. no. 70.
— grandidentata Lindl. III. 827. no. 43.
— grandiflora Bth. III. 817. no. 6.
— *grandiflora* Host. III. 835. no. 83.
— grandifolia E. Mey. III. 827. no. 45.
— Heraclea All. III. 818. no. 9.
β. lutea Bth.
— *heterophylla* Moench. III. 820. no. 17.
— hirsuta H. B. Kth. III. 824. no. 31.
— hirta Linn. III. 833. no. 75.
— *hispida* Pursh. III. 825. no. 36.
— hispidula Hochstett. VI. 681. no. 12.
— humifusa Burch. III. 829. no. 55.
— hyssopifolia Michx. III. 825. no. 37.
— *hyssopifolia* Vahl. III. 838. no. 100.
— hyssopoides Burch. III. 837. no. 95.
— *Iberica* M. Bieb. III. 836. no. 91.
— inflata Bth. III. 840. no. 113.
— integrifolia Vahl. III. 840. no. 114.
— *intermedia* Ait. III. 821. no. 19. *β*.
— *intermedia* Hortul. III. 820. no. 17.
— *intermedia* Ten. III. 818. no. 9.
— *inscripta* Rchb. III. 833. no. 75.
— Italica Mill. III. 820. no. 16.
β. pungens Bth.
— Iva Griseb. III. 841. no. 116.
— jugalis Burch. III. 840. no. 112.
— Keerlii Bth. III. 832. no. 69.
— Kotschyi Boiss. III. 952.
— Kraussii Hochstett. VI. 681. no. 13.
— Kurdica Boiss. III. 952.
— Lamarckii Bth. III. 840. no. 111.
— lamioides Bth. VI. 679. no. 3.
— lanata Jacq. III. 819. no. 15.
— *lanata* Moench. III. 840. no. 109.
— *latifolia* Ait. III. 828. no. 49.
— lavandulaefolia Vahl. III. 841. no. 117.
— leucoglossa Griseb. III. 836. no. 90.
— linearis Burch. III. 838. no. 99.
— longifolia Bth. III. 817. no. 5.
— *Lusitanica* Steud. III. 820. no. 17.
— Lyallii Bth. III. 830. no. 59.
— macilenta E. Mey. III. 837. no. 96.
— Macraei Bth. III. 827. no. 44.
— macrocheilos Boiss. III. 952.
— maritima Linn. III. 834. no. 80.
— marrubiifolia Viv. III. 830. no. 62. III. 843. no. 134.

Stachys Mauritiana Sieb. III. 816. no. 8.
— melissaefolia Bth. III. 822. no. 23.
— menthaefolia Visiani. III. 835. no. 83.
— Mexicana Bth. III. 824. no. 32.
— Meyenii Wlprs. III. 951.
— mollissima Willd. III. 819. no. 10.
— Montbretii Bth. III. 818. no. 8.
— mucronata Sieb. III. 841. no. 118.
— Natalensis Hochstett. VI. 681. no. 11.
— nepetaefolia Desf. III. 828. no. 50.
— *nervosa* Gat. III. 834. no. 77.
— nigricans E. Mey. III. 829. no. 56.
— nivea Labill. III. 839. no. 106.
— nutans Bth. III. 840. no. 110.
— *obliqua* Waldst. et Kit. III. 818. no. 9. β.
— oblongifolia Bth. III. 826. no. 40.
— obtusicrena Boiss. VI. 681. no. 16.
— Olympica Poir. III. 842. no. 124.
— *orientalis* Forsk. III. 839. no. 105.
— *orientalis* Hortul. III. 820. no. 17.
— *orientalis* Linn. III. 821. no. 19. β.
— *orientalis* Vahl. III. 818. no. 9. β.
— Palaestina Linn. III. 839. no. 109.
— *Palaestina* Vahl. III. 839. no. 105.
— palustris Linn. III. 825. no. 34.
β. angustifolia } Bth.
γ. hybrida } Bth.
— *palustris* Walt. III. 826. no. 37.
— *Pannonica* Lang. III. 820. no. 17.
— Parolinii Visiani. III 836. no. 89.
— parvifolia Martens et Galeotti. VI. 681. no. 10.
— *patens* Swrtz. III. 562. no. 175.
— patula Griseb. III. 835. no. 84.
— pauciflora Bth. III. 839. no. 105.
— pauciflora Visiani. III. 836. no. 88.
— Persepolitana Boiss. VI. 680. no. 6.
— *Persica* Gmel. jun. III. 821. no. 20.
— Peruviana Dombey. III. 832. no. 68.
— *phlomoides* Willd. III. 818. no. 9.
— pilosa Nutt. III. 842. no. 126.
— pilosissima Martens et Galeotti. VI. 679. no. 1.
— Pinardi Boiss. III. 952.
— plumosa Griseb. III. 833. no. 76.
— *Poiretii* Ten. III. 830. no. 62.
— *polystachya* Ten. III. 820. no. 17.
— *procumbens* Lam. III. 836. no. 86.
— *prostrata* Lag. III. 836. no. 91.
— pubescens Ten. III. 834. no. 78.
—? pumila Russell. III. 819. no. 11.
— *pungens* Russell. III. 820. no. 16. β.
— *purpurea* Poir. III. 836. no. 91.
— ramosissima Montbr. et Auch. III. 837. no. 92.
— *recta* β. Bert. III. 835. no. 85.
Stachys recta Linn. III. 835. no. 86.
— *recta* d'Urv. III. 837. no. 94.
— repens Mart. et Galeotti. VI. 679. no. 2.
— Riederi Chamisso. III. 823. no. 30.
— rotundifolia Moç. et Sess. III. 830. no. 60.
— rosmarinifolia Bth. III. 838. no. 100.
— *rubra* Donn. III. 837. no. 91.
— rugosa Ait. III. 838. no. 101.
— *rugosa* Lam. III. 840. no. 111.
— rupestris Montbr. et Aucher. III. 819. no. 12.
— *Salviae* Lindl. III. 845. no. 8.
— *salviaefolia* Hochst. et Steud. III. 820. no. 16. β.
— *salviaefolia* Ten. III. 820. no. 16.
— saturejoides Montbr. et Auch. III. 837. no. 93.
— Scardica Griseb. III. 817. no. 4.
— *scordifolia* Willd. III. 836. no. 91.
— scordioides Poir. III. 842. no. 123.
— Scyronica Boiss. III. 952.
— *segetum* Hagen. III. 824. no. 34.
— *sericea* Griseb. III. 820. no. 17. β.
— sericea Wall. III. 821. no. 20.
— serrulata Burch. III. 830. no. 63.
— sessilifolia E. Mey. III. 827. no. 46.
— setifera C. A. Mey. III. 821. no. 21.
— *Sibirica* Hortul. III. 820. no. 17.
— *Sibirica* Link. III. 821. no. 19. β.
— *Sideritis* Vill. III. 836. no. 86.
— sideritoides Gill. III. 827. no. 42.
— spathulata Burch. III. 838. no. 98.
— *speciosa* Hook. III. 736. no. 5.
— *spectabilis* Choisy. III. 820. no. 17.
— spinosa Linn. III. 841. no. 119.
— spinulosa Sbthrp. et Sm. III. 834. no. 81.
— splendens Wall. III. 822. no. 24.
— stenophylla Spreng. III. 843. no. 136.
— subcrenata Vis. III. 835. no. 85.
— subnuda Montbr. et Auch. III. 836. no. 87.
— subsessilis Burch. III. 829. no. 58.
— sylvatica Linn. III. 824. no. 33.
— sylvestris Forsk. III. 836. no. 86.
— Swainsoni Bth. III. 819. no. 13.
— *tenuifolia* Pall. III. 837. no. 94.
— *tenuifolia* Willd. III. 826. no. 37.
— Thunbergii Bth. III. 823. no. 27.
— Tmolea Boiss. III. 951.
— *tomentosa* Gat. III. 820. no. 17.
— truncata Kunze. III. 831. no. 67.
— Tournefortii Poir. III. 842. no. 125.
— *urticaefolia* Tausch. III. 821. no. 19. β.
— Valentina Lag. III. 843. no. 135.
— *velutina* Willd. III. 828. no. 49.
— venosa Pers. III. 843. no. 131.
— *verbascifolia* Hortul. III. 820. no. 17.

Stachys vestita Bth. III. 821. no. 22.
— virgata Bory et Chaub. III. 842. no. 127.
— viscosa Montbr. et Auch. III. 835. no. 82.
— Zuccarinii Bth. III. 819. no. 14.
Stachytarpheta Vahl. IV. 4. VI. 686.
— angustifolia Vahl. IV. 4. no. 1.
— aristata Vahl. IV. 4. no. 5. VI. 686. †
— *asperrima* Chamisso. IV. 8. no. 24.
— bifurca Bth. IV. 11. no. 39.
— Bogoriensis Zollinger et Moritzi. VI. 686. no. 2.
— Cajanensis Vahl. IV. 5. no. 9.
— canescens H. B. Bth. IV. 6. no. 15.
— Chamissonis Wlprs. IV. 10. no. 35.
— ciliata Knze. VI. 686. no. 1.
— crassifolia Schrad. IV. 7. no. 19.
— dichotoma Vahl. IV. 5. no. 6.
— discolor Cham. IV. 9. no. 31.
— elatior Schrad. IV. 4. no. 2.
— gesnerioides Cham. IV. 8. no. 25.
— *gibberosa* Rchb. IV. 4. no. 4. IV. 9. no. 28.
— glabra Cham. IV. 9. no. 30.
— glauca Wlprs. IV. 11. no. 37.
— hirsuta Jcq. fil. IV. 6. no. 16.
— hirsutissima Link. IV. 5. no. 10.
— hirta H. B. Kth. IV. 5. no. 8.
— hispida Nees et Mart. IV. 8. no. 22.
— Indica Vahl. IV. 4. no. 3.
— integrifolia Wlprs. IV. 10. no. 36.
— Jamaicensis Vahl. IV. 4. no. 4.
β. pilosiuscula Wlprs.
— marginata Vahl. IV. 5. no. 11.
— microphylla Wlprs. IV. 6. no. 14.
— mutabilis Vahl. IV. 7. no. 18.
— Orubica Vahl. IV. 7. no. 17.
— *palustris* Jcq. fil. IV. 4. no. 2.
— *pilosiuscula* H. B. Kth. IV. 4. no. 4. β.
— Pohliana Chamisso. IV. 9. no. 29.
— prismatica Vahl. IV. 8. no. 23.
— pseudochascanum Wlprs. IV. 11. no. 38.
— quadrangula Nees et Mart. IV. 7. no. 21.
— rhomboidalis Wlprs. IV. 10. no. 32.
— *rotundifolia* Lnk. IV. 5. no. 10.
— scaberrima Chamisso. IV. 8. no. 24.
—? squamosa Vahl. IV. 9. no. 27.
— strigosa Vahl. IV. 6. no. 12.
— triphylla Wlprs. IV. 10. no. 33.
— trispicata Nees et Mart. IV. 7. no. 20.
— umbrosa H. B. Kth IV. 6. no. 13.
— urticifolia Sims. IV. 5. no. 7.
— veronicaefolia Cham. IV. 8. no. 26.
— villosa Chamisso. IV. 10. no. 34.
— *Zuccagni* Roem. et Schult. IV. 7. no. 18.
Stachyurus Sieb. et Zucc. I. 258.
— praecox Sieb. et Zucc. *I. 258. no. 1.
Stadmannia trijuga Spr. I. 421. no. 1.
Staechelina alpina Crntz. III. 407. no. 1.
Staehelina DC. II. 669.
— Baetica DC. *II. 669. no. 1.
Staelia Cham. *II. 468.
Stagmaria W. Jack. I. 555. V. 415.
— verniciflua W. Jack. *I. 555. no. 1. V. 415. no. 1.
Stalagmites Murr. I. 395.
— dulcis G. Don. I. 396. no. 3.
— Guineensis G. Don. I. 396. no. 6.
— Javanensis Blume. I. 395. no. 1.
— ovalifolius G. Don. I. 396. no. 4.
— pictorius G. Don. I. 396. no. 2.
— spicatus Wlprs. I. 396. no. 5.
Stalea vid. Halea.
Stanleya Nutt. I. 173.
— *amplexifolia* Nutt. I. 173. no. 1.
— *gracilis* DC. I. 173. no. 2.
— heterophylla Nutt. I. 173. no. 2.
— integrifolia James. I. 173. no. 1.
— viridiflora Nutt. I. 173. no. 3.
— *Washitana* DC. I. 128. no. 1.
Stapelia Linn. VI. 495.
— cactiformis Hook. VI. 495. no. 1.
Stapeliae Dcne. VI. 491.
Staphylea Linn. I. 529.
— Bumalda DC. *I. 529. no. 2.
— chrysodonta Jungh. I. 529. no. 1.
— *corymbosa* DC. I. 529. no. 2.
—? *Indica* Burm. I. 444. no. 3. *a*. a.
— *montana* Rxb. I. 532. no. 6.
— *occidentalis* Swrtz. I. 529. no. 3.
— *crepretum* Rxb. I. 532. no. 7.
STAPHYLEACEAE Bartl. I. 529. II. 826. V. 401.
Stauntonia DC. I. 99.
— *Brunoniana* Wall. I. 99. no. 1.
— hexaphylla Dcne. *I. 99. no. 1.
Stauracanthus Lnk. *I. 627.
— *aphyllus* Lnk. I. 626. no. 3.
Stauranthera Bth. *VI 523.
Staurophragma Fisch. et Mey. III. 447. °III. 958. *VI. 636.
— Natolicum Fisch. et Mey. III. 447. no. 1.
Stechmannia DC. *II. 669. VI. 283.
— ramosissima Jaub. et Spach. VI. 283. no. 2.
— Staehelinae DC. VI. 283. no. 1.
Stedelia Brasiliensis Spr. I. 405. no. 20.
Steganotropis conjugata Lehm. I. 756. no. 1.
Stegionepeta Bth. III. 779. VI. 676. no. 1.
Steinheilia Dcne. VI. 482.
— radians Dcne. *VI. 482. no. 1.
Steiractis DC. *II. 592. *II. 952. no. 31.
Steirodiscus Lssng. *II. 637.
Steiroglossa DC. *II. 635.
Stelechospermum Blume. I. 397.

Stelechospermum flexuosum Blume. *I. 397. no. 1.
Stellara lathraeoides Fisch. III. 479. no. 1.
Stellatae Cham. et Schlchtd. II. 454. II. 941. VI. 8.
Stellera Turcz. *VI. 508.
Stemmadenia Bth. °VI. 468.
— glabra Bth. VI. 469. no. 1.
— mollis Bth. VI. 469. no. 3.
— pubescens Bth. VI. 469. no. 2.
Stemodia Linn. III. 266. °III. 963. *VI. 642.
— arenaria H. B. Kth. III. 268. no. 18.
— balsamea Bth. III. 266. no. 3.
— bartsioides Lindl. III. 268. no. no. 16.
— camphorata Vahl. III. 267. no. 8.
— *capitata* Bth. III. 265. no. 5. et 6.
— Chilensis Bth. III. 268. no. 17.
— diffusa Bth. III. 267. no. 12.
— durantifolia Swrtz. III. 269. no. 26.
— Ehrenbergiana Schlchtd. *III. 270. no. 31.
— foliosa Bth. III. 269. no. 24.
— *glabra* Spr. III. 286. no. 5.
— *grandiflora* Hamilt. III. 265. no. 2.
— gratiolaefolia St. Hil. III. 269. no. 23.
— gratioloides Bth. III. 268. no. 13.
— hirsuta Heyne. III. 267. no. 11.
— hypericifolia Bth. III. 266. no. 2.
— hyptoides Cham. III. 269. no. 27.
— Jorullensis H. B. Kth. III. 269. no. 21.
— *lobelioides* Lehm. III. 268. no. 17.
— *macrostachya* Bth. III. 265. no. 3.
— *maritima* Heyne. III. 267. no. 10.
— maritima Linn. III. 269. no. 25.
— Menthastrum Bth. III. 266. no. 1. *III. 938.
— micrantha Bth. III. 267. no. 6.
— minuta G. Don. III. 270. no. 29.
— *multifida* Spr. III. 271. no. 2.
— muraria Rxb. III. 268. no. 14.
— palustris St. Hil. III. 269. no. 22.
— parviflora Ait. III. 268. no. 19.
— Philippensis Cham. et Schlchtd. III. 267. no. 9.
— repens Bth. III. 267. no. 7.
— *ruderalis* Vahl. III. 266. no. 4.
— sessilis Bth. III. 266. no. 4.
— stricta Cham. III. 270. no. 28.
— suffruticosa H. B. Kth. III. 269. no. 20.
— tenuiflora Bth. III. 266. no. 5.
— tomentosa G. Don. III. 270. no. 30.
— *trifoliata* Rchb. III. 269. no. 20.
— verticillaris Lnk. III. 268. no. 15.
— viscosa Rxb. III. 267. no. 10.
Stemodiacra maritima odorata etc. R. Br. *III. 269. no. 25.
Stemonurus Blume. I. 378.
— frutescens Blume. I. 378. no. 4.
Stemonurus Javanicus Blume. I. 378. no. 3. (c. var. β. ibid.)
— pauciflorus Blume. I. 378. no. 1.
— secundiflorus Blume. I. 378. no. 2.
Stenactis N. ab E. *II. 583. *II. 952. no. 13.
— *ambigua* DC. II. 581. no. 29.
— *annua* DC. II. 581. no. 28.
— *Beyrichii* Fisch. et Mey. II. 581. no. 29. γ.
— *strigosa* DC. II. 581. no. 28.
— *verna* N. ab E. II. 581. no. 30.
Stenanthera R. Br. *II. 731. VI. 425.
— *ciliata* Lindl. VI. 424. no. 1.
— conostephioides Sonder. VI. 425. no. 1.
Stenarrhena lanata D. Don. III. 617. no. 66.
Stengelia C. H. Schultz. II. 946.
— *Adoënsis* C. H. Schultz. II. 946. no. 11.
— *controversa* C. H. Schultz. II. 947. no. 13.
— *Kotschyana* Hochst. II. 947. no. 12.
Stenocarpus Spach. (Genista) V. 481.
Stenochilum elegans Willd. III. 398. no. 9.
Stenochilus R. Br. IV. 140. VI. 693.
— albicans Bartl. VI. 693. no. 1.
— glaber R. Br. IV. 141. no. 4.
— incanus Lindl. IV. 140. no. 2.
— longifolius R. Br. IV. 141. no. 6.
— maculatus Ker. IV. 141. no. 5.
— racemosus Endl. IV. 140. no. 1.
— subcanescens Bartl. VI. 693. no. 2.
— viscosus Grah. IV. 140. no. 3.
Stenocline DC. *II. 646.
Stenocoelium Ldb. II. 406. V. 871.
— athamanthoides Ldb. *II. 406. no. 1. V. 871. no. 3.
— *athamanthoides* Lssng. V. 872. no. 3.
— divaricatum Turczan. V. 871. no. 1.
— trichocarpum Schrenk. V. 871. no. 2.
Stenodon Naudin. °V. 698.
— suberosus Naudin. *V. 698. no. 1.
Stenogoni Lem. (Echinocactus) II. 318. V. 814.
Stenogyne Bth. III. 900. °III. 991.
— cordata Bth. III. 900. no. 3.
— macrantha Bth. III. 900. no. 1.
— microphylla Bth. III. 900. no. 5.
— Nelsoni Bth. III. 901. no. 7.
— rugosa Bth. III. 900. no. 4.
— scrophularioides Bth. III. 901. no. 6.
— sessilis Bth. III. 900. no. 2.
Stenolobium Bth. I. 759.
— coeruleum Bth. I. 759. no. 1.
— glabrum Bth. I. 759. no. 2.
— tomentosum Bth. I. 759. no. 3.
— velutinum Bth. I. 759. no. 4.
Stenopetalum R. Br. I. 174. V. 40.
— croceum Bnge. V. 40. no. 5.
— draboides Hook. V. 40. no. 2.

Stenopetalum gracile Bnge. V. 40. no. 4.
— incisifolium Hook. I. 174. no. 3.
— lineare R. Br. I. 174. no. 2. [V. 40. no. 3. V. 41. †]
— minus Bnge. V. 40. no. 6.
— procumbens Hook. V. 40. no. 1.
— robustum Endl I. 174. no. 1. V. 41. †
Stenosiphon Spach. II. 97. V. 670.
— virgatum Spach. *II. 97. no. 1. V. 670. no. 1.
Stenospermum capitatum Sweet. V. 742. no. 4.
Stenostomum Gaertn. fil. II. 487.
— paniculatum Poepp. et Endl. *II. 487. no. 1.
Stenotaenia Boiss. °V. 888.
— nudicaulis Boiss. V. 888. no. 2.
— tordylioides Boiss. V. 888. no. 1.
Stenotus Nutt. II. 591. *II. 952. no. 45. II. 966.
— acaulis Nutt. II. 591. no. 1. *II. 966. no. 1.
— armerioides Nutt. II. 591. no. 3. *II. 967. no. 3.
— caespitosus Nutt. II. 591. no. 2. *II. 967. no. 4.
— florifer Torr. et Gr. II. 967. no. 6.
— linearifolius Torr. et Gr. *II. 967. no. 5.
— multicaulis Nutt. II. 592. no. 4. *II. 967. no. 7.
— pygmaeus Torr. et Gr. II. 967. no. 2.
Stephanandra Sieb. et Zucc. °V. 658.
— flexuosa Sieb. et Zucc. *V. 658. no. 1.
Stĕphania Lour. I. 96.
Stephania Willd. I. 201.
— Abyssinica Dill. et A. Rich. I. 96. no. 11.
— acuminatissima Blume. I. 96. no. 6.
— Burmanni Wght. et Arn. *I. 96. no. 10.
— capitata Blume. I. 96. no. 5.
— corymbosa Blume. I. 96. no. 4.
— discolor Blume. I. 96. no. 1.
— glaucescens Dcne. I. 96. no. 8.
— hernandifolia Wght. et Arn. *I. 96. no. 9.
— longa Lour. I. 96. no. 7.
— tomentosa Blume. I. 96. no. 3.
— venosa Blume. I. 96. no. 2.
Stephanocoma Lssng. *II. 666. VI. 278.
— *berkheyoides* C. H. Schultz. VI. 279. no. 3.
— carduoides Lssng. *VI. 278. no. 1.
β. major } C. H. Schultz.
β. minor }
— *incana* C. H. Schultz. VI. 279. no. 1.
— *rubricaulis* C. H. Schultz. VI. 279. no. 2.
Stephanomata Spr. I. 20.
Stephanomeria Nutt. °VI. 348.
— exigua Nutt. VI. 349. no. 5.
— *heterophylla* Nutt. VI. 349. no. 2.
Stephanomeria minor Nutt. VI. 348. no. 1.
— paniculata Nutt. VI. 349. no. 3.
— runcinata Nutt. VI. 349. no. 2.
— virgata Bth. VI. 349. no. 4.
Stephanopodium Poepp. et Endl. II. 828. °V. 408.
— Peruvianum Poepp. et Endl. *II. 828. no. 1. V. 408. no. 1.
Stephanotrichum Naudin. °V. 718.
— hispidum Naudin. V. 719. no. 1.
Stephanotus P. Thouars. VI. 492.
— floribunda Brogn. *VI. 492. no. 1.
Stephegyne Korthls. II. 513. °VI. 70.
— Africana Wlprs. *II. 513. no. 3. *VI. 71. no. 3.
— parvifolia Korthls. II. 513. no. 2. VI. 71. no. 2.
— speciosa Korthls. II. 513. no. 1. VI. 71. no. 1.
Steppia C. H. Schultz. VI. 163.
— *Abyssinica* C. H. Schultz. VI. 163. no. 4.
Sterculia Linn. I. 334. II. 795. V. 97.
Sterculia Endl. (ex p.) V. 104. 106.
— Abyssinica R. Br. II. 795. no. 8. V. 98. no. 7.
— acerifolia Wlprs. I. 335. no. 14.*)
— *acuminata* Palis. V. 106. no. 1.
— *alata* Rxb. I. 335. no. 1. V. 103. no. 1.
— angustifolia Rxb. I. 335. no. 10. V. 100. no. 32.
— *angustifolia* W. Jack. V. 101. no. 34.
— Balanghas Linn. I. 335. † V. 108. no. 31.
— *Balanghas* Rxb. V. 100. no. 30.
— Blumei G. Don. II. 795. no. 1. *V. 102. no. 54.
— *Candollei* Wall. V. 102. no. 44.
— Caribaea Horsf. et Bennet. V. 99. no. 13.
— caricaefolia G. Don. II. 795. no. 7. *V. 102. no. 58.
— Carthaginensis Cav. V. 98. no. 10.
— Ceramica Horsf. et Bennet. V. 102. no. 45.
— Chica St. Hil. I. 335. no. 15.
— *Chicha* St. Hil. V. 98. no. 10.
— *coccinea* Jack. II. 795. no. 3. V. 100. no. 27.
— coccinea Rxb. I. 335. no. 9. V. 100. no. 29.
— colorata Rxb. I. 335. †
— *colorata* Rxb. V. 104. no. 2.
— comosa Wall. I. 335. no. 7. V. 100. no. 25.
— cordata Blume. I. 335. no. 13. *V. 102. no. 53.
— *cordata* Blume. V. 99. no. 23.
— cordifolia Cav. I. 335. †
— *cordifolia* Cav. V. 106. no. 2.

*) Cujus synonymum erit: *Cichaea acerifolia* Prsl. Reliq. Hänk. II. 141.

Sterculia cuneata Horsf. et Bennet. V. 101. no. 35.
— cuspidata Horsf. et Bennet. V. 101. no. 40.
— excelsa Mart. II. 795. no. 9. *V. 102. no. 59.
— ferruginea Horsf. et Bennet. V. 101. no. 36.
— foetida Linn. I. 335. † V. 97. no. 1. (c. var. β.)
— frondosa Rich. V. 99. no. 15.
— *fulgens* Wall. V. 104. no. 2. β.
— *grandiflora* Venten. V. 106. no. 1.
— grandifolia Horsf. et Bennet. V. 101. no. 39.
— guttata Rxb. V. 99. no. 18.
— *Helicteres* Pers. V. 98. no. 10.
— *heterophylla* Palis. V. 106. no. 3.
— imberbis DC. *V. 102. no. 49.
— insularis Horsf. et Bennet. V. 101. no. 41.
— Ivira Swrtz. V. 99. no. 12.
— *Jackiana* Wall. V. 101. no. 34.
— Javanica Horsf. et Bennet. V. 99. no. 23.
— laevis Wall. II. 795. no. 3. V. 100. no. 27.
— *lanceaefolia* Rxb. I. 335. no. 8. V. 99. no. 20.
— *lanceolata* Blume. II. 795. no. 1. V. 100. no. 26.
— lanceolata Cav. I. 335. † V. 99. no. 21.
— longifolia Venten. V. 100. no. 26.
— *macrocarpa* Don. V. 106. no. 1.
— macrophylla Venten. V. 100. no. 24.
— Madagascariensis Horsf. et Bennet. V. 99. no. 19.
— Mexicana Horsf. et Bennet. V. 98. no. 3.
— mollis Wall. V. 101. no. 33.
— *monosperma* Venten. V. 100. no. 30.
— *nitida* Venten. V. 106. no. 1.
— nobilis Sm. V. 100. no. 30.
— oblongata Horsf. et Bennet. V. 101. no. 38.
— *oblongifolia* DC. V. 106. no. 1.
— obovata Horsf. et Bennet. V. 102. no. 47.
— parviflora Rxb. V. 101. no. 42.
— parvifolia Wall. V. 99. no. 22.
— peltata G. Don. II. 795. no. 6. *V. 102. no. 57.
— *platanifolia* Linn. fil. V. 104. no. 1.
— polyphylla Horsf. et Bennet. V. 98. no. 2.
— populifolia Rxb. *I. 335. no. 11.
— *populifolia* Rxb. V. 104. no. 1.
— *populifolia* var. *a.* DC. V. 102. no. 44.
— *populifolia β. acutiuscula* DC. I. 335. no. 11.
— propinqua Horsf. et Bennet. V. 99. no. 14.
— *pubescens* G. Don. II. 795. no. 2. V. 102. no. 46.
— punctata DC. *V. 102. no. 50.
— *punctata* Moç. et Sess. V. 98. no. 10.
— pyriformis Bnge. I. 335. no. 5.
Sterculia pyriformis Bnge. V. 104. no. 1.
— quadrifida Horsf. et Bennet. V. 102. no. 43.
— Roxburghiana Wall. I. 335. no. 8.
— Roxburghii Wall. V. 99. no. 20.
— rubiginosa Venten. V. 101. no. 34.
— rugosa Horsf. et Bennet. V. 99. no. 17.
— *scaphifera* Wall. V. 104. no. 1.
— scatigera Wall. II. 795. no. 11. *V. 102. no. 60.
— setigera Delile. I. 334. no. 1. *V. 102. no. 51.
— Spangleri Horsf. et Bennet. V. 100. no. 28.
— stipularis Horsf. et Bennet. V. 101. no. 37.
— striata St. Hil. et Naud. II. 795. no. 10. V. 98. no. 11.
— subpeltata Blume. I. 335. no. 12. *V. 102. no. 52.
— Surinamensis Horsf. et Bennet. V. 99. no. 16.
— tomentosa Guill. et Perr. I. 334. no. 3. V. 98. no. 8.
— *tomentosa* Thnbrg. V. 104. no. 1.
— tragacantha Lindl. I. 335. no. 4. *II. 795. no. 2. V. 102. no. 46.
— triloba G. Don. II. 795. no. 5. *V. 102. no. 56.
— triphaca Horsf. et Bennet. V. 98. no. 9.
— urceolata Sm. V. 102. no. 44.
— urens Rxb. V. 98. no. 5.
— versicolor Wall. I. 335. no. 6. V. 98. no. 4.
— verticillata Schum. I. 334. no. 2.
— *verticillata* Schum. et Thonn. V. 106. no. 1.
— villifera Steudel. V. 102. no. 48.
— villosa Rxb. V. 98. no. 6.
— Wallichii G. Don. II. 795. no. 4. *V. 102. no. 55.
STERCULIACEAE Vent. I. 329. II. 793. V. 95.
Sterculieae Schott et Endl. I. 334. II. 795. V. 97.
Stereoderma Blume. *V. 461.
Stereospermum Cham. *VI. 514.
Stereoxylum ciliatum Poir. V. 734. no. 4.
Sterigma DC. *I. 183. II. 762.
— acanthocarpum Fisch. et Mey. II. 762. no. 1.
— brachypetalum Boiss. II. 762. no. 2.
— contortuplicatum Boiss. II. 762. no. 3.
— *helichrysifolium* DC. II. 762. no. 1.
— longistylum Boiss. II. 763. no. 4.
Steriphoma Spr. *I. 201.*)
Steudelia capillaris Eckl. et Zeyh. II. 250. no. 3.

*) Nec Steriphonia.

Steudelia diffusa Eckl. et Zeyh. II. 250. no. 2.
— *galioides* Prsl. II. 250. no. 5. *a.*
— *sylvatica* Eckl. et Zeyh. II. 250. no. 1.
Stevenia Fisch. et Adans. *I. 134.
— *cheiranthoides* DC. I. 132. no. 18.
Stevensia Poit. *II. 510.
Stevia Cav. II. 546. VI. 107.
— *callosa* Nutt. II. 949. no. 2.
— catharctica Poepp. et Endl. VI. 107. no. 2.
— collina Gardn. VI. 704. no. 2.
— compacta Bth. VI. 107. no. 4.
— conferta DC. *II. 547. no. 13.
α. capitata }
β. corymbosa } Schlchtd.
γ. ramosa }
— cordifolia Bth. II. 546. no. 1.
— crenata Bth. VI. 107. no. 3.
— dissoluta Schlchtd. II. 547. no. 11.
— Ehrenbergiana Schlchtd. II. 545. no. 15.
— elliptica Hook. et Arn. II. 548. no. 17.
— erecta Lam. II. 548. †
— glandulifera Schlchtd. II. 547. no. 8.
— glandulosa Hook. et Arn. II. 547. no. 12.
— hyssopifolia Cav. II. 548. †
— imbricata Gardn. VI. 704. no. 3.
— ivaefolia Willd. II. 548. †
— lanceolata Lag. II. 548. †
— lanceolata Wlprs. II. 546. no. 4.
— latifolia Bth. II. 546. no. 2.
— leucantha Schlchtd. II. 547. no. 10.
— linearifolia Wlprs. II. 546. no. 5.
— nitida Wlprs. II. 546. no. 6.
— Organensis Gardn. VI. 107. no. 1.
— origanifolia Wlprs. II. 546. no. 7.
— polycephala Bertol. II. 547. no. 9.
— purpurea Lag. II. 548. †
— pyrolaefolia Schlchtd. II. 547. no. 14.
— Reglensis Bth. II. 548. no. 16.
— resinosa Gardn. VI. 704. no. 1.
— scabrella Bth. II. 546. no. 3.
— serrata Cav. II. 548. †
— suaveolens Lag. II. 548. †
— subhirsuta Lag. II. 548. †
— *trachelioides* Hook. II. 547. no. 8.
— verticillata Schlchtd. II. 548. no. 18.
Stewartia Cav. I. 374.
Stibas Commers. VI. 371. no. 1.
Stictogeum Ser. II. 48. V. 656.
Stictophyllum Edgeworth. °VI. 308.
— glabrum Edgeworth. VI. 308. no. 1.
Stifftia Mikan. II. 679.
Sifftia Mikan. *VI. 318.
Stigmanthus Lour. *II. 489.
Stigmaphyllon Adr. Juss. °V. 202.
— acuminatum Adr. Juss. V. 220. no. 48.
— adenodon Adr. Juss. V. 206. no. 8.
Stigmaphyllon affine Adr. Juss. V. 210. no. 19.
— alternifolium Adr. Juss. V. 213. no. 28.
— angulosum Adr. Juss. V. 206. no. 12.
— angustilobum Adr. Juss. V. 208. no. 16.
— anomalum Adr. Juss. V. 208. no. 15.
— aristatum Lindl. V. 204. no. 4.
— auriculatum Adr. Juss. V. 205. no. 5.
— cardiophyllum Adr. Juss. V. 216. no. 36.
— ciliatum Adr. Juss. V. 205. no. 7.
— convolvulifolium Adr. Juss. V. 216. no. 37.
— diversifolium Adr. Juss. V. 219. no. 46.
— ellipticum Adr. Juss. V. 217. no. 41.
— emarginatum Adr. Juss. V. 220. no. 49.
— Finlayanum Adr. Juss. V. 217. no. 38.
— fulgens Adr. Juss. V. 214. no. 30.
— Gaudichaudianum Adr. Juss. V. 204. no. 3.
— Gayanum Adr. Juss. V. 209. no. 17.
— hastatum Griseb. V. 210. no. 20.
— Humboldtianum Adr. Juss. V. 211. no. 22.
— hypoleucum Miquel. V. 213. no. 27.
— irregulare Adr. Juss. V. 211. no. 21.
— jatrophaefolium Adr. Juss. V. 203. no. 2.
— lacunosum Adr. Juss. V. 214. no. 31.
— Lalandianum Adr. Juss. V. 219. no. 47.
— Lindenianum Adr. Juss. V. 207. no. 14.
— littorale Adr. Juss. V. 212. no. 26.
— macropodum Adr. Juss. V. 214. no. 29.
— Martianum Adr. Juss. V. 215. no. 32.
— megacarpon Griseb. V. 211. no. 24.
— mucronatum Adr. Juss. V. 218. no. 42.
— palmatum Adr. Juss. V. 206. no. 11.
— *Paralias* Adr. Juss. V. 201. no. 1
— periplocaefolium Adr. Juss. V. 219. no. 45.
β. subovatum.
— puberulum Griseb. V. 215. no. 34.
— puberum Adr. Juss. V. 217. no. 40.
— repandum Griseb. V. 205. no. 6.
— reticulatum Adr. Juss. V. 218. no. 43.
— Richardianum Adr. Juss. V. 215. no. 33.
— rotundifolium Adr. Juss. V. 216. no. 35.
— sagittatum Adr. Juss. V. 206. no. 9.
— Sagraeanum Adr. Juss. V. 218. no. 44.
— Salzmanni Adr. Juss. V. 209. no. 18.
— sinuatum Adr. Juss. V. 206. no. 10.
— strigosum Adr. Juss. V. 211. no. 23.
— ternatum Adr. Juss. V. 217. no. 39.
— tomentosum Adr. Juss. V. 212. no. 25.
— urenaefolium Adr. Juss. V. 207. no. 13.
— vitifolium Adr. Juss. V. 203. no. 1.
Stigmatococca Willd. III. 125. °III. 956.
— solanacea Willd. *III. 125. no. 1.
Stigmatotheca C. H. Schultz. °VI. 198.
— lacera C. H. Schultz. VI. 199. no. 2.
— pinnatifida C. H. Schultz. VI. 199. no. 1.
Stilbe Bergius. IV. 171.
— albiflora E. Mey. IV. 172. no. 2.

Stilbe cernua Thnbrg. IV. 173. no. 1.
— ericoides Lam. IV. 171. no. 1. (c. var. β. ibid.)
— *ericoides* Lam. IV. 172. no. 2.
— myrtifolia Lam. IV. 173. no. 4.
— phylicoides Lichtenstein. *IV. 173.
— pinastra Linn. IV. 172. no. 3.
— *serrulata* Hochst. IV. 173. no. 1.
— *vestita* Bergius. IV. 173. no. 3.
— *virgata* Lam. IV. 171. no. 1. (et diagn. ibid. in adn.)
STILBINEAE Kth. IV. 171.
Stilpnogyne DC. *II. 650.
Stilpnopappus Mart. *II. 541. VI. 98.
— dentatus Gardn. VI. 98. no. 3.
— procumbens Gardn. VI. 98. no. 2.
— suffruticosus Gardn. VI. 98. no. 1.
Stilpnophytum Lssng. *II. 639.
Stipellares (Mimosa.) Bth. I. 880.
Stipulaceae (Crotalaria) Bth. V. 449.
Stipularia Palis. *II. 525.
Stipulicida L. C. Rich. *I. 263.
Stiza erioloba E. Mey. I. 607. no. 12.
— *psiloloba* E. Mey. I. 607. no. 12.
Stizolobium P. Br. I. 767.
— *bulbosum* Spr. I. 781. no. 1.
— *giganteum* Spr. I. 767. no. 4.
— *pruriens* Spr.? I. 767. no. 7.
— *scarabaeoides* Spr. I. 783. no. 1.
— *urens* Schum. et Thonn. I. 768. no. 9.
Stizolophus DC. II. 671. no. 5.
Stobaea Thnbrg. *II. 666. VI. 279.
— adenocarpa DC. *VI. 279. no. 1.
β. incana C. H. Schultz.
— echinopoda DC. *VI. 279. no. 3.
— *Kraussii* C. H. Schultz. VI. 278. no. 2.
— rubricaulis DC. VI. 279. no. 2.
Stoebe Lssng. *II. 648. VI. 249.
— leiocarpa C. H. Schultz. VI. 249. no. 1.
Stockesia Hérit. *II. 541.
Stoechadina DC. VI. 240.
Stoechas Bth. III. 572.
— *dentata* Mill. III. 573. no. 4.
— *officinarum* Mill. III. 573. no. 1.
— *pedunculata* Mill. III. 573. no. 2.
— *purpurea* Tourn. III. 573. no. 1.
— *viridis* Raj. III. 573. no. 3.
Stomandra DC. VI. 498. no. 2.
Stommarhena DC. *II. 731. *VI. 424.
— *serratifolia* DC. VI. 425. no. 15. VI. 741. no. 15.
— *xerophylla* DC. VI. 425. no. 13.
Stomotechium Lehmann. *VI. 558.
Strabonia DC. *II. 601.
Strabonia DC. II. 954. no. 1. Obs.
— *gnaphalodes* DC. VI. 144. no. 2.
Stramonia Besl. III. 17. no. 12.
— *Aegyptiaca foetida etc.* Hort. Lugd. Bat. III. 17. no. 13. γ.
— *Curassavica humilior Hyoscyami folio* Herm. III. 15. no. 4.
— *foetida Malabarica, semine pallido etc.* Hort. Lugd. Bot. III. 17. no. 13. *a.*
— *Indica prima seu Datura alba* Rmph. III. 17. no. 12.
Stramonium Bernhardi. III. 15.
— *Aegyptiacum flore pleno Ponae* Moris. III. 17. no. 13. γ.
— *Americanum minus Alkenengi folio* Tournef. III. 15. no. 4.
— *arboreum* Mnch. III. 15. no. 2.
— *fastuosum* Mnch. III. 17. no. 13. β.
— *fastuosum fl. albo* Mnch. III. 17. no. 12.
— *ferox* Tournef. III. 16. no. 6.
— *ferox, pomo crassioribus aculeis robustioribus* Herm. III. 16. no. 6.
— *foetidum* Scop. III. 16. no. 7.
— *foliis angulosis, fructu erecto muricato, etc.* Hall. III. 16. no. 7.
— *fructu spinoso oblongo, flore albo* Tourn. III. 16. no. 7.
— *fructu spinoso oblongo, flore purpureo* Tournef. III. 16. no. 10.
— *fructu spinoso rotundo* Tournef. III. 17. no. 13. γ.
— *laeve* Mnch. III. 16. no. 5.
— *longioribus aculeis* Barrel. III. 16. no. 6.
— *majus purpureum* Raj. III. 16. no. 10.
— *Malabricum fructu glabro etc.* Tournef. III. 17. no. 13. *a.*
— *spinosum* Lam. III. 16. no. 7.
— *Tatula* Mnch. III. 16. no. 10.
— *vulgare* Mnch. III. 16. no. 7.
— *vulgatum* Grtnr. III. 16. no. 7.
Stranvaesia Lindl. II. 59.
— glaucescens Lindl. II. 59. no. 1.
Straussia DC. II. 477.
Stravadium DC. II. 192. V. 756.
Stravadium Juss. II. 192.
— *album* DC. II. 192. no. 2.
— *album* Pers. II. 192. no. 1.
— *coccineum* DC. II. 192. no. 1.
— *rubrum?* DC. II. 192. no. 2.
— *rubrum* Pers. II. 192. no. 1.
Streblocarpus Arn. I. 197.
— angustifolius Endl. I. 197. no. 1.
— oblongifolius Endl. *I. 197. no. 2. (c. varr. *a.* β. γ. ibid.)
— ovalifolius Endl. I. 197. no. 4.
— scaber Endl. I. 197. no. 3.
Streblorhiza speciosa Endl. I. 684. no. 2.
Strempelia A. Rich. *II. 478.

Streptanthus Nutt. I. 128.
— angustifolius Nutt. I. 128. no. 4.
— arcuatus Nutt. I. 128. no. 6. (III. Emend. p. 1.)
— cordatus Nutt. I. 129. no. 12.
— flavescens Hook. I. 129. no. 9.
— glandulosus Hook. I. 129. no. 8.
— heterophyllus Nutt. I. 129. no. 11.
— hyacinthoides Hook. I. 129. no. 13.
— longifolius Bth. I. 129. no. 7.
— maculatus Nutt. I. 128. no. 2.
— obtusifolius Hook. I. 128. no. 1.
— repandus Nutt. I. 129. no. 10.
— sagittatus Nutt. I. 128. no. 3.
— virgatus Mutt. I. 128. no. 5.
Streptium asperum Roxb. IV. 35. no. 5.
Streptocarpus Lindl. *VI. 522.
Streptocaulon Wght. et Arn. *VI. 480.
Streptopetalum secretum Hochstett. V. 782. no. 1.
Streptopodium Bth. III. 902.
Striatae Bth. (Inga) V. 636.
Striga Lour. III. 299. °III. 966. *VI. 648.
— aspera Bth. III. 299. no. 4.
— coccinea Bth. III. 300. no. 12.
— curviflora Bth. III. 299. no. 5.
— densiflora Bth. III. 300. no. 7.
— elegans Bth. III. 300. no. 9.
— euphrasioides Bth. III. 301. no. 14.
— Forbesii Bth. III. 301. no. 16.
β. grandiflora Bth.
— glabrata Bth. III. 300. no. 13.
— hermontica Bth. III. 301. no. 1.
— humifusa Bth. III. 299. no. 2.
— lutea Lour. III. 300. no. 10.
— Masuria Bth. III. 301. no. 15.
— multiflora Bth. III. 300. no. 6.
— orobanchoides Bth. III. 299. no. 1.
— parviflora Bth. III. 299. no. 3.
— phoenicea Bth. III. 300. no. 11.
— Thunbergii Bth. III. 300. no. 8.
β. grandiflora.
Strobocalyx DC. II. 539. no. 8.
Stroemia trifoliata Rxb. I. 196. no. 1.
Stroganowia Karel. et Kiril. II. 763. V. 50.
— brachyota Karel. et Kiril. V. 50. no. 2.
— intermedia Karel. et Kiril. II. 763. no. 1. *V. 50. no. 3.
— sagittata Karel. et Kiril. V. 50. no. 1.
Strombocarpa Bth. (Prosopis) I. 862. V. 582.
Stromnothamnus Schauer. II. 931.
Strongylodon Vogel. I. 769.
— ruber Vogel. *I. 769. no. 1.
Strongyloma DC. *VI. 321.
Strongylosperma Lssng. *II. 638. *VI. 209.
Strongylosperma Lssng. II. 992.
Strongylospermum australe Lssng. II. 992. no. 1.
— *reptans* Lssng. II. 992. no. 2.
Strophades Boiss. I. 171.
— lanceolata Boiss. I. 171. no. 1.
— linearis Boiss. I. 171. no. 2.
Strophanthus DC. *VI. 472.
Strophipomaea Choisy. VI. 532.
Strophocaulos Choisy. VI. 540.
Strophopappus DC. *II. 541.
Strophostyles Ell. I. 773.
— *peduncularis* Ell. I. 774. no. 52.
Strumpfia Jcq. *II. 489.
Strutanthus Mart. II. 440. V. 939. no. 18.
— *vulgaris* Mart. II. 445. no. 51.
Struthium DC. I. 271. no. 4. 5. II. 775.
Strychneae Endl. VI. 497.
Strychnodendros Bauh. III. 46. no. 64.
Στρύχνον ὑπνωτικόν Dioscor. III. 23. no. 1. β.
Στρύχνος ἁλικάκαβος Dioscor. III. 23. no. 5.
Strychnos Linn. VI. 497.
— Gomesiana Casaretto. VI. 497. no. 1.
— *oblongifolia* Hochstett. VI. 467. no. 1.
Stryphnodendron Mart. I. 860. °V. 579.
— Barbatimam Mart. I. 860. no. 1.
— discolor Bth. I. 861. no. 4.
— floribundum Bth. I. 861. no. 5.
— microstachyum Poepp. et Endl. V. 580. no. 2.
— paniculatum Poepp. et Endl. V. 579. no. 1.
— polyphyllum Mart. I. 860. no. 2.
— rotundifolium Mart. I. 860. no. 3.
Stuartia Catesb. I. 374. II. 802.
— monadelpha Siebld. et Zucc. I. 374. no. 1.
— pentagyna L'Hérit. I. 374. † *II. 802. no. 1.
Stubendorfia Schrenk. °V. 50.
— orientalis Schrenk. V. 50. no. 1.
Stylesia Nutt. II. 627.
— ambrosioides Nutt. II. 627. no. 1.
— puberula Nutt. II. 627. no. 2.
STYLIDIEAE Juss. II. 704. VI. 367.
Stylidium Swrtz. II. 704. VI. 367.
— aciculare Sonder. VI. 368. no. 4.
— affine Sonder. VI. 367. no. 1.
β. minus.
— *androsaceum* DC. VI. 369. no. 25.
— androsaceum Lindl. II. 705. no. 15.
— *androsaceum* Lindl. VI. 370. no. 29.
— bellidifolium Sonder. VI. 368. no. 7.
— bicolor Lindl. II. 704. no. 6.
— brachyphyllum Sonder. VI. 369. no. 24.
— Brunonianum Bth. II. 705. †
— canaliculatum Lindl. II. 705. no. 14.
— caulescens Lindl. II. 705. no. 12.

Stylidium cicatricosum Lindl. VI. 370. no. 28.
— ciliatum Lindl. II. 704. no. 7.
— compressum Lindl. II. 705. no. 9.
— *corymbosum* Bth. VI. 369. no. 15.
— diuroides Lindl. II. 705. no. 10.
— divaricatum Sonder. VI. 369. no. 23.
— Drummondii Grah. II. 705. no. 16.
— emarginatum Sonder. VI. 369. no. 18.
— fruticosum R. Br. II. 705. †
— guttatum R. Br. *VI. 369. no. 25.
— hispidum Lindl. II. 705. no. 8.
— laricifolium Lindl. II. 704. no. 3.
— Lehmannianum Sonder. VI. 368. no. 6.
β. gracile.
— leptocalyx Sonder. VI. 367. no. 3.
— leptostachyum Lindl. II. 704. no. 1.
— Lindleyanum Sonder. VI. 370. no. 29.
β. subracemosum.
— lineatum Sonder. VI. 368. no. 8.
— marginatum Sonder. VI. 368. no. 10.
— mucronifolium Sonder. VI. 369. no. 19.
— nudum Lindl. II. 705. no. 11.
— obtusatum Sonder. VI. 369. no. 17.
— petiolare Sonder. VI. 369. no. 16.
β. pauciflorum.
— pilosum Labill. II. 705. †
— plantagineum Sonder. VI. 367. no. 2.
— pruinosum Sonder. VI. 368. no. 11.
— pubigerum Sonder. VI. 369. no. 20.
— pulchellum Sonder. VI. 369. no. 15.
— pycnostachyum Lindl. II. 705. no. 13.
— *pycnostachyum* Lindl. VI. 369. no. 21.
— radicans Sonder. VI. 368. no. 13.
— rhynchocarpum Sonder. VI. 369. no. 26.
— rigidulum Sonder. VI. 369. no. 27.
— robustum Sonder. VI. 368. no. 9.
— rupestre Sonder. VI. 368. no. 5.
— saxifragoides Lindl. II. 704. no. 4.
— scabridum Lindl. II. 704. no. 2.
— *stipitatum* Bth. VI. 370. no. 1.
— streptocarpum Sonder. VI. 369. no. 22.
— striatum Lindl. II. 704. no. 5.
— tenue Sonder. VI. 368. no. 12.
— thyrsiforme DC. *VI. 369. no. 21.
— uniflorum Sonder. VI. 368. no. 14.
Stylipus Rafin. II. 47.
— *vernus* Rafin. II. 47. no. 5.
Stylisma Rafin. *VI. 543.
Stylobasium Dsf. *II. 7. V. 647.
— lineare N. ab E. V. 647. no. 1.
Stylocarpum incanum Noulet. I. 186. no. 5.
Stylocline Nutt. II. 599. *II. 955. no. 3. VI. 139.
— gnaphalioides Nutt. *II. 599. no. 1. VI. 139. no. 1.
Stylocoryne Cav. II. 516. II. 943.
Stylocoryne DC. II. 516.
— lateriflora Spanoghe. II. 516. no. 1.
— *Malabarica* DC. II. 518. no. 1.
— mollissima Wlprs. II. 517. no. 5.
— monosperma Wght. et Arn. II. 516. no. 3.
— *Pandaki* DC. II. 518. no. 1.
— pepericarpa Bth. II. 943. no. 1.
— pubiflora Dcne. II. 516. no. 2.
— Webera A. Rich. II. 517. no. 4.
Stylogyne Alph. DC. VI. 451.
— Martiana Alph. DC. *VI. 451. no. 1.
Stylolepis DC. VI. 236.
Styloncerus Labill. *II. 643. VI. 228.
— cylindraceus Steetz. VI. 228. no. 1.
— humifusus Spr. VI. 228. no. 3.
— suberectus Steetz. VI. 228. no. 2.
Stylonema DC. I. 173.
Stylopappus Nutt. *II. 696.
Stylopappus Nutt. II. 695.
— *elatus* Nutt. II. 695. no. 4.
— *grandiflorus* Nutt. II. 696. no. 5.
— *laciniatus* Nutt. II. 695. no. 2.
Stylophorum Nutt. *I. 109.
Stylophorum Nutt. I. 110.
— *diphyllum* Nutt. I. 110. no. 6.
— *Ohioënse* Spr. I. 110. no. 6.
— *petiolatum* Nutt. I. 110. no. 6.
Stylosanthes Linn. I. 727. II. 889. V. 521.
— angustifolia Vogel. I. 727. no. 2.
— Bojeri Vogel. I. 727. no. 5.
— bracteolata Vogel. I. 727. no. 8.
— capitata Vogel. I. 727. no. 7.
— Guineensis G. Don. II. 889. no. 2.
— Guineensis Schum. et Thonn. I. 727. no. 1.
— leiocarpa Vogel. I. 727. no. 3.
— Montevidensis Vogel. I. 727. no. 4.
— *rigida* Spr. I. 727. no. 6.
— scabra Vogel. I. 727. no. 6.
— Surinamensis Miquel. V. 521. no. 1.
— tenuifolia G. Don. II. 889. no. 1.
Stylothelae Pfeiff. (Mamillaria) II. 292.
Styphelia Sm. II. 731. VI. 423.
— elegans Sonder. VI. 423. no. 1.
β. lanceolata.
— tenuifolia Lindl. II. 731. no. 1.
— *tenuifolia* Lindl. VI. 423. no. 1.
— tubiflora Sm. VI. 423. †
Styphelieae Bartl. II. 731. VI. 423.
Styphnolobium Schott. I. 807.
— affine Wlprs. I. 807. no. 2.
— Japonicum Schott. *I. 807. no. 1.
Styphonia Nutt. I. 555. V. 414.
— integrifolia Nutt. I. 555. no. 1. V. 414. no. 1.
— serrata Nutt. V. 414. no. 2. (III. Emend. p. 3.)

Styposanthes DC.(?) I. 727. no. 5.
STYRACEAE Alph. DC. VI. 458.
Styraceae DC. VI. 459.
Styrax Tournef. VI. 459.
— ellipticus Jungh. et Vriese. VI. 459. no. 2.
— subpaniculatus Jungh. et Vriese. VI. 459. no. 1.
Subcapitatae DC. (Cordia) VI. 554. no. 4.
Subimbricata DC. (Eupatorium) VI. 709.
Subularia Linn. I. 190.
— aquatica Linn. *I. 190. no. 1.
Subularieae DC. I. 190.
Succisa Coult. II. 536. VI. 86. no. 1.
Succowia Medic. *I. 188.
— *fimbriata* Dennstaedt. V. 294. no. 1.
Suchtelenia Karelin. *VI. 563.
Suffrenia Bellard. *II. 101.
Sulipa Blanco. II. 510. VI. 71.
— pseudopsidium Blanco. *II. 510. no. 1. VI. 71. no. 1.
Sullivantia Ohionis Gray. II. 367. no. 40.
Sumac DC. I. 553. no. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 32.
Summibracteatae Bth. (Acacia) I. 908.
Suprago DC. II. 549.
Suriana Plum. *I. 562.
Surianeae Endl. I. 562.
Sutera Rth. III. 271. °III. 963. *VI. 642.
— dissecta Wlprs. III. 271. no. 3.
— glandulosa Rth. III. 271. no. 1.
— multifida Wlprs. III. 271. no. 2.
Suteria DC. II. 470. VI. 36.
— Hookeriana Gardn. VI. 36. no. 1.
— macrantha Gardn. VI. 37. no. 3.
— macrocalyx Mart. II. 470. no. 1.
— parviflora Gardn. VI. 37. no. 2.
Sutherlandia R. Br. I. 683.
—(?) Darumbium Bertero. I. 684. no. 2.
— frutescens R. Br. *I. 683. no. 1.
γ. angustifolia, δ. Garipensis, β. incana } E. Mey. I. 684.
ε. tomentosa Wlprs. I. 684.
— *incana* E. Mey. I. 684. no. 1. β.
— *microphylla* Burch. I. 684. no. 1. γ.
— *tomentosa* Eckl. et Zeyh. I. 684. no. 1. ε.
Suttonia A. Rich. °VI. 449.
— australis A. Rich. VI. 450. no. 1.
— divaricata Hook. fil. VI. 450. no. 2.
— saligna Hook. fil. *VI. 450. no. 4.
— tenuifolia Hook. fil. VI. 450. no. 3.
Svitramia Cham. II. 132.
— canescens Cham. II. 132. no. 1.
Swainsona Salisb. *I. 682. II. 860.
— albiflora G. Don. II. 860. no. 1.
— *galegifolia β. albiflora* Lindl. II. 860. no. 1.
Swammerdamia DC. *II. 646. VI. 237.
— glomerata Raoul. VI. 237. no. 1.
Swanalloia aurantiaca Hortor. III. 934.
Swartzia Willd. I. 841. V. 563.
— acuminata Willd. I. 842. no. 9.
— acutifolia Vogel. I. 842. no. 10.
— alterna Bth. I. 843. no. 20.
— auriculata Poepp. et Endl. V. 563. no. 2.
— bifida Steudel. V. 563. no. 3.
— Brasiliensis Vogel. I. 843. no. 22.
— calophylla Poepp. et Endl. V. 563. no. 1.
— coriacea Dsvx. I. 841. no. 1.
— corrugata Bth. I. 842. no. 17.
— dicarpa Moricand. V. 563. no. 4.
— *dipetala* Willd. I. 842. no. 8.
— discolor Poepp. et Endl. V. 564. no. 6.
— glabra Vogel. I. 841. no. 3.
— *grandiflora* Gmel. III. 18. no. 1.
— grandifolia Bngrd. I. 842. no. 13.
— latifolia Bth. I. 842. no. 14.
— laurifolia Bth. I. 842. no. 16.
— laxiflora Bngrd. I. 842. no. 15.
— leptopetala Bth. I. 842. no. 18.
— lomatopus Mart. I. 843. no. 25.
— macrophylla Willd. I. 842. no. 7.
— Madagascariensis Dsvx. I. 841. no. 6.
— marginata Bth. I. 843. no. 19.
— microstylis Bth. I. 841. no. 4.
— mollis Bth. I. 843. no. 21.
— montana Vogel. I. 842. no. 11.
— multijuga Vogel. I. 842. no. 12.
— pilulifera Bth. I. 841. no. 5.
— polyanthera Steudel. V. 564. no. 7.
— pulchra Vogel. I. 843. no. 23.
— recurva Poepp. et Endl. V. 564. no. 5.
— robiniaefolia Vogel. I. 843. no. 24.
— sericea Vogel. I. 841. no. 2.
Swartzieae Bth. I. 841. VI. 562.
Sweetia DC. I. 761.
Swertia Linn. VI. 509.
— tetragona Edgwrth. VI. 509. no. 1.
— tetrandra Hochstett. VI. 509. no. 2.
Swertieae Griseb. VI. 504.
Swietenia Linn. I. 436.
— *Chickrassa* Rxb. I. 436. no. 1.
— *febrifuga* Rxb. I. 436. no. 1.
— Mahagoni Linn. *I. 436. no. 1.
— *rubra* Rottl. I. 436. no. 1.
Swietenieae Adr. Juss. I. 436.
Sycioideae Endl. II. 204.
Sycios Linn. II. 204.
— ...... Schlchtd. et Cham. II. 204. no. 6.
— *angulatus* Hook. II. 204. no. 1.
— *Baderoa* Hook. et Arn. II. 204. no. 3.
— bryoniaefolius Moris. II. 204. no. 3.
— hederaefolius Dcne. II. 204. no. 5.

Sycios lobatus Michx. II. 203. no. 1.
— montanus Poepp. et Endl. II. 204. no. 2.
— Oreganus Torr. et Gr. II. 204. no. 1.
— pachycarpus Hook. II. 204. no. 4.
Sykesia Arn. * VI. 499.
Sylitra E. Mey. I. 683.
— biflora E. Mey. *I. 683. no. 1.
Syllysium Meyen et Schauer. ° V. 751.
— buxifolium Meyen et Schauer. V. 751. no. 1.
Symbiomeria Nutt. II. 542. VI. 99.
— Baldwiniana Nutt. *II. 542. no. 1. VI. 99. no. 1.
Symbolanthus G. Don. * VI. 504.
Symmetria Blume. * II. 114.
Symphanthi graciliflori DC. (Loranthus) II. 440.
Symphorema Rxb. IV. 116. VI. 692.
— involucratum Rxb. IV. 116. no. 1. * VI. 692. no. 1.
— *paniculatum* Heyne. IV. 118.
— polyandrum Wght. * VI. 692.
Symphoremeae Meisn. IV. 116. VI. 692.
Symphoricarpos Dill. II. 446.
— ciliatus Nutt. II. 447. no. 3.
— imberbis Tausch. II. 447. no. 4.
— mollis Nutt. II. 447. no. 2.
— montanus H. B. Kth. II. 447. †
— occidentalis R. Br. II. 446. no. 1.
Symphyandra Alph. DC. * II. 711. * VI. 387.
Symphyllium ......? Griff. III. 284. no. 1.
Symphyoloma C. A. Mey. II. 414. V. 889.
— graveolens C. A. Mey. * II. 414. no. 1. V. 889. no. 1.
Symphyomera Hook. fil. ° V. 724.
— filicula Hook. fil. VI. 724. no. 1.
Symphyomyrtus Schauer. ° V. 743.
— Lehmanni Schauer. * V. 743. no. 1.
Symphyopoda DC. (Bauhinia) I. 850.
Symphysia Prsl. VI. 740.
— Martinicensis Prsl. * VI. 740. no. 1.
Symphytum Tournef. VI. 558.
— alatum Tausch. VI. 558. no. 2.
— *Bohemicum* Schmidt. VI. 558. no. 3. *a.*
— borragineum Tausch. VI. 558. no. 1.
— Caucasicum M. Bieb. * VI. 558. no. 4.
— officinale Linn. *a.* ochroleucum DC. VI. 558. no. 3.
Sympieza Lichtenst. * II. 729.
Symploceae Alph. DC. VI. 458.
Symplocos Jcq. VI. 458.
— ......? Junghun et Vriese. VI. 459. no. 5.
— coccinea H. B. Kth. * VI. 742.
— parvifolia Bth. VI. 459. no. 4.
— Ribes Jungh. et Vriese. VI. 458. no. 1.
Symplocos Verhuelli Jungh. et Vriese. VI. 458. no. 3.
δ. diffusa VI. 459. no. 3.
β. glabra VI. 458. no. 3.
γ. Javanica VI. 458. no. 3.
α. parvifolia VI. 458. no. 3.
— xanthophylla Jungh. et Vriese. VI. 458. no. 2.
Sympodium C. Koch. II. 394. * V. 852.
— simplex C. Koch. II. 394. no. 1.
Synandra Nutt. III. 801. ° III. 987.
— grandiflora Nutt. III. 801. no. 1.
Syncarpia Ten. II. 160. * II. 923. * V. 741.
— laurifolia Ten. * II. 160. no. 1.
Syncephalantha Bartl. * II. 624. * II. 701.
Syncephalum DC. * II. 650.
Synchodendron Boj. * II. 543.
Syncolostemon E. Mey. III. 522. ° III. 978.
— densiflorus E. Mey. III. 522. no. 3.
— parviflorus E. Mey. III. 522. no. 4. (et var. *β.* ibid.)
— ramulosus E. Mey. III. 522. no. 2.
— rotundifolius E. Mey. III. 522. no. 1.
Syndesmanthus Bth. * II. 729.
Syndesmis Wall. I. 555.
— elegans Wall. * I. 555. no. 1.
Synedrella Gaertn. * II. 622. VI. 171.
— peduncularis Bth. VI. 171. no. 1.
Synelcosciadium Boiss. ° V. 891.
— Carmeli Boiss. * V. 891. no. 1.
Synnema Bth. * VI. 652.
Synochreati DC. (Astragalus) I. 703. II. 867.
Synoum Adr. Juss. I. 429.
— glandulosum Adr. Juss. I. 429. no. 1.
Synstylae DC. (Rosa) II. 11. no. 7.
Synthyrsis Bth. * VI. 647.
Syrenia Andrz. I. 173.
— angustifolia Ehrh. I. 173. †
— cuspidata M. B. I. 173. †
— siliculosa Andrz. * I. 173. no. 1.
Syrenopsis Jaub et Spach. I. 171.
— stylosa Jaub. et Spach. * I. 171. no. 1.
Syringa Linn. VI. 461.
— Josikaea Jcq. fil. * VI. 461. no. 1.
Syringeae Don. VI. 461.
Syrmatium Vogel. * I. 651.
— *glabrum* Vogel. I. 649. no. 16.
— *tomentosum* Vogel. I. 649. no. 10.
Syspone Griseb. II. 845.
— sagittalis Griseb. * II. 845. no. 1.
— *sagittalis* Griseb. V. 490. no. 67.
Syzygium Gaertn. II. 178. II. 933. V. 752.
— alternifolium Wght. II. 179. no. 8.
— androsaemoides Wght. II. 179. no. 18.
— areolatum DC. II. 181. †
— Arnottianum Wght. II. 180. no. 24.

Syzygium balsameum Wall. II. 179. no. 15.
—? buxifolium Hook. II. 180. no. 29.
— calophyllifolium Wght. II. 180. no. 27.
— caryophyllaeum Gaertn. *II. 178. no. 6.
— *caryophyllifolium* DC. II. 179. no. 10.
— cordatum Hochstett. V. 752. no. 1.
— cordifolium Wght. II. 179. no. 9.
— *densiflorum* Wall. II. 180. no. 24.
— fruticosum Rxb. II. 179. no. 11.
— grande Wght. II. 180. no. 25.
— Guineense DC. II. 181. †
— inophyllum DC. *II. 180. no. 22.
— Jambolanum DC. *II. 179. no. 10.
— *lanceolatum* Wght. et Arn. II. 181. no. 5.
— myrtifolium Rxb. II. 178. no. 3.
— Neesianum Arn. II. 178. no. 2.
— nervosum DC. *II. 179. no. 16.
— nitidum Bth. II. 933. no. 1.
— odoratum DC. *II. 179. no. 13.
Syzygium oleinum Wall. *II. 178. no. 4.
— polyanthum Wght. II. 180. no. 20.
— reticulatum Wght. II. 179. no. 7.
— revolutum Wght. II. 180. no. 23.
— rotundifolium Arn. II. 180. no. 26.
— rubens Rxb. II. 180. no. 21.
— rubicundum Wght. et Arn. II. 178. no. 1.
— salicifolium Grah. II. 179. no. 12.
— sylvestre Moon. II. 178. no. 5.
— tetragonum Wall. II. 179. no. 17.
— Timorianum Dcne. II. 180. no. 28.
— toddalioides Wght. II. 179. no. 14.
— venosum DC. II. 181. †
— Wallichii Wght. II. 180. no. 19.
— *Wightianum* Wall. II. 181. no. 4.
— *Zeylanicum* DC. II. 181. no. 6.
Szovitsia Fisch. et Mey. II. 420. V. 901.
— callicarpa Fisch. et Mey. II. 420. no. 1. V. 901. no. 1.

T

Tabacum G. Don. III. 7.
Tabacus viridis Mnch. III. 9. no. 8.
Tabejuga Gomez. VI. 514.
— cordata Bth. VI. 514. no. 1.
— *latifolia* DC. VI. 514. no. 1.
Tabernaemontana Plum. VI. 469.
— ...... Martens et Galeotti. VI. 469. no. 1.
— floribunda Blume. *VI. 469. no. 2.
— sphaerocarpa Blume. *VI. 469. no. 3.
Tabernaemontaneae Alph. DC. VI. 468.
Tacazzea Dcne. *VI. 479.
Tachia Aubl. *VI. 504.
— *punctata* Plée. V. 555. no. 12.
Tachiadenus Griseb. *VI. 504.
Tachigalia Hull. I. 845. V. 569.
— aurea Tulasne. V. 570. no. 8.
— eriocalyx Tulasne. V. 569. no. 4.
— glauca Tulasne. V. 569. no. 5.
— paniculata Aubl. V. 569. no. 1.
— *paniculata* Pers. V. 569. no. 1.
— Poeppigiana Tulasne. V. 569. no. 7.
— polyphylla Poepp. et Endl. V. 570. no. 9.
— pubiflora Bth. I. 845. no. 1. *V. 569. no. 3.
—? *purpurea* L. C. Rich. V. 550. no. 2.
— Richardiana Tulasne. V. 569. no. 6.
— sericea Tulasne. V. 569. no. 2.
Tachybota Aubl. I. 206.
— Guianensis Aubl. *I. 206. no. 1.
Tacsonia Juss. II. 221. V. 773.
— candida Poepp. et Endl. II. 222. no. 3.
— cuneata Bth. V. 774. no. 4.
— eriantha Bth. V. 773. no. 2.
— Fockeana Miquel. V. 773. no. 3.
— laevis Bth. V. 773. no. 1.
—? Mansii Mart. II. 222. no. 2.
— mollissima H. B. Kth. V. 774. †
— pinnatistipula Juss. *II. 221. no. 1. V. 774. †
— Quitensis Bth. V. 774. no. 5.
— spinosa Poepp. et Endl. II. 222. no. 4.
— tomentosa Juss. II. 222. no. 1.
Taeniocarpum Choisy. II. 806. no. 9 et 10. 807. no. 11—16.
Taeniocarpum Dsvx. I. 782.
— articulatum Dsvx. *I. 782. no. 1.
Taeniostema Spach. I. 213.
— micranthum Spach. *I. 213. no. 1.
Tageteae DC. II. 623. II. 987. VI. 171.
Tagetes Tournef. II. 624. VI. 173.
— congesta Hook. et Arn. II. 624. no. 1.
— *Fevillei* Bertero. VI. 180. no. 2.
— microglossa Bth. VI. 173. no. 3.

Tagetes silenoides Meyen et Wlprs. VI. 173. no. 1.
— tinctoria Hornschuch. VI. 173. no. 2.
Tagetineae Cass. II. 623. II. 987. VI. 171.
Tala Blanco. III. 437. °III. 973. * VI. 654.
— odorata Blanco. III. 437. no. 1.
Talauma Juss. I. 69. II. 746.
— Candollei Blume. *I. 69. no. 1.
— fragrantissima Hook. I. 69. no. 8.
— macrocarpa Zucc. *II. 746. no. 1.
— Mexicana Don. I. 69. no. 9.
— mutabilis Blume. I. 69. no. 2.
β. acuminata.
γ. longifolia.
δ. splendens.
— ovata St. Hil. I. 69. no. 6.
— pumila Andr. *I. 69. no. 3.
— Roxburghii Don. I. 69. no. 5. (III. Emend. p. 1.)
— Rumphii Blume. I. 69. no. 4.
— Sellowiana St. Hil. I. 69. no. 7.
Taleuser IV. 107. no. 32.
Taligalea campestris Aubl. IV. 124. no. 1.
Talinum Adams. II. 234. II. 934. V. 786.
— Caffrum Eckl. et Zeyh. *II. 234. no. 1.
— ciliatum Lindl. II. 934. no. 1.
— *decumbens* Willd. II. 239. no. 1. V. 788. no. 1.
—? diffusum Colla. II. 234. no. 4.
—? gracile Colla. II. 235. no. 6.
— Linaria Colla. II. 235. no. 5.
—? *Menziesii* Hook. II. 235. no. 1.
— minimum Miers. II. 234. no. 3.
— minus Eckl. et Zeyh. II. 234. no. 2.
— *monandrum* Rz. et Pav. II. 238. no. 1. V. 787. no. 1.
— nanum N. ab E. V. 786. no. 1.
— *teretifolium* Prsh. II. 934. no. 1.
—? trigonum Colla. II. 235. no. 7.
Talisia Aubl. I. 420.
— *Guianensis* DC. I. 420. no. 1.
— mollis Cambess. *I. 420. no. 1.
Tamarindus Linn. I. 845.
— Indica Linn. *I. 845. no. 1.
Tamariscineae Juss. II. 114.
TAMARISCINEAE Meisn. (ex p.) V. 808.
Tamariscus Monomotlamensis Pluk. I. 542. no. 2.
Tamarix Linn. II. 115.
— Africana Poir. II. 115. no. 3.
— amplexicaulis Ehrnbrg. II. 116. no. 10.
— Anglica B. Webb. II. 117. no. 12.
— angustifolia Ldb. II. 117. no. 16.
— *arborea* Sieb. II. 116. no. 8. ϑ.
— *articulata* Vahl. II. 115. no. 7.
Tamarix articulata Wall. II. 115. no. 8. δ.
— *Canariensis* Willd. II. 115. no. 8. ε.
— *Chinensis* Lour. II. 115. no. 8. β.
— cupressiformis Ldb. II. 117. no. 14.
— effusa Ehrnbrg. II. 115. no. 6.
— elongata Ldb. II. 117. no. 13.
— *epacridoides* Sm. II. 115. no. 8. δ.
— *ericoides* Rth. II. 115. no. 1.
— ericoides Rth. *II. 116. no. 9.
— *Gallica* Engl. Bot. II. 117. no. 12.
— Gallica Linn. II. 115. no. 8.
ϑ. arborea Ehrnbrg. II. 116. no. 8.
ε. Canariensis Ehrnbrg. II. 115. no. 8.
β. Chinensis Ehrnbrg. II. 115. no. 8.
η. heterophylla Ehrnbrg. II. 116. no. 8.
δ. Indica Ehrnbrg. II. 115. no. 8.
ι. mannifera Ehrnbrg. II. 116. no. 8.
γ. Narbonensis Ehrnbrg. II. 115. no. 8.
a. effusa.
b. virgata.
ζ. Nilotica Ehrnbrg. II. 116. no. 8.
b. cinerea.
a. glaucescens.
α. subtilis Ehrnbrg. II. 115. no. 8.
— gracilis Willd. II. 115. no. 5.
— *Indica* Willd. II. 115. no. 8. δ.
— juniperina Bnge. II. 117. no. 17.
— laxa Willd. II. 115. no. 2.
α. racemosa } Ehrnbrg.
β. subspicata } Ehrnbrg.
— *mucronata* Sm. II. 115. no. 1.
— orientalis Forsk. *II. 115. no. 7.
— passerinoides Delile. II. 116. no. 11.
α. divaricata } Ehrnbrg.
β. Hammonis } Ehrnbrg.
γ. macrocarpa } Ehrnbrg.
— *pycnocarpa* DC. II. 115. no. 4.
— ramosissima Ldb. II. 117. no. 15.
— *Soongarica* Pall. II. 268. no. 1. V. 808. no. 1.
— tenacissima Hamilt. II. 115. no. 1.
— tetragyna Ehrnbrg. II. 115. no. 4. (c. var. β. ibid.)
— tetrandra Pall. II. 115. no. 1.
Tamonea Aublet. IV. 115.
— *Curassavica* Pers. IV. 115. no. 2.
— *mutica* Pers. IV. 115. no. 3.
— scabra Cham. et Schlchtd. IV. 115. no. 1.
γ. minor.
— spicata Aublet. IV. 115. no. 3.
— verbenacea Swrtz. IV. 115. no. 2.
Tanacetum Linn. II. 642. °VI. 219.
Tanacetum C. H. Schultz. VI. 210. no. 1.
— Achilleae C. H. Schultz. *VI. 222. no. 36.
— achilleaefolium C. H. Schultz. *VI. 221. no. 9.

Tanacetum acutilobum DC. VI. 209. no. 4.
— *albidum* DC. VI. 209. no. 6.
— *album* Thal. VI. 222. no. 35.
— alpinum C. H. Schultz. VI. 223. no. 48.
— atratum C. H. Schultz. VI. 224. no. 49.
— Aucherianum C. H. Schultz. *VI. 222. no. 34.
— Balsamita Linn. VI. 219. no. 1.
— balsamitoides C. H. Schultz. *VI. 219. no. 2.
— bipinnatum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 21.
— Bocconi C. H. Schultz. *VI. 221. no. 27.
— *boreale* Nutt. II. 642. no. 2.
— *camphoratum* Lssng. II. 642. no. 2.
— *Canariense* DC. VI. 211. no. 1.
— capitatum Torr. et Gr. II. 642. no. 3.
— Cappadocicum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 25.
— carneum C. H. Schultz. *VI. 222. no. 39.
— Caucasicum C. H. Schultz. *VI. 223. no. 46.
— chiliophyllum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 11.
— cinerariaefolium C. H. Schultz. *VI. 222. no. 37.
— *cinereum* DC. VI. 209. no. 5.
— corymbosum C. H. Schultz. *VI. 222. no. 35.
— decipiens C. H. Schultz. *VI. 221. no. 13.
— densum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 17.
— *Douglasii* DC. II. 642. no. 2.
— dumosum Boiss. VI. 220. no. 7.
— elongatum C. H. Schultz. *VI. 224. no. 50.
— ferulaceum C. H. Schultz. VI. 225. no. 55.
— *fruticosum* Chr. Schmidt. VI. 211. no. 1.
— *globiferum* DC. VI. 209. no. 2.
— *grandiflorum* Thnbrg. VI. 209. no. 3.
— heterophyllum Boiss. VI. 220. no. 3.
— Huronense Nutt. *II. 642. no. 2. *VI. 220. no. 4.
— Indicum C. H. Schultz. *VI. 225. no. 56.
— *inodorum latifolium etc.* Barrel. VI. 222. no. 35.
— Kochii C. H. Schultz. *VI. 221. no. 15.
— Ledebourii C. H. Schultz. *VI. 220. no. 6.
— leptophyllum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 19.
— *Leucanthemum* Tabern. VI. 222. no. 35.
— macrophyllum C. H. Schultz. *V. 221. no. 30.
—? *matricarioides* Lssng. II. 639. no. 1. II. 642. no. 1.
— Meyerianum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 12.
— minimum C. H. Schultz. *VI 223. no. 44.
— *montanum inodorum etc.* C. Bauh. VI. 222. no. 35.
Tanacetum multicaule C. H. Schultz. *VI. 221. no. 28.
— myriophyllum Willd. *VI. 221. no. 10.
— nivale C. H. Schultz. VI. 223. no. 43.
— niveum C. H. Schultz. *VI. 222. no. 33.
— Nuttallii Torr. et Gr. II. 642. no 4.
— *obtusum* Thnbrg. VI. 209. no. 2.
— oligocephalum *C. H. Schultz. VI. 221. no. 20.
— palmatifidum C. H. Schultz. *VI. 223. no. 45.
— palustre C. H. Schultz. VI. 224. no. 52.
— parthenifolium C. H. Schultz. *VI. 222. no. 32.
— Parthenium C. H. Schultz. *VI. 222. no. 31.
  β. breveradiatum.
  γ. discoideum.
  δ. floribus plenis.
  ε. foliis crispis.
  α. longeradiatum.
— *pauciflorum* DC. II. 642. no. 1. VI. 194. no. 4.
— pinnatifidum C. H. Schultz. *VI. 222. no. 38.
— pinnatum Boiss. VI. 220. no. 8.
— polycephalum C. H. Schultz. VI. 221. no. 16.
— ptarmicaeflorum C. H. Schultz. VI. 224. no. 54.
— pulchellum C. H. Schultz. *VI. 223. no. 47.
— pulchrum C. H. Schultz. *VI. 224. no. 53.
— pulverulentum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 24.
— radicans C. H. Schultz. *VI. 221. no. 23.
— roseum C. H. Schultz. *VI. 222. no. 40.
— saxatile C. H. Schultz. *VI. 221. no. 14.
— sericeum C. H. Schultz. *VI. 222. no. 41.
— silaifolium C. H. Schultz. *VI. 224. no. 51.
— Sinaicum Delile. *VI. 220. no. 5.
— Sinense C. H. Schultz. *VI. 225. no. 57.
— *suaveolens* Hook. II. 639. no. 1. VI. 194. no. 4.
— suaveolens Hook *II. 642. no. 1.
— sulphureum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 26.
— Tauricum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 18.
— tenuifolium Jcq. II. 642. †
— Tournefortii C. H. Schultz. *VI. 223. no. 42.
— trifurcatum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 29.
— uniflorum C. H. Schultz. *VI. 221. no. 22.
Tanaceum Nutt. II. 641.
Tanaecieae A. P. DC. VI. 516.
Tanaecium Swect. *VI. 517.
Tanghinia Pet. Thouars. VI. 468.
— *Manghas* Bojer. VI. 468. no. 2.

Tanghinia venenifera Poir. *VI. 468. no. 1.
Tanycrania Endl. V. 932.
Tapeinotes DC. II. 716. *VI. 406.
— villosa Gardn. II. 716. no. 1.
Tapina Mart. II. 716.
Tapinanthus Blume. II. 442.
Tapiria Juss. *I. 560.
Tapura Aubl. I. 549. II. 829.
— Amazonica Poepp. et Endl. II. 829. no. 1.
— ciliata Gardn. I. 549. no. 1.
Taquerinia Cass. *II. 951. no. 3.
Taraxacum Hall. II. 694. VI. 356.
— *bicolor* DC. VI. 356. no. 4.
— dens leonis Dsf. *VI. 356. no. 1.
γ. eriocaulon C. Koch.
β. laevigatum Hook. fil.
— dissectum Ldb. VI. 356. no. 3.
— *laevigatum* DC. VI. 356. no. 1. β.
— leucanthum Ldb. VI. 356. no. 4.
β. sinuatum.
α. subdentatum.
— pyrrhopappum Boiss. et Reut. II. 694. no. 1.
— serotinum var. eriocaulon C. Koch. VI. 356. no. 2.
Taraxia Nutt. II. 85.
— *breviflora* Nutt. II. 85. no. 65.
— *longiflora* Nutt. II. 86. no. 66.
Tarchonantheae Lssng. II. 599. II. 972. VI. 138.
Tarchonantheae C. H. Schultz. II. 952.
Tarchonanthus Linn. *II. 599. *II. 952.
Tarenna Zeylanica Gaertn. II. 517. no. 4.
Tarrietia Blume. I. 423.
— Javanica Blume. *I. 423. no. 1.
Tasconioïdes DC. II. 221.
Tassadia Dcne. *VI. 487.
Tassia sericea Rich. V. 569. no. 2.
Tassmannia R. Br. I. 72. V. 14.
— aromatica R. Br. V. 14. no. 1.
— monticola A. Rich. I. 72. no. 1.
Tauscheria Fisch. I. 182.
— desertorum Royle. *I. 182. no. 1.
— *gymnocarpa* Fisch. I. 182. no. 1. β.
— *lasiocarpa* Fisch. I. 182. no. 1. α.
Tauschia Schlchtd. II. 423. V. 907.
— *hederaefolia* Preisser. I. 399. no. 1.
— nudicaulis Schlchtd. *I. 423. no. 1. V. 907. no. 1.
Taverniera DC. I. 744. II. 892.
— *conoclada* Jaub. et Spach. II. 892. no. 1.
— cuneifolia Arn. *I. 744. no. 1.
— *ephedroides* Jaub. et Spach. II. 892. no. 2.
— glabra Boiss. II. 892. no. 2.
— incana Boiss. II. 892. no. 1.
Taxostiche DC. VI. 241. no. 16.
Taynia de Abobrinha V. 764. no. 1.
— *de Quiabo* et *Gonu* V. 764. no. 1.
— *mindo* V. 765. no. 1.
Tayotum Blanco. *VI. 479.
Tbichogyne vid. Trichogyne.
Teclea Delile. °V. 397.
— nobilis Delile. *V. 397. no. 1.
Tecmarsis DC. *II. 543.
Tecoma Juss. VI. 514.
— australis R. Br. *VI. 514. no. 1.
— jasminoides Lindl. *VI. 514. no. 2.
Tecomaxochitl Hern. III. 19. no. 4.
Teconia vid. Feronia.
Tectonia Linn. fil. IV. 98.
— Hamiltoniana Wall. IV. 99. no. 2.
— grandis Linn. IV. 98. no. 1.
— *ternifolia* Hamilt. IV. 99. no. 2.
Teedia Rudolphi. III. 263. °III. 962. *VI. 640.
— lucida Rudolphi. III. 263. no. 1.
β. parvifolia.
— pubescens Burchell. III. 263. no. 2.
Teesdalia R. Br. I. 156.
— Lepidium DC. *I. 156. no. 1.
— nudicaulis R. Br. *I. 156. no. 2.
— petraea Rchb. *I. 156. no. 3.
Teganium procumbens Schmidt. VI. 549. no. 1.
Telekia Baumg. *II. 602.
Telephieae DC. I. 263.
Telephium Tournef. *I. 263.
Telephium Linn. V. 795. no. 1. 2.
Telfairia Hook. II. 195. V. 758.
— pedata Hook. II. 195. no. 1. V. 758. no. 1.
Telfairieae Endl. II. 195. V. 758.
Telina Bth. (Lotononis) V. 456.
Telina E. Mey. I. 623. (*V. 460.)
Telina E. Mey. II. 837. V. 455.
— angustifolia E. Mey. I. 624. no. 10.
— *angustifolia* E. Mey. V. 457. no. 20.
— capnitidis E. Mey. I. 624 no. 5.
— *capnitis* E. Mey. V. 459. no. 59.
— cytisoides E. Mey. I. 623. no. 1.
— *cytisoides* E. Mey. V. 455. no. 4.
— eriocarpa E. Mey. I. 623. no. 2.
— *eriocarpa* E. Mey. V. 455. no. 4.
— *excisa* E. Mey. I. 592. no. 85. V. 456. no. 11. β.
— genuflexa E. Mey. I. 624. no. 4.
— *genuflexa* E. Mey. V. 455. no. 5.
— heterophylla E. Mey. I. 624. no. 6.
— *heterophylla* E. Mey. V. 456. no. 10.
— prostrata E. Mey. I. 624. no. 7.
— *prostrata* E. Mey. V. 456. no. 11.
— striata E. Mey. I. 623. no. 3.
— *striata* E. Mey. V. 455. no. 6.
— varia E. Mey. I. 624. no. 9.

Telina varia E. Mey. V. 456. no. 16.
— villosa E. Mey. I. 624. no. 8.
— *villosa* E. Mey. V. 456. no. 12.
Teline Medicus. (Genista) V. 502.
— *Canariensis* B. Webb. V. 502. no. 97.
— *candicans* B. Webb. V. 502. no. 95.
— *congesta* B. Webb. V. 502. no. 100.
— *linifolia* B. Webb. V. 502. no. 101.
— *linifolia β. latifolia* B. Webb. V. 502. no. 101. β.
— *Maderensis* Spach. V. 502. no. 96.
— *ramosissima* B. Webb. V. 502. no. 98.
— *rosmarinifolia* B. Webb. V. 502. no. 102.
— *Spachiana* B. Webb. V. 502. no. 105.
— *stenopetala* B. Webb. V. 502. no. 99.
Tellima R. Br. II. 371.
— Cymbalaria Wlprs. II. 372. no. 6.
— glabra Wlprs. II. 371. no. 3.
— grandiflora Dougl. *II. 371. no. 1.
— heterophylla Hook. et Arn. II. 371. no. 5.
— parviflora Hook. II. 371. no. 2.
β.? micrantha.
— *parvifolia* Hook. et Arn. II. 371. no. 2.
— tenella Wlprs. II. 371. no. 4.
Telmissa Fnzl. II. 256. V. 791.
— sedoides Fnzl. II. 256. no. 1. V. 791. no. 1.
Templetonia R. Br. I. 578.
— glauca Sims. *I. 578. no. 2.
— retusa R. Br. *I. 578. no. 1.
Temus Mol. *I. 72.
Tenaris E. Mey. *VI. 491.
Tengeta VI. 158. no. 2.
Tepesia Gaertn. *II. 489.
Tephrodes DC. (Vernonia) VI. 702. no. 1.
Tephroseris DC. II. 654. no. 6. 7. VI. 260. no. 19.
Tephrosia Pers. I. 673. II. 857. V. 514.
— adunca Bth. I. 676. no. 32.
—? *ambigua* Curtis. I. 672. no. 1.
— amoena E. Mey. I. 675. no. 25.
— angulata E. Mey. I. 675. no. 24.
— *argentea* Wght. I. 677. no. 46.
— argentea Pers. *I. 674. no. 4.
— ascendens Mcfd. I. 676. no. 34.
— brachyloba E. Mey. I. 676. no. 28.
— bracteolata Guill. et Perr. I. 675. no. 20.
— brevipes Bth. I. 677. no. 40.
— *candida* DC. I. 678. no. 1.
— canescens E. Mey. I. 675. no. 23.
— *Capensis* DC. I. 676. no. 27. α.
— Capensis Pers. I. 676. no. 27.
β. acutifolia }
γ. angustifolia } E. Mey.
α. Jacquini }
— Chilensis Trevir. I. 676. no. 36.
— chrysophylla Mart. et Galeotti. II. 857. no. 4.
Tephrosia chrysophylla Prsh. *I. 677. no. 45.
— coccinea Wall. I. 674. no. 10.
— *Colutea* DC. I. 674. no. 3.
— *Colutea* Wght. I. 674. no. 2.
— crassifolia Bth. V. 515. no. 3.
— dichotoma Desvx. I. 674. no. 11.
— diffusa Wght. et Arn. I. 674. no. 6.
— discolor E. Mey. I. 676. no. 30.
— Drégeana E. Mey. I. 676. no. 31.
— elegans Schum. et Thonn. I. 675. no. 15.
— elongata E. Mey. I. 676. no. 29.
— *flexuosa* Chapm. I. 677. no. 44. γ.
— fusca Wght. et Arn. I. 677. no. 46.
— *galegoides* Grah. I. 674. no. 7. α.
— glabrescens Bth. V. 514. no. 1.
— glandulifera Bth. V. 514. no. 2.
— glomeruliflora Meisn. V. 514. no. 4.
— gracilipes Guill. et Perr. I. 675. no. 19.
— *gracilis* Nutt. I. 677. no. 44.
— *Grahamii* Wall. I. 674. no. 1. δ.
— *grandiflora* Pers. I. 673. no. 1.
— gynothrix Miquel. V. 515. no. 6.
— *Heyneana* Wall. I. 673. no. 1. β. γ.
— hirsuta Schum. et Thonn. I. 675. no. 16.
— *hispida* DC. I. 677. no. 43.
— hispidula Prsh. *I. 677. no. 44. (c. varr. β. γ. et δ. ibid.)
— *holosericea* Nutt. I. 677. no. 41. γ.
— Hookeriana Wght. et Arn. I. 674. no. 2. (III. Emend. p. 3.)
— humilis Guill. et Perr. I. 675. no. 22.
— *hypargyrea* DC. I. 673. no. 1.
— incana Grah. I. 674. no. 3. II. 858. †
— *intermedia* Grah. I. 673. no. 1. β.
— Kraussiana Meisn. V. 515. no. 7.
— lanata Mart. et Galeotti. II. 857. no. 3.
— *lanceaefolia* Lnk. I. 674. no. 7.
— *lanceolata* Grah. I. 674. no. 7. β.
— lathyroides Guill. et Perr. I. 675. no. 18.
— leptostachys DC. *I. 675. no. 17.
— *lobata* Grah. I. 674. no. 7. α.
— longipes Meisn. V. 515. no. 5.
— Luzoniensis Vogel. I. 675. no. 14.
— maxima Pers. *I. 674. no. 8.
— *Mitchellii* Grah. I. 674. no. 8.
— *modesta* Hochstett. V. 510. no. 5.
— moschata Tussac. I. 676. no. 35.
— *nervosa* Pers. I. 673. no. 1.
— oblongifolia E. Mey. I. 676. no. 33.
— onobrychioides Nutt. I. 677. no. 42.
— *parviflora* Wght. I. 674. no. 6.
— *paucifolia* Nutt. I. 677. no. 43.
— penicillata Bth. I. 677. no. 39.
— *pentaphylla* Grah. I. 674. no. 9.
— Persica Boiss. V. 857. no. 1.
— platycarpa Guill. et Perr. I. 675. no. 21.

Tephrosia polystachya E. Mey. I. 675. no. 26.
— *prostrata* Nutt. I. 677. no. 45.
— purpurea Pers. *I. 674. no. 7. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *pusilla* Pers. I. 651. no. 1.
— racemosa Wght. et Arn. I. 677. no. 47.
— rigida Spanoghe. I. 674. no. 12.
— Schiedeana Schlchtd. I. 676. no. 38.
— senticosa Linn. II. 858. †
— spicata Torr. et Gr. *I. 677. no. 43.
— spinosa Pers. *I. 674. no. 9. II. 858. †
— *stricta* Grah. I. 674. no. 7. α.
— suberosa DC. I. 678. †
— *Taylorii* Grah. I. 674. no. 7. α.
— *tinctoria* Grah. I. 674. no. 7. α.
— tinctoria Pers. *I. 673. no. 1. II. 858. †
— toxicaria Linn. I. 678. †
— *uliginosa* Spr. I. 798. no. 2.
— venosa Mart. et Galeotti. II. 857. no. 2.
— vestita Vogel. I. 674. no. 13.
— vicioides Schlchtd. I. 676. no. 37.
— villosa Pers. *I. 674. no. 5.
— *villosa* Wall. I. 674. no. 4.
— Virginiana Pers. *I. 677. no. 41.
β. glabra Nutt.
γ. holosericea Torr. et Gr.
— *Wallichii* Grah. I. 674. no. 7. α.
Tephrosioides Jaub. et Spach. II. 843.
Teramnus P. Br. I. 759. V. 531.
— *Botrydium* Schott. I. 760. no. 15.
— *labialis* Spr. I. 759. no. 1.
— *parviflorus* Spr. I. 759. no. 1.
— *tenuiflorus* Spr. I. 761. no. 1.
— *volubilis* Swrtz. V. 531. no. 1.
TEREBINTHACEAE DC. (ex p.) I. 519. 549. 557. 561.
Terma Endl. II. 667. VI. 279.
Terminalia Linn. II. 60.
Terminalia Wght. et Arn. (ex p.) II. 62.
— actinophylla Mart. II. 61. no. 9.
— acuta Hamilt. II. 61. no. 13.
— Adamantium Cambess. II. 62. no. 17.
— *alata* Rth. II. 62. no. 6.
— *angustifolia* Rxb. II. 61. no. 12.
— australis Cambess. II. 61. no. 5.
— avicennioides Guill. et Perr. II. 61. no. 4.
— Belerica Rxb. *II. 61. no. 10.
— *Berryi* Wght. et Arn. II. 62. no. 3.
— Brownii Fresen. II. 60. no. 2.
— Catappa Linn. *II. 60. no. 1. (c. varr. α. et β. ibid.)
— *Catappa* Rxb. II. 60. no. 1. β.
— Chebula Retz. *II. 61. no. 11.
— *coriacea* Wght. et Arn. II. 62. no. 7.
— *crenulata* Wght. et Arn. II. 62. no. 4.
— *elliptica* Willd.? II. 62. no. 6.
Terminalia glabra Wght. et Arn. II. 62. no. 5.
— glabrescens Mart. II. 61. no. 7.
— *intermedia* Spr. II. 60. no. 1. β.
— macroptera Guill. et Perr. II. 61. no. 3.
— macroptera Mart. II. 61. no. 8.
— *Maradu* Hamilt. II. 62. no. 1.
— microcarpa Dene. II. 61. no. 15.
— *Moluccana* Lam. II. 60. no. 1. β.
— *monoptera* Rth. II. 62. no. 8. β.
— *myrobalana* Rth. II. 60. no. 1. β.
— *Myrobalanus citrina* Koen. II. 61. no. 11.
— nitida Rxb. II. 61. no. 14.
— obovata Cambess. II. 62. no. 18.
— oxycarpa Mart. II. 62. no. 20.
— *paniculata* Rth. II. 62. no. 8. β.
— *paniculata* Wght. et Arn. II. 62. no. 8.
— Paraënsis Mart. II. 62. no. 19.
— psidiifolia Del. II. 61. no. 16.
— *punctata* Rth. II. 61. no. 10.
— *reticulata* Rth. II. 61. no. 11.
— sericea Cambess. II. 61. no. 6.
— *subcordata* Willd. II. 60. no. 1. β.
— *tomentosa* Wght. et Arn. II. 62. no. 6.
— Travencorensis Wght. et Arn. II. 61. no. 12.
Terminalieae DC. II. 60.
Ternatea DC. I. 751.
Ternstroemia Mut. I. 368. II. 801. V. 130.
— acuminata W. Jack. I. 368. no. 3.
— Brasiliensis Cambess. I. 369. no. 13.
— carnosa Cambess. I. 369. no. 14.
— crassifolia Bth. II. 801. no. 2.
— crenata Mcfd. I. 368. no. 9.
— cuneifolia Gardn. V. 130. no. 2.
— cuspidata W. Jack. I. 368. no. 5.
— Japonica Sieb. et Zucc. I. 368. no. 8.
— Lushia Hamilt. I. 368. no. 1.
— obovalis A. Rich. V. 130. no. 1.
— Pavoniana Moric. I. 369. no. 11.
— pentapetala W. Jack. I. 368. no. 7.
— racemosa Don. I. 368. no. 2.
— revoluta Spltgrbr. II. 801. no. 3.
— rubiginosa W. Jack. I. 368. no. 6.
— *rubiginosa* Jack. I. 371. no. 8.
— Ruiziana Moric. I. 368. no. 10.
— Schomburgkiana Bth. II. 801. no. 1.
— serrata W. Jack. I. 368. no. 4.
— Tepezapote Cham. et Schlchtd. I. 369. no. 12. (III. Emend. p. 2.)
TERNSTROEMIACEAE DC. I. 367. V. 129. II. 801.
Ternstroemieae Endl. I. 367. V. 129.
Tertrea DC. *II. 483.
Tessaria Rz. et Pav. *II. 599. *II. 953. no. 3.
Tessiera DC. *II. 468.

Tetilla DC. II. 265. *II. 734. V. 807.
— hydrocotylifolia DC. *II. 265. no. 1. V. 807. no. 1.
Tetracarpaea Hook. II. 746.
— Tassmanniana Hook. *II. 746. no. 1.
Tetracellion ellipsoideum Hort. I. 154. no. 1.
Tetracera Linn. I. 67. V. 14.
— alata Prsl. I. 68. no. 11.
— arborescens Jack. I. 67. no. 1.
— Blumei Wlprs. I. 67. no. 7.
— Breyniana Schlchtd. I. 68. no. 16.
— dichotoma Blume. I. 67. no. 3.
— *fagifolia* Blume. I. 67. no. 7.
— fagifolia Willd. I. 68. no. 17.
— Japurensis Mart. et Zucc. I. 68. no. 15.
— *laevis* Wall. I. 67. no. 2.
— Madagascariensis Willd. I. 67. no. 8.
— *multiflora* DC. I. 67. no. 12.
— *obovata* DC. I. 68. no. 9.
— Poeppigiana Schlchtd. I. 68. no. 14.
— rhamnifolia Prsl. I. 68. no. 13.
— Rheedii DC. *I. 67. no. 2.
— rigida Blume. I. 67. no. 5. et 6.
— rugosa Guillem. et Perr. I. 68. no. 10.
— salicifolia Prsl. I. 68. no. 12.
— Sellowiana Schlchtd. I. 68. no. 18.
— Senegalensis DC. *I. 68. no. 9.
— sericea Blume. I. 67. no. 4.
Tetracme Bnge. I. 171.
— quadricornis Bnge. *I. 171. no. 1.
Tetractis Spr. *I. 14.
Tetradenia Bth. III. 584. °III. 979.
— fruticosa Bth. III. 584. no. 1.
Tetradia Bennet. °V. 103.
— Horsfieldii Bennet. *V. 103. no. 1.
Tetradiclis Stev. I. 519. II. 825.
— Eversmanni Bnge. II. 825. no. 2.
— *salsa* Claus. II. 825. no. 2.
— salsa Stev. *I. 519. no. 1. II. 825. no. 1.
Tetradium Lour. *I. 523.
Tetradium Lour. V. 103. Observ.
—? *fraxinifolium* Wall. V. 397. no. 1.
Tetradymia DC. II. 664.
— canescens DC. II. 664. no. 1.
— inermis Nutt. II. 664. no. 2.
— Nuttallii Torr. et Gr. II. 664. no. 3.
— spinosa Hook et Arn. II. 664. no. 4.
— *spinosa* Nutt. II. 664. no. 3.
Tetraglochin Poepp. II. 44. V. 656.
— strictum Poepp. *II. 44. no. 1. V. 656. no. 1.
Tetragonella Miquel. °V. 783.
— amplexicoma Miquel. V. 783. no. 1.
Tetragonia Linn. II. 230.
— chenopodioides Eckl. et Zeyh. II. 230. no. 2.
Tetragonia heterophylla Eckl. et Zeyh. II. 231. no. 3.
— nigrescens Eckl. et Zeyh. II. 230. no. 1.
Tetragonieae Fnzl. II. 230. V. 783.
Tetragonocarpae Bth. (Indigofera) I. 669.
Tetragonolobus Scop. *I. 648. II. 854.
— aduncus Griseb. II. 854. no. 1.
— Aegaeus Griseb. II. 855. no. 2.
Tetragonotheca Dill. *II. 611.
Tetrahit herbariorum Ger. III. 836. no. 86.
— *Ladanum* Moench. III. 813. no. 2.
— *longiflorum* Moench. III. 813. no. 1.
— *nodosum* Moench. III. 814. no. 3.
Tetrahitum hirtum Hffmnsgg. et Lnk. III. 833. no. 75.
Tetralobus Alph. DC. VI. 439.
— *Preissii* A. DC. VI. 439. no. 1.
— *pusillus* A. DC. VI. 439. no. 3.
Tetramerium Bth. (Faramea) II. 478. VI. 43. no. 1.
Tetramolopium N. ab E. *II. 576.
Tetramorphaea DC. *II. 672.
— *Belangeriana* DC. VI. 302. no. 43. β.
— *Bruguieriana* DC. VI. 302. no. 43.
Tetranema Bth. III. 251. 452. °III. 961. *VI. 640.
— Mexicanum Bth. III. 251. no. 1. *452. no. 1. III. 938.
Tetranthus Swrtz. *II. 607.
Tetrapathaea Raoul. °V. 772.
Tetrapathea DC. II. 218.
— australis Raoul. V. 772. no. 1.
Tetraphyle Eckl. et Zeyh. II. 253.
— *campestris* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 19.
— *corallina* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 11.
— *furcata* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 12.
— *lanceolata* Eckl. et Zeyh. II. 254. no. 20.
— *littoralis* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 13.
— *lycopodioides* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 16.
— *muscosa* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 18.
— *parvula* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 17.
— *polpodacea* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 15.
— *propinqua* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 14.
— *pyramidalis* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 9.
— *quadrangula* Eckl. et Zeyh. II. 253. no. 10.
Tetraphyllacium Poepp. et Endl. II. 767.
— macrophyllum Poepp. et Endl. *II. 767. no. 1.
Tetrapilus Loureiro. *VI. 462.
Tetraplasium petiolare Knze. II. 265. no. 1. V. 807. no. 1.
Tetrapleura Bth. I. 861. °V. 581.
— Thonningii Bth. *I. 861. no. 1. *V. 581. no. 1.
Tetrapoma Turczan. I. 154.
— barbareaefolium Turcz. *I. 154. no. 1.

Tetrapoma Crusianum Turez. I. 154. no. 2.
Tetrapora Schauer. II. 921. ° V. 734.
— Preissiana Schauer. *II. 921. no. 1. *V. 734. no. 1.
Tetrapteris acuminata Raeusch. V. 303. no. 6.
— *citrifolia* Pers. V. 303. no. 7.
— *obovata* Poepp. V. 334. no. 39.
Tetrapterygium Fisch. et Mey. I. 180. V. 43.
— glastifolium Fisch. et Mey. *I. 180. no. 1. V. 44. no. 2.
— stylophorum Jaub. et Spach. V. 43. no. 1.
Tetrapterys Cav. ° V. 300.
Tetrapterys Adr. Juss. V. 301.
— Acapulcensis H. B. Kth. V. 302. no. 4.
— acutifolia Cav. V. 312. no. 31.
— *acutifolia* Griseb. V. 312. no. 31.
— *acutifolia β. ferruginea* Griseb. V. 243. no. 48.
— affinis Adr. Juss. V. 301. no. 1.
— anisoptera Adr. Juss. V. 301. no. 2.
— bracteolata Grieseb. V. 302. no. 3.
— calophylla Adr. Juss. V. 305. no. 14.
— buxifolia Cav. V. 314. no. 38.
— chalcophylla Adr. Juss. V. 308. no. 21.
— chamaecerasifolia Adr. Juss. V. 319. no. 49.
— cinerea Griseb. V. 305. no. 16.
— Cotoneaster Adr. Juss. V. 307. no. 20.
— crebriflora Adr. Juss. V. 302. no. 5.
— crispa Adr. Juss. V. 303. no. 8.
— crotonifolia Adr. Juss. V. 305. no. 15.
— discolor DC. V. 305. no. 12.
— fimbripetala Adr. Juss. V. 317. no. 46.
— fraxinifolia Adr. Juss. V. 313. no. 35.
— *Gaudichaudiana* Adr. Juss. V. 336. no. 45.
— Guilleminiana Adr. Juss. V. 311. no. 30.
— humilis Adr. Juss. V. 318. no. 48.
— inaequalis Cav. V. 303. no. 7.
— Lalandiana Adr. Juss. V. 309. no. 23.
— Langsdorffiana Adr. Juss. V. 315. no. 40.
— lasiocarpa Adr. Juss. V. 306. no. 18.
— leucosepala Adr. Juss. V. 309. no. 25.
— ligustrifolia Adr. Juss. V. 314. no. 39.
— longibracteata Adr. Juss. V. 316. no. 43.
— lucida Adr. Juss. V. 313. no. 34.
— *macrophylla* Poepp. V. 304. no. 10.
— Maranhamensis Adr. Juss. V. 313. no. 36.
— metallicolor Adr. Juss. V. 309. no. 24.
— mogoriifolia Adr. Juss. V. 311. no. 28.
β. platyptera.
— mollis Grieseb. V. 306. no. 17.
— mucronata Cav. V. 303. no. 6.
— multiflora Adr. Juss. V. 311. no. 29.
— multiglandulosa Adr. Juss. V. 310. no. 26.
— nitida Martius. V. 304. no. 9.
— ovalifolia Griseb. V. 304. no. 10.
Tetrapterys paludosa Adr. Juss. V. 316. no. 42.
— puberula Miquel. V. 305. no. 13.
— punctulata Adr. Juss. V. 310. no. 27.
— racemulosa Adr. Juss. V. 319. no. 51.
— ramiflora Adr. Juss. V. 318. no. 47.
— rotundifolia Adr. Juss. V. 307. no. 19.
— Schiedeana Chamisso et Schlchdt. V. 314. no. 37.
— sericea Adr. Juss. V. 308. no. 22.
— styloptera Adr. Juss. V. 317. no. 44.
— suaveolens Adr. Juss. V. 312. no. 32.
— Trinitensis Adr. Juss. V. 304. no. 11.
— Turnerae Adr. Juss. V. 319. no. 50.
— vacciniifolia Adr. Juss. V. 317. no. 45.
— xylosteifolia Adr. Juss. V. 315. no. 41.
Tetrastemon loranthoïdes Hook. et Arn. II. 150. no. 1.
Tetratenium DC. II. 415.
Tetratheca Sm. I. 249. II. 770. V. 68.
— aculeata Steetz. V. 69. no. 10.
— affinis Endl. I. 249. no. 1. V. 68. no. 1.
— ciliata Lindl. I. 219. no. 8. II. 770. no. 1.
— confertifolia Steetz. V. 68. no. 4.
— epilobioides Steetz. V. 69. no. 9.
— gracilis Steetz. V. 69. no. 6.
— hirsuta Lindl. I. 249. no. 6.
— *hirsuta* Lindl. V. 69. no. 10.
— hispidissima Steetz. V. 69. no. 8.
— juncea Sm. V. 70. †
— nuda Lindl. I. 249. no. 5. V. 68. no. 3.
— pilifera Lindl. I. 249. no. 7.
— Preissiana Steetz. V. 69. no. 11.
β. integrifolia V. 70.
— rubriseta Lindl. I. 249. no. 4.
— *rubriseta* Lindl. V. 69. no. 10.
— setigera Endl. I. 249. no. 2. V. 68. no. 5.
β. elongata Steetz. V. 68. no. 5.
— viminea Lindl. I. 249. no. 3. V. 69. no. 7.
β. microphylla } Steetz. V. 69. no. 7.
γ. setosa }
— virgata Steetz. V. 68. no. 2.
β. setigera.
Tetraulacium Turczan. °III. 455. °III. 968. *VI. 642.
— veronicaeforme Turczan. *III. 455. no. 1.
Tetrazygis Rich. *II. 144.
Tetrodus DC. II. 628.
Tetromolopium N. ab. E. *II. 951. no. 10.
Teucrii quarti tertia species Clus. III. 351. no. 83. *a.* III. 352. no. 2. adn.
Teucris Ging. III. 904. VI. 684. no. 1.
Teucrium Linn. III. 903. °III. 991. VI. 684.
— ......? *III. 333.
— ......? Hasskarl. III. 909. no. 25.
— abutiloides L'Hérit. III. 908. no. 22.

Teucrium Achaemenis Schreb. III. 921. no. 75. ε.
— Aegyptiacum Pers. III. 921. no. 75. β.
— Africanum Thunb. III. 907. no. 19.
— *album* Poir. III. 921. no. 75. γ.
— alpestre Sbthrp. et Sm. III. 920. no. 73.
— amplexicaule Bth. III. 921. no. 76.
— angustissimum Schreb. III. 923. no. 83.
— Arduini Linn. III. 910. no. 29.
— *arenarium* Gmel. III. 314. no. 47.
— argutum R. Br. III. 912. no. 38.
— *Asiaticum* Linn. III. 913. no. 43.
— *aureum* Schreb. III. 921. no. 75.
— *Belion* Schreb. III. 921. no. 75. γ.
— *betonicaefolium* Jacq. III. 904. no. 3.
— Betonicum L'Hérit. III. 904. no. 3.
— bicolor Sm. III. 907. no. 16.
— Botrys Linn. III. 914. no. 49.
— bracteatum Desf. III. 910. no. 30.
— brevifolium Schreb. III. 905. no. 5.
— buxifolium Schreb. III. 919. no. 69.
— campanulatum Linn. III. 906. no. 14.
— Canadense Linn. III. 909. no. 27.
— *Canariense* Lam. III. 904. no. 2.
— *canescens* Forst. III. 904. no. 3.
— canum Fisch. et Mey. III. 916. no. 55.
— Capense Thunb. III. 905. no. 10.
— *capitatum* Linn. III. 921. no. 75. ζ.
— *chamaedryfolium* Mill. III. 907. no. 15.
— Chamaedrys Linn. III. 916. no. 54.
— *Chamaedrys γ. angustifolium* B. Webb. III. 915. no. 51.
— *Chamaepithys* Linn. III. 930. no. 25.
— *Charamoniense* Cav. III. 905. no. 6.
— *Chium* Poir. III. 930. no. 24.
— cinereum Boiss. III. 919. no. 68.
— coeleste Schreb. III. 923. no. 84.
— compactum Clementi. III. 910. no. 31.
— *Commersonii* Spreng. III. 924. no. 91.
— *corymbiferum* Desf. III. 921. no. 75. ζ.
— corymbosum R. Br. III. 905. no. 9.
— *Creticum* Lam. III. 905. no. 5.
— Creticum Linn. III. 905. no. 6.
— Cubense Linn. III. 907. no. 15.
— cuneifolium Sibthrp. et Sm. III. 919. no. 71.
— *cuneifolium* Schimp. III. 919. no. 70.
— cylindricum Lam. III. 921. no. 75. ζ.
— cymosum Pers. III. 923. no. 85.
— Cyprium Boiss. III. 920. no. 74.
— *diversiflorum* Moench. III. 906. no. 14.
— *divaricatum* Sieb. III. 917. no. 59. et no. 60.
— Euganeum Visiani. III. 923. no. 87.
— fasciculatum Poir. III. 924. no. 92.
— *flavescens* Schreb. III. 921. no. 75. ζ.
Teucrium flavicans Lam. III. 921. no. 75. α.
— flavum Linn. III. 917. no. 60.
β. purpureum Bth.
— *foliis ovatis etc.* Ger. III. 913. no. 42.
— fragile Boiss. III. 915. no. 53.
— fruticans Linn. III. 904. no. 4.
— *Genevense* Crantz. III. no. 926. 6.
— *gnaphalodes* Vahl. III. 921. no. 75. δ.
— Haenseleri Boiss. III. 920. no. 72.
β. angustifolium.
— *heterophyllum* Cav. III. 907. no. 16.
— heterophyllum L'Hérit. III. 904. no. 2.
— *hyssopifolium* Schreb. III. 905. no. 6.
— Hyrcanicum Linn. III. 910. no. 28.
— inflatum Swartz. III. 909. no. 26.
— *Iva* Linn. III. 929. no. 22.
— Japonicum Willd. III. 909. no. 24.
— Kotschyanum Poech. VI. 684. no. 3.
— laciniatum Torrey. III. 908. no. 21.
— *laevigatum* Russ. III. 930. no. 26.
— *laevigatum* Vahl. III. 907. no. 15.
— *lamiifolium* d'Urv. III. 910. no. 29.
— lanceolatum Bth. III. 905. no. 8.
— *lanigerum* Lag. III. 921. no. 75. δ.
— *lanuginosum* Hffmnsgg. et Lnk. III. 914. no. 48.
— *latifolium* Linn. III. 904. no. 4.
— *Laxmanni* Linn. III. 929. no. 18.
— *lavandulaceum* Pourr. III. 921. no. 75. ζ.
— laxum D. Don. III. 911. no. 35.
— leucocladum Boiss. III. 919. no. 70.
— leucophyllum Montbr. et Auch. III. 916. no. 56.
— *Libanitis* Schreb. III. 922. no. 80.
— lucidum Linn. III. 915. no. 50.
— *lucidum* Sbthrp. et Sm. III. 917. no. 60. β.
— Lusitanicum Lam. III. 913. no. 43.
— *Lusitanicum* Schreb. III. 921. no. 75. γ.
— *macrophyllum* Lam. III. 908. no. 22.
— macrostachyum Wall. III. 903. no. 1.
— *Maderense* Lam. III. 904. no. 3.
— Majorana Pers. III. 923. no. 86.
— *maritimum* Lam. III. 917. no. 58.
— Marum Linn. III. 916. no. 58.
— Mascatense Boiss. III. 922. no. 78.
— Massiliense Linn. III. 913. no. 42.
— *Mauritanum* Linn. III. 908. no. 20. β.
— microphyllum Desf. III. 917. no. 59.
— Montbretii Bth. III. 923. no. 81.
— montanum Linn. III. 922. no. 79.
— *moschatum* Lam. III. 929. no. 22.
— *mucronatum* Linn. III. 913. no. 45.
— multicaule Montbr. et Auch. III. 907. no. 18.
— *multiflorum* Hortul. III. 916. no. 54.
— multiflorum Linn. III. 316. no. 57.

Teucrium myrtifolium Poir. III. 918. no. 64.
— *Nissolianum* Linn. III. 908. no. 20. β.
— nitidum Schreb. III. 918. no. 62.
— nudicaule Hook. III. 907. no. 17.
— *nudicaule* Meyen. III. 907. no. 16.
— *odoratum* Lam. III. 913. no. 42.
— *officinale* Lam. III. 916. no. 54.
— oliganthum Hsskrl. VI. 684. no. 2.
— Oliverianum Ging. III. 906. no. 13.
— *orchideum* Lindl. III. 907. no. 16.
— orientale Linn. III. 906. no. 11.
— *palustre* H. B. Kth. III. 909. no. 26.
— *palustre* Lam. III. 914. no. 47.
— parviflorum Schreb. III. 906. no. 12.
— Persicum Boiss. III. 915. no. 52.
— Polium Linn. III. 920. no. 75.
ζ. angustifolium Bth. III. 921.
ϑ. aureum Boiss. III. 921.
α. flavescens Bth. III. 920.
δ. gnaphalodes Bth. III. 921.
β. hirsutum Bth. III. 921.
η. montanum Boiss. 921.
ε. purpurascens Bth. III. 921.
γ. vulgare Bth. III. 921.
— *Polium* Linn. III. 921. no. 75. γ.
— *Pseudochamaedrys* Wndrth. III. 916. no. 54.
— *Pseudochamaepithys* Bth. III. 907. no. 18.
— Pseudochamaepithys Linn. III. 908. no. 20.
β. multifidum Bth.
— *Pseudohyssopus* Schreb. III. 921. no. 75. γ.
— Pseudoscorodonia Desf. III. 912. no. 40.
— pumilum Linn. III. 922. no. 80.
— *pycnophyllum* Schreb. III. 921. no. 75. ζ.
— *pyramidale* Crantz. III. 926. no. 4.
— Pyrenaicum Linn. III. 918. no. 67.
β. Granatense Boiss. III. 919.
— quadratulum Schreb. III. 918. no. 65.
— *quadratulum* Sm. et Sbthrp. III. 917. no. 59.
— quadrifarium Hamilt. III. 912. no. 37.
β. glabrius Bth.
— racemosum R. Br. III. 905. no. 7.
— ramosissimum Desf. III. 917. no. 61.
— regium Schreb. III. 918. no. 63.
— *regium* Hortul. III. 917. no. 60. β.
— *reptans* Pourr. III. 919. no. 67.
— resupinatum Desf. III. 914. no. 46.
— *rhombifolium* Willd. III. 554. no. 145.
— riparium Hochstett. VI. 684. no. 4.
— *rosmarinifolium* Lam. III. 905. no. 6.
— rotundifolium Poir. III. 924. no. 91.
— *rotundifolium* Schreb. III. 919. no. 67.
— Royleanum Wall. III. 911. no. 36.
— *salicifolium* Linn. III. 929. no. 20.
— *Salviastrum* Hoffm. III. 913. no. 43.
Teucrium Salviastrum Schreb. III. 913. no. 44.
— *saxatile* Cav. III. 919. no. 69.
— *saxatile* Sieb. III. 920. no. 73.
— scordioides Schreb. III. 914. no. 48.
— *Scordium* Brot. III. 914. no. 48.
— scordium Linn. III. 914. no. 47.
— Scorodonia Linn. III. 912. no. 39.
— sessilifolium Clarke. III. 923. no. 88.
— *Sibiricum* Linn. III. 789. no. 69.
— Smyrnaeum Boiss. III. 913. no. 41.
— *speciosum* Hill. III. 910. no. 27.
— spinosum Linn. III. 913. no. 45.
— stoloniferum Hamilt. III. 911. no. 33.
— subspinosum Pourr. III. 918. no. 66.
— *subtriphyllum* Lag. III. 921. no. 75. γ.
— *supinum* Linn. III. 922. no. 79.
— *sylvestre* Lam. III. 912. no. 39.
— Taylori Boiss. VI. 684. no. 1.
— *Teuthrion* Schreb. III. 921. no. 75. γ.
— Thea Lour. III. 924. no. 90.
— thymifolium Schreb. III. 922. no. 77.
— tomentosum Heyne. III. 911. no. 32.
β. glabriusculum Bth.
— *tomentosum* Mnch. III. 904. no. 4.
— *tomentosum* Vill. III. 921. no. 75. α.
— *trifidum* Retz. III. 908. no. 19.
— *trifoliatum* Vahl. III. 921. no. 75. γ.
— undulatum Lour. III. 924. no. 89.
— *Valentinum* Schreb. III. 921. no. 75. ζ.
— verticillatum Cav. III. 923. no. 82.
— *vesicarium* Mill. III. 909. no. 26.
— *villosum* Forst. III. 909. no. 26.
— *Virginicum* Linn. III. 910. no. 27.
— *Virginicum* Thunb. III. 909. no. 24.
— viscidum Blume. III. 911. no. 34.
— Wallichianum Bth. III. 909. no. 23.
— Webbianum Boiss. III. 915. no. 51.
Teucropsis Ging. III. 904.
Texiera glastifolia Jaub. et Spach. I. 146. no. 1.
THALAMIFLORAE DC. I. 3.
Thalictrum Tourn. I. 10. II. 737. V. 4.
— acaule Cambess. I. 12. no. 31.
— agreste Kar. et Kir. I. 11. no. 12.
— Alpinum Linn. I. 13. †
— anemonoides Michx. I. 13. no. 45.
— angustifolium Jcq. I. 14. †
var. varifolium Rchb. 14. †
— appendiculatum C. A. Meyer. I. 11. no. 15.
— aquilegiifolium Linn. I. 14. †
— Baikalense Turcz. I. 10. no. 5.
— Bauhini Crntz. I. 14. †
— Caffrum Eckl. et Zeyh. I. 13. no. 36.
— capillare Rchb. I. 14. †
— *Carolinianum* DC. I. 13. no. 39.
— *Carolinianum* Walt. I. 31. no. 9.

Thalictrum clavatum DC. *I. 13. no. 37. *V. 4. no. 1.
— Cornuti Linn. *I. 13. no. 40.
— *Cornuti β.* Fisch. et Mey. I. 13. no. 42.
— *corynellum* DC. I. 13. no. 40.
— cultratum Wall. I. 11. no. 19.
— cysticarpum Wall. I. 11. no. 18.
— dasycarpum Fisch. Mey. et Lallem. I. 13. no. 42.
— dioicum Linn. *I. 13. no. 39.
— Dunense Dumort. I. 10. no. 1.
— *elatum* Ldb. I. 10. no. 6.
— elatum Murr. I. 14. †
— elegans Wall. I. 12. no. 22.
— *exaltatum* C. A. Meyer. I. 10. no. 9.
— filipes Torr. et Gr. I. 13. no. 38. (III. Emend. p. 1.) V. 4. no. 1.
— flavo-virens Ldb. I. 10. no. 8.
— flavum Linn. I. 14. †
— *flavum β. commutatum* Whlnbrg. I. 11. no. 10.
— flexuosum Bernh. I. 14. †
— floribundum Schrad. I. 11. no. 16.
— foeniculaceum Bnge. I. 13. no. 35.
— foetidum Linn. I. 13. †
— galioides Nestl. I. 14. †
— glaucescens Willd. I. 14. †
— glaucum Desf. I. 14. †
— globiflorum Ldb. I. 10. no. 7.
— glyphocarpum Wght. et Arn. I. 12. no. 30. (III. Emend. p. 1.)
— gracile C. A. Meyer. I. 11. no. 14.
— Hernandezii Tausch. I. 13. no. 44.
— isopyroides C. A. Meyer. I. 11. no. 13.
— Javanicum Blume. I. 12. no. 32.
— Kemense Fries. I. 11. no. 10.
— *laevigatum* Michx. I. 13. no. 39.
— laserpitiifolium Willd. I. 14. †
— lasiostylum Prsl. I. 13. no. 43.
— Leyii Löhr. II. 737. no. 2.
— lucidum Linn. I. 14. †
— macrocarpum Grénier. I. 10. no. 2.
— majus Linn. I. 14. †
— marginatum Royle. I. 12. no. 25.
— Maxwellii Royle. I. 12. no. 27.
— medium Jcq. I. 14. †
— microphyllum Royle. I. 12. no. 24.
— micropodum Karel et Kiril. I. 11. no. 11.
— minus Linn. I. 14. †
— *minus δ. strictum* Koch. II. 737. no. 1.
— Morisoni Gmel. I. 14. †
— mucronatum Ldb. I. 10. no. 6.
— neurocarpum Royle. I. 12. no. 23.
— nigricans Jcq. I. 14. †
— nudicaule Schweinitz. I. 13. no. 41.
— nutans Desf. I. 14. †
Thalictrum orientale Boiss. I. 10. no. 4.
— pauciflorum Royle. I. 12. no. 29.
— polygamum Mhlnbrg. I. 13. no. 40.
— Punduanum Wall. I. 12. no. 21.
— *purpurascens* DC. I. 13. no. 39.
— radiatum Royle. I. 12. no. 28.
— *ranunculinum* Mhlnbrg. I. 59. no. 1.
— reniforme Wall. I. 11. no. 20.
— *revolutum* DC. I. 13. no. 40.
— rhynchocarpum Dill. et A. Rich. I. 10. no. 3.
— rotundifolium DC. I. 13. no. 46. †
— *rugosum* DC. I. 13. no. 39.
— Ruthenicum Schrad. I. 11. no. 17.
— saxatile Schlchtd. I. 14. †
— simplex Linn. I. 14. †
— sparsiflorum Turcz. I. 12. no. 33. (I. 13. no. 34.) *II. 738. no. 3.
— strictum Ldb. I. 10. no. 9.
— sylvaticum Koch. II. 737. no. 1.
— vaginatum Royle. I. 12. no. 26.
Thamnea Soland. I. 545.
— uniflora Soland. *I. 545. no. 1.
Thapsandra Griseb. III. 446.
Thapsia Tournef. *II. 417.
— *Apii folio Lusitanica etc.* Tournef. V. 901. no. 1.
— *foetida* Linn. II. 420. no. 3.
— *glomerata* Nutt. II. 417. no. 1.
— *gummifera* Spr. II. 420. no. 1. V. 901. no. 1. *β.*
— *polygama* Dsf. V. 897. no. 2.
— *tenuifolia* Lag. II. 420. no. 2.
— *trifoliata* Linn. II. 403. no. 1.
—? *trifoliata* Mill. II. 404. no. 3.
Thapsieae Koch. II. 417. V. 896.
Thapsium Nutt. II. 403.
— *atropurpureum* Nutt. II. 403. no. 1.
— aureum Nutt. II. 404. no. 2.
— barbinode Nutt. II. 404. no. 3.
— cordatum Torr. et Gr. II. 403. no. 1. *β.* floribus obscure purpureis.
Thea Linn. I. 375.
— viridis Linn. *I. 375. no. 1.
Thecocarpus Boiss. °V. 913.
— meifolius Boiss. *V. 913. no. 1.
Theka Rheede. IV. 99. no. 1.
Thelesperma Lssng. *II. 623.
Thelycrania Endl. V. 932.
Thelypodium Endl. I. 172.
— integrifolium Endl. I. 172. no. 2.
— laciniatum Endl. I. 172. no. 1.
— sagittatum Endl. I. 172. no. 3.
Thelyra Thouars. *II. 7.
Thenardia H. B. Kth. VI. 473.
— suaveolens Mart. et Galeotti. VI. 473 no. 1.

Theobroma Linn. I. 339.
— Cacao Linn. *I. 339. no. 1.
— Guianensis Voigt. I. 339. no. 6.
— microcarpa Mart. I. 339. no. 5.
— subincana Mart. I. 339. no. 3.
— sylvestris G. Don. I. 339. no. 2.
— sylvestris Mart. I. 339. no. 4.
Theodora Medic. I. 844.
— *speciosa* Medic. I. 844. no. 1.
— *stipulata* Eckl. et Zeyh. I. 844. no. 3.
Theophrasta Juss. VI. 453.
— Jussiaci Lindl. *VI. 453. no. 1.
THEOPHRASTACEAE Alph. DC. VI. 453.
Theophrasteae Alph. DC. VI. 453.
Theophrasteae Endl. VI. 453.
Theophrasteae Meisn. VI. 453.
Thermia laburnifolia Spr. V. 422. no. 1.
Thermopsis R. Br. I. 562. II. 831.
— alpina Ldb. *I. 562. no. 3.
— barbata Bth. I. 562. no. 1. *II. 831. no. 1.
— fabacea DC. I. 563. †
— *Gorgonensis* DC. I. 562. no. 3.
— inflata Cambess. I. 562. no. 2.
— *laburnifolia* D. Don. II. 831. no. 1. V. 422. no. 1.
— macrophylla Hook. et Arn. I. 563. no. 5.
— montana Nutt. I. 562. no. 4. (III. Emend. p. 3.)
— *Nepalensis* DC. II. 831. no. 1. V. 422. no. 1.
— Nepaulensis DC. I. 563. †
— rhombifolia Nutt. I. 563. †
Therogeron DC. *II. 579. *II. 952. no. 10.
Thespesia Corr. I. 312. II. 791.
— macrophylla Blume. I. 312. no. 1.
— populnea Corr. *II. 791. no. 1.
— tomentosa Prsl. I. 312. no. 2.
Thespis DC. *II. 594. *II. 952. no. 56.
Thevenotia DC. *II. 669.
— *Persica* DC. VI. 284. no. 2.
Thevetia Linn. VI. 467.
— plumeriaefolia Bth. VI. 467. no. 1.
Thevetieae Alph. DC. VI. 467.
Thibaudia Rz. et Pav. I. 399. no. 1. II. 723. (ex p.)
Thibaudia Rz. et Pav. II. 723. VI. 411.
— *acuminata* Hook. VI. 412. no. 10.
— angustifolia Hook. VI. 412. no. 8.
— breviflora Bth. VI. 412. no. 7.
— capitata Bth. VI. 411. no. 1.
— crassifolia Bth. II. 723. no. 1.
— cyathifera Bth. VI. 411. no. 4.
— dependens Bth. VI. 411. no. 3.
— hirtiflora Bth. VI. 412. no. 6.
— Hookeri Wlprs. VI. 412 no. 9.
— laurifolia Mart. et Galeotti. II. 723. no. 3.
Thibaudia Mexicana Martens et Galeotti. II. 723. no. 2.
— Pinchinchensis Bth. VI. 412. no. 5.
— speciosa Bth. VI. 411. no. 2.
Thieleodoxa Cham. II. 524.
— ......? Mart. et Galeotti. V. 74. no. 5.
— elliptica Cham. II. 524. no. 1.
— lanceolata Cham. II. 524. no. 2.
Thiodia Bennet. I. 204.
— serrata Endl. *I. 204. no. 1.
Thisantha Eckl. et Zeyh. II. 256. et 935. V. 792.
— decumbens Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 5.
— glabra Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 3. V. 792. no. 2.
— glomerata Eckl. et Zeyh. *II. 256. no. 1.
— patens Eckl. et Zeyh. II. 256. no. 2.
— scaberula Knze. V. 792. no. 1.
— strigosa Eckl. *II. 256. no. 4.
— subulata Hook. II. 935. no. 1.
Thladiantha Bnge. II. 205. V. 763.
— dubia Bnge. *II. 205. no. 1. V. 763. no. 1.
Thlaspi Dill. I. 155. II. 758. V. 37.
— alliaceum Linn. I. 155. †
— alpestre Linn. I. 156. †
— alpinum Jcq. I. 156. †
— *amarum* Noulet. 157. †
— annuum C. Koch. I. 155. no 7.
β. viride.
— Andicola Gill. et Hook. I. 155. no. 10.
— arvense Linn. I. 155. no. 9. (c. var. β.) I. 155. †
— *Baikalense* DC. I. 155. no. 9.
— bulbosum Spruner. II. 758. no. 1.
— cepaeaefolium Koch. I. 156. †
— corymbosum Gay. I. 156. †
— drabaeflorum Fnzl. II. 759. no. 2.
— elegans Boiss. V. 37. no. 1.
— grandiflorum Bory et Jaub. I. 155. no. 3.
— *grandiflorum* Bory et Chaub. II. 761. no. 1.
— *heterophyllum* DC. I. 177. no. 14.
— montanum Linn. I. 156. †
— Natolicum Boiss. I. 155. no. 6.
— perfoliatum Linn. I. 155. †
— *pinnatum* Noulet. I. 157. †
— platycarpum Fisch. et Mey. I. 155. no. 5.
— praecox Wulf. I. 156. †
— Prolongi Boiss. I. 155. no. 2.
— rivale Prsl. I. 155. no. 1.
— rotundifolium Gaud. I. 156. †
— scapiflorum Viv. I. 155. no. 4.
— stylosum Ten. I. 156. †
— sylvium Gaud. I. 156. †
— umbellatum Gmel. I. 155. no. 8.
Thlaspideae DC. I. 155. V. 37.

Thlaspidium DC. I. 157.
Thliphthisa Griseb. VI. 13.
Thlipsocarpus Knze. °VI. 732.
— Baeticus Knze. VI. 732. no 1.
Thomasia Gay. I 336. II. 795. V. 107.
— aemula Steudel. V. 109. no. 12.
— angustifolia Steudel. V. 108. no. 9.
— canescens Lindl. I. 336. no. 5.
— cognata Steudel. V. 108. no. 8.
— cygnopotamica Steudel. V. 108. no. 5.
— diffusa G. Don. II. 795. no. 1.
— discolor Steudel. V. 109. no. 14.
— glabrata Steudel. V. 109. no. 16.
— glutinosa Lindl. I. 336. no. 4.
— grandiflora Lindl. I. 336. no. 6.
— hypoleuca Steudel. V. 109. no. 17.
— lasiopetaloides Steudel. V. 109. no. 13.
— lucida Steudel. V. 108. no. 6.
— macrocalyx Steudel. V. 108. no. 2.
— macrocarpa Hügel. I. 336. no. 7.
— *macrocarpa* Hügel. V. 107. no. 1.
— montana Steudel. V. 108. no. 3.
— paniculata Lindl. I. 336. no. 2.
— pauciflora Lindl. I. 336. no. 3.
— pumila Steudel. V. 109. no. 11.
— rulingioides Steudel. V. 108. no. 7.
— rupestris Steudel. V. 108. no. 4.
— stipulacea Lindl. I. 336. no. 1. *V. 107. no. 1.
— subhastata Steudel. V. 109. no. 10.
— viridis Steudel. V. 109. no. 15.
Thompsonia R. Br. II. 218. *V. 771.
— ...... R. Br. *II. 218. no. 1.
Thouinia Poit. I. 420. V. 365.
— adenophora Miq. V. 366. no. 3.
— *adenophora* Miq. (olim) V. 369. no. 8.
— australis A. Rich. I. 421. no. 3.
— *dioica* N. ab E. et Mart. I. 415. no. 13.
— macroptera Casaretto. V. 366. no. 2.
— Morisiana Casaretto. V. 365. no. 1.
— scandens Cambess. I. 420. no. 1.
— simplicifolia Poit. *I. 420. no. 2.
Thrincia Rth. *II. 688. *VI. 344.
Thryallis Mart. °V. 198.
— brachystachys Lindl. V. 200. no. 3.
— *Brasiliensis* Linn. V. 183. no. 1.
— latifolia Mart. V. 199. no. 2.
— longifolia Martius. V. 199. no. 1.
— *macroptera* Mart. V. 196. no. 4.
Thyana simplicifolia Hamilt. I. 420. no. 2.
Thylacanthus Tulasne. °V. 566.
— ferrugineus Tulasne. V. 566. no. 1.
Thylachium Lour. *I. 196. V. 53.
— angustifolium Bojer. V. 53. no. 2.
— Sumangui Bojer. V. 53. no. 1.
Thymbra Linn. III. 744. °III. 983.
Thymbra ambigua Clarke. III. 745. no. 1.
— *Caroliniana* Walt. III. 800. no. 1.
— *ciliata* Dsf. III. 705. no. 37.
— *ciliata* Ten. III. 700. no. 15.
— *hirsuta* Pers. III. 705. no. 41.
— spicata Linn. III. 744. no. 1.
— *spicata* Pall. III. 686. no. 1.
— *verticillata* Linn. III. 745. no. 1.
Thymelaea Aethiopica glabra etc. Pluken. IV. 170. no. 4.
— *Africana foliis Lini etc.* Herm. IV. 170. no. 3.
— *foliis angustissimis linearibus etc.* Burm. IV. 170. no. 4.
Thymoideae Wlprs. IV. 15.
Thymophylla Lag. *II. 624.
Thymopsis Jaub. et Spach. II. 810. °V. 142.
— aspera Jaub. et Spach. *II. 810. no. 1. *V. 143. no. 1.
Thymum saxatile ex monte Calpe Tournef. III. 698. no. 3. *a.*
Thymus Linn. III. 697. °III. 982. VI. 671.
— *acicularis* Waldst. et Kit. III. 700. no. 15.
— *acinoides* Ten. III. 729. no. 9.
— *Acinos* Linn. III. 729. no. 8.
— *adscendens* Bernh.? III. 701. no. 16.
— Aegyptiacus Bernh. *III. 705.
— *affinis* Sieb. III. 699. no. 12.
— albicans Hoffmnsgg. et Lnk. III. 705. no. 42.
— *albidus* Opitz. III. 701. no. 15.
— *Almoradux* Duf. III. 697. no. 1. *β.*
— *alpinus* Linn. III. 730. no. 11.
— angustifolius Pers. III. 700. no. 15. *β.* Nevadensis Boiss. III. 701.
— *arenarius* Bernh. III. 700. no. 13. *a.*
— *ascendens* Bernh. III. 699. no. 8.
— *Athonicus* Bernh. III. 728. no. 5. *β.*
— *Austriacus* Bernh. III. 701. no. 16.
— *Barrelieri* Spr. III. 728. no. 41.
— *biflorus* Hamilt. III. 723. no. 27.
— Bonariensis Tenore. III. 705. no. 45.
— Bovei Bth. III. 699. no. 10.
— bracteosus Visiani. III. 702. no. 22.
— *Brauneanus* Hoppe. III. 728. no. 5.
— brevifolius Whlnbrg. III. 705. no. 46.
— Broussonetii Boiss. III. 704. no. 34.
— *Brownei* Swrtz. III. 719. no. 5.
— *caespititius* Lnk. et Hoffmnsgg. III. 700. no. 15.
— *Calamintha* Scop. III. 728. no. 6.
— *calaminthoides* Rchb. III. 728. no. 6. *β.*
— camphoratus Hffmnsgg. et Lnk. *III. 705.
— *canescens* Dumort. III. 729. no. 8.
— *canus* Stev. III. 730. no. 12.
— capitatus Hffmnsgg. et Lnk. III. 703. no. 31.

Thymus capitellatus Hffmnsgg. et Lnk. III. 702. no. 26.
— Cappadocicus Boiss. III. 947.
— carnosus Boiss. III. 698. no. 5.
— *Carolinianus* Michx. III. 729. no. 7.
— cephalotus Linn. III. 704. no. 33.
— *chamaedrys* Fries. III. 700. no. 13. β.
— *Chamissonis* Bth. III. 719. no. 8.
— cherlerioides Vis. III. 703. no. 29.
— *ciliatus* Bth. III. 704. no. 34.
— ciliatus Bth. III. 704. no. 37.
— *ciliatus* Lam. III. 701. no. 15.
— *ciliatus* Mnch. III. 697. no. 1.
— *citratus* Dumort. III. 700. no. 13. α.
— *citriodorus* Schreb. III. 700. no. 13. α.
— *collinus* M. Bieb. III. 700. no. 13. α.
— comptus Friv. III. 701. no. 17.
— coriaceus Vogel. III. 705. no. 47.
— *Corsicus* Pers. III. 730. no. 10.
— *Creticus* Brot. III. 703. no 31.
— *Creticus* DC. III. 726. no. 41.
— *Croaticus* Pers. III. 724. no. 29.
— *debilis* Ldb. III. 731. no. 15.
— *decumbens* Bernh. III. 700. no. 13. α.
— decussatus Bth. III. 699. no. 9.
— *deflexus* Lej. III. 700. no. 13. α.
— *diffusus* Boiss. III. 698. no. 3. γ.
— *diffusus* Hortul. III. 728. no. 5.
— diffusus Salzm. III. 699. no. 8.
β. pubescens Bth.
— *Douglasii* Bth. III. 719. no. 8.
— *effusus* Host. III. 700. no. 13. α.
— *elongatus* Lnk. III. 697. no. 2.
— *ericaefolius* Roth. III. 721. no. 15.
— *exiguus* Sibthrp. et Sm. III. 730. no. 12.
— *exserens* Ehrb. III. 700. no. 13.
— *filiformis* Ait. III. 723. no. 24.
— *filiformis* Sieb. III. 722. no. 21.
— *fruticulosus* Bert. III. 721. no. 16
— *glaber* Mill. III. 700. no. 13. α.
— *glabratus* Schult. III. 700. no. 13. α.
— *globrescens* Hffmnsgg. et Lnk. III. 701. no. 16.
— *glandulosus* Lag. III. 698. no. 6.
— *glandulosus* Req. III. 728. no. 4.
— Granatensis Boiss. III. 704. no. 3.
— *grandiflorus* Scop. III. 733. no. 25.
— *grandiflorus* Sims. III. 729. no. 7.
— *graveolens* M. Bieb. III. 730. no. 12.
— *graveolens* Sibthrp. et Sm. III. 699. no. 11. III. 946.
— Herbabarona Lois. III. 699. no. 12.
— *heterophyllus* Poir. III. 729. no. 8.
— heterotrichus Griseb. III. 700. no. 14.
— *hirtus* Willd. III. 671. no. 1.
— hirsutissimus Poir. III. 705. no. 41.
Thymus hirsutus Auct. III. 701. no. 16.
— hirsutus M. Bieb. III. 702. no. 24.
— *hirtus* Russ. III. 720. no. 10.
— *hirtus* Sieb. III. 727. no. 2.
— *hirtus* Viv. III. 677. no. 305.
— hirtus Willd. III. 697. no. 3.
γ. capitatus
δ. erianthus
β. intermedius
α. legitimus } Boiss. III. 698.
— Hispanicus Poir. III. 703. no. 30.
— *humifusus* Bernh. III. 700. no. 13. α.
— *imbricatus* Forsk. III. 724. no. 30.
— *incanus* Sibthrp. III. 727. no. 1.
— *includens* Ehrh. III. 700. no. 13.
— *Indicus* Burm. III. 496. no. 6.
— *inodorus* Bth. III. 721. no. 15.
— *inodorus* Dsf. III. 721. no. 17.
— *inodorus* Lej. III. 701. no. 15.
— integer Griseb. *III. 705.
— *Kollmunzerianus* Opitz. III. 700. no. 13. α.
— Kotschyanus Boiss. III. 946.
— *laevigatus* Vahl. III. 700. no. 13. α.
— lanceolatus Dsf. III. 701. no. 20.
— *lanuginosus* Schkhr. III. 700. no. 13. α.
— *lanuginosus* Mill. III. 701. no. 16.
— linearis Bth. III. 702. no. 21.
— longicaulis Presl. III. 705. no. 44.
— longiflorus Boiss. III. 704. no. 35.
— *lucidus* Ehrh. III. 684. no. 1. α.
— *lucidus* Guss. III. 699. no. 12.
— Lusitanicus Boiss. III. 698. no. 4.
— *majoranaefolius* Dsf. III. 700. no. 13. β.
— *marginatus* Sm. III. 724. no. 29.
— *marifolius* Pourr. III. 697. no. 1. β. et no. 2.
— *marifolius* Willd. III. 726. no. 41.
— *Marinosci* Ten. III. 703. no. 31.
— *Marschallianus* Willd. III. 701. no. 16.
— Mastichina Linn. III. 697. no. 1.
β. micranthus Bth.
— *Mastichina* Sm. III. 722. no. 21.
— Megapotamicus Spr. III. 705. no. 43.
— *melissoides* Bernh. III. 730. no. 14.
— *melissoides* Fisch. III. 700. no. 13. α.
— membranaceus Boiss. III. 704. no. 36.
— *micans* Lowe. III. 700. no. 15.
— *micranthus* Brot. III. 720. no. 10.
— *microphyllus* d'Urv. III. 723. no. 22. β.
— *montanus* Crantz. III. 730. no. 11.
— *montanus* Waldst. et Kit. III. 700. no. 13. β.
— *Moschatella* Pollini. III. 728. no. 6.
— multiflorus Pers. III. 705. no. 40.
— *Nepeta* Sm. III. 728. no. 5.
— *nepetoides* D. Don. III. 781. no. 32.
— nervosus Gay. III. 701. no. 15.

Thymus nubigenus H. B. Kth. III. 726. no. 38.
— Numidicus Dsf. III. 703. no. 27.
— *nummulariaefolius* Loisel. III. 730. no. 11.
— *nummularius* Bieb. III. 700. no. 13. β.
— *odoratissimus* M. Bieb. III. 700. no. 15.
— *odoratissimus* Mill. III. 701. no. 16.
— *origanifolius* D. Don. III. 734. no. 27.
— *origanifolius* Visiani. III. 727. no. 3.
— origanoides B. Webb. III. 947.
— *ovatus* Mill. III. 700. no. 13. β.
— Pannonicus All. III. 701. no. 16.
— *parviflorus* Req. III. 594. no. 21.
— *Patavinus* Jcq. III. 729. no. 9.
— *piligerus* Opitz. III. 701. no. 16.
— *Piperella* All. III. 724. no. 29.
— *Piperella* Bth. III. 946.
— Piperella Linn. III. 699. no. 11.
— *piperitus* D. Don. III. 734. no. 27.
— *procerus* Opitz. III. 700. no. 13. α.
— *Pseudoserpyllum* Rchb. III. 700. no. 13. β.
— pulchellus C. A. Mey. III. 705. no. 38.
— *pulegioides* Rchb. III. 700. no. 13. β.
— punctatus Visiani. III. 703. no. 28.
— *punctatus* Willd. III. 684. no. 1. α.
— *purpurascens* Poir. III. 730. no. 13.
— *repens* D. Don. III. 731. no. 18.
— *repens* Lnk. et Hffmnsgg. III. 700. no. 15.
— Richardi Pers. III. 705. no. 39.
— *rigidus* Rchb. III. 700. no. 13. α.
— *rotundifolius* Poir. III. 730. no. 14.
— *scaber* Prsl. *III. 710.
— *serpylloides* Bory. III. 701. no. 15. β.
— Serpyllum Linn. III. 699. no. 13.
β. montanus Bth.
α. vulgaris Bth.
— *serratus* Opitz. III. 700. no. 13. α.
— *serratus* Poir. III. 690. no. 10.
— Sibthorpii Bth. III. 701. no. 19.
— Sipyleus Boiss. III. 946.
— *spinulosus* Ten. III. 700. no. 15.
— striatus Vahl. III. 702. no. 23.
— *suaveolens* Sm. III. 729. no. 9.
— *subcitratus* Schreb. III. 700. no. 13. α.
— *subcordatus* Visiani. III. 724. no. 28.
— *subnudus* Spr. III. 726. no. 40.
— *Sudeticus* Opitz. III. 700. no. 13. α.
— *sylvaticus* Bernh. III. 732. no. 20.
— *sylvestris* Schreb. III. 700. no. 13. α.
— *Syrticus* Spr. III. 677. no. 305.
— *Teneriffae* Hortul. III. 723. no. 22. α.
— *Teneriffae* Poir. III. 723. no. 26.
— tenuifolius Mill. III. 698. no. 7.
β. floribundus Boiss.
α. gracilis Boiss.
— *terebinthinaceus* Willd. III. 723. no. 26.
— teucrioides Boiss. III. 946.
Thymus tomentosus Willd.? III. 697. no. 1. β.
— tomentosus Willd. III. 697. no. 2.
— *Tragoriganum* Linn. III. 709. no. 9.
— *umbrosus* Spreng. III. 728. no. 6.
— *variabilis* Lnk. et Hffmnsgg. III. 701. no. 15.
— *veronicaefolius* Spr. III. 734. no. 29.
— *villosissimus* Tausch. III. 730. no. 11.
— *villosus* Guthnik. III. 698. no. 4.
— villosus Linn. III. 702. no. 25.
— *virgatus* Ten. III. 720. no. 10. γ.
— *Virginicus* Linn. III. 691. no. 12.
— vulgaris Linn. III. 698. no. 6.
— *vulgaris* Sibthrp. et Sm. III. 702. no. 24.
— *Willdenowii* Boiss. III. 698. no. 3. α.
— Willdenowii Boiss. VI. 671. no. 1.
— *Xalapensis* H. B. Kth. III. 719. no. 6.
— zygioides Griseb. III. 701. no. 18.
— *Zygis* Linn. III. 701. no. 15.
— *Zygis* Pall. III. 701. no. 16.
— *Zygis* Sibthrp. et Sm. III. 702. no. 23.
Thyrsanthus Bth. VI. 470.
— embelioides Alph. DC. *VI. 470. no. 1.
— *frutescens* Ell. I. 770. no. 4.
Thyrsiflorae Bth. (Manulea) III. 318.
Thysanocarpus Hook. I. 183.
— crenatus Nutt. I. 183. no. 4.
— curvipes Hook. I. 183. no. 1.
— *Deppei* Nutt. I. 183. no. 2. β.
— elegans Fisch. et Mey. I. 183. no 2. (c. varr. α. β. et γ.)
— laciniatus Nutt. I. 183. no. 5.
— oblongifolius Nutt. I. 183. no. 6.
— pulchellus Fisch. et Mey. I. 183. no. 3.
— pusillus Hook. I. 183. no. 7. (III. Emend. p. 3.)
Thysanus Lour. *I. 562.
Thysselinum DC. II. 410.
Tiarella Linn. II. 372.
— *alternifolia* Fisch. II. 371. no. 1.
— *biternata* Vent. II. 372. no. 2.
— ? *bracteata* Torr. II. 370. no. 12.
— *colorans* Grah. II. 369. no. 4.
— cordifolia Linn. *II. 372. no. 1.
— laciniata Hook. II. 372. no. 4.
— *Menziesii* Prsh. II. 370. no. 1.
— *rhombifolia* Nutt. II. 372. no. 3.
— *stenopetala* Prsl. II. 370. no. 1.
— stenopetala Prsl. II. 372. no. 5.
— trifoliata Linn. *II. 372. no. 3.
— unifoliata Hook. II. 372. no. 2.
Tibouchina Aubl. *II. 132.
Ticorea Aubl. I. 500.
— febrifuga St. Hil. I. 500. †
— jasminiflora St. Hil. I. 500. †
— nitida Prsl. I. 500. no. 1.

Tidemannia DC. *II. 414.
Tilesia F. W. Mey. *II 609.
— *capitata* F. W. Mey. II. 612. no. 1.
Tilia Linn. I. 357. II. 799.
— alba Michx. I. 360. no. 9.
— *alba* W. et K. I. 359. no. 8.
— *Americana* Ait. I. 358. no. 4.
— argentea Dsf. I. 359. no. 8.
β. virescens Spach.
— *Carinthiaca* Bosc. I. 358. no. 3.
— *corallina* Ait. I. 358. no. 3.
— *corallina* Hort. Carlsr. II. 799. no. 3.
— *cordata* Mill. I. 358. no. 3.
— *cordifolia* Bess. I. 358. no. 3.
— dasystyla Stev. I. 360. no. 11.
— *Europaea* Dsf. I. 358. no. 3.
— *Europaea* Sm. I. 357. no. 2.
— *Europaea* γ. Linn. I. 357. no. 1.
— *Europaea* var. *borealis* Whlnbrg. I. 357. no. 1.
— flavescens A. Braun. II. 799. no. 1a.
— floribunda A. Braun. II. 799. no. 2.
— heterophylla Vent. I. 359. no. 9.
— *hybrida* Bechst. I. 357. no. 2.
— intermedia DC. I. 357. no. 2.
— *laxiflora* Hort. Carlsruh. II. 799. no. 2.
— laxiflora Michx. I. 359. no. 7.
— *laxiflora* Willd. I. 359. no. 4. β.
— *macrophylla* Hort. I. 360. no. 9.
— Mexicana Schlchtd. I. 360. no. 13.
— *microphylla* Vent. I. 357. no. 1.
— *Mississippensis* Bosc. I. 359. no. 4. β.
— mollis E. Spach. I. 358. no. 3.
δ. bracteosa } Spach.
ζ. brevipes } Spach.
η. corallina } Spach.
ε. leptolepis } Spach.
γ. longepedunculata } Spach.
β. pluriflora } Spach.
α. vulgaris } Spach.
— multiflora Ldb. II. 799. no. 1.
— neglecta Spach. I. 359. no. 5.
— nigra Borkh. I. 358. no. 4.
α. densiflora } Spach. I. 359.
β. laxiflora } Spach. I. 359.
— *parviflora* Ehrh. I. 557 no. 1.
— parvifolia Stev. I. 360. no. 10.
— *pauciflora* Hayne. I. 358. no. 3.
— *platyphylla* Scop. I. 358. no. 3.
— praecox A. Braun. II. 799. no. 3.
— *pubescens* Ait. I. 359. no. 7.
β. *leptophylla* Vent. I. 359. no. 7.
— *pubescens* var. Vent. I. 359. no. 6.
— rotundifolia Vent. I. 359. no. 8.
— *rubra* DC. I. 358. no. 3.
— rubra Stev. I. 360. no. 12.
Tilia sylvestris Dsf. I. 357. no. 1.
β. cordifolia v. major } Spach.
α. ovalifolia v. minor } Spach.
γ. rotundifolia } Spach.
— *Tecksiana* C. Bauh. I. 357. no. 2.
— *tomentosa* Mnch. I. 359. no. 8.
— truncata Spach. I. 359. no. 6.
— *ulmifolia* Scop. I. 357. no. 1.
— *vulgaris* Hayne. I. 357. no. 2.
TILIACEAE Endl. I. 352. II. 798. V. 115.
TILIACEAE Juss. I. 352. V. 115.
Tiliaceae verae Endl. I. 352. II. 798. V. 115.
Tiliacora racemosa Colebr. I. 94. no. 13.
Tillaea DC. II. 251. V. 791. no. 1.
Tillaea Micheli. II. 251. V. 791.
— alata Viv. II. 251. no. 1.
— angustifolia Nutt. II. 252. no. 13.
— *ascendens* Eaton. II. 252. no. 11.
— ascendens N. ab E. V. 791. no. 1.
— brevifolia Eckl. et Zeyh. II. 251. no. 10.
— Capensis Linn. fil. *II. 252. no. 14.
β. minor Eckl. et Zeyh.
— colorata N. ab E. V. 791. no. 2.
— Drummondii Torr. et Gr. II. 252. no. 12.
— Ecklonis Wlprs. II. 251. no. 8.
— elatinoides Eckl. et Zeyh. II. 251. no. 7.
— *erecta* Hook. II. 251. no. 2.
— filiformis Endl. II. 252. no. 15.
β. parvula.
— fluitans Endl. II. 252. no. 16.
β. intermedia.
γ. obovata.
— *hexandra* Lapierre. I. 284. no. 9. *α.*
— intricata N. ab E. V. 791. no. 3.
— macrantha J. D. Hook. II. 251. no. 3.
— minima Miers. II. 251. no. 2.
— moschata DC. *II. 251. no. 4.
— muscosa Linn. *II. 251. no. 6.
— *pedunculata* Sieb. II. 251. no. 5.
— perfoliata Linn. fil. II. 252. no. 18.
β. latifolia.
— *pharnaceoides* Hochstett. et Schmpr. II. 254. no. 22.
— reflexa Endl. II. 252. no 17.
— simplex Nutt. *II. 252. no. 11.
— trichotoma Eckl. et Zeyh. II. 251. no. 9.
— verticillaris DC. *II. 251. no. 5.
Timonius Rmph. *II. 487.
Timutua DC. I. 238. no. 66. 74.
Tinctoriae Wght. et Arn. (Indigofera) I. 669.
Tinguarra Parlatore. °V. 867.
— cervariaefolia Parlatore. V. 867. no. 1.
Tinus DC. VI. 7. no. 2.
Tithonia Dsf. II. 616.
— angustifolia Hook. et Arn. II. 616. no. 1.

Tithonia pachycephala Hook. et Arn. II. 616. no. 1.
Tithymali facie planta Aethiopica Pluken. IV. 154. no. 19.
Tittius Rmph. IV. 82. no. 2.
Tittmannia Brogn. I. 545.
— *alsinoides* Spr. III. 297. no. 1.
— *angustifolia* Bth. III. 293. no. 17.
— *Colsmanni* Bth. III. 289. no. 4.
— *elata* Bth. III. 296. no. 6.
— *erecta* Bth. III. 292. no. 5.
— *grandiflora* Spr. III. 293. no. 16. III. 298. no. 4.
— *hirta* Bth. III. 293. no. 10.
— lateriflora Brogn. *I. 545. no. 1.
— *monticola* Spr. III. 297. no. 3.
— *obovata* Bnge. III. 294. no. 24.
— *ovata* Bth. III. 292. no. 7.
— *ovata* Rchb. III. 292. no. 4.
— *pusilla* Bth. III. 293. no. 8. et 9.
— *scabra* Spr. III. 296. no. 10.
— *scapigera* Spr. III. 297. no. 2.
— *stachydifolia* Turczan. III. 294. no. 25.
— *subulata* Spr. III. 297. no. 3.
— *sulcata* Bth. III. 293. no. 8.
— *trichotoma* Bth. III. 292. no. 5.
— *viscosa* Rchb. III. 292. no. 7.
Tobinia acuminata Desvx. I. 521. no. 22.
— *coriacea* Desvx. I. 521. no. 20.
— *emarginata* Desvx. I. 521. no. 23.
— *spinosa* Desvx. I. 521. no. 21.
— *ternata* Desvx. I. 521. no. 24.
Tococa Aubl. II. 141. V. 711.
— acuminata Bth. V. 711. no. 1.
— aristata Bth. II. 141. no. 4.
— barbata Bth. II. 141. no. 5.
— bulbifera Mart. et Schrenk. *II. 141. no. 9.
— coronata Bth. II. 141. no. 2.
— formicaria Mart. *II. 141. no. 8.
— *macrosperma* Mart. II. 141. no. 1.
— planifolia Bth. II. 141. no. 7.
— platyphylla Bth. V. 711. no. 2.
— Rorcimi Bth. II. 141. no. 6.
— subnuda Bth. II. 141. no. 1.
— truncata Bth. II. 141. no. 3.
Tocoyena Aubl. II. 521. VI. 76.
— acutiflora Mart. II. 521. no. 5.
— Brasiliensis Mart. II. 521. no. 6.
— foetida Poepp. et Endl. II. 521. no. 1.
— hirsuta Moric. *VI. 76. no. 1.
— microdon Mart. II. 521. no. 4.
— velutina Mart. II. 521. no. 3.
— viscidula Mart. II. 521. no. 2.
Todaroa Parlatore. °V. 865.
— aurea Parlatore. V. 865. no 1.
Toddalia Juss. I. 522.
—? bilocularis Wght. et Arn. I. 522. no. 1. (III. Emend. p. 2.)
— floribunda Wall. I. 523. no. 2.
— *lanceolata* Lam. I. 523. no. 1.
— Megapotamica G. Don. I. 523. no. 3.
— *paniculata* Lam. I. 523. no. 2.
— venosa G. Don. I. 523. no. 4.
Tollatia Endl. II. 631.
— chrysanthemoides Endl. *II. 631. no. 1.
Tolmiea Torr. et Gr. II. 370.
— Menziesii Torr. et Gr. *II. 370. no. 1.
Tolpidium C. H. Schultz. II. 947.
Tolpis Adans. *II. 685. VI. 328.
Tolpis DC. (ex p.) II. 685.
— nobilis Hochstett. VI. 328. no. 1.
Toluifera Lour. I. 560.
— *Cochinchinensis* Lour. I. 560. no. 1.
Tolypangium Endl. VI. 367.
Tolypanthus Blume. II. 445.
Tomanthea DC. *II. 670.
— *Aucheri* DC. VI. 291. no. 3.
Tomba V. 764. no. 1.
Tomentosae Bth. (Mimosa) I. 875.
Tomex tomentosa Linn. IV. 127. no. 10.
Tommasinia Bertoloni. °V. 881.
— Kotschyi Boiss. V. 881. no. 3.
— Szowitsii Boiss. V. 881. no. 2.
— verticillaris Bertoloni. V. 881. no. 1.
Tonsella pyriformis G. Don. I. 402. no. 14.
Tonshia polypetala Ham. I. 368. no. 2.
Tontelea Aubl. I. 400.
— calypsoides Endl. I. 400. no. 4.
— erythroxyloides Endl. I. 400. no. 2.
— multiflora Endl. I. 401. 6.
— obtusifolia Endl. I. 400. no. 1.
— serrata Endl. I. 401. no. 7.
— undulata Endl. I. 400. no. 3.
— velutina Endl. I. 401. no. 5.
Tordyliopsis DC. *II. 417.
Tordylium Tournef. II. 417. V. 895.
— Cappadocicum Boiss. V. 896. no. 2.
— concinnum Ten. II. 417. no. 1.
— *humile* Ten. II. 417. no. 1.
— macropetalum Boiss. V. 895. no. 1.
Torenia Linn. III. 294. °III. 965. VI. 643.
— *alba* Hamilt. III. 292. no. 3. III. 294. no. 3.
— Asiatica Linn. III. 294. no. 3. VI. 643. †
— concolor Lindl. VI. 643. no. 1.
— cordifolia Rxb. III. 295. no. 5.
— *cordifolia* Bth. III. 294. no. 3.
— *crustacea* Cham. et Schlchtd. III. 292. no. 4.
— *diffusa* D. Don. III. 294. no. 3.
— *diffusa* Rxb. III. 294. no. 21.

Torenia edentula Griffith. III. 295. no. 4. VI. 643. †
—? *fimbriata* Grah. III. 296. no. 1.
— flaccida R. Br. III. 296. no. 11.
— flava Hamilt. III. 294. no. 2.
— *gracilis* Bth. III. 289. no. 4.
— *hians* Rxb. III. 294. no. 3.
— *hirsuta* Willd. III. 294. no. 3.
— *hirta* Cham. et Schlchtd. III. 293. no. 8.
— longiflora Morren. VI. 746.
— *lucida* Hamilt. III. 292. no. 4.
— minuta Blume. III. 295. no. 9.
— *molluginoides* Bth. III. 291. no. 2.
— *multiflora* Rxb. III. 294. no. 23.
— obtusa Blume. III. 295. no. 8.
— parviflora Hamilt. III. 295. no. 6.
— *peduncularis* Bth. III. 294. no. 3.
— *pedunculata* Willd. III. 295. no. 6.
— polygonoides Bth. III. 295. no. 7.
— racemosa Bth. III. 294. no. 1.
— scabra R. Br. III. 296. no. 10.
— *scabra* Grah. III. 296. no. 1.
— *sessiliflora* Bth. III. 293. no. 11.
— *vagans* Rxb. III. 294. no. 3.
— *varians* Rxb. III. 294. no. 22.
— *veronicaefolia* Willd. III. 295. no. 6.
Toricellia DC. *II. 430.
Torilis Adans. II. 421. V. 903.
— Friedrichsthalii Cesati. II. 421. no. 1.
— grandiflora Boiss. V. 903. no. 1.
— nodosa Gärtn. *II. 421. no. 2.
— *tuberculata* DC. V. 903. no. 1.
Tormentilla pusilla Willd. II. 27. no. 12.
Tortula aspera Roxb. IV. 35. no. 5.
Torvum (Solanum) G. Don. III. 78.
Toulicia Aubl. *I. 413. V. 360.
— Brasiliensis Casaretto. V. 360. no. 1.
Tounatea DC. I. 841.
Tournefortia Linn. VI. 555.
— acutiflora Martens et Galeotti. VI. 556. no. 9.
— asperrima Martens et Galeotti. VI. 556. no. 7.
— calycina Bth. VI. 555. no. 1.
— candida Wlprs. VI. 556. no. 11.
— capitata Martens et Galeotti. VI. 555. no. 5.
— chrysantha Wlprs. VI. 556. no. 10.
— densiflora Martens et Galeotti. VI. 556. no. 8.
— elliptica Martens et Galeotti. VI. 555. no. 6.
— leptostachya Bth. VI. 555. no. 2.
— obtusiflora Bth. VI. 555. no. 3.
— rufipila Bth. VI. 555. no. 4.
Touroulia Aubl. II. 434.
— Guianensis Aubl. *II. 434. no. 1.
Tourretia Dombey. *VI. 516.
Tovaria Rz. et Pav. I. 202. V. 55.
— pendula Rz. et Pav. *I. 202. no. 1. V. 55. no. 1.
Tovomita Aubl. I. 392. II. 810.
— Amazonica Wlprs. I. 392. no. 8.
— Brasiliensis Martius. I. 392. no. 3.
— calyptrata Schlchtd. I. 392. no. 6.
— clusiaefolia G. Don. *I. 392. no. 2.
— foliosa Prsl. I. 392. no. 7.
— fructipendula G. Don. I. 392. no. 4.
— macrophylla Wlprs. I. 392. no. 10.
— Madagascariensis G. Don. *I. 392. no. 1.
— microcarpa Wlprs. I. 392. no. 9.
— myriandra Bth. II. 810. no. 2.
— paniculata Cambess. I. 392. no. 5.
— umbellata Bth. II. 810. no. 1.
Townsendia Hook. II. 575. *II. 952. no. 11. II. 957.
— grandiflora Nutt. II. 957. no. 5.
— incana Nutt. II. 575. no. 2. *II. 957. no. 2.
— sericea Hook. II. 575. no. 1. *II. 957. no. 1.
— spathulata Nutt. II. 957. no. 3.
— strigosa Nutt. II. 957. no. 4.
Toxicophlaea Harvey. VI. 467.
— cestroides Alph. DC. *VI. 467. no. 1.
Toxocarpus Wght. et Arn. *VI. 481.
Tozzia Michel. III. 436. °III. 972. *VI. 654.
— alpina Linn. III. 436. no. 1.
— *alpina lutea, Alsines folio etc.* Micheli. III. 436. no. 1.
Trachelium Linn. *II. 711. *VI. 387.
— *Rumelianum* Hampe. VI. 382. no. 3.
Trachodes Don. *II. 690. *VI. 360.
Trachydium Lindl. II. 404. V. 869.
— Roylei Lindl. *II. 404. no. 1. V. 869. no. 1.
Trachylobium Hayne. I. 846.
— Gaertnerianum Hayne. I. 846. no. 3.
— Hornemannianum Hayne. I. 846. no. 2.
— Lamarckianum Hayne. I. 846. no. 4.
— Martianum Hayne. I. 846. no. 1.
Trachymene Rdge. II. 385. V. 840.
— candelabrum Bnge. V. 840. no. 3.
— conferta Gaudich. II. 385. no. 4.
— crassifolia Bth. II. 385. no. 3.
— filiformis Bnge. V. 840. no. 7.
— juncea Bnge. V. 840. no. 2.
— lanceolata Spr. II. 385. †
— pendula Bth. II. 385. no. 2.
— platyptera Bnge. V. 840. no. 5.
β. rupestris.
α. turfosa.
— ramosissima Bth. II. 385. no. 1.
— scabriuscula Bnge. V. 840. no. 4.
— stricta Bnge. V. 840. no. 6.
— teres Bnge. V. 840. no. 1.

Trachyphytum Nutt. II. 224.
— *albicaule* Nutt. II. 224. no. 6.
— *gracile* Nutt. II. 224. no. 6.
Trachysciadium DC. II. 392.
— *Capense* Eckl. et Zeyh. II. 392. no. 3.
Trachytelia DC. *I. 68.
Tragacanthacei DC. (Astragalus) I. 705. II. 871.
Tragacanthae DC. (Astragalus) I. 705. II. 871. V. 518.
Tragacanthoides Spach. (Cicer) II. 884.
Tragacanthoides Jaub. et Spach. (Ebenus) II. 899.
Tragium DC. II. 395. V. 854.
— *Dendroselinum* B. Webb. V. 855. no. 7.
Tragoceras Lssng. *II. 607.
Tragopogon Linn. *II. 689. V. 347.
— barbirostre Bischoff. VI. 732.
— caricifolium Boiss. VI. 348. no. 2.
— latifolium Boiss. VI. 347. no. 1.
— *mutabile* Hort. Paris. VI. 733.
— Persicum Boiss. VI. 348. no. 3.
Tragoriganum Bth. III. 709.
Tragoriganum Clus. III. 697. no. 1.
Tragoselinum DC. V. 854.
Traillia Lindl. *II. 762.
Tralliana Lour. *I. 539.
Trapa Linn. II. 100.
— natans Linn. *II. 100. no. 1.
Trapeae Endl. II. 100.
Trattinickia Willd. *I. 558.
Trautvetteria Fisch. et Mey. I. 59.
— grandis Nutt. I. 60. no. 2.
— palmata Fisch. et Mey. *I. 59. no. 1. (cum varr. *α*. *β*.)
Trechonaetes Miers. °VI. 615.
— laciniata Miers. VI. 615. no. 1.
— sativa Miers. VI. 615. no. 2.
Tremandra R. Br. *I. 249. V. 70.
— hirsuta Lindl. V. 70. †
— oppositifolia Steetz. V. 70. no. 1.
TREMANDREAE R. Br. I. 249. II. 770. V. 68.
Tremandropsis Steetz. V. 69.
Trembleya DC. II. 127. V. 699.
— calycina Cham. II. 128. no. 4.
— Neopyrenaica Naudin. V. 699. no. 3.
— paniculata Naudin. V. 700. no. 5.
— pentagona Naudin. V. 699. no. 2.
— phlogiformis DC. *II. 127. no. 2.
— pithyoides Cham. II. 128. no. 3.
— revoluta Naudin. V. 700. no. 6.
— rosmarinoides DC. *II. 127. no. 1.
— stachyoides Naudin. V. 699. no. 4.
— tridentata Naudin. V. 699. no. 1.
Trepocarpus Nutt. II. 417.
Trepocarpus Aethusae Nutt. *II. 417. no. 1.
— *brachycarpus* DC. II. 417. no. 1.
Trevesia Visiani. °V. 926.
— palmata Visiani. *V. 926. no. 1.
Trevirania discolor Poepp. et Endl. II. 719. no. 4.
— *divaricata* Poepp. et Endl. II. 719. no. 10. VI. 403. no. 12.
— *maculata* Martens et Galeotti. II. 719. no. 2.
— *maculata* Poepp. et Endl. II. 719. no. 3. VI. 403. no. 7.
— *mollis* Poepp. et Endl. II. 719. no. 7. VI. 403. no. 10.
— *scabra* Poepp. et Endl. II. 719. no. 5. VI. 403. no. 8.
— *tenerrima* Poepp. et Endl. II. 719. no. 8. VI. 403. no. 11.
— *urticaefolia* Poepp. et Endl. II. 719. no. 6. VI. 403. no. 9.
Triachne Cass. *II. 682.
— *pygmaea* Cass. VI. 321. no. 3.
Triaenia Russeggeri Fnzl. I. 391. no. 3.
Triaenoides Choisy. II. 808. no. 18.
Triangulares Bth. (Acacia) I. 888. V. 589.
Trianthaea DC. II. 945.
Trianthema Linn. II. 232.
— crystallina Vahl. *II. 232. no. 1. (cum var. *β*. ibid.)
— *crystallina* Wall. II. 232. no. 1. *β*.
— *monogyna* Madr. Herb. II. 232. no. 2.
— obcordata Rxb. II. 232. no. 2.
— *pentandra β. obcordata* DC. II. 232. no. 2.
— *polyandra* Blume. II. 233. no. 1.
— sedifolia Vis. II. 232. no. 3.
— *triquetra* Rottl. II. 232. no. 1.
Trianthus Hook. fil. °VI. 321.
— ulicinus Hook. fil. *VI. 321. no. 1.
Triaspis Burchell. °V. 295.
— flabellaris Adr. Juss. V. 296. no. 4.
— hypericoides Burch. V. 295. no. 1.
— Mozambica Adr. Juss. V. 295. no. 2.
— odorata Adr. Juss. V. 296. no. 3.
Tribuleae Endl. I. 493.
Tribulus Tournef. I. 493. II. 822. V. 385.
— *albus* Poir. I. 493. no. 1.
— bicornutus Fisch. et Mey. I. 493. no. 6.
— *bicornutus* Fisch. et Mey. II. 822. no. 2.
— bimucronatus Vis. I. 493. no. 2.
— *Brasiliensis* Spr. I. 493. no. 3.
— *cistoides* Endl. I. 493. no. 2.
— *humifusus* Thonn. et Schum. I. 493. no. 1.
— lanuginosus Linn. V. 385. no. 1.
— longepetalus Viv. I. 493. no. 3.
— macropterus Boiss. II. 822. no. 1.
— *maximus* Linn. I. 493. no. 1.

Tribulus Moluccanus Dcne. I. 493. no. 5.
— pubescens G. Don. I. 493. no. 4.
— terrestris Linn. I. 493. no. 1. *II. 822. no. 2.
β. albidus Friv. I. 493. no. I.
Tricalysia A. Rich. *II. 489.
Tricentrum DC. *II. 127.
Triceros Lour. *I. 560.
Trichantha Hook. °V. 395.
— major Hook. VI. 396. no. 2.
— minor Hook. V. 396. no 1.
Trichanthera Ehrnbrg. I. 498.
— modesta Ehrnbrg. *I. 498. no. 1.
Trichasma Wlprs. I. 630. II. 842.
— calycinum Wlprs. *I. 630. no. 2. *II. 842. no. 1.
— ciliatum Wlprs. I. 630. no. 1,
β. minor.
— *ciliatum* Wlprs. V. 510. no. 4.
Trichaurus Arn. II. 115.
— Aucherianus Dcne. II. 115. no. 3.
— ericoides Wght. et Arn. *II. 115. no. 1.
— pycnocarpus Dcne. II. 115. no. 4.
— vaginatus Dsvx. II. 115. no. 2.
Tricheroides DC. II. 533. no. 3.
Trichilia Linn. I. 432. II. 817. V. 375.
— *affinis* A. Juss. I. 433. no. 7.
— *alliacea* Forst. I. 430. no. 5.
— *bijuga* Labill. I. 429. no. 2.
— *Capensis* Pers. I. 431. no. 2.
— cathartica Mart. I. 433. no. 23.
— *Catigua* A. Juss. I. 433. no. 6.
— *cauliflora* Bnks. et Soland. I. 430. no. 3.
— discolor A. Juss. I. 432. no. 4.
— diversifolia A. Juss. I. 433. no. 17.
— *elegans* A. Juss. I. 433. no. 2.
— emetica Vahl. *I. 432. no. 1.
— *excelsa* Spr. I. 430. no. 7.
— glabra Macfd. I. 432. no. 9.
— *glabra* Linn. I. 432. no. 12.
— *glandulosa* Sm. I. 429. no. 1.
— *Guara* Aubl. I. 434. no. 6.
— *Halesia* Loefl. I. 432. no. 13.
— Havanensis Jcq. *I. 432. no. 12.
— heterophylla Willd. *I. 433. no. 21.
— hirta Linn. *I. 432. no. 5.
—(?) lepidota Mart. I. 433. no. 22.
— membranacea Macfd. I. 432. no. 6.
— minor A. Rich. II. 817. no. I.
— mollissima Spr. I. 430. no. 6.
— *monophylla* A. Rich. I. 253. no. 23.
— montana Kth. *I. 433. no. 18.
— *moschata* β. DC. I. 433. no. 4.
— *moschata* Swrtz. I. 433. no. 5.
— multiflora Casaretto. V. 375. no. 1.
— *nervosa* Vahl. I. 431. no. 1.
— *octandra* Soland. I. 429. no. 1.
Trichilia odorata Andr. I. 433. no. 4.
— pallida Swrtz. *I. 433. no. 19.
— Portoricensis Spr. *I. 432. no. 14.
— Pricureana A. Juss. I. 432. no. 2.
— pteleaefolia A. Juss. I. 432. no. 15.
— *pubescens* A. Rich. I. 434. no. 10.
— quadrijuga Kth. *I. 432. no. 11.
— *Richardiana* A. Juss. I. 433. no. 1.
— Rüppelliana Fresenius. I. 432. no. 3.
— simplicifolia Spr. *I. 433. no. 16.
— *spectabilis* Forst. I. 430. no. 3.
— *spinosa* Willd. I. 379. no. 1. (cum varr. α. et β. ibid.)
— spondioides Linn. *I. 432. no. 7.
— terminalis Jcq. *I. 432. no. 8.
— *terminalis* Jcq.? I. 432. no. 9.
— tomentosa Kth. *I. 432. no. 10.
— trifoliata Linn. I. 432. no. 13.
— Trinitensis A. Juss. I. 433. no. 20.
— *venosa* Spr. I. 431. no. 1.
Trichilieae Adr. Juss. I. 428.
Trichlis pentastemon Hall. II. 241. no. 4. *a.*
Trichoa Pers. I. 95.
— concolor Endl. I. 95. no. 1.
Trichocephalum Koch. II. 851.
Trichocladus Pers. II. 434. II. 940.
— ellipticus Eckl. et Zeyh. II. 434. no. 1.
— peltatus Meisn. II. 940. no. 1.
—? verticillatus Eckl. et Zeyh. II. 434. no. 2.
Trichocline Cass. II. 680. *VI. 317.
— pedicularifolia Wlprs. II. 680. no. 1.
Trichodesma R. Br. *VI. 564.
Trichogalium DC. II. 457. VI. 13. VI. 699. no. 8.
Trichogonia Gardn. °VI. 704.
— campestris Gardn. VI. 704. no. 1.
— multiflora Gardn. VI. 705. no. 2.
— salviaefolia Gardn. VI. 705. no. 3.
Trichogyne Lssng. II. 648. *VI. 249.
— *cauliflora* DC. II. 648. no. 2.
— *paronychioides* DC. II. 649. no. 3.
— *verticillata* Lssng. II. 648. no. 1.
Tricholepis DC. II. 670. VI. 292.
— glaberrima DC. *II. 670. no. 1.
— nigricans Edgwrth. VI. 292. no. 1.
Tricholoma Bth. *VI. 644.
Trichomeria caesia Nutt. II. 76. no. 4.
— *diffusa* Nutt. II. 76. no. 1.
— *micrantha* Nutt. II. 77. no. 6.
— *racemosa* Nutt. II. 76. no. 5.
— *ramosissima* Nutt. II. 76. no. 3.
Trichophyllum integrifolium Hook. VI. 175. no. 2.
— *multiflorum* Nutt. II. 626. no. 3. VI. 175. no. 2.
Trichora DC. VI. 85. no. 2.

Trichosandra Dcne. *VI. 493.
Trichosanthes Linn. II. 202.
— anguina Linn. II. 203. †
— *anguina* Wall. II. 203. no. 3. β.
— *cordata* Wall. II. 203. no. 3. γ.
— *corniculata* Lam. II. 202. no. 1.
— Cucumeria Linn. *II. 202. no. 2. (c. varr. α. β. et γ. ibid.)
— *cucumerina* Rottl. II. 203. no. 3. γ.
— *foetidissima* Jcq. II. 197. no. 1.
— *Kakidonda* Rxb. II. 203. no. 3. β.
— *laciniosa* Madr. Herb. II. 202. no. 2. β.
— *laciniosa* Wght. II. 203. no. 3. β.
— palmata Rxb. II. 202. no. 3. (cum varr. β. et γ.)
— *palmata* Rxb. II. 203. no. 3. β.
— tuberosa Willd. *II. 202. no. 1.
Trichoseris Rüppelii C. H. Schultz. VI. 697. no. 1.
Trichosiphon Endl. V. 103. no. 3.
Trichospermum Blume. I. 202.
— Javanicum Blume. *I. 202. no. 1.
Trichosphaeria Bth. III. 537.
Trichospira H. B. Kth. *II. 543.
Trichosporum albidum N. ab E. VI. 521. no. 5.
— *pulchrum* Blume. VI. 521. no. 2.
— *radicans* Blume. VI. 521. no. 3.
Trichostema brachiota Linn. III. 585. no. 1.
Trichostemma R. Br. *II. 702. no. 7.
Trichostemma Linn. III. 902. °III. 991.
— *brachiatum* Lam. III. 902. no. 1.
— dichotomum Linn. III. 902. no. 2.
— *dichotomum* Roth. III. 902. no. 1.
— lanatum Bth. III. 903. no. 5.
— lanceolatum Bth. III. 903. no. 4.
— lineare Nutt. III. 902. no. 1.
— oblongum Bth. III. 902. no. 3.
— *pilosum* Roth. III. 902. no. 2.
Trichostylis Griseb. VI. 501. no. 2.
Tricomaria Hook. et Arn. °V. 284.
— Usillo Hook. et Arn. V. 285. no. 1.
Tricuspidaria Rz. et Pav. *I. 366.
Tricuspidarieae Endl. I. 365.
Tridactylina C. H. Schultz. °VI. 208.
— Kirilowii C. H. Schultz. *VI. 208. no. 1.
Tridax Linn. *II. 630.
Tridesmis Spach. *I. 391.
Tridia Korthls. I. 286.
— frankenioides Korthls. *I. 286. no. 1.
Trientalis Linn. *VI. 446.
Trifoliastrum Ser. II. 852.
Trifolieae DC. I. 635. II. 847. V. 512.
Trifoliolatae (Indigofera) I. 662.
Trifolium Tournef. I. 639. (I. 643.** cf. III. Emend. p. 3.) II. 850. V. 512.
Trifolium aciculare Torr. et Gr. I. 644. no. 54.
— affine Prsl. I. 646. no. 71.
— *affine* Prsl. II. 850. no. 4.
— Africanum Ser. *I. 641. no. 29.
— *albidum* Stev. II. 850. no. 3.
— albopurpureum Torr. et Gr. I. 643. no. 39.
— alpestre Linn. I. 647. †
— altissimum Dougl. I. 642. no. 36.
— amphianthum Torr. et Gr. I. 644. no. 48.
— amplectens Torr. et Gr. I. 645. no. 60.
— Anatolicum Boiss. II. 852. no. 14.
— Andinum Nutt. I. 643. no. 42. (III. Emend. p. 3.)
— *atropurpureum* Nutt. I. 644. no. 53. α.
— aurantiacum Boiss. et Sprun. II. 852. no. 17.
— Bejariense Moric. I. 646. no. 69.
— bilineatum Fresen. I. 641. no. 25.
— *Bocconi β. longiflorum* Bory et Chaub. II. 851. no. 7.
— Brutium Ten. I. 639. no. 4.
— Burchellianum Ser. I. 641. no. 28.
— calocephalum Fresen. I. 641. no. 21.
— *calocephalum* Nutt. I. 644. no. 53. β.
— calycinum Wlprs. I. 640. no. 13.
— capillatum Dumort. I. 639. no. 1.
— Carolinianum Michx. *I. 644. no. 49.
— Caucasicum Tausch. I. 642. no. 34.
— Cherleri Linn. I. 647. †
— Chilense Hook. et Arn. I. 646. no. 66.
— chrysopogon Viv. I. 641. no. 27.
— *coerulescens* M. B. I. 638. no. 14.
— coeruleum Viv. I. 641. no. 26.
— commutatum Ledeb. II. 850. no. 3.
— congestum Guss. I. 639. no. 5.
— cordifolium Montbr. et Auch. I. 640. no. 12.
— cryptoscias Griseb. II. 853. no. 21.
— cyathiferum Lindl. I. 645. no. 63.
— dasyphyllum Torr. et Gr. I. 643. no. 44.
— dasyurum Prsl. I. 640. no. 15.
— dichotomum Hook. et Arn. I. 643. no. 40.
— eriocephalum Ledeb. II. 850. no. 2.
— eriocephalum Nutt. I. 642. no. 38.
— erubescens Fnzl. I. 642. no. 33.
— eximium Stev. I. 647. †
— fimbriatum Lindl. I. 644. no. 51.
— flavum Prsl. I. 640. no. 11.
— fucatum Lindl. I. 645. no. 59.
— fulcratum Griseb. II. 853. no. 19.
— glabellum Prsl. I. 639. no. 8.
— glanduliferum Boiss. II. 852. no. 12.
— gracilentum Torr. et Gr. I. 643. no. 46.
— *grandiflorum* Ldb. I. 647. †
— gymnocarpon Nutt. I. 646. no. 64.

Trifolium heterodon Torr. et Gr. I. 644. no. 53. (cum varr. α. β. et γ.)
— hirsutum Thnbrg. I. 642. no. 31.
β. glabellum.
— hybridum Linn. I. 647. †
β. pingue Griseb. II. 853. no. 20.
— intermedium Guss. I. 639. no. 6.
— involucratum Willd. *I. 644. no. 54.
— lappaceum Linn. I. 647. †
— *lasiocephalum* Lnk. I. 642. no. 31.
— leiocalycinum Boiss. et Sprun. II. 852. no. 15.
— leucanthum M. Bieb. I. 647. †
— *Libanoticum* Ehrnbrg. II. 851. no. 10.
— longipes Nutt. I. 643. no. 41.
— Macraei Hook. et Arn. I. 646. no. 65.
— *macrocalyx* Hook. I. 646. no. 69.
— macropodum Wlprs. I. 640. no. 14.
— Marsicum Ten. II. 850. no. 1.
— melananthum Hook. et Arn. I. 645. no. 61.
— Mesogitanum Boiss. II. 852. no. 18.
— *microcephalum β. glabrum* Hook. I. 644. no. 50.
— microdon Hook. et Arn. I. 644. no. 55.
— micropetalum E. Mey. I. 642. no. 30. (c. varr. α. et β. ibid.)
— nanum Torr. I. 643. no. 43.
— neglectum Fisch. Mey. et Lallem. V. 512. no. 2.
— nervosum Prsl. I. 639. no. 9.
— nidificum Griseb. II. 853. no. 22.
— obtusiflorum Hook. I. 645. no. 57. (III. Emend. p. 3.)
— Oliverianum Ser. II. 851. no. 10.
— Ottonis Sprun. II. 851. no. 9.
— ovatifolium Bory et Chaub. I. 640. no. 17.
— *oxypetalum* Fisch. et Mey. I. 644. no. 49.
— Palavicum Hochstett. V. 512. no. 1.
— pallidum Waldst. et Kit. I. 647. †
— Panormitanum Prsl. I. 640. no. 10.
— Parnassi Boiss. et Sprun. II. 852. no. 13.
— patulum Tausch. I. 639. no. 3.
— pauciflorum Nutt. I. 645. no. 58. (III. Emend. p. 3.)
— Peruvianum Vogel. I. 646. no. 70.
— phleoides Linn. I. 647. †
— physanthum Hook. et Arn. I. 646. no. 67.
— *physopetalum* Fisch. et Mey. I. 645. no. 59.
— pilulare Boiss. II. 851. no. 11.
— platycephalum Bischof. I. 644. no. 47.
— plumosum Dougl. I. 642. no. 37.
— polyphyllum C. A. Mey. I. 642. no. 35.
— polyphyllum Nutt. I. 645. no. 56.
— polystachyum Fresen. I. 640. no. 20.
— Praetutianum Guss. I. 647. †
Trifolium Preslianum Boiss. II. 850. no. 4.
— *psoraleoides* Walt. I. 659. no. 54.
— radiosum Whlnbrg. I. 640. no. 18.
— *radiosum* Whlnbrg. II. 851. no. 10.
— reflexum Linn. I. 647. †
— repens β. alpestre Guss. I. 639. no. 2.
— Rüppellianum Fresen. I. 641. no. 22.
— Russaeanum Boiss. II. 851. no. 6.
— scabrum Linn. var. β. Bory et Chaub. I. 640. no. 16.
— scutatum Boiss. II. 851. no. 8.
— setiferum Boiss. II. 852. no. 16.
— semipilosum Fresen. I. 641. no. 24.
— Simense Fresen. I. 640. no. 19.
— Smyrnaeum Boiss. II. 850. no. 5.
— speciosum Willd. I. 647. †
— spinulosum Dougl. I. 644. no. 52. (cum var. β. ibid.)
— *squarrosum* Savi. II. 850. no. 3.
— *sqarrosum β. elatum* Ten. II. 850. no. 1.
— spumosum Linn. I. 647. †
— stoloniferum Mühlb. I. 643. no. 45.
— *stramineum* Guss. II. 851. no. 7.
— stramineum Prsl. I. 639. no. 7.
— Tembense Fresen. I. 641. no. 23.
— Tenoreanum Boiss. et Sprun. II. 851. no. 7.
— *tenuifolium* Ten. II. 851. no. 7.
— tomentosum Linn. I. 647. †
— triaristatum Bertero. I. 646. no. 68
— *tridentatum* Lindl. I. 644. no. 54
— *umbellatum* Ser. I. 644. no. 49.
— uniflorum Linn. I. 647. †
— variegatum Nutt. I. 644. no. 50.
— *variegatum β.* Torr. et Gr. I. 645. no. 61.
— vesiculosum Linn. I. 647. †
— *Willdenowii* Spr. I. 644. no. 54.
— Wormskioldii Lehm. I. 645. no. 62.
— xerocephalum Fnzl. I. 642. no. 32.
Trigonella Linn. I. 636. II. 847.
— *Americanum* Nutt. I. 650. no. 26.
— Arabica Delile. I. 637. no. 3.
— arcuata C. A. Mey. I. 637. no. 7.
— arguta Vis. I. 637. no. 12.
— astroites Fisch. et Mey. I. 637. no. 9.
— Aucheri Boiss. II. 849. no. 14.
— aurantiaca Boiss. II. 848. no. 8.
— azurea C. A. Mey. I. 638. no. 14.
— biflora Griseb. II. 849. no. 11.
— brachycarpa Spr. I. 636. no. 2.
— Cachemirica Cambess. I. 638. no. 20.
— *Cachemirica* Cambess. II. 905. no. 2.
— capitata Boiss. II. 847. no. 1.
— Cariensis Boiss. II. 848. no. 5.
— corniculata Linn. II. 849. †
— crassipes Boiss. II. 849. no. 10.

Trigonella dura Vis. I. 637. no. 11.
— elliptica Boiss. II. 849. no. 13.
— Emodi Bth. I. 638. no. 17.
— ensifera Trautv. I. 637. no. 4.
— fimbriata Royle. I. 638. no. 19.
— gracilis Bth. I. 638. no. 16.
— incisa Bth. I. 637. no. 6.
— *Indica* Linn. I. 606. no. 1.
— littoralis Guss. I. 637. no. 10.
— lunata Boiss. II. 849. no. 12.
— macrorhyncha Boiss. II. 848. no. 6.
— maritima Delile. I. 638. †
— microcarpa Fresen. I. 637. no. 13.
— monantha C. A. Mey. I. 637. no. 8.
— obcordata Wall. I. 638. no. 18.
— orthoceras Kar. et Kiril. I. 637. no. 5.
— ovalis Boiss. I. 636. no. 1.
— pecten Schenk. I. 638. no. 15.
— Persica Boiss. II. 848. no. 9.
— *platycarpos* Linn. II. 847. no. 1.
— prostrata DC. I. 638. †
— *Ruthenica* Linn. II. 847. no. 2.
— Smyrnaea Boiss. II. 848. no. 4.
— Spruneriana Boiss. II. 847. no. 2.
— tenuissima Lindl. II. 849. no. 15.
— *tetrapetala* Rxb. I. 759. no. 2.
— *tomentosa* Thnbrg. I. 657. no. 26. et 27.
— torulosa Griseb. II. 848. no. 7.
— velutina Boiss. II. 848. no. 3.
— *villosa* Thnbrg. I. 657. no. 26.
Trigonelloides Jaub. et Spach. II. 844.
Trigonia Aubl. I. 248. II. 769.
— Cepo Cambess. I. 249. no. 3.
— crotonoides Cambess. I. 249. no. 4.
β. incana.
γ. oblongifolia.
— macrocarpa Bth. II. 769. no. 1.
— nivea Cambess. I. 248. no. 1.
— subcymosa Bth. II. 769. no. 2.
Trigoniaceae Endl. I. 248.
Trigonocapsa Blume. II. 123.
Trigonocoelae Torr. et Gr. (Valerianella) II. 527.
Trigonosciadium Boiss. °V. 895.
— tuberosum Boiss. V. 895. no. 1.
Trigonospermum Lssng. *II. 604.
Trigonotheca Hochstett. V. 146.
— *Natalensis* C. H. Schultz. VI. 157. no. 1.
— serrata Hochstett. V. 146. no. 1.
Triguera Cav. III. 124. °III. 956.
— ambrosiaca Cav. III. 124. no. 1.
— *baccata* Gmel. III. 124. no. 1.
— inodora Cav. III. 124. no. 2.
Trigynaea Schlchtd. *I. 91.
— *oblongifolia* Schlchtd. I. 80. no. 58.
Trilepisium Thouars. *II. 7.
Trilisa DC. II. 551.
Trilix Linn. *I. 363. *V. 120.
Trimeris Prsl. II. 706.
Trimeris Prsl. *II. 709.
Trimetra Moç. *II. 701.
Trimorphaea Cass. II. 579. VI. 124. no. 18.
Trimorphaea DC. (ex p.) II. 579.
Trimundia Endl. I. 245.
Trinchinettia Endl. *II. 629. VI. 180.
— caleoides Endl. *VI. 180. no. 1.
Trinervatae DC. (Baccharis) II. 595.
Trinetra Moç. et Sess. *II. 702. no. 8.
Trineuron Hook. fil. °VI. 226.
— spathulatum Hook. fil. VI. 227. no. 1.
Trinia Hffm. II. 392.
— seseloides Ldb. *II. 392. no. 1.
— Swellendamensis Eckl. et Zeyh. II. 392. no. 3.
— Uitenhagensis Eckl. et Zeyh. II. 392. no. 2.
Trinogeton Bth. °VI. 615.
— maritimum Bth. VI. 615. no. 1.
Triodon DC. *II. 466. VI. 30.
— angulatum Bth. VI. 30. no. 1.
— laxum Bth. VI. 30. no. 2.
Trionum DC. I. 302. no. 1. I. 306. no. 53.
Trionychion Wallrth. III. 457.
Triopteris acuminata Willd. V. 303. no. 6.
— *acutifolia* Willd. V. 312. no. 31.
— *argentea* Slzm. V. 225. no. 5.
— *bifurca* Grtnr. V. 303. no. 7.
— *Brasiliensis* Poir. V. 243. no. 48.
— *buxifolia* Willd. V. 314. no. 38.
— *citrifolia* Swrtz. V. 303. no. 7.
— *discolor* F. W. Mey. V. 305. no. 12.
— *divaricata* A. Rich. V. 239. no. 39.
— *Hiraea* Grtnr. V. 335. no. 42.
— *inaequalis* Raeusch. V. 303. no. 7.
— *Indica* Willd. V. 298. no. 4.
— *Jamaicensis* Nees et Mart. V. 274. no. 56.
— *lingulata* Poir. V. 219. no. 45.
— *Mexicana* Hook. et Arn. V. 314. no. 37.
— *odorata* Poir. V. 296. no. 3.
— *pinnata* Poir. V. 296. no. 4.
— *quadrialata* Pav. V. 314. no. 37.
— *reclinata* Cavanilles. V. 335. no. 42.
Triopterys Linn. °V. 299.
— *Havanensis* H. B. Kth. V. 300. no. 3.
— Jamaicensis Linn. V. 299. no. 1.
— *Jamaicensis* Swrtz. V. 300. no. 2.
— lancifolia Adr. Juss. V. 312. no. 33.
— *lucida* H. B. Kth. V. 300. no. 3.
— *macrophylla* Slz. V. 333. no. 35.
— ovata Cavan. V. 300. no. 2.
— *polycarpa* Slzm. V. 330. no. 28.
— rigida Swrtz. V. 300. no. 3.
— *sericea* Schlchtd. V. 346. no. 3.

Triopterys volubilis Slzm. V. 322. no. 9.
Triosteum Linn. II. 450.
— perfoliatum Linn. *II. 450. no. 1.
Tripetaleia Siebold et Zucc. °V. 139.
— paniculata Siebold et Zucc. V. 139. no. 1.
Tripetelus Lindl. II. 454.
— Australasicus Lindl. *II. 454. no. 1.
Triphaca Africana Lour. V. 98. no. 9.
Triphasia Lour. I. 379. II. 804.
— *aurantiola* Lour. I. 379. no. 1.
— sarmentosa Blume. II. 804. no. 1.
— trifoliata DC. *I. 379. no. 1.
Triphelia R. Br. II. 153.
Triphelia R. Br. V. 727.
— brunioides R. Br. *II. 153. no. 1.
— *brunioides* R. Br. V. 727. no. 1.
Triphysaria Fisch. et Mey. III. 397. °III. 971.
— versicolor Fisch. et Mey. *III. 397. no. 1.
Tripinnaria Pers. *VI. 517.
Triplandron Bth. °V. 145.
— lineatum Bth. V. 145. no. 1.
Triplectrum Don. II. 143. V. 712.
— radicans Don. *II. 143. no. 1. V. 712. no. 1.
Tripleurospermum C. H. Schultz. °VI. 196.
— disciforme C. H. Schultz. *VI. 197. no. 2.
— inodorum C. H. Schultz. VI. 196. no. 1.
Triplinerviae (Solidago) Torr. et Gr. II 965.
Triplopappus Torr. et Gr. II. 577.
Triplostegia Wall. *II. 531.
Tripolium Nees ab E. *II. 575. *II. 952. no. 1.
— *angustum* Lindl. II. 573. no. 123.
— *divaricatum* Nutt. II. 574. no. 125.
— *flexuosum* N. ab E. II. 573. no. 122.
— *frondosum* Nutt. II. 574. no. 130.
— *imbricatum* Nutt. II. 574. no. 131.
— *occidentale* Nutt. II. 574. no. 129.
— *Oreganum* Nutt. II. 574. no. 126.
— *paludosum* N. ab E. II. 360. no. 10.
— *subulatum* N. ab E. II. 573. no. 124. II. 574. no. 128.
Tripteris Lssng. *II. 665.
— *Aghillana* DC. VI. 273. no. 1. β.
— *Kraussii* C. H. Schult. VI. 273. no. 1.
— *setifera* DC. VI. 273. no. 1. *a*.
Tripterospermum Blume. *VI. 507.
Triptilion Rz. et Pav. II. 682. *VI. 321.
— spinosum Rz. et Pav. *II. 682. no. 1.
Triptolemaea Mart. I. 800.
— glabra Bth. I. 801. no. 7.
— latifolia Bth. I. 801. no. 6.
— montana Mart. I. 801. no. 4.
— myriantha Mart. I. 800. no. 1.
— pauciflora Mart. I. 801. no. 3.
— platycarpa Bth. I. 801. no. 2. (c. var. β.)
Triptolemaea pubescens Bth. I. 801. no. 8.
— riparia Mart. I. 801. no. 5.
Trischidium Tulasne. °V. 565.
— vestitum Tulasne. *V. 565. no. 1.
Tristania R. Br. II. 160. *II. 927. *V. 744.
— *albens* Cunn. II. 161. no. 1.
— *arborescens* Ait. II. 161. no. 1.
— *arborescens* Ldb. II. 161. no. 1.
— *depressa* Lnk. II. 161. no. 2.
— macrophylla A. Cunn. II. 160. no. 6.
— neriifolia R. Br. II. 160. †
— obovata R. Br. Br. II. 160. no. 1.
— psidioides A. Cunn. II. 160. no. 4.
— salicina A. Cunn. II. 160. no. 5.
— subverticillata Wendl. II. 160. no. 2.
— umbrosa A. Cunn. II. 160. no. 3.
Tristellateia Pet. Thouars. °V. 290.
— Australasica A. Rich. V. 290. no. 1. (V. 335. no. 42.)
— Bernierana Adr. Juss. V. 292. no. 5.
— Bojeriana Adr. Juss. V. 292. no. 6.
— cocculifolia Adr. Juss. V. 293. no. 7.
— dulcamara Adr. Juss. V. 293. no. 8.
— heterophylla Adr. Juss. V. 291. no. 3.
— Madagascariensis Poir. V. 291. no. 2.
— montana Adr. Juss. V. 292. no. 4.
— *Novaeguineensis* Blume. V. 291. no. 1.
Tristemma Juss. II. 132.
— *angustifolium* Blume II. 135. no. 1.
— erectum Guill. et Perr. II. 132. no. 2.
— *incompletum* R. Br. II. 132. no. 1.
— Schumacheri Guill. et Perr. II. 132. no. 1.
Tristerix Mart. II. 444.
Triticum Vaccinium Dodon. III. 435. no. 3.
Tritomopterys Adr. Juss. V. 344.
Triumfetta Plum. I. 355. II. 799. V. 118.
— abutiloides St. Hil. I. 357. no. 23.
— *annua* D. Don .I. 355. no. 8.
— cana Blume. I. 355. no. 6.
— chrysotricha Bojer. V. 119. no. 5.
— cordifolia Guill. et Perr. I. 356. no. 15.
— dumetorum Schlchtd. I. 356. no. 17.
— eriocarpa St. Hil. I. 357. no. 25.
— glabra Hb. Miss. I. 356. no. 10.
— graveolens Blume. I. 355. no. 5.
— grossulariaefolia A. Rich. V. 118. no. 3.
— guazumaefolia Bojer. V. 119. no. 4.
— hispida A. Rich. V. 118. no. 2.
— longicoma St. Hil. I. 356. no. 20.
— longiseta Guill. et Perr. I. 356. no. 16.
—? microphylla Wght. et Arn. I. 356. no. 12.
— mollis Schum. I. 356. no. 14.
— neglecta Wght. et Arn. I. 356. no. 11.
— nemoralis St. Hil. I. 356. no. 19.
— Nepaulensis G. Don. I. 355. no. 8.
— oblonga Wall. I. 355. no. 7.

Triumfetta obovata Schlchtd. II. 799. no. 1.
— obscura St. Hil. I. 357. no. 22.
— pentandra Guill. et Perr. I. 356. no. 13.
— *procumbens* Hort. V. 119. no. 7.
— pseudo-angulata Blume. I. 355. no. 1.
— radicans Bojer. V. 119. no. 7.
— riparia Hochst. V. 119. no. 8.
— sepium St. Hil. I. 356. no. 21.
— spicata Blume. I. 355. no. 2.
— suffruticosa Blume. I. 355. no. 4.
— Surinamensis Steudel. V. 118. no. 1.
— tomentosa Bojer. V. 119. no. 6.
— tricuspis St. Hil. I. 357. no. 24.
— ulmifolia Desvx. I. 356. no. 18.
— vestita Wall. I. 355. no. 9.
— villosiuscula Blume. I. 355. no. 3.
Trixago Steven. III. 408.
Trixago Steven. * VI. 653.
— *altius serratis foliis* Barrel. III 408. no. 6.
— *Apula unicaulis* Columm. III. 408. no. 6. β.
— *arvensis* Hoffmnsgg. et Lnk. III. 831. no. 65.
— *carnea* Griseb. III. 409. no. 8.
— *colorata* Prsl. III. 831. no. 65.
— *cordifolia* Mnch. III. 831. no. 65.
— *latifolia* Rchb. III. 408. no. 4.
— *purpurea* Steven. III. 408. no. 4.
— *scordifolia* Rchb. III. 409. no. 9.
— *viscosa* Rchb. III. 408. no. 5.
Trixideae Lssng. II. 682. VI. 322.
Trixis P. Br. II. 682. * VI. 324.
— Ehrenbergii Knze. II. 683. no. 3.
— latifolia Hook. et Arn. II. 682. no. 2.
— obvallata Hook. et Arn. II. 682. no. 1.
Trochetia DC. * I. 350. V. 114.
— grandiflora Lindl. V. 114. no. 1.
Trochiscanthes Koch. * II. 404.
Trochocarpa R. Br. * II. 732.
Trochodendron Sieb. et Zucc. I. 72. II. 747.
— aralioides Sieb. et Zucc. * I. 72. no. 1. * II. 747. no. 1.
Trochoseris Poepp. et Endl. II. 695. 696.
— *alpina* Poepp. et Endl. VI. 356. no. 1.
— *pterocarpa* Poepp. et Endl. VI. 356. no. 2.
Trochostigma Sieb. et Zucc. ° V. 131.
— argutum Sieb. et Zucc. V. 131. no. 2.
— polygamum Sieb. et Zucc. V. 132. no. 4.
— repandum Sieb. et Zucc. V. 132. no. 3.
— rufum Sieb. et Zucc. V. 131. no. 1.
— volubile Sieb. et Zucc. V. 132. no. 5.
Trollius Linn. I. 47. II. 740.
— acaulis Lindl. II. 740. no. 1.
— *Americanus* Mühlnbrg. I. 47. no. 7.
— aureus Tausch. II. 740. no. 2.
— *Caucasicus* Hort. II. 740. no. 2. et no. 3.
— Chinensis Bnge. I. 47. no. 2.
Trollius Europaeus Linn. * I. 47. no. 1.
γ. altissimus Rchb.
α. humilis Rchb.
β. medius Wndrth.
— grandiflorus Tausch. II. 740. no. 3.
— laxus Salisb. I. 47. no. 7.
— lilacinus Bnge. I. 47. no. 3.
— *lilacinus* Bnge. II. 741. no. 1.
— *patulus* α. DC. I. 47. no. 4. et †
— pumilus Don. I. 47. no. 6.
— Riederianus Fisch. et Mey. I. 47. no. 4.
— Somcheticus C. Koch. I. 47. no. 5.
— viridis Mielichh. II. 741. no. 4.
Trongum hortense Rmph. III. 81. no. 319. a. b.
— *pra rubrum* Rmph. III. 84. no. 333.
— *spinosum agreste* Rmph. III. 84. no. 332.
TRDPAEOLEAE Juss. I. 465. II. 820. V. 381.
Tropaeolum Linn. I. 465. II. 820. V. 381.
— azureum Bert. I. 465. no. 2. II. 820. † V. 381. no. 1.
— *azureum* Hook. V. 381. no. 2.
var. *obscurum* Van Houtte. V. 381. no. 2.
— brachyceras Hook et Arn. I. 465. no. 3. V. 382. †
— Brasiliense Casaretto. V. 381. no. 4.
— Bridgesii Gardn. V. 381. no. 3.
— Chilense Bert. I. 465. no. 1.
— ciliatum Rz. et Pav. I. 466. †
— cirrhipes Hook. I. 466. no. 12.
— *coccineum* Miers. I. 466. no. 10.
— edule Rz. et Pav. V. 382. †
— elegans G. Don. I. 465. no. 6.
— Haynianum Bernhardi. II. 820. no. 1.
— leptophyllum G. Don. I. 465. no. 5.
— Lobbianum Hook. V. 382. no. 6.
— majus β. atrosanguineum Sweet. I. 466. † V. 382. †
— *minimum* Miers. I. 465. no. 3.
— Moritzianum Kltzsch. I. 466. no. 11. (III. Emend. p. 2.) V. 382. †
— mucronatum Meyen. * V. 382.
— orthoceras Gardn. II. 820. no. 2.
— peltophorum Bth. V. 382. no. 5.
— *pentaphyllum* Lam. I. 465. no. 1.
— peregrinum Linn. I. 466. †
— polyphyllum Cav. * I. 466. no. 8. V. 382. †
β. brevicaule } Poepp. et Endl. I. 466.
α. myriophyllum } no. 8.
— *prostratum* Miers. I. 466. no. 8.
— sessilifolium Poepp. et Endl. I. 466. no. 9.
— speciosum Poepp. et Endl. I. 466. no. 7.
— tenellum G. Don. I. 465. no. 4.
— tricolor Lindl. I. 466. no. 10. V. 382. †
β. majus venustum Paxton. V. 382. †

Tropaeolum tricolorum Sweet. I. 466. no. 10.
— trimaculatum Hort. *II. 820. no. 3.
— tuberosum Rz. et Pav. I. 466.† V. 382.†
— violaeflorum A. Dietr. V. 381. no. 2.
Trophospermum C. A. Mey. I. 171.
— Altaicum C. A. Mey. *I. 171. no. 1.
Tropidocarpus Hoock. I. 167.
— gracilis Hook. I. 167. no. 1.
— scabriusculus Hook. I. 167. no. 2.
Troximeria Nutt. II. 695.
Troximon Grtnr. II. 685. *VI. 328. *VI. 366.
— *apargioides* Lssng. II. 696. no. 4.
— *aurantiacum* Hook. II. 695. no. 1.
— cuspidatum Prsh. *II. 685. no. 1.
— glaucum Nutt. II. 685. no. 2.
β. dasycephalum.
— glaucum Richards. II. 685. no. 2
— *marginatum* Nutt. II. 685. no. 1.
— parviflorum Nutt. II. 685. no. 3.
— *pumilum* Nutt. II. 685. no. 2. (in adn. diagn.) II. 695. no. 1.
— roseum Nutt. II. 686. no. 4.
— taraxacifolium Nutt. II. 686. no. 5.
Truncaria DC. *II. 120.
Tryptomene Endl. II. 157. °V. 732.
— australis Endl. *II. 157. no. 1. V. 732.
— no. 2.
— saxicola Schauer. V. 732. no. 1.
Tschudya DC. II. 138. V. 709.
— *inopogon* Mart. II. 140. no. 19.
Tsiam-Cumulu Rheede. III. 481. no. 1.
Tsieria manga Nari Rheede. III. 273. no. 7.
Tsjadaen Rheede. III. 815. no. 5.
Tsjerneaniran Adans. II. 803. no. 1.
Tsjeru-Caniram Rheede. V. 137. no. 1.
Tuberaria DC. V. 58b. no. 2.
Tubocytisus Boiss. II. 846. no. 5. 6. 7. 8.
Tubuliflorae Endl. (Compositae) II. 538. II. 944. VI. 88.
Tuckermannia Nutt. II. 615. VI. 156. *VI. 164.
— maritima Mutt. *II. 615. no. 1. VI. 156. no. 1.
Tula Adans. *II. 502.
Tulasnea Naudin. °V. 682.
— foliosa Naudin. V. 683. no. 2.
— gracillima Naudin. V. 683. no. 1.
Tullia pycnanthemoides Leavenworth. III. 689. no. 5.
Tulocarpus Hook. et Arn. *II. 976. II. 606. VI. 149.
— Mexicanus Hook. et Arn. *II. 976. no. 1. VI. 149. no. 1.
Tumba Rheede. III. 876. no. 40.
Tuna elatior, spinis validis nigricantibus Dill. II. 351. no. 61.
Tuna major flore gilvo Dill. II. 350. no. 51.
— *major flore sulphureo* Dill. II. 351. no. 55.
— *mitior flore sanguineo cochenillifera* Dill. II. 348. no. 20.
Tunica Scop. I. 268. no. 19. II. 773.
— *prolifera* Fisch. et Mey. II. 773. no. 15.
— *Saxifraga* Scop. II. 773. no. 16.
— *stricta* Fisch. et Mey. II. 773. no. 17.
— *velutina* Fisch. et Mey. I. 266. no. 5.
Tupa G. Don. VI. 378.
— atropurpurea Visiani. VI. 378. no. 1.
— persicifolia DC. VI. 733.
Tupeicava Piso. III. 332. no. 1.
Tupeja Cham. et Schlchtd. II. 439. V. 937.
— antarctica Cham. et Schlchtd. *II. 439. no. 1.
— Cunninghamii Miq. V. 937. no. 1.
— *racemosa* Krthls. II. 439. no. 3.
— pubigera Miq. V. 937. no. 2.
— Reinwardtiana Blume. II. 439. no. 3.
— umbellata Blume. II. 439. no. 2.
Turbith Tausch. II. 404.
— Matthioli Tausch. *II. 404. no. 1.
Turczaninowia DC. *II. 575. *II. 951. no. 6.
Turgenia Hffmnsgg. II. 421. V. 901.
— brachyacantha Boiss. V. 901. no. 2.
— foeniculacea Fnzl. II. 421. no. 1.
— *foeniculacea* Fnzl. V. 902. no. 1.
— *heterocarpa* DC. V. 902. no. 1.
— tuberculata Boiss. V. 901. no. 1.
Turgeniopsis Boiss. °V. 902.
— foeniculacea Boiss. V. 902. no. 1.
Turnera Plum. II. 228. V. 782.
— ...... nova species? Schlchtd. II. 230. no. 27.
— aurantiaca Bth. II. 229. no. 23.
— aurea Cambess. II. 229. no. 20.
— capitata Cambess. II. 228. no. 6.
— chamaedryfolia Cambess. II. 229. no. 15.
— dichotoma Gardn. II. 229. no. 26.
— Duarteana Cambess. II. 229. no. 17.
β. rotundifolia.
— elegans Otto. II. 228. no. 1.
— genistoides Cambess. II. 229. no. 14.
— helianthemoides Cambess. II. 229. no. 18.
— hermannioides Cambess. II. 228. no. 10.
— Hindsiana Bth. V. 782. no. 2.
— humifusa Endl. II. 230. no. 28.
— incana Cambess. II. 228. no. 9.
— lamiifolia Cambess. II. 228. no. 3.
— lanceolata Cambess. II. 228. no. 4.
— longiflora Cambess. II. 228. no. 7.
— lutescens Cambess. II. 228. no. 8.
— melochioides Cambess. II. 229. no. 11.
— nana Cambess. II. 229. no. 12.
— oblongifolia Cambess. II. 228. no. 5.

Turnera parviflora Bth. II. 229. no. 25.
— pinifolia Cambess. II. 229. no. 13.
— pinnatifida Juss. *II. 229. no. 16.
β. carnea Cambess.
— rosea Cambess. II. 229. no. 19.
— salicifolia Cambess. II. 229. no. 22.
— sidaefolia Cambess. II. 229. no. 21.
— ulmifolia Linn. V. 782. no. 1.
β. angustifolia DC.
— velutina Bth. II. 229. no. 24.
— velutina Prsl. II. 228. no. 2.
TURNERACEAE H. B. Ktb. II. 228. V. 782.
Turpinia Vent. I. 529. V. 401.
— corymbosa G. Don. *I. 529. no. 2.
— Nepalensis Wall. I. 529. no. 1. (III. Emend. p. 3.)
— occidentalis G. Don. I. 529. no. 3.
—? sphaerocarpa Hsskrl. II. 826. no. 1. V. 401. no. 1.
Turraea Linn. I. 426. V. 373.
— *alata* Wght. I. 426. no. 1.
— Billardieri Bennet. *I. 426. no. 3.
— concinna Bennet. I. 427. no. 4.
— floribunda Hochstett. V. 373. no. 3.
— glabra Cav. *I. 427. no. 9.
— heterophylla Sm. *I. 427. no. 10.
— *lanceolata* Cav. I. 426. no. 1.
— lobata Lindl. V. 373. no. 1.
— *maculata* Sm. I. 427. no. 9.
— obtusifolia Hochstett. V. 373. no. 2.
— pinnata Spanoghe. I. 427. no. 7.
— *pinnata* Wall. I. 426. no. 2.
— pubescens Hellen. I. 426. no. 2.
— pumila Bennet. I. 427. no. 6.
— *sericea* Sm. I. 427. no. 8.
— tetramera Bennet. I. 427. no. 11.
— tomentosa Cav. *I. 427. no. 8.
— villosa Bennet. I. 427. no. 5.
— *virens* Koen. I. 379. no. 1.
— *virens β. Billardieri* DC. I. 426. no. 3.
— virens Linn. *I. 426. no. 1.
Turrigera Dcne. *VI. 488.
Turrita pendula Wallr. I. 132. no. 20.
Turritella DC.? I. 132. no. 19.
Turritis Dill. I. 129.
— brachycarpa Torr. et Gr. I. 130. no. 9.
— *ciliata* Tsch. I. 130. no. 2.
—? diffusa Hook. I. 130. no. 10.
—? falcata Turcz. I. 129. no. 1.
—? *falcata* Turcz. I. 132. no. 24.
— glabra Linn. *I. 129. no. 2. (c. var. β. ibid.)
— Grahamii Lehm. I. 129. no. 6.
— *hirsuta* M. Bieb. I. 132. no. 19.
— lasiophylla Hook. et Arn. I. 130. no. 11.
— macrocarpa Nutt. I. 129. no. 3.
— mollis Hook. I. 129. no. 5.
— *patula* Grah I. 129. no. 6.
— retrofracta Hook. I. 130. no. 8.
— spathulata Nutt. I. 129. no. 4.
— stricta Grah. I. 129. no. 6.
Tussacia Bth. °VI. 740.
— pulchella Bth. *VI. 740.
— rupestris Bth. VI. 740. no. 2.
— villosa Bth. VI. 740. no. 1.
Tussilagineae Less. II. 557. VI. 117.
Tussilago Tournef. II. 557.
— *anandria* Linn. VI. 316. no. 18.
Tweedia coerulea Don. VI. 488. no. 1.
Tylacantha Nees et Mart. III. 178. °III. 958.
Tylacantha Nees et Mart. VI. 636.
— campestris N. ab E. III. 178. no. 1.
Tylloma Don. *VI. 318.
Tylophora R. Br. VI. 491.
— Iphisia Dcne. VI. 491. †*
— lycioides Dcne. VI. 491. no. 2.
β. major Meisn.
— syringaefolia Spruner. VI. 491. no. 1.
Tylotaea Vogel. I. 852.
Typhalaca DC. I. 297. II. 789. no. 1.
Tyrimnus Cass. *II. 673.
Tytonia Madagascariensis Don. I. 476. no. 3.
— *natans* Don. I. 476. no. 2.

U

Uebelinia Hochstett. I. 282.
— Abyssinica Hochstett. *I. 282. no. 1.
Ulek Baumg. *II. 955. no. 2.
Ulex Linn. I. 626.
— australis Clement. *I. 626. no. 1.
— Boivinii B. Webb. I. 626. no. 2.
— Baeticus Boiss. I. 626. no. 4.
— genistoides Brot. I. 626. no. 3.
— *genistoides* Slzm. I. 626. no. 2.
— *Hibernicus* G. Don. I. 627. no. 5.
— *provincialis* Lois. I. 626. no. 1.
— strictus Mackay. I. 627. no. 5.
Ulloa Pers. III. 106.
— *parasitica* Pers. III. 106. no. 1. III. 934.
Ullucus Lozano. *II. 239.
Ulmaria Mnch. II. 50. V. 657. no. 3. 4. 5.
— *foliis profunde laciniatis* Ruth. V. 658. no. 3. *β*.
Uloptera Fnzl. °V. 873. (cf. V. 871. no. 12.)
— macrocarpa Fnzl. V. 873. no. 1.
— *macrocarpa* Fnzl. V. 877. no. 12.
Ulricia pyramidata Jcq. III. 846. no. 1.
UMBELLIFERAE Juss. II. 381. II. 937. V. 838.
Umbellularia Bth. III. 563. VI. 660. no. 10.
Umbiliceae Endl. II. 256. V. 792.
Umbilicus DC. II. 258. V. 792.
— affinis Schrenk. II. 258. no. 4.
— Aizoon Fnzl. II. 258. no. 1.
— *erectus* DC. II. 259. no. 8. V. 794. no. 6.
— fimbriatus Turczan. V. 794. no. 7.
— globulariaefolius Fnzl. II. 258. no. 2.
— Heylandianus B. Webb et Berth. II. 259. no. 7. V. 793. no. 5.
— luteus B. Webb et Berth. *II. 259. no. 8. V. 794. no. 6.
— macrophyllus DC. V. 794. †
— Mexicanus Schlchtd. II. 258. no. 5.
— oreades Dcne. II. 258. no. 6.
— oxypetalus Boiss. V. 793. no. 4.
— Persicus Boiss. V. 792. no. 1.
— platyphyllus Schrenk. II. 258. no. 3.
— Sempervivum DC. II. 259. †
— simplex C. Koch. V. 793. no. 2.
Umbilicus tropaeolifolius Boiss. V. 793. no. 3.
— *Veneris officinarum* Lonic. III. 191. no. 9.
Un altro Verbasco Matth. III. 132. no. 22.
Uncaria Endl. II. 512. II. 943.
Uncaria Schreb. II. 512.
— *Africana* G. Don. II. 512. no. 21.
— *appendiculata* Bth. II. 943. no. 1.
— *attenuata* Krthls. II. 513. no. 27.
— *calophylla* Krthls. II. 513. no. 28.
— *canescens* Krthls. II. 513. no. 29.
— *dasyoneura* Krthls. II. 513. no. 26.
— *elliptica* R. Br. II. 512. no. 19.
— *Gambir* Hunter. II. 513. no. 25.
— *Hallii* Krthls. II. 512. no. 23.
— *laevigata* Wall. II. 512. no. 18.
— *nemorosa* Krthls. II. 512. no. 24.
— *pilosa* Rxb. et Wall. II. 512. no. 22.
— *procumbens* Burch. VI. 520. no. 1.
— *Roxburghiana* Krthls. II. 513. no. 30.
— *setiloba* Bth. II. 943. no. 2.
— *speciosa* Wall. II. 512. no. 20.
— *Wallichii* Krthls. II. 513. no. 31.
Ungeria Schott et Endl. I. 334.
— floribunda Schott et Endl. *I. 334. no. 1.
Ungnadia Endl. I. 423. V. 371.
— speciosa Endl. *I. 423. no. 1. V. 371. no. 1.
Unguicularia Bth. II. 901. no. 2.
Unguis cati Bth. V. 609.
Unibracteatae (Michelia) I. 70.
Unifoliolatae (Indigofera) I. 662.
Uninerviae Bth. (Acacia) I. 893. V. 589.
Unona Blume. I. 77.
— *acutiflora* Dun. I. 76. no. 1.
— *Aethiopica* Dun. I. 75. no. 11.
— *Amherstiana* DC. I. 77. no. 14.
— *aromatica* DC. I. 76. no. 1.
— *biglandulosa* Blume. I. 77. no. 16.
— *carminativa* Arruda da Camara. I. 75. no. 7.
— *dasyamaschala* Blume. I. 77. no. 13.
— *discolor* Vahl. I. 77. no. 16.
— *discreta* Linn. I. 76. no. 2.
— *diversifolia* Spanoghe. I. 77. no. 18.

Unona elliptica Blume. I. 74. no. 2.
— *Fluminensis* Vellozo. I. 75. no. 7.
— *furfuracea* DC. fil. I. 79. no. 49.
— *grandiflora* DC. I. 78. no. 21.
— *hamata* Dun. I. 80. no. 2.
— *Kentii* Blume. I. 74. no. 4.
— *latifolia* Dun. I. 78. no. 37.
— *leptopetala* DC. I. 78. no. 32.
— *littoralis* Blume. I. 78. no. 30.
— *longifolia* Dun. I. 81. no. 2.
— *lucida* DC. I. 76. no. 5.
— *macrocarpa* Vahl. I. 79. no. 50.
— *macrophylla* Blume. I. 74. no. 5.
— *macrophylla* Rxb. I. 78. no. 22.
— *Narum* Dun. I. 78. no. 20.
— *odorata* Dun. I. 78. no. 32.
— *oxypetala* DC. I. 76. no. 3.
— *pedunculosa* DC. fil. I. 77. no. 15.
— *polycarpa* DC. I. 76. no. 4.
— *pygmaea* Bartr. I. 79. no. 54.
—? *Selanica* DC. V. 128. no. 3.
— *suaveolens* Blume. I. 81. no. 3.
— *subcordata* Blume. I. 74. no. 1.
— *undulata* DC. I. 76. no. 3.
— *undulata* Wall. I. 77. no. 17.
— *virgata* Blume. I. 78. no. 41.
Unxia Linn. *II. 604.
Uranthera Naudin. °V. 697.
— alsinaefolia Naudin. V. 697. no. 1.
— variabilis Naudin. V. 698. no. 2.
α. lanceaeflora.
β. parietariaefolia.
Uraria Desvx. I. 735. II. 889. V. 523.
— alopecuroides Wght. I. 736. no. 5. (III. Emend. p. 4.)
— arborea G. Don. II. 889. no. 1.
— cordifolia Wall. I. 735. no. 1.
— *crinita* Desvx. *β. macrostachya* Wall. I. 735. no. 1.
— *desmidioides* Grah. I. 735. no. 3.
— hamosa Wall. I. 735. no. 3. (III. Emend. p. 4.)
— lagopoides DC. I. 736. †
— linearis Hsskrl. II. 890. no. 2. V. 524. no. 2.
— paniculata Hsskrl. V. 523. no. 1.
— picta Desvx. *II. 890. no. 3.
—? styracifolia Wght. et Arn. *I. 736. no. 4.
Uraspermum Claytoni Nutt. II. 423. no. 1.
— *hirsutum* Bigel. II. 423. no. 2.
Urceola Rxb. * VI. 468.
Urena Linn. I. 297. V. 89.
— diversifolia Wlprs. V. 89. no. 3.
— diversifolia Schum. et Thonn. I. 297. no. 6.
— Haenkeana Wlprs. I. 297. no. 9.
Urena heterophylla Prsl. I. 297. no. 9.
— *heterophylla* Sm. I. 297. no. 5. *β.*
— *heterophylla* Wall. I. 297. no. 5. *α.*
— *Lappago* Sm. I. 297. no. 5. *α.*
— lobata Linn. I. 297. † * V. 89. no. 2.
β. tomentosa Wlprs. V. 89. no. 2.
— mollis R. Br. *V. 89. no. 1.
— *morifolia* DC. I. 297. no. 5. *α.*
— *muricata* DC. I. 297. no. 5. *α.*
— obtusata Guill. et Perr. I. 297. no. 3.
— repanda Blume. I. 297. no. 1.
— ricinocarpa Eckl. et Zeyh. I. 297. no. 8.
— sinuata Linn. *I. 297. no. 5. (c. varr. *α.* et *β.* ibid.)
— speciosa Wall. I. 297. no. 4.
— tomentosa Blume. I. 297. no. 2.
— virgata Guill. et Perr. I. 297. no. 7.
Urenoideae DC. (Pavonia) II. 789. no. 3.
Uropappus grandiflorus Nutt. II. 684. no. 2.
— *heteropappus* Nutt. II. 684. no. 1.
— *Lindleyi* Nutt. II. 684. no. 2.
— *linearifolius* Nutt. II. 684. no. 2.
Urophorus Nutt. II. 957.
Urophyllum Jack et Wall. *II. 490.
Urospermum Juss. *II. 688. *VI. 349.
Ursinia Gaertn. *II. 630. VI. 182.
— Abyssinica C. H. Schultz. VI. 182. no. 1.
Urvillea H. B. Kth. I. 411. V. 359.
— affinis Schlchtd. V. 359. no. 1.
— glabra Cambess. I. 411. no. 1.
— rufescens Cambess. I. 411. no. 2.
Usteria Willd. * VI. 497.
— *antirrhiniflora* Poir. III. 229. no. 3.
— *scandens* Cav. III. 229. no. 2.
Usterieae Endl. VI. 497.
Uterveria Bertol. I. 201.
— Breynia Bertol. I. 201. no. 7.
— comosa Bertol. *I. 201. no. 5.
— cynophallophora Bertol. *I. 201. no. 2.
— Eustachyana Bertol. *I. 201. no. 4.
— frondosa Bertol. *I. 201. no. 1.
— linearis Bertol. *I. 201. no. 6.
— tenuisiliqua Bertol. I. 201. no. 8.
— verrucosa Bertol. *I. 201. no. 3.
Utricularia Linn. VI. 438.
— alata Benjamin. VI. 741. no. 1.
— Hookeri Lehm. *VI. 439. no. 5.
— Humboldtii Schomburgk. VI. 438. no. 3.
— *inaequalis* Alph. DC. VI. 439. no. 5.
— *latiloba* Bth. VI. 439. no. 2.
— Lehmanni Benjamin. VI. 741. no. 3.
— *macroceras* Alph. DC. VI. 439. no. 4. *β.*
— Menziesii R. Br. * VI. 439. no. 4.
β. macroceras.
— minor Linn. VI. 438. no. 3. adn.
— *multifida* Bth. VI. 439. no. 1.

Utricularia obovata Miquel. VI. 438. no. 2.
— *Preissii* Alph. DC. VI. 439. no. 6.
— pulchella C. B. Lehmann. VI. 438. no. 1.
— similis Lehm. * VI. 439. no. 6.
— squamosa Benjamin. VI. 741. no. 2.
— *tenella* R. Br. VI. 439. no. 3.
— Wallichiana Benjamin. VI. 742. no. 4.
UTRICULARIEAE Endl. VI. 438.
Uvaria Blume. I. 76.
Uvaria Linn. I. 76. V. 14.
— *Aethiopica* A. Rich. I. 75. no. 11.
— Amherstiana DC. fil. I. 77. no. 14.
— argentea Blume. I. 78. no. 29.
— aurita Blume. I. 78. no. 24.
— Brasiliensis Vellozo. I. 79. no. 57.
— Burahol Blume. *I. 79. no. 45.
— Chamae Pal. de Beauv. I. 79. no. 50.
— *ciliata* Heyne. I. 74. no. 1.
— *clavata* Reinw. I. 80. no. 3.
— cordata Schum. et Thonn. I. 79. no. 47.
— cylindrica Schum. et Thonn. I. 79. no. 48.
— dasyamaschala Blume. I. 77. no. 13.
— *dioica* Rxb. I. 91. no. 1.
— discolor Vahl. *I. 77. no. 16.
— diversifolia Spanoghe. I. 77. no. 18.
— *dulcis* Spr. I. 78. no. 25.
— *dulcis* var. *Javana* Spr. I. 78. no. 23.
— ebracteolata Prsl. I. 77. no. 11.
— elliptica DC. fil. I. 76. no. 4.
— *esculenta* Rottl. I. 80. no. 1.
— foetida Rz. et Pav. I. 79. no. 55.
— furfuracea DC. fil. I. 79. no. 49.
— glabra Spanoghe. I. 77. no. 12.
— glauca Hsskrl. V. 14. no. 1.
— Gomeziana DC. fil. I. 76. no. 5.
— grandiflora Rxb. *I. 78. no. 21.
— guatterioides DC. fil. I. 76. no. 1.
— Hasseltii Blume. I. 79. no. 43.
— heterocarpa Blume. I. 78. no. 39.
— *heteroclita* Rxb. V. 15. no. 1.
— Heyneana Wall. *I. 77. no. 19.
— hirsuta Blume. I. 78. no. 28.
— *hirsuta* Vellozo. I. 85. no. 17. β.
— humilis Blume. *I. 78. no. 35.
— *Japonica* Linn. V. 15. no. 1.
— Javana Dunal. *I. 78. no. 25.
— latifolia Blume. *I. 78. no. 37.
— littoralis Blume. *I. 78. no. 30.
— *longifolia* Blume. I. 78. no. 37.
Uvaria macrophylla Rxb. *I. 78. no. 22.
— *moniliformis* Gaertn. I. 76. no. 2.
— *monopetala* A. Rich. I. 80. no. 1.
— *monosperma* Lam. I. 85. no. 51.
— montana Blume. I. 79. no. 42.
— Narum Wall. *I. 78. no. 20.
— neglecta A. Rich. I. 79. no. 56.
— nitida Rxb. I. 77. no. 8.
— obovata Torr. et Gr. *I. 79. no. 53.
— obtusa Blume. *I. 78. no. 34.
— odorata Lam. *I. 78. no. 32.
— *odoratissima* Rxb. I. 80. no. 1.
— opthalmica Rxb. I. 76. no. 7.
— ovalifolia Blume. I. 78. no. 31.
— *parviflora* Ach. Rich. I. 76. no. 2.
— parviflora Torr. et Gr. *II. 79. no. 52.
— pedunculosa DC. fil. I. 77. no. 15.
— polypyrena Blume. I. 78. no. 36.
— purpurea Blume. *I. 78. no. 23.
— pygmaea Torr. et Gr. *I. 79. no. 54.
— *pyrifolia* Reinwardt. I. 92. no. 2.
— reticulata Blume. I. 79. no. 46.
— rubiginosa DC. fil. I. 76. no. 3.
— rufa Blume. I. 78. no. 26.
— rufescens DC. fil. I. 76. no. 2.
— rugosa Blume. *I. 79. no. 44.
— sclerocarpa DC. fil. I. 76. no. 6.
— *sessilis* Vellozo. I. 86. no. 5.
— solanifolia Prsl. I. 77. no. 10.
— Sorzogonensis Prsl. I. 77. no. 9.
— sphaerocarpa Blume. *I. 78. no. 38.
— Timoriensis Blume. I. 78. no. 27.
— trichomalla Blume. I. 78. no. 40.
— trigyna Mart. I. 80. no. 58.
— triloba Torr. et Gr. *I. 79. no. 51.
— *uncata* Rxb. I. 80. no. 1.
— *uncinata* Dun. I. 80. no. 1.
— undulata Rxb. I. 77. no. 17.
— *velutina?* Blume. I. 78. no. 28.
— velutina Blume. *I. 78. no. 33.
— *villosa* Rxb. I. 78. no. 33.
— virgata Blume. *I. 78. no. 41.
— *Zeylanica* Deless. I. 80. no. 2.
— *Zeylanica* Lam. I. 78. no. 20.
Uvedalia R. Br. III. 274. °III. 963.
Uvedalia DC. (?) VI. 149. no. 1.
— linearis R. Br. III. 274. no. 1.
Uwarowia Bnge. III. 407. IV. 12.

V

Vaccaria Medik. I. 272.
— *pyramidata* G. M. S. I. 272. no. 1.
— vulgaris Host. * I. 272. no. 1.
VACCINIEAE DC. II. 723. VI. 408.
Vaccinieae Endl. VI. 408.
Vaccinium Linn. II. 723. VI. 413.
— angustifolium Bth. II. 724. no. 4.
— brachystachyum Bth. II. 724. no. 5.
— Constablaei Gray. V. 414. no. 8.
— dendrophilum Bth. VI. 414. no. 7.
— densiflorum Btb. VI. 413. no. 5.
— discolor Martens et Galeotti. II. 724. no. 3.
— epacridifolium Bth. VI. 413. no. 3.
— Forbesii Hook. II. 724. no. 2.
— Imrayi Hook. II. 723. no. 1.
— Javanicum Hook. VI. 413. no. 1.
— Mortinia Bth. VI. 413. no. 4.
— muscicola Hook. VI. 413. no. 2.
— polystachyum Bth. VI. 413. no. 6.
Vachellia Farnesiana Wght. et Arn. I. 909. no. 236.
Vahea Lam. VI. 466.
— Madagascariensis Boj. * VI. 466. no. 1.
Vahlia Thnbrg. II. 362.
— *Oldenlandiae* DC. II. 362. no. 1.
— oldenlandioides Rxb. * II. 362. no. 1.
— *sessiliflora* DC. II. 362. no. 2.
— viscosa Rxb. * II. 362. no. 2.
Vaillantia DC. II. 454. VI. 697.
— aristata Boiss. et Heldreich. VI. 697. no. 1.
Valdia Cardui folio, fructu subcoeruleo Plum. IV. 110. no. 51.
Valentiana Raf. * II. 454.
Valentinia Swrtz. * I. 422.
Valenzuelia Bert. I. 415.
— trinervis Bert. I. 415. no. 1.
Valeriana Neck. II. 528. II. 944. VI. 80.
— ...... Martens et Galeotti. VI. 83. no. 19.
— affinis Martens et Galeotti. VI. 73. no. 15.
— *Africana fruticans foliis Ericae* Commel. IV. 170. no. 4.
— alliariaefolia Vahl. II. 531. †
— alternifolia Ldb. II. 528. no. 3.
Valeriana barbareaefolia Martens et Galeotti. VI. 82. no. 12.
— Berterii Colla. II. 530. no. 19.
— bracteata Bth. VI. 81. no. 7.
— Bridgesii Hook. et Arn. II. 530. no. 17.
— Brunoniana Wght. et Arn. II. 529. no. 7.
— Candolleana Gardn. VI. 82. no. 9.
— capitata Pall. II. 531. †
— capitata Willd. * II. 529. no. 11.
β. Hookeri Torr. et Gr.
— *capitata β. Hookeri* Torr. et Gr. VI. 81. no. 5.
— ciliata Torr. et Gr. II. 530. no. 13.
— *crispa* Hook. et Arn. II. 530. no. 18.
— densiflora Bth. II. 530. no. 22. (II. 531. no. 23.)
— denudata Bth. II. 530. no. 20.
— dioica Bnks. II. 529. no. 10.
β. uliginosa.
— *dioica* Prsh. II. 529. no. 10.
— dubia Bnge. II. 528. no. 2.
β. angustifolia.
α. latifolia.
— edulis Nutt. II. 530. no. 12.
— erysimoides Poepp. et Endl. II. 530. no. 14.
— Galeottiana Martens. VI. 83. no. 18.
— glauca Poepp. II. 531. †
— gracilis Bth. VI. 82. no. 8.
— Hardwickii Wall. II. 531. †
— heterophylla Turczan. VI. 81. no. 4.
— hispidula Boiss. VI. 80. no. 1.
— *Hookeri* Nutt. II. 529. no. 11. β.
— Hookeriana Wght. et Arn. II. 529. no. 8.
— Hornschuchiana Wlprs. VI. 81. no. 6.
— incrassata Bory et Chaub. II. 528. no. 1.
— laciniosa Mart. et Galeotti. VI. 82. no. 11.
— latifolia Mart. et Galeotti. VI. 83. no. 17.
— laxiflora DC. II. 531. †
— leucocarpa DC. II. 531. †
— macrorhiza Poepp. II. 531. †
— Napus Lindl. II. 531. no. 25.
— Organensis Gardn. VI. 82. no. 10.
— *pauciflora* Hook. II. 529. no. 11. β.
— Pavonii Poepp. et Endl. II. 530. no. 15.

Valeriana petrophila Bnge. II. 529. no. 4.
— pilosiuscula Martens et Galeotti. VI. 83. no. 14.
— pterocarpa Hook. et Arn. II. 530. no. 18.
— pulchella Martens et Galeotti. VI. 83. no. 16.
— pyrolaefolia Dcne. II. 529. no. 6.
— ramosissima Martens et Galeotti. VI. 82. no. 13.
— rupicola Poepp. et Endl. II. 530. no. 16.
— *samolifolia* Bert. II. 531. no. 1.
— saxicola C. A. Mey. II. 529. no. 5.
— siifolia C. Koch. VI. 81. no. 2.
— *Sitchensis* Bngrd. II. 529. no. 11. β.
— Sitchensis Bngrd. VI. 81. no. 5.
— Steveni Ldb. VI. 81. no. 3.
— subincisa Bth. II. 530. no. 21. (II. 531. no. 24.)
— *sylvatica* Beck. II. 529. no. 10. β.
— tenera Wall. II. 529. no. 9.
— tuberosa Linn. *II. 944. no. 1.
β. eriophylla Nordmann.
VALERIANEAE DC. II. 526. II. 944. VI. 79.
Valerianella Mnch. II. 526. VI. 79.
— Abyssinica Fresen. II. 526. no. 4.
— *Africana foliis angustis etc.* Commel. IV. 144. no. 1. *a.*
— amblyotis Fisch. et Mey. VI. 80. no. 8.
— Aucheri Boiss. VI. 79. no. 2.
— *congesta* Lindl. II. 528. no. 1.
— corniculata C. A. Mey. II. 527. no. 6.
— cymbaecarpa C. A. Mey. II. 527. no. 5.
— diodon Boiss. VI. 79. no. 1.
— *exscapa* DC. II. 391. no. 1.
— Fagopyrum Wlprs. II. 527. no. 13.
— hirsutissima Lnk. II. 526. no. 3.
— Kotschyi Boiss. VI. 80. no. 7.
— lingulata Prsl. VI. 80. no. 9.
— longiflora Wlprs. II. 527. no. 11.
— monodon C Koch. II. 526. no. 1.
— Nuttallii Wlprs. II. 527. no. 12.
— obtusiloba Boiss. VI. 80. no. 5.
— olitoria Mnch. *II. 527. no. 10.
— oxyrhyncha Fisch. et Mey. VI. 79. no. 3.
— *parviflora* Dougl. II. 528. no. 1.
— Persica Boiss. VI. 79. no. 4.
— plagiostephana Fisch. et Mey. II. 526. no. 2.
— *radiata* Beck. II. 527. no. 13.
— *radiata* DC. II. 527. no. 10.
— *rhombicarpa* Aikin. II. 527. no. 10.
— sclerocarpa Fisch. et Mey. II. 527. no. 9.
— Szovitsiana Fisch. et Mey. II. 527. no. 7.
— tuberculata Boiss. VI. 79. no. 5.
— Woodsiana Wlprs. II. 527. no. 8.
Valerianoides Boerh. IV. 4. no. 4.
Valerianoides Aethiopicum Thymeleae affine umbellatum etc. Pluk. IV. 158. no. 30.
Vallaris Burm. *VI. 470.
Vallea Mutis. *I. 365.
Vallesia Rz. et Pav. *VI. 467.
Vancouveria Dcne. I. 101.
— hexandra Morr. et Dcne. *I. 101. no. 1.
Vandellia Linn. III. 291. °III. 965. *VI. 644.
Vandellia Linn. *VI. 644.
— alba Bth. III. 292. no. 3.
— angustifolia Bth. III. 293. no. 17.
— chamaedrys G. Don. III. 293. no. 18.
— cordifolia G. Don. III. 294. no. 19.
— crustacea Bth. III. 292. no. 4.
— diffusa Linn. III. 293. no. 15.
— *diffusa* Willd. III. 294. no. 21.
— elata Bth. III. 292. no. 6.
— erecta Bth. III. 292. no. 5.
— hirsuta Hamilt. III. 292. no. 7.
— laxa Bth. III. 293. no. 9.
— limosa Wlprs. III. 293. no. 14.
— minima Royle. III. 293. no. 12.
— mollis Bth. III 293. no. 10.
— molluginoides Bth. III. 291. no. 2.
— multiflora G. Don. III. 294. no. 24.
— nummulariaefolia D. Don. III. 293. no. 13.
— oblonga Bth. III. 291. no. 1.
— obovata Wlprs. III. 294. no. 24.
— pedunculata Bth. III. 293. no. 16.
— pratensis Vahl. III. 280. no. 11.
— Roxburghii G. Don. III. 294. no. 21.
— scabra Bth. III. 292. no. 8.
— sessiliflora Bth. III. 293. no. 11.
— stachydifolia Wlprs. III. 294. no. 25.
— strigosa G. Don. III. 294. no. 20.
— varians G. Don. III. 294. no. 22.
Vangueria Commers. II. 486. II. 942.
— tomentosa Hochstett. II. 942. no. 1.
— velutina Hook. II. 486. no. 1.
Vanillosma Lssng. VI. 90.
Vantanea Aubl. *I. 363.
Vareca Gaertn. *II. 222.
— *heteroclita* Rxb. I. 225. no. 6.
— *lanceolata* Rxb. I. 224. no. 3.
Vargasia DC. *II. 630.
Vargasia DC. VI. 181. no. 1.
Varronia A. P. DC. VI. 553.
— calyptrata DC. *VI. 553. no. 1.
Varthemia DC. *II. 601.
Vascoa DC. I. 578.
— *acuminata* E. Mey. I. 579. no. 3.
— *amplexicaulis* DC. I. 579. no. 2.
— *perfoliata* DC. I. 579. no. 3.
Vasconella St. Hil. II. 205.
— quercifolia St. Hil. *II. 205. no. 1.
Vatairea Aubl. *I. 805. *I. 855.

Vateria Linn. V. 126.
— *flexuosa* Lour. I. 397. no. 1.
— Indica Linn. V. 126. no. 1.
— lanceaefolia Rxb. V. 126. no. 2.
— pauciflora Wlprs. V. 126. no. 6.
— Rassak Wlprs. V. 126. no. 5.
— Roxburghiana Wght. V. 126. no. 3.
— ? Zeylanica Wght. V. 126. no. 4.
Vatica Linn. V. 127.
— *Chinensis* Linn.? V. 127. no. 1.
— laccifera Wght. et Arn. V. 127. n. 1.
— lepidota Krthls. V. 127. no. 3.
— lepidota Krthls. V. 127. no. 3.
— Tumbugaja Wght. et Arn. V. 127. no. 2.
— ovalis Krthls. V. 127. no. 4.
Vauquelinia Correa. *II. 52.
Vavaea Bth. II. 801. °V. 376.
— amicorum Bth. *II. 801. no. 1. *V. 377. no. 1.
Velaea DC. II. 423.
— decumbens Bth. II. 423. no. 1.
Velago xylocarpa Gaertn. I. 350. no. 3. V. 114. no. 2.
Velezia Linn. *I. 266.
— *latifolia* Eschschltz. I. 259. no. 5.
Vella DC. I. 188.
— spinosa Boiss. I. 188. no. 1.
Velleae DC. I. 188. V. 50.
Velleya Roem. et Schult. II. 713. *VI. 394.
— lanceolata Lindl. II. 713. no. 1.
Venegasia DC. *II. 635.
Venidium Lssng. *II. 666. VI. 276.
— *hispidulum* DC. VI. 277. no. 1.
— *Kraussii* C. H. Schultz. VI. 277. no. 1.
— ramosissimum C. H. Schultz. VI. 276. no. 1.
Venilia G. Don. III. 164.
Ventenatia Palis. *I. 366.
Vepris Commers. I. 523.
— *inermis* Adr. Juss. I. 523. no. 2.
— lanceolata G. Don. I. 523. no. 1.
— obovata G. Don. I. 523. no. 2.
— *simplicifolia* Endl. II. 825. no. 1.
Verae Bth. (Colummea) VI. 405.
Verae Bth. (Inga) V. 640.
Verae G. Don. (Pentstemon) III. 241.
Verae DC. (Psychotria) II. 473. no. 21.
Verae DC. (Saxifraga) II. 364. no. 15.
Verbasceae Bth. III. 127. III. 957. VI. 634.
VERBASCINAE N. ab E. III. 127.
Verbasco, un altro Matth. III. 132. no. 22.
Verbascum Linn. III. 127. 439. °III. 957. VI. 634.
— ......? Ebel. III. 935.
— ......? Nees ab E. III. 147. no. 100.
Verbascum acuminatum Schrad. *III. 147.
— adenopborum Boiss. III. 441. no. 108.
— adulterinum Koch. III. 132. no. 21.
— Aethiopicum Ehrnbrg. *III. 147.
— *album* Mnch. III. 135. no. 32. β.
— alopecuroides Biv. III. 146. no. 95.
— alopecurus Thuill. III. 136. no. 39.
— *alopecurus* Thuill. III. 136. no. 41.
— *alpinum* Turr. III. 137. no. 43.
— *alpinum Sclareae Indicae foliis* Bassano. III. 137. no. 43.
— alyssifolium Boiss. III. 443. no. 116.
— *ambiguum* Lej. III. 131. no. 19.
— angustifolium Tenore. III. 140. no. 61.
— annuum Mill. III. 146. no. 94.
— *Arcturus* Linn. III. 148. no. 7.
— argyrostachyon Tenore. III. 130. no. 11.
— asperulum Boiss. III. 440. no. 104.
— auriculatum Smith. III. 130. no. 13.
— *australe* Moris. III. 129. no. 5. δ.
— *australe* Schrad. III. 128. no. 5. β.
— *Austriacum* Comoll. III. 136. no. 41.
— *Austriacum* Schrad. 137. no. 42. β.
— Atheniense Hort. Angl. *III. 147.
— Banaticum Schrad. III. 133. no. 28.
— Bastardi Roem. et Schult. III. 133. no. 26.
— *Bernadesii* Vahl. III. 150. no. 19.
— betonicaefolium Dsf. III. 142. no. 68.
— bicolor Badarro. III. 137. no. 44.
— *Biebersteinii* Bess. III. 134. no. 31.
— *bipinnatifidum* Sims. III. 145. no. 83.
— Bithynicum Boiss. III. 441. no. 107.
— Blattaria Linn. III. 140. no. 60.
— *Blattaria* Guss. III. 132. no. 23.
— *Blattariae foliis etc.* Boerh. III. 146. no. 86.
— *blattarioides* Schrad. III. 132. no. 23.
— *blattarioides* Whlnbrg. III. 443. no. 115.
— *blattarioides β.* Gaud. III. 139. no. 56.
— *blattarioides β. caule ramosissimo* Bast. III. 133. no. 26.
— Boerhavii Linn. III. 145. no. 86.
— bombyciferum Boiss. III. 444. no. 119.
— *bracteatum* Kickx. III. 127. adn.
— bracteatum Prsl. III. 146. no. 92.
— bugulaefolium Lam. III. 141. no. 64.
— *bugulaefolium* Lam. III. 446. no. 1.
— *Calabricum* Thom. et Rich. III. 141. no. 61.
— Candelabrum Karel. et Kiril. III. 139. no. 55.
— candidissimum DC. III. 130. no. 12. (c. var. β. ibid.)
— *Caucasicum* Hortor. III. 144. no. 77.
— Celsiae Boiss. III. 140. no. 58.
— ceratophyllum Schrad. III. 145. no. 82.

Verbascum cheiranthifolium Boiss. III. 441. no. 109.
— chryserium Schrad. III. 139. no. 54.
— chrysorrhacos Boiss. III. 444. no. 118.
— *Cisalpinum* Biroli. III. 140. no. 59.
— Claytonii Michx. III. 146. no. 89.
— *coeruleum* Schanz. III. 134. no. 29.
— collinum Schrad. III. 131. no. 19.
— *compactum* Hortnl. III. 129. no. 6.
— compactum M. Bieberst. III. 141. no. 65.
— *condensatum* Schrad. III. 129. no. 5. δ.
— conocarpum Moris. III. 138. no. 46. (c. var. β. ibid.)
— cordatum Dsf. III. 146. no. 88.
— crassifolium Lnk. et Hffmnsgg. III. 128. no. 4.
— *crassifolium* Schleich. III. 129. no. 6.
— crenatifolium Boiss. III. 444. no. 117.
— *Creticum spinosum frutescens* Tournef. III. 144. no. 78.
— *crystallostemon* Weinm. III. 132. no. 23.
— cupreum Curtis. III. 143. no. 75.
— *cuspidatum* Schrad. III. 127. no. 1.
— cuspidatum Schrad. III. 127. adn.
— cylindrocarpum Griseb. III. 439. no. 102.
— Daënense Boiss. VI. 635. no. 3.
— densiflorum Bertoloni. III. 131. no. 17.
— *densiflorum* Pollin. III. 127. adn.
— *dentatum* Lapeyr. III. 137. no. 42. γ.
— dentifolium Delile. III. 139. no. 50.
— *dentis folio argenteo* Tournef. III. 442. no. 110.
— denudatum Pfund. III. 147. no. 97.
— *elongatum* Willd. III. 128. no. 2. γ.
— epixanthinum Boiss. et Heldreich. VI. 636. no. 6.
— fasciculatum Ehrnbrg. *III. 147.
— *ferrugineum* Andrws. III. 143. no. 71.
— ferrugineum Mill. III. 143. no. 72.
— flagriforme Pfund. III. 147. no. 98.
— floccosum Waldst. et Kitaib. III. 134. no. 30.
— *flore albo parvo* J. Bauh. III. 135. no. 32. β.
— formosum Fisch. III. 142. no. 67.
— *Gallicum* Willd. III. 137. no. 42. γ.
— Garganicum Tenore. III. 135. no. 36. *III. 440. no. 31.
β. heterophyllum Griseb. III. 440. no. 31.
— glabratum Friv. III. 145. no. 84.
— glabrum Delaborde. III. 14. no. 936.
— *glabrum* Mill. III. 140. no. 60.
— *glabrum* Willd. III. 132. no. 23.
— *glandulosum* Thore. III. 132. no. 23.
— glomeratum Boiss. III. 445. no. 120.
— gnaphalodes M. Bieb. III. 136. no. 38.
Verbascum gossypinum M. Bieb. III. 131. no. 16.
— *Graecum fruticosum etc.* Tournef. III. 145. no. 84.
— Granatense Boiss. III. 135. no. 33.
— grandiflorum Schrad. III. 143. no. 76.
— haemorrhoidale Ait. III. 146. no. 87.
— Haenseleri Boiss. III. 139. no. 51.
— *heterophyllum* Mill. III. 140. no. 60.
— *heterophyllum* Moretti. III. 134. no. 30.
— Hinkei Friv. III. 145. no. 85.
— Hohenackeri Fisch. et Mey. III. 131. no. 20.
— hybridum Brot. III. 133. no. 24.
— hyoserifolium Schrad. III. 139. no. 53.
— *Indicum* Wall. III. 127. no. 1.
— Indicum Wall. III. 127. adn.
— interjectum Pfund. III. 147. no. 96.
— intermedium Ruprecht. III. 147. no. 99.
— *intubaceum* Tabern. III. 132. no. 22.
— *Italicum* Moric. III. 128. no. 5.
— *Kickxianum* Dumort. III. 127. adn.
— Kotschyi Boiss. et Hohenack. III. 443. no. 114.
— *laevigatum* Hort. Prag. III. 132. no. 23.
— Lagurus Fisch. et Mey. III. 144. no. 79.
— lanatum Schrad. III. 137. no. 43.
— *laxiflorum* Prsl. III. 134. no. 30.
— laxiflorum Prsl. III. 146. no. 91.
— leiostachyon Griseb. III. 440. no. 105.
— leptostachyum DC. III. 136. no. 37.
— leucophyllum Griseb. III. 445. no. 122.
— *Linnaei* Pfnd. III. 128. no. 1.
— *longifolium* DC. III. 134. no. 29.
— longifolium DC. III. 135. no. 35.
— *luteum* Mill. III. 146. no. 86.
— *Lychnitis* All. III. 134. no. 30.
— Lychnitis Linn. III. 134. no. 32. (c. varr. β. et γ. III. 135.)
— *Lychnitis β. Hungaricum* Roch. III. 134. no. 31.
— *Lychnitis β. Thapsi* Sm. III. 129. no. 7.
— *Lychnitis* Schltz. III. 127. no. 1.
— Lydium Boiss. III. 440. no. 106.
— *lyratum* Lam. III. 150. no. 20.
— macranthum Lnk. et Hffmnsgg. III. 133. no. 25.
— macrurum Ten. III. 128. no. 3.
— *macrurum* Ten. III. 128. no. 5. β.
— majale DC. III. 141. no. 63.
β. longebracteatum Schrad.
— mallophorum Boiss. et Heldreich. VI. 635. no. 5.
— *micranthum* Moretti. III. 135. no. 32.
— micranthum Moretti. III. 934.
— *mixtum* Bardarro. III. 136. no. 41.
— *mixtum* DC. III. 134. no. 30.

Verbascum Moenchii Schultz. III. 135. no. 32. β.
— molle C. Koch. III. 143. no. 74.
— Monspessulanum Pers. III. 138. no. 48.
— montanum Schrad. III. 129. no. 6.
— mucronatum Lam. III. 130. no. 11.
— *Myconi* Linn. III. 438. no. 1.
— napifolium Boiss. III. 442. no. 111.
— *neglectum* β. Guss. III. 128. no. 2. γ.
— *nemorosum* Schrad. III. 129. no. 5. γ.
— Nevadense Boiss. III. 139. no. 52.
— *nigro-Austriacum* Rchb. III. 137. no. 42. δ.
— *nigro-lychnitis* Schiede. III. 137. no. 41. ε.
— *nigrum* γ. Bertol. III. 137. no. 43.
— nigrum Linn. III. 136. no. 41. (c. varr. γ. δ. ε.)
β. gymnostemon Roem. et Schult. III. 137.
— *nigrum* Plenk. III. 137. no. 42. β.
— *nigrum* β. Bertol. III. 137. no. 42. γ.
— *nigrum folio Papaveris corniculati* Tournef. III. 132. no. 22.
— niveum Tenore. III. 130. no. 10.
— *nonum* Caesalp. III. 140. no. 60.
— nothum Koch. III. 131. no. 18.
— Novae Hollandiae Roem. *III. 147.
— *octavum* Caesalp. III. 140. no. 59.
— Olympicum Boiss. III. 439. no. 103.
— *orchideum* Host.? III. 137. no. 42. δ.
— orientale M. Bieb. III. 137. no. 42.
β. Austriacum, γ. Chaixi, δ. Reichenbachianum } G. Don.
— *orientale Betonicae folio etc.* Tournef. III. 142. no. 68.
— *orientale maximum etc.* Tournef. III. 130. no. 11. et 13.
— *orientale Sophiae foliis* Tournef. III. 148. no. 5.
— *Osbeckii* Linn. III. 124. no. 1.
— *Osbeckii* var. *Byzantinum* Linn. III. 446. no. 1.
— ovalifolium Donn. III. 142. no. 66.
— ovatum Schrad. III. 138. no. 49.
— *pallidum* N. ab E. III. 128. no. 2. β.
— *Parisiense* Thuill.? III. 137. no. 42. δ.
— *parviflorum* Lam. III. 150. no. 18.
— *parviflorum* Lam. III. 442. no. 110.
— phlomoides Linn. III. 128. no. 5. (c. varr. α. β. γ. δ. et ε. ibid. et III. 129.)
— *phlomoides* Schrad. III. 128. no. 5. α.
— phoenicum Linn. III. 140. no. 59.
— Pinardi Boiss. III. 443. no. 113.
— pinnatifidum Vahl. III. 145. no. 83.
— plantagineum Moris. III. 129. no. 9.
— *plicatum* Sm. III. 145. no. 81.
Verbascum polystachyum Karel. et Kiril. III. 135. no. 34.
— Prusianum Boiss. VI. 634. no. 2. β. floccosum.
— *Pseudo-Blattaria* Schleich. III. 133. adn. III. 139. no. 56.
— *pulverulentum* Sm. III. 134. no. 30.
— *pulverulentum* Spr. III. 128. no. 5.
— pulverulentum Vill. III. 134. no. 31.
— *pulverulentum flore luteo parvo* J. Bauh. III. 135. no. 32.
— *pulvinatum* Thuill. III. 134. no. 30.
— puniceum Schrad. III. 142. no. 69. (et var. β. ibid.)
— *pyramidale* Host. III. 134. no. 31.
— pyramidatum M. Bieb. III. 144. no. 77.
— *quintum* Caesalp. III. 135. no. 32. β.
— ramigerum Schrad. III. 129. no. 8.
— *ramosissimum* DC. III. 133. no. 26.
— ramosissimum Poir. III 138. no. 47.
— repandum Willd. III. 133. adn.
— *repandum* Willd. III. 133. no. 23.
— rotundifolium Tenore. III. 138. no. 45. (c. var. β. ibid.)
— *rubiginosum* Re. III. 139. no. 41.
— rubigiosum Waldst. et Kit. III. 139. no. 56.
— ruderale Pfeiffer. VI. 634. no. 1.
— *rugulosum* Willd. III. 128. no. 5.
— saccatum C. Koch. III. 143. no. 73.
— salviaefolium Boiss. III. 439. no. 101.
— *Samniticum* Tenore. III. 129. no. 5. ε.
— Sartorii Boiss. et Heldreich. VI. 635. no. 4.
— *scabrum* Prsl. III. 132. no. 22.
— Schottianum Schrad. III. 136. no. 40.
— Schraderi Mey. III. 128. no. 2. (c. varr. β. γ.)
— *seminigrum* Fries. III. 131. no. 19.
— *sextum* Caesalp. III. 132. no. 22.
— simplex Labill. III. 141. no. 62.
— *simplex* Lnk. et Hffmnsgg. III. 129. no. 7.
— *sinuatum* Habl. III. 145. no. 83.
— sinuatum Linn. III. 132. no. 22.
— *sinuatum* β. Linn. III. 145. no. 81.
— *sinuatum* var. *Banaticum* Roch. III. 133. no. 28.
— Slavonicum Kit. *III. 147.
— Smyrnaeum Boiss. III. 442. no. 112.
— Soongaricum Schrenk. III. 135. no. 34.
— speciosum Schrad. III. 134. no. 29. (c. var. β.)
— spectabile M. Bieb. III. 142. no. 70.
— spinosum Linn. III. 144. no. 78.
— *spinosum Creticum* Lob. III. 144. no. 78.
— splendidum Boiss. III. 445. no. 121.
— spurium Koch. III. 129. no. 7.
— *Stevenii* Hort. Vindob. III. 136. no. 38.
— strictum Clarke. III. 146. no. 90.

Verbascum Syriacum Schrad. III. 144. no. 80.
— taraxacifolium Boiss. III. 441. no. 110.
— *thapsiforme* Guss. III. 128. no. 3.
— *thapsiforme* Schrad. III. 127. no. 1.
— thapsiforme Schrad. III. 127. adn.
— *thapsiformi-lychnitis* Schiede. III. 129. no. 8.
— *thapsiformi-nigrum* Schiede. III. 132. no. 21.
— *thapsoides* Birol. III. 135. no. 32.
— *thapsoides* Host. III. 134. no. 29.
— *thapsoides* Lnk. et Hffmnsgg. III. 129. no. 7.
— *thapsoides* Vill. III. 128. no. 5.
— *thapso-lychnitis* Mert. et Kch. III. 129. no. 7.
— *thapso-nigrum* Schiede. III. 131. no. 19.
— *Thapsus* Blackw. III. 127. adn.
— *Thapsus* Brot. III. 128. no. 4.
— Thapsus Linn. III. 127. no. 1.
— *Thapsus* Plenk. III. 128. no. 5.
— *Thapsus* Schrad. III. 128. no. 2.
— *Thapsus a.* Whlnbrg. III. 128. no. 2.
— *thyrsoideum* Host. III. 137. no. 43.
— *tomentosum* Lam. III. 128. no. 5.
— triste Smith. III. 143. no. 71.
— undulatum Lam. III. 145. no. 81.
β. integrifolium Griseb. III. 445. no. 81.
— *urticaefolium* Lam. III. 137. no. 42.
— versiflorum Schrad. III. 133. no. 27.
— viminale Gussone. III. 130. no. 15.
— *virens* Host. III. 137. no. 42.
— *virgatum* Hochst. III. 137. no. 42.
— virgatum Roem. et Schult. III. 132. no. 23.
— *virgatum* Schleich. III. 140. no. 56.
— *viscidulum* Pers. III. 132. no. 23.
— *viscidulum* Romeo. III. 132. no. 23.
— *Waltheri* Hort. III. 140. no. 60.
— Weldenii Braune. III. 934.
— *Weldenii* Moretti. III. 135. no. 32. β.
— Wiedemannianum Fisch. et Mey. III. 140. no. 57.
— xanthophoeniceum Griseb. III. 443. no. 115.
Verbena Endl. (ex p.) IV. 4. 10.
Verbena Linn. IV. 13. VI. 686.
— ...... Bertero. IV. 13. no. 7.
— affinis Martens et Galeotti. VI. 687. no. 5.
— alata Chamisso. IV. 17. no. 24.
— *alopecuroides* Hort. Berol. IV. 23. no. 48.
— *alpigena* Wlprs. IV. 42. no. 5.
— *alternifolia* Hortor. IV. 15. no. 13.
— Americana Mill. *IV. 33.
— *Americana altissima spica multiplici etc.* Herm. IV. 21. no. 38.
— angustifolia Michx. IV. 18. no. 26.
Verbena angustifolia Mill. IV. 4. no. 1.
— aphylla Gill. et Hook. IV. 17. no. 22.
— *aristata* Vahl. IV. 4. no. 5.
— Arraniana Hort. *IV. 33.
— asparagoides Gill. et Hook. IV. 14. no. 5.
— aspera Gill. et Hook. IV. 15. no. 14.
— aspera Knze. *IV. 33.
— Aubletia Linn. IV. 31. no. 79.
— barbata Grah. *IV. 33.
— bipinnatifida Nutt. *IV. 33.
— biserrata H. B. Kth. IV. 21. no. 40.
— Bonariensis Linn. IV. 19. no. 31.
β. littoralis Hook. IV. 20.
γ. longebracteata Linn. IV. 20.
— *Bonariensis altissima etc.* Dill. IV. 19. no. 31.
— *bracteata* Cavanilles. IV. 24. no. 53.
— bracteosa Michx. VI. 24. no. 53.
— caespitosa Gill. et Hook. IV. 14. no. 4.
— *Cajanensis* Rich. IV. 5. no. 9.
— calcicola Wlprs. IV. 15. no. 16.
— canescens H. B. Kth. IV. 24. no. 50.
— *Capensis* Thnbrg. IV. 20. no. 31. IV. 43. no. 6.
— *capitatata* Blanco. IV. 49. no. 30. (et diagnos. ibid. in adnot.)
— Caracasana H. B. Kth. IV. 19. no. 30.
— *carnea* Medicus. IV. 18. no. 27.
— *Carolinensis Melissae folio aspero* Dillen. IV. 18. no. 27.
— Caroliniana Willd. IV. 18. no. 27.
— *Caroliniana integro folio serrato scabro* Raj. IV. 18. no. 27.
— chamaedryfolia Juss. IV. 28. no. 66.
— Chamissonis Wlprs. IV. 18. no. 28.
— ciliata Bth. IV. 30. no. 75.
— *clavata* Rz. et Pav. IV. 12. no. 1.
— *communis flore coeruleo* Bauh. IV. 25. no. 56.
— *corymbosa* Hort. Berol. IV. 20. no. 31.
— corymbosa Rz. et Pav. IV. 26. no. 61.
— crithmifolia Gill. et Hook. IV. 30. no. 73
β. minor.
— *cunea* Arrabida. IV. 26. no. 60.
— *cuneifolia* Hort. Berol. IV. 22. no. 44. (et diagnos. ibid. in adnot.)
— cuneifolia Rafin. *IV. 33.
— cuneifolia Rz. et Pav. IV. 31. no. 78.
— *Curassavica* Linn. IV. 115. no. 2.
— dentata Visiani. IV. 41. adn.
— *diceras* Bert. IV. 13. no. 6.
— *dichotoma* Rz. et Pav. IV. 5. no. 6.
— diffusa Lam. IV. 20. no. 36.
— *dissecta* Spr. IV. 12. no. 3.
— *Doniana* Steud. IV. 27. no. 63.
— *Drummondi* Hort. IV. 32. no. 79.

Verbena elegans Hort. *IV. 33.
— elegans H. B. Kth. IV. 30. no. 74.
— *elliptica* Willd. IV. 48. no. 26.
— ephedroides Chamisso. IV. 17. no. 20.
— erinacea Gill. et Hook. IV. 15. no. 12.
— erinoides Lam. IV. 30. no. 76. (c. varr. *a. β. γ. δ.* et *ε.*)
— flava Gill. et Hook. IV. 30. no. 72.
— *folio rotundo serrato etc.* Sloane. IV. 4. no. 4.
— Forskålii Vahl. IV. 35. no. 5.
— *Forskålii* Vahl. IV. 35. no. 6.
— fruticosa Houst. *IV. 33.
— glabrata H. B. Kth. IV. 20. no. 34.
— glandulosa Morren. *IV. 33.
— *glandulosa* Moris. IV. 22. no. 44.
— glauca Gill. et Hook. IV. 17. no. 21.
— *globifera* Willd. IV. 47. no. 20.
— *globulifera* L'Hérit. IV. 47. no. 20.
— *gracilis* Cham. IV. 19. no. 28.
— gracilis Dsf. IV. 24. no. 54.
— *grandiflora* Michx. IV. 32. no. 79.
— gratissima Hook. et Gill. IV. 13. no. 2.
— hastata Linn. IV. 20. no. 38. (c. var. *β.*)
— *heterophylla* Willd. IV. 25. no. 55.
— hirsuta Martens et Galeotti. VI. 686. no. 1.
— hirta Spr. IV. 22. no. 46.
— hispida Rz. et Pav. IV. 22. no. 44.
— humifusa Chamisso. IV. 29. no. 71.
— *Hyderobadensis* Rottl. IV. 12. no. 3.
— incisa Hook. IV. 32. no. 80.
— *Indica* Jcq. IV. 4. no. 1.
— *Indica* Linn. IV. 4. no. 3.
— inflata H. B. Kth. IV. 25. no. 55.
— *integrifolia* Michx. IV. 18. no. 26.
— intermedia Gill. et Hook. IV. 27. no. 62.
— intermedia Penny. *IV. 33.
— *Jamaicensis* Linn. IV. 4. no. 4.
— *Javanica* Burm. IV. 50. no. 33.
— juncea Gill. et Hook. IV. 16. no. 19. (cum varr. *α.* et *β.* ibid.)
— *juniperina* Gill. et Hook. IV. 15. no. 11.
— juniperina Lagasca. IV. 14. no. 11.
— *Lamberti* Ker. IV. 32. no. 79.
— *lanata* Willd. IV. 48. no. 26.
— *lantanoides* Willd. IV. 54. no. 48.
— *lappulacea* Linn. IV. 34. no. 1.
— lasiostachys Lnk. IV. 22. no. 45.
— ligustrina Lagasca. IV. 32. no. 84.
— lipozygioides Wlprs. IV. 16. no. 17.
β. minima.
— *littoralis* H. B. Kth. IV. 20. no. 31. *β.*
— *lobata* Arrabida. IV. 27. no. 61.
— *lobelioides* Graham. IV. 33. no. 89.
— *longiflora* Lam. IV. 32. no. 79.
— longifolia Mart. et Galeotti. VI. 687. no. 8.
Verbena Lucaeana Wlprs. IV. 23. no. 49.
— *Mariana Rosae Chinensis folio etc.* Petiv. IV. 37. no. 1.
— marrubioides Chamisso. IV. 27. no. 64.
— Megapotamica Spr. IV. 32. no. 87.
— *Melindres* Gillies. IV. 28. no. 66.
— melindroides Cham. IV. 28. no. 67.
— *melissoides* Sweet. IV. 28. no. 66.
— menthaefolia Bth. IV. 32. no. 88.
— *Mexicana* Linn. IV. 35. no. 4.
— *Mexicana Trachelii folio, fructu Aparines* Dill. IV. 35. no. 4.
— microphylla H. B. Kth. IV. 24. no. 52.
— minima Meyen. IV. 14. no. 6.
— *minima Chamaedryos folio* Sloane. III. 628. no. 103.
— mollis Martens et Galeotti. VI. 686. no. 2.
— Montevidensis Spr. IV. 20. no. 33.
— *Montevidensis* Spr. IV. 28. no. 66.
— *Moranensis* Willd. IV. 30. no. 74.
— *multifida* Rz. et Pav. IV. 30. no. 76.
— *multifida β. contracta* Bot. Reg. IV. 31. no. 76. *γ.*
— *mutabilis* Jcq. IV. 7. no. 18.
— *Mysoorensis* Wght. IV. 12. no. 3.
— nervosa Scheele. VI. 686. no. 4.
— *nodiflora* Linn. IV. 49. no. 30.
— *nodiflora capite oblongo* Barrel. IV. 49. no. 30.
— *Oblactia* Retz. IV. 32. no. 79.
— *Obletia* Med. IV. 32. no. 79.
— *odorata* Meyen. IV. 30. no. 76.
— officinalis Linn. IV. 25. no. 56.
— *officinalis* Lour. IV. 25. no. 56.
— *orchioides* Hortor. IV. 36. no. 8.
— *Orubica* Linn. IV. 7. no. 17.
— *Orubica Teucrii folio* Pluk. IV. 7. no. 17.
— ovata Cham. IV. 19. no. 29.
— paniculata Lam. IV. 21. no. 41.
— *parviflora* Ruiz. IV. 25. no. 54.
— pauciflora Martens et Galeotti. VI. 687. no. 6.
— phlogiflora Cham. IV. 26. no. 60.
β. canescenti-hirtello scabra.
α. glabra.
— Platensis Spr. IV. 33. no. 90.
— pogostoma Kltzsch. IV. 31. no. 77.
— polycnemoides Lagasca. IV. 14. no. 7.
— polystachya H. B. Kth. IV. 21. no. 39.
— *prismatica* Linn. IV. 8. no. 23.
— *prostrata* R. Brown IV. 32. no. 79.
— *pseudogervão* St. Hil. IV. 11. no. 1.
— *pulchella* Sweet. IV. 13. no. 4.
— *quadrangularis* Vellozo. IV. 20. no. 31.
— radicans Gill. et Hook. IV. 24. no. 51.
— *recta* Dod. IV. 25. no. 56.

Verbena recta H. B. Kth. IV. 20. no. 37.
— *recta Canadensis Urticae folio* Moris. IV. 21. no. 42.
— *remota* Bth. IV. 25. no. 54.
— *repens* Savi. IV. 49. no. 30.
— *repens* Spr. IV. 24. no. 53.
— rhinanthifolia Martens et Galeotti. VI. 687. no. 7.
— ribifolia Wlprs. IV. 29. no. 70.
— *rigens* Michx. IV. 23. no. 48.
— rigida Spr. IV. 32. no. 86.
— *rosea* Hort. IV. 7. no. 18.
— rugosa Mill. *IV. 33.
— *rugosa* Mühlnbrg. IV. 18. no. 26.
— *Sabini* Hort. IV. 31. no. 76. γ.
— sagittalis Cham. IV. 18. no. 25.
— salviaefolia Hook. et Arn. IV. 13. no. 1.
— *sarmentosa* Willd. IV. 48. no. 26.
— *scaberrima* Cham. IV. 27. no. 63.
— *scabra* Mhlnbrg. IV. 47. no. 22.
— scabra Vahl. IV. 21. no. 43.
— scoparia Gill. et Hook. IV. 16. no. 18.
— scoparia Tausch. IV. 32. no. 82.
— scordioides Cham. IV. 27. no. 65.
— *scordioides* Cham. IV. 29. no. 69.
— selaginoides Kth. IV. 15. no. 13.
— *Selloi* Spr. IV. 13. no. 5.
— seriphioides Gill. et Hook. IV. 14. no. 3.
— setosa Martens et Galeotti. VI. 887. no. 9.
— simplex Lehm. IV. 32. no. 81.
— *sororia* D. Don. IV. 25. no. 56.
— spathulata Gill. et Hook. IV. 17. no. 23.
— *spicata Jamaicana etc.* Pluk. IV. 8. no. 23.
— spuria Linn. IV. 25. no. 58.
— *squamosa* Jcq. IV. 9. no. 27.
— stellarioides Cham. IV. 26. no. 59.
α. decurrens.
β. sessilis.
— stenophylla Scheele. VI. 686. no. 3.
— *stoechadifolia* Linn. IV. 47. no. 21.
— stricta Venten. IV. 23. no. 48.
— strigosa Cham. IV. 23. no. 47.
— *strigosa* Hook. IV. 23. no. 49.
— *suffruticosa* Aublet. IV. 47. no. 21.
— *suffruticosa reclinata etc.* P. Br. IV. 47. no. 21.
— *sulphurea* Meisn. IV. 12. no. 2.
— supina Clus. IV. 25. no. 57.
— *tenera* Spr. IV. 13. no. 4.
— *tenuifolia* Bauh. IV. 25. no. 57.
— teucriifolia Martens et Galeotti. VI. 687. no. 10.
— teucrioides Gill. et Hook. IV. 29. no. 69.
— thymifolia Lagasca. IV. 32. no. 85.
— thymoides Cham. IV. 15. no. 15.
— *trichotoma* Mnch. IV. 20. no. 31.
Verbena tridactylides Lagasca. IV. 14. no. 8.
— tridens Lagasca. IV. 14. no. 9.
— trifida H. B. Kth. IV. 14. no. 10.
— *triphylla* L'Hérit. IV. 41. no. 1.
— tuberosa Grah. IV. 33. no. 89.
— Tweediana Niven. IV. 28. no. 68.
— urticifolia Linn. IV. 21. no. 42.
— valerianoides H. B. Kth. IV. 20. no. 32.
— venosa Gill. et Hook. IV. 27. no. 63.
— veronicaefolia H. B. Kth. IV. 20. no. 35.
— *veronicaefolia* Sm. IV. 28. no. 66.
— *virgata* Rz. et Pav. IV. 42. no. 7.
— xutha Lehm. IV. 32. no. 83.
Verbenaea Wlprs. IV. 14.
VERBENACEAE Juss. IV. 3. VI. 686.
Verbesina Lssng. II. 620. II. 987. VI. 170.
— argentea Bertol. II. 621. no. 6.
— auriculata Hook. et Arn. II. 621. no. 4.
— *Coreopsis* Michx. II. 982. no. 1.
— *Coreopsis β. alba* Michx. II. 982. no. 2.
— glabrata Hook. et Arn. II. 621. no. 3.
— *hastulata* Hook. et Arn. II. 620. no. 1.
— helianthoides Hook. et Arn. II. 621. no. 5.
— scabra Bth. II. 621. no. 2.
— *subcordata* DC.? II. 621. no. 5.
— sublobata Bth. VI. 170. no. 1.
— triplinervia Vis. II. 621. no. 7.
— villosa Nutt. II. 620. no. 1.
— *villosa* Nutt. II. 987. no. 1. *β.*
— Virginica Linn. * II. 987. no. 1.
Verbesineae Lssng. II. 619. II. 987. VI. 169.
Vernonia Schreb. II. 538. II. 945. VI. 89.
— Abyssinica C. H. Schultz. II. 947. no. 13.
— acutangula Gardn. VI. 96. no. 44.
— Adamantium Gardn. VI. 95. no. 37.
— *adenosticta* Fnzl. VI. 98. no. 1.
— Adoënsis C. H. Schultz. II. 946. no. 11.
— albiflora Gardn. VI. 96. no. 43.
— *altissima* Lssng. II. 540. no. 11.
— altissima Michx. II. 540. no. 13. (c. varr. *α. β. γ.*)
— *altissima* Nutt. II. 540. no. 11. *γ.*
— *altissima β. marginata* Torrey. II. 540. no. 12.
— ammophila Gardn. VI. 97. no. 49.
— angulifolia DC. * VI. 97. no. 50.
β. Kraussii C. H. Schultz.
— *angustifolia* Ell. II. 540. no. 13. *α.*
— Ararana Gardn. VI. 97. no. 48.
— Araripensis Gardn. VI. 95. no. 38.
— arcuata Gardn. VI. 95. no. 34.
— argyrophylla Lssng. VI. 98. †
— asterotrichia Poepp. et Endl. II. 539. no. 5.
— Baldwinii Torr. II. 539. no. 10.
— Burchelliana Gardn. VI. 89. no. 3.
— *canescens* C. H. Schultz. VI. 97. no. 51

Vernonia chiliantha Wlprs. II. 541. no. 17.
— chromolepis Gardn. VI. 96. no. 41.
— clavata Gardn. VI. 94. no. 33.
— collina Gardn. VI. 92. no. 19.
— compacta Gardn. VI. 93. no. 25.
— congesta Bth. II. 539. no. 6.
— *conyzoides* Wlprs. VI. 138. no. 1.
— Corcovadensis Gardn. VI. 94. no. 29.
— *corymbosa* Schweinitz. II. 540. no. 11.
— crenata Gardn. VI. 94. no. 30.
— cuneifolia Gardn. VI. 92. no. 22.
— cyanopioides Wlprs. II. 541. no. 18.
— cylindrica C. H. Schultz. II. 945. no. 6.
— daphnoides Wlprs. II. 541. no. 19.
— decumbens Gardn. VI. 91. no. 16.
— Drégeana C. H. Schultz. *II. 947. no. 20.
— ehretifolia Bth. II. 540. no. 15.
— *elaeagnoides* C. H. Schultz. VI. 97. no. 53.
— eriolepis Gardn. VI. 96. no. 42.
— *eriosematoides* Wlprs. II. 679. no. 1. VI. 317. no. 1.
— Estrellensis Gardn. VI. 93. no. 23.
— fagifolia Gardn. VI. 93. no. 26.
— *fasciculata* DC. II. 540. no. 13. *a.*
— fasciculata Michx. *II. 540. no. 11. (c. varr. *β. γ. δ.*)
— floccosa Gardn. VI. 96. no. 45.
— florida Gardn. VI. 92. no. 18.
— foliosa Gardn. VI. 89. no. 5.
— glomeruliflora Wlprs. II. 538. no. 1.
— Gomphrena Wlprs. VI. 90. no. 8.
— Hilariana Gardn. VI. 91. no. 12.
— hirsuta C. H. Schultz. *II. 947. no. 17.
— Hochstetteri C. H. Schultz. II. 945. no. 5. *β.* rubicunda.
— *Hochstetteri β. rubicunda* C. H. Schultz. VI. 98. uo. 54.
— imbricata Gardn. VI. 89. no. 2.
— inulaefolia Steud. II. 946. no. 9.
— Jamesii Torr. et Gr. II. 540. no. 12.
— Koestelini Hochst. *II. 947. no. 21. *VI. 98. no. 54.
— Kotschyana C. H. Schultz. II. 947. no. 12.
— Kraussii C. H. Schultz. II. 947. no. 16. *VI. 97. no. 53.
— lanuginosa Gardn. VI. 94. no. 31.
— laxa Gardn. VI. 92. no. 21.
— Luschnatiana Wlprs. II. 539. no. 2.
— Martiana Gardn. VI. 89. no. 4.
— membranacea Gardn. VI. 93. no. 28.
— micans Bth. VI. 90. no. 7.
— Miersiana Gardn. VI. 91. no. 15.
— Natalensis C. H. Schultz. *II. 947. no. 15. *VI. 97. no. 52.
— neriifolia Gardn. VI. 93. no. 27.
— nitens Gardn. VI. 95. no. 36.
Vernonia Noveboracensis Willd. *II. 539. no. 9. (c. varr. *β.* et *γ.* ibid.)
— oblonga Gardn. VI. 90. no. 6.
— *octangularis* Meyen. VI. 136. no. 9.
— oligocephala C. H. Schultz. *II. 947. no. 19. VI. 702. no. 2.
— opaca Bth. II. 539. no. 4.
— ovalifolia Torr. et Gr. II. 540. no. 14.
— Pacchensis Bth. VI. 91. no. 10.
— paludosa Gardn. VI. 91. no. 13.
— palustris Gardn. VI. 93. no. 24.
— *paniculata* DC. II. 542. no. 1.
— pauciflora Lssng. *II. 947. no. 14.
— Perrottettii C. H. Schultz. II. 947. no. 18.
— phylicaeformis Wlprs. VI. 89. no. 1. *β.* resinosa.
— pinifolia Lssng. *VI. 97. no. 51.
— platycephala Gardn. VI. 92. no. 17.
— *plumbaginifolia* Fnzl. VI. 98. no. 54.
— *praealta* DC. II. 540. no. 11.
— *praealta* Willd. II. 539. no. 9. *β.*
— profuga Notaris. II. 539. no. 7.
— purpurascens C. H. Schultz. II. 945. no. 3.
— purpurea C. H. Schultz. II. 946. no. 10.
— pycnantha Bth. VI. 91. no. 11.
— reflexa Gardn. VI. 95. no. 40.
— reticulata Gardn. VI. 97. no. 47.
— rhomboidea Edgwrth. VI. 702. no. 1.
— Riedeliana Gardn. VI. 92. no. 20.
— Rüppellii C. H. Schultz. II. 946. no. 8.
— rupestris Gardn. VI. 91. no. 14.
— Sarmentiana Gardn. VI. 95. no. 35.
— *scaberrima* Nutt. II. 540. no. 13. *β.*
— *Schimperi* C. H. Schultz. II. 946. no. 9.
— Sinclairii Bth. VI. 90. no. 9.
— solanifolia Bth. II. 539. no. 8.
— *sphaeroidea* Nutt. II. 540. no. 10.
— *stoechadifolia* C. H. Schultz. VI. 98. no. 54.
— stricta Gardn. VI. 94. no. 32.
— subcordata Gardn. VI. 97. no. 46.
— subsessilis Wlprs. II. 539. no. 3.
— *tomentosa* Ell. II. 539. no. 9. *γ.*
— tricephala Gardn. VI. 95. no. 39.
— Unionis C. H. Schultz. II. 945. no. 7.
— verbascoides Wlprs. II. 540. no. 16.
Vernoniaceae Lssng. II. 538. II. 944. VI. 88.
Vernonieae Cass. II. 538. II. 944. VI. 88.
Veronica Linn. III. 335. 453. °III. 968. VI. 647.
Veronica Rchb. III. 338. III. 453.
Veronica Riv. III. 343. no. 36.
Veronica no. 544. Hall. III. 356. no. 102.
Veronica no. 545. *a.* Hall. III. 354. no. 90.
— abrotanifolia Lnk. *III. 368.
— Abyssinica Fresenius. VI. 648. no. 9.
— *acinacifolia* G. Don. III. 340. no. 20.

Veronica acinacifolia Schlchr. III. 338. no. 11.
— *acinacifolia* Willd. III. 340. no. 21.
— acinifolia Linn. III. 339. no. 20.
— *acuta* Mart. III. 362. no. 8. β. adnot. III. 363. no. 121.
— acutiflora Lapeyr. III. 345. no. 45.
— agrestis Linn. III. 336. no. 5.
— *agrestis* Sm. III. 336. no. 6.
— *agrestis* β. Whlnbrg. III. 336. no. 6.
— *agrestis* var. *Byzantina* Sibthrp. III. 337. no. 8.
— *Allionii* Schmdt. III. 343. no. 36. γ.
— *Allionii* Sm. III. 343. no. 39.
— alpina Linn. III. 356. no. 102.
γ. crenata | β. heterophylla | α. integrifolia | ζ. minor | ε. serratifolia } Rchb.
— *alpina* Oed. III. 356. no. 102. α.
— *alpina* Sievers. III. 355. no. 97.
— *con foglio di Serpillo* Pon. III. 357. no. 106.
— *alpina var.?* Flor. Danic. III. 356. no. 102. δ.
— *alpina pumila, caule aphyllo* Bocc. III. 342. no. 34.
— *alpina* var. *Unalaschkensis* Cham. et Schlchtd. III. 356. no. 102. δ.
— *alpina* Linn. δ. *Wormskioldii* Hook. III. 356. no. 102.
— *Altaica* Fisch. III. 362. no. 120. α.
— *alternifolia* Lej. III. 362. no. 7. in adnot. III. 363. no. 122. γ.
— *ambigua* Mart. III. 363. no. 121.
— *Americana erecta frutescens et ramosa* Herm. III. 331. no. 1.
— *amethystina* Willd. III. 361. no. 5. β. adnot. III. 362. no. 120. α.
— amoena M. Bieb. III. 339. no. 19.
— Anagallis Linn. III. 349. no. 77. (c. varr. β. γ. et δ.)
— *Anagallis* var. *minor* Ten. III. 349. no. 77. δ.
— *anagalloides* Guss. III. 349. no. 77. δ.
— *Anarrhinum* Hort. Dresd. III. 361. no. 6. α. adnot.
— *angustifolia* Brnhrd. III. 351. no. 83. α.
— *angustifolia* Fisch. III. 351. no. 83. δ. III. 352. no. 1. ζ. adnot. III. 366. no. 136.
— angustifolia A. Rich. III. 346. no. 58.
— *angustifolia, floribus paniculatis* Amm. III. 362. no. 120. α.
— anisophylla C. Koch. III. 344. no. 40.
— aphylla Linn. III. 342. no. 34.
— Appennina Tausch. III. 938.
— arbustulosa Hffmnsgg. III. 354. no. 92.
— *arguta* R. Br. III. 345. no. 51.
Veronica arguta Hort. Berol. III. 360. adn. no. 1. ε.
— *arguta* Moretti. III. 360. adn. no. 2.
— arguta Schrad. III. 362. adn. no. 7.
β. longebracteata | γ. nitens } Rchb. ibid.
— *arguta* Willd. III. 362. adn. no. 7. γ.
— *aristata* C. H. Schultz. VI. 97. no. 52.
— arvensis Linn. III. 340. no. 21.
— ascendens D. Don. *III. 368.
— Aucheri Boiss. III. 453. no. 152.
— *australis* Schrad. III. 360. no. 3. β. adnot. III. 363. no. 122. β.
— Austriaca Linn. III. 351. no. 83.
α. dentata Koch.
δ. multifida Rchb.
η. orientalis Linn.
ε. pectinata Rchb.
β. pinnatifida Koch.
ζ. trichocarpa Linn.
— *Austriaca* Linn. III. 351. no. 83. β.
— *azurea* Schott. III. 362. adn. no. 8. β.
— Bachofenii Heuffel. III. 864. no. 124.
— *Barrelieri* Schott. III. 360. no. 1. β. adn. III. 363. no. 122. ε.
— *Baumgartenii* Roem. et Schult. III. 348. no. 74.
— Baumgartenii Roem. et Schult. III. 355. no. 96.
— Beccabunga Linn. III. 349. no. 78. (cum varr. β. et γ.)
— *Beccabunga* β. *alpina* Ten. III. 350. no. 78. β.
— *Bellardi* All. III. 339. no. 15. β.
— bellidioides Linn. III. 353. no. 89.
— Billardieri Vahl. III. 346. no. 56.
— biloba Linn. III. 335. no. 1.
β. minima C. Koch. III. 336.
— *biloba* Schimper. III. 453. no. 151.
— *Brachtii* Opitz. III. 363. no. 121. adnot.
— *brachyphylla* Roem. et Schult. III. 360. no. 1. ε. adnot.
— bracteata Opitz. III. 367. no. 147.
— *brevicaulis* Tausch. III. 938.
— *brevifolia* M. Bieb. III. 361. no. 5. β. adn. III. 362. no. 120. α. III. 363. no. 120. γ.
— *brevifolia* Lnk. III. 360. adnot. no. 1. ε.
— Brownii Roem. et Schult. III. 345. no. 51.
—? *Brunoniana* Wall. III. 370. no. 1.
— *Buxbaumiana* Pall. III. 367. no. 142.
— Buxbaumii Ten. III. 337. no. 8.
— caespitosa Boiss. III. 455. no. 162.
— callistachya Ldb. *III. 368.
— calycina R. Br. III. 347. no. 63.
— campylopoda Boiss. III. 453. no. 151.
— cana Wall. III. 359. no. 119.

Veronica candida Lodd. *III. 368.
— *canescens* Pall. III. 360. adnot. no. 1. ε.
— *canescens* Schrad. III. 360. no. 3. β. adn.
— Capensis Fnzl. III. 343. no. 38.
— capitata Royle. III. 355. no. 101.
— *capitulata* Poir. III. 362. no. 120. α.
— cardiocarpa Wlprs. III. 335. no. 2.
— Cariensis Boiss. III. 454. no. 160.
— *carnea* DC. III. 361. adnot. no. 5. γ.
— *carnea* Hort. III. 361. no. 4. α. adnot.
— *carnosula* Lam. III. 340. no. 23.
— *Caroliniana* Poir. III. 349. no. 75.
— *Caroliniana* Walt. III. 340. no. 23.
— cartilaginea Ldb. III. 365. no. 130.
— cataractae Forst. III. 358. no. 115.
— *caule hexangulari etc.* Sloane. III. 269. no. 26.
— *caule simplici foliis congestis terminato* Allion. III. 356. no. 102.
— ceratocarpa C. A. Mey. III. 340. no. 24.
— Chaixi Lapeyr. III. 348. no. 71.
β. minor.
— chamaedryoides Bory et Chaub. III. 344. no. 43.
— chamaedrys Linn. III. 344. no. 42.
γ. cano-pubescens.
β. lamiifolia.
— *chamaepithyoides* Lam. III. 339. no. 16.
— chamaepithys Griseb. III. 453. no. 153.
— *Chia Cymbalariae folio* Buxb. III. 338. no. 10.
— Chilensis H. B. Kth. III. 340. no. 23.
— *ciliaris* Hffm. III. 362. adnot. no. 8. ε.
— *circaeoides* G. Don. III. 348. no. 73.
— circaeoides G. Don. *III. 368.
— *Clusii* Schott. III. 360. no. 1. δ. adnot. III. 363. no. 122. α.
— *comosa* Hortor. III. 362. adnot. no. 8. γ.
— *complicata* Hffm. III. 362. no. 8. α. adn. III. 363. no. 121.
— *condensata* Hortor. III. 362. adn. no. 8. γ.
— confusa Roem. et Schult. III. 365. no. 132.
— *corymbosa* Hortor. III. 366. no. 134.
— *Crantzii* Schult. III. 360. adnot. no. 2.
— *crassifolia* Kitaib. III. 360. no. 2. adnot. III. 364. no. 122. ζ.
— crassifolia Wierzb. III. 361. no. 123.
— crenulata Hffm. III. 360. no. 4. adnot.
γ. crenulata Hffm.
β. grandis Rchb.
α. paludosa Rchb.
— Cretica Pall. III. 357. no. 107.
— crinita Kit. III. 356. no. 86.
— *crinita* Kit.? III. 352. adnot. no. 3. β.
— *crispa* Hort. III. 352. no. 3. ζ. adnot.
— Crista galli Steven. III. 335. no. 1.
Veronica cristata Brnhrd. III. 360. no. 2. adn. III. 363. no. 122. ζ.
— cuneifolia D. Don. III. 341. no. 31.
— Cymbalaria Dodard. III. 337. no. 10.
— *cymbalariaefolia* Schm. III. 337. no. 8.
— cymbalariaefolia Vahl. III. 338. no. 10.
— Dabneyi Hochst. III. 454. no. 156.
— decussata Ait. III. 346. no. 60.
— deltigera Wall. III. 347. no. 68.
— densiflora Ldb. III. 355. no. 97.
— *dentata* Schmidt. III. 351. no. 1. γ. adnot. III. 351. no. 83. α.
— *dentata* Schrad. III. 352. no. 2. adnot.
— *dentosa* Hortor. III. 362. adnot. no. 8. γ.
— *depauperata* Waldst. et Kit. III. 342. no. 34.
— depauperata Waldst. et Kit. III. 342. no. 35.
— depressa Kit. III. 341. no. 27.
— *Derwentia* Andrws. III. 347. no. 62.
— didyma Ten. III. 336. no. 6. (c. var. β.) *III. 453. no. 5.
— diffusa Hook. fil. III. 347. no. 65.
— *digitata* Lam. III. 338. no. 12.
— digitata Vahl. III. 339. no. 16.
— *Dillenii* Crantz. III. 339. no. 15.
— diosmifolia R. Cunn. III. 359. no. 118.
— distans R. Br. III. 345. no. 52.
— *divaricata* Tausch. III. 344. no. 42. β.
— diversifolia Mnch. *III. 368.
— *dubia* Chaix. III. 348. no. 71.
— *elata* Host. III. 362. no. 8. ε. adnot.
— *elatior* Ehrh. III. 362. no. 8. δ. adnot.
— *elatior* Host. III. 363. no. 121.
— *elegans* DC. III. 361. no. 5. γ. *** adnot.
— elliptica Forst. III. 346. no. 59.
— *erecta sylvestris* Rivin. III. 358. no. 109.
— erinoides Boiss. III. 455. no. 163.
— euphrasiaefolia Lnk. III. 356. no. 103.
— exaltata Maud. *III. 368.
— *falcata* Mart. III. 362. no. 8. ε. adnot.
— *filiformis* Birol. III. 337. no. 8.
— filiformis Vahl. III. 341. no. 25.
— *flexuosa* Host. III. 362. adnot. no. 8. α.
— *floribunda* R. Br. III. 346. no. 54.
— *florida* Schmdt. III. 344. no. 42. γ.
— *flosculis oblongis pedicellis insidentibus* Buxb. III. 337. no. 8.
— Fluminensis Arrabida. III. 368. no. 150.
— *foemina* Fchs. III. 193. no. 18.
— *foliis inferioribus ovatis crenatis* Gmel. III. 372. no. 4.
— *folio Chamaedryos* Riv. III. 336. no. 6.
— *folio Hederae* Riv. III. 337. no. 9.
— *foliosa* Waldst. et Kit. III. 361. no. 5. β adnot. III. 363. no. 120. γ.
— fontana Pall. III. 358. no. 111.

Veronica formosa R. Br. III. 346. no. 61.
— Froelichiana Rxb. III. 345. no. 44.
— *frutescens* Scop. III. 354. no. 90.
— *frutescens durior etc.* Bocc. III. 350. no. 82.
— *fruticosa erecta dulcis hexangulari caule* Sloan. III. 331. no. 1.
— *fruticulosa* Fl. Danic. III. 357. no. 106.
— fruticulosa Linn. III. 354. no. 90.
— *galeopsifolia* Gilib. III. 348. no. 73.
— Gebbardiana Vest. III. 356. adnot.
— *Gebhardiana* Vest. III. 356. no. 102. β.
— *geniculata* Host. III. 361. adn. no. 6. α.
— gentianifolia Sweet. * III. 368.
— gentianoides Vahl. III. 367. no. 142.
— *glabra* Ehrh. III. 363. no. 120. δ.
— glabra Ehrh. III. 365. no. 128.
— *glabra* Schrad. III. 361. no. 5. γ. ** adn.
— glauca Sibthrp. et Sm. III. 339. no. 118.
— *Gouani* Moretti. III. 354. no. 91.
— grandiflora D. Don. III. 339. no. 17.
— *grandiflora* Wall. III. 350. no. 80.
— *grandiflora* Willd. III. 342. no. 34.
— *grandifolia* Vest. III. 356. no. 102. ε.
— grandis Fisch. III. 355. no. 94.
— *grandis* Fisch. III. 361. adnot. no. 4. β.
— *grossa* Mart. III. 361. no. 4. β. adnot. III. 363. no. 121.
— hederaefolia Linn. III. 337. no. 9.
— *hederaefolia* β. Linn. III. 338. no. 10.
— *Henningii* Opitz. III. 363. no. 121. adnot.
— herniarioides Pourr. III. 358. no. 110.
— *heterophylla* Salisb. III. 352. no. 83. η.
— Himalensis D. Don. III. 350. no. 80.
— *hirsuta* Hopk. III. 343. no. 37.
— Hookeriana Wlprs. III. 341. no. 32.
— *hospita* M. et K. III. 337. no. 8.
— *Hostii* Moretti. III. 362. no. 8. α. adnot. III. 364. no. 125.
— *humifusa* Dicks. III. 358. no. 109. ε.
— *humilior foliis incisis* Clayt. IV. 26. no. 58.
— *hybrida* M. Bieb. III. 360. no. 2. adnot. III. 364. no. 122. ζ.
— *hybrida* Linn. III. 360. no. 1. γ. adnot. III. 363. no. 122. β.
— *hybrida* Schmidt. III. 360. no. 1. δ. adn.
— *incana* Linn. III. 360. no. 1. ε. adnot.
— *incana* Willd. III. 360. no. 3. β. adnot.
— *incarnata* G. Don. III. 361. no. 5. γ. *** adnot.
— incisa Ait. III. 367. no. 140.
— integrifolia Willd. III. 356. no. 102. α.
— *Jacquini* Roem. et Schult. III. 351. no. 83. β.
— Javanica Blume. III. 355. no. 99.
— *Jungbaueri* Opitz. III. 363. no. 121. adn.
Veronica Kamtschatica Linn. III. 342. no. 34.
— Koeleri Roem. et Schult. III. 367. no. 145.
— *Kosteletzkyi* Opitz. III. 363. no. 121. adn.
— labiata R. Br. III. 346. no. 62.
— *laciniata* Ait. III. 361. no. 5. γ. * adnot.
— *laciniata* Mnch. III. 351. no. 83. β.
— *laeta* Hort. III. 360. no. 3. β. adnot.
— laeta Karel. et Kiril. III. 366. no. 138.
— *laevis* Lam. III. 340. no. 23.
— *lamiifolia* Hayne. III. 344. no. 42. β.
— lanosa Bth. III. 355. no. 95.
— *Lappago* Schrank. III. 337. no. 9.
— latifolia Linn. III. 352. no. 3. adnot. III. 352. no. 84.
α. major, β. minor } Schrad. III. 353. no. 84.
α. decumbens Rchb., ε. genuina Rchb., β. heterophylla Rchb., η. heterophylla Salisb., γ. lacinata Mnch., ϑ. multifida Jcq., ζ. plicata Pohl., δ. pseudochamaedrys Jcq. } III. 352. no. 3. adn.
— *latifolia* Rchb. III. 351. no. 83.
— *latifolia* Scop. III. 348. no. 73.
— *latifolia γ. dubia* Lapeyr. III. 348. no. 71.
— *latifolia β. heterophylla* Rchb. III. 353. no. 86.
— *latifolia minor* Riv. III. 340. no. 21.
— Lavaudiana Raoul. VI. 648. no. 7.
— laxa Bth. III. 347. no. 67.
— *laxiflora* Lejeune. III. 361. no. 5. γ. *** adnot. III. 362. no. 120. β.
— *leptostachya* Hortor. III. 361. no. 5. γ. ** in adnot. III. 363. no. 120. δ.
— *leucantha* Helm. III. 362. no. 120. α.
— ligustrifolia R. Cunn. III. 359. no. 117.
— *limosa* Lejeune. III. 350. no. 78. γ.
— linariaefolia Pall. III. 366. no 136.
— Lindleyana Paxton. VI. 647. no. 6.
—? *Lindleyana* Wall. III. 373. no. 1.
— littoralis Arrabida. III. 367. no. 148.
— *longebracteata* Lnk. III. 362. no. 7. β. adnot.
β. *poliocaulis* Lnk. III. 360. no. 3. β. adnot.
— longiflora Roem. et Schult. III. 365. no. 133.
— *longifolia* Bmgrtnr. III. 361. no. 6. adn.
— longifolia Linn. III. 363. no. 121.
— *longifolia* Schrad. III. 362. no. 8. ε. adnot.
— *longifolia* Whlnbrg.? III. 367. no. 147.
— Lutetiana Roem. et Schult. III. 353. no. 85.
— luxurians Ldb. III. 366. no. 135.
— *macrocarpa* Hort. III. 362. no. 6. δ. adn.
— macrocarpa Vahl. III. 346. no. 55.

Veronica macropoda Boiss. III. 453. no. 155.
— macrostachya Vahl. III. 348. no. 72.
— macrostemon Bnge. III. 357. no. 108.
— *major altera frutescens* Moris. III. 353. no. 84.
— *major frutescens Chamaedrys spuria latifolia* Weinm. III. 353. no. 84.
— *maritima* Linn. III. 363. no. 121. III. 367. no. 141.
— maritima Linn. III. 362. no. 8. adn.

β. azurea
α. complicata
γ. condensata
δ. elatior
ε. longifolia
ζ. Oederiana
} Rchb. l. c. adn.

— *maritima* Nocc. et Balb. III. 364. no. 125.
— *maritima* Oed. III. 362. no. 8. ζ. adn.
— *maritima* Rchb. III. 362. no. 8. β. adn.
— *Marylandica* Murr. III. 340. no. 23.
— *mas alpina glabra erecta etc.* Bocc. III. 343. no. 36.
— *mas recta latifolia, spica coerulea* Barrel. III. 360. no. 1. β. adn.
— *maxima* Seguier. III. 348. no. 73.
— maxima Stev. III. 341. no. 29.
— *maxima latifolia seu Quercus folio* Moris. III. 348. no. 73.
— *media* Lej. III. 363. no. 122. γ.
— *media* Schrad. III. 363. no. 121.
— media Schrad. III. 361. no. 6. adn.

δ. cordifolia
β. subtomentosa
α. persicifolia
γ. Schreberiana
} Rchb.

— *media* Svensk bot. III. 360. no. 3. β. adn.
— melancholica Hort. Paris. *III. 368.
— melissaefolia Poir. III. 347. no. 69.
— *melissaefolia* Vahl. III. 348. no. 70.
— *menthaefolia* Schott. III. 360. no. 3. β. adn.
— mesotypa Lnk. *III. 368.
— Michauxii Lam. III. 345. no. 46.
— micrantha Lnk. et Hffmnsgg. III. 345. no. 49.
— microcarpa Boiss. III. 454. no. 157.
— *microphylla* Kitaib. III. 340. no. 21.
— microphylla Kitaib. III. 358. no. 113.
— *minima Clinopodii minoris folio* Bocc. III. 340. no. 20.
— *minima repens* Rivin. III. 358. no. 109.
— *minor angustifolia* Moris. III. 350. no. 82.
— *minor angustifolia etc.* Seguier. III. 350. no. 82.
— *minor foliis imis rotundioribus* Seguier. III. 344. no. 42.
Veronica minor Serpylli folio Lobel. III. 358. no. 109.
— minuta C. A. Mey. III. 347. no. 66.
— *mollis* Lnk. III. 365. no. 127.
— *mollis* Zea. III. 345. no. 49.
— *mollissima* Hortor. III. 345. no. 49.
— montana Linn. III. 344. no. 41.
— *montana* Riv. III. 339. no. 15. III. 352. no. 3. δ. adn.
— montioides Boiss. *VI. 647. no. 4.
— *Mülleri* Mart. III. 361. no. 6. α. adn.
— *Mülleriana* Vest. III. 343. no. 36. γ.
— *multicaulis* Brnhrdi. III. 362. no. 7. adn.
— *multifida* Linn. III. 351. no. 83. δ.
— *neglecta* Schmidt. III. 358. no. 109. γ.
— *neglecta* Vahl. III. 360. no. 3. β. adn.
— nigricans C. Koch. III. 338. no. 14.
— *nitens* Host. III. 360. no. 1. γ. adn. III. 363. no. 122. δ.
— *nitens* Lnk. III. 362. no. 7. γ. adn.
— *nitida* Ehrh. III. 363. no. 120. γ.
— *nitida* Lnk. III. 362. no. 7. γ. adn.
— *nitidula* Rchb. III. 336. no. 6.
— nivea Hook. fil. III. 342. no. 32.
— nivea Lindl. III. 350. no. 81.
— *nova* Koeler. III. 367. no. 145.
— Novae Hollandiae Poir. III. 345. no. 53.
— nudicaulis Karel. et Kiril. III. 336. no. 4.
— *nudicaulis* Pers. III. 342. no. 34.
— nummularia Gouan. III. 355. no. 98.
— *nummulariaefolia* Thuill. III. 358. no. 109. δ.
— nutans Bngrd. III. 355. no. 100.
— *ocymifolia* Thuill. III. 338. no. 11.
— *officinalis* β. Linn. III. 343. no. 39.
— officinalis Linn. III. 342. no. 36. (c. varr. γ. ε. ζ.)

δ. luxurians
β. pusilla
} Linn. III. 343.

— *Olympica* Pall.? III. 367. no. 143.
— opaca Fries. III. 337. no. 7.
— orchidea Crntz. III. 360. no. 2. adn.
— *orchidea* Crntz. III. 363. no. 122. ζ.
— *orientalis* Ait. III. 352. no. 83. η.
— *orientalis* Lodd. III. 352. no. 2. γ. adn.
— *orientalis* β. Vahl. III. 342. no. 33.
— *orientalis* Willd. III. 352. no. 3. η. adn.
— *orientalis, foliis Hederae terrestris etc.* Buxb. III. 341. no. 25.
— *Orsiniana* Ten. III. 351. no. 82.
— *Ossetica* Stev. III. 352. no. 83. η.
— oxycarpa Boiss. *VI. 647. no. 5.
— *oxyphylla* Stev. III. 361. no. 6. α. adn.
— Paederotae Boiss. III. 454. no. 159.
— *pallens* Host. III. 360. no. 3. β. adnot.
— *pallescens* Gater. III. 340. no. 23.

Veronica pallida Hornem. III. 367. no. 143.
— *paludosa* Lej. III. 361. no. 4. *a.* adnot. III. 363. no. 122. *β.*
— *palustris angustifolia* Rivin. III. 348. no. 75.
— *paniculata* Linn. III. 361. no. 5. *a.* adn. III. 362. no. 120. *a.*
— *paniculata* Willd. III. 351. no. 83. *a.*
— Pannonica Mill. *III. 368.
— *Panormitana* Guss. III. 337. no. 10.
— *Parmularia* Poit. et Turp. III. 349. no. 75. *β.*
— *parva saxatilis cauliculis nudis* Seguier. III. 342. no. 34.
— parviflora Vahl. III. 345. no. 54.
— parvifolia Vahl. III. 353. no. 87.
— *pauciflora* Kit.? III. 348. no. 74.
— pauciflora Kit. III. 357. no. 105.
— *pectinata* Vahl. III. 352. no. 83. *ε.*
— peduncularis M. Bieb. III. 345. no. 48. *β.* flaccida.
— *peduncularis γ.* M. Bieb. III. 348. no. 74.
— *pedunculata* Labill. III. 341. no. 30.
— peregrina Linn. III. 340. no. 23.
— perfoliata R. Br. III. 347. no. 64.
— perpusilla Boiss. *VI. 647. no. 3.
— *Persica* Poir. III. 337. no. 8.
— *persicifolia* Schott. III. 361. no. 6. *a.* adn. III. 363. no. 121.
— *Peruviana* Willd. III. 340. no. 23.
— *petiolaris* Lapeyr. III. 362. no. 8. *ε.* adn.
— *petraea* Baumg. III. 355. no. 96.
— *petraea etc.* J. Bauh. III. 369. no. 1.
— *petraea* Pon. III. 369. no. 1.
— petraea Stev. III. 348. no. 74.
— *Pettersii* Opitz. III. 363. no. 121. adnot.
— *pilocarpa* Lnk. III. 352. no. 3. *η.* adnot. III. 352. no. 83. *ζ.*
— *pilosa* Schmidt. III. 352. no. 3. *ζ.* adnot.
— *pilosa* Willd. III. 344. no. 42. *γ.*
— pinnata Ait. III. 366. no. 137.
— *pinnatifida* Auctor. III. 344. no. 42. *γ.*
— *pinnatifida* Lam. III. 339. no. 15.
— pinnatifida Willd. *III. 368.
— *Platensis latifolia* Riv. III. 344. no. 42.
— plebeja R. Br. III. 345. no. 50.
— *plicata* Pohl. III. 344. no. 42. *γ.*
— *polita* Fries. III. 336. no. 6.
— *polyanthos* Thuill. III. 340. no. 21.
— *polygonoides* Lam. III. 339. no. 15. *β.*
— *polymorpha* Willd. III. 351. no. 83. *β.* III. 352. no. 1. *ε.* adnot.
— polystachya Lnk. III. 366. no. 134.
— Ponae Willd. III. 354. no. 91.
— praealta Hortor. *III. 368.
— praecox All. III. 338. no. 11.
— *pratensis a.* Crantz. III. 351. no. 83. *β.*
Veronica pratensis Dodon. III. 358. no. 109.
— *pratensis Nummulariae folio, flore coeruleo* Pluk. III. 358. no. 10. *β.*
— *procumbens* Riv. III. 344. no. 41.
— prostrata Linn. III. 350. no. 82. *III. 938. (III. 352. no. 1. adnot.)
γ. angustifolia Brnhrdi. } III. 352. adn.
ε. Austriaca Linn. } III. 352. adn.
β. genuina Rchb. } III. 352. adn.
ζ. multifida Linn. } III. 352. adn.
δ. pectinata Opitz. } III. 352. adn.
a. saturejaefolia Poit. } III. 352. adn.
— *prostrata ε. angustifolia* Brnhrdi. III. 351. no. 83. *a.*
— *prostrata ε. Austriaca* Rchb. III. 351. no. 83. *β.*
— *prostrata γ. multifida* Rchb. III. 351. no. 83. *δ.*
— *prostrata δ. pectinata* Rchb. III. 352. no. 83. *ε.*
— *Pseudochamaedrys* Jcq. III. 352. no. 3. *δ.* adnot. III. 353. no. 84.
— pulchella Brnhrdi. III. 340. no. 22.
— *pulchella* Guss. III. 336. no. 5.
— *pumila* All. III. 356. no. 102. *β.*
— pumila Clarke. III. 453. no. 154.
— *punctata* Hamilt. III. 350. no. 78.
— Purshii G. Don. III. 350. no. 79.
— *pygmaea* Braune. III. 356. no. 102. *β.*
— Pyrenaica All. III. 343. no. 39.
— *quadrifolia* Schkuhr. III. 362. no. 8. *ε.*
— ramosa Pallas. III. 365. no. 129.
— *recta minima* Clus. III. 360. no. 3. *a.* adn.
— *reniformis* Prsh. III. 350. no. 79.
— reniformis Rafin. III. 341. no. 26.
— repens Clar. III. 341. no. 28.
— *repens ex alis spicata etc.* Allion. III. 343. no. 39.
— *Reuteri* Moritzi. III. 453. no. 5.
— *rigens* Mart. III. 363. no. 121.
— riparia Seidl. *III. 368.
— *Romana* All. III. 338. no. 12. *β.* III. 340. no. 20.
— *Romana* Linn. III. 340. no. 23.
— *Romana* Schmdt. III. 340. no. 21.
— *Romana* Scop. III. 338. no. 11.
— rosea Dsf. III. 353. no. 88.
— rotundifolia Rz. et Pav. III. 367. no. 146.
— *rotundifolia* Schrnk. III. 356. no. 102. *β.*
— *rotundifolia* var. *Brasiliensis* Spr. III. 282. no. 30.
— *rubella* Pallas. III. 362. no. 120. *a.* III. 365. no. 131.
— rubicunda Ledb. III. 365. no. 131.
— *ruderalis* Vahl. III. 358. no. 109.
— *Rudolphiana* Hayne. III. 344. no. 42. *β.*

Veronica rugosa Hort. III. 360. no. 3. β. adn.
— *Rutae folio* Riv. III. 338. no. 12.
— *Ruthenica* Fisch. III. 361. no. 5. γ. adn. III. 363. no. 120. γ.
— salicifolia Forst. III. 346. no. 57. *VI. 647. no. 2.
— *saturejaefolia* Poit. et Turp. III. 351. no. 82. β.
— *saxatilis* J. Bauh. III. 357. no. 106.
— saxatilis Jcq. III. 357. no. 106.
— *saxatilis* β. Willd. III. 355. no. 98.
— Scardica Griseb. III. 455. no. 161.
— *Schmidtii* Roem. et Schult. III. 351. no. 83. α. III. 352. no. 1. γ. adn.
— *Schreberi* Lapeyr. III. 362. no. 8. ε. adn.
— *Schreberiana* Rchb. III. 361. no. 6. γ. adn.
— scutellata Linn. III. 348. no. 75.
α. glabra III. 349.
β. pilosa III. 349.
— secundiflora C. Koch. III. 338. no. 13.
— *segetalis* Pers. III. 338. no. 11.
— *sempervirens* Lam. III. 354. no. 91.
— *serotina* Hort. III. 362. no. 8. δ. adn.
— serpyllifolia Linn. III. 357. no. 109.
ζ. hirsuta
ε. humifusa
γ. neglecta
δ. nummulariaefolia
β. tenella
} III. 358.
— serrulata Pall. III. 365. no. 126.
— sessiliflora Bnge. III. 366. no. 139.
— setigera D. Don. III. 343. no. 37.
— *Sibirica* Linn. III. 369. no. 4.
— Simensis Fresenius. VI. 648. no. 8.
— *Spadana* Lejeune. III. 343. no. 36. δ.
— speciosa A. Cunn. III. 359. no. 116. III. 938. *VI. 647. no. 1.
β. rosea Van Houtte. VI. 746. no. 1.
— *spicata* Auctor. III. 363. no. 122. α. III. 360. no. 3. α. β. γ. δ. adn.
— spicata Linn. III. 363. no. 122. III. 360. no. 3. adn.
ζ. cristata Koch. III. 363. no. 122. III. 360. no. 3. adn.
γ. lamiifolia Koch. III. 363. no. 122.
β. latifolia Koch. III. 363. no 122.
α. minor Rchb. III. 360. no. 3. adn.
β. major Rchb. III. 360. no. 3. adn.
δ. nitens Koch. III. 360. no. 3. α. β. adn. III. 363. no. 122.
ε. setulosa Koch. III. 363. no. 122.
α. vulgaris Koch. III. 363. no. 122.
— *spicata minor* C. Bauh. III. 360. no. 3. α.
— *spicata* γ. *Bertol.* III. 363. no. 122. α.
— *spuria* Junghans. III. 361. no. 5. γ. adn.
— *spuria* Lejeune. III. 361. no. 5. β. adn.
Veronica spuria Linn. III. 359. no. 120. III. 361. no. 5. adn.
γ. foliosa Koch. III. 363. no. 120.
β. grandiflora Rchb. III. 361. no. 5. adn.
β. laxiflora Koch. III. 362. no. 120.
γ. nitida Rchb. III. 361. no. 5. adn.
α. parviflora Rchb. III. 361. no. 5. adn.
α. Schraderi Koch. III. 361. no. 120. III. 361. no. 5. α. adn.
δ. subcordata Koch. III. 363. no. 120.
— *spuria* Spr. III. 361. no. 5. γ. adn. III. 362. no. 120. β.
— *spuria* Schrad. III. 361. no. 120. α.
— squamosa Prsl. III. 359. no. 1. adn.
β. Barrelieri
δ. Clusiana
ε. Linkiana
γ. nitens
α. Vaillantii
} Rchb.
— *squamosa* Prsl. III. 363. no. 122. α.
— Stelleri Pallas. III. 354. no. 93.
— Stephaniana Roem. et Schult. III. 365. no. 127.
— *Sternbergiana* Brnhrdi. III. 363. no. 122. δ. III. 360. no. 3. α.
— stolonifera Lehm. III. 367. no. 149.
— stricta Lodb. *III. 368.
— *strictiflora* Lapeyr. III. 355. no. 98.
— *subacaulis* Lam. III. 342. no. 34.
— sublaciniata G. Don. III. 367. no. 141.
— *succulenta* All. III. 339. no. 15.
— Syriaca Roem. et Schult. III. 341. no. 30.
— Taurica Willd. III. 342. no. 33.
— *Taurica* Willd. III. 352. no. 3. α. adn.
— telephiifolia Tournef. III. 358. no. 114.
— *tenella* All. III. 358. no. 109. β.
— tenella All. III. 358. no. 112.
— *tenella* Schmdt. III. 349. no. 77. β.
— *tenella* Viv. III. 341. no. 28.
— *tenuifolia* M. Bieb. III. 351. no. 83. δ.
— tenuis Ldb. III. 349. no. 76.
— *tenuissime laciniata* Moris. III. 351. no. 83.
— *terrestris annua, folio Polygoni, flore albo* Moris. III. 340. no. 23.
— *tertia fruticans* Clus. III. 357. no. 106.
— tetragona Hook. III. 938.
— *Teucrii facie* Park. III. 351. no. 83. α.
— *Teucrium* Brot. III. 345. no. 49.
— *Teucrium* Host. III. 351. no. 83. α.
— Teucrium Linn. III. 352. no. 2. adn.
ζ. brevicaulis Fsch.
ε. Clusiana Rchb.
δ. Hosteana Rchb.
α. hyssopifolia Rchb.
β. orientalis Ait.
γ. tenuifolia Stev.

Veronica Teucrium Poit. et Turp. III. 353. no. 84.
— *Teucrium* Rchb. III. 351. no. 83.
— *Teucrium* Vahl. III. 352. no. 2. adn. III. 353. no. 84. *β.*
— *Teucrium γ. angustifolia* Ldb. III. 351. no. 83. *α.*
— thymifolia Sibthrp. et Sm. III. 356. no. 104.
— *thymifolia* Willd. III. 356. no. 103.
—? thyrsiflora Wall. III. 175. no. 64.
— Ticinensis Pollini. III. 364. no. 125.
— *Tournefortii* Gmel. III. 337. no. 8.
— *Tournefortii* Schmdt. III. 343. no. 36.
— *trichocarpa* Roem. et Schult. III. 352. no. 83. *ζ.* III. 352. no. 3. *η.* adn.
— *triloba* Opitz. III. 337. no. 9.
— triphyllos Linn. III. 338. no. 12. *β.* pusilla Bertol.
— *triquetra* Kitaib. III. 363. no. 120. *γ.* III. 361. no. 5. *β.*** adn.
— *tubiflora* Fisch. et Mey. III. 370. no. 5.
— Tymphrestea Boiss. et Sprun. III. 454. no. 158.
— umbrosa M. Bieb. III. 345. no. 47.
— *undulata* Wall. III. 349. no. 77.
— urticaefolia Linn. fil. III. 348. no. 73.
— verna Linn. III. 338. no. 15.
— *villosa* Schrad. III. 361. no. 4. *γ.* adn.
— *versicolor* Fries. III. 336. no. 5.
— Vestiana Roem. et Schult. III. 348. no. 70.
— virgata Lnk. III. 362. no. 120. *α.*
— *Virginica* Linn. III. 369. no. 3.
— *viscida* Waldst. III. 338. no. 11.
— vitifolia Sm. III. 367. no. 144.
— Waldsteiniana Schott. *III. 368.
— *Wormskioldii* Roem. et Schult. III. 356. no. 102. *δ.*
— *Xalapensis* H. B. Kth. III. 340. no. 23.
Veronicae similis fruticosa Curassavica Herm. IV. 115. no. 2.
Veronicastrum album Mnch. III. 369. no. 3.
— *laciniatum* Mnch. III. 361. no. 5. *γ.* adn.
— *rubellum* Mnch. III. 369. no. 4.
Veroniceae Bth. III. 331. III. 968. VI. 647.
Verrucularia Adr. Juss. °V. 181.
— glaucophylla Adr. Juss. V. 182. no. 1.
Verticillares (Oxytropis) DC. V. 417.
Verticillaria Rz. et Pav. *I. 392.
Verticillatae Steven (Pedicularis) III. 409.
Verticordia DC. II. 154. ° V. 730.
— acerosa Lindl. II. 156. no. 14.
— Brownii DC. II. 154. no. 4.
— chrysantha Endl. II. 156. no. 17.
— compta Endl. II. 156. no. 11.
— Cunninghami Schauer. II. 155. no. 6.
— *cuspidata* All. Cunn. II. 155. no. 9.
Verticordia densiflora Lindl. II. 154. no. 3.
— Drummondii Schauer. II. 155. no. 7.
— Endlicheriana Schauer. V. 731. no. 4.
— Fontanesii DC. II. 154. no. 1.
— grandiflora Endl. II. 157. no. 18.
— habrantha Schauer. V. 731. no. 2.
— *heliantha* Lindl. II. 157. no. 18.
— Hügelii Endl. II. 155. no. 10.
— insignis Endl. II. 156. no. 12.
— Lehmanni Schauer. V. 731. no. 1.
— Lindleyi Schauer. II. 155. no. 8.
— nitens Schauer. II. 156. no. 16.
— pennigera Endl. II. 155. no. 9.
— picta Endl. II. 155. no. 5.
— *platystigma* All. Cunn. II. 156. no. 10.
— Preissii Schauer. V. 731. no. 3.
— Röei Endl. II. 156. no. 13.
— serrata Schauer. II. 156. no. 15.
— Sieberii Diesing. II. 154. no. 2.
Vesalea floribunda Mart. et Galeotti. VI. 3. no. 3.
— *hirsuta* Mart. et Galeotti. VI. 3. no. 4.
Vesicaria Lam. I. 140.
— alpina Nutt. I. 141. no. 12.
— *Andicola* Gill. I. 140. no. 4.
— angustifolia Nutt. I. 141. no. 7.
— arctica Richards. I. 140. no. 4. (c. var. *β.*)
— brevistyla Torr. et Gr. I. 141. no. 9.
— canescens Zucc. I. 140. no. 1.
— didymocarpa Hook. I. 141. no. 13.
— digitata C. A. Mey. I. 140. no. 2.
— gnaphalodes Boiss. I. 140. no. 3.
— gracilis Hook. I. 141. no. 10.
— grandiflora Hook. I. 141. no. 5. *β.* pallida.
— Nuttallii Torr. et Gr. I. 141. no. 8.
— repanda Nutt. I. 141. no. 6.
— *reticulata* Lam. I. 141. no. 1.
— Shortii Torr. et Gr. I. 141. no. 11.
— utriculata Lam. I. 141. †
Vesicariana DC. I. 140.
Vesicarii (Astragalus) DC. I. 701. II. 867. V. 518.
Vesicastrum Prsl. I. 642. no. 32. II. 852.
Veslingia Visiani. °II. 611. * VI. 158.
— *scabra* Visiani. II. 610. no. 1. VI. 158. no. 3.
— scabra Vis. II. 611. no. 1.
Vestia Willd. III. 123. °III. 955. °VI. 630.
— lycioides Willd. *III. 123. no. 1. VI. 630. no. 1.
Vestieae Endl. III. 123. III. 955. VI. 630.
Vexillaria Bth. I. 753.
— *arborea* Hffmnsgg. I. 752. no. 10.
— glycinoides Bth. * I. 753. no. 3.
— grandiflora Bth. I. 753. no. 5.

Vexillaria laurifolia Bth. *I. 753. no. 1.
— rubiginosa Bth. *I. 753. no. 2.
— villosa Bth. I. 753. no. 4.
Vialia Visiani. °V. 113.
— macrophylla Visiani. *V. 113. no. 1.
Viborgia Thnbrg. I. 607. V. 454.
— cuspidata Bth. V. 454. no. 1.
— flexuosa E. Mey. I. 607. no. 1.
— floribunda E. Mey. I. 608. no. 2.
— *fusca* Eckl. et Zeyh. I. 608. no. 8.
— grandiflora E. Mey. I. 608. no. 11.
— *grandiflora* E. Mey. V. 454. no. 8.
— heterocládos E. Mey. I. 608. no. 6.
— incurvata E. Mey. I. 608. no. 9.
— lanceolata E. Mey. I. 608. no. 3.
— *monoptera* E. Mey. I. 608. no. 7.
— *obcordata* Eckl. et Zeyh. I. 608. no. 2.
— oblongata E. Mey. I. 608. no. 5.
— *oblongata β. cuspidata* E. Mey. V. 454. no. 1.
— parvifolia E. Mey. I. 608. no. 10.
— sericea Thnbrg. *I. 608. no. 8.
— spinescens Eckl. et Zeyh. I. 608. no. 7.
— tenuifolia E. Mey. I. 608. no. 12.
— tetraptera E. Mey. I. 608. no. 4.
Viborgioides (Lebeckia) Bth. V. 453.
Viburnum Linn. II. 450. VI. 7.
— *acerifolium* Bongrd. II. 452. no. 12.
— acutifolium Bth. II. 452. no. 13.
— alternifolium Zolling. et Moritzi. VI. 697.
— *Americanum odoratum etc.* Pluk. IV. 59. no. 2.
— *Americanum odoratum folio parvo orbiculato etc.* Pluk. IV. 63. no. 23.
— *Americanum Urticae foliis* Commel. IV. 60. no. 4.
— *Americanum Urticae foliis etc.* Commel. IV. 61. no. 12.
— capitellatum Wght. et Arn. II. 451. no. 5.
— *Canadense glabrum* Vaill. II. 452. no. 8.
— *cassinoides* Linn. II. 451. no. 7. γ.
— *cassinoides* Mill. II. 452. no. 9.
— cotinifolium Don. II. 452. †
— densum Bth. II. 452. no. 15.
— dentatum Linn. *II. 452. no. 11.
β. ?scabrellum Torr. et Gr.
— *dentatum* Michx. II. 452. no. 11. β.
— discolor Bth. II. 452. no. 17.
— divaricatum Bth. VI. 7. no. 1.
— *edule* Prsh. II. 452. no. 20. β.
— elatum Bth. II. 452. no. 14.
— ellipticum Hook. II. 452. no. 10.
— erubescens DC. II. 452. †
— foetens Dcne. II. 450. no. 1.
— foetidum Wall. II. 452. †
— fragrans Bnge. II. 451. no. 4.
Viburnum Hartwegii Bth. II. 452. no. 16.
— hebanthum Wght. et Arn. II. 450. no. 2.
— *laevigatum* Ait. II. 452. no. 9.
— lasiophyllum Bth. VI. 7. no. 4.
— microcarpum Cham. et Schlchtd. II. 452. no. 19.
— nervosum Hook. et Arn. II. 451. no. 6.
— *nitidum* Ait. II. 451. no. 7. β.
— *nudum* Hook. II. 452. no. 7. γ.
— nudum Linn. II. 451. no. 7.
β. angustifolium } Torr. et Gr.
γ. cassinoides } Torr. et Gr.
α. Claytoni } Torr. et Gr.
— obovatum Walt. *II. 452. no. 9.
— oleaefolium Tausch. II. 452. no. 18.
— *opuloides* Mhlnbrg. II. 452. no. 20. β.
— Opulus Linn. *II. 452. no. 20.
β. Americanum } Hook.
γ. subintegrifolium } Hook.
— *Opulus γ. edule* Michx. II. 453. no. 20. β.
— *Opulus β. Pimina* Michx. II. 452. no. 20. β.
— *oxycoccos* Prsh. II. 452. no. 20. β.
— parviflorum Mart. et Galeotti. VI. 8. no. 5.
— pauciflorum Pylaie. II. 452. no. 12.
— Pichinchense Bth. VI. 7. no. 3.
— plicatum Thnbrg. II. 452. †
— prunifolium Linn. *II. 452. no. 8.
β. ferrugineum Torr. et Gr.
— *prunifolium* Poir. II. 452. no. 8.
— *pyrifolium* Prsh. II. 452. no. 7. γ.
— *pyracanthifolium* Schweintz. II. 451. no. 7. β.
— *Salviae folio floribus albis* Herm. IV. 62. no. 15.
— *scandens* Linn. II. 376. no. 10.
— *serratum* Thnbrg. II. 376. no. 7.
— *squamatum* Wats. II. 451. no. 7. α.
— *squamatum* Willd. II. 452. no. 7. γ.
— stellulatum DC. II. 452. †
— tomentosum Thnbrg. II. 452. †
— triphyllum Bth. VI. 7. no. 2.
— *virens* Thnbrg. II. 376. no. 10.
— Wightianum Wall. II. 451. no. 3.
Vicatia DC. *II. 425.
Vicia Linn. I. 713. II. 885.
— ...... (innominata) I. 718. no. 48.
— albicans Lowe. I. 715. no. 19.
— amoena Fisch. I. 718. †
— Armena Boiss. II. 885. no. 1.
— articulata Willd. II. 886. no. 10.
— Aucheri Jaub. et Spach. II. 886. no. 6.
— Barbazitae Ten. I. 717. no. 44.
— bidentata Hook. I. 717. no. 35.
— bijuga Gill. I. 717. no. 34.
— branchitropis Kar. et Kir. I. 714. no. 12.

Vicia Consentini Cons. I. 717. no. 43.
— costata C. A. Mey. I. 714. no. 9.
— cuspidata Boiss. II. 886. no. 5.
— dasycarpa Ten. I. 713. no. 2.
— dentata Gill. I. 716. no. 33.
— *disperma* DC. I. 713. no. 3.
— erviformis Boiss. I. 713. no. 1.
— exigua Nutt. I. 716. no. 28.
— galeata Boiss. II. 885. no. 3.
— gigantea Bnge. I. 715. no. 17.
— *gigantea* Hook. I. 716. no. 24.
— glauca Prsl. I. 713. no. 5.
— *gracilis* Sol. I. 715. no. 20.
— grandiflora Scop. var. phaeosaemia Griseb. II. 886. no. 7.
— Hookeriana Wlprs. I. 715. no. 24.
— Hyrcanica Fisch. et Mey. I. 718. no. 46.
— lacta Cesati. I. 717. no. 45.
— Leavenworthii Torr. et Gr. I. 716. no. 26. (III. Emend. p. 4.)
— leucantha Riv. I. 718. †
— lilacina C. A. Mey. I. 714. no. 10.
— linearifolia Hook. et Arn. I. 718. no. 47.
— Ludoviciana Nutt. I. 716. no. 25.
— Macraei Hook. et Arn. I. 716. no. 31.
— megalotropis C. A. Mey. I. 714. no. 11.
— *micrantha* Hook. et Arn. I. 716. no. 30.
— micrantha Lowe. I. 715. no. 20.
— micrantha Nutt. I. 716. no. 27.
— *Mitchellii* Raf. I. 713. no. 2.
— monosperma C. Koch. I. 715. no. 15.
— Montevidensis Vogel. I. 717. no. 38.
— multicaulis C. A. Mey. I. 714. no. 8.
— nana Vogel. I. 717. no. 41.
— nigricans Hook. et Arn. I. 716. no. 29.
— obscura Vogel. I. 717. no. 40.
— Oregana Nutt. I. 715. no. 21. (III. Emend. p. 4.)
— pallida Hook. et Arn. I. 716. no. 32.
— pallida Turcz. II. 886. no. 9.
— parviflora Hook. I. 716. no. 30.
— pauciflora Prsl. I. 714. no. 6.
— *pellucida* Jcq. I. 683. no. 16. δ.
— Persica Boiss. II. 885. no. 2.
— picta Fisch. et Mey. I. 714. no. 13.
— pinetorum Boiss. et Sprun. II. 885. no. 4.
— polysperma Ten. I. 718. † no. 4. I. 713.
— pseudo-orobus Fisch. et Mey. I. 714. no. 14.
— rigidula Royle. I. 715. no. 16.
— Selloi Vogel. I. 717. no. 37.
— sericocarpa Fzl. I. 714. no. 7.
— *Sitchensis* Bongrd. I. 716. no. 24.
— sparsifolia Nutt. I. 715. no. 23. (III. Emend. p. 4.)
— stenophylla Vogel. I. 717. no. 39.
Vicia tenuifolia Rth. var. laxiflora Griseb. II. 886. no. 8.
— tephrosioides Vogel. I. 717. no. 36.
— trichocalyx Moris. I. 713. no. 3.
— tridentata Bnge. I. 715. no. 18.
— tridentata Schweintz. I. 718. no. 49.
— truncata Nutt. I. 715. no. 22.
— vestita Boiss. I. 717. no. 42.
Vicieae DC. I. 712. II. 883.
Vicioides (Cicer) Jaub. et Spach. II. 884.
Vicoa Cass. *II. 601. *II. 954. no. 1.
Victoria Lindl. I. 106.
— Cruziana d'Orbigny. I. 106. no. 2.
— regia Lindl. I. 106. no. 1.
Vidua Coult. II. 536. VI. 86. no. 2.
Vigna Savi. I. 778. V. 537.
— anomala Wlprs. I. 779. no. 8.
— brachystachys Bth. V. 538. no. 2.
— Capensis Wlprs. *I. 778. no. 2.
β. oblonga E. Mey.
— carinalis Bth. V. 538. no. 4.
— Catjang Wlprs. *I. 778. no. 1.
— helicopus Wlprs. I. 779. no. 6.
— hirta Hook. V. 538. no. 5.
— hispida Wlprs. I. 778. no. 3.
— oblonga Bth. V. 538. no. 3.
—? O-Wahiensis Vogel. I. 779. no. 7.
— retusa Wlprs. I. 778. no. 5.
— rotundifolia Hsskrl. V. 537. no. 1.
— triloba Wlprs. *I. 778. no. 4.
— unguiculata Wlprs. *I. 779. no. 9.
— *villosa?* Hook. et Arn. I. 779. no. 7.
Viguiera H. B. Kth. *II. 615. II. 982. VI. 164.
— subincisa Bth. VI. 164. no. 1.
— Texana Torr. et Gr. II. 982. no. 1.
Villanova Lag. *II. 637. VI. 208.
— Titicacensis Wlprs. VI. 208. no. 1.
Villaresia Rz. et Pav. I. 541.
— mucronata Rz. et Pav. *I. 541. no. 1.
Villarsia Ventenat. VI. 509.
— capitata N. ab E. VI. 509. no. 1.
— involucrata Hook. VI. 509. no. 3.
— latifolia Bth. VI. 509. no. 2.
Vilmorinia DC. *I. 762.
Viminaria Sm. I. 571. V. 429.
— denudata Sm. *I. 571. no. 1.
—? Preissii Meisn. V. 429. no. 1.
Vinca Linn. *VI. 470.
Vincentia triflora Bojer. V. 119. no. 1.
Vincetoxicum Mnch. VI. 483.
— Anatolicum Boiss. VI. 484. no. 3.
— *canescens* Dcne. VI. 484. no. 2.
— *fruticulosum* Dcne. VI. 483. no. 1. adn.
— minus C. Koch. VI. 483. no. 1.
— nivale Boiss. VI. 484. no. 5.

Vincetoxicum speciosum Boiss. VI. 484. no. 4.
— Tmoleum Boiss. VI. 481. no. 2.
Vinhatico Casal. V. 561. no. 1.
Viola Linn. I. 213. II. 766. V. 59.
— acuminata Ldb. II. 766. no. 6.
— *acuta* Bigel. I. 217. no. 46. β.
— *affinis* Le Conte. I. 217. no. 41.
— *Alleghaniensis* Roem. et Schult. I. 217. no. 44. β.
— Allionii Piv. I. 220. †
— alpina Jcq. I. 220. †
— ambigua Wald. et Kit. I. 220. †
— *amoena* Le Conte. I. 217. no. 37. et 45.
— Asterias Hook. et Arn. I. 219. no. 62.
— arcuata Blume. I. 216. no. 30.
— attenuata Swett. I. 217. no. 36.
— balsaminoides Gardn. I. 219. no. 65.
— Bertolonii De Salis. I. 213. no. 4.
— biflora Linn. I. 220. †
— Billottii F. W. Schultz. I. 213. no. 1.
— blanda Willd. *I. 217. no. 45. I. 219. †
— borealis Weinm. I. 214. no. 13.
— brachyceras Turcz. II. 766. no. 5.
— calcarata Linn. I. 220. †
β. Zoyssii Wulff. I. 220. †
— Caleyana G. Don. I. 216. no. 34.
— campestris M. B. I. 219. †
α. Caucasica, γ. Pannonica, β. Podolica } M. B. I. 219. †
— Canadensis Linn. *I. 218. no. 55. I. 219. †
β. corymbosa Nutt. I. 218. no. 55.
— canina Linn. I. 220. †
γ. ericetorum, δ. lucorum, ε. montana, β. sabulosa } Rchb. I. 220. †
— canino-sylvestris Rchb. I. 220. †
— Cenisia All. I. 220. †
— *Cenisia* Lag. I. 214. no. 5. V. 59. no. 5. β.
— cerasifolia St. Hil. V. 59 no. 3.
— Chamissonis Ging. I. 216. no. 33.
— cheiranthifolia H. B. Kth. I. 214. no. 8.
— *Chinensis* G. Don. I. 215. no. 20.
— chrysantha Hook. I. 218. no. 57.
— chrysantha Schrad. I. 221. †
— ciliata Schlchtd. I. 218. no. 59.
— cinerea Boiss. II. 767. no. 9.
— *clandestina* Prsh. I. 217. no. 45.
— collina Bess. I. 220. †
— Comollia Massara. V. 59. no. 5.
β. Nevadensis Boiss.
— *conferta* St. Hil. V. 59. no. 3.
— *congener* Le Conte. I. 217. no. 41.
— congesta Gill. I. 219. no. 60.
— conspersa Rchb. I. 219. †
Viola cordata Walt. I. 219. †
— cornuta Linn. I. 220. †
— Cotyledon Ging. I. 219. †
— crassifolia Fnzl. I. 215. no. 16.
— cucullata Ait. *I. 217. no. 41.
δ. alba, β. congener, ε. reniformis, γ. sororia } Torr. et Gr.
— *debilis* Michx. I. 217. no. 47.
— *debilis* Nutt. I. 218. no. 49.
— *debilis* Prsh. I. 218. no. 48.
— declinata W. et K. (cum varr.) I. 220. †
— Denhardtii Ten. I. 213. no. 3.
— delphinantha Boiss. II. 766. no. 8.
— delphinifolia Nutt. I. 217. no. 39.
— Demetria Prolong. I. 214. no. 6.
— *dentata* Prsh. I. 217. no. 44. γ.
— dissecta Ldb. I. 214. no. 10.
— distans Wall. I. 215. no. 23.
— *emarginata* Le Conte. I. 217. no. 44. γ.
— epipsila Ledeb. I. 219. †
— eriocarpa Lew. I. 219. †
— *flabellifolia* Lodd. I. 217. no. 38.
— glabella Nutt. I. 218. no. 54.
— glacialis Poepp. et Endl. I. 219. no. 64.
— glandulifera Hook. I. 219. no. 67.
— *Gmeliniana δ. cordifolia* DC. II. 766. no. 1.
— gracillima St. Hil. V. 59. no. 1.
— Grahami Bth. I. 219. no. 66.
— Hamiltoniana Don. I. 215. no. 19.
— hederacea Labill. I. 219. †
— *heterophylla* Le Conte. I. 217. no. 40.
— hirta Linn. I. 220. †
δ. grandifolia Hffl., ε. hirsuta Schult., β. lactiflora Optz., α. parvula Optz., γ. revoluta Hffl. } I. 220. †
— imberbis Ldb. I. 214. no. 11.
— incisa Turcz. II. 766. no. 4.
— inconspicua Blume. I. 216. no. 28.
— Irgutiana Turcz. II. 766. no. 1.
— *Itoubou* Aubl. I. 222. no. 20.
— Kamtschatica Ging. II. 766. no. 3.
— Kunawurensis Royle. I. 216. no. 25.
— *Labradorica* Schrk. I. 218. no. 48.
— lactea Sm. I. 220. †
— lacteo-sylvestris Rchb. I. 220. †
— lanceolata Linn. I. 219. †
— *lanceolata* Prsh. I. 217. no. 36.
— lancifolia Thore. I. 220. †
— Leconteana Sweet. I. 217. no. 37.
— *Lewisiana* DC. I. 217. no. 47.
— linguaefolia Nutt. I. 218. no. 50.

Viola livida Kit. I. 220. †
— *longifolia* Poir. I. 223. no. 1.
— longipes Nutt. I. 218. no. 49.
— lutea Huds. I. 221. †
γ. grandiflora Vill.
β. lutea Sm.
α. saxatilis Schm.
ε. Sudetica Rchb. } I. 221. †
— macroceras Bnge. II. 766. no. 2.
— maculata Cav. II. 767. †
— Maderensis Lowe. I. 214. no. 9.
— micrantha Turcz. I. 216. no. 27.
— *micrantha* Turcz. II. 766. no. 6.
— mirabilis Linn. I. 220. †
— modesta Fnzl. I. 215. no. 15.
α. grandiflora.
β. parviflora.
— montana Linn. I. 220. †
— *Mühlenbergiana* Ging. I. 218. no. 48.
— Mühlenbergii Torr. *I. 218. no. 48.
β. albiflora Hook.
γ. multicaulis Torr.
— Nevadensis Boiss. I. 214. no. 5.
— *Nevadensis* Boiss. V. 59. no. 5. β.
— *Notaniana* Wall. I. 215. no. 20.
— *nummulariaefolia* Comoll. V. 59. no. 5.
— nummularifolia All. 220. †
— *obliqua* Ait. I. 217. no. 41.
— *obliqua* Prsh. I. 217. no. 37. et 45.
— occulta Lehm. I. 214. no. 12. *II. 767. no. 10.
— ocellata Torr. et Gr. I. 218. no. 53.
— *ochroleuca* Schwein. I. 217. no. 47.
— odorata Linn. I. 220. †
β. alba Rchb. I. 220. †
— odorato-hirta Rchb. I. 220. †
— *orchidiflora* Rudge. I. 223. no. 1.
— orthoceras Ldb. II. 767. no. 11.
— *ovata* Nutt. I. 217. no. 44. β.
— palmaris Hamilt. I. 215. no. 18.
— palmata Linn. *I. 217. no. 40. I. 220. †
— Palmensis B. Webb. I. 214. no. 7. I. 220. †
— palustris Linn. I. 220. †
— *papilionacea* Prsh. I. 217. no. 41.
— *Patriniana β. Chinensis* DC. I. 216. no. 26.
— Patrinii DC *I. 215. no. 20.
— pedata Linn. *I. 217. no. 38.
β. flabellata Sweet.
— pedatifida G. Don. I. 217. no. 35.
— pedunculata Torr. et Gr. I. 218. no. 52.
— pentadactyla Fnzl. I. 215. no. 17.
— persicifolia Schkhr. I. 220. †
— pilosa Blume. I. 216. no. 29.
— pinnata Linn. I. 220. †
Viola praemorsa Dougl. I. 218. no. 51.
— pratensis Mert. et Koch. I. 220. †
— *pratensis* Mutel. I. 213. no. 1.
— *primulaefolia* Linn. I. 215. no. 20.
— primulaefolia Linn. I. 217. no. 46. I. 220. †
β. acuta.
— prionantha Bnge. I. 216. no. 26.
— pubescens Nutt. I. 220. †
— *pumila* Mutel. I. 213. no. 1.
— *pumilio* Masson. I. 214. no. 8.
— Pyrenaica Ramond. I. 220. †
— *ranunculifolia* Juss. I. 217. no. 40.
— reniformis Wall. I. 216. no. 24.
— *repens* Schwein. I. 217. no. 47.
— reticulata Schlchtd. I. 218. no. 58.
— Riviniana Rchb. I. 220. †
— rostrata Nutt. I. 220. †
— rosulata Poepp. et Endl. I. 219. no. 63.
— Rothomagensis Thuill. I. 221. †
— rotundifolia Michx. I. 220. †
— rupestris Schm. I. 220. †
— Ruppii All. I. 220. †
— sagittata Ait. *I. 217. no. 44. (c. varr. β. γ.) I. 220. †
— sarmentosa Dougl. I. 218. no. 56.
— Schultzii Billot. I. 213. no. 2.
— Selkirkii Goldie. I. 217. no. 43.
— septemloba Le Conte. I. 217. no. 42.
— *serpens* Wall. I. 215. no. 23.
— Sieberi Hook. I. 216. no. 31.
— Somchetica C. Koch. I. 214. no. 14.
— sororia Willd. I. 217. no. 41. I. 220. †
— *spathulata* Sieb. I. 216. no. 31.
— striata Ait. *I. 217. no. 47. I. 220. †
— suavis M. B. I. 220. †
— subdimidiata St. Hil. V. 59. no. 2.
— sylvestris Lam. I. 220. †
— tenuis Bth. II. 766. no. 7.
— *Teydra* Berth. I. 214. no. 8.
— tracheliifolia Ging. I. 216. no. 32.
— tricolor Linn. β. Bannatica Kit. I. 221. †
— *tricolor β.* DC. I. 214. no. 6.
— *tricolor ζ. appendiculata* DC. II. 767. no. 10.
— truncata Meyen. V. 59. no. 4.
— *turfosa* Kirschleg. I. 213. no. 2.
— uliginosa Schrad. I. 220. †
— umbrosa Hartm. et Fr. I. 220. †
— uniflora Linn. I. 220. †
— Valdoria All. I. 220. †
α. heterophylla Bertolon.
β. brevecalcarata I. 220. †
— vulcanica Gill. I. 219. no. 61.
— Wightiana Wall. I. 215. no. 21. (III. Emend. p. 1.)
VIOLARIEAE DC. I. 213. II. 766. V. 59.

VIOLARIEAE Endl. (ex p.) I. 225. V. 60.
Violeae DC. I. 213. II. 766.
Virecta DC. II. 503.
— *elatior* DC. VI. 57. no. 3.
— lutea G. Don. II. 503. no. 1.
—? paniculata G. Don. II. 503. no. 2.
Virga regia Caesalp. III. 255. no. 1.
Virgatae (Solidago) Torr. et Gr. II. 961.
Virgaurea DC. II. 960.
— *vel Solidagini affinis* Raj. VI. 258. no. 8.
— *seu Solidagini angustifoliae affinis* J. Bauh. VI. 258. no. 6.
Virgilia Lam. I. 807.
— aurea Lam. *I. 807. no. 2.
— grandis E. Mey. I. 807. no. 1.
— *intrusa* R. Br. I. 806. no. 1.
— *lutea* Michx. I. 807. no. 1.
— *robinioides* DC. I. 807. no. 4.
— *sylvatica* DC. I. 807. no. 2.
Virginica Steinheil. (Plantago) IV. 178. VI. 665.
Virgularia alpestris Mart. III. 383. no. 14.
— *campestris* Mart. III. 379. no. 1.
— *lanceolata* Rz. et Pav. III. 383. no. 15.
— *montana* Mart. III. 380. no. 2.
— *revoluta* Rz. et Pav. III. 383. no. 15.
— *splendida* Mart. III. 380. no. 3.
Viscago Wolgensis Hornem. II. 779. no. 19.
Viscaria Roehl. *I. 281. V. 82.
— aspera Poir. *V. 82. no. 1.
— *oculata* Lindl. V. 82. no. 1.
Viscum Tournef. II. 437. V. 936.
— ambiguum Hook. et Arn. II. 438. no. 19.
— *antarcticum* Forst. II. 439. no. 1.
— capitellatum Sm. *II. 437. no. 5. (c. varr. α. et β.)
— Chilense Hook. II. 438. no. 21.
— clavatum Bth. V. 936. no. 1.
— Crassulae Eckl. et Zeyh. II. 438. no. 14.
— dimidiatum Miquel. V. 936. no. 6.
— distichum Endl. II. 439. no. 23.
— ellipticum Gardn. V. 936. no. 5.
— Eucleae Eckl. et Zeyh. II. 438. no. 12.
— falcatum Cham. et Schlchtd. II. 438. no. 20.
— falcifrons Hook. et Arn. II. 438. no. 18.
— geminatum Korthls. II. 438. no. 11.
— glandulosum Miquel. V. 936. no. 7.
— glaucum Eckl. II. 438. no. 13.
— grossum Wght. II. 437. no. 7.
— incanum Hook. II. 438. no. 22.
— *incanum* Hook. II. 439. no. 1.
— laxum Boiss. et Reut. II. 437. no. 1.
— Liga Gill. II. 438. no. 17.
— *Mangiferae* Wght. II. 437. no. 5. *a.*
— *monoicum* Wght. II. 437. no. 2.
— navicellatum Korthls. II. 437. no. 9.
Viscum nitidum Gardn. V. 936. no. 4.
— obtusissimum Miquel. V. 936. no. 3.
— *opuntioides* Forst. II. 439. no. 23.
— *Oxycedri* DC. II. 437. no. 1.
— Pamattonis Korthls. II. 437. no. 8.
— *pubigerum* R. Cunn. V. 937. no. 2.
— ramosissimum Wall. II. 437. no. 6.
— robustum Eckl. et Zeyh. II. 438. no. 15.
— Roxburghianum Korthls. II. 437. no. 10.
— squamigerum Bth. V. 936. no. 2.
— *tomentosum* DC. II. 438. no. 16.
— verruculosum Wght. et Arn. II. 437. no. 2.
— villosum Nutt. II. 438. no. 16.
— Wallichianum Wght. et Arn. II. 437. no. 3.
— *Wightianum* Wall.? II. 437. no. 3.
— Wightianum Wall. II. 437. no. 4.
Visenia Houtt. I. 351. V. 115.
— alba Endl. *I. 351. no. 2. V. 115. no. 2.
— Javanica Jungh. I. 351. no. 1.
— umbellata Houttuyn. V. 115. no. 1.
Visiania A. P. DC. VI. 461.
— robusta Alph. DC. *VI. 461. no. 1.
Vismia Vellozo. I. 391. V. 144.
— angusta Miquel. V. 144. no. 1.
— *Guineensis* Chois. I. 391. no. 1.
— longifolia St. Hil. I. 391. no. 2.
— Mexicana Schlchtd. I. 391. no. 1.
— micrantha St. Hil. I. 391. no. 3.
Visnea Linn. I. 368.
— mocanera Linn. *I. 368. no. 1.
Viteae Endl. I. 437.
Vitex Linn. IV. 82. VI. 690.
Vitex Camer. IV. 90. no. 39.
— acuminata R. Br. IV. 86. no. 24.
— agnus castus Linn. IV. 90. no. 39.
β. latifolia.
— alata Heyne. IV. 83. no. 8.
— *alata* Rxb. IV. 84. no. 9. β.
— altissima Linn. IV. 83. no. 9.
β. macrophylla.
— arborea Rxb. IV. 84. no. 11.
— *arborea* Fisch. IV. 89. no. 37.
— axillaris Walt. *IV. 91.
— babula Wall. *IV. 91.
— Balbisii Spr. IV. 84. no. 13.
— *bicolor* Willd. IV. 89. no. 37.
— bignonioides H. B. Kth. IV. 86. no. 20.
— bombacifolia Wall. IV. 86. no. 26.
— Californica Bth. VI. 690. no. 2.
— canescens Wall. *IV. 91.
— capitata Vahl. IV. 88. no. 32.
— *Caribaea* Hook. et Arn. VI. 690. no. 2.
— chrysoclada Bojer. IV. 83. no. 4.
— cuneata Schum. et Thonn. IV. 88. no. 33.
— cymosa Bertero. IV. 86. no. 22.
— divaricata Swrtz. IV. 84. no. 12.

Vitex ferruginea Schum. et Thonn. IV. 90. no. 40.
— *ferruginea* Vahl. IV. 90. no. 40.
— ferruginea Vahl. *IV. 91.
— Finlaysoniana Rxb. *IV. 91.
— flavens H. B. Kth. IV. 86. no. 23.
— geniculata Blanco. IV. 91. no. 42.
— gigantea H. B. Kth. IV. 85. no. 19.
—? glabrata R. Br. IV. 86. no. 25.
— heptaphylla Juss. IV. 90. no. 41.
— heterophylla Rxb. IV. 88. no. 34.
— incisa Lam. IV. 87. no. 29.
— *integerrima* Mill. IV. 83. no. 5.
— involucrata Prsl. VI. 690. no. 1.
— *latifolia* Mill. IV. 90. no. 39. *β.*
— *latiore folio* Bauh. IV. 90. no. 39. *β.*
— *leucoxylon* Linn. fil. IV. 82. no. 2.
— *leucoxylon* Rxb. IV. 87. no. 26.
— limonifolia Wall. IV. 84. no. 10.
— littoralis A. Cunn. IV. 87. no. 27.
— *littoralis* Dcne. IV. 85. no. 14.
— Loureirii Hook. et Arn. IV. 89. no. 36.
—? macrophylla R. Br. IV. 82. no. 3.
— mollis H. B. Kth. IV. 85. no. 17.
— Moluccana Blume. IV. 82. uo. 2.
— Montevidensis Cham. IV. 88. no. 31. *β.* multinervis.
— *Morava* Hamilt. IV. 83. no. 8.
— Negundo Linn. IV. 89. no. 37.
— obovata E. Mey. IV. 87. no. 28.
— Orinocensis H. B. Kth. IV. 86. no. 21.
— ovata Thnbrg. IV. 82. no. 1.
— pallida Wall. *IV. 91.
— *paniculata* Lam. IV. 89. no. 37.
— parviflora Juss. IV. 85. no. 15.
— peduncularis Wall. *IV. 91.
— *polygama* Cham. IV. 92. no. 1.
— *pubescens* Heyne. IV. 84. no. 9. *β.*
— pubescens Vahl. IV. 83. no. 6.
— *repens* Blanco. IV. 82. no. 1.
— *rotundifolia* Linn. fil. IV. 82. no. 1.
— rufescens Juss. IV. 85. no. 16.
— saligna Wall. *IV. 91.
— scabra Wall. *IV. 91.
— Sellowiana Chamisso. IV. 89. no. 35.
— sexdentata Wall. *IV. 91.
— spicata Loureiro. IV. 89. no. 38.
— *sylvestris trifolia Indica cordata* Burm. IV. 89. no. 37.
— Timoriensis Wlprs. IV. 84. no. 14.
— *triflora* Vahl. IV. 92. no. 2.
— trifolia Linn. IV. 83. no. 5.
— *trifolia Indica minor serrata* Pluk. IV. 89. no. 37.
— *trifolia minor Indica* Pluk. IV. 83. no. 5.
— umbrosa Swrtz. IV. 87. no. 30.
Vitex undulata Wall. IV. 83. no. 7. *IV. 91.
— vestita Wall. IV. 85. no. 18.
Viticastrum Prsl. ° VI. 691.
— racemosum Prsl. * VI. 691. no. 1.
Viticella DC. V. 3. no. 2. 22.
Vitis Linn. I. 441. II. 817.
— adnata Wall. *I. 442. no. 8.
— *aquosa* Wall. I. 444. no. 31.
— auriculata Wall. *I. 443. no. 20.
— bryoniaefolia Bnge. I. 443. no. 23.
— capreolata Royle. I. 438. no. 21.
— carnosa Wall. I. 442. no. 13. (c. varr. *α. β. γ. δ.*)
— *cinnamomea* Wall. I. 443. no. 30. *β.*
— cordifolia Rth. I. 444. no. 31.
— *crenata* Wall. I. 442. no. 13. *α.* et *β.*
— cymosa Blume. I. 443. no. 26.
— *diversifolia* Wall. I. 441. no. 1.
— elongata Wall. I. 442. no. 15.
— erioclada Wght. et Arn. I. 443. no. 29.
— erythrodes Fresen. I. 444. no. 32.
— ficifolia Bnge. I. 443. no. 22.
— *glabrata* Heyne. I. 443. no. 28.
— glauca Wght. et Arn. *I. 442. no. 7.
— *hederacea* Wall. I. 439. no. 21.
— *heterophylla* Wall. I. 442. no. 11.
— *Heyneana* DC. I. 444. no. 31.
— Heyneana Wall. I. 442. no. 5. (III. Emend. p. 2.)
— hispida Eckl. et Zeyh. I. 444. no. 34.
— inaequalis Wall. I. 441. no. 1.
— incisa Nutt. I. 442. no. 10.
— *Kleinii* Wall. I. 442. no. 7.
— lanata Rxb. I. 444. no. 31.
— *lanceolaria* Wall. I. 443. no. 16.
— lanceolaria Wall. *I. 443. no. 17.
— latifolia Rxb. *I. 443. no. 28.
— Linnaei Wall. *I. 442. no. 9.
— muricata Wall. I. 442. no. 16.
— pallida Wght. et Arn. I. 442. no. 4.
— *paniculata* Wall. I. 443. no. 21.
— pedata Wall. *I. 443. no. 19.
— pentaphylla Guill. et Perr. I. 444. no. 33.
— quadrangularis Wall. *I. 441. no. 2.
— racemifera Jack. I. 443. no. 27.
— repanda Wght. et Arn. *I. 442. no. 3.
— repens Wght. et Arn. *I. 442. no. 6.
— Rheedei Wght. et Arn. *I. 442. no. 11.
— Roxburghii Wght. et Arn. *I. 442. no. 14.
— *semicordata* Wall. I. 441. no. 48.
— serratifolia Wght. et Arn. *I. 443. no. 18.
— setosa Wall. *I. 442. no. 12.
— sylvestris Blume. I. 443. no. 24. II. 817. no. 1.
— tenuifolia Wght. et Arn. I. 443. no. 21. (III. Emend. p. 2.)

Vitis ternata Heyne. I. 443. no. 30. *β.*
— tomentosa Heyne. *I. 443. no. 30. (c. var. *a.* et *β.* ibid.) (III. Emend. p. 2.)
— *trifida* Rth. I. 443. no. 30. *a.*
— *triloba* Heyne. I. 443. no. 30. *a.*
— *triloba* Wall. I. 443. no. 30. *β.*
— truncata Blume. I. 443. no. 25.
Vittadinia A. Rich. *II. 578. *II. 951. no. 15.
Vittmannia elliptica Vahl. I. 525. no. 1.
Viviania Cav. I. 461.
— crenata Hook. I. 461. no. 4.
— grandifolia Wlprs. I. 461. no. 2.
— marifolia Cav. *I. 461. no. 1.
— parvifolia Wlprs. I. 461. no. 3.
— petiolata Hook. I. 461. no. 6.
— rosea Hook. I. 461. no. 5.
— spinescens Prsl. I. 461. no. 7.
Vivianiaceae Endl. I. 460.
VIVIANIACEAE Meisn. V. 379.
Vlamingia Vriese. °VI. 380.
— Australasica Vriese. *VI. 380. no. 1.
Voacanga Pet. Thouars. *VI. 468.
— *Drégei* E. Mey. VI. 468. no. 1.
Voandzeia Thouars. *I. 782.
Vochysia Juss. II. 69.
— cinnamomea Pohl. II. 69. no. 11.
— cuneata Pohl. II. 69. no. 8.
— divergens Pohl. II. 69. no. 2.
— elongata Pohl. II. 69. no. 7.
— herbacea Pohl. II. 69. no. 9.
— lucida Prsl. II. 69. no. 1.
— micrantha Pohl. II. 69. no. 3.
— pruinosa Pohl. II. 69. no. 5.
— pumila Pohl. II. 69. no. 4.
— sericea Pohl. II. 69. no. 10.
— thyrsoidea Pohl. II. 69. no. 6.
VOCHYSIACEAE Mart. et Zucc. II. 68. II. 915. V. 663.
VOCHYSIACEAE St. Hil. II. 68. V. 663.
Voglera (Genista) Flor. Wetteraw. V. 470.
— *spinosa* Flor. Wetteraw. V. 472. no. 25.
Voigtia Kltzsch. °VI. 69.
— australis Kltzsch. *VI. 70. no. 1.
Volkameria Linn. IV. 99.
— Acerbiana Visiani. IV. 100. no. 2.
— aculeata Linn. IV. 99. no. 1.
Volkameria alternifolia Burm. IV. 109. no. 46.
— *angulata* Loureiro. IV. 102. no. 3.
— *angustifolia* Andrws. IV. 111. no. 57.
— *Buchanani* Rxb. IV. 108. no. 44.
— *buxifolia* Willd. IV. 112. no. 59.
— *capitata* Willd. IV. 109. no. 49.
— *coccinea* Herb. IV. 108. no. 38.
— *Commersonii.* Poir. IV. 112. no. 62.
— cordifolia Hochstett. IV. 100. no. 3.
— *dentata* Rxb. IV. 114. no. 73.
— *farinosa* Rxb. IV. 107. no. 32.
— *foetida* Hamilt. IV. 109. no. 44.
— grandiflora Blanco. IV. 100. no. 5.
— heterophylla Poir. IV. 111. no. 57.
— *inermis β.* Ait. IV. 111. no. 55.
— *inermis* Linn. IV. 112. no. 58.
— *infortunata* Rxb. IV. 107. no. 37.
— *Japonica* Jcq. IV. 110. no. 50.
— *Japonica* Thnbrg. IV. 110. no. 50.
— *Kaempferi* Jcq. IV. 108. no. 38.
— *ligustrina* Jcq. IV. 111. no. 55.
— *multiflora* Burm. IV. 107. no. 35.
— *neriifolia* Rxb. IV. 110. no. 52.
— *obovata* Rxb. IV. 112. no. 60.
— *odorata* Hamilt. IV. 109. no. 45.
— odoratissima Fisch. *IV. 100.
— *Petasites* Loureiro. IV. 108. no. 43.
— *pumila* Loureiro. IV. 105. no. 25.
— scandens Linn. fil. IV. 100. no. 4.
— *serrata* Linn. IV. 107. no. 31.
— spinosa Juss. *IV. 100.
— *urticaefolia* Rxb. IV. 114. no. 72.
— *verticillata* Rz. et Pav. IV. 73. no. 5.
Votomita Aubl. *II. 436.
Vouapa Aubl. I. 845. V. 571.
— elegans Miquel. V. 571. no. 1.
— phaselocarpa Hayne. I. 845. no. 1.
Voucapoua Americana Aubl. I. 803. no. 8.
Voyria Aubl. VI. 504.
— nivea Miquel. IV. 504. no. 1.
Vrolickia polygaloides Spr. III. 297. no. 1.
Vrucu Pis. I. 202. no. 1.
Vulgares Bth. (Acacia) I. 913. V. 591.
Vulgares Bth. (Crotalaria) V. 451.
Vulneraria DC. I. 634.
Vulpinae Bth. (Inga) V. 634.

W

Wahlenbergia Schrad. II. 710. VI. 381.
— clematidea Schrenk. II. 710. no. 1.
— rigida Bernhardi. VI. 381. no. 1.
Wahlenbergieae Endl. II. 709. VI. 381.
Waitzia Wendl. °VI. 233.
— acuminata Steetz. VI. 233. no. 4.
— aurea Steetz. VI. 233. no. 3.
— brevirostris Steetz. VI. 233. no. 2.
— citrina Steetz. VI. 234. no. 7.
— corymbosa Wendl. VI. 233. no. 1.
β. Benthamiana } Steetz.
α. Wendlandiana } Steetz.
— Steetziana Lehm. VI. 234. no. 6.
— sulphurea Steetz. VI. 233. no. 5.
Walafridia E. Mey. IV. 144.
— nitida E. Mey. IV. 144. no. 1.
— trimera Hochstett. IV. 144. no. 2.
Waldheimia Karel. et Kiril. II. 652. V. 254.
— tridactylides Kar. et Kir. *II. 652. no. 1. VI. 254. no. 1.
Waldsteinia Willd. II. 46.
— fragarioides Trattin. *II. 46. no. 2.
— geoides Willd. II. 46. †
— lobata Torr. et Gr. *II. 46. no. 3.
— trifolia Rochel. II. 46. no. 1.
Walkera Schreb. *I. 528.
Walkeria Ehret. VI. 549. no. 1.
Wallenia Swrtz. *VI. 451.
Wallichia spectabilis DC. I. 351. no. 1.
Wallrothia DC. II. 403.
Wallrothia Rth. IV. 82.
— articulata Rth. IV. 82. no. 1.
— leucoxylon Rth. IV. 82. no. 2.
Walpersia villosa Meisn. V. 541. no. 1.
Walsurea Rxb. I. 431.
—? *lanceolata* Wall. I. 428. no. 1.
— piscidia Rxb. I. 431. no. 1.
— ternata Rxb. I. 432. no. 2.
Walteriana Fraser. VI. 421. no. 1.
Waltheria Linn. I. 340. II. 796.
— Africana Schum. et Thonn. I. 340. no. 3.
— *Americana* Linn. I. 340. no. 1.
— *arborescens* Cav. I. 340. no. 1.
— bracteosa St. Hil. et Naud. II. 796. no. 1.
Waltheria carpinifolia St. Hil. et Naud. II. 796. no. 2.
— Douradinha St. Hil. et Cambess. I. 341. no. 8.
— *elliptica* Cav. I. 340. no. 1.
— glomerata Prsl. I. 340. no. 5.
— Guineensis Schum. et Thonn. I. 340. no. 2.
— hirsuta Prsl. I. 340. no. 6.
— Indica Linn. *I. 340. no. 1.
— involucrata Bth. I. 341. no. 9.
— lantanaefolia St. Hil. et Naud. II. 796. no. 3.
— *microphylla* Cav. I. 340. no. 1.
— paniculata Bth. I. 341. no. 10.
— Preslii Wlprs. I. 340. no. 4.
— *rotundifolia* Prsl. I. 340. no. 4.
— rotundifolia Zucc. I. 341. no. 7.
Waunschia Adr. Juss. V. 353.
Warea Nutt. I. 173.
— amplexifolia Nutt. I. 173. no. 1.
— cuneifolia Nutt. I. 173. no. 2.
Warthemia Boiss. VI. 147.
— Arabica Boiss. VI. 147. no. 1.
Water Figwort Petiv. III. 171. no. 33.
Webbia DC. *II. 541. *II. 949.
Webbia DC. II. 970. adnot.
Webbia C. H. Schultz. *II. 952. no. 23. °II. 970.
— *aristata* DC. II. 947. no. 15. VI. 97. no. 52.
— *Canariensis* B. Webb et Berth. I. 386. no. 25.
— *elaeagnoides* DC. II. 947. no. 16. VI. 97. no. 53.
— *floribunda* Spach. I. 386. no. 24.
— *heterophylla* Spach. I. 386. no. 25.
— *hirsuta* DC. II. 947. no. 17.
— Kraussii C. H. Schultz. *II. 971. no. 1.
— *nudicaulis* DC. II. 947. no. 20.
— *oligocephala* DC. II. 947. no. 19.
— *pinifolia* DC. VI. 97. no. 51.
— *platysepala* Spach. I. 386. no. 26.
— *serratuloides* DC. II. 947. no. 18.
Webera...... Madr. Herb. II. 504. no. 1.
— *corymbosa* Sm. II. 482. no. 10.

Webera corymbosa Willd. II. 517. no. 4.
— *cymosa* Willd. II. 484. no. 1.
— *lanceolata* Moon. VI. 47. no. 1.
Wedelia Jcq. II. 608. VI. 157.
— cordata Hook. et Arn. II. 608. no. 2.
— grandiflora Bth. VI. 157. no. 1.
— paludicola Poepp. et Endl. II. 609. no. 6.
— populifolia Hook. et Arn. II. 609. no. 3.
— psammophila Poepp. et Endl. II. 609. no. 5.
— scaberrima Bth. II. 609. no. 7.
— scandens Gardn. VI. 157. no. 2.
— strigosa Hook. et Arn. II. 608. no. 1.
— subflexuosa Hook. et Arn. II. 609. no. 4.
— *Titicacensis* Meyen et Wlprs. VI. 208. no. 1.
Weigela florida DC. II. 450. no. 2.
— *pauciflora* DC. II. 450. no. 1.
Weigeltia Alph. DC. * VI. 451.
Weinmannia Linn. II. 373. V. 829.
— auriculata D. Don. V. 831. no. 13.
— Balbisiana H. B. Kth. V. 830. no. 3.
— betulina A. Cunn. II. 373. no. 4. * V. 833. no. 44.
— biglandulosa A. Cunn. II. 373. no. 1. * V. 833. no. 43.
— Caripensis H. B. Kth. V. 833. no. 32.
— *Chilensis* DC. II. 375. no. 1.
— cinerea Rz. et Pav. V. 832. no. 27.
— cordata D. Don. V. 830. no. 12.
— *corymbosa* Rz. et Pav. II. 375. no. 1.
— crassifolia Rz. et Pav. V. 830. no. 8.
— crenata Prsl. II. 374. no. 7. * V. 833. no. 39.
— *dentata* Rz. et Pav. V. 831. no. 19.
— *dioica* Spr. I. 423. no. 1.
— discolor Gardn. V. 831. no. 17.
— diversifolia Moric. * V. 833. no. 34.
— elliptica H. B. Kth. V. 830. no. 6.
— fagaroides H. B. Kth. V. 832. no. 23.
— *fraxinea* Sm. II. 374. no. 1. V. 834. no. 1.
— fuchsioides A. Cunn. II. 373. no. 5. * V. 833. no. 45.
— *glabra* Lam. V. 832. no. 22.
— glabra Linn. V. 831. no. 18.
— glomerata Prsl. II. 374. no. 9. * V. 833. no. 41.
— heterophylla H. B. Kth. V. 830. no. 11.
— *heterophylla* Rz. et Pav. V. 830. no. 12.
— *hirta* var.? Smith. V. 831. no. 21.
— hirta Swrtz. II. 374. no. 11. (c. varr. *β.* et *γ.* ibid.) V. 831. no. 20.
— hirtella H. B. Kth. V. 832. no. 29.
— intermedia Schlchtd. et Cham. II. 374. no. 10. * V. 833. no. 42.
— Kunthiana D. Don. V. 829. no. 2.
— latifolia Prsl. II. 373. no. 3. * V. 830. no. 9.
Weinmannia laurina H. B. Kth. V. 830. no. 4.
— lentiscifolia Prsl. II. 374. no. 8. * V. 833. no. 40.
— macrophylla H. B. Kth. V. 830. no. 5.
— macrostachya DC. * V. 833. no. 35.
— Mauritiana D. Don. V. 831. no. 15.
— microphylla H. B. Kth. V. 831. no. 16.
— *microphylla* Rz. et Pav. V. 832. no. 24.
— nitida D. Don. V. 831. no. 21.
— Organensis Gardn. V. 833. no. 33.
— ovalis Rz. et Pav. V. 830. no. 7.
— ovata Cav. V. 829. no. 1.
— *ovata* H. B. Kth. V. 830. no. 2.
— *ovata* Rz. et Pav. V. 831. no. 13.
— *paniculata* Cav. II. 375. no. 1.
— *parviflora* Forst. II. 374. no. 2. V. 833. no. 2.
— parvifolia Rz. V. 832. no. 24.
— paulliniaefolia DC. * V. 833. no. 36.
— pentaphylla Rz. et Pav. V. 831. no. 14.
— *pinnata* Linn. et Cav. V. 831. no. 18. 19.
— polyphylla Moric. * V. 833. no. 38.
— *polystachya* Ruiz. V. 832. no. 28.
— producta Moric. * V. 833. no. 37.
— *pubescens* H. B. Kth. V. 832. no. 30.
— *pubescens* Ruiz. V. 832. no. 25.
— *racemosa* Forst. II. 374. no. 1.
— *racemosa* Murr. V. 833. no. 1.
— reticulata Rz. et Pav. V. 832. no. 25.
— *rosaefolia* A. Cunn. II. 374. no. 1. V. 834. no. 1.
— rugosa Bth. V. 830. no. 10.
— *sambucina* Ruiz. V. 832. no. 27.
— sorbifolia H. B. Kth. V. 833. no. 31.
— *speciosa* Bnks. et Sol. II. 374. no. 1. V. 833. no. 1.
— subsessiliflora Rz. et Pav. V. 832. no. 28.
— sylvicola Soland. II. 373 no. 6. * V. 833. no. 46.
— tinctoria Sm. V. 832. no. 22.
— tomentosa Linn. V. 832. no. 26.
— trichosperma Cav. V. 831. no. 19.
— *trifoliata* Lam. V. 831. no. 15.
— *trifoliata* Thnbrg. II. 373. no. 1.
— venosa Hort. II. 373. no. 2.
— *venosa* Knwls. et Wstctt. V. 829. no. 1.
Wenderothia Schlchtd. I. 768. V. 535.
— discolor Schlchtd. * I. 768. no. 1. V. 535. no. 1.
— glabra Mart. et Galeotti. V. 535. no. 4.
—? hirsuta Mart. et Galeotti. V. 535. no. 3.
— pilosa Mart. et Galeotti. V. 535. no. 2.
Wendlandia Bartl. II. 504. V. 58.
— bicuspidata Wght. et Arn. II. 504. no. 2.
— *Caroliniana* Nutt. I. 94. no. 24.
— Heyneana Wall. II. 504. no. 3.

Wendlandia Kotschyi Boiss. et Hohenack. VI. 58. no. 1.
— *Lawsoniae* DC. II. 491. no. 1.
— ligustrina Wall. II. 505. no. 5.
— *longifolia* DC. II. 505. no. 1.
— Malayana G. Don. II. 505. no. 6.
— nitens Wall. II. 504. no. 4.
— Notoniana Wall. II. 504. no. 1.
— pilosa G. Don. II. 505. no. 8.
— racemosa G. Don. II. 505. no. 9.
— scandens G. Don. II. 505. no. 11.
— *spicata* DC. II. 504. no. 1.
— sulcata G. Don. II. 505. no. 7.
— *thyrsoidea* Rth. II. 504. no. 1.
— virgata G. Don. II. 505. no. 10.
— *Wightiana* Wall. II. 504. no. 2.
Wendtia DC. II. 416. V. 890. no. 8.
Wendtia Meyen. I. 460. V. 380.
— gracilis Meyen. *I. 460. no. 1. V. 380. no. 1.
— Poeppigiana Kltzsch. *I. 460. no. 2.
— Reynoldsii Endl. I. 460. no. 3.
Wensea pyramidata Wendl. III. 577. no. 2.
Werneria H. B. Kth. II. 652. VI. 254.
— densa Bth. VI. 254. no. 2.
— minima Meyen. et Wlprs. VI. 254. no. 1. β. pygmaea Wlprs.
— pygmaea Hook. et Arn. II. 652. no. 1.
Westonia humifusa Spr. I. 606. no. 1.
Westringia R. Br. III. 770. °III. 985. VI. 676.
— angustifolia R. Br. III. 771. no. 6.
— brevifolia Bth. III. 771. no. 3.
— capitata Bartl. VI. 676. no. 2.
— cinerea R. Br. III. 771. no. 5.
— Dampieri R. Br. III. 770. no. 2.
— eremicola A. Cunn. III. 771. no. 7.
— glabra R. Br. III. 771. no. 9.
— longifolia R. Br. III. 771. no. 8.
— *longifolia* Lindl. III. 771. no. 7.
— rigida R. Br. III. 771. no. 4.
— rosmariniformis Sm. III. 770. no. 1.
— rubiaefolia R. Br. III. 772. no. 10.
— serpyllifolia Bartl. VI. 676. no. 1.
Whitia Blume. *VI. 523.
Whitlavia Harvey. °VI. 524.
— grandiflora Harvey. VI. 525. no. 1.
— minor Harvey. VI. 525. no. 2.
Whitleya Sweet. III. 22.
— *stramonifolia* Sweet. III. 22. no. 1.
Wiborgia fusca Willd. I. 579. no. 1.
Wickstroemia fruticosa Schrad. V. 132. no. 1.
Wiedemannia Fisch. et Mey. III. 801. °III. 987.
— orientalis Fisch. et Mey. III. 801. no. 1.
Wiegmannia Meyen. II. 463. VI. 27.
— glauca Meyen. *II. 463. no. 1. VI. 27. no. 1.
Wigandia H. B. Kth. *VI. 566.
Wightia Wall. *VI. 638.
Wilbrandria Silva Manso. °V. 764.
— hibiscoides Silva Manso. *V. 764. no. 1.
Willemetia Neck. *II. 695. *VI. 356.
Willichia...... Mutis. III. 297. no. 1.
Willughbeia Rxb. *VI. 465.
Willughbeiae Alph. DC. VI. 464. VI. 465.
Wilsonia R. Br. *VI. 543.
— *glaberrima* Hook. IV. 37. no. 1.
Wimmeria Schlchtd. I. 536.
— concolor Schlchtd. *I. 536. no. 1.
Winchia Alph. DC. VI. 466.
— calophylla Alph. DC. *VI. 466. no. 1.
Wintera axillaris Forst. V. 14. no. 2.
Winterlia Spr. *I. 262.
— *uliginosa* Spr. II. 101. no. 2.
Wirtgenia C. H. Schultz. °VI. 146.
— Abyssinica C. H. Schultz. *VI. 146. no. 1.
Wissadula Medic. I. 327.
— excelsior Prsl. *I. 328. no. 3.
— hirsuta Prsl. I. 328. no. 4.
— scabra Prsl. I. 328. no. 2.
— spicata Prsl. *I. 327. no. 1.
Wisteria Nutt. I. 769. V. 536.
— brachybotrys Siebold et Zucc. I. 770. no. 3.
— Chinensis DC. *I. 770. no. 2.
— Consequana Paxton. *V. 536. no. 2.
— dubia Wlprs. V. 536. no. 1.
—? *floribunda* DC. I. 770. no. 2.
— frutescens DC. *I. 770. no. 4. β. macrostachya.
— Japonica Siebold et Zucc. I. 769. no. 1.
— *macrostachya* Nutt. I. 770. no. 4.
Wisterieae Endl. I. 769. V. 536.
Withania Pauquy. III. 104. °III. 955.
— aristata Pauquy. III. 104. no. 2.
— frutescens Pauquy. III. 104. no. 1.
Witharia Auctor. nonnull. III. 104.
Witheringia L'Hérit. III. 29. °III. 954. VI. 575.
— angustifolia Dun. III. 31. no. 13.
— aspera Spr. III. 31. no. 17.
— ciliata H. B. Kth. III. 30. no. 8.
— conica Steud. *III. 32. no. 23.
— crassifolia Dunal. III. 30. no. 3.
— diploconos Mart. III. 30. no. 6.
— *diploconos* Mart. VI. 577. no. 4.
— divaricata Mart. III. 30. no. 5.
— *divaricata* Mart. VI. 577. no. 8.
— diversifolia Kltzsch. III. 29. no. 1.
— dumetorum Dunal. III. 31. no. 11.
— hirsuta Gardn. VI. 575. no. 1.
— macrophylla Dun. III. 30. no. 7.
— mollis H. B. Kth. III. 30. no. 9.
— montana Dunal. III. 32. no. 19. β. arenaria Dunal.

Witheringia multifida Dunal. III. 32. no. 22.
— pendula Roem. et Schult. III. 31. no. 14.
— *pendula* Roem. et Schult. VI. 594. no. 80.
— phyllantha Dunal. III. 32. no. 20.
β. major.
α. minor.
— picta Mart. III. 30. no. 4.
— *picta* Mart. VI. 580. no. 1.
— pinnatifida Dunal. III. 32. no. 21.
— purpurea Loddiges. *III. 32. no. 23.
— rhomboidea Dunal. III. 31. no. 10.
— riparia H. B. Kth. III. 31. no. 12.
—? salicifolia Hook. III. 31. no. 15.
— Sellowiana Sendtner. VI. 575. no. 2.
— solanacea L'Hérit. III. 31. no. 16.
— stramonifolia H. B. Kth. III. 30. no. 2.
— umbellata Dunal. III. 32. no. 18.
Wittelsbachia insignis Mart. et Zucc. I. 367. no. 2.
Wodur Anderson. V. 412. no. 1.
Wollastonia DC. *II. 609.
— *procumbens* DC. II. 620. no. 6.
— *strigulosa* DC. II. 620. no. 7.
Woodvillea DC. *II. 587. *II. 952. no. 13.
— *calendulacea* DC. II. 580. no. 20. β.
Wormia Rottb. I. 63.
Wormia Vahl. II. 68.
— apetala Gaudich. I. 63. no. 3.
— excelsa Jack. I. 63. no. 1.
— pulchella Jack. I. 63. no. 2.
Wormskioldia Schum. et Thonn. II. 230. V. 782.
Wormskioldia diversifolia Schum. et Thonn. *II. 230. no. 1. V. 782. no. 2.
— *heterophylla* Thonn. V. 782. no. 2.
— serrata Hochstett. V. 782. no. 1.
Wrightia R. Br. *VI. 471.
Wrightieae G. Don. VI. 471.
Würschmittia C. H. Schultz. °VI. 161.
— Abyssinica C. H. Schultz. *VI. 162. no. 1.
Wulfenia Jcq. III. 370. °III. 969. III. 455. *VI. 647.
— *Ageria* Sm. III. 369. no. 2.
— Amherstiana Bth. III. 370. no. 2.
— *Bouonarota* Sm. III. 369. no. 1.
— *Bouonarota β. rotundifolia* Vahl. III. 369. no. 1. β.
— Carinthiaca Jcq. III. 370. no. 1.
— *chamaedryfolia* Host. III. 369. no. 1.
— *lutea* Host. III. 369. no. 2.
— orientalis Boiss. III. 455. no. 4.
— reniformis Dougl. III. 371. no. 3.
Wulffia Neck. II. 612.
— platyglossa DC. *II. 612. no. 1.
Wydleria DC. II. 391.
— Chilensis Fisch. et Trautvett. II. 391. no. 1.
Wyethia Nutt. II. 608. II. 977.
— amplexicaulis Nutt. II. 608. no. 4.
— angustifolia Nutt. *II. 608. no. 2.
— Californica Nutt. *II. 608. no. 6.
— helenioides Nutt. *II. 608. no. 5.
— helianthoides Nutt. II. 608. no. 1.
— robusta Nutt. II. 608. no. 3. *II. 977. no 1.
Wylia DC. V. 904. no. 4.

X

Xanthaea Griseb. VI. 501. no. 3.
Xanthaparine DC. II. 456. VI. 11. VI. 698. no. 6.
Ξάνθιον Diosc. VI. 150. no. 1.
Xanthiophoea Mart. III. 538.
Xanthisma DC. *II. 544.
Xanthium Tournef. *II. 606. II. 976. VI. 150.
Xanthium etc. Dodon. VI. 151. no. 8.
— Abyssinicum Wllrth. VI. 150. no. 2.
— ambrosioides Hook. et Arn. VI. 153. no. 18. (c. var. β. ibid.)
— *annuum* Georgi. VI. 151. no. 8.
— antiquorum Wllrth. VI. 150. no. 1.
Xanthium armatum H. B. Kth. VI. 153. no. 19.
— brachyacanthum DC. VI. 153. no. 21.
— brevirostre Wllrth. VI. 151. no. 9.
— Canadense DC. VI. 152. no. 16.
— *Canadense* Hook. VI. 152. no. 15.
— *Canadense majus fructu aculeis aduncis munito* Tournef. VI. 152. no. 14.
— *Carolinianum* Gronov. VI. 150. no. 4.
— *Carolinianum medium fructu toroso* Dillen. VI. 150. no. 4.
— *catharticum* H. B. Kth. VI. 153. no. 19.
— *Chinense* Mill. VI. 151. no. 6.
— *cuneatum* Much. VI. 152. no. 14.

Xanthium Dioscoridis C. Bauh. VI. 151. no. 8.
— *Dioscoridis* Gundelsh. VI. 150. no. 1.
— discolor Wllrth. VI. 151. no. 6.
— *echinatum* Balbis et Nocc. VI. 152. no. 12.
— echinatum Murray. *II. 976. no. 1. (cum var. *β.* ibid.) VI. 152. no. 14.
— *eriocarpon* Wllrth. VI. 153. no. 18.
— *foliis semitrilobatis uncinatis* Hall. VI. 151. no. 8.
— inaequilaterum DC. VI. 150. no. 5.
— *Indicum* DC. VI. 150. no. 1.
— *Indicum* Rxb. VI. 151. no. 7.
— *Indicum* Wall. VI. 151. no. 6.
— *Indicum* Wght. VI. 151. no. 9.
— Italicum Moretti. VI. 152. no. 12.
— laevigatum Mhlnbrg. VI. 150. no. 3.
— longirostre Wllrth. VI. 152. no. 11.
— *Lusitanicum laciniatum etc.* Tournef. VI. 153. no. 20.
— *macrocarpum* Berlandier. VI. 152. no. 13.
— *macrocarpum* Bluff et N. ab E. VI. 152. no. 12.
— *macrocarpum* DC. II. 976. no. 1. VI. 152. no. 14.
— *macrocarpum β. glabratum* DC. VI. 150. no. 4. VI. 152. no. 11.
— *maculatum* Raf. II. 976. no. 1. VI. 152. no. 13.
— *monoicum* Gilib. VI. 151. no. 8.
— *orientale* Blume. VI. 150. no. 5.
— *orientale* Grtnr. VI. 152. no. 14.
— *orientale* Linn. VI. 151. no. 6.
— *orientale* Michx. II. 976. no. 1.
— oviforme Wllrth. VI. 152. no. 15.
— Pennsylvanicum Wllrth. VI. 151. no. 10.
  β. eglandulosum.
  α. glandulosum.
  γ. occidentale.
— pungens Wllrth. VI. 150. no. 4.
— Roxburghii Wllrth. VI. 151. no. 7.
— saccharatum Wllrth. VI 152. no. 13.
— *spinosum* Arrabida. VI. 153. no. 21.
— *spinosum* Beyrich. VI. 153. no. 17.
— spinosum Linn. VI. 153. no. 20.
— *strumarium* Beyrich. VI. 151. no. 10. *a.*
— *strumarium* Delile. VI. 150. no. 1.
— strumarium Linn. VI. 151. no. 8.
— *strumarium* Schimp. VI. 150. no. 2.
— *strumarium* Thnbrg. VI. 151. no. 6.
— *strumarium* Willd. VI. 151. no. 7.
— *strumarium ex America boreali etc.* Willd. VI. 150. no. 3.
— *vulgare* Lam. VI. 151 no. 8.
— xanthocarpum Wllrth. VI. 152. no. 17.
Xanthizoon Griseb. V. 825. no. 6.
Xanthocephalum Willd. *II. 635.
Xanthoceras Bnge. I. 422.
— sorbifolia Bnge. *I. 422. no. 1.
Xanthochymus Rxb. I. 395.
— *dulcis* Rxb. I. 396. no. 3.
— *Javanensis* Blume. I. 395. no. 1.
— *ovalifolius* Rxb. I. 396. no. 4.
— *pictorius* Rxb. I. 396. no. 2.
— *spicatus* Wght. et Arn. I. 396. no. 5.
Xanthocoma H. B. Kth. *II. 585. *II. 951. no. 1.
Xanthogalium DC. II. 457. VI. 698.
Xanthogalum Lallem. V. 885.
— purpurascens Lallem. V. 885. no. 1.
Xanthoglossa DC. (Pyrethrum) II. 636. no. 2. VI. 203. no. 7. VI. 221.
Xanthoglossa C. H. Schultz. (Tanacetum) VI. 221.
Xanthogymnocline C. H. Schultz. VI. 221.
Xantophthalmum C. H. Schultz. °VI. 207.
— segetum C. H. Schultz. *VI. 207. no. 1.
  α. vulgare.
  β. Welwitschii.
Xanthophyllum Rxb. I. 248.
— angustifolium Wght. I. 248. no. 7.
— Arnottianum Wght. I. 248. no. 5.
— flavescens Rxb. I. 248. no. 3.
— *flavescens* Wght. et Arn. I. 248. no. 5.
— longifolium Wlprs. I. 248. no. 2.
— Roxburghianum Wght. I. 248. no. 4.
— undulatum Wght. I. 248. no. 6.
— vitellinum Wlprs. I. 248. no. 1.
Xantophytum Blume. *II. 504.
Xantophytum Blume. VI. 58.
— *spicatum* Blume. II. 504. no. 1. VI. 58. no. 1.
Xanthosia Rdge. II. 385.
Xanthosia Rdge. V. 841.
— candida Steudel. V. 842. no. 4.
— ciliata Hook. V. 842. no. 3.
— glabrata Bnge. V. 841. no. 1.
— *hirsuta* DC. II. 385. no. 1.
— Hügelii Steudel. *V. 842. no. 5.
— pusilla Bnge. V. 842. no. 2.
— rotundifolia Bnge. V. 842. no. 6.
Xatardia Meisn. II. 403.
— scabra Meisn. *II. 403. no. 1.
Xenismia DC. *II. 604.
Xenopoma obovatum Willd. III. 725. no. 36.
Xeranthemeae Lssng. II. 667. VI. 281.
Xeranthemum Tournef. II. 667. VI. 281.
— radiatum Lam. *II. 667. no. 1.
  α. macranthum.
  γ. micranthum.
  β. sativum.
— *radiatum* var. *pictum* Boiss. VI. 281. no. 1. *α.*

Xeranthemum squarrosum Boiss. VI. 281. no. 1.
a. pictum.
β. unicolor.
Xeranthus salicosus Miers. II. 234. no. 1. V. 786. no. 1.
Xerocalyx (Cassia) Vogel. I. 831.
Xerocarpa DC. (Scaevola) II. 712. no. 3.
Xerocarpaea G. Don. VI. 391.
Xerocarpicae Schauer. II. 920. V. 726. (Myrtaceae)
Xerocarpicae Bth. (Vaccinieae) VI. 415.
Xerocarpus Guill. et Perr. I. 606.
— hirsutus Guill. et Perr. *I. 606. no. 1.
Xerochlaena DC. II. 992. no. 1.
Xeropetalum Delile I. 349. V. 113.
— minus Endl. I. 349. no. 2.
— multiflorum Endl. I. 349. no. 1.
— quinquesetum Delile. V. 113. no. 1.
— rotundifolium Hochstett. V. 114. no. 2.
— tiliaceum Endl. I. 349. no. 3.
Xerothamnus DC. *II. 585. *II. 951. no. 2.
Xerotium Gallicum Bluff et Fingerh. VI. 248. no. 1.
Ximenesia Cav. *II. 622.
Ximenia Plum. I. 377. *II. 803. V. 137.
— Americana Plum. *I. 377. no. 1.
β. inermis Hochstett. V. 137. no. 1.
— inermis Mcfd. I. 377. no. 4.
— laurina Delile. V. 137. no. 1.
— *montana* Macf. I. 377. no. 1.
—? olacioides Wght. et Arn. I. 377. no. 2. (III. Emend. p. 2.)
— parviflora Bth. I. 377. no. 3.
— *Russelliana* Wall. I. 377. no. 1.
Xiphocarpus Prsl. I. 678. V. 516.
Xiphocarpus Prsl. V 515. no. 3.
— Martinicensis Prsl. *I. 678. no. 1. V. 516. no. 1.
Xiphochaeta Poepp. et Endl. II. 538. *II. 944. °VI. 88.
— aquatica Poepp. et Endl. *II. 538. no. 1. VI. 88. no. 1.
Xiphotheca axillaris Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 5.
— *lanceolata* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 6.
— *polycarpa* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 1.
— *rotundifolia* Eckl. et Zeyh. I. 580. no. 1.
— *sericea* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 4.
— *tomentosa* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 2.
— *villosa* Eckl. et Zeyh. I. 581. no. 3.
Xuaresia Rz. et Pav. III. 264. °III. 962.
Xuaresia biflora Rz. et Pav. III. 264. no. 1.
Xyladenius Desvx. I. 204.
— glandulosus Desvx. *I. 204. no. 1.
Xylia Bth. I. 884. °V. 587.
— dolabriformis Bth. *I. 884. no. 1. V. 587. no. 1.
Xylobium Vogel. I. 813.
Xylocarpus Adr. Juss. I. 435.
— Granatum Koen. *I. 435. no. 1.
— obovatus Adr. Juss. I. 435. no. 1.
Xylodontes (Hyptis) Bth. III. 545. VI. 659. no. 5.
Xylopia Linn. I. 75.
— Aethiopica A. Rich. *I. 75. no. 11.
— barbata Hffmnsgg. I. 75. no. 4.
— Brasiliensis Spr. *I. 75. no. 2.
— Cubensis A. Rich. I. 75. no. 9.
— emarginata Mart. I. 75. no. 3.
— frutescens Aubl. *I. 75. no. 1.
— grandiflora St. Hil. I. 75. no. 6.
— Langsdorffiana St. Hil. et Tulasne. I. 75. no. 8.
— obtusifolia A. Rich. I. 75. no. 10.
— ochrantha Mart. I. 75. no. 5.
— *parvifolia* Schlchtd. I. 75. no. 2.
— *prinoides* Dun. I. 80. no. 1.
— sericea St. Hil. I. 75. no. 7.
— trunciflora Cham. et Schlchtd. I. 75. no. 12.
— undulata Pal. B. I. 75. †
Xylopicae Endl. I. 74. II. 747. V. 14.
Xylopleurum Spach. II. 85.
— *Berlandieri* Spach. II. 85. no. 63.
— *Drummondii* Spach. II. 85. no. 64.
— *hirsutum* Spach. II. 85. no. 62.
— *Nuttaltii* Spach. II. 85. no. 64.
— *obtusifolium* Spach. II. 85. no. 64.
Xylorhiza Nutt. *II. 576. *II. 952. no. 10.
Xylorhiza (Aster) Nutt. II. 572.
— *glabriuscula* Nutt. II. 572. no. 116.
Xylosteum Juss. II. 448. VI. 4. VI. 697. no. 1.
— *arboreum* B. Webb. II. 448. no. 12. VI. 5. no. 2.
— *asperifolium* Dcne. II. 449. no. 18.
— *oblongifolium* Goldie. II. 450. no. 24.
— *Solonis* Eat. II. 450. no. 23.
— *spinosum* Dcne. II. 449. no. 19.
Xylotheca Hochst. °V. 56.
— Kraussiana Hochst. V. 56. no. 1.
Xyridanthe Lindl. II. 645. VI. 232.
— stricta Lindl. *II. 645. no. 1. VI. 232 no. 1.
Xysmalobium R. Br. *VI. 483.

Y

Yerba de Cumbre III. 169. no. 27.
— *del venado* VI. 509. no. 4.
Youngia Cassini. VI. 360.
— diversifolia Ldb. VI. 361. no. 4.
— flexuosa Ldb. VI. 361. no. 5.
— glauca Edgeworth. VI. 360. no. 1.
— Kochii Ldb. VI. 360. no. 3.
— pygmaea Ldb. VI. 361. no. 6.
β. flaccida.
γ. dentata.
Youngia pygmaea Ldb. VI. no. 6.
δ. lyrata.
α. nana.
— stenoma Ldb. VI. 360. no. 2.
Ὑποσφαιρολόβιον Renealm. V. 509. no. 8.
Yrmeloffia Belanger. III. 808.
— *hispida* Belanger. III. 809. no. 5.
— *insignis* Belanger. III. 808. no. 4.
Yungia Cass. *II. 691.

Z

Zacyntha Tournef. *II. 695. *VI. 359.
Zahlbrucknera Rchb. II. 362.
— paradoxa Rchb. *II. 362. no. 1.
Zaluzania Pers. *II. 611.
Zaluzianskya F. W. Schmidt. III. 306. °III. 967. *VI. 641.
— Benthamiana Wlprs. III. 309. no. 15.
— Capensis Wlprs. III. 307. no. 5.
γ. foliosa.
β. glabriuscula.
α. hirsuta.
δ. tenuifolia.
— coriacea Wlprs. III. 306. no. 1.
— dentata Wlprs. III. 307. no. 7.
— divaricata Wlprs. III. 308. no. 12.
— longiflora Wlprs. III. 307. no. 6.
— lychnidea Wlprs. III. 307. no. 4.
— maritima Wlprs. III. 307. no. 3.
— ovata Wlprs. III. 307. no. 8.
— peduncularis Wlprs. III. 308. no. 13.
β. glabriuscula.
α. hirsuta.
— pumila Wlprs. III. 307. no. 9.
Zaluzianskya pusilla Wlprs. III. 308. no. 11.
— selaginoides Wlprs. III. 308. no. 10.
β. glabra.
γ. parviflora.
α. villosa.
— spathacea Wlprs. III. 306. no. 2.
— villosa F. W. Schmidt. III. 308. no. 11.
Zanonia Linn. II. 194.
— angulata Wall. II. 194. no. 3.
— cissoides Wall. II. 194. no. 4.
— clavigera Wall. II. 194. no. 2.
— heterosperma Wall. II. 194. no. 6.
— Indica Linn. II. 194. †
— laxa Wall. II. 194. no. 5.
— sarcophylla Wall. II. 194. no. 1.
— Timoriensis Spanoghe. II. 194. no. 8.
— Wightiana Arn. II. 194. no. 7.
ZANTHOXYLEAE Adr. Juss. I. 519. II. 825. V. 395.
Zanthoxylum Kth. I. 519. II. 825. V. 396.
— aculeatum Mcfd. I. 521. no. 25.
— acuminatum Swrtz. *I. 521. no. 22.
— alatum Wlprs. I. 521. no. 16.

Zanthoxylum Australasicum Adr. Juss. I. 522. no. 39.
— bombacifolium A. Rich. II. 825. no. 4.
— Coco Gill. I. 521. no. 19.
—? connaroides Wght. et Arn. I. 520. no. 4. (III. Emend. p. 2.)
— coriaceum Dsvx. I. 521. no. 20.
— coriaceum A. Rich. II. 825. no. 2.
— dumosum A. Rich. II. 825. no. 3.
— elegans St. Hil. I. 522. no. 36.
— elephantiasis Mcfd. I. 521. no. 26.
— emarginatum Swrtz. *I. 521. no. 23.
— *floribundum* Wall. I. 523. no. 2.
— hiemale St. Hil. I. 521. no. 31.
— Javanicum Blume. I. 519. no. 1.
— juniperinum Poepp. et Endl. V. 396. no. 1.
— Lamarckianum Cham. *I. 520. no. 9.
— Leprieurii Guil. et Perr. I. 520. no. 14.
— Magu Bert. I. 521. no. 18.
— melanostictum Schlchtd. I. 521. no. 17.
— monogynum St. Hil. I. 522. †
— montanum Blume. I. 520. no. 3.
— Natalense Hochstett. V. 396. no. 2.
— nemorale Mart. I. 522. no. 38.
— nigrum Mart. I. 522. no. 37.
— nitidum DC. I. 522. †
— nitidum St. Hil. I. 521. no. 30.
— Novae Zeelandiae A. Rich. I. 522. no. 38.
— ovalifolium Wght. I. 520. no. 8.
— petiolare St. Hil. et Tulasne. I. 522. no. 33.
— *polygamum* Thonn. et Schum. I. 520. no. 13.
— praecox St. Hil. I. 521. no. 29.
— pubescens St. Hil. et Tul. I. 522. no. 35.
— ricinoides Blume. I. 520. no. 12.
— rugosum St. Hil. et Tul. I. 522. no. 34.
— Roxburghianum Cham. *I. 520. no. 10.
— Rumphianum Cham. *I. 520. no. 11.
— scandens Blume. I. 520. no. 2.
— Senegalense DC. *I. 520. no. 13.
— serrulatum Blume. I. 520. no. 6.
— sorbifolium St. Hil. I. 521. no. 28.
— spinosum Swrtz. *I. 521. no. 21.
— Sumach Mcfd. I. 521. no. 27.
— taediosum A. Rich. II. 825. no. 5.
— ternatum Swrtz. *I. 521. no. 24.
— tetraspermum Wght. et Arn. I. 520. no. 5. (III. Emend. p. 2.)
— *Thunbergii* DC. I. 559. no. 3.
— Timoriense Spanoghe. I. 520. no. 7.
— Tingoassuiba St. Hil. I. 522. no. 32.
— *triphyllum* G. Don. I. 520. no. 9.
— varians Bth. II. 825. no. 1.
Zapania Juss. IV. 42.
— *Arabica* Poir. IV. 35. no. 6.
— *bracteosa* Poir. IV. 24. no. 53.
Zapania citriodora Lam. IV. 41. no. 1.
— *cuneifolia* Torr.? *IV. 57.
— *echinus* N. ab E. III. 524. no. 1.
— *Javanica* Poir. IV. 50. no. 33.
— *lanceolata* Prsh. IV. 48. no. 28.
— *lantanoides* Lam. IV. 47. no. 20.
— *lappulacea* Lam. IV. 34. no. 1.
— *Mexicana* Lam. IV. 35. no. 4.
— *mutabilis* Zucc. IV. 7. no. 18.
— *nodiflora* Lam. IV. 49. no. 30.
— *odorata* Pers. IV. 47. no. 20.
— *odoratissima* Scop. IV. 47. no. 20.
— *reclinata* Lam. IV. 47. no. 21.
— *repens* Bertol. IV. 49. no. 30.
— *stocchadifolia* Juss. IV. 47. no. 21.
— *suberosa* Spr. IV. 49. no. 29.
— *urticifolia* Poir. IV. 5. no. 7.
— *virgata* Poir. IV. 42. no. 7.
Zataria Boiss. °III. 688. °III. 981.
— multiflora Boiss. III. 688. no. 1.
Zauschneria Prsl. II. 93.
— Californica Prsl. II. 93. no. 1.
— Mexicana Prsl. II. 93. no. 2.
Zehneria Endl. II. 196.
— affinis Endl. II. 196. no. 6.
— Baueriana Endl. *II. 196. no. 8.
— cuspidata Endl. II. 196. no. 3.
— dilatata Endl. II. 196. no. 7.
— Ecklonis Endl. II. 196. no. 2.
— membranacea Endl. *II. 196. no. 4.
— suavis Endl. II. 196. no. 1.
— velutina Endl. II. 196. no. 5.
Zellin Tannay VI. 167. no. 1.
Zenkeria Arn. I. 855. V. 571.
— dalbergioides Arn. *I. 855. no. 1. V. 571. no. 1.
Zenobia D. Don. *II. 727.
Zerdana Boiss. I. 173.
— anchonoides Boiss. *I. 173. no. 1.
Zeyheria Martius. VI. 514.
— Surinamensis Miquel. VI. 514. no. 1.
Zichya Hügel. I. 757. II. 900. V. 530.
— angustifolia Lindl. I. 757. no. 7.
— coccinea Bth. *I. 757. no. 3. V. 530. †
— glabrata Bth. I. 757. no. 5.
— inophylla Bth. I. 757. no. 1.
—? Latrobeana Meisn. V. 530. no. 1.
— Molly Hügel. I. 757. no. 4.
— pannosa Paxton? V. 530. †
— sericea Bth. I. 757. no. 2.
— tricolor Lindl. I. 757. no. 6.
— villosa Lindl. I. 758. no. 8. *II. 900. no. 1.
Zieria Sm. I. 502.
— laevigata Sm. *I. 502. no. 1.
Zietenia Bth. III. 841. VI. 681. no. 17.
— *orientalis* Gled. III. 841. no. 117.

Zilla Forsk. I. 188. II. 763.
— Chamaerapistrum Boiss. II. 763. no. 1.
— microcarpa Vis. I. 188. no. 1.
— *myagroides β. microcarpa* DC. I. 188. no. 1.
— schouwioides Boiss. II. 763. no. 2.
Zilleae DC. I. 188.
Zinnia Linn. II. 608.
— grandiflora Nutt. II. 608. no. 1.
— linearis Bth. II. 608. no. 2.
Zizia Koch. *II. 391.
— *cordata* Koch. II. 403. no. 1.
Zizyphora Linn. III. 684. °III. 981.
— acinoides Linn. III. 685. no. 8.
— acutifolia Montbr. et Auch. III. 685. no. 7.
— *bracteolata* Roem. et Schult. III. 718. no. 3.
— Brantii C. Koch. III. 686. no. 11.
— canescens Bth. III. 685. no. 5.
— capitata Linn. III. 685. no. 9.
— cleonioides Boiss. III. 946.
— clinopodioides M. Bieb. III. 684. no. 1.
α. canescens } Bth.
β. media }
— *clinopodioides* Rudolph. III. 684. no. 1. β.
— *clinopodioides β. acinoides* Rudolph. III. 684. no. 1. α.
— *clinopodioides α. cunila* Rudolph. III. 684. no. 1. α.
— dasyantha M. Bieb. III. 685. no. 4.
— *glabella* Roem. et Schult. III. 718. no. 1.
— Gundelsheimeri C. Koch. III. 684. no. 2.
— Hispanica Linn. III. 685. no. 6.
— *hispida* Roem. et Schult. III. 718. no. 8.
— Javanica Blume. III. 686. no. 12.
— *Mariana* Roem. et Schult. III. 713. no. 1.
— *media* Lnk. III. 684. no. 1. β.
— *Mussini* Adam. III. 684. no. 1. α.
— *pulegioides* Roem. et Schult. III. 716. no. 2.
— *pungens* Bnge. III. 789. no. 72.
— *Puschkini* Adam. III. 685. no. 4.
— serpyllacea M. Bieb. III. 685. no. 3.
— *serpyllacea* Sims. III. 684. no. 1. β.
— *serpyllacea* Ten. III. 686. no. 10.
— *spicata* Cerv. III. 686. no. 10.
— *Taurica* M. Bieb. III. 686. no. 1.
— *tenuior* Falk. III. 684. no. 1. α.
— *tenuior* Karel. et Kiril. III. 686. no. 2.
— tenuior Linn. III. 685. no. 10.
— *thymoides* Roem. et Schult. III. 700. no. 13. β.
Zoegea Linn. *II. 670.
Zollernia Neow. et N. ab E. I. 841. V. 562.
— discolor Vogel. I. 841. no. 3.
— falcata Neow. et N. ab E. I. 841. no. 2.
— Houlletiana Tulasne. V. 562. no. 1.
Zollernia ilicifolia Vogel. I. 841. no. 4. V. 563. no. 3.
α. Clausseniana } Tulasne. V. 563. no. 3.
β. erostris }
— *ilicifolia* Vogel. V. 562. no. 2.
— splendens Neow. et N. ab E. I. 841. no. 1.
— Vogelii Tulasne. V. 562. no. 2.
Zollicoferia DC. *II. 689. VI. 359.
— Arabica Boiss. VI. 359. no. 2.
— *chondrilloides* DC. VI. 359. no. 1.
— mucronata Boiss. VI. 359. no. 1.
Zopoa Wlprs. V. 843.
Zornia Gmel. I. 726. II. 888. V. 520.
— biarticulata G. Don. II. 888. no. 1.
— brachycarpa Vogel. I. 726. no. 6.
— Brasiliensis Vogel. I. 727. no. 11.
— *canescens* Mnch. III. 798. no. 1.
— *disperma* Grah. I. 726. no. 1.
— flemmingioides Moric. V. 520. no. 2.
— Gardneriana Moric. V. 520. no. 3.
— gemella Vogel. I. 726. no. 7.
— gibbosa Spanoghe. I. 726. no. 2.
— graminea Spanoghe. I. 726. no. 3.
— laevis Schlchtd. et Cham. I. 726. no. 8.
— *linearifolia* Moench. III. 796. no. 26.
— linearis E. Mey. I. 727. no. 10.
— nuda Vogel. I. 727. no. 9.
— *nutans* Moench. III. 795. no. 21.
— ovata Vogel. I. 726. no. 4.
— *partita* Moench. III. 797. no. 27.
— *parviflora* Moench. III. 795. no. 19.
— *peltata* Moench. III. 798. no. 3.
— perforata Vogel. I. 726. no. 5.
— sericea Moric. V. 520. no. 1.
— Surinamensis Miq. II. 889. no. 2.
— tenuifolia Moric. V. 521. no. 5.
— virgata Moric. V. 520. no. 4.
— Walkerii Arn. I. 726. no. 1.
Zozimia Hffmnsgg. *II. 416. V. 891.
— *anethifolia* DC. V. 892. no. 1.
— tragioides Boiss. V. 891. no. 1.
Zucca Comm. *II. 205.
Zuccagnia Cav. I. 809.
—? angulata Hook. I. 809. no. 1.
— microphylla Vogel. I. 809. no. 2.
Zuccarinia Blume. *II. 513.
Zucchellia Dcne. *VI. 479.
Zuëlania A. Rich. I. 204.
— lactioides A. Rich. *I. 204. no. 1.
Zwingera Act. Helvet. VI. 549. no. 1.
Zygia P. Br. I. 928. °V. 598.
— Brownei Wlprs. *I. 928. no. 3. V. 598. no. 1.
— fastigiata E. Mey. I. 928. no. 1. V. 598. no. 2.
—? Sassa Bth. V. 598. no. 3.

Zygia virgultosa E. Mey. *I. 928. no. 2.
Zygis aromatica Desvx. III. 725. no. 36.
Zygopeltis Fnzl. *II. 759.
ZYGOPHYLLEAE R. Br. I. 493. II. 822. V. 385.
Zygophylleae Endl. I. 493.
Zygophyllum Linn. I. 494. II. 823. V. 386.
— *album* Dsf. I. 496. no. 14.
— atriplicoides Fisch. et Mey. I. 494. no. 1.
— Australasicum Miquel. V. 386. no. 2.
— *Billardieri* DC. I. 494. no. 2.
— brachypterum Kar. et Kir. I. 494. no. 5.
— *coccineum* Lepech. I. 494. no. 4.
— Commelini Eckl. et Zeyh. *I. 497. no. 23.
— cuneifolium Eckl. et Zeyh. I. 497. no. 25.
— debile Cham. et Schlchtd. I. 496. no. 15.
— dichotomum Lichtenst. I. 497. no. 19.
— divaricatum Eckl. et Zeyh. I. 497. no. 24.
— Eichwaldi C. A. Mey. I. 494. no. 4.
— Fabago Linn. I. 498. †
— flexuosum Eckl. et Zeyh. I. 497. no. 26.
— Fontanesii B. Webb et Berthel. I. 496. no. 14.
— *fruticulosum* DC. I. 494. no. 1.
— furcatum C. A. Mey. I. 494. no. 2.
— horridum Cham. et Schlchtd. I. 496. no. 16.
Zygophyllum lanatum Willd. I. 498. no. 1.
— latifolium Schrenk. V. 386. no. 1.
— Lichtensteinianum Cham. et Schlchtd. I. 496. no. 18.
— limosum Eckl. et Zeyh. I. 497. no. 21.
— macropterum C. A. Mey. I. 494. no. 9.
— maritimum Eckl. et Zeyh. I. 497. no. 20
— melongena Bnge. I. 494. no. 7.
— microcarpum Lichtenst. I. 496. no. 17.
— miniatum Cham. et Schlchtd. I. 495. no. 11.
— pinnatum Cham. et Schlchtd. I. 495. no. 10.
— portulacoides Cham. et Schlchtd. I. 495. no. 12.
— propinquum Dcne. I. 494. no. 6.
— *prostratum* Thnbrg. I. 498. no. 1.
— pterocarpum C. A. Mey. I. 494. no. 3.
— pygmaeum Eckl. et Zeyh. I. 498. no. 27.
— Retama Gill. I. 498. no. 28.
— Rosowii Bnge. II. 823. no. 1.
— semiteres Eckl. et Zeyh. I. 497. no. 22.
— spathulatum G. Don. I. 496. no. 13.
— subtrijugum C. L. Mey. I. 494. no. 8.
Zygostigma Griseb. *VI. 300.
Zymum ...... Aubl. V. 291. no. 2.
— *Madagascariense* Spr. V. 291. no 2.
Zyrphelis DC. II. 955. no. 1.

Addenda et emendanda.

Arenaria adenotricha Bngrd. loco; *Arenaria adenotrichia* Bngrd.
Buchnera aspera Schum. et Thonn. III. 299. no. 4. loco: III. 292. no. 4.
— *curviflora* R. Br. III. 299. no. 5. loco: III. 292. no. 5.
— *gesnerioides* Willd. III. 299. no. 1. loco: III. 292. no. 1.
— *parviflora* R. Br. III. 299. no. 3. loco: III. 292. no. 3.
Capsicum grossum δ. angulosum Fngrht. III. 35. no. 14.
Carim Tumba Rheede. III. 938.
Cichaea acerifolia Prsl. I. 335. no. 14.
Descurainia loco: *Descarainia.*
Diascia alonsooides Bth. III. 181. no. 12.
— parviflora Bth. III. 181. no. 11.
Euphrasia aspera Willd. III. 299. no. 4. loco: III. 292. no. 4.
Genista biflora Dsf. *I. 628. no. 3.
β. plumosa Boiss.
Gloxinia digitaliflora Hook. VI. 402.
Orobanche Indica Spr. III. 299. no. 1.
Rochonia DC. *II. 592.
Sclerotheca Alph. DC. *II. 708.
Stalea Torr. et Gr. *II. 611.

BEROLINI, TYPIS HÆNELIANIS.

Anzeige.

Vielfach ist es bedauert worden, dass das **Repertorium botanices systematicae** sich nicht auch über die apetalischen und monokotyledonischen Gewächse erstrecke, wie es doch anfangs von mir beabsichtigt wurde. Die Schwierigkeit, welche mich von der Ausführung dieses Planes abhielt, lag mit darin, dass es für die hierher gehörigen Pflanzenfamilien mehrentheils an einer vollständigen, brauchbaren Grundlage fehlt. Denn **Sprengel's** *Systema vegetabilium*, die letzte vollendete Uebersicht des Gewächsreiches, ist zu lückenhaft, auch schon zu veraltet und nach einem so mangelhaften Principe bearbeitet, so dass es sich nicht der Mühe verlohnen möchte, dieses trotz alle Dem gegenwärtig noch unentbehrliche Buch durch Supplemente zu vervollständigen.

Deshalb habe ich mich im Einverständniss mit dem Verleger entschlossen, das *Repertorium* nicht fernerweitig in der bisherigen Form fortzusetzen, sondern statt dessen, gleichsam als eine neue Series des Werkes, die

„Annales botanices systematicae"

enthaltend die während des letzten Jahres neu publicirten phanerogamischen Pflanzengattungen und Arten, so wie Berichtigungen zu den bereits beschriebenen, herauszugeben. Es soll dieses Werk in Bänden von unbestimmter Stärke in der ersten Hälfte eines jeden Jahres die Erscheinungen des letzt verwichenen bringen, und sich in der Art an die sechs Bände des Repertorii anschliessen, dass es zu diesen ein fortlaufendes Supplement abgiebt. Zum Schluss eines jeden Bandes wird, um den Gebrauch von vorn herein zu erleichtern, ein Register der abgehandelten Gattungen und Arten erfolgen. Der 1. Band dieses Jahresberichtes der systematischen Botanik wird die Jahre 1846 und 1847 umfassen, und da die Vorarbeiten grösstentheils vollendet sind, so kann mit dem Drucke bald nach Beendigung des gegenwärtig vorliegenden Schlussheftes des Repertorii begonnen werden.

Zwar hat Hr. Prof. **Grisebach** angefangen, einen Jahresbericht der systematischen Botanik zu geben, doch abgesehen davon, dass derselbe in Bezug auf Vollständigkeit Einiges zu wünschen übrig lässt, so beschränkt er sich darauf, die ihm zu Gesichte gekommenen neuen literarischen Erscheinungen blos im Allgemeinen zu besprechen, so dass seine Arbeit zur Bestimmung neuer Pflanzen in keiner Weise benutzt werden kann.

Die möglichste Vollständigkeit zu erreichen, werde ich durchaus keine Mühe scheuen, und hoffe, dass diejenigen Botaniker, welche dem Repertorium bis jetzt ihren Beifall und ihre Theilnahme gezollt haben, nicht anstehen werden, diesem neuen, noch gemeinnützigeren Unternehmen ihre gütige Mitwirkung und Aufmerksamkeit zu widmen. Namentlich ergeht an alle diejenigen Herren, welche sich mit systematischer Pflanzenkunde beschäftigen, und Gemeinsinn genug besitzen, dass sie es einsehen, wie nur durch bereitwillige Mittheilung der so sehr zersplitterten botanischen Literatur eine dem Einzelnen auch bei dem ausdauerndsten Fleisse unerreichbare Vollständigkeit erzielt werden kann, hiermit die eben so angelegentliche als ergebenste Bitte, mich durch Mittheilung seltener Brochüren namentlich der ausserdeutschen Literatur, so wie durch anderweitige Notizen freundlichst unterstützen zu wollen. Jede noch so kleine Mittheilung ist willkommen und bitte ich auf dem Wege des Buchhandels durch Herrn **Friedrich Hofmeister** in **Leipzig** oder direct durch die Post an mich gelangen zu lassen.

Berlin, (Mauerstrasse No. 6 et 7.) im **Februar 1848**.

Dr. G. Walpers.



3 5185 00093 7472

